

801-12  
1840

# САДОВЫЙ СЛОВАРЬ.

Объясненіе словъ, употребляемыхъ въ садоводствѣ, и описаніе встрѣчаемыхъ въ садахъ растений съ указаніемъ ихъ свойствъ и условій для успѣшнаго за ними ухода.

СОСТАВИЛЪ

**П. Е. Волкенштейнъ,**

Почетный членъ обществъ садоводства Императорскаго Россійскаго, московскаго Любителей и многихъ иностранныхъ.

---

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

ИЗДАНИЕ К. Л. РИККЕРА.

Невскій проспектъ, 14.

1889.



ПАМЯТИ

САМУИЛА АЛЕКСѢВИЧА

ГРЕЙГА.

21240-0



2007338923

Типографія Н. А. Леведева, Невскій просп., № 1.

БИБЛІОТЕКА

ДОКТОРА МЕДИЦИНЫ

*Н. И. Скребицкаго.*

Составившій предлагаемый Садовый Словарь далекъ отъ признанія его труда безупречнымъ: многого въ немъ недостаетъ, многое, быть можетъ, сочтется лишнимъ. Единственное значеніе Словаря—то, что онъ является первенцомъ въ нашей литературѣ, и это должно быть всецѣло отнесено къ издателю.

Для сдѣланія книги доступною большинству, размѣръ ея былъ ограниченъ; для сохраненія мѣста допущены сокращенія наиболѣе чаще встрѣчающихся словъ. Сокращенія эти объяснены ниже, хотя читатель могъ бы ихъ понять и безъ этого. Въ описаніи растеній соблюденъ слѣдующій порядокъ: послѣ названія рода (напечатаннаго русскими и латинскими буквами), приведены словопроизводство, семейство, число видовъ въ родѣ (въ скобкахъ), мѣсто нахожденія въ природѣ, естественное развитіе, условія ухода (составъ земли, способъ размноженія и, для болѣе нѣжныхъ растеній, температура зимой и лѣтомъ) \*). Послѣ описанія рода перечислены наиболѣе замѣчательные въ садовомъ отношеніи виды съ переводомъ ихъ названій и съ указаніемъ: мѣста произрастанія въ природѣ, окраски цвѣтовъ, формы листьевъ, времени цвѣтенія, вышины въ футахъ или дюймахъ и нѣкоторыхъ, гдѣ нужно было, свѣдѣній о долговѣчности, разнovidностяхъ и синонимахъ. По ограниченности объема книги, послѣднимъ, къ сожалѣнію, не дано мѣста въ азбучномъ порядкѣ.

\*) При словѣ «папоротники» объяснены условія воспитанія и содержанія этихъ растеній, и въ отдѣльныхъ случаяхъ не повторены.



Составитель позволяет себѣ обратиться къ читателю съ тою же просьбой, какую собиратели житія святыхъ, чтимыхъ св. Церковью, сопровождали свой трудъ, и сказать ихъ словами:

„Молимъ же любовь твою, читателю усердный, аще кая обрящени въ книзѣ сей прегрѣшенія, исправи любовію, прощая немощи человѣчестѣи и несовершенству“.

С.-Петербургъ,  
январь 1889 года.

### Объясненіе сокращеній.

В., в. . . . . Востокъ, восточный.  
волоkn. . . . . волокистый.  
глин. дерн. . . . . глинисто-дерновал.  
гол. . . . . головка (цвѣточная).  
д. . . . . дюймъ.  
двул. . . . . двуклѣтній.  
дерн. . . . . дерновал.  
древ. . . . . древесный.  
З., з. . . . . Западъ, западный; земл.  
куст. . . . . кустарный.  
л., лл. . . . . листъ, листья.  
листов. . . . . листовал.  
М. Д. Н. . . . . Мысль Доброй Надежды.  
многол. . . . . многолѣтній.  
о. . . . . островъ.  
однол. . . . . однолѣтній.

оранж. . . . . оранжерейный.  
песч. . . . . песчанистый, песковатый.  
прицв. . . . . прицвѣтникъ.  
р., рр. . . . . растеніе, растенія.  
разм. . . . . размноженіе, размножается.  
С. . . . . семейство, Сѣверъ, сѣверный.  
Син. . . . . Синонимъ.  
Т., темп. . . . . температура.  
тепл. . . . . тепличный.  
торф. . . . . торфяной.  
трав. . . . . травянистый.  
цв. . . . . цвѣтокъ, цвѣты, цвѣтъ.  
ф. . . . . футъ.  
Ю. . . . . Югъ, южный.

Передъ тѣмъ, чтобы пользоваться Словаремъ, необходимо исправить слѣдующія изъ опечатокъ.

Стр.	Колон.	Строка.	Должно быть,	а не
7	2	1	sarmentosum	samentosum
9	2	16 снизу	Кунинггамп	Кунингамп
13	2	14 —	Облетин	Облетин
14	1	24	laciniata	latiniata
16	1	5	paronichioides	paronichiodes
16	1	19	camelorum	comelorum

22	2	31	Dawsonianus	Dansonianus
25	2	2 снизу	Антирринумъ	Атирринумъ
28	1	19	бикарината	бакарината
—	—	20	bicarinata	basarinata
29	1	26 снизу	люцида	люцида
—	2	16	querciphylla	quercifilla
38	2	6	Аталанта	Аталанта
41	2	21	zelandiae	zelandiae
42	1	22	пурпуреумъ	пирпуреумъ.
53	2	26	Хардвеніи	хартвеніи
54	2	15 снизу	Бляксія	Бляксия
56	1	14 —	Бонния	Бонния
59	1	29	Дигбайяна	Дигбайяна
—	1	4 снизу	вирзингъ	вирзинсъ
64	1	25	fruticescens	fruticescens
73	2	15 снизу	перфектионъ	перфектонъ
75	1	16 —	Boyanâ	Boyanâ
81	1	19 —	Ореодакса	Ореодакса
—	2	34	Сплене	Сплена
—	2	11 снизу	Gagea	Gegea
82	2	29	Andrewsii	Andrewii
83	2	22	пратѣнзе	пратѣазе
—	2	8 снизу	racemosa	racemosa
84	1	6	пегелондесъ	пегелондесъ
—	1	30 снизу	макоуна	макоунеа
86	2	17 —	Глифеа	Глифеа
—	—	11 —	Glyphosperma	Glyphosperma
88	1	21 —	Глауциумъ	Глауциумъ
—	2	23 —	Gowenia	Gowenia
91	1	30 —	boerhaaviaefolia	boerhaaviefolia
95	2	6	Дабѣция	Дабѣция
—	—	19 снизу	Тайерманни	Тайерманни.
97	2	10 —	Wrightii	Wrightii
113	2	14	спатуліта	спатуліна
135	2	25	перспіефолія	перспіефолія
136	1	15	Шейхперн	Шейхперн
137	1	22	Аннѣи	Аннѣи
138	1	15 снизу	Цанін	Цанін
139	1	5	ромбондѣа	домбондѣа
153	1	12 снизу	antiquorum	anticoorum
156	1	18	макроплектронъ	микроплектронъ.
157	1	21 снизу	Коннарусъ	Коннарусъ
159	2	17 —	тенцифолія (C. tennifolia)	теницифолія (tencifolia).
—	—	2 —	lanceolata	lanceolata
160	2	15 —	хубантусъ	хубантусъ
—	—	9 —	Aizelii	Aizelii
165	2	5 —	циліата	циліата
169	1	7	Cunninghamii	Cunninghamii
174	2	15 снизу	Лебулѣзъ	Лебулѣзъ
175	2	3	вернумъ	вернумъ

175	2	18	Leukos	Leukos
176	1	29 снизу	капильлифолія	капильлифолія.
178	2	10 —	Lepedeza	Lepedeza
185	1	27	Лиссохиллюсъ	Лиссохиллюсъ
187	1	26	lateritia	laterisia
193	1	1	Ляблябъ	Ляблябъ.
—	—	23	произведенныхъ	произведенныхъ
—	2	3 снизу	Патерсона	Патерсоне
196	1	29	Лярдисабала	Лярдисабалі
200	1	24	luteo-alba	lutea-alba
203	1	23 снизу	Нортіана	Нортіана
204	1	16	цѣспитова	цѣспитова
213	2	16 снизу	пудика	пудика
232	2	3	Opuntia	Opuntia
241	1	26 снизу	excavatum	excavatum
242	1	13	Рафинѣскіи	Рафинѣскіи
249	1	11 снизу	rhombifolia	rhombifolia
261	1	21 —	Петалікте	Петалікте
264	2	16	Сабинова	Сабинова
270	1	26 снизу	Плюмерія	Плюскерія
—	2	16 —	Плятигаго	Плятигаго
272	1	19 —	Погоріне	Погоріне
275	1	17	Поликарипеа	Поликарипее
279	1	20	Poterium	Poterium
280	2	13	денсифлора	денсифлора
293	1	31 снизу	Рейнвартія	Рейнвартія
294	1	22	Restrepia	Rastrepia
295	1	24 снизу	Рикотія	Рикотія
297	1	21	Rhode	Rohde
—	2	22	кампанулягумъ	кампанулягумъ
298	2	25	Родотіпосъ	Родотіпосъ
301	1	20	Рубаля	Роуполя
—	2	7	Рубусъ	Рубусъ
304	1	32 снизу	монтевидензисъ	монтевидензисъ
305	2	17	пигмѣа	пигмѣа
308	2	17	Санчесіа	Санчесіа
309	1	32 снизу	Ренаеа	Ренаса
313	2	6 —	haematoda	haematoda
314	1	16	семейства	семейство
—	—	24 снизу	онагриновыхъ	онагриновыхъ
316	1	24 —	Sigmatostalyx	Sigmatostalys
320	1	12	крѣпость	крѣпость
—	—	14	Америки	Америки
323	2	3 снизу	Соляндра	Соляндра
325	2	18	Suttonia	Suttonia
—	—	28	Соуербеа	Соуербеа
326	2	3 снизу	juncus	juncus
—	1	24 —	Spigellius	Spigellius
327	1	3	Спирантѣра	Спирантѣра
—	2	4	Спиронѣма	Спиронѣма

328	1	2 снизу	Станѣлія	Станѣлія
—	2	12	Staunthera	Staunthera
336	2	12	перергнумъ	перергнумъ
337	1	20	Ванъ-Вольксеміи	Ванъ-Вольксеміи
338	1	17	тамарисовыя	тамарисовыя
339	2	8	podon	podon
340	2	24	Терминъ	Терминъ
344	1	22	Тинанъ	Тинанъ.
346	1	23	Нуаенанче	Нуаенанче
—	—	25	Токеикофлѣа	Токеикофлѣа
—	—	26	phloeos	phloeos
347	2	24 снизу	зубца	зубца
348	1	22	ясминойдесъ	ясминойдесъ
—	2	31 снизу	africana	африкана
—	—	9 снизу	Трещины	Трещины
350	1	21 снизу	Тристанія	Тристанія
—	2	4	Мелалейка	Мелалейка
—	—	28 снизу	Потса	Потса
351	2	7	trichos	tricho
352	1	1 снизу	Трихосантесъ	Ртихосантесъ
359	2	25 снизу	bifida	befida
360	2	27	Фадіенія	Фадіенія
—	—	16 снизу	Файюсъ	Файюсъ
361	2	21	Phaleria	Phaleria
369	2	28 снизу	Fluegge	Fluegge
370	1	17	Fontanesia	Fonsauesia
376	1	28 снизу	Халлопаннусъ	Халлопаннусъ
377	1	1	coniferae	coniferae
380	1	7	Манглезіи	Манглезіи
381	2	27 снизу	абиссиникусъ	абиссиникусъ
384	1	31	дерн.	древ
—	2	11	Heterorappus	Heterorappus
385	2	19	сириакусъ (H. syriacus)	сириакусъ (H. syriacus)
—	—	4 снизу	съ	и
386	1	21	Hydor	Hydros
—	—	13 снизу	плавающими	плавающе
387	2	21	тонбриджензе	тонбриджензе
388	2	3	спорангіевъ	спорангіевъ
389	1	12	ауликумъ	ауликумъ
—	2	18	славогодниковыхъ	славогодниковыхъ
390	2	18 снизу	пана	пана
391	1	19 снизу	блѣдно-зеленый	блѣдный
392	1	23 снизу	Хомалинтусъ	Хомалинтусъ.
—	—	17 снизу	Гоу	Гоу
—	2	6	касатиковыхъ	касатиковыхъ.
393	1	27	Хорминумъ	Хорминумъ
394	1	15	Хотчинсъ	Хутчинсъ.
—	—	25	Хоу (Howe)	Лоу (Lowe)
395	2	11	Худъ	Гудъ



395	2	5	спизу	земли	зелень
396	1	18	спизу	Хуэрниа	Хуэрниа
397	2	1		Традесканция	Традесканция
398	1	18		Цедронелья	Цедронелья
—	—	43		Цезальпиния	Цезальпиния
—	—	2	спизу	земли	зелены
399	2	10		а постъ	и песокъ
400	1	1		кошведным	кошведным
—	—	25		Центауреа	Центауреа
401	2	17	спизу	дер.	дер.
402	2	21		пентагонусъ	пентагонусъ.
403	2	15	спизу	фастигиата (fastigiata)	фастигиата (fastigiata)
404	1	30		Дипсакусъ	Дипсакусъ
—	2	5		Zexmenia	Zixmenia
405	2	3		вуглярисъ	вуглярисъ
406	2	5		Leechianum	Leechianum
—	—	15	спизу	Куон	Кунос
408	1	26		альтернифолюсъ	альтернифолюсъ
—	—	32		лонгусъ	лонгусъ
—	—	42		черенковъ	черенковъ
—	—	16	спизу	барбатумъ	барбатумъ
—	2	5		villosum	villosum
—	—	2	спизу	Снеисерианумъ	Снеисерианумъ
409	1	9		супербиевъ	супербиевъ
—	—	19		Hainaldianum	Hainaldianum
—	2	7		Лоджиса	Лоджиса
410	2	14		dentata	dentata
412	2	21	спизу	Сиккима	Сиккилеа
—	—	10	спизу	Цианофильюмъ	Цианофильюмъ
413	1	14		мъмечкамъ	съмечкамъ
—	—	30		Амбонна	Амбонна
414	1	3		Химокантесъ	Химокантесъ
—	2	29		Чернокленина	Чернокленина
415	1	19	спизу	Швейггерия	Швейггерия
—	2	5		морозниковыхъ	морцининиковыхъ
416	1	4		Schaefferia	Schaefferia
—	—	10		frutescens	frutescens
—	—	24		пиниатусъ	пиниатусъ
—	—	14	спизу	парегата	парегата
422	1	22	спизу	Эвхаридиумъ	Эвхаридиумъ
424	2	20		Эмпетрумъ	Эмпетрумъ
425	1	9		элитическая	элитическая
—	2	4	спизу	вершина	вершина
428	2	2		Parmenteriana	Parmenteriana
430	1	11		Erythrochiton	Erythrochiton
431	2	20		горная	горная
433	1	5	спизу	Boschianus	Boschianus

Примечаніе. Въ словахъ, содержащихъ *ѣ* или *ѣ*, у которыхъ не означено удареніи, оно падаетъ на эти буквы.

**ААРОНОВА БОРОДА.** См. Сакси-фрага.

**АВЕЛІЯ (Abelia).** Докторъ Клеркъ *Абель*—врачъ англійскаго посольства въ Китай, † 1826. С жимолостныхъ. (7). Гималаи, Китай, Японія, Туркестанъ, Мексика. Оранже. орнам. кустарники. Дерн. пополамъ съ торф. и съ добавленіемъ песку. Черенками и отводкой, въ парникѣ.

**А. рупестрисъ (A. rupestris)**—растущая на камнѣ. Китай. Цв. малиновые, пахучіе, продолжительные. **А. флорибунда (A. floribunda)**, многоцвѣтная. Мексика. Цв. розово-пурпуровые въ мартѣ.

**АВІЕСЪ (Abies), ПИХТА.** *Абесъ*—подыматься, по росту, или *аріосъ* грушевое дерево, по формѣ шишекъ. С. хвойныхъ. (20). Европа, Азія, Сѣв. Америка. Въ названіяхъ большая сбивчивость. Существенный признакъ—двурядные лл., шишки обращенныя вверхъ съ широкими опадающими чешуйками. Песковатая глин. дерн. Сѣменами, черенками и прививкой.

**А. амабилісъ (A. amabilis)**,—миловидная. Калифорнія. Красное р. 180 ф. Растетъ въ Крыму. **А. бальзама (A. balsamea)**, бальзамическая. Соед. Амер. Штаты. 40—60 ф. Вполнѣ вынослива. **А. брактееата (A. bracteata)**, прицветниковая. Юж. Калифорнія. 25 ф. **А. нобилисъ (A. nobilis)**, благородная. С. Калифорнія, Орегоно. 200—300 ф. Растетъ въ Крыму. **А. нордманниана (A. Nordmanniana)**, Нордманнова. Крымъ, Кавказъ. 80—100 ф. **А. пектината (A. pectinata)**, гребенчатая. Европейская или польская пихта. Сред. Европа. 80—100 ф. **А. пиндрои (A. Pindrow)**, гималайская. В. Гималаи. 75—100. Растетъ въ Крыму. **А. сахалинensis (A. sachalinensis)**, сахалинская. Сахалинъ, Японія. 100 ф. **А. сибиріка (A. sibirica)**, сибирская. Сибирская пихта. Сибирь, С.-В. Евр. Россія. 50—60 ф. Вынослива. **А. фразери (A. Fraseri)**, Фразерова. С. Каролина.

30—40 ф. Вынослива; схожа съ *A. бальмеа*. **А. цефалоника (A. cephalonica)**, кефалонская. Горы Греція. 50—60 ф. Растетъ въ Крыму. **А. цилицика (A. cilicica)**, киличійская. Таврскія горы. 40—50 ф. Растетъ въ Крыму.

**АВОВРА (Abobra).** Названіе мѣстное бразильское. С. тыквенныхъ. (1). Юж. Америка. Тепл. или оранже. Рыхлая, легкая. Сѣменами въ апрѣлѣ, въ песков. з., на лѣто можно на воздухъ. Клубн. корни зимою сохраняются въ защитѣ отъ мороза.

**А. виридифлора (A. viridiflora)**, съ зелеными цв.). Южная Америка. Быстрорастущее цѣпкое, орнаментальное р. съ мясистымъ корнемъ. На зиму убирается въ защиту; лѣтомъ—на солнечное мѣсто съ рыхлою землею. Сѣять въ горшки въ апрѣлѣ, въ іюнь высадить на воздухъ.

**АВРИКОСЪ.** См. Арменияка.

**АВРОМА (Abroma).** *А*—отрицаніе, *брома*—хлѣбъ; не съѣдомое. С. павозниковыхъ. (2). Тропич. Азія, Австралія. Тепл. древ. рр. Глин. дерн. пополамъ съ торф. Сѣменами или черенками изъ полувызрѣвшаго роста, въ тепл.

**А. аугуста (A. augusta)**, величавая, съ гладкими цв. ножками. Ост-индія. Цв. грязно-пурпуровые, въ августѣ. 10 ф. **А. фастуоза (A. fastuosa)**, пышная, съ колючими цв. ножками. Австралія. Цв. темно-пурпуровые, въ іюнь. 10 ф.

**АВРОНІЯ (Abronia).** *Абросъ*—пѣжый, по цвѣт. оберткѣ. С. ночевѣтныхъ. (10). Сѣв. Америка. Калифорнскія рр. низкаго роста, цв. похожіе на вербеновые. Одно и многол. трав. рр. Песчанистая; положеніе солнечное. Сѣменами, съ кот. снятъ верхній покровъ передъ посѣвомъ съ осени въ оранжереѣ; всходятъ весной; черенками весной. Зимѣ въ защитѣ отъ холода.

**А. умбеллята (A. umbellata)**, зонтич-



ная). Цв. розовые со слабым запахом, въ апрѣлѣ; ростъ стелющийся. Отъ 6 до 24 д. **А. фрагранс** (A. fragrans, душистая). Цв. бѣлые съ нѣжнымъ запахомъ, особенно вечеромъ, въ маѣ. 1—2 ф. Ростъ болѣе прямой.

**АБРУСЪ** (Abrus). *Abrus*—мяткій, по л. С. бобовыхъ. (5). Тропич. страны. Тепл. выщ. Песков. глин. дерн. съ торф. Сѣменами или черенками въ пескѣ.

**А. прекаторіусъ** (A. precatorius, молитвенный). Изъ красныхъ сѣмечекъ съ чернымъ на верху пятнышкомъ дѣлаются четки. Ост. индія. Цв. свѣто-пурпуровые, въ мартѣ до мая. 12 ф. Нуждается въ сильномъ теплѣ.

**АБУТА** (Abuta). Мѣстное названіе въ Гвѣанѣ. Съ луносѣмненниковыхъ. (6). Троп. Америка. Тепл. выщ. рр. Глин. дерн. пополамъ съ торф. Черенками въ пескѣ, въ тепл. парникѣ.

**А. рурѣсценсъ** (A. rufescens, рыжеватая). Каенна. Цв. сѣрвато-бархатистые снаружи, темно-пурпуровые внутри, въ мартѣ. 10 ф.

**АБУТИЛОНЪ** (Abutilon). Арабское названіе проскурника. С. мальвовыхъ. (70). Жаркія страны. Красивыя, декоративныя кустарныя рр. для оранжерей и на воздухѣ. Уходъ самый невзыскательный. Глин. дерн. пополамъ съ торфяной и съ добавленіемъ рѣчного песка. Необходимо хорошей водостокъ. Въ концѣ мая можно высаживать на воздухъ, при этомъ поливка жидкимъ удобреніемъ весьма полезна. Горшечныя рр. съ осени до весны поливаются меньше. Могутъ выводиться въ питамбовой формѣ. Черенками изъ молодого роста, лучше въ августѣ, сентябрѣ, при темп. 16—17° Р. Сѣмена высѣваются въ той же температурѣ, въ плошкахъ.

**А. арбореумъ** (A. arboreum, древесный). Съ перуанскихъ горъ. Цв. большіе, желтые, лѣтомъ. **А. Дарвини** (A. Darwini, — Дарвиновъ). Бразилія. Цв. ярко-оранжевые съ темными жилками, въ апрѣлѣ. Далъ много помѣсей. **А. инсигне** (A. insigne, — красивый). Изъ Нов. Гренады. Цв. пурпуровые съ темными жилками, зимой. **А. мегалопотамикумъ** (A. megapotamicum, — съ Большой рѣки). Рио-Гранде. Цв. небольшие; доли темно-красныя, лепестки блѣдно-желтые, тычинки—темнокоричневые, осенью и зимой. Называется также **А. максимиліанумъ**. **А. стріатумъ** (A. striatum, — полосатый). Бразилія. Цв. желто-оранжевые съ темно-красными жилками; лѣтомъ, продолжительно. Нужно постоянно прищипывать. **А. Томпсона** (A. Thompsoni, — Томсоновъ). Цв. большіе желтые, полосатые, лѣтомъ; листья

какъ у винограда, съ желтыми и черными пятнами.

**АВЕРРОА** (Averrhoa). *Averrhoa* — арабскій прачъ, жившій во время владычества мавровъ въ Кордовѣ, въ половинѣ XII ст. С. гераніевыхъ. (2). Троп. Азия. Тепл. дерев. рр. Сѣмѣя торф. съ глин. дерн. Черенками изъ полувзрѣлаго роста въ апрѣлѣ, подъ стекломъ, на тепломъ мѣстѣ, въ пескѣ.

**А. Билимбѣ** (A. Bilimbi, Билимби). Отечество неизвѣстно. Цв. красно-пурпуровые, въ маѣ. 8—15 ф. **А. Карамболы** (A. Carambola, Карамбола). Цейлонъ. Цв. красные, въ маѣ. 14—20 ф.

**АВРАНЪ**. См. Граціола.

**АВРІКУЛЯ**. См. Примуля.

**АГАВЕ** (Agave). *Agave*—удивительный. С. амариллисовыхъ (120). Южная Америка, Мексика и южная часть С. Америки Оранж. многол. рр. Глин. дерн. съ пескомъ, добавленіемъ листвои и торфяной для малорослыхъ. Хорошій водостокъ; лѣтомъ сильная поливка, зимой—значительно меньшая. Отпрысками и сѣменами.

**А. американа** (A. americana, американская). Столѣтнее дерево. Американскій Алоэ. Ю. Америка. Цв. желто-зеленые, длинною кистью, въ августѣ. Разновидности: *variegata* (variegata, петролистная), *мексикана* (mexicana, мексиканская) и *пикта* (picta, росписная). **А. аттенуата** (A. attenuata, вытянутая). Мексика. Цв. желто-зеленые. Стовь 4—7 ф. выш. и 3—4 д. толщ. **А. варіегата** (A. variegata, пестрая). Техасъ. Цв. зеленоватые. Лл. пестрые. **А. вивіпара** (A. vivipara, живородящая). Тропич. страны Старого свѣта. Цв. зеленоватые, превращающіеся часто въ луковички. **А. дазиліриойдесъ** (A. dasyliroides, походил на дазилірионъ). Мексика. Цв. желтые. Имѣетъ разновидность *dealbata* (dealbata, бѣловатая). **А. денсифлора** (A. densiflora, съ густыми цв.). Мексика. Цв. красноватые. **А. Кордерой** (A. Corderoyi, — Кордеруа). Мексика. Цв. неизвѣстны. **А. лофанта** (A. lophantha, — гребенчатоцвѣтная). Мексика. Цв. зеленоватые. Имѣетъ разновидности *longifolia* (longifolia, — длиннолистная) и *сегрегата* (segregata, — сизоватая). **А. макранта** (A. macranta, — длинно-иглая). Мексика. Цв. зеленоватые; р. почти безъ ствола. **А. максимиліана** (A. Maximiliana, — Максимиліанова). Мексика. Цв. неизвѣстны. **А. пруиноза** (A. pruinosa, — съ налетомъ). Мексика. Цв. неизвѣстны. **А. Сальмана** (A. Salmiana, — князя Сальма Дика). Мексика. Цв. желтоватые. Имѣетъ разновидность *латиссима* (latissima, — широчайшая). **А. утахензисъ**

(A. utahensis, — изъ Утахы). Южный Утахъ. Цв. желтоватые. **А. филифера** (A. filifera, дающая нити). Мексика. Цв. зеленоватые. **А. хетераканта** (A. heteracantha, съ различными иглами). Мексика. Цв. зеленоватые. Р. безстебельное. **А. хоррида** (A. horrida, — страшная). Съ очень острыми иглами, длиною почти въ 1/2 д. **А. целсіана** (A. Celsiana, Целсы). Мексика. Цв. красно-коричневые. Р. почти безъ ствола. **А. юкцефолія** (A. yuccae-folia, съ листьями какъ у юкки). Мексика. Цв. зеленоватые. **А. Элемсетіана** (A. Eilemsetiana, — Элемсетова). Мексика. Цв. зеленоватые.

Всѣ агаве замѣчательны листьями, и цвѣты ихъ красивы по своимъ, болѣею частью, громаднымъ соцвѣтіямъ, вырастающимъ чрезъ большой промежутокъ времени, давшій имъ прозвище «столѣтнихъ» деревъ, т. е. цвѣтущихъ будто бы по прошествіи ста лѣтъ.

**АГАЛЪМІЯ** (Agalmyla). *Ahalma*—украшение и *mule*—дерево. С. геснеріевыхъ. (3). Ява. Многол. тепл. рр. Торф. съ листвои, торф. мохомъ и древ. углемъ.

**А. стамінеа** (A. staminea, длинно-тычиночная). Ява. Тепличное цѣльное р. Цв. шарлаховые, лѣтомъ. З. торфяная съ листвои и болотнымъ мохомъ; во время роста обильная поливка, съ осени уменьшаемая. Разм. черенками подъ стекломъ. Темп. лѣтомъ не ниже 20° днемъ и 15° ночью.

**АГАНИЗІЯ** (Aganisia). Отъ *aganos*—желанный. С. орхидей. (6). Троп. Америка. Тепл. эпифитъ. На чуркѣ, подвѣшанной къ шпалѣ, въ теплицѣ. Влажный воздухъ, опрыскивать во время роста, затѣнять при сильномъ солнцѣ. Дѣленіемъ передъ самымъ ростомъ.

**А. пультелла** (A. pulchella, — красивая). Демарара. Цв. бѣлые съ желтымъ пятномъ на губѣ, въ разное время года продолжительно. Лучше держать въ горшкѣ въ торфяной землѣ. **А. фимбриата** (A. fimbriata, — бахромчатая). Демарара. Цв. бѣлые съ голубою губою. **А. пѣрулеа** (A. coerulea, — синяя). Бразилія. Цв. голубые.

**АГАНОЗМА** (Aganostma). *Aganostma*—нѣжный и *osme*—запахъ. С. кутровыхъ. Остиндія. Тепличныя красивыя рр. Глин. дерн. съ пескомъ и торфяной, по ровну. Черенками подъ стекломъ.

**А. акумината** (A. acuminata, — остролистная). Сильхетъ. Цв. крупныя, бѣлые. **А. каріофиллята** (A. caryophyllata, — съ запахомъ гвоздики). Индія. Цв. блѣдно-желтые съ розовымъ оттыскомъ. **А. маргината** (A. marginata, — каемчатая). Сильхетъ. Цв. бѣлые пахучіе. **А. Роксбургіи** (A. Roxburgii, — Роксбурга). Индія. Цв. бѣлые, большіе, пахучіе. **А. элегансъ**

(A. elegans, нарядная). Индія. Цв. маленькіе пурпуровые.

Всѣ названныя виды—выщѣся кусты.

**АГАПАНТУСЪ** (Agapanthus). *Agape*—люблю и *anthos*—цвѣтокъ. С. лилейныхъ (3). Южная Африка. Оранж. многол. трав. рр. Плотная глин. дерн. съ листвои, перепрѣвшимъ перегноемъ и пескомъ. На лѣто выставляются на воздухъ, на зиму убираются подъ защиту отъ мороза и содержатся довольно сухо. Лѣтомъ, особенно въ сухую погоду—обильно поливаются. Передъ цвѣтеніемъ или даже во время его—хорошо полить жидкимъ удобреніемъ. Отпрысками и дѣленіемъ весной.

**А. умбеллятусъ** (A. umbellatus, — зонтичный). Мысъ Д. Н. Цв. блѣдно-лазуревые, лѣтомъ и осенью. 2—3 ф. Въ садахъ воспеиваются разновидности: *albifidus* (albifidus — бѣловатый), съ бѣлыми цвѣтами; *ауреусъ* (aureus, — золотистый) съ лл. имѣющими желтыя полосы; *варіегатусъ* (variegatus, — пестрая) съ почти бѣлыми лл., *Лейхтлин* (Leichtlini — Лейхтлина), съ темно-лазуревыми цв., *максимумъ* (maximum — большія), зонтики большіе, ярко-голубыхъ цв., *миноръ* (minor — меньшая), во всѣхъ частяхъ меньше обычныхъ, *Мурайтусъ* (Mooreanus — Мура) цв. темно-лазуревые и *флоре-плено* (flore-pleno — махровая), съ цв. махровыми и потому цвѣтущими продолжительно.

**АГАПѢТЕСЪ** (Agapetes). *Agapetes*—любимый. С. брусничныхъ. (18). Троп. Азия. Тепличн. кустарники. Торфяная съ глин. дерн. и несомъ. Молодыми одревѣвшими черенками, въ теплицѣ, подъ стекломъ.

**А. буксифолія** (A. buxifolia, съ листьями буксы). Востокъ. Цв. ярко-красные, въ апрѣлѣ. 5 ф. Выщѣся р.

**АГАРИКУСЪ** (Agaricus). Обширный родъ, подраздѣляемый на нѣсколько родовъ, шляпныхъ грибовъ, имѣющихъ подъ шляпкой пластинки. Къ нему относятся, въ числѣ многихъ другихъ: груздь, волнушка, сыроушка—изъ съѣдомыхъ, мухоморъ, валуй и др.—изъ неупотребляемыхъ въ пищу.

**АГАСТАХИСЪ** (Agastachys) *Agastachys*—удивительный и *stachys*—колось. С. протейныхъ. (1). Южная Африка. Оранж. куст. р. Глин. дерн. по ровну съ пескомъ и торфяной. Черенками изъ взрѣлаго роста, въ пескѣ, подъ стекломъ, въ оранжерей.

**А. одората** (A. odorata, пахучій). Оранжерейный кустарникъ съ Мыса Добрая Надежды. Цв. блѣдно-желтые, пахучіе, въ апрѣлѣ. 3 ф.

**АГАТѢА** (Agathaea). *Agathos* —



прекрасный. С. сложноцвѣтныхъ. Южная Африка. Оранж. полукуст. рр. Глин. дерн. пополамъ съ торф. Черенками изъ молодого роста, во всякое время года.

**А. цѣлестисъ** (*A. coelestis*—небесно-голубой). М. Добр. Над. Цв. голубые, въ июнь. 1½ ф.

**АГАТОЗМА** (*Agatosma*).—*Agathos* прекрасный и *osme*—запахъ. С. рутовыхъ. (100). Южн. Африка, Мексика и южная часть С. Америки. Оранж. кустарники. Смѣсь песку съ торфомъ и добавленіемъ глин. дерн. Черенками въ песокъ, подъ стекломъ, въ оранжереѣ. Лѣтомъ затѣненіе. Зимой—температура 4—6°.

**А. акумината** (*A. acuminata*—съ остро-конечными лл.). Цв. фіолетовые, въ апрѣлѣ. 1—2 ф. **А. бруниадесъ** (*A. brunia-des*—съ лл. какъ у бруниадесъ). Цв. лиловые или бѣлые, въ апрѣлѣ. 1—2 ф. **А. циліата** (*A. ciliata*—рѣсничатая). Цв. бѣлые, въ апрѣлѣ. 1—2 ф. **А. эректа** (*A. erecta*—прямая). Цв. блѣдно-фіолетовые, въ апрѣлѣ. 1—2 ф.

**АГАТОФИЛЬЮМЪ** (*Agathophyllum*). *Agathos*—прекрасный и *phyllon*—листъ. Лл. пахнутъ гвоздикой. С. лавровыхъ. (1). Мадагаскаръ. Тепл. дерево. Торфяная съ глин. дерн. Черенками, въ умеренномъ теплѣ.

**А. ароматизумъ** (*A. aromaticum*—ароматическій). Мадагаскаръ. Оранжевое дерево. Цв. бѣлые. 30 ф. Плоды доставляютъ мадагаскарскій мускатный орехъ.

**АГЕРАТУМЪ** (*Ageratum*). *A*—нѣтъ и *geras*—старый,—на р. всегда съ. бывають свѣжи. С. сложноцвѣтныхъ. (16). Тропич. и жаркій поясъ Америки. Полувыносл. одно и двул. трав. рр. Родъ этотъ назыв. также *Целестина* (*Coelestina*). Сильная легкая. Съменами и черенками; послѣдній способъ необходимъ для сохраненія уклоненной формы. Большіе оранжер. экземпляры получаютъ посѣвомъ въ январѣ, въ теплицѣ, въ песчанистую землю; всходы разсаживаются какъ только можно ихъ ухватить, и, когда окрѣпнутъ, переносятся похолодѣе и пересаживаются въ большую посуду, а когда разросутся—поливаются жидкимъ удобреніемъ два раза въ недѣлю. Въ жаркую погоду необходимо опрыскивать ежедневно водою отъ паучка. Экземпляры, назначаемые для воздуха, подготавливаются въ одно и то же время, постепенно приучаются къ воздуху и высаживаются въ концѣ мая или началѣ июня. Черенки дѣлаются такимъ же образомъ, какъ и др. мягко-древесныхъ рр., въ теплѣ.

**А. мексиканумъ** (*A. mexicanum*, мексиканскій). Мексиканскій жемчужникъ. Мексика.

Цв. голубовато-лиловые. 2 ф. Есть разновидность съ бѣлыми цв. и много садовыхъ формъ, различающихся ростомъ и окраской цв.

**АГЛАЙЯ** (*Aglaia*). По мнѣнію ботаниковъ имени одной изъ грацій. С. ясенокыхъ. (60). Малайскій арх., Китай, Австралія, остр. Тихаго океана. Тепличный деревъ. Глин. дерн. съ торфяной. Черенками въ теплѣ, песокъ, подъ стекломъ.

**А. одората** (*A. odorata*, пахучая). Китай. Цв. пахучіе, съ февраля по май. 8—10 ф. Говорятъ, что цвѣтами этого растенія китайцы сообщаютъ запахъ чая.

**АГЛАОНЕМА** (*Aglaonema*). *Aglos*—блестящій и *nema*—нить, по глянцевитымъ тычинкамъ. С. ароидей. (20). Троп. Азія, Малайскій арх., частью Африка. Теплич. многол. рр., близкія къ Арумъ и нуждающіяся въ томъ же уходѣ, какъ теилли. Арумъ.

**А. Манни** (*A. Mannii*, Манна). Хребетъ Виктории. Чехолъ бѣловатый. 1½ ф. **А. пиктумъ** (*A. pictum*, расписной). Борнео. Чехолъ желтоватый. 1—2 ф.

**АГРИМОНИЯ** (*Agrimonia*). *Argos*—бѣлый; рр. эти считались цѣлебными отъ бѣльма на глазахъ, а бѣлыми бѣлаго цвѣта. С. розовыхъ. (20). Европа, Азія, Америка. Многол. трав. возд. рр. Обыкновенная садовая. Дѣленіемъ корней.

**А. одората** (*A. odorata*, пахучая). Ренессансъ пахучій. Италія. Цв. желтые съ запахомъ. 2—3 ф.

**АГРОСТЕМА** (*Agrostemma*). *Agros*—поле и *stemma*—вѣнокъ. С. гвоздичныхъ. Одно и многол. трав. рр. Къ этому роду въ садахъ относятся виды Лихнисъ. Здѣсь удержаны садовыя названія. Обыкновенная садовая. Съменами.

**А. коронарія** (*A. coronaria*, вѣнчаная). Аксамитка. Цв. бѣлые съ красною серединой. 1—2. Имѣетъ много разновидностей. Хороша для сухихъ мѣстъ. Изъ Италіи. **А. флосъ-Ювизъ** (*A. flos-Jovis*, цвѣтокъ Юпитера). *Куколекъ*. Цв. пурпуровые, зонтиками, въ июлѣ. Все р. было-пушистое. 1½ ф. Изъ Швейцаріи. **А. цѣли-роза** (*A. coeli-rosa*, небесный розанъ). Изъ Леванта. Цв. пѣжно-розовые, бѣлые или ярко-пурпуровые, лѣтомъ. 1 ф. Имѣетъ формы: *пурпуреа* (*purpurea*) съ темно-пурпуровыми и *фимбриата* (*fimbriata*) съ бахромчатыми цвѣтами.

**АГРОСТИСЬ** (*Agrostis*). *Agros*—поле. С. злаковъ. (100). Повсемѣстно. Декоративные одно и многол. злаки. Съять весной на воздухъ или въ горшкахъ, въ обывков. землю.

**А. небулоса** (*A. nebulosa*, облачный). Однолѣтнее. 1½ ф. **А. пухлякъ** (*A. pulchella*, красивый). Однолѣтнее. 6—12 д.

**А. спика-вѣнти** (*A. spica-venti*, колеблющаяся отъ вѣтра колосокъ). Метла. 1—1½ ф. Однолѣтнее.

**АДА** (*Ada*). С. орхидей. (1). Андскія горы въ Колумбіи. Тепл. эпифитъ.

**А. аурантиака** (*A. aurantiaca*—оранжевая). Цв. красно-оранжевые, зимою и весной, продолжительно. Торфяная земля съ болот. мохомъ; хороший водостокъ, лѣтомъ обильная поливка. Дѣленіемъ, какъ только тронется въ ростъ.

**АДАМИЯ** (*Adamia*). Джонъ Адамъ былъ ген.-губ. въ Индіи и покровительствовалъ ест. наукамъ. С. камнеломковыхъ. (3). Гималаи, Южный Китай, Ява, Филипп. острова. Оранж. куст. рр. Глин. дерн. съ торф. и пескомъ; въ ней же сажаютъ черенки подъ закрытіемъ.

**А. вериколоръ** (*A. versicolor*, разноцвѣтная). Китай. Цв. голубые, въ августѣ. **А. сивьватика** (*A. sylvatica*, лѣсная). Ява. Цв. голубые въ июнь. 6 ф. **А. ціанеа** (*A. cyanea*,—съ голубыми ягодами). Непаль, по скаламъ. Цв. розоватые, въ июнь. 6 ф.

**АДАНСОНІЯ** (*Adansonia*). Мишель Адамонъ былъ знаменитый франц. ботаникъ. С. навозниковыхъ. (3). Африка. Троп. Азія, Австралія.

**А. дигитата** (*A. digitata*, съ перстовидными листьями). *Боабабъ*. Одинъ изъ самыхъ рослыхъ представителей раст. царства; въ садахъ никогда не носились.

**АДГАТОДА** (*Adgatoda*). Мѣстное названіе. С. акантовыхъ. (6). Остиндія, тропич. и Южная Африка, Бразилія. Тепл. куст. рр. Теплота и влажность. Размнож. черенками въ песокъ, какъ Юстинія.

**А. цидоніефолія** (*A. cydoniaefolia*—съ листьями айвы). Бразилія. Цв. бѣлые съ пурпуровымъ, въ октябрѣ. Р. это хорошо для расправки по шпаламъ.

**АДЕЛОВОТРИСЬ** (*Adelobotrys*). *Adelos*—темный и *botrys*—пучекъ. С. черноустовыхъ. (8). Тропическая Америка. Тепл. выощ. рр. Уходъ какъ за Лизандромъ.

**А. Линдѣни** (*A. Lindeni*—Линденовъ). Бразилія. Цв. бѣлые, пѣмниющіеся въ пурпуровые.

**АДЕНАНДРА** (*Adenandra*). *Aden*—железка и *aner*—мужской; пыльники оканчиваются пар. видною железкой. С. рутовыхъ. (21). Южная Африка. Оранж. куст. рр. Въ песокъ съ малымъ количествомъ глин. дерн. Черенками изъ новаго роста до образованія почекъ.

**А. амѣна** (*A. amoena*—красивая). Мысъ Д. Н. Цв. большіе, бѣлые съ красноватою нижнею стороной, въ июнь. 1—2 ф. **А. вильдоса** (*A. villosa*—пушистая). Мысъ

Д. Н. Цв. малиновые, въ июнь. 1—2 ф. **А. умбеллята** (*A. umbellata*—зонтичная). Мысъ Д. Н. Цв. малиновые, зонтикомъ, въ июнь. 1—2 ф. У разновидности *сиендза* (красивая) цв. крупнѣе. **А. фрагрансъ** (*A. fragrans*—пахучая). Мысъ Д. Н. Цв. розовые, душистые, въ май. 1—2 ф.

**АДЕНАНТЕРА** (*Adenanthera*). *Aden*—железка и *anthera*—пыльникъ. С. бобовыхъ. (4). Азія, Африка, троп. Австралія. Тепл. дрв. рр. Смѣсь торф. съ глин. дерн. Черенками, которые рѣжутъ по сѣставу и обрабатываютъ въ песокъ, подъ прикрытіемъ и въ теплѣ.

**А. павонина** (*A. pavonina*—павлинья). Австралія. Цв. красные, въ июль. 5 ф.

**АДЕНИУМЪ** (*Adenium*). Городъ Аденъ, въ окрестностяхъ котораго растетъ. С. кутровыхъ. (4). Аравія, жаркіе поясы Африки. Оранж. сочные куст. рр. Песокъ съ глин. дерн. Черенками изъ полувзрѣлаго роста, подъ рамой.

**А. обѣзумъ** (*A. obesum*, жирный). Аденъ. Цв. малиновые пушистые, въ июль. 3—4 ф.

**АДЕНОКАЛИМНА** (*Adenocalymna*). *Aden*—железка и *calymna*—покрывъ; на поверхности лл. и цвѣтовъ многочисленныя железки. С. бинбоніиныхъ. (20). Южная Америка. Высоковыощ. тепл. рр. Теплый и влажный воздухъ. Торф. съ глин. дерн. Черенками подъ прикрытіемъ въ тепломъ грунтѣ.

**А. комозумъ** (*A. comosum*,—волосистая). Бразилія. Цв. желтые въ сентябрѣ. 10 ф. **А. нитидумъ** (*A. nitidum*—блестящая). Бразилія. Цв. желтые, въ февралѣ. 10 ф.

**АДЕНОКАРПУСЪ** (*Adenocarpus*). *Aden*—железка и *karpos*—плодъ. С. бобовыхъ. (8). Ю.-З. Европа, С. Африка, Канарскіе о. Оранж. куст. рр. Смѣсь торфа съ глин. дерн. и пескомъ. Съменами (въ марѣ) и отводкой, или прививкой. Черенки изъ молодого роста укореняются хорошо подъ прикрытіемъ.

**А. фоліолосъ** (*A. foliolosus*—съ немногими лл.). Канарскіе о. Цв. желтые, въ май. 4—6 ф. **А. хиспанікусъ** (*A. hispanicus*—испанскій). Испанія. Цв. желтые, въ июнь. 2—4 ф.

**АДЕНОФОРА** (*Adenophora*). *Aden*—железка и *phoreo*—носить; при основаніи столбика железка. С. колокольчиковыхъ. (15). Западн. Европа, Азія, Африка. Многол. выносл. рр. Сильная земля. Съменами; дѣленіемъ корней—нельзя. Въ умѣр. климатѣ хорошо зимуютъ.

**А. дентикулата** (*A. denticulata*—зубчатая). Даурія. Цв. голубые, въ июль 1½ ф. **А. коронопифолія** (*A. coronopifolia*,—съ листьями крушины). Даурія. Цв. голубые, крупнѣе, въ июль. **А. Ламаркии** (*A. La-*



marckii—Дамаркова). Европа. Цв. голубые, въ июнь. 1—2 ф.

**АДІАНТУМЪ** (*Adiantum*). *Adiantos*—сухой; вода не смачиваетъ листьевъ. (130). Азія, Африка, Канарскіе острова, Америка, Австралія, Европа. Дренажъ и волоконистая торфъ съ глини. дерн. и пескомъ—существенныя условія, сверхъ того достаточный просторъ для кома.

**А. ассимили** или **этиопикумъ** (*A. assimile*, —присоединенный, а. *aethiopicum* —этиопскій). Испанія. 12—18 д. **А. Вильямса** (*A. Williamsii*—Вильямсовъ). Перуанскія горы. 9—18 д. **А. Капильюсъ-Венерио** (*A. Capillus-Veneris*, Венеринъ волосъ). *Килная трава*. Европа. 4—9 д. Имѣетъ очень много садовыхъ формъ. **А. макрофиллюмъ** (*A. macrophyllum*—крупнолистный). Тропич. Америка. 9—15 д. **А. педатумъ** (*A. pedatum*—столообразный). Индія и Соед. Амер. Штаты. 9—24 д. **А. тенерумъ** (*A. tenerum*—нѣжный). Мексика. 1—3 ф. Имѣетъ разновидность *Фирлейензе* (*Farleyense*—Фарлеена) изъ Барбадоса. **А. формозумъ** (*A. formosum*—красивый). Австралія. 18—24 ф. **А. фудеумъ** (*A. fulvum*—рыжеватый). Новая Зеландія. 9—12 д.

**АДЛУМІЯ** (*Adlumia*). *Adlumino*—окаймлять пурпуромъ, по цвѣтамъ. С. дымянокъ. Только одинъ оранжей или полувыносливый вьющійся видъ изъ сѣв. Америки. Сѣменами.

**А. цирроза** (*A. cirrhosa*—съ прищипками). Цв. розовые, въ июнь. Двухлѣтнее, но самоцвѣтѣ—многолѣтнее. Очень ломкое, должно быть подъ закрытіемъ Сип. Коридалисъ **фунгоза** (*Corydalis fungosa*).

**АДОНИСЪ** (*Adonis*). Многологическое имя. С. лютиковыхъ. (4). Европа, Азія. Одно или мног. трав. пр. Однолѣтніе уступаютъ многолѣтнимъ. Обыкн. садовая. Сѣменами, а многолѣт.—и дѣленіемъ.

**А. аутомналисъ** (*A. autumnalis*—осенній). *Уголекъ изъ огня. Павлики очі*. Европа. Цв. ярко-красные съ черной середкой, въ май. 1 ф. Однолѣтній. **А. верналисъ** (*A. vernalis*—весенній). *Горчичникъ*. Европа. Цв. желтые, крупные, въ апрѣль. 9 д.—1 ф. Многолѣтній. **А. вольгензисъ** (*A. volgensis*, —новожскій). Россія. Цв. желтые, весной. Форма средняя между верналисъ и пиренаикъ. Многолѣтній. **А. пиренаика** (*A. pyrenaica*, пиренейскій). Пиренейскія горы. Цв. желтые, въ июль. До 1 ф. Многолѣтній. **А. эстивалисъ** (*A. aestivalis*—лѣтній). Южн. Европа. Цв. ярко-малиновые, въ июнь. 1 ф. Многолѣтній.

**АЭРАНТУСЪ** (*Aëranthus*). *Aer*—воздухъ и *anthos*—цвѣтокъ. С. орхидей.

(2). Маскаренскіе о. Эпифиты. Уходятъ какъ за Ангулоа, съ которыми схожи.

**А. арахнитисъ** (*A. arachnitis*, —паукообразный). Мадагаскаръ. Цв. зеленые. 4 д. **А. грандифлора** (*A. grandiflora*—крупноцвѣтнй). Мадагаскаръ. Цв. желтовато-зеленые, большіе. 8 д.

**АЭРИДЕСЪ** или **АЭРИДЕСЪ** (*Aërides*). *Aer*—воздухъ, по способности извлекать пищу изъ одного воздуха. С. орхидей. (10). Тепл. эпифиты. Остиндія, Малайск. арх., Японія. Молодые пр. прикрѣпляются къ чуркамъ и этимъ довольствуются, поглощая влажнсть изъ воздуха, но когда разрастутся—сажаются въ горшки, наполненные  $\frac{1}{4}$  битыми черепками и кусками древесины. угля,  $\frac{2}{3}$  живымъ торфянымъ мохомъ, на который и сажаютъ корни. Съ ранней весны до сентября обильно смачиваются, но отнюдь не моча цвѣтотъ; потомъ поливку постепенно уменьшаютъ и воздухъ держатъ сухое, но не доводя до завяданія листьевъ. Зимой 11—12°, весной ночью 18, днемъ—21, лѣтомъ ночью 17, днемъ 21—23°.

**А. аффине** (*A. affine*—сродный). Остиндія. Цв. пѣжно-розовые. 3 ф. У разнор. *супербумъ* (*superbum*, —превосходный) цв. крупнѣе и ярче. **А. Вильямса** (*A. Williamsii*—Вильямсовъ). Индія. Цв. свѣтло-малиновые. Видъ рѣдкій. **А. виренсъ** (*A. virens*—сильный). Остиндія. Цв. бѣлые съ розово-пурпуров. крапинками съ апрѣля до іюля, очень душистые. Разнов. *Эллиси* (*Ellisii*, —Эллиза) им. цв. крупнѣе. **А. квинквевульнерумъ** (*A. quinquevulneum*—съ пятью язычками). Филиппинскіе ос. Цв. бѣлые съ 5 красными пятнышками, пахучіе, поздно лѣтомъ до осени. 12 д. **А. криспумъ** (*A. crispum*—курчавый). Бомбей. Цв. бѣлые съ розово-пурпуровымъ отливомъ, долго остающіеся. Разновидн. *Линдлейанумъ* (*Lindleyanum*—Линдлеева) болѣе сильнаго роста съ болѣе крупными и яркими цв., а разнов. *Варнери* (*Wagneri*)—мельче видовой формы. **А. макулосумъ** (*A. maculosum*—пятнистый). Бомбей. Цв. крупные розовые съ красными пятнами. **А. нobile** (*A. nobile*—благородный). Остиндія. Цв. бѣлые съ ярко-розовыми пятнышками и кончиками. **А. одоратумъ** (*A. odoratum*—благоуханный). Остиндія. Цв. бѣлые, очень душистые. Одно изъ старинныхъ пр.

**АЕРОФИТЫ**. Растенія растущія всецѣло въ воздухѣ.

**АЗАРУМЪ** (*Asarum*). Происхождение назв. сомнительно. С. кирказоновыхъ. (13). Европа, Гималай, В. Азія, Японія и особенно С. Америка. Многол. вынос. трав. пр. Легко размнож. дѣленіемъ.

**А. канадензе** (*A. canadense*—канадскій).

Канада. Цв. коричневыя, въ май, июнь. 1 ф. **А. каудатумъ** (*A. caudatum*—хвостовый). Калифорнія. Цв. красно-коричневые съ лопастями чашечки очень вытянутыми. **А. европеумъ** (*A. europaeum*, европейскій). *Комитени. Грызникъ*. Цв. грязно-коричневые, въ май. лл. почковидные. 1 ф.

**АЗИМИНА** (*Asimina*). Происхождение названія не опредѣленно. С. аноновыхъ. (8). Америка. Оранже. куст. пр. Торф. съ пескомъ. Отводки осенью; посѣвъ—въ горшки.

**А. трилоба** (*A. triloba*, трехлобная). Пенсильванія. Цв. колокольчатые, пурпуровые, въ май. 10 ф. Дерево.

**АЗОТЬ**. Газъ входящій въ составъ воздуха и орудныхъ тѣлъ, имѣющій важное значеніе.

**АЙВА**. См. Цидонія.

**АЙНСЛЕА** (*Ainslaea*). Д-ръ *Энсли* (*Ainslie*), авторъ сочиненія объ индійскихъ врачевныхъ средствахъ. С. сложнотѣльных. Многолѣтн. трава. пр. введенныя въ сады недавно. Легкая сильная. Дѣленіемъ.

**А. Валькере** (*A. Walkeriae*, —Миссъ Уокеръ). Гонконгъ. Цв. головки бѣлыя, пыльники красные. 1 ф.

**АЙЛАНТУСЪ** (*Ailantus*). *Ailanto*—стройный. С. желтодревесниковыхъ. (4). Остиндія, Китай, троп. Австралія. Оранже. и темл. пр.

**А. glandulosusъ** (*A. glandulosus*, съ железками). Китай. Лучшая з. легкая и влажная. Цв. зеленоватые, большими метелками, имѣющими непріятный запахъ, въ августъ. 60 ф.

**АЙРА** (*Aira*). *Aira* у грековъ назывался пирей. С. злаковъ. (5). Европа. Прям. вынос. пр. Обыкновенная садовая. Сѣять весной.

**А. пулхелла** (*A. pulchella*, красивая). Луговой. Южн. Европа. Метелка рыхлая, ростъ—кустомъ. 6—80. **А. флексуоза** (*A. flexuosa*, изгибающаяся). *Молодотникъ*. Европа. Метелка прямая, пленки коричневыя. 1 ф.

**АЙТОНІЯ** (*Aitonía*). *Эйтонъ* (*Aiton*) былъ главнымъ садовникомъ кьюсскаго сада въ Лондонѣ. С. ясенковыхъ. (1). Мисъ Д. Н.

**А. капензисъ** (*A. capensis*, съ Мыса Д. Н.). Оранжевый кустарникъ въ 2 ф. Цв. малиновые, въ июль. Торфяная поплазъ съ глини. дер. Черепками въ песокъ, теплѣ, подъ прикрытіемъ.

**АЙЦООНЪ** (*Aizoon*). *Аей*—всегда и *зоонъ*—живетъ; р. живетъ во всякихъ условіяхъ. С. портулаковыхъ. (8). Южн. Европа. Канар. о., Африка, Австралія. Оранже. одно или двух. трав., либо кустар. пр.

**А. сарментозумъ** (*A. sarmentosum*, дающій отпрыски). Юж. Африка. Оранжевый полукустарникъ. Легкая, песчанистая земля, сухой воздухъ. Цв. зеленоватые, лѣтомъ.

**АКАЖУ**. См. Анакардиумъ.

**АКАЛИФА** (*Acalypha*). *Akalos*—непріятный и *aphe*—для осязанія. С. молочайныхъ. (220). Куст. теплич. орнамент. пр. съ пестрыми лл. Тропическія страны. Цв. незначительные. Торф. съ глини. дерн. Черепками въ апрѣль, въ теплицѣ.

**А. Вилькенсіана** (*A. Wilkensiana*, Вилка). Нов. Гебридскіе о. Лл. съ красными и малиновыми пятнами и крапинками. 6—10 ф. Сип. **А. триколоръ** (*A. tricolor*). **А. макрофилла** (*A. macrophylla*, крупнолистная). Лл. большіе, рыжеватого цв. съ бѣлыми пятнами. Лучшій тепл. видъ.

**АКАНТОВЫЯ** растенія (*acanthosae*). Многочисленное семейство обыкновенно мягкихъ травянистыхъ растеній съ угловыми цвѣтками, у которыхъ чашечка состоитъ изъ наслоячатыхъ чешуекъ, а вѣтчикъ со сросшимися лепестками. Прицвѣтники большіе, листовые.

**АКАНТОЛИМОНЪ** (*Acantholimon*). *Acanthos*—игла и *limon*—желтокорень (*Statice*). С. попутниковыхъ. (84). Вост. Азія. Выносим. или оранжевый пр. Песковатая. Сѣменами, или черепками позднимъ лѣтомъ, въ парникѣ.

**А. венустумъ** (*A. venustum*, прелестный). Килікія. Цв. розовые, лѣтомъ. 6—8 д. **А. глумациеумъ** (*A. glumaceum*, плечатый). Малая Азія, Кавказъ. Цв. розовые, колосомъ, лѣтомъ. Сип. *Статиче арапати* (*Statice Ararati*).

**АКАНТОРИЦА** (*Acanthorhiza*). *Akantha*—игла и *rhiza*—корень. С. пальмъ. (3). Сред. Америка. Тепличныя пальмы, отличающіяся отъ *Trithrinax* воздушными корнями, окрѣпающими въ иглы, а также пластинками вай, разсѣченныхъ до основанія черенка. Сильная глини. дерн. Сѣменами.

**А. акулеата** (*A. aculeata*—съ иглами). Мексика. Назыв. также *Хамеоронъ стаураканта* (*Chamaeops stauracantha*). **А. Варшевичи** (*A. Warzewiczii*, Варшевича). Трон. Америка. Пластика л. неправильно разсѣченная, на нижн. створѣ бѣлаго цв.

**АКАНТОФЕНИКСЪ** (*Acanthophoenix*). *Akantha*—колючка и *phoenix*—финиковая пальма. С. пальмъ. (4). Маскаренскіе о. Тепл. пальмы, близкія къ *Agave*. Темп. лѣтомъ 16—22°, зимой отъ 10 до 15°. Сѣменами. Глини. дерн., торф., листовая и песокъ—по ровну.

**А. кринитумъ** (*A. crinitum*—волоса).



тій). Сейшельскіе о. Стволъ съ черными пятнами.

**АКАНТЕФИШПУМЪ** (*Acanthophippium*). Происхождение названія неопределенно. С. орхидей. (4). Остиндія, ос. Малайского архипелага. Тепл. земныя рр. Песков. торф. съ камешками, битыми черенками или гравіемъ. Дѣленіемъ луковицы при началѣ роста. Темп. въ состояніи покоя 8—13, во время роста 17—22.

**А. бикодоръ** (*A. bicolor*, двуцвѣтный). Цейлонъ. Цв. пурпуровые съ желтымъ, въ июль. 9 д. **А. Куртиса** (*A. Curtisii*, Кортиса). Малайскій архип. Цв. розовые съ пурпуровыми пятнами, въ июль.

**АКАНТУСЪ** (*Acanthus*). *Acanthos* — колючка. С. акантовыхъ. (15). Тропич. и внѣ тропич. страны, преим. въ Африкѣ и Южн. Европѣ. Выносл. или оранж. Орнаментальный, сильныя рр. съ красивыми лл. Глубокая земля, солнечное положеніе. Сѣменами, или дѣленіемъ корней, осенью и весной.

**А. молистый** (*A. mollis*—мягкій). Италия. Цв. бѣлые или розовые, лѣтомъ. 3—4 ф. **А. монтанусъ** (*A. montanus*—горный). Запад. Африка. Цв. розовые, въ августѣ.

**АКАЦІЯ** (*Acacia*). *Акаго*—заострить; многие виды колючіе. С. бобовыхъ. (430). Жаркіе поясы, преим. въ Австраліи и Африкѣ. Оранж. или тепл. куст. и древ. рр. При сильномъ ростѣ стебля и корни обильная поливка. Обрѣзывать лучше вслѣдъ за цвѣтеніемъ (въ маѣ), на лѣто выставитъ на воздухъ, на солнце, отнюдь не засушивая. Зимой темпер. 5—12°. Глин. дерн. пополамъ съ листовою или торф. съ добавкою песка. Черенками съ лоскутомъ древесины, лѣтомъ, не въ сильномъ теплѣ, въ смѣси торфяной земли пополамъ съ пескомъ; послѣ укорененія рассадить тотчасъ же и держать въ прикрытіи въ парникѣ, пока не установятся. Сѣмена сѣютъ какъ только собраны въ песчанисто-торфяную землю, на 1/4 д. глубиною, при темп. 10—12°. Разскаиваются какъ только можно ухватить и держатъ, пока не обростутъ, въ прикрытіи. У поименованныхъ видовъ цв. желтые.

**А. вертицилліата** (*A. verticillata*—кольчатая). Нов. Южн. Валлисъ. Цв. въ мартѣ. 6—10 ф. **А. деальбата** (*A. dealbata*—бѣловатая). Австралія. Тасмани. Цв. лѣтомъ. 10—20 ф. **А. Друммонди** (*A. Drummondii*—Друммондова). Лебяжья рѣка. Цв. въ апрѣлѣ. 10 ф. **А. Леббежъ** (*A. Lebbes*—Леббекова). Ост. и Вост.-Индіа. Цв. пахучіе, въ маѣ. 20 ф. (тепличная). **А. линейарисъ** (*A. linearis*—линейная). Нов. Юж. Валлисъ. Цв. въ маѣ. 3—6 ф. **А. лонгифолия** (*A. longifolia*—длиннолистная). Ав-

стралія. Цв. въ мартѣ. 10 ф. **А. оксидедрусъ** (*A. oxycarpus*—остро-кедровый). Нов. Южн. Валлисъ. Цв. въ апрѣлѣ. 6—10 ф. **А. парадокса** (*A. paradoxa*—необычайная). Австралія. Цв. въ мартѣ. 6 ф. **А. платиптера** (*A. platyptera*—широколистная). Лебяжья р. Цв. въ мартѣ. 3 ф. **А. пульхелля** (*A. pulchella*—красивая). Австралія. Цв. въ апрѣлѣ. 2—3 ф. **А. рундифолия** (*A. rotundifolia*—круглолистная). Австралія. Цв. въ мартѣ. 6 ф.

**АКАЦІЯ ВЪЛАЯ**. См. Робинія. **А. желтая** или **сибирская**. См. Карагана. **А. красная**. См. Лябурнумъ.

**АКВАРІЙ**. Водоемъ для разведенія водныхъ и болотныхъ растений.

**АКВИЛЕГІЯ** (*Aquilegia*). Отъ *aquila*—орелъ, по формѣ лепестковъ. С. лютиковыхъ. Теперь признаютъ 5—6. Европа, Азія, С. Америка. Многол. трав. рр. съ волокнистыми корнями. Влажное, защищенное положеніе, открытое для солнца. Нѣжные пужаются въ смѣси изъ разсыпчатой дерн. съ листовою, при рошемъ дренажѣ. Сѣменами, которые даютъ очень измѣнчивыя формы, такъ что для разведенія извѣстнаго сорта должно раст. посадить отдѣльно и во время цвѣтенія закрыть кисеей отъ налета насекомыхъ; наиболее вѣрный способъ размноженія—дѣленіемъ корней.

**А. альпійка** (*A. alpina*, альпійская). Швейцарія. Цв. голубые или голубые съ бѣлымъ, въ маѣ. 1 ф. **А. вулгарисъ** (*A. vulgaris*, обыкновенная). Голубки; зонки; садовые колокольчики. Дикорост. Цв. разн. окраски, весной и лѣтомъ. Много разновидностей. 1—1 1/2 ф. **А. glandulоза** (*A. glandulosa*, железковая). Сибирь. Цв. ярко-голубые, весной. 8—12 д. Имѣетъ много красивыхъ разновидностей. **А. канадѣнзисъ** (*A. canadensis*, канадская). Сѣв. Америка. Цв. шароховые, въ маѣ—июль. 1—2 ф. **А. пиренейка** (*A. pyrenaica*,—пиренейская). Пиреней. Цв. лиловато-голубые, лѣтомъ. 9—12 д. **А. сибиріка** (*A. sibirica*, сибирская). Сибирь. Цв. ярко-лиловые, лѣтомъ. 1 ф. **А. формоза** (*A. formosa*, красивая). С. Америка. Цв. ярко-красные, съ мая до сентября. 2—4 ф. **А. фразансъ** (*A. fragrans*, душистая). Гималаи. Цв. бѣлые или блѣдно-пурпуровые, съ мая до июля. Оранжер. или по крайней мѣрѣ на зиму вынимаемое изъ грунта р. **А. хризанта** (*A. chrysantha*, съ золотисто-желтыми цв.). Цв. желтые, съ іюня до августа. 3—4 ф. **А. цѣрүлеа** (*A. coerulescens*, голубая). Скалистые горы. Цв. голубые съ бѣлымъ, съ апрѣля. 10—15 д. Имѣетъ нѣсколько разновидностей.

**АКЕВІЯ** (*Akebia*). Японское названіе. С. лунофемниковыхъ. (4). Японія,

Китай. Вьющіеся кустарники, въ умѣренномъ климатѣ воздушные съ прикрытіемъ на зиму, вообще же оранжерейные. Песчанисто-дерн., лист. и торф.-лучшія дѣленіемъ корней и черенками.

**А. квината** (*A. quinata*, съ пятрыными листьями). Чусанъ. Цв. темно-пурпуровые, очень душистые, въ маѣ. 10 ф.

**АКЛИМАТИЗАЦІЯ**. Прирученіе рр. къ новому климату.

**АКМАДЕНІЯ** (*Asmadenia*). *Асте*—коонецъ и *адеи*—железка, по тычинкамъ. С. рутовыхъ. (15). Юго-зап. Африка. Оранж. куст. рр. Торф. съ пескомъ и глин. дерн. Черенками изъ молодого роста, въ песокъ, подъ рамой въ оранжерей.

**А. тетрагона** (*A. tetragona*, четырехгранная). Мысъ Доброй Надежды. Цв. бѣлые, крупныя, въ июль. 1—2 ф.

**АКМЕНА** (*Asmena*). *Астенае*—нимфы Венеры олимпійской. С. миртовыхъ. Малочисленный родъ оранж. кустар. рр. Торф. съ глин. дерн. и пескомъ по ровну. Черенками изъ полурѣзлого роста въ песокъ, подъ рамой.

**А. флорибунда** (*A. floribunda*, многоцвѣтная). Австралія. Цв. бѣлые, полузонтиками, въ маѣ до сентября, ягоды пурпуровыя, шаровидныя. 4 ф.

**АКОНИТУМЪ** (*Aconitum*). *Асонеа* или *Асоне* гавань въ Гераклею, въ Византію, вблизи которой въ изобиліи встрѣчается это р. С. лютиковыхъ. (18). Сѣв. полушаріе. Выносл. многол. трав. Обыкновен. садовая. Не трогая нѣсколько лѣтъ разрастаются и даютъ хорошее цвѣтеніе. Особенно полезны въ затѣненіи деревьями. Дѣленіемъ корней и сѣменами тотчасъ по созрѣваніи. Рр. ядовитыя, особенно ихъ корни.

**А. Камарумъ** (*A. Camatum*). Австрія. Цв. ярко-пурпуровые, въ июль—сентябрь. 3—4 ф. **А. ликостонумъ** (*A. lycoctonum*, волчий). Европа. Цв. тускло-фіолетовые, въ июль. 4—6 ф. **А. напелльзусъ** (*A. Napellus*,—рыбчатый). *Борецъ*. *Пострыль*. Европа. Цв. голубые, крупныя, лѣтомъ. 3—4 ф. Образовать чрезвычайно много разновидностей, которые разводятъ въ садахъ подъ различными названіями. Чрезвычайно ядовиты, поэтому сажать тамъ, гдѣ не могутъ быть опасны для ребенка и домашняго скота. **А. японикумъ** (*A. japonicum*,—японскій). Японія. Цв. тѣлеснаго цвѣта, съ іюля до сентября. 6 ф.

**АКОРУСЪ** (*Acorus*). *А*—безъ и *корс*—зрачекъ, по врачебному будто-бы значенію въ глазныхъ болѣзняхъ. С. ароид. (2). Теплыя страны сѣв. полушарія. Полувынослив, трав. рр. Мѣсто влажное,

по берегамъ водоемовъ; могутъ расти даже въ водѣ, но мелкой. Дѣленіемъ весной.

**А. граминеусъ** (*A. gramineus*,—травянистый). Китай. Низкорослое, красивое р. У разновидности *варіегатусъ* (*variegatus*, пестрый), листья съ бѣлыми полосками. **А. Каламусъ** (*A. Calamus*,—тростниковый). Аиръ. Европа. Цв. маленькіе, желтые, въ початкахъ, лѣтомъ. Имѣетъ разновидность съ бѣло-полосатыми листьями.

**АКРОКЛИНІУМЪ** (*Acroclinium*). *Акрос*—вершина и *клин*—ложе, по открытымъ цвѣткамъ. С. сложноцвѣтныхъ. (42). Австралія и Южн. Африка. Полувыносл. однол. рр. Глин. дерн. Цв. головки не теряютъ цвѣта и употребляются для сухихъ букетовъ. Цвѣтутъ и зимой, для этого сѣять въ августѣ въ горшки и держать въ умѣренной теплотѣ. Для сухихъ цв. собирать головки еще не вполне распустившіяся.

**А. розеумъ** (*A. roseum*, розовый). Ю.-Зап. Австралія. Цв. розовые. 1—2 ф. Имѣетъ разновидности: *альбумъ* (*album*, бѣлый), съ бѣлыми и *грандифлорумъ* (*grandiflorum*,—крупноцвѣтная) съ крупными розовыми цвѣтами.

**АКРОКОМІЯ** (*Acrocomia*). *Акрос*—вершина и *ком*—пучокъ, по листьямъ. С. пальмъ. (8). Троп. Америка. Тепл. пальмы. Сильная песковато-глин. дерн. Отпрысками. Въ садахъ встрѣчаются только два вида:

**А. акулеата** (*A. aculeata*—съ колючками). Вестиндія. 40 ф. **А. склерокарга** (*A. sclerocarpa*—твердоплодная). Вестиндія. 40 ф. Назыв. также *Кокосъ фузиформисъ* (*Cocos fusiformis*).

**АКРОНИХІЯ** (*Acronychia*). *Акрон*—прядь, клочокъ и *онух*—ноготь, по лепесткамъ. С. рутовыхъ. (15). Троп. Азія, Австралія, ос. Южного океана. Орнамент. оранж. куст. рр. Черенками въ іюль подъ прикрытіемъ, въ песокъ. Песков. глин. дерн. съ торф. Темп. зимой 4—6°.

**А. Куннигами** (*A. Cunninghamii*,—Коннингамова). Моретонскій заливъ. Цв. бѣлые, похожіе на померанцевые, съ превосходнымъ запахомъ, въ июль. 7 ф.

**АКРОСТИХУМЪ** (*Acrostichum*). *Акрос*—вершина и *stichos*—рядъ. С. папоротниковыхъ. (180). Тропич. страны. Тепл. и оранж. рр. Торф. съ рубленымъ болотнымъ мохомъ и пескомъ. Большіе экземпляры хороши въ подвѣсныхъ вазахъ, малые—въ вазовыхъ ящикахъ (террариумахъ). Темп. зимой не ниже 8°.

**А. ауреумъ** (*A. aureum*, золотистый). По всему тропич. поясу обихъ полушарій. Тепличное водное р. Синонимъ *Хризодіумъ ауреумъ* (*Chrysodium aureum*). **А. виско-**



**вумъ** (A. viscosum, липкий). Тропическая Америка и тропическ. страны Старого Свѣта. Теплолюбивый видъ. **А. латифолиумъ** (A. latifolium, —широколистный). Мексика. Бразилія. Теплолюб. видъ. Сил. **Элафоглоссумъ латифолиумъ** (Elaphoglossum latifolium). **А. сканденсъ** (A. scandens —извилистый). Гималаи. Оранж. и тепл. видъ. Сил. **Стенохлэна сканденсъ** (Stenochlaena scandens). **А. тенуифолиумъ** (A. tenuifolium, —узколистный). Южн. Африка. Оранж. и теплолюб. видъ. Синонимъ. —**Стенохлэна тенуифолия** (Stenochlaena tenuifolia).

**АКРОТРИХЕ** (Acrotiche). **А. акрос** —вершина и **thrix** —волосокъ; верхняя сторона листочковъ съ волосками. С. эпакриповыхъ. (8). Австралія. Оранж. куст. рр. Торф. пополамъ съ песчанисто-дерн.; черенками изъ молодого роста, въ песокъ, подъ прикрытіемъ.

**А. кордата** (A. cordata, —съ сердцевидными лл.). Австралія. Цв. маленькіе, бѣлые, въ апрѣлѣ. **А. дивариката** (A. divaricata —растопыренная). Нов. Южн. Валисъ. Цв. бѣлые, маленькіе, въ маѣ. 6 д.—1 ф.

**АКРОФИЛЛЮМЪ** (Acrophylum). **А. акрос** —вершина и **phylon** —листъ. С. камнеломковыхъ (1). Австралія. Оранж. куст. р. Волоки. торф. съ добавленіемъ песку. Пересаживать въ февралѣ. Полувызрѣвшими побѣгами, подъ прикрытіемъ. Не засушивать корней. Поздней весной и лѣтомъ опрыскивать.

**А. венозумъ** (A. venosum, —съ жилками). Цв. свѣтло-малиновые, въ маѣ—июнѣ.

**АКСАМИТКИ**. См. Агростемма.

**АКТИНИДІЯ** (Actinidia). **Актин** —лучъ, по расположенію тычинокъ. С. тернстреміиныхъ. (8). Гималаи, Китай, Японія. Выносятся выносл. куст. рр. Сильная, рыхлая. Сѣменами, отводкой и черенками.

**А. коломикта** (A. Kolomikta). С. В. Азія. Цв. бѣлые, лѣтомъ; осенью цвѣтъ листа красный.

**АКТИНОМЕРИСЪ** (Actinomeris). **Актин** —лучъ и **meris** —часть; по расположенію всего р. С. сложнотычинныхъ. (9). Сѣв. Америка, Мексика. Многолѣт. трав. Глин. дерн. Сѣменами и дѣленіемъ корней. **А. хелиантоидесъ** (A. helianthoides —похожій на подсолнечникъ). Южн. Америка. Цв. головки желтыя, въ 2 д., съ іюля до сентября. 3 ф.

**АЛАНГІЕВЫЯ** растенія (alangiaceae). Весьма малочисленное семейство древесныхъ и кустарныхъ растеній, съ непривлекательными цвѣтами, но сочными и съѣдобными плодами. Наиболѣе извѣстны роды **Алангіумъ** и **Нисса**.

**АЛЕБАСТРЪ**. Гипсъ; сернокислая известь.

**АЛЕВРИТЕСЪ** (Aleurites). Съ греческаго, —мучнистый. С. молочайныхъ. (3). Зап. Азія, Малайск. арх. Теплолюбивыя дров. рр. Глин. дерн. Черенками изъ зрѣлаго роста въ песокъ, подъ прикрытіемъ.

**А. трилоба** (A. triloba, трехлопастной). Молуккскіе ос. и Тихаго океана, 30—40 ф.

**АЛЕТРИСЪ** (Aletris). **Aletron** —мука, по мучнистому палету. С. кровяниковыхъ. (8). С. Америка, Японія, Китай. Остіндія, Борнео. Оранж. многол. трав. рр. Сродни съ амариллисами. Торф. съ листовой и пескомъ. Дѣленіемъ корней.

**А. ауреа** (A. aurea, золотистый). Сѣв. Америка. Цв. желтые. 1—2 ф. **А. фарингоса** (A. farinosa, мучнистый). С. Америка. Цв. бѣлые. 1½—2 ф.

**АЛИБЕРТІЯ** (Alibertia). **Алиберт** былъ знаменитый франц. химикъ. С. кипныхъ. (20). Тропич. Америка. Низкія теплолюб. деревья. Глин. дерн. съ торфяной. Черенками подъ прикрытіемъ во влажномъ и тепломъ воздухѣ.

**А. эдулис** (A. edulis, съѣдомая). Гвиана. Цв. бѣлые, въ іюнѣ. Плоды употребляются въ пищу. 12 ф.

**АЛИЗМА** (Alisma). **Alis** —кельтское названіе воды. С. частушнихъ. (6). Повсемѣстно. Выносливыя водяныя рр. Дѣленіемъ корней или сѣменами въ погруженномъ въ воду горшкѣ съ глин. дерн., торф. и пескомъ.

**А. натамсъ** (A. natans, плавающая). З. Европа. Цв. бѣлые, въ іюлѣ. **А. плантато** (A. Plantago, попутниковая). **Частуха**. **Водяной шлемикъ**. Европа. Цв. нѣжно-розовые, въ іюлѣ. Есть разновидность **ланцеолата** (lanceolata), съ ланцетовидными лл. Цв. бѣлые, тоже въ іюлѣ.

**АЛИССУМЪ** (Alyssum). **А** —отрицаніе и **lyssa** —гнѣвъ; р. укрощаетъ-де гнѣвъ. С. крестоцвѣтныхъ. (90). Ю. Европа, С. Африка, Востокъ. Однолѣт. или низкорослыя кустар. многолѣт. рр. Сѣменами, дѣленіемъ корней и черенками. Послѣдніе дѣлаются изъ молодого роста, въ песокъ, рано весной. Сѣять можно на воздухѣ, или въ парникѣ, въ плошки, въ песчанистую землю; сѣмена обычно всходятъ чрезъ 2—3 недѣли. Цв. у всѣхъ желтые.

**А. альпестре** (A. alpestre, альпійскій). Южн. Евр. Цв. въ іюнѣ. Многолѣт. 3 д. **А. Вирсбекіи** (A. Wiersbeckii, Вирсбековъ). Малая Азія. Цв. лѣтомъ. 1½ ф. **А. гемонензе** (A. Gemonense, германскій). Италія. Цв. въ іюнѣ. Многолѣт. 1 ф. **А. саксатиле** (A. saxatile, каменный). В. Европа.

Цв. въ апрѣлѣ. Многолѣт. 1 ф. Разновидность **варіегатумъ** (variegatum, пестролистный). **А. серпиллифоліумъ** (A. serpyllifolium, съ листьями богородской травы). Южн. Европа. Цв. въ апрѣлѣ до іюня. Многол. 3—4 д.

**АЛИЧА**. См. Прунусъ.

**АЛКАЛИ**. Щелочь.

**АЛКАЛОИДЪ**. Вещество щелочнаго свойства, извлекаемое изъ растеній.

**АЛКОГОЛЬ**. Безводный винный спиртъ.

**АЛЛІЯ**. Ведущая къ дому, подѣзная, не должна быть колѣчатая или однообразная, прямая, а красиво-извилистая и не заслоняющая видъ на домъ. Ширина средняя 5 арш., но можетъ быть и больше. Деревья могутъ сидѣть въ одинъ или два ряда, въ переплетъ. Поперечное разстояніе между рядами, правымъ и лѣвымъ, дерево не должно быть меньше 10 арш. Лучшимъ деревомъ для аллеи считается липа, но для той же цѣли могутъ служить и другія какъ лиственные, такъ и хвойныя породы. Между деревьями допускается посадка кустарныхъ растеній.

**АЛОЕ** (Aloe). Названіе арабское. С. лилейныхъ. (90). Южн. Африка, Канарскіе ос. и Средиземное побережье. Оранжерейныя многолѣт. рр., нуждающіяся въ постоянно сильномъ свѣтѣ. Глин. дерн. рыхлая съ торф. и небольшимъ количествомъ перегноя. Для лучшаго водостока можно прибавить толченая кирпичца.

**А. абиссиника** (A. abyssinica, абиссинскій). Абиссинія. Лл. мечевидные, иногда съ пятнышками, розеткой. 1—2 ф. Называется **макулата** (maculata). **А. альбодышнкта** (A. albocincta, съ бѣлыми полосками). М. Д. Н. Лл. ланцетовидные съ сизыми полосками и пятнами. 1—2 ф. **А. арборесценсъ** (A. arborescens, древовидный). М. Д. Н. Лл. мечевидные, розеткой, зеленые. 10—12 ф. **А. бревифолия** (A. brevifolia, коротколистный). М. Д. Н. Лл. ланцетовидные, розеткой. Стволъ короткий. **А. варіегата** (A. variegata, расписной). М. Д. Н. Лл. ланцетовидные съ сирыми пятнышками и бѣловатыми краями. **А. вера** (A. vera, настоящий). М. Д. Н. Лл. мечевидные, блѣдно-зеленые. 1—2 ф. **А. глаука** (A. glauca —сизый). М. Д. Н. Лл. ланцетовидные розеткой. 1 ф. **А. Гриніи** (A. Greenii, Гриновъ). М. Д. Н. Лл. ланцетовидные съ бѣловатыми полосками. Стволъ короткий. **А. дистансъ** (A. distans, рыхлый). М. Д. Н. Лл. овально-ланцетовидные, рѣдкіе. Стволъ короткий. **А. дихотома** (A. dichotoma, развилитый). М. Д. Н. Лл. плотные, ланцетовидные. Стволъ короткий.

**А. Купери** (A. Cooperi, Купера). Наталь. Лл. ланцетовидные, съ бѣлыми зубчиками по краямъ. **А. линейта** (A. lineata, съ черточками). М. Д. Н. Лл. ланцетовидные, розеткой. 6 д.—1 ф. **А. макрокarpa** (A. macrocarpa, толстоплодный). Абиссинія, Лл. розеткой, овально-ланцетовидные. Стволъ короткий. **А. митреформисъ** (A. mitraeformis, митрообразный). М. Д. Н. Лл. рѣдкіе, ланцетовидные. Стволъ 3—4 ф. **А. нобилисъ** (A. nobilis, благородный). М. Д. Н. Лл. ланцетовидные, рѣдкіе. 3—4 ф. **А. Перри** (A. Perri, Перри). Сокоатра. Лл. ланцетовидные. розеткой. Стволъ короткий. **А. стріатула** (A. striatula, съ несными полосками). М. Д. Н. Лл. линейные, зеленые съ зубчатыми краями. Стволъ длинный, хворостинный. **А. суккотрина** (A. succotrina, съ о. Сокоатры). Лл. мечевидные, розеткой. 3—5 ф. **А. триколоръ** (A. tricolor, трехцвѣтный). Ю. Африка. Лл. ланцетовидные съ пятнышками. Стволъ короткий. **А. цезія** (A. caesia, сизо-голубой). М. Д. Н. Лл. ланцетовидные, остроконечные. 12—14 ф. **А. пилата** (A. cilata, рѣснчатый). М. Д. Н. Лл. линейные съ мелкими зубчиками. Стволъ хворостинный. **А. Шимпери** (A. Schimperii, Шимпера). Абиссинія. Лл. продолговато-ланцетовидные, сизые, съ крапинками и полосками. Стволъ короткий.

Всѣ приведенные виды имѣютъ большія метельчатые соцветія изъ желтыхъ или красныхъ красивыхъ цвѣтовъ.

**АЛОЙ АМЕРИКАНСКІЙ**. См. Агава.

**АЛОКАЗІЯ** (Alocasia). Отъ **а** —безъ и **Calocasia**. С. ароидей. (20). Тропич. Азія. Малайск. архип. Теплолюб. многол. рр. нуждающіяся въ большомъ теплѣ и сильной влажности, при обильной поливкѣ. Волокнистая торф. съ волокнистой глин. дерн. и съ примѣсю кусковъ древ. угля, рѣчного песку и большого количества торфяного моха. Поверхъ земли полезно класть мохъ. Водосточный слой на 2/3 вышины горшка, изъ битыхъ, хорошо обмытыхъ черепковъ. Во время роста поливать сильно и разъ или два въ недѣлю дать жидкое удобрение. Весною и лѣтомъ затѣнять. Размнож. сѣменами и дѣленіемъ корневища. Температура зимой 12—14°, лѣтомъ 20—23°.

**А. Дженнингси** (A. Jenningsii, Дженнингсова). Индія. Лл. цвѣтливо-сердцевидные, ярко-зеленые съ темными пятнами. **А. Джонсто́ни** (A. Johnstoni, Джонстона). Соломоновы ос. Лл. серповидные, оливково-зеленые съ розовыми жилками и пятнышками. **А. кутреа** (A. cuprea, мѣдная). Борнео. Лл. сердцевидно-овальные, на нижн. сторонѣ пурпуровые; цвѣточный чехолъ красно-пурпуровый. **А. седени** (A. Sedeni, Седена).



Гибридъ между *A. Lovin* и купреа, лл. сердцевидно-стрѣловидные, бронзово-зеленые. **А. скабріускуля** (*A. scabriscula*, жестковатая). Борнео. Лл. стрѣловидные, темно-зеленые на верхней, свѣтло-зеленые на нижней сторонѣ. **А. Тиботіана** (*A. Thibautiana*, Тиботова). Борнео. Лл. глубоко-сердцевидные, сѣро-оливковые, съ сѣрыми жилками, которыя на нижней сторонѣ пурпуровыя. **А. хибрида** (*A. hybrida*, гибридная). Помесь *A. Lovin* съ *A. купреа*. Лл. эллиптические, темно-оливков. цв. **А. чельсо́ни** (*A. selsoni*, назъ Чельсон). Гибридъ отъ *A. купреа* съ *A. лонгилоба*. Лл. большіе, на верхней сторонѣ темно-зеленые, металлическіе, на нижней—пурпуровые.

**АЛОПА** (*Alopa*). Передѣланное изъ *Нолана*; *nola*—колокольчикъ, по формѣ цвѣтвъ. С. полановыхъ. (6). Чили. Оранжевые кустарнички. Торф. и глини. дерн. Черенками, которые обростають недѣли въ двѣ въ песчанисто-дерн. землѣ, въ умѣренномъ теплѣ.

**А. цѣлестисъ** (*A. coelestis*, небесно-голубая). Чили. Цв. блѣдно-голубые, большіе, въ іюль; лѣтомъ выставляется на воздухъ.

**АЛОНСОА** (*Alonsoa*). *Алонсо*—испаецъ въ Санта Фе де Богота. С. норичниковыхъ. (6). Андскія горы въ Америкѣ, Австралія. Полувыносливыя травянистыя однолѣтн. пр. Легкая, сильная Черенками весной или осенью въ песчан. землѣ, въ умѣренномъ теплѣ, или сѣменами—въ мартѣ; однолѣтнія высаживаются въ маѣ на воздухъ.

**А. Варшевичи** (*A. Warszewiczii*, Варшевичева). Чили. Цв. шарлахово-розовые, въ іюль. 1½ ф. Одно изъ лучшихъ однолѣтнихъ пр. **А. альбифлора** (*A. albiflora*, блѣдноцвѣтная). Мексика. Цв. бѣлые съ желтымъ глазкомъ. 1½—2 ф. Хорошо для горшечнаго содержанія въ оранжевѣ. Цвѣтеть всю осень и зиму. **А. инцизифолия** (*A. incisifolia*, съ разрывными лл.). Чили. Цв. шарлаховые съ мая до октября. Оранжевое полукустарное р. 1—2 ф. **А. линифолия** (*A. linifolia*, съ листьями, какъ у льна). Австралія. Цв. шарлаховые. 1—1½ ф. Прекрасное однолѣтнее р. и для горшечной и для воздушной посадки.

**АЛОЙЗИЯ** (*Aloysia*). Въ честь *Маріи Луизы*, матери испанскаго короля Фердинанда VII. С. железниковыхъ.

**А. цитриодора** (*A. citriodora*, съ цитроннымъ запахомъ). Чили. Оранжев. кустъ, имѣющій пріятный запахъ; признаками походить на вербену, потому назыв. также *Вербена трифилля* и *Линтия цитриодора*. Рыхлая, песчанисто-дерн. Черенками, весной, въ песокъ, въ умѣренномъ теплѣ; укореняются по простотѣ недѣль трехъ. По мѣрѣ вызрѣванія древесины, съ осени поли-

вать меньше, а въ январѣ переставить ближе къ свѣту и въ тепло, причемъ поливать сильнѣе. Когда покажется ростъ—обрѣзають на 2—3 глазка, затѣмъ при слѣдующемъ ростѣ пр. пересаживають въ сильную песчанистую землю и даютъ горшки меньше, а когда комъ оплетется—большіе. Цв. бѣловатые или лавовые.

**АЛТАГАНА**. См. Карагана.

**АЛТѢЙ**. См. Альтей.

**АДУХА**. Низкій сортъ вязниковскихъ вишенъ.

**АЛЬВИНИЗМЪ**. Бѣдное состояніе зеленыхъ частей вслѣдствіе недостатка хлорофилла.

**АЛЬВИЦІЯ** (*Albizia*). По фамиліи итальянскаго ботаника. С. бобовыхъ. (25). Африка, Азія, Австралія. Оранжевые оранж. деревья и кустарнички. Ухождъ какъ за *Акаціей*.

**А. лофанта** (*A. lophantha*—гребенчато-цвѣтная). Австралія. Цв. желтые, въ маѣ. 6—10 ф.

**АЛЬБУКА** (*Albica*). *Албус*—бѣлый. С. лилейныхъ. (30). Южн. Африка. Оранжевые луковичныя пр. Легкая глини. дерн. съ перегноемъ и пескомъ. Сѣменами или дѣтками луковичъ.

**А. ауреа** (*A. aurea*, золотистая). М. Д. Н. Цв. желтые, въ іюль. 2 ф. **А. Нельсо́ни** (*A. Nelsoni*, Нельсонова). Наталь. Цв. бѣлые, лѣтомъ. 4—5 ф. **А. фастигиата** (*A. fastigiata*, пирамидальная). Цв. бѣлые, въ маѣ. 1½ ф.

**АЛЬВУМЪ** растительный. Бѣловое соединеніе, растворимое въ водѣ, по свертывающемуся при нагрѣваніи раствору. Встрѣчается преимущественно въ плазмѣ живой кѣлочки.

**АЛЬПИУМЪ** (*Allium*). *Ал*—жгучій, *пій*. С. лилейныхъ. (250). Европа, Азія, Африка, Сѣв. Америка. Большинство садов. видовъ—бордюрные пр., требующія самого простаго ухода. Размнож. луковичками, котор. отдѣляются осенью или весной и разсаживаются въ промежуточномъ растеніи и на глубину д. 4. Сѣменами ихъ размножаютъ рано весной, сѣять рѣдко и оставляють на грядкѣ или до осени, или до слѣд. весны. Въ продолженіе роста содержать чисто отъ сорной травы, а высокіе—подвизывать къ палочкамъ. Земля легкая.

а) Садовые.

**А. акуминатумъ** (*A. acuminatum*, остро-конечный). С.-З. Америка. Цв. темно-розовые, зонтиками, въ іюль—августъ. 6—10 д. **А. ацуреумъ** (*A. azureum*, лазуревый). Сибирь. Цв. темно-голубые, лѣтомъ; 1—2 ф. **А. Бидвелліи** (*A. Bidwelliae*, Бидвеллея).

*Сьера-Невада*. Цв. ярко-розовые, зонтиками, въ іюль. 2—3 д. **А. Брюэри** (*A. Breweri*, Брюеровъ). Калифорнія. Цв. темно-розовые, зонтиками, въ іюль. 1—3 д. **А. Макнабианумъ** (*A. Mac-Nabianum*, Макнабовъ). С. Америка. Цв. темно-маджестовые, необычные въ *Allium*, зонтиками, лѣтомъ. 1 ф. **А. Моли** (*A. Moly*, Моли). Южн. Европа. Цв. желтые, плотными зонтиками, весной. 10—15 д. **А. неаполитанумъ** (*A. neapolitanum*, неаполитанскій). Южн. Европа. Цв. бѣлые, зонтиками, весной. 15—18 д. **А. нигрумъ** (*A. nigrum*, черный). Южн. Европа. Цв. темно-фиолетовые, зонтиками, лѣтомъ. 2½—3 ф. **А. педемонтанумъ** (*A. pedemontanum*, пиемонтскій). Пиемонтъ. Цв. розово-пурпуровые, въ іюль. **А. ро́зеумъ** (*A. roseum*, розовый). Южн. Европа. Цв. блѣдно-розовые. 12—16 д. **А. сфероцефалумъ** (*A. sphaerocephalum*, круглоголовый). Южн. Европа. Цв. розоватые, шаровидной головкой, въ іюль. 1½—2 ф. **А. фальцифоліумъ** (*A. falcifolium*, съ серповидными листьями). С.-З. Америка. Цв. блѣдно-розовые, въ августъ. 2—3 д. **А. цѣрулеумъ** (*A. coeruleum*, голубой). Россія. Цв. голубые, плотными головками, въ іюль. 8 д.

б) Огородные.

**А. аскалонікумъ** (*A. ascalonicum*, Шалотъ). Малая Азія. Многолѣтнее. Размн. дѣтками. **А. поррумъ** (*A. porrum*, Поррей). Южн. Европа. Духвѣтнѣй. Разнов. *амелопразумъ* (перловый) многолѣтн. съ мелкими, полупрозрачными луковичками, кот. размножаются. **А. пролиферумъ** (*A. proliferum*, египетскій лукъ). Египетъ. Духвѣтнее. Походитъ на рѣпчатый. **А. сативумъ** (*A. sativum*, Чеснокъ). Южн. Европа. Многолѣтнее. **А. скородоправумъ** (*A. scorodoprasmum*, Рокамболь). Сред. и Западн. Европа. Походитъ на чеснокъ. Размн. и дѣтками и воздушными луковичными почками. **А. фистулосумъ** (*A. fistulosum*, Песочный). Сибирь. Многолѣтнее, но возобновляемое черезъ 3—4 р. посѣвомъ. **А. цѣпа** (*A. cepa*, Рѣпчатый лукъ). Востокъ. Духвѣтнее. Имѣетъ много разновидностей. Размнож. посѣвомъ, чрезъ что получаетъ *спячкы* и луковичками—*саженцы*. **А. шеноправумъ** (*A. schoenoprasmum*, Скорода, Шнитлукъ). Сред. Европа. Многолѣтнее. Цвѣтеть красиво.

**АЛЬЛОПЛЕКТУСЪ** (*Alloplectus*). *Алос*—различный и *плеко*—складывать, по складчатой въ разныхъ направленіяхъ чашечкѣ. С. геснеріевыхъ. (30). Тропич. Америка. Тепличныя куст. породы, воспитываемыя подобно Геснера.

**А. пельтатусъ** (*A. peltatus*, со щитовидными лл.). Коста-Рика. Цв. бѣловатые, въ августъ. 1 ф. **А. цаморензисъ** (*A. za-*

*mogensis*, назъ Цаморы). Колумбія. Цв. желтые. 1 ф.

**АЛЬЛЯМАНДА** (*Allamanda*). *Алламанъ* (*Allamand*) жилъ въ Лейденѣ и доставилъ Линнею сѣмена этого р. С. кустовыхъ (12). Бразилія и Сред. Америка. Теплич. кустарн. пр. Компость изъ 3 ч. волокнистой глини. дерн. съ 1 ч. древ. угля или крупнаго рѣчи. песку и цѣлотор. количества коровьяго перегноя. Черенками, преимущ. весной, при 17—21°. Черенки должны имѣть два колѣна; ихъ сажаютъ въ горшечки съ пескомъ пополамъ съ торфяной или листов. землей, крѣпко обжимають и ставятъ въ теплый грунтъ, хорошенько поливая. Когда, недѣли черезъ 3, окоренятся, и покажется ростъ, вынимають изъ грунта и ставятъ на него, не закапывая уже; недѣли черезъ 2—3, когда корни залетутъ кохъ, пересаживають и ставятъ опять на грунтъ, не вкапывая. Когда корни начнутъ ростъ въ свѣжей землѣ, кончики побѣговъ прищипываютъ, а когда вызванные этимъ побѣги дадутъ по два колѣна— снова прищипываютъ. Повторяя пересадку и прищипываніе получаютъ пр., которые расправляются по шпаламъ и всей крышѣ, въ растояніи 8—9 д. отъ стекла. Въ горшкѣ должно быть оставлено достаточно мѣста для воды, п. ч. раст. въ росту требуетъ ежедневной сильной поливки. Въ январѣ или февралѣ пр. обрѣзаются съ 2 колѣнами прошлаго года роста. Зимую поливка нужна менѣе обильная, но съ хорошимъ водостокомъ. Темпер. никогда не должна быть ниже 10°. Пр. эти никогда не страдаютъ ни отъ какихъ вѣсковыхъ.

**А. грандифлора** (*A. grandiflora*, крупноцвѣтная). Бразилія. Цв. блѣдно-желтые, въ іюль. **А. катартика** (*A. cathartica*, слабительная). Гвіана. Цв. желтые, іюнѣ. Наз. также *Линнеи* (*Linnaei*). **А. перифолия** (*A. perifolia*, съ лл. олеандра). Южн. Америка. Цв. золотисто-желтые, въ іюль. **А. нобилис** (*A. nobilis*, благородная). Бразилія. Цв. ярко-желтые, въ іюль. **А. Облетіи** (*A. Aubletii*, Облетова). Гвіана. Цв. ярко-желтые, въ іюль. **А. Чельсо́ни** (*A. Chelsoni*, назъ Чельсон). Садов. гибридъ. Цв. желтые, лѣтомъ. **А. Шоттѣи** (*A. Schottii*, Шоттова). Бразилія. Цв. желтые, въ сентябрѣ.

**АЛЬЛАНТОДІЯ** (*Allantodia*). *Аллантаос*—сосиска, по цилиндрической формѣ чехлика споръ. С. папоротниковъ (1).

**А. Бруноніана** (*A. Brunoniana*, Брунона). Гималаи, на высотѣ 6 т. ф. Оранжевый видъ, близкій къ *Аспленіумъ*.

**АЛЬМЕИДА** (*Almeida*). Бразилецъ *Де-Альмеида* оказалъ услуги Сентъ-



Илеру во время путешествия его по Бразилии. С. рутовых. (10). Бразилия. Тепличный древ. и куст. пр. Смесь глины, дерн. с торф. и песком. Черепками из полудувшей древесины, в тепл., под закрытием.

**А. рубра** (A. rubra, красная). Бразилия. Цв. малиновые, с сентября. 12 ф.

**АЛЬПУСЪ (Alnus)**. *Al* — близк и *lan* — берег рѣки. С. березовых. (14). Европа, Азия, С. Америка. Древесныя и кустарныя пр. Почти исключительно съменами, собираемыми осенью и предварительно обсушенными. Всходы рассаживаются на грядки, и когда подрастут — высаживаются на мѣсто, весной или осенью.

**А. глутиноза** (A. glutinosa, липкая). *Ольха черная*. Широко распространена по Россіи. Любит влажное мѣсто. 50—60 ф. Имѣетъ разновидности, сажаемыя въ садахъ: *ауреа* (aurea, сь золотистымъ листомъ), *инчиза* (incisa, сь надрѣзанными лл.), *кверцифолія* (quercifolia, сь листьями какъ у дуба), *латиниата* (latiniata, сь разрывными лл.), *оксикантифолія* (oxycanthifolia, сь остроразрывными лл.). **А. инкана** (A. incana, бѣлая). *Ольха бѣлая*. Сѣв. умѣр. климатъ. 8—20 ф.; **А. кордифолія** (A. cordifolia, сь сердцевиднымъ л.). Калабрія. Неаполь. 15—50 ф.; мѣсто сухое. **А. фирма** (A. firma, крѣпкая). Японія.

**АЛЬПИНИА (Alpinia)**. Просперъ *Альпино* былъ знаменитый въ свое время итальянскій ботаникъ. С. либирныхъ. (40). Тропич. и жаркій поясъ Азій. Ос. Южн. Океана. Австралія. Теплич. многолѣт. травяни. пр. Глин. дерн., сь торф. и лист. поровну, сь добавленіемъ песку или толченого древ. угля. Во время развитія полезна поливка жидкимъ удобреніемъ или поверхностное удобреніе, п. ч. пр. эти очень жадно потребляютъ питат. вещества. Высокая температура, сильная земля, обильная поливка и просторъ — составляютъ условія ухода. По отцвѣтении, когда появится желтый листъ, поливка уменьшается, но совершенно прусушивать кома никогда не слѣдуетъ, точно также не должно ставить въ низкую температуру въ состояніи покоя; напротивъ, для этихъ пр. во время покоя необходимо тепло. Размнож. дѣленіемъ весной, когда покажется ростъ и достигнетъ длины дюйма.

**А. альбо-линеата** (A. albo-lineata — сь бѣлыми полосками). Нов. Гвиней. Лл. эллиптически-ланцетовидные, сь поперечи. бѣлыми полосками. 3—4 ф. **А. витата** (A. vitata, полосатая). О. Юж. океана. Лл. эллиптически-ланцетовидные сь темнозелеными и бѣлыми полосами. 3—4 ф. **А. нутанс** (A. nutans, пониклая). Индія. Цв. розово-красные, пахучіе; въ маѣ; лл. ланцетовид-

ные. 13 ф. Для успѣшнаго развитія необходимо сильно дѣлать.

**АЛЬПИЙСКІЯ РАСТЕНІЯ**. Такъ называются породы, встречаемыя на высококихъ горахъ. Въ послѣднее время эти растенія стали употреблять въ каменистыхъ участкахъ, гдѣ представляется возможность дать имъ условія похожія на природныя. Эти условія: хороший водосточный слой, расколотые камни, въ трещинахъ которыхъ корни не бываютъ сильно нагрѣты, но окружены влагою. Гнѣзда для такихъ пр. дѣлаются между камней, на глубину 18 д., изъ которыхъ на 6 д. кладется слой мелкихъ галекъ, битого кирпича и т. п., а когда растеніе будетъ посажено, то поверхъ земли засыпается крупнымъ пескомъ или гравіемъ, вслѣдствіе чего дождевая вода легко протекаетъ, но не быстро испаряется. На волнистой поверхности альпійскія растенія удаются лучше.

**АЛЬСОДЕЯ (Alsodeia)**. *Alsodes* — грусто-лиственный. С. фиалковыхъ. Теплич. кустарники сь Мадагаскара. Глин. дерн. сь пескомъ. Черенки прирастаютъ легко въ пескѣ, въ тепл., подъ закрытіемъ.

**А. латифолія** (A. latifolia, широко-листая). Цв. бѣлые, въ іюнѣ. 6 ф.

**АЛЬСОФИЛІА (Alsophila)**. *Alsos* — лѣсъ и *philos* — любить. С. папоротниковъ. (100). Тропич. страны. Австралія. Ос. Южн. Океана. Глин. дерн. сь торф. Обильная поливка и защита отъ солнца. Красивые древесные папоротники.

**А. акулеата** (A. aculeata — сь шипами). Тропич. Америка. Тепличная. **А. армата** (A. armata, вооруженная). Тропич. Америка. Тепличная. **А. аспера** (A. aspera, жесткая). Вестиндія. Тепличная. **А. австралис** (A. australis, австралийская). Австралія. Оранжевая. Валъ бываютъ длиною до 30 ф. **А. вильоза** (A. villosa, косматая). Тропич. Америка. Тепл. **А. контаминас** (A. contaminata, омраченная). Ява. Тепл. Син. **А. глаука** (A. glauca). **А. Купера** (A. Cooperi, Купера). Квинслендъ. Оранжев. **А. Лейхардта** (A. Leichardti, Лейхардтова). Австралія. Оранжев. Син. **А. Макатурри** (A. Macathurii). **А. Мурѣи** (A. Moorei). **А. палеолата** (A. paleolata, пленчатая). Колумбія. Тепл. Син. **А. Гарднера** (A. Gardneri). **А. пруната** (A. pruinata, сь налетомъ). Тропич. Америка до Чили. И тепл. и оранжев. **А. Ребекке** (A. Rebeccae, Ребекки). Квинслендъ. Оранжев. **А. сагитифолія** (A. sagittifolia — стрѣловидная). Тринидадъ. Теплич. **А. скоттиана** (A. scottiana, Скоттова). Сиккимъ. Оранжев. **А. эксцельза** (A. excelsa, высокая). Норфолькъ. Оранжев.

**АЛЬСТОНІЯ**. См. Олыстонія.

**АЛЬСТРЁМЕРІЯ (Alstroemeria)**.

Баронъ *Альстрёмъ* — шведскій ботаникъ, другъ Линнея. С. амариллисовыхъ. (50). Южн. Америка. Полувыносливыя клубневые пр. 2 ч. торфяной, 2 ч. листовой и 1 ч. глин. дерн. сь добавленіемъ песку. Поливка обильная; высаженные въ грунтъ обкладываются мохомъ. Эффектны въ массѣ. Съменами и дѣленіемъ корней. Съвъ весной въ горшки или плошки въ парникъ или оранжерею; всходы рассаживаются по одиночкѣ и держатся подъ стекломъ, пока не окрѣпнутъ. Земля для посѣва и посадки — та же, какъ означена выше. Окрѣпшія пр. высаживать въ промежуточномъ разстояніи 1 ф. На зиму клубни сохраняются съ землею въ защитѣ. Раздѣленіе корней дѣлается или осенью или весной; тѣмъ менѣ дѣлать корни, тѣмъ лучше бываютъ растенія. При содержаніи въ горшкахъ необходимъ хорошій водостокъ; земля дается составленная изъ равныхъ частей глин. дерн., листовой и волокнистой торфяной сь пескомъ. Сначала поливать умѣренно, а когда корни пойдутъ въ ростъ — поливку усиливать, никогда не доводя до засухи кома. Каждое пр. подвязывается къ палочкѣ. Передъ цвѣтеніемъ полезно на верхъ подсыпать перегной сь листовой землей. Опыскивать по временамъ отъ паучка. По отцвѣтении сохранять въ защитѣ, но не засушить. При новой посадкѣ старую землю отряхнуть осторожно, не ломаявъ корни.

**А. ауранціака** (A. aurantiaca — оранжевая). Чили. Цв. оранжевые, лѣтомъ и осенью. 3—4 ф. **А. вериколоръ** (A. versicolor — разноцвѣтная). Перу. Цв. желтые сь пурпуровыми пятнышками, поздно лѣтомъ. 2—4 ф. Син. **А. перувіана** (A. peruviana). У разновидности *нивео-маргината* (niveo-marginata), цв. розовые сь бѣлымъ, зеленые кончики и темныя пятнышки. **А. каріофиллѣя** (A. caryophyllaea, гвоздичная). Бразилія. Цв. шарлаховые, сь запахомъ гвоздики, въ мартѣ. **А. пелегрина** (A. Pelegria, — такъ называется чилийцами). Чили. Цв. бѣлые сь розовыми черточками и желтыми пятнышками, лѣтомъ. 1 ф. У разновидности *альба* (alba) цв. бѣлые. **А. пситтацина** (A. psittacina, попугайная). Мексика. Цв. малиновые сь зелеными кончиками и пурпуровыми пятнышками, въ сентябрѣ. 6 ф. У разновидности *Эрембальти* (Erembaulti) цв. бѣлые. **А. пѣлхра** (A. pulchra, красная). Чили. Цв. пурпуровые сь желтыми краями и красными пятнышками, лѣтомъ. 1 ф. Син. **А. флосъ Мартини** (A. flos Martini) и **А. триколоръ** (A. tricolor). **А. Симеи** (A. Simii, Симеова). Чили. Цв. желтые сь красными по-

лосками, въ іюнѣ. 3 ф. Син. **А. Гукера** (A. Hookeri), **А. пульчелла** (A. pulchella) и **А. розеа** (A. rosea). **А. чилѣнзисъ** (A. chilensis, чилийская). Чили. Цв. кроваво-красные сь желтыми полосками, лѣтомъ и осенью. 2—3 ф. Одинъ изъ самыхъ выносливыхъ видовъ и имѣетъ очень много формъ, отличающихся окраской цвѣтовъ.

**АЛЬТѢА (Althaea)**. *Altheo* — исцѣлять. С. мальвовыхъ. (12). Теплая, преим. восточныя страны. Выносливая однол. и многол. пр. схожія съ мальвой. Обыкновенная садовая. Съменами или дѣленіемъ корней; двуглѣтніе высѣваются ежегодно или на мѣсто, или въ плошкахъ, либо грядкахъ, изъ которыхъ пересаживаются когда подрастутъ.

**А. каннабіна** (A. cannabina, конопляная). Юж. Франція. Цв. розовые, іюнѣ. 5—6 ф. Многол. **А. карибеа** (A. caribaea, карибейская). Карибейскіе остр. Цв. розовые, весной. 3 ф. Двул. **А. парбонѣнзисъ** (A. parbonensis, изъ Парбонны). Франція. Цв. блѣдно-розовые, въ августѣ. 3—6 ф. Многолѣтн. **А. официнализъ** (A. officinalis, лекарственная). *Алтей-просвирникъ*. Европа, умѣр. Россія. Цв. свѣтло-розовые, въ іюль. 3—4 ф. Многол. **А. розеа** (A. rosea, розовая). *Рожь. Штокъ-роза*. Китай. Цв. розовые, въ іюль. 8 ф. См. Штокъ-роза. **А. флексуоза** (A. flexuosa, изогнутая). С. Индія. Цв. шарлаховые, въ іюль. 2—3 ф. Двул.

**АЛЬТЕРНАНТЕРА (Alternanthera)**. *Alternans* — чередующійся, — по тычинкамъ, у которыхъ пестики чередуются безплодные. С. амарантовыхъ (16). Троп. и жаркіе пояса Австраліи и Южн. Америки. Полу-выносливыя орнамент. многолѣтнія лиственные пр. Хорошая окраска достигается содержаніемъ при хорошемъ освѣщеніи и солнечной теплотѣ. Гдѣ нужно имѣть много этихъ пр., слѣдуетъ ихъ держать въ парникѣ сь 20°—22°, что достигается весной безъ затрудненій. Когда парниковая температура установится, насыпаютъ на 4—5 д. хорошей, рыхлой, песчанной земли, покрывъ ее легкимъ слоемъ песку и нажавъ поверхность довольно плотно доской. Въ эту землю сажаютъ черенки, въ разстояніи дюйма. При влажномъ, спертомъ воздухѣ и затѣненіи, они укореняются вскорѣ; когда это произойдетъ, затѣненіе дѣлается лиственнымъ и дается исподволь воздухъ.

**А. амабиліс** (A. amabilis, пріятная). Бразилія. Лл. розовые сь оранжевымъ, имъ разновидности *амѣна* (amoena, — восхитительная) — лл. красно-оранжевые сь пурпуровыми и оранжево-желтыми полосками; *триколоръ* (tricolor, — трехцвѣтная), лл. по краямъ зеленые, по срединѣ ярко-розовые сь oran-



жевыми полосками. Обь изъ Бразиліи. **А. верзиколоръ** (*A. versicolor* — разноцвѣтная). Бразилія. Лл. ярко-малиновые съ зелено-бронзовымъ, р. плотное. **А. паронихиодесъ** (*A. paronichiodes*, похожая на паронихію). Бразилія. Лл. красно-оранжевые съ оливково-зеленымъ. Разновидности: *marginifera* (*magnifica*, великолѣпная), окраска ярче, *major* (*major* — болѣе крупная) лл. бронзовые съ оранжев. кончиками; *major aurea* (*major aurea*, болѣе крупная золотистая) лл. золотисто-желтые.

**АЛЬБАГИ** (*Alhagi*). Арабское название р. С. бобовыхъ. (6). Греція. Востокъ. Гималаи. Оранжер. кустарники. Въ горшкахъ съ пескомъ, глин. дерн. и торфяной землей. Съеменами и черенками изъ молодого роста въ песокъ, съ закрытіемъ.

**А. камелорумъ** (*A. camelorum*, верблюдникъ). Кавказъ. Уралъ. Цв. красные, въ іюль.

**АЛЬХЕМІЛЬЯ** (*Alchemilla*). Одинъ изъ видовъ у Арабовъ называется *alkemeluch*. С. розоцвѣтныхъ. (30). Европа, Азія, Африка, Америка. Многол. и рѣдко однол. трав. выносл. рр. Обыкновенная садовая, но хорошо дренпрованая. Съеменами и дѣленіемъ.

**А. альпіна** (*A. alpina*, альпійская) 3. Европа. Цв. зеленоватые, маленькіе. 6 д. **А. серицеа** (*A. sericea*, шелковистая). Кавказъ. Цв. зеленоватые, въ іюль. 6 д. Оба вида — многолѣтніе.

**АМАРАНТОВЫЯ** или **АМАРАНТУСОВЫЯ** рр (*amaranthaceae*). Многочисленное семейство изъ травянистыхъ и иногда кустарныхъ породъ съ незначительными безлѣпестковыми цвѣтами, собранными колосьями или головками. Почти всѣ амарантусовыя раст. не имѣютъ никакого садового значенія и исключеніе изъ этого составляетъ только амарантусъ.

**АМАРАНТУСЪ** (*Amaranthus*). **А.** частіца отрицанія и *maraino* — увядать, по продолжительности окраски цвѣтовъ. С. амарантовыхъ. (45). Почти всѣ жаркаго и тропич. климата, повсемѣстно. Выносливая или полувыносливая трав. рр. Сильная глин. дерн. Сѣять въ апрѣль въ парникѣ, всходы расаждать когда они будутъ въ 1/2 д.; въ концѣ мая высадить на воздухъ; хороши для содержанія въ горшкахъ; для этого сажать въ горшки малыми экзеп., давать просторную посуду, поливать сильнѣе и ставить ближе къ стеклу.

**А. биколоръ** (*A. bicolor*, двуцвѣтный). Индія. Лл. съ зелеными черточками. 2 ф. У разнов. *ruber* (*ruber*, красный) лл. ярко-шарлаховые, почти красно-фіолетовые съ зеленою. **А. гипохондрикусъ** (*A. hypochondriacus*, гипохондрический). Азія. Цв. желто-карминовые, въ іюль. 4—5 ф., разнов. *atropurpureus* (*atropurpureus*, — черно-пурпуровый) — улучшенная форма. **А. меланхоликъ** (*A. melancholicus*, меланхолический). Японія. Употреб. разнов. *ruber* (*ruber*) съ красными лл. **А. салицифоліусъ** (*A. salicifolius*, съ лист. ивы). Филиппинскіе о. Лл. длин. съ оранжевыми, карминовыми и бронз. краями. 3 ф. **А. спезіозусъ** (*A. speciosus*, красивый). Непаль. Цв. темно-карминовые, въ іюль. 3—5 ф. **А. триколоръ** (*A. tricolor*, трехцвѣтный). Остиндія. Лл. пурпурово-красные, съ желтою серединою и зелеными кончиками. 1/2 ф.

**АМАРИЛЛИСОВЫЯ** рр. (*amaryllidaceae* или *amaryllideae*). Весьма обширное семейство красивыхъ луковичныхъ или со стеблемъ рр. Цвѣты единичные, зонтичные или метельчатые; цвѣт. покровъ верхній, шести-лопастный, часто съ коронкой (манжеткой) наверху трубки. Листья мечевидные или линейные. Къ этому сем. принадлежатъ, между прочимъ, Агава, Амариллисъ, Крипумъ, Нарциссусъ, Панкраціумъ, Хемантусъ, Хиппеаструмъ и др.

**АМАРИЛЛИСЪ** (*Amaryllis*). Имя *Amaryllis* встрѣчается въ твореньяхъ Теократа и Виргилія Самариллисовыхъ. (1). Вестиндія. Въ прежнее время къ этому роду относились: Брунсувгія, Валота, Хиппеаструмъ, Крипумъ, Нерине, Спрекелия, Стернбергія, Фиделья и Цефирантусъ, въ настоящее же время остался одинъ видъ.

**А. Веллядовна** (*A. Belladonna*, красавица). Вестиндія. Полувыносливое луков. р. Хорошая волокнистая глин. дерн., смѣшанная поронку съ листовой и пескомъ. Луковички углубляются на 6 д., на подстилку пескомъ, которымъ обсыплютъ и вокругъ, а затѣмъ засыпаютъ з., которая обсыпается плотно. Если р. постоянно въ грунтѣ, то чѣмъ рѣже его пересаживать, тѣмъ оно бываетъ сильнѣе, а если нужно пересадить, то дѣлаютъ это въ іюнь или іюль, передъ появленіемъ цв. стрѣлокъ. Лѣтомъ полезно поливать жидкимъ удобреніемъ. При содержаніи въ горшкахъ требуютъ возможно большаго свѣта. По отцвѣтѣн и завяданіи лл. поливка уменьшается, затѣмъ рр. выносятся на зиму въ прохладное и сухое мѣсто, въ защиту отъ мороза. А. Белладонна бываетъ различнаго цвѣта, — отъ бѣлаго до краснаго. Цвѣтеть осенью.

**АМБРОЗИИЯ** (*Ambrosinia*). Джачинти *Амброзини* (*Ambrosini*) былъ проф. въ Болоннѣ. С. ароидей. (1) Юж. Европа. **А. Бассіи** (*A. Bassii*, Басіена). Корсика. Сардинія. Полу-выносл. клубневое многолѣт. р., довольствующееся всякой землей. Зимой — въ защитѣ отъ мороза. Размнож. съеменами и дѣленіемъ. Съемена сѣютъ въ оранжереи, какъ только созрѣютъ, а дѣленіе дѣлаютъ весной, какъ тронется ростъ. Чехолъ съ длиннымъ хвостомъ, лл. продолговатые 4 д.

**АМГЕРСТІЯ** (*Amherstia*). Въ честь графини *Амгерст* (*Amherst*). С. бобовыхъ. (1).

**А. нобилис** (*A. nobilis*, благородная). Индія. Тепл. дерев. р. въ 30—40 ф. Лл. яркочерешные, въ маѣ, чрезвычайно красивые. Сильная глин. дерн. Съеменами и черенками изъ полувырѣвшаго роста, въ песокъ, подъ закрытіемъ, при 22°.

**АМЕЛАНШЬЕ** (*Amelanchier*). Такъ называютъ мушмулу въ Садовъ С. розовыхъ. (4). Южн. Европа, Малая Азія, Японія, С. Америка. Куст. или низкія дерев. рр. Глин. Отводкой, черенками и съеменами.

**А. вулгарисъ** (*A. vulgaris*, обыкновенный). *Ирга*. Обыкн. мушмула. Ю. Европа. Цв. бѣлые, въ апрѣль—маѣ. 3—9 ф. Снн. *Меспилусъ* *Амеланше* (*Mespilus Amelanchier*). **А. канадѣнзисъ** (*A. canadensis*, канадскій). *Канадская мушмула*. Канада. Цв. бѣлые, въ апрѣль—маѣ, 6—8 ф. Снн. *Пирусъ* *ботридумъ* (*Pyrus Botryrium*). Имѣетъ разновидности: *овалис* (*ovalis*), *парауифолия* (*paravifolia*) и *флорида* (*florida*). **А. сангвинейя** (*sanguinea*, кровано-красный). Сѣв. Америка. Цв. бѣлые, въ апрѣль—маѣ, 4—8 ф.

**АМЕЛЛУСЪ** (*Amellus*). Такъ названо у Виргилія р. похожее на голубую астру, растущую по р. Меллѣ. С. сложноцвѣтныхъ. (8). Южн. Африка. Трав. многол. рр. Обыкновенная садовая. Дѣленіемъ и черенками весной, подъ стекломъ.

**А. лихнитисъ** (*A. Lychnitis*, съ лл. какъ у лихнисъ). М. Д. Н. Цв. фіолетовые, въ іюнь. Глинисто-дерн. съ торфяной, листовой и пескомъ. Оранж.

**АМИГДАЛУСЪ** (*Amygdalus*). *Амуссо* — расщеплять, по морщинистымъ извилинамъ шелухи. С. розовыхъ. (10). Юж. Европа и жаркія страны Азіи. Древесныя и кустар. рр. Для оранж. наиболѣе годны небольшіе, пирамидальные экз. выш. въ 2—3 ф. Необходимъ просторный комъ, темп. въ 8—10° при цвѣтѣн. Пересадка по опаденіи лл. Послѣ цвѣта выставить на лѣто на воздухъ. Размнож. прививкой глазкомъ къ дичкамъ сливы.

**А. коммуніс** (*A. communis*, обыкновенный). *Миндальное дерево*. *Миндаль*. Африка. Цв. бѣлые или розовые въ мартъ. 10—30 ф. Разновидности: *амара* (*amara* горькій) цв. крупнѣе, бѣлые съ розовымъ основаніемъ, въ апрѣль; *дулсис* (*dulcis*, сладкій) цв. красные ранніе, *макрокарпа* (*macrocarpa*, крупноплодный), цв. розоват.

въ защитѣ отъ мороза. Размнож. съеменами и дѣленіемъ. Съемена сѣютъ въ оранжереи, какъ только созрѣютъ, а дѣленіе дѣлаютъ весной, какъ тронется ростъ. Чехолъ съ длиннымъ хвостомъ, лл. продолговатые 4 д.

**АМГЕРСТІЯ** (*Amherstia*). Въ честь графини *Амгерст* (*Amherst*). С. бобовыхъ. (1).

**А. нобилис** (*A. nobilis*, благородная). Индія. Тепл. дерев. р. въ 30—40 ф. Лл. яркочерешные, въ маѣ, чрезвычайно красивые. Сильная глин. дерн. Съеменами и черенками изъ полувырѣвшаго роста, въ песокъ, подъ закрытіемъ, при 22°.

**АМЕЛАНШЬЕ** (*Amelanchier*). Такъ называютъ мушмулу въ Садовъ С. розовыхъ. (4). Южн. Европа, Малая Азія, Японія, С. Америка. Куст. или низкія дерев. рр. Глин. Отводкой, черенками и съеменами.

**А. вулгарисъ** (*A. vulgaris*, обыкновенный). *Ирга*. Обыкн. мушмула. Ю. Европа. Цв. бѣлые, въ апрѣль—маѣ. 3—9 ф. Снн. *Меспилусъ* *Амеланше* (*Mespilus Amelanchier*). **А. канадѣнзисъ** (*A. canadensis*, канадскій). *Канадская мушмула*. Канада. Цв. бѣлые, въ апрѣль—маѣ, 6—8 ф. Снн. *Пирусъ* *ботридумъ* (*Pyrus Botryrium*). Имѣетъ разновидности: *овалис* (*ovalis*), *парауифолия* (*paravifolia*) и *флорида* (*florida*). **А. сангвинейя** (*sanguinea*, кровано-красный). Сѣв. Америка. Цв. бѣлые, въ апрѣль—маѣ, 4—8 ф.

**АМЕЛЛУСЪ** (*Amellus*). Такъ названо у Виргилія р. похожее на голубую астру, растущую по р. Меллѣ. С. сложноцвѣтныхъ. (8). Южн. Африка. Трав. многол. рр. Обыкновенная садовая. Дѣленіемъ и черенками весной, подъ стекломъ.

**А. лихнитисъ** (*A. Lychnitis*, съ лл. какъ у лихнисъ). М. Д. Н. Цв. фіолетовые, въ іюнь. Глинисто-дерн. съ торфяной, листовой и пескомъ. Оранж.

**АМИГДАЛУСЪ** (*Amygdalus*). *Амуссо* — расщеплять, по морщинистымъ извилинамъ шелухи. С. розовыхъ. (10). Юж. Европа и жаркія страны Азіи. Древесныя и кустар. рр. Для оранж. наиболѣе годны небольшіе, пирамидальные экз. выш. въ 2—3 ф. Необходимъ просторный комъ, темп. въ 8—10° при цвѣтѣн. Пересадка по опаденіи лл. Послѣ цвѣта выставить на лѣто на воздухъ. Размнож. прививкой глазкомъ къ дичкамъ сливы.

**А. коммуніс** (*A. communis*, обыкновенный). *Миндальное дерево*. *Миндаль*. Африка. Цв. бѣлые или розовые въ мартъ. 10—30 ф. Разновидности: *амара* (*amara* горькій) цв. крупнѣе, бѣлые съ розовымъ основаніемъ, въ апрѣль; *дулсис* (*dulcis*, сладкій) цв. красные ранніе, *макрокарпа* (*macrocarpa*, крупноплодный), цв. розоват.

большіе до лл., *флоре плено* (*flora pleno*, махровый) цв. тѣлесные, *франгиліс* (*fragilis* ломкій) цв. блѣдно-розовые, вмѣстѣ съ лл. и др. **А. инкана** (*A. incana*, бѣлый). Карказъ. Низкаго роста. Цв. красные, въ апрѣль. 2 ф. **А. пана** (*A. pana*, низкій). *Бобовникъ*. Манджурія, Юж. Россія. Цв. розовые, въ апрѣль. 2—3 ф. Снн. *А. Бессеріана* (*A. Besserianna*).

**АМИРИСЪ** (*Amyris*). **А** — рѣзкій, сильный и *myron* — бальзамъ; все р. имѣетъ бальзамическій запахъ. С. мѣтечковыхъ. (12). Вестиндія, Тропическія Америка. Орнамент. теплич. рр. Сѣть глин. дерн. съ торф. Черенки приростають легко весной въ песокъ, на тепломъ грунтѣ.

**А. бразиліензисъ** (*A. braziliensis*, бразильскій). Бразилія. Цв. бѣлые, въ августъ. 20 фуп. **А. Плюмьери** (*A. Plumieri*, Плюмьера). Вестиндія. Цв. бѣлые, въ сентябрь. 20 ф. **А. токсифера** (*A. toxifera*, ядовитый). Вестиндія. Цв. бѣлые, въ августъ. 50 ф. Снн. *А. бальзамифера* (*A. balsamifera*).

**АМИЦІЯ** (*Amicia*). *Амичи* (*Amici*) былъ знаменитый флорентинскій физикъ. С. бобовыхъ. (4). Троп. Америка.

**А. цугомерисъ** (*A. zugomeris*, съ дву-членистымъ стручкомъ). Мексика. Оранже-рейнное дерево въ 8 ф. Цв. желтые съ краснымъ, осенью. Размнож. черенками, въ песокъ, въ теплѣ, подъ закрытіемъ.

**АМИАКЪ** или **АМОНИАКЪ**. Летучая нашатырная щелочь, содержащая азотъ.

**АММОБИУМЪ** (*Ammobium*). *Аммос* — песокъ и *bio* — жить. С. сложноцвѣтныхъ. (2). Австралія. Размн. съеменами какъ полувыносл. однол. или какъ двул. Въ первомъ случаѣ весной, въ парникѣ или оранж., во второмъ — осенью, въ оранж.; послѣдній способъ лучше. На землѣ неприхотливы.

**А. алатумъ** (*A. alatum*, крылатый). Австралія. Цв. головки серебристо-бѣлыми, съ мая до сентября, образующія *сухоцѣтны*. 1 1/2—2 ф. У разновид. *грандифлорумъ* (*grandiflorum*) цв. вдвое крупнѣе; она передается съеменами вѣрно.

**АММОДЕНДРОНЪ** (*Ammodendron*). *Аммос* — песокъ и *dendron* — дерево. С. бобовыхъ. (3). Азіат. Россія.

**А. Сиверсіи** (*A. Sieversii*, Сиверсовъ). В. Россія. Кустарн. р., довольствующійся всякой землей; размнож. съеменами и отводкой. Цв. пурпуровые, въ іюнь. 4 ф.

**АМОМУМЪ** (*Amomum*). **А** — част. отрицанія и *mos* — нечистота, по свойствамъ противодіа. С. инбирныхъ. (50). Троп. Азія, Австралія, Африка, о. Южн. Океана. Теплич. многол. трав., ароматич. рр. Уходъ какъ за Альпійя.



**А. аугустифолиумъ** (*A. angustifolium*, узколистный). Мадагаскар. Цв. ярко-желтые или мадиновые, в июль. 8 ф. **А. гранумъ парадиза** (*A. granum paradisi*, райское съим.). Западн. Африка. Цв. белые, с желтым и розовым. 3 ф. **А. кардамомумъ** (*A. cardamomum*, кардамонт). Остиндия. Цв. коричневые, в август. 8 ф. **А. мелгета** (*A. melgeta*, мелгета). Сьерра-Леоне. Цв. светло-малиновые, в май. 1—2 ф.

**АМОРФА (Amorpha).** А — частица отрицания и *morphe* — форма, по неполному образованию цветков. С. бобовых. (8). С. Америка. Кустарник пр., выносящий умеренный климат при защите. Обыкновенная садовая. Отводкой или черенками отрезанными по суставам и посаженными рано осенью в защиту, где оставляются до след. осени. Пр. дают много корневых отпрысков, которыми их тоже легко размножить.

**А. канесценс** (*A. canescens*, сѣроватая). Миссури. Цв. темно-голубые, в июль. Все р. с жесткими волосками. **А. фрутикоза** (*A. fruticosa*, кустарная). Колумбия. Цв. синепурпуровые, в июль. Имѣетъ нѣсколько разновидностей, отличающихся листьями.

**АМОРФОФАЛЛЮСЪ (Amorphophallus).** *Amorphus* — измѣненной формы и *phallos* — жезлъ, булава; по двѣторасположенію. С. ароидей. (25). Троп. Азія и Африка, остр. Малайского архипелага. Пр. близка съ *Agum*,  $\frac{1}{2}$  хорошей глины. Дерн. и  $\frac{1}{2}$  перепрѣшного перегноя; достаточный просторъ для кома и температура от 10 до 14 и даже 17°. Зимой содержать сухо и тепло, — сырость и холодъ для нихъ убійственны. Размнож. трудно, клубень ихъ великъ и рѣдко даетъ отпрыски; должно стараться получить сѣмена, чего можно достигнуть опыленіемъ, какъ у *Agum*, подобно которому производится и сѣвъ этихъ пр.

**А. кампанулятусъ** (*A. campanulatus*, колокольчатый). Индія. Походить на *A. Ривьера*, но цв. коричневые съ краснымъ и чернымъ. 2 ф. Сип. **Арумъ кампанулятусъ** (*Agum campanulatum*). **А. Лакүрия** (*A. Lacourii*, Лакуровъ). Кохинхина. Лл. стопорядные съ желтыми пятнами. Оран. **А. Ривьера** (*A. Rivieri*, Ривьеровъ). Кохинхина. Початокъ съ чехломъ и ножкой до 3 ф. длинны, покрывается до лл., чехолъ розово-зеленый, початокъ темно-красный, в мартъ — май. Сип. **Протеинофаллюсъ Ривьера** (*Proteinophallus Rivieri*). **А. титанумъ** (*A. Titanum*, титанъ). О. Суматра. Гигантск. растит. царства. Початокъ длиною 5 ф. темно-пурпуроваго цвѣта, чехолъ почти 3 ф. шириною, колокольчатой формы, зеленоватого цвѣта внутри, темно-пурпуроваго по краямъ и свѣтло-зеленаго снаружи.

Цв. стрѣлка  $1\frac{1}{2}$  ф., лл. в 45 ф. въ окружности. Сип. **Конофаллюсъ титанумъ** (*Conophallus Titanum*).

**АМПЕЛОПСИСЪ (Ampelopsis).** *Ampelops* — виноградъ и *opsis* — похоть. С. виноградныхъ. (15). С. Америка, Китай, Японія. Оран. цѣпкія куст. пр. Черенками въ оранж. осенью, а весною высаживаются, равно весною, въ тепломъ парникѣ, а также отводками.

**А. аконитифолия** (*A. aconitifolia*, съ листьями аконита). Китай. Лл. дваневидно-разсѣченные. Въ умѣр. климатѣ — на воздухѣ. **А. квинкефолія** (*A. quinquefolia*, пятилиственный). **Дикій виноградъ**. С. Америка. Лл. осенью краснѣютъ. Выносливъ. Сип. **А. хедеріцеа** (*A. hederacea*), **А. сержаніефолія** (*A. serjaniaefolia*, съ лл. сержана). Японія. Лл. пятилопастные; корни клубневые. Сип. **А. тубероза** (*A. tuberosa*), **Циссусъ витицифолія** (*Cissus viticifolia*). **А. трикуспидата** (*A. tricuspidata*, съ тремя острыми). Японія. Лл. различной формы, старые даютъ хвостики. Сип. **А. Вейчи** (*A. Veitchii*), **Витисъ японика** (*Vitis japonica*).

**АМПЛЪ.** Подвѣсный горшокъ, ваза, корзина для содержанія цвѣтотъ. Амплъ дѣлается изъ фарфора, terra-cotta, дерева, пробки, проволоки и пр. При посадкѣ растеній, внутренняя сторона окладывается мохомъ или сфагнеллою, на которые разстилается слой черенковъ, чтобы удержать землю отъ просыпанія сквозь нижній слой. Terra-cотовыя амплы должны имѣть возможно большее количество отверстій.

**АМПРИКЪ.** См. Арктостафилосъ. **АМСОНІЯ (Amsonia).** *Amson* (Amson) былъ ученый путешественникъ по Америкѣ. С. кутровыхъ. (4). С. Америка, Японія. Многол. трав. пр. удобныя для посадки по краямъ клумбъ, гдѣ ихъ не тревожили-бы. Размнож. весною дѣленіемъ корней, осенью — черенками.

**А. салицифолія** (*A. salicifolia*, съ лл. какъ у ливы). С. Америка. Цв. голубые, лѣтомъ.  $1\frac{1}{2}$ —2 ф. **А. табернемонтана** (*A. Tabernaemontana*, табернемонтанова). С. Америка. Цв. свѣтло-голубые, лѣтомъ.  $1\frac{1}{2}$ —2 $\frac{1}{2}$  ф. Сип. **А. латифолія** (*A. latifolia*) и **Табернемонтана Амонія** (*Tabernaemontana Amsonia*).

**АМФИКАРПЕА (Amphicarpa).** *Amphi* — оба и *karpos* — плодъ, по двойной формѣ стручковъ, — верхнихъ мочевидныхъ, и нижнихъ — грушеобразныхъ; послѣдніе послѣ оплодотворенія зарываются въ землю. С. бобовыхъ. (7). С. Америка, Гималаи, Японія. Однол. трав. вьющаяся пр. Сѣять въ оранж. или на воздухѣ весной, на солнечномъ положеніи.

**А. моноика** (*A. monoica*, однодомная). С. Америка. Цв. съ блѣдно-фіолетовымъ флагомъ и белыми крыльями и ладьями, в июль до августа.

**АМФИКОМЕ (Amphicome).** *Amphi* — оба и *come* — прядь волосковъ: плоды покрыты волосками по обоимъ концамъ. С. биньонійныхъ. (3). Остиндия, Гималаи, Туркестанъ. Оранж. оранж. трав. пр. Глин. дерн. съ пескомъ и листов. Сѣять весною въ песчанистую землю, въ оранжереѣ.

**А. аргута** (*A. arguta* — красиворазсѣченное). Индія. Цв. красные, пониклые, в августъ, 3 ф. **А. эмоди** (*A. Emodi* — Эмоди). Индія на возвышенностяхъ. Цв. розовые съ оранжевымъ, в августъ до октября,  $1\frac{1}{2}$ —1 ф.

**АМФИЛОФИУМЪ (Amphilophium).** *Amphilophos* — съ обѣихъ сторонъ съ гребешкомъ, — по закрученному краю вѣника. С. биньонійныхъ.

**А. паникулѣтумъ** (*A. paniculatum*, метельчатый). Вестиндія. Тепличное цѣпкое р. Цв. розовые, в июль. Глин. дернов. съ листов. Размн. черенками изъ молодого роста, в песокъ, подъ закрытіемъ и въ тепломъ грунтѣ, весной.

**АНАГАЛЬИСЪ (Anagallis).** *Anagelao* — смѣяться. С. первоцвѣтныхъ. (12). Европа, Запад. Азія, Африка, Южн. Америка. Одно и многол. трав. пр. Однол. размнож. сѣменами, весной; многол. — черенками изъ молодого роста или дѣленіемъ, во всякое время, въ парникѣ или тепл. оранж. Сильная глин. дерн.; на зиму укрывать.

**А. грандифлора** (*A. grandiflora*, крупноцвѣтная). Цв. различные, преимущ. голубые и ярко-красные, съ май до осени. Однол. **А. линифолія** (*A. linifolia*, съ лл. какъ у льна). Португалія. Цв. ярко-голубые, крупныя (въ  $\frac{1}{2}$  д. шир.), в июль. 9—12 д. Многол. Имѣетъ нѣск. разновидностей. Сип. **А. Монелли** (*A. Monelli*). **А. тенелля** (*A. tenella*, пѣкный). 3. Европа. Цв. розово-малиновые, лѣтомъ. Стелющаяся р. предпочитающее сырое мѣсто.

**АНАГИРИСЪ (Anagiris)** *Ana* — назадъ и *gyros* — кругъ; стручья загнуты внутрь. С. бобовыхъ. (3). Средиз. побережье, С. Африка, Канарскіе о. Оранж. оранж. куст.; смѣсь глин. дерн., песку и торф. по ровну. Черенками изъ молодого роста в июль, въ горшкахъ съ пескомъ подъ закрытіемъ.

**А. фетида** (*A. foetida*, вонючій). Ю. Европа. Цв. желтые, съ волосками, в май. 6—8 ф. Вся части р. неприяно пахнутъ.

**АНАКАМПСЕРОСЪ (Anacampteros).** *Anakampto* — принуждать возвра-

щаться и *eros* — любовь. С. портулаковыхъ. (9). Южн. Африка съ М. Д. Н. Низкорослыя оранжер. сочныя травы. Песчанисто-дерн. со старой штукатуркой. Полівка малая. Черенки передъ посадкой просушить; лл. срѣзанные вилотъ къ стеблю и тоже обсушенные даютъ равнымъ образомъ корни сѣмена, если ихъ можно получить, сѣять весной.

**А. арахноидесъ** (*A. arachnoides*, паутиный). Цв. белые, в июль; лл. какъ бы запутанные паутиной. 6—9 д. **А. вѣриансъ** (*A. varians*, измѣчивый). Цв. красноватые, в июль. 6 д. **А. рѣбенсъ** (*A. rubens*, красноватый). Цв. красные, в июль. 6—9 д.

**АНАЛОГІЯ.** См. Подобіе.

**АНАКАРДИУМЪ (Anacardium).** *Ana* — подобный и *cardia* — сердце; по формѣ зерна. С. сердечниковыхъ. (6). Троп. Америка, Вестиндія. Оранж. тепл. деревья. Легкая глин. дерн. Черенки съ вырѣшеной древесиной прирастаютъ въ песокъ, въ теплѣ и въ закрытіи.

**А. окциденталисъ** (*A. occidentalis*, западный). *Акажу*. Вестиндія. Цв. красноватые, мелкіе, очень душистые, дающие круглый желтый или красный, съдымый плодъ. 16 ф.

**АНАНАССА (Ananassa).** *Nanas* — въ Юж. Америкѣ ананасъ. С. бромелиевыхъ. (6). Троп. Америка. Пестролистныя формы — одні изъ наиболѣе употребительныхъ оранж. пр., достигающихъ обыкн. теплич. содержаніемъ, лимб-бы не подвергался холодному теченію воздуха. 2 ч глин. дерн., 1 ч. торф., 1 перегной и 1 песокъ. Отпрысками, которые день-два должны обсыхать и потомъ ихъ можно сажать, чѣмъ блѣднѣе и длиннѣе листъ, тѣмъ въ болѣе тепло. Иногда выростають побѣги изъ-подъ плода и даютъ хорошія пр. Посаженыя весною въ горшки, пр. закапываются въ нагрѣтый грунтъ, если желаютъ ускорить ихъ развитіе. Для выгонки пестрыхъ сортовъ въ плодъ употребляются тѣ же приемы, какъ и для обыкновеннаго ананаса.

**А. макродонта** (*A. macrodonta*, съ крупными зубчиками). Филипп. остр. Цв. красноватые, плоды коническіе, около 8 д. длиною и 4 шир. **А. Портеана** (*A. Porteana*, Порты). Филипп. острова. Лл. темно-оливковые съ желтыми полосами. **А. сатива** (*A. sativa*, съдымый), у разнов. *варіега* (*variegata*) лл. съ белыми полосами и желтыми краями, а у самаго края красноватыми. Съ облегченіемъ средствъ сообщенія, воспитаніе ананаса, какъ съдымага плода, значительно сократилось. Тамъ, гдѣ оно продолжается еще, для этого устраиваются отдѣльныя теплицы съ грунтомъ, отрывающимся различными средствами.



**АНАНАСНОЕ** или **КОРИЧНЕВОЕ КРАСНОЕ**. Яблоко осеннее, среднего поспевания и средней величины, кисло-сладкого вкуса съ ананаснымъ запахомъ; кожица сплошь красная.

**АНАНАСОВЫЯ** или **БРОМЕЛІЕВЫЯ** (Bromeliaceae). Обширное с. безстебельныхъ или короткостебельныхъ рр. съ жесткими, желобковатыми, обычно колючими лл. и красивыми цв. Въ садахъ встречаемые принадлежатъ преимущественно къ родамъ Анаанасса, Вильбергия, Бромелия, Тилландсія и Эхмеа.

**АНАНТЕРИКСЪ** (Anantherix). А. — частица отщипания и *antherix* — пгла. С. ластовициковыхъ. (6). Свв. Америка. Травянистыя выносливыя рр., пуждающіяся въ легкой землѣ и размнож. или сѣменами, или дѣленіемъ корня.

**А. ВИРИДИСЪ** (A. viridis, зеленый). С. Америка. Цв. пурпурово-зеленые, крупные, въ августѣ. 1 ф.

**АНАРРИНУМЪ** (Anarrhinum). А. — част. отщипания и *rhin* — рыльце; у цв. пѣть шпорцевъ. С. норичниковыхъ. (11). Нубія, Средиземн. побережье. Полувыносливыя дву- и многол. рр. близкія съ Антхирринумъ. Обыкновен. садовая. Сѣменами весной или черенками изъ молодого роста.

**А. БЕЛЛИДИФОЛИУМЪ** (A. bellidifolium, съ листьями, какъ у маргаритки). Южная Европа. Цв. бѣлые, въ іюнѣ. 2 ф.

**АНАСТАТИКА** (Anastatica). *Anastasis* — воскресеніе: сухое растение, будучи положено въ воду, расправляется. С. крестоцвѣтныхъ. (1). С. Африка, Сирія, Аравія.

**А. ХИЕРОХУНТИКА** (A. hierochuntica, иерихонская). *Иерихонская роза*. *Богородичная ручка*. Однолѣт. Свѣтъ въ теплѣ, весной, посадить въ горшокъ, который поставляетъ въ теплый грунтъ; цв. мелкіе, бѣлые, въ іюль. 6 д.

**АНАСТОМОЗЪ**. Уголъ слиянія или сращенія мелкихъ развѣтвленій.

**АНАТОМІЯ**. Наука о составѣ вообще органическаго тѣла.

**АНГЕЛИКА** (Angelica). По предположившимся благотворнымъ свойствамъ р. С. зонтичныхъ. (18). Двухл. или многол. трав. рр. умеренныхъ и сѣверныхъ странъ.

**А. АРХАНГЕЛИКА** (A. Archangelica), *Дудки*. Дикорост. Размн. можно посѣвовать осенью или весной, въ обычн. землѣ.

**АНГЕЛОНІЯ** (Angelonia). Мѣстное названіе. С. норичниковыхъ. (22). Троп. Америка. Теплич. многол. травяни. рр. Легкая дерн. съ листов. и пескомъ. Черенки изъ молодого роста прирастаютъ легко весной, въ разводочномъ парничкѣ.

**А. САЛИКАРИЕФОЛІА** (A. salicariaefolia, съ лл. плакуна). Ю. Америка. Цв. голубые, въ августѣ. 1½—3 ф.

**АНГИОПТЕРИСЪ** (Angiopteris). *Aggeion* — сосудъ и *pteris* — крыло. С. папоротниковъ. (10). Троп. страны Старого свѣта. Гигантскіе оранж. папоротники, требующіе большого простора, обильной поливки и глин. дер. съ торф. и пескомъ, при хорошемъ дренажѣ.

**А. ЕВЕКТА** (A. evelcta, уклоняющійся). Пенъ 2—6 ф. выш., при 1½ ф. толщины. Ванъ 2—3 перистыя, длиною въ 6—15 ф. Рр. слышущія подъ другими видовыми названіями — только разновидности этого вида.

**АНГОФОРА** (Angophora). *Aggos* — сосудъ и *phero* — нести, по формѣ плодовъ. С. миртовыхъ. (4). Вост. Австралія. Оранж. куст. и древ. рр. Сѣмь изъ лист., торф. и песку. Черенками въ оранж., въ песч. землѣ, подъ закрытіемъ.

**А. КОРДИФОЛІА** (A. cordifolia, сердцелистная). Цв. желтоватые, въ маѣ. 7—10 ф. **А. ЛАНЦЕОЛІА** (A. lanceolata, ланцетовидная). Цв. бѣлые, въ маѣ. 4—6 ф.

**АНГРЕКУМЪ** (Angraecum). Малайцы зовутъ эти орхидеи *ангирекъ*. С. орхидей. (25). Троп. Африка, Маскаренскіе остр., Китай, Японія. Одна изъ лучшихъ эпифитныхъ орхидей. Температура: съ ноября до февраля 12 до 14°, въ мартѣ до мая, въ сентябрѣ и октябрѣ 15°, іюнь и августъ 17° ночью, днемъ она можетъ подыматься на 3—4° противу ночной. Черенки, древ. уголь и торф. мохъ. Внизъ кладутся черенки, а на нихъ уголь съ мелкими черепками; поверхъ корней — мохъ, прижавъ его хорошенько и насыпавъ горкой, не доходя до края, чтобы лл. были на ½ д. выше, а земля отстояла бы на 2 д. отъ края горшка. При пересадкѣ, корни очищаются отъ стараго моха, всѣ сгнившіе — вырываются. Если рр. посажены на чурки или въ корзинки — два раза въ день купать въ теплой водѣ. Отъ трипса и др. насекомыхъ — чаще обмывать губкой.

**А. АРКУАТУМЪ** (A. arcuatum, дугообразный). Наталь. Цв. бѣлые. Назыв. также *Листростачисъ аркуата* (Listrostachys arcuata) и *A. Седени* (A. Sedeni). **А. БИЛОБУМЪ** (A. bilobum, двудопастный). Берегъ М. Д. Н. Цв. бѣлые, пахучіе, съ октябрю до декабря. Въ корзинѣ обязательно. **А. КОТЧИЙ** (A. Kotshyi — Котчи). Западн. Цв. бѣлые съ желтымъ, пахнутъ гвоздичкой. На чуркѣ или въ корзинѣ. **А. МОДЕСТУМЪ** (A. modestum, скромный). Мадагаскаръ. Цв. бѣлые. **А. ПЕЛЬЮЦИДУМЪ** (A. pellucidum, прозрачный). Сіера-Леоне. Цв. бѣлые, нѣжные. Въ подвѣсной корзинѣ. **А. ПЕРТУЗУМЪ** (A. pertusum, продырявленный). Сіера-Леоне. Цв. бѣлые. **А. СКОТТИАНУМЪ**

(A. Scottianum, Скотта). Коморекіе ос. Цв. бѣлые. **А. ФАЛЬКАТУМЪ** (A. falcatum, серповидный). Китай. Цв. бѣлые, душистые. Оранжер. Сажать въ торф. з. въ подвѣшанной корзинки, близъ свѣта, нѣсколько затѣняя. **А. ЦИТРАТУМЪ** (A. citratum, цитронный). Мадагаскаръ. Цв. бѣлые. Густой ростъ. **А. ШАЙЛЮАНУМЪ** (A. Chaillanum, Шайлю). З. Африка. Цв. бѣлые. Рѣдкое р. **А. ЭБУРНЕУМЪ** (A. eburneum, бѣлый какъ слоновою кость). Мадагаскаръ. Цв. зеленоватые. Снн. *Эрббумъ эбурнеумъ* (Aerobium eburneum). **А. ЭЛЛИСИ** (A. Ellisii, Эллисовъ). Мадагаскаръ. Цв. бѣлые, пахучіе.

**АНГУЛОА** (Angyloa). Донъ Франциска де-Ангюла (Angulo) испанецъ, былъ въ Перу горнымъ начальникомъ и покровительствовалъ занимавшимся ботаникой. С. орхидей. (6). Колумбія, Перу. Оранж. рр. Волокнисто-торф. на хорошемъ дренажѣ. Темпер. лѣтомъ наибольшая 17° (днемъ) и наименьшая 6° (ночью), зимой наибольшая 13 (днемъ), наименьшая 6 (ночью). Во время роста сильная поливка и опрыскиваніе, мѣсто — полувѣтренное. Во время покоя, до появленія роста содержать довольно сухо. Размнож. дѣленіемъ луковицы передъ началомъ развитія. Цв. лѣтомъ.

**А. КЛОВЕЗИИ** (A. Clowesii, Кловеса). Колумбія, на 5—6 т. ф. возвышеніи. Цв. золотисто-желтые съ бѣлой губой, пахучіе. **А. РУКЕРИ** (A. Ruckeri, Рукера). Колумбія. Цв. желтые съ малиновыми пятнышками и малиновою губой. У разновидности *самойнеа* (sanguinea) цв. кровавые. **А. УНИФЛОРА** (A. uniflora, одноцвѣтная). Колумбія. Цв. бѣлые съ малиновыми крапинками. Одинъ изъ лучшихъ видовъ. **А. ЭБУРНЕА** (A. eburnea, какъ слоновою кость). Новая Гренада. Цв. бѣлые, губа съ малиновыми пятнышками.

**АНГУРИЯ** (Anguria). По гречески такъ называется огурецъ. С. тыквенныхъ. (17). Тропич. Америка. Теплич. цѣпкія рр., близкія къ Молюрдика. Рѣдко встречаются въ садахъ.

**А. МАКУАНА** (A. Makouana, Макуа). Ю. Америка. Имѣетъ сѣро-зеленые цв. 10 ф. **А. ПЕДАТА** (A. pedata, стоповидная). Южн. Америка. Цв. желтые, въ іюль. 12 ф. **А. ТРИЛОБАТА** (A. trilobata, трехлопастная). Кариба. Цв. малиновые, въ іюль. 20 ф. **А. ТРИФОЛІАТА** (A. trifoliata, трехлистая). Санъ-Доминго. Цв. желтые, въ іюль. 20 ф. **А. УМБРОЗА** (A. umbrosa, темная). Ю. Америка. Цв. желтые, въ іюль. 18 ф.

**АНДЕРСОНІЯ** (Andersonia). Было нѣсколько *Андерсоновъ*, врачей, покровительствовавшихъ ботаникѣ. С. элакри-

совыхъ. (19). Ю.—З. Австралія. Малорослые оранж. куст. рр.

**А. ШПРЕНГЕЛИОЙДЕСЪ** (A. sprengelioides, похожая на Sprengelia). Австралія. Цв. малиновые, въ мартѣ. 1—3 ф. Песчан. торф., съ обязательно-хорошимъ водостокомъ. Размн. черенками изъ молодого роста осенью и весной, подъ закрытіемъ при нѣжн. теплотѣ. Снн. *Шпрегелия Андерсона* (Sprengelia Andersoni).

**АНДИРА** (Andira). Названіе мѣстное бразильское. С. бобовыхъ. Изъ троп. странъ. Высокія тепличные деревья. Уходъ какъ за Жоффрой.

**А. ИНЕРМИСЪ** (A. inermis, безъ колючекъ). Ямайка. Цв. пурпуровые. 20—30 ф. Называется на роднѣи «капустнымъ» деревомъ.

**АНДРЕЦІЙ**. Совокупность тычинокъ въ цвѣтахъ. Мужскіе органы.

**АНДРОЗАЦЕ** (Androsace). *Aner* — мужчина и *sakos* — щипъ, по формѣ пыльника, похожего на щипъ. С. первоцвѣтотъ. (4). Европейскія высокія горы. Лучшее мѣсто произрастанія — въ трещинахъ камней, въ сильной песчан. торф. землѣ. Вредны и засуха и застой воды. Могутъ содержаться и въ горшкахъ. Дѣленіемъ, черенками и сѣменами. Послѣдніе высѣваются рано, въ парникѣ.

**А. АРГЕНТЕА** (A. argentea, серебристое). Швейцарія. Цв. бѣлые, въ іюнѣ. 2 д. Снн. *А. имбриката* (A. imbricata). **А. ВИЛЬДОЗА** (A. villosa, волосатое). Пиреней. Цв. розовые, въ маѣ. 2—4 д. **А. ВИТАЛИАНА** (A. Vitaliana, Витали). Пиреней. Цв. желтые, въ маѣ, іюнѣ. 1—2 д. **А. ВУЛЬФЕНИАНА** (A. Wulfeniana, Вульфеніана). Штирія. Цв. малиновые, лѣтомъ. 2 д. **А. КАРНЕА** (A. carnea, тѣлесное). Швейцарія. Цв. розовые, въ іюль. 3—4 д. Разновидность *эксимія* (eximia, отборная) болѣе сильное р. **А. КОРОНОФИЛІА** (A. coronopifolia, въ лл. боярышника). *Грижная трава*. Россія. Цв. бѣлые, въ апрѣль—іюнь. 6 д. **А. ЛАКТЕА** (A. lactea, молочноебѣлое). Австрія. Цв. бѣлые, въ іюнѣ. 4 д. **А. ЛАГГЕРИ** (A. Laggeri, Лаггера). Пиреней. Цв. малиновые, въ мартѣ—апрѣль. 3 д. **А. ЛЯНУГИНОЗА** (A. lanuginosa, съ пушистыми лл.). Гималаи. Цв. нѣжно-розовые, съ іюня до октябрю. 6—8 д. **А. САРМЕНТОЗА** (A. sarmentosa, распростертое). Гималаи. Цв. ярко-розовые, въ маѣ-іюнѣ. **А. ХАМЕЯСМЕ** (A. Chamaejasme, —каменный жасминъ). Австрія. Цв. тѣлесно-розовые, въ іюнѣ. 2—4 д. **А. ХЕЛЬВЕТІКА** (A. helvetica, швейцарское). Швейцарія. Цв. бѣлые, въ маѣ. 1 д.

**АНДРОЛЕПИСЬ** (Androlepis). *Aner* — мужчина и *lepis* — чешуйка; тычинки съ чешуйками. С. бромелиевыхъ. (1).







**А. гравеоленс** (*A. graveolens*, сильно пахучий). Укроп. Размн. съменами, весной, — рядами или въ разбросъ. Р. двул. Если оставить часть рр. съ съменами, то р. это размножается самосѣвомъ.

**АНИГОЦАНТУСЪ** (*Anigozanthus*). *Anigo* — раскидываться и *anthos* — цвѣтокъ, отъ раскидистаго расположенія цв. пожекъ. С. кровяниковокъ. (8). Австралія. Оранж. и полувыносливыя многол. трав. рр. Смѣсь 3 ч. глинисто-дерн. съ 1 ч. торф. и песку. Во время роста сильно поливать, во время покоя и зимой — держать сухо. Дѣленіемъ корня весной.

**А. кокцинеус** (*A. coccineus*, шарлаховый). Лебяжья р. Цв. шарлаховые, въ июлѣ. 5 ф. **А. пурпуреумус** (*A. pulcherrimus*, красивый). Лебяжья р. Цв. желтые, въ маѣ. 3 ф. **А. тиріантинус** (*A. tyrianthinus*, пурпуровый). Лебяжья р. Цв. пурпуровые съ бѣлымъ, въ маѣ. 3 ф. **А. флавидус** (*A. flavus*, желтоватый). Австралія. Цв. желто-зеленые, въ маѣ. 3 ф. Бываетъ съ цв. красными и зелеными.

**АНИЗОМЕЛЕСЪ** (*Anisomeles*). *Anisos* — неравный и *melos* — число; пыльники длинныхъ тычинокъ половину меньше короткихъ. С. губоцвѣтныхъ. Оранж. и теплич. кустар., многол. и однол. травянистыя рр. Легкая, сильная. Черенки принимаются изъ молодого роста, весной, подъ закрытіемъ, легко.

**А. малабарика** (*A. malabarica*, малабарскій). Тропич. Азія. Кустар. Цв. пурпуровые, въ июлѣ. 2—5 ф. **А. овата** (*A. ovata*, съ яйцевидными лл.). Непаль. Однол. Цв. пурпуровые, въ августѣ. 2—3 ф. Снять весной, въ теплѣ; по прирученію къ воздуху, можно высадить въ открытый грунтъ. **А. фуката** (*A. fucata*, развильистый). Непаль. Куст. Цв. пестрые — изъ бѣлыхъ, красныхъ и пурпуровыхъ полосокъ, въ июлѣ. 4—6 ф.

**АНИЗОХИЛЮСЪ** (*Anisochilus*). *Anisos* — неравный и *cheilos* — губа, по неравности губъ чашечки и вѣнчика. С. губоцвѣтныхъ. Теплич. многол. или двул. Всякая сильная и легкая. Съменами въ февралѣ, въ теплѣ и черенками въ пескѣ и теплѣ, подъ закрытіемъ.

**А. карпозум** (*A. carnosum*, тѣлесный). Остіндія. Цв. лиловые, въ июлѣ до сентября. 2 ф.

**АНИСИМОВСКОЕ ЯБЛОКО.** Поздній сортъ почти мелкаго яблока, похожаго на крымскій синапъ, но еще остроконечнѣе; кожица зеленая съ румянцемъ; вкусъ съ самымъ легкимъ кваскомъ.

**АНИСОВОЕ ЯБЛОКО**, или **АНИСЪ**. Сортъ по поспѣванію средней поры; форма рѣпчатая, величина средняя, цвѣтъ почти

сплошь красный; мякоть мягкая съ легкимъ кваскомъ, ароматная, но не съ анисовымъ запахомъ.

**АНИСЪ ЗВѢЗДЧАТЫЙ.** См. Иллициумъ.

**АНОМАТѢКА** (*Anomathesa*). *Anomatos* — необычный и *thesa* — коробка. С. косатиковыхъ. Южн. Африка. Многол. оранж. лукович. рр., годныя для высадки на лѣто на воздухъ, на солнечномъ мѣстѣ. Въ горшкахъ разводными пересаживаются въ мартѣ, въ новую землю, при чемъ старая отбрасывается. Размнож. легко дѣтками. Легкая песчанисто-дерн. съ добавленіемъ листовой. Съмена высѣваютъ, какъ только поспѣютъ, въ теплѣ. Съянцы зацвѣтаютъ на второй годъ.

**А. круента** (*A. eugenia*, кровавая). М. Д. Н. Цв. ярко-малиновые, лѣтомъ и осенью. 6—12 д.

**АНОНА** (*Anona*). Такъ называются эти рр. на Санъ-Доминго. С. аноновыхъ. (50). Тропич. Америка, Азія и Африка. Теплич. куст. рр. съ пахучими лл. Сильная глини. дерн. съ торф. Черенки съ не отрѣзанными лл. прирастаютъ въ пескѣ, теплѣ и закрытіи. Съмена сѣять въ горшки и ставить въ теплый грунтъ. Лѣтомъ 13—22°, зимой 10—15°.

**А. глѣбра** (*A. glabra*, гладкая). Флорида и Вестиндія. Цв. коричневыя, въ июлѣ. 16 ф. **А. мурicata** (*A. muricata*, съ мягкопильчатыми плодами). Бразилія. Цв. снаружи зеленые, внутри желтые съ крапинками. 15—25 ф. Плоды многихъ ановъ очень вкусны. Анона *геримолія* (*A. cherimolia*) производитъ плодъ — херимою, лучше котораго, говорятъ, нѣтъ во всемъ мірѣ.

**АНОНОВЫЯ** рр. (*Anonaceae*). Древесныя и кустарныя породы, преимущественно тропическія, съ цвѣтами выростающими на ножкахъ изъ угловъ листьевъ, съ очерченными, простыми, цѣльными или зубчатыми листьями. Представитель этого сем. есть Анона.

**АНОПТЕРУСЪ** (*Anopterus*). *Ano* — вверх и *pteron* — крыло, сѣмя имѣетъ на верхней части летучку. С. камеломковыхъ. (2). Австралія. Оранж. куст. Песчан. дерн. съ торф. При содержаніи въ горшкахъ обильная поливка. Черенки съ полувырѣваннымъ ростомъ прирастаютъ хорошо въ оранжереѣ, подъ стекломъ.

**А. glandulоза** (*A. glandulosa*, железковая). Тасманія. Цв. бѣлые съ розовымъ оттынкомъ въ апрѣлѣ — маѣ. 3 ф.

**АНСѢЛЬЛІЯ** (*Ansellia*). *Ansellia* (Ansell) — ботанич. коллекторъ въ экспедиціи къ истокамъ Нила. С. орхидей. (4). Троп. Африка, Индія. Теплич. эпифиты. Со-

держатъ въ просторныхъ горшкахъ. Волонистая торф. земля съ порядочнымъ дренажемъ. Во время роста обильная поливка, не попадая на самое р. Въ состояніи покоя — умѣренная или никакая, но влажный воздухъ. Размнож. дѣленіемъ луковицы вслѣдъ за цвѣтеніемъ.

**А. африкана** (*A. africana*, африканская). Фернандо-По. Цв. зеленые съ коричневыми пятнышками, губа желтая. Цвѣтетъ два мѣсяца. Имѣетъ разновидности: *гигантеа* (*gigantea*) изъ Наталъ, цв. которой превосходно пахнутъ, желтые; *нилотика* (*nilotica*, съ р. Нила) изъ В. Африки, лучше вида, цв. ярче.

**АНТЕМИСЪ** (*Anthemis*). *Anthemon* — цвѣтокъ, по обильному цвѣтенію. С. сложноцвѣтныхъ. (80). Европа, Азія, Африка. Одно и многол. трав. рр. Въ садовомъ отношеніи не имѣютъ большого значенія. Всякая садовая. Съменами и дѣленіемъ.

**А. анцонъ** (*A. Anzon*, вѣчноживой). Греція. Цв. головки похожи на маргаритки, лѣтомъ. 2—4 д. **А. Биберштейнн** (*A. Biebersteinii*, Биберштейновъ). Кавказъ. Цв. головки желтыя, лѣтомъ. 1—2 ф. **А. нобилис** (*A. nobilis*, благородный). *Цунава*. Римская ромашка. Цв. головки бѣлыя. Р. аптечное, полезное въ домашнемъ обиходѣ; довольствуется всякой землей. Размн. съменами, а потомъ дѣленіемъ корня весной. Части отдѣленные сидятъ рядами, въ просторѣ 9 д. во все стороны, и первое время поливать и опалывать. Цв. собирать какъ только раскроются, и потому нѣсколько разъ въ продолженіе лѣта. Есть махровая разновидность, она красивѣе, но для аптеки лучше не махровая.

**АНТЕННАРІЯ** (*Antennaria*). *Antennae*, пучальца настькомыхъ, по подобію съ ними пучка на сѣменахъ этихъ рр. С. сложноцвѣтныхъ. (10). Европа, Азія, Сѣв. Америка, Австралія. Многолѣтн. трав. рр. Легкая, всякая. Съменами весной, подъ рамами; раздѣленіемъ корня тоже весной.

**А. діюка** (*A. dioica*, двудомная). Горлянка, Бѣлѣха. Цв. головки розовыя, въ июлѣ. Спн. *Гнафалиумъ діонкумъ* (*Gnaphalium dioicum*). **А. маргаритасеа** (*A. margaritacea*, жемчужная). Цв. головки бѣлыя, въ августѣ. **А. томентоза** (*A. tomentosa*, пушистая). Цв. головки щитками. Самое низкое и самое бѣло-пушистое изъ рр. годныхъ для узорчатыхъ клумбъ, ростомъ не выше 1 д. и сильно разрастающееся.

**АНТЕРІДІЙ.** Производительный органъ тайноцвѣтныхъ, уподобляемый пыльнику цвѣтоносныхъ.

**АНТѢРИКУМЪ** (*Anthericum*). *Anthos* — цвѣтокъ, *herkos* — изгородь; по дол-

говизмѣ стеблямъ. С. лилейныхъ. (50). Европа, Азія, Африка, Америка. Луковичныя многол., нѣкоторые виды выносливыя. Сильная, легкая; для горшечныхъ — глини. дерн. съ листовой, перегноемъ и пескомъ. Пересадка до развитія или при появленіи роста. Во время роста обильная поливка, послѣ цвѣта ее уменьшаютъ, но никогда рр. не просушиваютъ. Дѣленіемъ или съменами точно такъ же въ оранжереѣ.

**А. Лилиаго** (*A. Liliago*, Лилиаго). Ю. Европа. Цв. бѣлые, въ маѣ. 12—18 д. Спн. *Фаллангумъ* или *Ватсонія Лилиаго* (*Phalangium s. Watsonia Liliago*). **А. Лилиаструмъ** (*A. Liliastrium*, алоберскій). Ю. Евр. Цв. бѣлые, душистые, рано лѣтомъ. 1—2 ф. Спн. *Чацкия* и *Парадизія Лилиаструмъ* (*Chactia s. Paradisia Liliastrium*). Разновид. *майоръ* (*major*) выш. 6 ф. **А. рабозумъ** (*A. gamosum*, вѣтвистый). Ю. Европа. Цв. бѣлые, немного меньше, чѣмъ у Лилиаго, въ июлѣ. Спн. *А. граммифолія* (*A. graminifolia*).

**АНТИГОНОНЪ** (*Antigonon*). *Anti* — противъ и *gonia* — уголъ С. истоковыхъ. (4). Мексика, Сред. Америка. Тепл. выюн. куст. Цвѣтутъ трудно. Глини. дерн. съ торф. Черенки, до посадки подъ стекло въ песокъ, должно съ конца обсушить, сажать въ апрѣлѣ. Лѣтомъ темпер. 13—24°, зимой 8°.

**А. амабиле** (*A. amabile*, милый). Мексика. Цв. розовые. **А. инсигне** (*A. insigne*, замѣчательный). Колумбія. Цв. розовые.

**АНТИЛЬЛИСЪ** (*Anthyllis*). *Anthos* — цвѣтокъ и *hylos* — пушокъ — цвѣты обычно покрыты пушкомъ. С. бобовыхъ. (20). Европа, З. Азія, Сѣв. Африка. Трав. или полукуст. рр.; травяни. многол. размнож. сѣменами или дѣленіемъ корня, однол. сѣменами на пригнѣтомъ мѣстѣ, на воздухѣ; кустар. зимуютъ въ защитѣ, или содержатся въ оранжереѣ. Глини. дерн. съ торф. и пескомъ. Черенки изъ молодого роста принимаются легко въ пескѣ, подъ стекломъ, въ неподогрѣтомъ грунтѣ.

**А. барба-іовисъ** (*A. barba-jovis*, Юпитерова борода). Испанія. Куст. Цв. бѣдно-желтые, въ мартѣ. 4—8 ф. **А. вульнерарія** (*A. vulnegera*, исцѣляющій рану). *Зольникъ*. *Изветникъ*. До Сѣв. Россіи. Многол. трав. Цв. желтые, иногда бѣлые или красноватые, лѣтомъ. **А. монтана** (*A. montana*, горный). Евр. Альпы. Многол. трав. Цв. малиновые, въ июлѣ. 3—6 д. **А. эринацеа** (*A. erinacea*, колочий). Испанія. Куст. Цв. розовые, въ апрѣлѣ. 6—12 д.

**АТИРРИНУМЪ** (*Antirrhinum*). *Anti* — похожий и *rhin* — носъ или мордочка, по вѣнчику. С. норичниковыхъ (24).



Умѣр. сѣв. полушарія. Выносливыя многол. трав. рр. Легкая съ перегноемъ. Сѣменами и черенками. Посѣвъ и съ осени на воздухѣ, и весной—въ парникѣ. Черенки—осенью, въ холод. парникѣ.

**А. азари́на** (*A. Asarina*). Ю. Франція. Цв. бѣлые съ розовымъ отблескомъ, въ июлѣ. Стелющийся. **А. майюсъ** (*A. majus*, большой), *Лангунъ златъ*. Запад. Европа. Цв. безконечныхъ окрасокъ; разнообразностей тоже много и по вышнѣ растенія. **А. молле** (*A. molle*, мягкій). Пириней. Цв. бѣлые, въ июлѣ. Хорошо на каменистомъ участіи.

**АНТИАРИСЬ** (*Antiaris*). На Явѣ называется антиаръ или анчаръ. С. хлѣбно-плодныхъ. (6). Остиндія, Малайск. арх.

**А. токсика́рія** (*A. toxicaria*, ядовитый). *Анчаръ*. Ява. Высокое дерево, растущее на Явѣ и смежныхъ ос. Изъ него павлекаютъ ядъ,—*упасъ* или *ипо*, чрезвычайно сильный.

**АНТОКСАНТУМЪ** (*Anthoxanthum*). *Anthos*—цвѣтокъ и *xanthus*—желтый. С. злаковъ. (5). Европа, Азія, Африка, Америка и Австралія.

**А. одорату́мъ** (*A. odoratum*, душистый). *Пахучій колосокъ*. Дикорастущій многолѣтній злакъ, дающій запахъ покосу. 1 ф.

**АНТОНОВЪ-ОГОНЬ. ИЗГАРИНА. ОГНЕВИЦА.** Помервѣніе части, обнаруживающееся чернотой, какъ-бы замараживающей. Единственное средство—вырѣзать всю пораженную часть до здоровой и затѣмъ защитить отъ воздуха замаской.

**АНТОНОВСКОЕ** или **ДУХОВОЕ**, также **КРАСНОГЛАЗОВСКОЕ.** Яблоко средней поры поснѣванія, довольно большого размѣра, нѣсколько прологоватой формы, съ ребрами и превосходныхъ достоинствъ: долго лежитъ и хорошо въ мочкѣ.

**А. скороспѣлое** яблоко. Ранній сортъ, формою похожій на антоновское, но иного вкуса, съ кваскомъ.

**АНТОЛИЦА** (*Antholyza*) *Anthos*—цвѣтокъ и *lissa*—яръсть; открывшійся цвѣтокъ—какъ пасть разсвѣтлѣвшаго зѣвря. С. косятниковъ. (15). Ю. Африка. Оранж. луков. рр., высаживаемыя также на лѣто на воздухѣ. Торф., песч. дерн. и лист. поровну. Передъ цвѣтомъ жидкое удобрение нѣсколько разъ. Отпрысками почти во всякое время, также сѣменами, въ оранж., въ легкой землѣ.

**А. кафра** (*A. Caffra*, кафрская). М. Д. Н. Цв. ярко-шарлаховые, въ июлѣ. 2 ф. Сип. *Анцантусъ сплендесъ*. **А. Кунонія** (*A. Cunonia*, Кунона). М. Д. Н. Цв. шарлаховые съ чернымъ, въ июлѣ. Сип. *Анцантусъ Кунонія*. **А. этиопика** (*A. aethio-*

*pica*, этиопская). М. Д. Н. Цв. шарлаховые съ зеленымъ, въ июлѣ. 3 ф. Сип. *А. флорибунда* и *прѣлита* (*A. floribunda et praeculta*).

**АНТОЛОМА** (*Antholoma*). *Anthos*—цвѣтокъ и *loma*—бахрома; по бахромчатому вѣничку. С. липовыхъ (1). Оранж. древ. р. Легкая глн. дерн. съ малымъ количествомъ торф. Черенками изъ вырѣвшаго роста, въ песокъ, подъ стекломъ.

**А. монтана** (*montana*, горная). Новая Каледонія. Цв. бѣлые, въ маѣ. 20 ф.

**АНТОСПЕРМУМЪ** (*Anthospermum*) *Anthos*—цвѣтокъ и *sperma*—сѣмя. С. мареновыхъ (21). Мысъ Д. Н. Оранж. куст. Торф., глн. дерн. и песокъ. Темп. лѣтомъ 8 до 15, зимой 4—6°. Черенками въ песокъ, подъ стекломъ.

**А. этиопику́мъ** (*A. aethiopicum*, этиопскій). Цв. двудомные, муж. коричневые, женск. зеленые, въ июлѣ. 2—3 ф.

**АНТОЦЕРЦИСЪ** (*Anthocercis*). *Anthos*—цвѣтокъ и *kerkis*—лучъ, по лучистому вѣничку. С. насленовыхъ (18). Австралія. Оранж. куст. р. 2½ глн. дерн. и ½ торф. Черенками въ песокъ, на тепломъ грунтѣ, подъ стекломъ. Прищипывать, чтобы кустились.

**А. альби́кансъ** (*A. albicans*, съ бѣловатыми лл.). Нов. южн. Валлисъ. Цв. бѣлые, въ апрѣлѣ. 1½—2 ф. **А. виско́за** (*A. viscosa*, липкій). Австралія. Цв. бѣлые, большіе, въ маѣ. 4—6 ф.

**АНТРОФИУМЪ** (*Antrophyum*). *Antros*—пещера и *phio*—рости. С. папоротниковъ. (16). Троп. Азія, Америка, ос. Тихаго океана. Тепл. рр.

**А. ланцесолату́мъ** (*A. lanceolatum*, ланцетовидный). Новая Гренада. Ван. въ 1 и болѣе ф. длин. и шириною въ ¼ до ½ д.

**АНТУРИУМЪ** (*Anthurium*). *Anthos* цвѣтокъ и *oura*—хвостъ, по початку. С. ароидей (160). Троп. Америка. Тепл. многол. трав. рр. Волокн. торф. съ глн. дер., торф. мохомъ, битыми черепками или древ. углемъ и пескомъ. Торфъ разломать и вытрясти изъ него землю; къ нему ¼ ч. моха и ½ ч. волокн. дерн. Дренажъ хорошій. Посадивъ, опрыснуть и поставить во влажный воздухъ, гдѣ теплѣе можетъ быть отъ 13 до 18° или нѣск. ниже для менѣе нѣжныхъ видовъ. Выводить отъ сѣмянъ—нужно терпѣнье; чтобы собрать сѣмена—искусств. оплодотворити; вырѣзываютъ сѣмена годъ; когда поснѣютъ, посѣять въ плошки и поставить въ темп. 20—24°, которую держать постоянно, при постоянномъ же влажномъ воздухѣ. Всходы разсадить, держать въ спертномъ и влажномъ воздухѣ, пока подрастутъ, потомъ исподволь приучить къ воздуху. Размножаются также

дѣленіемъ,—въ январѣ, при этомъ корень вынимаютъ, осторожно отряхаютъ землю, расправляютъ, дѣлятъ и сажаютъ.

**А. акау́ле** (*A. acaule*, безстебельный). Вестиндія. Лл. широкіе, продолгов. 1—3 ф.; цв. голубые, весной. **А. Андреану́мъ** (*A. Andreanum*, Андрѣ). Колумбія. Лл. овально-ланцетов. сердцевидные; цв. желтоватые съ красно-оранжевымъ чехломъ. **А. Бэкери** (*A. Bakeri*, Бэкера). Коста-Рика. Лл. линейные. Цв. зеленоватые съ краснымъ початкомъ, въ ноябрѣ. **А. Валу́еви** (*A. Waluiewi*, Валуева). Венецуэла. Лл. сердцевид., оливково-зеленые въ началѣ, ярко-красные потомъ. 2 ф. **А. Варокеану́мъ** (*A. Waroqueanum*, Вароке). Колумбія. Лл. продолговатые, бархатистые, зеленые. **А. Вейчѣи** (*A. Veitchii*, Вейча). Колумбія. Лл. сердцевид. съ металлич. отливомъ, волнистые. 2½ ф. **А. Гарри́си пульхру́мъ** (*A. Harrisii pulchrum*, Гарриса, красивый). В. англій. Лл. ланцетовид. пестрые. Цв. бѣлые съ малиновымъ початкомъ. Видовая форма весьма рѣдка. **А. инсѣн҃ге** (*A. insinge*, красивый). Колумбія. Лл. трехлопастные, молодые бронзового цвѣта, очень красивые.

**А. Кальбрѣйері** (*A. Kalbreyeri*, Кальбрѣера). Новая Гренада. Лл. дланевидные, темнозеленые. **А. кордифоліу́мъ** (*A. cordifolium*, сердцевидный). Новая Гренада. Лл. сердцевидные, темнозеленые на верхней, болѣе бѣлые на нижней сторонѣ. **А. коріа́цеу́мъ** (*A. coriaceum*, кожистый). Бразилія. Лл. овальные, очень толстые, кожистые.

**А. кристалли́ну́мъ** (*A. crystallinum*, хрустальный). Колумбія. Лл. овально-сердцевидные, бархатисто-зеленые съ бѣлыми жилками; молодые—фиолетоваго цвѣта. **А. кусpidату́мъ** (*A. cuspidatum*, остроконечный). Колумбія. Цв. красные, початокъ пурпуровый. 2—3 ф. **А. лейко́неу́мъ** (*A. leuconeum*, съ бѣлыми жилками). Мексика. Лл. сердцевидные, бархатистые, съ желтоватыми жилками. **А. Линденіану́мъ** (*A. Lindenianum*, Линдена). Колумбія. Лл. сердцевидные. Цв. душистые, бѣлые съ бѣлымъ или пурпуровымъ початкомъ, въ октябрѣ. 3 ф.

**А. ланцесолату́мъ** (*A. lanceolatum*, ланцетовидный). Вестиндія. Лл. ланцетовидные. Цв. зеленоватые, початокъ коричневый. 1 ф. Сип. **А. Вилденбу́и** (*A. Wildenowii*). **А. макроло́бу́мъ** (*A. macrolobum*, съ большими лопастями). Гибридъ. Лл. большіе, сердцевидные, съ 3 лопастями, темно-зеленые. **А. орнату́мъ** (*A. ornatum*, украшенный). Венецуэла. Лл. продолговато или овально-сердцевидные. Цв. бѣлые съ пурпуровымъ початкомъ, весной. 2½ ф. **А. регале** (*A. regale*, царскій). Перу. Лл. большіе, сердцевидно-остроконечные съ бѣлыми жилками; молодые розоватые. **А. сигнату́мъ** (*A. signatum*, отмѣченный). Венецуэла. Лл. трехлопастные, темно-зеленые. **А. спати-**

**филлю́мъ** (*A. spathiphyllum*, съ лопатчатыми лл.). Тропич. Америка. Лл. узко-ланцетовидные; цв. бѣлые съ желтымъ початкомъ. 1½ ф. **А. спленди́ду́мъ** (*A. splendendum*, великолѣпный). Юж. Америка. Лл. сердцевидные, пузырчатые, неровные. **А. субсигнату́мъ** (*A. subsignatum*, намѣченный). Коста-Рика. Лл. толстые, мясистые, стрѣловидные, темно-зеленые. 1½ ф. **А. ферре́рензе** (*A. ferreriense*, изъ Феррьеръ). Гибридъ между *A. орнату́мъ* и *Андреану́мъ*. Цв. ярко-красные съ бѣлымъ початкомъ. **А. фи́ссу́мъ** (*A. fissum*, расщепленный). Колумбія. Цв. зеленые, лл. разсѣченные на семь эллиптич. сегментовъ. 2 ф. **А. Шерцеріану́мъ** (*A. Scherzerianum*, Шерцеровъ). Коста-Рика. Цв. ярко-красные, початокъ красно-оранжевый. 1 ф. Дать нѣсколько красивыхъ разновидностей.

**АНХИТЕА** (*Anchietea*). *Anchietea* (*Anchietea*)—бразильскій ботаникъ. С. фиалковыхъ. Троп. Америка.

**А. пирифоліа** (*A. pyriformis*, съ лл. груши). Бразилія. Тепличное цвѣтущее р. Сѣвъ глн. дерн. съ торф. и пескомъ. Черенки хорошо принимаются въ песокъ, въ теплѣ, подъ стекломъ. Цв. бѣлые, въ июлѣ.

**АНХОМАНЕОЪ** (*Anchomanes*). Происхождение названія неизвѣстно. С. ароидей (1).

**А. Хукері** (*A. Hookeri*, Хукера). Фернандо-По. Тепличная клубневая ароидей, близкая къ *Аморфофаллюсъ* и по уходу. Назыв. также *Калладіу́мъ пещиолату́мъ* (*Caladium peltatum*). Когда завянутъ лл., пересадить въ смѣсь хорошей пещанисто-дерновой съ лист. Поливать не нужно до роста, весной, а потомъ—обильно. Лѣтомъ до 24°, зимой отъ 10 до 13°. Размнож. сѣменами и побѣгами. Чехолъ бѣдно-пурпуровый, початокъ бѣлый, въ июлѣ. 3 ф. Лл. широкіе, многоразд.

**АНХУ́ЗА** (*Anchusa*). *Anchousa*—краска для лица, по употребленію нѣк. видовъ. С. бурачниковыхъ (30). Европа, З. Азія, Африка. Одно, двул. и многол. рр. Сѣменами. Садовая, обильно.

**А. капензі́съ** (*A. capensis*, съ мыса Д. Н.). Цв. голубые, въ июлѣ. Двул. Оранж. 1½ ф.

**АНЧАРЪ**. См. Антиарисъ.

**АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ**. См. Виоля.

**АОТУСЪ** (*Aotus*). *A*—част. отрицанія и *ous*—ухо, по отсутствію придатковъ у чашечки. С. бобовыхъ. (19). Австралія. Оранж. куст. Глн. дерн., торф. и песокъ поровну, съ добавленіемъ древ. угля, при хорошемъ дренажѣ. Черенки изъ полувыврѣвш. древесины, въ апрѣлѣ, въ песокъ, подъ стекломъ.

**А. грацильді́ма** (*A. gracillima*, весьма красивый). Австралія. Цв. желтые или розовые, маленькіе, въ маѣ. 3 ф.



**АПЕЙБА** (Apeiba). Так называют эти пр. в Гвианѣ. С. липовыхъ. Теплич. куст. или древ. пр. Глин. дер. съ торф. Черенками изъ зрѣлаго роста въ песокъ подъ стекломъ; необходимо давать воздухъ, иначе черенки подгниютъ. Для возбужденія къ цвѣту кору большихъ вѣтокъ надрѣзаютъ кольцомъ.

**А. аспера** (A. aspera, жесткая). Гвиана. Цв. золотисто-желтые, въ мѣс. 30—40 ф. **А. тибурбу** (A. Tiburbou). Гвиана. Цв. темно-желтые, въ августъ. 10 ф.

**АПЕЛЬСИНЪ**. См. Цитрусъ.

**АПЕКРА** (Apicra). *Apicra* — не острый. С. лилейныхъ. (7). Южн. Америка. Пр. весьма близка къ алов и воспитываемыя такъ же.

**А. аспера** (A. aspera, жесткая). М. Д. Н. Цв. сѣроватые, въ июнь, 1 ф. **А. бакарината** (A. basarinata, съ двойнымъ килемъ). М. Д. Н.; цв. неизвѣстные. 1 ф. **А. пентагона** (A. pentagona, пятигранная). М. Д. Н. Цв. бѣловатые, въ июнь, 1 ф. **А. спиральс** (A. spiralis, спиральная). М. Д. Н. Цв. красноватые, въ июнь, 1 ф. **А. фоллоза** (A. foliolosa, съ мелкими лл.). М. Д. Н. Цв. зеленоватые, въ июль 1 ф.

**АПИОСЪ** (Arios). *Arios* — груша, по формѣ клубней. С. бобовыхъ. (3). С. Америка, Китай, Гималаи. Клубневое, выходящее р., выносящее умеренный климатъ. Песчанистая, рыхлая; положеніе солнечное. Дѣлится клубней.

**А. тубероза** (A. tuberosa, клубневой). *Земляная рудька*. Пенсильванія. Цв. темно-пурпуровые, пахучие, лѣтомъ и осенью. Клубни мунистые, употребляемые въ пищу. 6 ф. Сип. *Glycine arios* (Glycine Arios).

**АПИУМЪ** (Arium). *Arium* — кельтское слово, означающее воду, по влажности земли, въ которой растутъ. С. зонтичныхъ. (1). Распространены по всей земной поверхности; многа ядовиты. Въ огородахъ имѣетъ значеніе *А. гравеоленс* (A. graveolens, съ сильнымъ запахомъ), — *Сельдерей*, который бываетъ, *корневой*, *салатный* или *листовой* и *кудрявый*, происшедшіе отъ того же вида, дико растущаго въ Ю. Европѣ, С. Америкѣ, Зап. Азій и С. Африкѣ. Двудѣт. Сѣменами, высаживаемыми въ парникахъ или тепличкахъ, весной. Листовой — бланшируется окучиваніемъ, болѣе сильнымъ чѣмъ корневой. Зеленъ — рыхлая, удобренная, влажная.

**АПЛЕКТРУМЪ** (Aplectrum). *A* — частіца отрицанія и *plectron* — шпора. С. орхидей. (1). С. Америка.

**А. хемале** (A. huemale, зимній). Земная орхидея, нуждающаяся въ ватненіи и въ смѣси глин. дер. съ лист., при умеренной влажности. Цв. зеленовато-коричневые, въ апрѣль. 1 ф.

**АПОГАМНЫЙ** организмъ. Развивающийся безполовымъ способомъ, вслѣдствіе утраты способности полового размноженія.

**АПОНОГЕТОНЪ** (Aponogeton). *Apon* (кельтское) вода и *geiton* — смежество. С. наядовыхъ. (20). Троп. Азія, Африка, Австралія. Водяныя многол. Лучшій видъ *A. distachyon*, хорошо растетъ въ небольшихъ аквариумахъ. Сильная песчанисто дерн. съ переносимъ, въ которую сажаютъ р. въ горшокъ, опускаемый въ воду, у большихъ экз. при этомъ горшокъ разламываютъ.

**А. дистахионъ** (A. distachyon, двуголовый). М. Д. Н. Цв. бѣлые, тычинки съ пурпуровыми пыльниками *А. спатацеумъ юнцеемъ* (A. spathaceum junceum, съ чехломъ тростниковымъ). Ю. Африка. Цв. темно-розовые.

**АПОРТОВОЕ, АПОРТЪ**. Сортъ яблока поздній, крупный, съ широкимъ основаніемъ конической формы, желтое съ алой росписью, болѣе или менѣе полное; мякоть съ самымъ легкимъ кваскомъ, разсыпчатая. Лучшее изъ русскихъ десертныхъ яблокъ. *А. сладкій*, похожъ формой и окраской на обыкновенный, вкуса болѣе сладкаго.

**АПОТЕНІЙ**. Плодоносный поверхностный слой сумчатыхъ грибовъ.

**АПОЦИНУМЪ** (Aposcynum). *Apo* — прочъ и *kyon* — собака: Dioscorидъ былъ убѣжденъ, что это р. ядовито собакамъ. С. кутровыхъ (5). С. Америка, ю. Европа, Азія. Многол. трав. пр. Обыкновен. садов. Сѣменами, отпрысками и дѣленіемъ.

**А. андроземифоліумъ** (A. androsaemifolium, съ лл. зѣвробоя). *Мухомолка*. Канада. Виргинія. Цв. блѣдно-розовые съ болѣе темными полосками, въ июль. 1—2 ф.

**АПОШИНСКОЕ** яблоко. См. Стянка.

**АРАУКАРИЯ** (Araucaria). Въ Чили эти пр. называютъ araucanos. С. хвойныхъ (10). Ю. Америка, Австралія, остр. Южн. Океана, Новая Каледонія. Величественныя древ. породы, изъ которыхъ нѣкъ. выносятъ климатъ умеренныхъ европейскихъ странъ. Волокнистая глин. дернов. съ листовой и пескомъ. Сѣменами и черенками изъ главнаго побѣга, въ песокъ.

**А. Бидвилліи** (A. Bidwillii, Бидвиллія). Моретонскій заливъ. Лл. 2 горизонтальными рядами, 150 ф. Симметрическаго и правильнаго роста. **А. бразиліансисъ** (A. brasiliensis, бразильская). Бразилія. Лл. черепчатые, темно-зеленые, остроколючные. 70—100 ф. **А. Гольдайдана** (A. Goldiana, Гольдайдан). Нов. Каледонія. Лл. кольчатые, пониклые, темно-зеленые. **А. имбриката** (A. imbricata, настельная). Чили. Лл. овалъ-

но-ланцетовидные, сидячіе, остроколючные. 50—100 ф. Одинъ изъ болѣе выносливыхъ видовъ **А. Кукии** (A. Cookii, Кукова). Нов. Каледонія. Лл. шиловидные, короткіе, густые. 200 ф. **А. Куннингами** (A. Cunninghamii, Куннингама). Моретонскій заливъ. Лл. игловые, на плодоносныхъ вѣтвяхъ болѣе короткіе и толстые. 100 ф. Одинъ изъ выносливѣйшихъ видовъ. Имѣетъ разновидность *гласка* (glauca) съ сизо-серебристыми лл. **А. Рудей** (A. Rulei, Рудя). Папуанскій архипелагъ. Л. продолговато-ланцетовидное, настельные въ 4 ряда. 50 ф. У разновидности *элеганс* (elegans), лл. короче и гуще. **А. экцелса** (A. excelsa, паяцкая). Норфолкъ. Лл. шиловидные, остроколючные, ярко-зеленые, густые. 150 ф. Весьма красивое, симметрическое дерево.

**АРАВИСЪ** (Arabis). Происхожденіе не объяснено. С. крестоцвѣтныхъ (130). Европа, С. Азія и С. Америка. Многол. или однол. трав. пр. Сухая почва. Многол. дѣленіемъ и черенками въ песокъ, на воздухѣ, лѣтомъ, или сѣменами. Съѣзъ весною въ плошки. Однол. и двул. не имѣютъ садоваго значенія.

**А. альбида** (A. albiда, бѣловатый). Крымъ. Кавказъ. Цв. бѣлые, въ июль. Многол. 6—9 д. Для бордюра употребляютъ пестролистную разновид. *варіегата* (variegata). **А. альпина** (A. alpina, альпійская). Швейцарія. Цв. бѣлые, въ мѣс. Многол. 6 д. Имѣетъ разновидность *варіегата* (variegata), весьма красивую, въ бордюры. **А. ареноза** (A. arenosa, любящій песокъ). Ср. Европа. Цв. розовые. Многол. 6 д. **А. люцида** (A. lucida, блестящая). Венгрія. Цв. бѣлые, лѣтомъ. 4—6 д. Многол. Имѣетъ пестролистную разновидность *варіегата* (variegata). **А. петреа** (A. petraea, со скалъ). З. Европа. Цв. бѣлые, въ июнь. 3—4 д.

**АРАВКА. АРАВСКОЕ ЯБЛОКО**. Поздній сортъ, отличающийся темно-красной кожицей; разбѣръ болѣе чѣмъ средній, вкусъ кислый; хорошее кухонное яблоко. Вызрѣваетъ въ лежкѣ.

**АРАЛІЕВЫЯ** пр. (araliaceae). Древесныя, кустарныя, рѣдко травянистыя пр., близка по строенію къ зонтичнымъ. Наиболѣе извѣстны роды *Аралія* и *Хедера*.

**АРАЛІЯ** (Aralia). Происхожденіе названія неизвѣстно. С. араліевыхъ (30). Азія, Мексика, С. Америка. Теплич., оранж. и частію полувынос. пр. Главнѣйшее условіе ухода — достаточная поливка. Теплич. виды въ песокъ. дерн. съ торф., нѣкъ. количествомъ лист. и достаточнымъ колич. песку; для болѣе сильныхъ — прибавляется перегной. Самый обыкновен. и успѣшнѣйшій способъ размнож. —

корневыми черенками, длиною въ 2 д. въ песокъ, при умеренномъ теплѣ и прикрытіи стекломъ. Можно также размножать отрѣзками стебля длиною въ 1—1½ д. съ глазкомъ на концѣ, въ песокъ. Нѣкот., какъ напр. *A. leptophylla*, Veitchii и др., черенками принимаются трудно, и потому ихъ размножаютъ прививкой.

**А. Вейчии** (A. Veitchii, Вейча). Нов. Каледонія. Лл. дланевидные съ нитевидными листочками, зелеными на верхней, красными на нижней сторонѣ. **А. Гильфойлей** (A. Guillelolei, Гильфол). Ос. Южн. Океана. Лл. перистые, листочки продолговато-эллиптические съ бѣлыми каемками. Стебель съ мѣтлами. Теплич. **А. кверцифолія** (A. quercifolia, съ лл. дуба). Новая Британія. Лл. тройчатые, листочки выемчатые, светло-зеленые. Теплич. **А. Максимовичи** (A. Maximowiczii, Максимовича). Японія. Лл. дланевидные, листочки ланцетовидные, зубчатые. Оранж. Сип. *Acanthopanax ricinifolium* (Acanthopanax ricinifolium). **А. монстроза** (A. monstrosa, чудовищная). Ос. Южн. Океана. Лл. перистые, пониклые, листочки зубчатые. Теплич. **А. нудикаулис** (A. nudicaulis, съ голымъ стеблемъ). С. Америка. Лл. корневые, перистые; цв. зеленоватые, въ июль. 3—4 ф. Травяни. многол. **А. Осіана** (A. Osiana, Осіана). Ос. Южн. Океана. Лл. сложные, листочки глубоко разсѣченные на концахъ, жилины многолапчатого цвѣта. **А. пентафилля** (A. pentaphylla, пятилистая). Японія. Лл. дланевидные, перисторазсѣченные, ярко-зеленые. У разновидности *варіегата* (variegata) лл. обведены бѣлыми краями. Стебель древесный, колючій. 30 ф. Сип. *Panax spinosa* (Panax spinosa). **А. рацемоза** (A. racemosa, съ цвѣтами кистью). С. Америка. Лл. трехраздѣльные, раздѣлы съ сердцевидными листочками. Ц. зеленоватые, въ июль. 3—4 ф. Трав. многол. **А. спиноза** (A. spinosa, съ колючками). С. Америка. Лл. дву и трехперистые, листочки овальные, зубчатые. Стебель съ иглами. 8—12 ф. Оранж. **А. терната** (A. ternata, съ тройчатыми листочками). Новая Британія. Лл. тройчатые, листочки продолговато-ланцетовидные, зубчатые. Теплич. **А. филицифолія** (A. filicifolia, съ лл. папоротника). Поднезвіе. Лл. непарноперистые. Стебель и черешки пурпуровые съ бѣлыми пятнышками. **А. хинензисъ** (A. chinensis, китайская). Китай. Лл. перистые, кожистые. Сип. *A. canescens* (A. canescens). **А. хетероморфа** (A. heteromorpha, разной формы). Лл. иногда овалъно-ланцетов. и зубчатые, въ другихъ случаяхъ — съ дву и трехразсѣченными концами, ярко-зелен. **А. Шабриери** (A. Schabrieri, Шабриера). Лл. перистые, перья линейно-ланцетовидныя, темно-зеленые. Теплич. **А. эдулис** (A. edulis, съ-



добная). Япония, Лл. нижние — перистые, верхние — простые. Цв. белые, летом. Многол. трав. **А. элегантиссима** (*A. elegantissima*, — самая изящная). Остр. Южн. Океана. Лл. дланевидные, листочки нитевидные, пониклые. Теплич.

**АРАХИСЬ** (*Arachis*). **А** — частица отрицания и *rachis* — ветка. С. бобовых (7). Бразилия и др. тропич. страны. Теплич. однол. Песч. дерн; с/менами в теплх, всходы рассаживают в отдельные горшки.

**А. хипогэа** (*A. hypogaea*, подземный). *Земляные орехи*. Южн. Америка. Цв. желтые, в маё. По отцветении, когда станут вырастать стручки, удлинится почка, спускается в землю и семена вызревают под землей. 1 ф.

**АРБОРЕТУМЪ**. Собрание выносливых древесных пород. От хорошего насаждения арборетума требуется, чтобы он был расположен красиво, но не систематически только, как это делается в коллекциях ботанических садов, хотя для научных целей удовлетворяет более систематическое насаждение.

**АРВУТУСЪ** (*Arbutus*). Кельтское слово *arboise* означает колючий куст, но грубым плодам. С. вересковых (10). 3. Европа, Средиземное побережье, С.-З. Америка, Мексика. Древесный и кустарн. рр. С/менами, весной; окулировкой; отводкой. Легкая песчаная или торфяная с песком.

**А. андрахне** (*A. Andrachne*, *Кизиль-ахча* в Крыму). Греция. Цв. зеленоватые с пухом, весной. 10—14 ф. Имеем разновидности *serotifolia* (*serotifolia*) с запыленными лл. **А. денсифлора** (*A. densiflora*, густоцветная). Мексика. Цв. белые. 20 ф. **А. Менциса** (*A. Menziesi*, Менциса). С.-З. Америка. Цв. белые, осен. 6—10 ф. **А. Унедо** (*A. Unedo*), *Ежовка*. Ю. Европа. Цв. белые, иногда красные, осенью. 8—10 ф. **А. гибрида** (*A. hybrida*, гибридное). Садовая разновидность. Цв. белые, осенью. 10—20 ф.

**АРВУЗОВСКОЕ** яблоко. Сорт средней поры поспевания, крупный, белого цвета с легким румянцем и с рассыпчатой мякотью кисло-сладкого вкуса.

**АРВУЗЪ**. См. Цитрулюс.

**АРГАНІЯ** (*Argania*). **Аргам** — местное название. С. санитовых (1). Марокко. Оранж. дерево. Обыкновен. садовая; отводками или черенками, осенью, под стеклом, в оранжереях.

**А. Сидероксилонъ** (*A. Sideroxylon*) *Желтое дерево*. Цв. зеленовато-желтые, в июль. Плоды велич. в сливу, с млеч-

ным соком. 15—20 ф. Син. *Элеодендронъ Арианъ* и *Сидероксилонъ спинозусъ* (*Elaeodendron Argan, Sideroxylon spinosum*).

**АРГЕМОНЕ** (*Argemone*). **Аргема** — глазное бельмо, по предположению врачей свойства. С. маковых (6). Америка. Одно- и многол. рр., содержащая желтый млечный сок. Обыкновен. садовая; с/вется в марте — апреле в группах на воздухе, или более пышная в парниках; и высаживаются на воздух в маё — июнь.

**А. альбифлора** (*A. albiflora*, белоцветное). Георгия. Цв. белые, в июль — август. 1 ф. Выносливое однол. **А. грандифлора** (*A. grandiflora*, крупноцветное). Мексика. Цв. крупные белые с желтыми пыльниками, в июль. Многол. Цветет в второй год, произрастая в оранжереях. 2 — 3 ф. **А. охroleйка** (*A. ochroleuca*, желтоватое). Мексика. Цв. бледно-желтые, в августе. Стебель колючий. Однол. **А. хирсута** (*A. hirsuta*, волосатая). Калифорния. Цв. белые, в сентябрь. Однол. 2 ф.

**АРГИРЕЯ** (*Argyrea*). *Argyreia* — серебристый, по нижней стороне лл. С. вьюнковых (24). Остиндия, Малайск. архип., троп. Африка. Оранж. и тепл. дерн. куст. рр. Торф. с/ глини. дерн. и песком. Черенками, в песок, под стеклом, при теплх.

**А. кунеата** (*A. cuneata*, клиновидная). Индия. Цв. большие, темно-пурпуровые, в июль. 2 — 5 ф. **А. специоза** (*A. speciosa*, красивая). Индия. Цв. большие, темно-розовые, в июль. 5 — 10 ф. **А. спленденс** (*A. splendens*, великоцветная). Индия. Цв. бледно-красные, в ноябрь. 10 ф. **А. цимоза** (*A. cymosa*, с цвет. полузонтиками). Малабарь. Цв. внизу светло-малиновые, в ноябрь. 10 ф.

**АРГИРОКСИФИУМЪ** (*Argyrophium*). *Argyros* — серебро и *xyphon* — шпага: по серебристым листьям, как у *Gladiolus*. С. сложноцветных. (1). С/менами. Сильная песчанисто-дерновая с листовой.

**А. сандвиченс** (*A. sandwicense*, со Сандвичевых ос.). Сандвичевы ос. Цв. гол. пурпуровые. 3 ф. Оранж. многол. трав. р. Син. *Аргирофитонъ Дулязия* (*Argyrophyton Douglasii*).

**АРДИЗИЯ** (*Ardisia*). *Ardis* — острье, по остроконечным пыльникам. С. прищипенных. (200). Троп. и жарк. поясы, но редко в троп. Африк. Оранж. куст. и древ. рр. Черенками из полурасполога роста, с/ марта до сентября; но лучше с/менами, в горшках или планках, рано весной, в смеси из глини. дерн. пополам с лист., на теплом месте.

Довольствуются температурой, которая не спадала бы ниже 6° зимою. Красоту рр. составляют плоды.

**А. макрокάρпа** (*A. macrosarpa*, крупноплодная). Непаль. Цв. темные, плоды кипарисного цвета, величиною в крыжовник. 5—6 ф. **А. кренулата** (*A. crenulata*, с круглозубчатыми лл.). Мексика. Цв. красновато-фиолетовые, в июль. Ягоды кораллово-красные. 3 — 6 ф. **А. паникулата** (*A. paniculata*, метельчатая). Индия. Цв. розовые, в июль. Плоды красивые, в горшину. 8—10 ф.

**АРДУИНА** (*Arduina*). *II. Ардуини* (*Arduini*) был начальником падуанского ботанич. сада во времена Линнея. С. куртовых (1). Южн. Африка. Глин. дер. пополам с торф. Черенками, в песок, под стеклом. Темп. зимой не ниже 4°.

**А. биспиноза** (*A. bispinosa*, с двойными иглами). М. Д. Н. Цв. маленькие, белые, пахучие, с/ марта до августа; ягоды красные. Куст. р. 3—5 ф.

**АРЕКА** (*Areca*). В Малабарь взрослое это дерево называется *арекъ*. С. пальм. В настоящее время родъ Арека разбит на несколько отдельных. Орнамент. излци. тепл. пальмы. Глин. дерн. поровну с торф. и лист., с/ добавкою песка; для взрослых количество глини. дер. должно быть увеличено. Размнож. с/менами, в теплх. Темп. зимой 10—15, летом 15—22°.

**А. Аликиса** (*A. Aliciae*, принцессы Алисы). С. Австралия. Лл. перистораздельные. **А. glandiformис** (*A. glandiformis*, с с/менами, похожими на желуды). Молукские ос. Лл. перистораздельные. **А. Катеху** (*A. Catechu*, Катеху). Индия. Лл. перистые, светло-зеленые. 30 ф. Производит ботельный орехъ. **А. концинна** (*A. concinna*, красивая). Цейлон. Лл. перистораздельные. 8—12 ф. **А. триандра** (*A. triandra*, трехтычковая). Индия. Лл. перистые, похожие на А. Катеху. 20 ф.

**АРЕНАРИЯ** (*Arenaria*). *Arena* — песок. С. гвоздичных. (130). Почти повсеместно; под тропиками редко. Травянист. выносл. рр. из которых заслуживают внимания только многол. Обыкновенная садовая или из глини. дерн. с/ листов. и песком. Д/леніем, с/менами и черенками. Лучшее время д/лить — июль и август. С/ять — в холод. парникъ весной.

**А. балеарика** (*A. balearica*, балеарская). Корсика. Цв. белые, до августа с/ весны. 3 д. **А. грамифолия** (*A. graminifolia*, с листьями злаков). Кавказ. Цв. белые, в июль. 6—9 д. **А. ларицифолія** (*A. laricifolia*, с лл. как у лиственницы).

Швейцария. Цв. белые, в июль. 6 д. **А. пурпурасценс** (*A. purpurascens*, пурпуровая). Пиренеи. Цв. светло-пурпуровые, в маё. 6 д. **А. ротундифолия** (*A. rotundifolia*, круглолистная). В. Россия. Цв. белые, с/ июня по август. 4—6 д.

**АРЕНГА** (*Arenga*). Происхождение названия неизвестно. С. пальм. (1). Сильное тепло, сильная перегонная земля. Только с/менами.

**А. сахарифера** (*A. saccharifera*, сахарная). Молукские ос. Замечательная перистолестная пальма: сердцевина дает саго, а сок — сахар.

**АРЕОМЕТРЪ**. Снарядъ для измерения плотности жидкостей.

**АРЕТУЗА** (*Arethusa*). *Аретуза*, одна из мифологических Гесперидъ, превращенная в источник. С. орхидей. (3). Япония. С. Америка, Гватемала. Земные рр., нуждаются в затененном положении в оранжереях и в смеси из перегной с торф. мохом.

**А. бульбоза** (*A. bulbosa*, луковичная). Каролина. Цв. крупные, ярко-розовые с пурпуровым оттенком, в маё, 8 д.

**АРИЗАРУМЪ** (*Arisarum*). Так назывался у древ. греков какой то арумъ. С. ароидей. (3). Средиземное побережье. Рр. эти не имеют садового значения. Песчанистая с/ глини. дерн. и торф. С/менами и д/леніемъ корня, весной.

**А. вульгаре** (*A. vulgare*, обыкновенный). *Клецникъ*. Южн. Европа. Чехолъ ярко-пурпуровый, весной. 1 ф.

**АРИЗЕМА** (*Arisaema*). *Aron* — арумъ и *sana* — образекъ, по сходству с арумъ. С. ароидей. (50). Троп. Азия и п/вот. в Америке и Абиссинии. Малая клубневая преимущественно оранж. рр. Уходъ какъ за арумъ.

**А. галеата**. (*A. galeata*, шлемовидная). Гималаи. Чехолъ зеленый с/ пурпуровым основанием, в июль. 1 ф. **А. Гриффиса** (*A. Griffithi*, Гриффиса). Сиккимъ. Чехолъ большой фиолетово-коричневый, весной. 1—1½ ф. Син. *А. Хукериджумъ* (*A. Hookerianum*). **А. концинна** (*A. concinna*, красивая). Сиккимъ. Чехолъ зеленый с/ белыми продольными полосками, в июль. 1—2 ф. **А. курватумъ** (*A. curvatum*, скривленная). Гималаи. Чехолъ с/ неясными белыми полосками, в июль. 1 ф. **А. перентойдес** (*A. perentoides*, похожая на Непентесъ). Гималаи. Чехолъ охристо-желтый, весной. 2 ф. **А. рингенс** (*A. ringens*, открытый). Япония. Чехолъ зеленый с/ белыми полосками, весной. Син. *А. прёкоксъ* (*A. praecox*) и *Зибольди* (*A. Sieboldi*). **А. специоза** (*A. speciosa*, особенная). Гималаи. **А. трифилля** (*A. triphylla*, трехлистная). С. Америка. Чехолъ с/ пурпуро-



выми полосками, в июль — июль. 1 ф. Сип. *Арум трифилла и зебринна* (*Arum triphylla et zebrina*).

**АРИСТЕА** (*Aristea*). *Aristea* — ость, по острым концам л. с косатиловых. (15). Мадагаскар. Ю. Африка. Оранжевые трав. пр. 3 ч. волокнистой торф. и 1 ч. глини. дерн. Семенами и делением корня.

**А. капitata** (*A. capitata*, головчатая). М. Д. Н. Цв. голубые, в июль. 3 ф. **А. циянеа** (*A. cyanea*, ярко-голубая). М. Д. Н. Цв. голубые, в июль. 6 д.

**АРИСТОЛОХИЯ** (*Aristolochia*). *Aristos* — лучший и *locheia* — очищение, по врачебному действию. С. кирказоновых. (180). Жаркая страна. Тепл., оранжев. и воздуш. цв. являющиеся или прямостоячие пр. Хорошая глини. дерн. с птк. количеством перегноя и добавкой песка. Лучше растут посаженные в грунт. Черенками в песок, под стеклом, в тепл.

**А. Гольдайна** (*A. Goldiana*, Гольдайн). Старая Калабарская рыва Цв. снаружи зеленые, внутри желтые с шоколадного цвета жилками, в июль. Цыкое р. 15 ф. Тепл. **А. Дюшартрей** (*A. Duchartrei*, Дюшартрей). Верх. Амазонка. Цв. с коричневыми трубкой и белыми отворотом с пурпуровыми крапинками, в январь. 5 ф. Тепл. **А. каудата** (*A. caudata*, с хвостовидным концом). Бразилия. Цв. тускло-желтые, отворот с завитым длинным концом, в июль. 5 ф. Тепл. **А. лавиоза** (*A. labiosa*, губастая). Бразилия. Цв. зеленые, двугубые, в июль. 20 ф. Оранжев. **А. одоратиссима** (*A. odoratissima*, весьма душистая). Ямайка. Цв. пурпуровые, с приятным запахом, в июль. 10 ф. Тепл. **А. орнитоцефала** (*A. ornithocephala*, птичье-головая). Цв. пурпуровые, большие, очень похожие на голову журавля, сразу цветет с коричневыми пятнами, в октябрь. 20 ф. Тепл. **А. рингенс** (*A. ringens*, отверстие). Бразилия. Цв. очень крупные, зеленые с пурпуровыми и черными разводами, в июль. 20 ф. Тепл. **А. сифо** (*A. sirho*, сифонная, трубчатая). С. Америка. Цв. желтовато-коричневые, в мае и июль. 15—30 ф. Зимует у нас под закрытием, в сильной, глубокой, несколько сухой почве. **А. томентоза** (*A. tomentosa*, пушистая). С. Америка. Цв. пурпуровые, в июль. Ближай к сифо и столько же выносливая. 20 ф. **А. трикаудата** (*A. tricaudata*, треххвостая). Мексика. Цв. темные коричнево-пурпуровые, в август. Тепл. **А. флорибунда** (*A. floribunda*, обильно цветущая). Цв. красно-пурпуровые с желтыми жилками, в июль. 10 ф. Тепл. **А. цилиоза** (*A. ciliosa*, бахромчатая). Бразилия.

Цв. желто-коричневые с бахромчатым отворотом, в сентябрь. 6 ф. Тепл.

**АРИСТОТЕЛИЯ** (*Aristotelia*). По греч. философу *Аристотелю*. С. липовых. (5). Чили. Австралия, Нов. Зеландия. **А. Макви** (*A. Maqui*, Макви). Чили. Красивый куст. к. неопадаящими лл., зимующий на воздухе в умеренном климате. Цв. маленькие, зеленоватые, в мае; плоды — ягоды, в горошину, темно-пурпуровые, почти черные. Обыкновен. садовая. Размнож. черенками, под стеклом.

**АРКАДЬ**. Ранний сорт сладких яблок, небольших размеров, круглой формы, с зеленоватою кожей и румянцем. **А. бый**. Такой же ранний сорт, как бый. аркад, но несколько крупнее, вкуснее, румянообразной формы, с более светлой, почти белой кожей и румянцем.

**АРКТИЧЕСКИЙ**. Уверный.

**АРКТОТЕКА** (*Arctotheca*). *Arktos* — медведь и *theca* — коробочка, по грубости плодов. С. сложноцветных. (1). Юж. Африка. Торф. с лист. и глини. дерн. Делением, или черенками весной. **А. репенс** (*A. repens*, ползучая). М. Д. Н. Безстебельное, ползучее р. с желтыми цв. головками, в июль.

**АРКТОСТАФИЛОСЪ** (*Arctostaphylos*). *Arctos* — медведь и *staphyle* — плодовая кисть: медведи едят плоды птк. видов. С. вересковых. (15). Европа, Мексика, Калифорния. Рыхлая, торф. с песком. Уход как за Арбутус.

**А. альпина** (*A. alpina*, альпийский) *Амрикс*. 3. Европа, В. Сибирь. Цв. белые или белые, в апрель. Р. лекарное. Сип. *Арбутус альпина* (*Arbutus alpina*). **А. нитид** (*A. nitida*, блестящий). Мексика. Цв. белые, в мае. 4 ф. **А. пунгенс** (*A. pungens*, колючий) Мексика. Цв. белые, в февраль. Лл. колючие. 1 ф. **А. томентоза** (*A. tomentosa*, пушистый). С.-З. Америка. Цв. белые, в декабрь. 4 ф. **А. уа-урси** (*A. uva-ursi*, медвежье ухо). *Толокиянка*. С. Россия. Цв. белые с красным в зеве, в апрель. Низкий полукуст. Сип. *Арбутус уа-урси* (*Arbutus uva-ursi*).

**АРКТОТИСЬ** (*Arctotis*). *Arctos* — медведь и *ous* — ухо, по плодам С. сложноцветных. (30). Южн. Африка. Глини. дерн. с лист. Черенками в песок, тепл., под закрытием.

**А. акаулис** (*A. acaulis*, безстебельный). М. Д. Н. Цв. головки желтые с красным, летом. 4 д. **А. арборесценс** (*A. arborescens*, древовидный). М. Д. Н. Цв. головки белые на верхней, малиновые — на нижней стороне, летом. 2 ф. **А. грандифлора** (*A. grandiflora*, крупноцветная). М.

**Д. Н.** Цв. головки оранжевые, в июль. 1½ ф. Сип. **А. ундулата** (*A. undulata*). **А. специоза** (*A. speciosa*, особенный). М. Д. Н. Цв. головки желтые, в июль. 1½ ф. Сип. **А. бревискапа** (*A. brevicaapa*).

**АРМЕНИАКА** (*Armeniacae*). От *Армен* — предполагаемой родины абрикоса. С. розановых. Низкорослая дер. Сильная глинисто-дернов. Семенами и прививкой.

**А. бриганция** (*A. brigantia*, бриансонская). Юж. Европа. Цв. белые или розовые, в март. 6—8 ф. Родоначальная форма желтых и зеленых сливных пород (ренклода, марабеллы и др.). **А. вулгарис** (*A. vulgaris*, обыкновенная). *Абрикос*. Ю. Россия. Цв. бледно-малиновые, рано весной. 15 ф. Чрезвычайно много разновидностей. **А. дазикарпа** (*A. dasycarpa*, толсто-плодная). *Черный абрикос*. Китай. Цв. белые, весной рано. 10—15 ф. **А. сибирика** (*A. sibirica*, сибирская). *Каменная или сибирская слива*. Даурия. Цв. розовые, в апрель. 8—20 ф.

**АРМЕРИЯ** (*Armeria*). Так называли Римляне гвоздику. С. свинцовых. (50). Европа, С. Африка, З. Азия, Сев. Америка. Многол. трав. пр. Песчанисто-дерн. с лист.; семенами и делением. Сбыв весной в горшки, которые ставят в холод. парник.

**А. вулгарис** (*A. vulgaris*, обыкновенная). Европа. Цв. розовые, лиловые или белые, в июль до августа. 6—12 д. **А. диантоидес** (*A. dianthoides*, похожая на гвоздику). Ю. Европа. Цв. бледно-розовые, в мае — июль. 6—8 д. **А. плантагина** (*A. plantaginea*, с л. попутника). Ю. Европа. Цв. розовые, в июль. 1 ф. **А. сетacea** (*A. setacea*, со щетинками). Юж. Европа. Цв. бледно-розовые, с мая. Плоды со щетинками. 3 д. **А. цефалотес** (*A. cerphalotes*, круглоглавый). Юж. Европа. Цв. темно-карминные, осенью. 12—18 д. Едва ли не самая лучшая армерия. Сип. **А. латифolia**, **А. мауританика**, **А. формоза** (*A. latifolia*, *A. mauritanica*, *A. formosa*). **А. юнца** (*A. juncea*, тростниковая). Юж. Европа. Цв. розовые, в июль. 3 д. **А. юниперифолия** (*A. juniperifolia*, с л. можжевельника). Испания. Цв. темно-розовые, в мае — июль. 6 д.

**АРНЕВИЯ** (*Arnebia*). Название арабского происхождения. С. бурачниковых. (12). Азия, Сев. Африка. Одно и многол. трав. пр. Черенками, кот. отдираются осенью, сажаются в песок и переносятся на зиму в оранж., также семенами весной. Песчанисто дерн.

**А. эхиоидес** (*A. echinoides*, похожая на ежовник). Грузия. Цв. яркие желтые, с пурпуров. пятнышками, в мае. 9—12 д.

**АРНИКА** (*Arnica*). *Arnica* — овечья шкура, по листьям. С. сложноцветных. Европа, Азия, С. Америка. Многол. низкая трав. пр. Глини. дерн. с торф. и песком. Семенами весной, в парник.

**А. монтана** (*A. montana*, горная). *Баранья трава*. Европа. Цв. головки желтые, в июль. 1 ф. **А. фоллоза** (*A. foliosa*, листовенная). Соед. Штаты. Цв. головки бледно-желтые, в август. 1—2 ф. **А. Шамиссо** (*A. Chamissoni*, Шамиссо). С. Америка. Цв. головки желтые, с июля по сентябрь. 1—2 ф.

**АРОИДНЫЕ раст. АРОИДЕИ** (*Agraceae*, *Aroideae*) Обширное семейство травянистых растений с клубневыми корневищами. Цветы в початке; одно или обоим, защищенные чехлом. Листья большие, прикоренные. К этому сем. принадлежат известные роды Алоказия, Арум, Диффенбахия, Калadium, Колоказия.

**АРОМАТЪ**. Благоухание; приятный запах.

**АРПОФИЛЛИУМЪ** (*Arpophyllum*) *Арпе* — кинжал и *phyllon* — лист. С. орхидей. (6). Мексика, Сред. Америка, Ямайка. Тепл. эпифитный и земный пр. Волокни. торф. с малым кол. глини. дерн., улем и черенками.

**А. гигантеумъ** (*A. giganteum*, великанский). Мексика. Цв. темно-пурпуровые с розовыми, в апрель — май. **А. спикатумъ** (*A. spicatum*, с цв. в колосе). Гватемала. Цв. темно-красные, зимой.

**АРТАБОТРИСЪ** (*Artabotrys*). *Aratao* — поддерживать и *botrys* — виноград, по ухваткам, на которых висят плоды. С. аноновых. (15). Троп. Азия и Африка. Тепл. куст. пр. Песчанисто дерн. с торф. и перегноем. Черенками из взрвшеи древесины, под прикрытием, в тепл., рано весной. Семена высвоят как только получатся.

**А. одоратиссиму** (*A. odoratissimus*, с самым душистым цв.). С. ос. Малайского архипелага. Цв. красно-коричневые, очень душистые, в июль — июль. 6 ф.

**АРТАНЕМА** (*Artanema*). *Aratao* — поддерживать и *nema* — нить; по зубчику на длинных нитях. С. норичниковых. (3). Троп. Африка, Австралия. Оранжев. куст. пр. Семена высвоят весной в оранж. Легкая, сильная. Размнож. также черенками. На лето можно посадить на воздух.

**А. фимбриатумъ** (*A. fimbriatum*, бахромчатый). Австралия. Цв. большие, голубые, в июль. 2—3 ф.

**АРТЕМИЗИЯ** (*Artemisia*). *Армелиза* — одно из имен богини Дианы. С. сложноцветных. (Больше 150). Сев. по-



лушаріе, Южн. Америка. Многол. трав. и кустар. пр. обычно выносливы. Сухая всякая. Кустар. размнож. черенками; трав. многол.—дѣленіемъ, однол. и всѣ—сѣменами.

**А. абротанумъ** (*A. abrotanum*, душистая). *Божье дерево*. Южн. Европа. Цв. головки желтоватыя, въ августѣ—сентябрѣ. 2—4 ф. Куст. **А. альпина** (*A. alpina*, альпійская). Кавказъ. Цв. головки желтыя, лѣтомъ. 6—10 д. Мног. трав. **А. Абсинтиумъ** (*A. Absinthium*). *Полюнь*. Европа. Цв. гол. желтыя, лѣтомъ 1—1½ ф. Многол. трав. **А. аргентеа** (*A. argentea*, серебрястая). Мадера. Цв. головки блѣдно-желтыя, въ июль. 1½ ф. Куст. **А. вульгарисъ** (*A. vulgaris*, обыкновенная) *Биллиникъ*. *Бурьянъ*. *Чернобыльникъ*. Цв. головки желтыя, въ августѣ. 3—4 ф. Многол. трав. **А. Дракункулусъ** (*A. Dracunculus*). *Эстрагонъ*. Ю. Европа. Цв. головки зеленоватыя, въ июль. 2 ф. Многол. трав. **А. Мутеллиана** (*A. Mutelliana*). Евр. Альпы. Цв. головки зелено-желтыя, въ июль. 6 д. Трав. многол. **А. Стеллеріана** (*A. Stelleriana*, Стеллерова). В. Сибирь. Цв. головки желтыя, лѣтомъ. 1—2 ф. **А. пѣрулесценсъ** (*A. perulescens*, голубоватая). Ю. Европа. Цв. головки сизо-зеленыя, въ августѣ. Куст.

**АРРАКАХА** (*Arracacha*). Испанское названіе р. С. зонтичныхъ (1). Клубневое многол. трав. р.; клубни употребляются въ Южн. Америкѣ въ пищу, какъ картофель. Глин. дерн.; дѣленіемъ клубней.

**А. эскулента** (*A. esculenta*, съдомая). Сѣв. часть Южн. Америки, по горамъ. Цв. бѣлые, въ июль. 1—2 ф. Сил. *Кониумъ Арракаха* (*Conium Arracacha*).

**Артишокъ**. См. Цинара.

**АРТОКАРПУСЪ** (*Artocarpus*). *Артос*—хлѣбъ и *karpos*—плодъ; печеный плодъ вкусомъ походить на хлѣбъ. С. хлѣбноплодныхъ. (40). Троп. Азія, остр. малайск. арх. и Южн. Океана. Замѣчательно, что къ тому же отдѣлу пр., въ которомъ состоятъ хлѣбное и молочное дер. (*Brosimum Galactodendron*), относится и ядовитѣйшій Аичаръ. Теплолюб. дер., нуждающийся въ очень тепломъ и влажномъ воздухѣ. 2 ч. глин. дер. и 1 ч. лите. съ добавленіемъ песку. Размнож. трудно черенками изъ бокового роста.

**А. индиза** (*A. indica*, глубоко-разрѣзанной). Настоящее хлѣбное дерево. Ос. Ю. Океана. Лл. глубоко-разрѣзанные, длиною въ 2—3 ф. **А. Каннони** (*A. Cannoni*, Каннона). О. Товарищества. Лл. красно-бронзоваго цв. съ ярко-краснымъ черешкомъ и сред. жилкой. 7 ф.

**АРТРОПОДИУМЪ** (*Arthropodium*). *Arthron*—сочлененіе и *pous*—нога; по сочлененнымъ цв. почкамъ. С. лилейныхъ.

(8) Австралія, Нов. Зеландія, Нов. Каледонія. Оранж. трав. многол. пр., схожая съ Антерикумъ. Глин. дерн. съ торф.; дѣленіемъ и сѣменами.

**А. нео-каледоникумъ** (*A. neo-caledonicum*, новокаледонскій). Новая Каледонія. Цв. мелкіе, бѣлые, въ маѣ 1½ ф. **А. паникуллатумъ** (*A. paniculatum*, метельчатая). Нов. Южн. Валлисъ, Цв. бѣлые, въ маѣ. 3 ф. **А. пѣндулумъ** (*A. pendulum*, пониклый). Австралія. Цв. бѣлые, съ іюня по августъ. 1½ ф.

**АРТРОСТЕММА** (*Arthrostemma*). *Arthron*—суставъ, *stemon*—тычинка, по тычинкамъ со связникомъ. С. черноустовыхъ. (6). Южн. Америка. Тепл. и оранж. куст. пр. Сѣмь глин. дерн. съ торф. и пескомъ. Черенками съ апрѣля по августъ, изъ боковыхъ побѣговъ, въ песокъ, подъ стекломъ.

**А. верзиколюръ** (*A. versicolor*, разноцвѣтная). Бразилія. Цв. сначала бѣлые, потомъ розовые, въ сентябрѣ. 1 ф. Теплолюб. **А. нитида** (*A. nitida*, гладко-листая) Буеносъ-Айресъ. Цв. лиловые, въ іюнь. 2—3 ф. Оранж. **А. фразиле** (*A. fragile*, ломкая). Мексика. Цв. розовые, въ июль. 3 ф. Тепл.

**АРУМЪ** (*Arum*). Названіе, по всему вѣроятію, египетскаго происхожденія. С. ароидей. (20). Европа, Зап. Азія, Афганистанъ. Теплолюб., оранж. и воздушн. многол. пр. Сильная смѣсь глин. дерн. съ перегноемъ или листов. и нѣкот. количествомъ песку. Въ время развитія влажное содержаніе. Сѣменами и дѣленіемъ, обычно послѣднимъ, передъ началомъ роста.

**А. дракункулусъ** (*A. dracunculus*). *Драконникъ*. Юж. Европа. Чехолъ ланцетовидный, коралловый, въ июль. Лл. стоповидные. 3 ф. **А. италікумъ** (*A. italicum*, италіанскій). О. Ламанша. Чехолъ зеленоватый, весной, лл. стрѣловидные. 9 д. до 2 ф. Разновидность *мармората* (*marmorata*) имѣетъ пестрые лл. **А. палестинумъ** (*A. palaestinum*, изъ Палестины). Иерусалимъ. Чехолъ пурпуровый снаружи, черный внутри, въ маѣ. Лл. копьевидные. 12—18 д. **А. пробосцидѣумъ** (*A. proboscideum*, хоботковый). Южн. Европа. Чехолъ зелено-пурпуровый съ хвостомъ, въ маѣ; лл. сердцевидно-овальные. 6 д. **А. тенуифоліумъ** (*A. tenuifolium*, узколистный). Юж. Европа. Чехолъ бѣлый, въ апрѣль. Лл. линейно-ланцетовидные. 1 ф.

**АРУНДИНАРИЯ** (*Arundinaria*). *Arundo*—тростникъ. С. злаковъ. (24). Азія, Америка, Гималай, Японія. Кустистыя трав. пр. Глубокая, сильная земля; обильная поливка, размноженіе дѣленіемъ корней.

**А. фальката** (*A. falcata*, серповидная). Индія. Стебли вѣтвистые, лл. линейно-лан-

цетовидные, остроколючные. 3—6 д. Сил. *Бамбуза грацилисъ* (*Bambusa gracilis*).

**АРУНДО** (*Arundo*). Происхожденіе названія неясное. С. злаковъ. (7). Средиземное побережье, Остиндія, Америка, Новая Зеландія. Выносливыя или полувыносливыя трав. пр. Всякая садовая. Сѣменами или дѣленіемъ, то и другое весной.

**А. Донаксъ** (*A. Donax*). *Тростникъ-трубка*. Юж. Европа. Цв. красноватые, потомъ бѣлыя, осенью. Лл. ланцетовидные, остроколючные. 12 ф. У разновидности *верзиколюръ* (*versicolor*) лл. съ бѣлыми полосками. **А. конспікуа** (*A. conspurca*, поразительно красивое). Новая Зеландія. Цв. серебристо-бѣлые. Лл. узкіе, кожистые. 3—8 и даже 12 ф.

**АРХЕГОНИЙ**. Часть имѣющая значеніе пестика у тайноцвѣтныхъ.

**АРШИНЪ**. Погонная мѣра: 4 четверти по 4 вершка; треть сажени; 2½ рус. или англ. фута; 0,711 метра.

**АСИСТАЗИЯ** (*Asystasia*). *А*—отрицаніе и *stachys*—колось, по особености цвѣторасположенія. С. акантовыхъ. (20). Троп. и Южн. Америка, Остиндія, Малайскій архип. Теплолюб. куст. Черенками изъ молод. роста весной, въ песокъ, на сильно нагрѣтомъ грунтѣ, подъ стекломъ. Глин. дер. съ торф. и пескомъ.

**А. виолѣца** (*A. violacea*, фиолетовая). Индія. Цв. пурпурные съ бѣлыми полосками; 1—2 ф. **А. макрофилля** (*A. macrophylla*, крупнолистная). Фернандо-По. Цв. двугубые, розовые снаружи, почти бѣлые внутри, въ июль. 8—20 ф. **А. сканденсъ** (*A. scandens*, лазящая). Сьерра-Леоне. Цв. мѣдно-бѣлые, въ июль. 6 ф.

**АСКЛЕПІАСЪ** (*Asclepias*). *Эскулапійс* (*Эскулапъ*). С. ласточкинковыхъ. (60). Сѣв. и Юж. Америка, Африка. Трав. и полукуст. пр. Оранж. и тепл. виды нуждаются въ волокн. глинисто-дерн. и лист. Черенками весной, въ теплѣ, подъ стекломъ; пересаживаются часто. Сѣмена высѣваются весной, въ горшки.

**А. акумината** (*A. acuminata*, остроколючный). Нов. Джерсей. Цв. красные съ бѣлымъ, въ июль. 2 ф. Травяни. возд. **А. амѣна** (*A. amoena*, красивый). Нов. Англія. Цв. пурпуровые, въ июль. 3 ф. Трав. возд. **А. Дугласіи** (*A. Douglasii*, Дугласовъ). Запад. Америка. Цв. лилово-пурпурные, душистые, съ іюля до сентября. 2—3 ф. Воздух. **А. инкарната** (*A. incarnata*, тѣлеснаго цвѣта). Канада. Цв. красные, въ июль. 2 ф. Воздух. **А. курассавика** (*A. curassavica*, курассавскій). Троп. Америка. Цв. красно-оранжевые, въ июль. 1—3 ф. Теплолюб. **А. сиріака** (*A. syriaca*, сирійскій). *Ласточкинъ*. С. Америка. Цв. блѣдно-пурпуровые, въ июль. 3—4 ф. Возд. Сил. *А.*

*корнѣти* (*A. cornuti*). *А. тубероза* (*A. tuberosa*, клубневая). С. Америка. Цв. ярко-оранжевые, въ іюль до сентября. 1—2 ф. Воздух.

**АСКОГОНЪ** или **КАРПОГОНЪ**. Кѣлочка гриба, развивающаяся въ плодоспору.

**АСОРТИМЕНТЪ**. Подборъ. Выборъ. Собрание сортовъ.

**АСПАЗІЯ** (*Aspasia*). *Aspasia*—обнимать; столбецъ обнять губой. С. орхидей. (6). Троп. Америка. Тепл. эпифитъ. Въ корзинкахъ съ торф. мохомъ, торф., битыми черенками и др. углемъ. Зимой—довольно сухо. Темп. зимой 12 до 15, лѣтомъ 15—22°. Дѣленіемъ.

**А. варіегата** (*A. variegata*, разноцвѣтная). Панама. Цв. зеленоватыя съ желтовато-красными пятнышками, въ февралѣ. 9 д. **А. люната** (*A. lunata*, луневидная). Рио-Жанейро. Цв. зеленые, съ бѣлымъ и коричневымъ, въ февралѣ. 1 ф. **А. пиліонацеа** (*A. papilionacea*, мотыльковая). Коста-Рика. Цв. желтоватые съ коричневыми полосками. 9 д. **А. пситтацина** (*A. psittacina*, попугайная). Эквадоръ. Цв. зеленоватые съ коричневыми полосками. **А. эпидендройдесъ** (*A. epidendroides*, похожая на эпидендрумъ). Панама. Цв. желтоватые, въ февралѣ. 1 ф.

**АСПАЛАТУСЪ** (*Aspalathus*). *А*—частица отрицанія *исрао*—извлекать; иглы извлекаются трудно изъ тѣла. С. бобовыхъ. (150). Южн. Африка. Оранж. куст. и полукуст. пр. Глин. дерн. съ торф. Черенками въ апрѣль изъ полувызрѣвшей древесины, въ песокъ, не сыро, потому что загниваютъ. Темп. зимой 4—6°, лѣтомъ 10—15°.

**А. афринисъ** (*A. affinis*, близкій). М. Д. Над. Цв. желтые, въ июль. 3 ф. Куст.

**АСПАРАГУСЪ** (*Asparagus*). *А*—сильный и *sparasso*—рвать, по сильнымъ колючкамъ нѣкот. видовъ. С. лилейныхъ. (100). Жаркія и укр. страны. Тепл., оранж. и вынос. трав. или куст. пр. Выносливыя разн. сѣменами и нуждаются въ сильной глин. дерн. землѣ; тепл. и оранж.—дѣленіемъ и растутъ лучше в песчанисто-дерн. съ торф.

**А. Бруссонети** (*A. Broussonetii*, Бруссонет). Канар. Ос. Цв. мелкіе, дающіе красныя ягоды. Цѣнное оранж. р. 10 ф. **А. виргатусъ** (*A. virgatus*, дающій побѣги). Ю. Африка. Замѣчательное перистое р. 5 ф. Оранж. **А. официналь** (*A. officinalis*, аптечная). *Спаржа*. Зап. Россія. Цв. зеленоватые, въ августѣ. Разводится въ садахъ для употребленія въ пищу молодыхъ стеблей; съ этою цѣлью выгоняется въ огрѣваемыхъ (паровомъ и др. способомъ) воздушн. грядахъ. **А. плюмбозусъ** (*A. plu-*



mosus, перистая). Ю. Африка. Изящное цвѣлющееся теплич. р. Цв. бѣлые, весной. Имѣть разновидность *nanus* (nanus). А. **сканденс** (A. scandens, цыкал). Мысь Д. Н. Красное оранж. р. съ лл. похожими на хвойныя иглы.

**АСПЕРУЛЯ (Asperula).** *Asper* — жесткий, по листьямъ. С. маревыхъ. (80). Европа, Зап. Азия, Австралия. Преимущественно выносливыя трав. или куст. рр. Дѣленіемъ весной. Сѣменами.

А. **лонгифлора** (A. longiflora, длиннолистая). Венгрія. Цв. желтоватые внутри, красноватые снаружи, лѣтомъ. 6 д. А. **монтава** (A. montana, горная). Венгрія. Цв. малиновые, въ июль—июль. 6—8 д. А. **одората** (A. odorata, пахучая). Душистая *смола*. Сред. Россія. Цв. бѣлые, въ маѣ—июнь. 6—12 д. Свѣжее р. не пахнетъ, но высохнувъ издаетъ запахъ свѣже-скопченнаго сѣна, — пахучаго колоска. А. **ориенталис** (A. orientalis, восточная). Кавказъ. Цв. голубые, лѣтомъ. 1 ф. Сип. А. **азуреа-сетоза** (A. azurea-setosa).

**АСПИДИСТРА (Aspidistra).** *Aspidi-* — маленький круглый щитъ; по цв. С. лилейныхъ. (3). Гималай, Китай, Японія. Оранж. многолѣт. листь. рр. Почти всякая, но лучше глини. дерн. съ листь. и пескомъ. Отпрысками. Темп. 12—19°. лѣтомъ и 8—12° зимой.

А. **элатиоръ** (A. elatior, высокая). Японія. Лл. большіе, продолговатые. Р. безстебельное. 1—2 ф. Разновид. *variegata* (variegata) имѣть лл. съ бѣлыми полосками.

**АСПИДИУМЪ (Aspidium).** *Aspidi-* — щитъ, по оберткѣ. С. папоротниковъ. (400). Европа, Азия, Африка, Америка, Австралія. Воздушныя, оранж. и теплич. рр. Послѣд. не ниже 12° зимой. Песчанисто-глини. дерн. Посѣвомъ и обыкновенно дѣленіемъ.

А. **микронатумъ** (A. micronatum, острокопечный). Вестиндія. Ваи длин. до 18 д., шир. до 2 д., перистыя. Тепл. и оранж. А. **триангулумъ** (A. triangulum, трехгранный). Вестиндія. Ваи длин. до 3 ф., шир. до 1 ф., перистыя. Тепл. и оранж. А. **фалькатумъ** (A. falcatum, серповидный). Японія, Китай, Гималай. Ваи длин. до 2 ф., шир. до 9, перистыя.

**АСПЛЕНИУМЪ (Asplenium).** А — частица отрицанія и *splen* — печень, по врачевнымъ свойствамъ. С. папоротниковъ. (300). Повсемѣстно. шару. Воздушн., оранж. и тепл. рр. Тропич. пущаюся въ смѣси изъ торф., глини. дерн. и песку, прочіе — волокни. торф. и песку. Посѣвомъ и дѣленіемъ.

А. **Беланжері** (A. Belangeri, Беланже). Малайск. полуост. Ваи длинной до 1½ ф., шир. до 3 д., двуперистыя. Тепл. А. **буль-**

**биферумъ** (A. bulbiferum, дающій луковички). Нов. Зеландія. Ваи дл. 2 ф., шир. 8—12 д., перистыя. Оранж. А. **вивипарумъ** (A. viviparum, живо-рождающій). О. Маврикія. Ваи длин. до 2 ф., шир. до 8 д., перистыя. Тепл. А. **лазерпитифолиумъ** (A. laserpitifolium, съ лл. какъ у Лазерпитія). С. Австралія. Полинезія. Ваи длин. 4 ф. шир. 1½ ф., перистыя. Оранж. А. **нидусъ** (A. nidus, гнѣздомъ). Индія. Ваи до 4 ф., длин., и до 8 шир., широко-ланцетовидныя. Тепл. А. **фрагрансъ** (A. fragrans, душистый). Троп. Америка. Ваи длин. до 9 д., шир. до 6 д., трехперистыя. Тепл. А. **фуркатумъ** (fucatum, развилостый). Тропич. на обонхъ полушаріяхъ. Ваи дл. 1½ ф., шир. 6 д., перистыя. Теплич. А. **эбенумъ** (A. ebenum, съ бѣлыми черенками). Ваи длин. до 1½ ф., шир. 3 д., перистыя. Оранж.

**АСТАРТЕА (Astartea).** *Astartea* — одно изъ именъ Венеры. С. миртовыхъ. (3). Австралія. Оранж. куст. рр. Глини. дерн. съ торф., лист. и пескомъ. Черенки изъ молодого роста прирастаютъ въ умѣренномъ теплѣ, въ пескѣ, подъ стекломъ.

А. **фасцикулярисъ** (A. fascicularis, пучечная). Зап. Австралія, Цв. бѣлые, въ маѣ. 6—9 ф.

**АСТРА КИТАЙСКАЯ.** См. Каль-листефусъ.

**АСТРАГАЛЮСТЬ (Astragalus).** Древніе Греки называли такъ какое то кустарное р. С. бобовыхъ. (500—600). По всей земной поверхности, преимущественно же на Востока. Травяни. и полукуст. рр. Не влажная, легкая. Сѣменами и черенками, послѣдними надежнѣе, п. ч. рр. не любятъ пересадки.

А. **вульпинусъ** (A. vulpinus, дикій). Кавказъ. Цв. желтые, въ июль. 2—3 ф. А. **адсургенсъ** (A. adsurgens, приподымающійся). Сибирь. Цв. сине-пурпуровые, въ июль. А. **аустриакусъ** (A. austriacus, австрийскій). Ю. Европа. Цв. голубые съ пурпуровыми, въ маѣ. Р. распростертое. А. **галегиформисъ** (A. galegiformis, похожій на Galega). Сибирь. Цв. желтые, въ июль. 3—5 ф. А. **лейкофиллюсъ** (A. leucophyllus, бѣлолистный). С. Америка. Цв. бѣдно-желтые, въ июль—августъ. 2—3 ф. А. **максимумъ** (A. maximum, большой). Кавказъ. Цв. желтые, въ июль. 2—3 ф. А. **монспессуланусъ** (A. monspessulanus, изъ Монпелье). Ю. Европа. Цв. пурпуровые, въ июль. А. **онобрихйодесъ** (A. onobrichioides, похожій на Онобрихисъ). Персія. Цв. пурпуровые, въ июль. 9—12 д. А. **паннозусъ** (A. pannosus, пушистый). Сибирь. Цв. розовые, въ июль. 6—9 д. А. **суджкатусъ** (A. sulcatus, бороздчатый). Сибирь. Цв. свѣтло-фіолетовые, въ июль.

2—3 ф. А. **трагаканта** (A. tragacantha, съ крупными иглами). Левантъ. Цв. свѣтло-фіолетовые, въ июль. 1½—3 ф.

**АСТРАПЕА (Astrapea).** *Astrape* — блескъ; по яркости цв. С. стеркулиевыхъ. Теплич. дер. Глини. дерн. съ торф.; сильная поливка, или постановка въ поддонникъ съ водой. Черенками молодого роста, въ упомянутомъ составѣ съ пескомъ, подъ стекломъ. Темп. лѣтомъ 13—24, зимой 8—10°.

А. **Вальхихи** (A. Wallichii, Валиха). Мадагаскаръ. Цв. шарлаховые, въ июль. 30 ф. Чрезвычайно изящное р.

**АСТРАНЦІЯ (Astrantia).** *Astron-* — звѣзда, *anti* (въ соединеніи) подобный; по двѣторасположенію. С. зонтичныхъ. (5). Европа, Зап. Азия. Многол. трав. рр. Обычн. садовая. Дѣленіемъ корня осенью или весной.

А. **каролиніана** (A. caroliniana, каролинская). Каролина. Цв. бѣлые, въ маѣ. 6—12 д. А. **майоръ** (A. major, больша). Европа. Цв. розоватые, въ маѣ. 1—2 ф. А. **хельлеборифолия** (A. helleborifolia, съ лл. Хеллеборуса). Кавказъ. Цв. малиновые, въ июль. 1—2 ф.

**АСТЕРАКАНТА (Asteracantha).** *Aster* — звѣзда а *acantha* — игла, по расположенію послѣднихъ. С. акантовыхъ. Оранж. многол. трав. рр. Сѣменами въ августѣ и черенками весной. Глини. дер. Темп. зимой 3 до 5°.

А. **лонгифолия** (A. longifolia, длиннолистая). Индія. Цв. желтые, въ июль. 2 ф.

**АСТЕЛМА (Astelma).** А — част. отрицанія, *stelma* — вѣнецъ, по плоду. С. сложноцвѣтныхъ. Оранж. куст. рр. съ Миса Д. Н. Волоки. торф. съ лист. и пескомъ, при хорошемъ дренажѣ, съ ½ черенковъ; поливка осторожная, помѣщеніе у свѣта, обильное провѣтриваніе. Сѣменами въ умѣр. теплѣ.

А. **экзиміумъ** (A. eximium, отличный). Цв. головки пурпуровыя, съ мая по июль. 1½ ф.

**АСТЕРЪ (Aster).** *Aster* — звѣзда. С. сложноцвѣтныхъ. (200—350). Сѣв. полушаріе, Сѣв. Америка. Воздушн. и оранж. рр. Сѣменами весной, дѣленіемъ корней осенью. Торф. съ лист. и глини. дерн. Черенками — въ пескѣ, въ умѣренномъ теплѣ, подъ стекломъ.

А. **альпінусъ** (A. alpinus, Альпійскій). Ю. Европа. Цв. пурпуровыя, въ июль. 6—9 д., у разновидности *albus* (albus) — цв. бѣлые. А. **амеллюсъ** (A. amellus). *Голубая ромашка*. Италія. Цв. головки пурпуровыя, въ августѣ. 2 ф. Разнов. *бессарабикусъ* (bessarabiensis), съ болѣе крупными головками, одна изъ самыхъ лучшихъ

формъ. А. **верзиколоръ** (A. versicolor, разноцвѣтная). С. Америка. Цв. головки бѣлыя, перемежающіяся въ красныя, въ августѣ. 3 ф. А. **грандифлорусъ** (A. grandiflorus, крупноцвѣтный). С. Америка. Цв. головки пурпуровыя, въ ноябрѣ. 2 ф. А. **кордифолиусъ** (A. cordifolius, съ сердцевидными лл.). С. Америка. Цв. головки голубыя, въ июль. 2 ф. А. **мультифлорусъ** (A. multiflorus, многоцвѣтный). С. Америка. Цв. головки бѣлыя, мелкія, въ августѣ. 3 ф. А. **нове-англие** (A. novae-Angliae, изъ Нов. Англіи). С. Америка. Цв. головки пурпуровыя, въ сентябрѣ, 6 ф. А. **нове-белгій (A. novae-Belgii, нью-йоркская). С. Америка. Цв. головки бѣдно-голубыя, въ сентябрѣ. 4 ф. А. **пендулюсъ** (A. pendulus, пониклая). С. Америка. Цв. головки вычаль бѣлыя, потомъ розовыя. 2 ф. А. **пиренеусъ** (A. pyrenaicus, пиренейскій). Пиреней. Цв. головки сине-лиловыя, въ июль. 1—1½ ф. А. **Ривезіи** (A. Reevesii, Ривеса). С. Америка. Цв. головки бѣлыя, осенью. 9—12 д. А. **спуриусъ** (A. spurius, ложная). С. Америка. Цв. головки пурпуровыя, крупныя, въ сентябрѣ. 4 ф. А. **Традесканти** (A. Tradescanti, Традесканта). С. Америка. Цв. головки бѣлыя, въ августѣ. 3 ф. А. **флорибундусъ** (A. floribundus, многоцвѣтный). С. Америка. Цв. головки лилово-пурпуровыя. 4 ф.**

**АСТЕФАНУСЪ (Astephanus).** А — частица отрицанія и *stephanos* — вѣнецъ. С. ласточниковыхъ. Оранж. вьющіяся рр. съ М. Д. Н. Волоки. торф. съ листов. и глини. дерн. поровну. Черенки — въ пескѣ, въ умѣренномъ теплѣ. Дѣленіемъ.

А. **трифолиусъ** (A. trifolius, трехлиственный). Цв. бѣлые, въ июль.

**АСТИЛЬБЕ (Astilbe).** А — частица отриц., *stilbe* — красота, по невзрачности цв. нѣкоторыхъ видовъ. С. камнеломковыхъ. (6). Гималай, Японія, Ява, Сѣв. Америка. Вѣтвистыя трав. мног. рр. Обыкновенная садовая, мѣсто нѣсколько влажное. Дѣленіемъ весной рано. Близки къ Спирея.

А. **ривуларисъ** (A. rivularis, поручейная). Непаль. Цв. желтоватые, поздно лѣтомъ. 3 ф. А. **рѣбра** (A. rubra, красная). Индія. Цв. розовые, поздно лѣтомъ или осенью. 4—6 ф. А. **Тунберга** (A. Thunbergi, Тунберга). Японія. Цв. мелкіе бѣлые, въ маѣ. 1½ ф. Употребляется для выгонки въ цвѣтъ. А. **японика** (A. japonica, японская). Японія. Цв. мелкіе бѣлые, въ маѣ. 1—2 ф. Разводитъ также въ горникахъ для ранней выгонки. Сип. *Спирея барбатана*, *С. японика*, *Хотѣя японика* (Spiraea barbata, S. japonica, Hoteia japonica). Разновидность *variegata* (variegata) имѣть листья непестренныя желтыми.

**АСТРОКАРИУМЪ (Astrocaryum).**



*Astron*—звезда, *karyon*—плод, по расположению плода. С. пальм. (30). Темп. пр. Троп. Америка. Теперь назыв. *Феникофорум*. Пальмы близки к *Socos*.  $\frac{1}{2}$  глини, дерн. с  $\frac{1}{2}$  раст. перегной. Поливка обильная. Семенами весной, в нагретом грунте, или отпрысками. Темп. летом 15—19°, зимой 10—12°.

**А. аргентеум** (*A. argenteum*, серебристый). Колумбия. Лл. дугой, перистые, клиновидные, с белой нижней стороной. **А. филаре** (*A. filare*, питочный). Колумбия. Лл. пряморослые, с маленькими чешуйками на верхней и нижней сторонах.

**АСТРОЛОМА** (*Astroloma*). *Astron*—звезда, *loma*—бахрома, по краю вичника. С. знаменитых (18). Австралия. Оранжевый куст. Смесь поровну песку, глины, дерна и торфа; хороший дренаж. Молодыми черенками в песок, в оранж., под стеклом. Темп. зимой 4—7°.

**А. дентикулятум** (*A. denticulatum*, зубчатый). Австралия. Цв. бледно-красные, в мае до июля. 1 ф. **А. хумифузум** (*A. humifusum*, стелющийся). Австралия. Цв. шарлаховые, в мае—июнь. 1 ф.

**АССИМИЛИРОВАТЬ**. Ассимиляция. Усвоить. Усвоение, превращение.

**АССОНИЯ** (*Assonia*). Игнациус де Ассо (*Asso*)—испанский ботаник. С. навозниковых. Темп. дер. Всякая, сильная, или смесь глины, дерна, с торфом. Черенками, в сильном тепле, в песок, под стеклом.

**А. вибурнойдес** (*A. viburnoides*, с лл. калины). Бурбон. Цв. белые. 10—20 ф.

**А. погульня** (*A. porulnea*, с лл. тополя). О. Бурбон. Цв. белые, в июнь. 10—20 ф.

**АСФАЛЬТ**. Густая горная смола.

**АСФОДЕЛИНЕ** (*Asphodeline*). С. лилейных. (14). Средиземное побережье, Восток. Отличаются от *Asphodelus* прямыми стеблями, покрытыми лл. Делением. Обыкновенная садовая.

**А. литеа** (*lutea*, желтое). Сицилия. Цв. желтые, пахучие, летом. 3—4 ф. Спн. *Asphodelus luteus* (*Asphodelus luteus*).

**АСФОДЕЛУС** (*Asphodelus*). А—частича отрицания и *sphallo*—поражать, по красоте цв. С. лилейных. (7). Средиземное побережье, Остидия, Маскаренские о-ва. Многолетние травы. пр. Песчанисто-дерн. Делением корня, весной.

**А. альбус** (*A. albus*, белый). Юж. Европа. Цв. белые, в мае. 2 ф. В умеренном климате выносливое р.

**АСЦИРУМ** (*Ascyrum*). А—част. отрицания и *skyros*—жесткий; пр. на ощупь мягкий. С. зверобойных. Трав. или полукуст. оранж. пр. Торф. с ли-

стовой и песком в равных количествах. Семенами и делением.

**А. крукс-андрее** (*A. Crux Andreae*, Андреевский крест). С. Америка. Цв. бледно-желтые, в июль. 1 ф. Полукуст.

**АТАЛАНТИЯ** (*Atalantia*). *Атаманта*—дочь Схинея сиротского. С. рутовых. (11). Троп. Азия, Китай, Австралия. Темп. куст. пр. Черенки в песок, тепле, под стеклом. Глин. дерн. с торфиной.

**А монофилла** (*A. monophylla*, однолистная). Индия. Цв. маленькие, белые, в июль. 8 ф. Колочий куст.

**АТАМАНТА** (*Athamanta*). *Атаманта*—гора на Сицилии. С. зонтичных. (3). Европа, Зап. Азия. Оранжевый вынос. трав. многол. пр. Обыков. садовая. Делением или семенами весной.

**А. Маттиоли** (*A. Matthioli*, Маттиоли). Горы Каринтии. Цв. белые. летом Лл. как у фенхеля. 1—2 ф.

**АТАНАЗИЯ** (*Athanasia*). А—отрицание, *thanatos*—смерть; цв. иммортели. С. сложноцветных. (40). Юж. Африка. Черенками из полувызрвшаго роста, весной, в песок, под стеклом. 3 ч. глин. дерн. и 1 ч. торф. Темп. зимой 4—5°, летом 13° и выше.

**А. капитата** (*A. capitata*, головчатая). М. Д. Н. Цв. головки желтые, в марте. 1½ ф.

**АТЕРОСПЕРМА** (*Atherosperma*). *Ather*—шило и *sperma*—семя, семя с остью. С. остросемянных. (1). Повогола. оранж. дерево. Глин. дерн. пополам с торфом. Черенками в такой же з. Зимой темп. 4—5°.

**А. мошата** (*A. moschata*, мускусная). Цв. белые, в июль. 40 ф. Кора употребляется в настои, как чай.

**АТМОСФЕРА**. Окружающий воздух.

**АТРАГЕНЕ** (*Atragene*). Так у Теофраста назван *Clematis Vitalba*. С. лютиковых. Куст. цв. близки к *Clematis*, с которым теперь слиты. Черенками, в песок, под стеклом, отводкой и семенами, которая высевается весной, в тепле. Обыков. садовая.

**А. альпина** (*A. alpina*, альпийская). Горы европейские. Цв. голубые, иногда белые, в мае. Спн. *аустриака* и *сибирика* (*A. austriaca* et *A. sibirica*). **А. американа** (*A. americana*, американское). Спн. Америка. Цв. крупные, синие-пурпуровые, в мае. **А. макроретала** (*A. macroretala*, крупнолистная). Манчурия. Цв. голубые, весной.

**АТРИКСИЯ** (*Atrixia*). А—отрицание, *thrix*—волосок; цв. ложе без волосков. С. сложноцветных. Оранжевый куст. Черенками из молодого роста в песок, под стеклом. Глин. дерн. с торфом и песком. Зимн. темп. 3—5°.

**А. капензис** (*A. capensis*, с М. Д. Н.). М. Д. Н. Цв. головки ярко-малиновые, в апрель. 3 ф.

**АТРИПЛЕКС** (*Atriplex*) А—отрицание, *traphet*—питать. С. лебедовых. (100). Умер. и троп. страны. Непривлекательны пр., которые в садоводстве не имеют значения, кроме.

**А. хортензис** (*A. hortensis*, садовый). *Лебеда*. Монголия. Однол. р., замещающее липинуть, если брать листья молодые. Разноцветность *атро-саманеа* (*atro-sanguinea*) с красивыми лл.; р. орнаментальное в 4 ф.

**АТРОПА** (*Atropa*) *Амрона*—многол. Парка, отравляющая людей. С. пасленовых. (2). Европа, Азия. Садового значения не имеют. Трав. многол. пр.

**А. Велладонна** (*A. Belladonna*, Велладонна) *Сонная одурь*, *Красавица*. Цв. зеленые с пурпуровым, летом. 2—4 ф.

**АТРОТАКСИС** (*Atrotaxis*). *Athros*—скрученный, *taxis*—разъединение, по расположению чешуек у шишек. С. хвойных. (3). Тасмания. Древ. или куст. оранж. пр. Черенками. Называется обикн. *Артротаксис*.

**А. купрессойдес** (*A. cupressoides*, похожий на кипарис). Лл. мелкие, толстые, темнозеленые. 30 ф. **А. лясифолия** (*A. laxifolia*, с рыхлыми лл.). Лл. длинные, острые, растопыренные, как у можжевельника. 20—25 ф. Спн. *А. Донана* (*A. Doniana*). **А. селлагнойдес** (*A. selaginoides*, похожий на слага). Лл. глянцевитые, чешуйчатые. До 40 ф. Спн. *А. имбриката* (*A. imbricata*).

**АТРОФИЯ**. Недоразвитие.

**АТТАЛЕА** (*Attalea*). *Аталла*—великодушный. С. пальм. (20). Троп. Америка. Темп. пр., у которых перья вертикальные. Глин. дерн. пополам с торфом. Поливка обильная. Семенами. Темп. зимой 10—12, летом 12—21°.

**А. аминдалина** (*A. amygdalina*, с миндальным плодом). Нов. Гренада. Вая 3—6 ф. длиной. Спн. *А. пунифера* (*A. punicifera*). **А. Кохуне** (*A. Cohune*, Кохуне). Гондурас. Вая перистые, перья до 18 д. длиной. 50 ф. **А. фунифера** (*A. funifera*, веревочная). *Пассава*. Бразилия. Вая темно-зеленая; жесткая черная бахрома у влагалища идет на приготовление вичников, щеток и пр.

**АУРИЕТИЯ**. См. Обриетия

**АУДОНИЯ**. См. Одуния.

**АУКУБА** (*Aucuba*). Название японское. С. дереновых. (5). Гималай, Китай, Япония. Оранжевый куст. пр., в умеренном климате—воздушный. Всякая садовая, при содержании в горшках песчан. дерновой, сажать плотно, не давая слиш-

комь просторной посуды, иначе цветы не будут. Поливка во время роста обильная, потом ее нужно уменьшать. Семенами и черенками в песчан. земл. с прикрытием, весной и осенью.

**А. хималайка** (*A. himalaica*, гималайская). Гималай. Лл. ланцетовидные, ягоды не продолговатые. 7 ф. **А. японика** (*A. japonica*, японская). Япония. Лл. овально-ланцетовидные, бледно-зеленые с желтыми пятнами. Ягоды продолговатые. 6—10 ф. Образовала много нестролистых форм.

**АУЛАКС** (*Aulax*). *Аулакс*—бороздка, нижняя сторона лл. имеет бороздку. С. протейных. (1). Юж. Африка. Оранжевый куст. пр. Волокнистая глин. дерн. с листов. и песком, при хорошем дренаже. Черенками из вызрвшаго роста, в песчан. з., под стеклом, в оранж.

**А. пинифолия** (*A. pinifolia*, с лл. ели). Цв. желтые, в июль. 2 ф. **А. умбеллята** (*A. umbellata*, зонтичная). Цв. желтые, в июль. 2 ф.

**АУРИКУЛА**. См. Примула.

**АФЕЛЯНДРА** (*Aphelandra*). *Aphelles*—простой и *aner*—мужчина; пыльники одночленистые. С. акантовых. (50). Троп. и жаркая Америка. Темп. кустар. пр. Цветут обыкновенно осенью; чтобы продолжить цветение, можно переставить где-то в сухом воздухе; с того времени, как появятся цв. бутоны, полезно поливать жидким удобрением. По отцветении уменьшить поливку, но не допускать никогда до завядания. В это время можно держать в более сухом воздухе, при 8—10°, до марта, когда их обрезать, удалив слабые побеги вместе, а крепкие до 1—2 междоузлий или до почки старшего роста. По обрезке поливать больше и присыпать до роста, а когда появится рост—пересадить с подрезкой корня в меньшей величины горшки, когда же освоится—в большие. Летом давать влажный воздух с температурой ночью 15, а днем на 7 или 10° выше. Новый рост не укорачивают. Земля дается из равных частей волокнистой глины, дерна с торфяной и достаточным количеством песка. Черенки делаются из полувзрвшаго древесины с частицей старой, в горшках, в песок, на сильном тепле.

**А. ауранциака** (*A. aurantiaca*, оранжевая). Мексика. Цв. темно-оранжевые, в декабрь. 3 ф. Разновидности *Ремли* (*Roezlii*) отличается существенно завернутыми лл. и более бледными цв. **А. кристата** (*A. cristata*, гребенчатая). Вестиндия. Цв. шарлаховые, с августа по ноябрь. 3 ф. **А. Леопольди** (*A. Leopoldi*, Леопольда). Бразилия. Цв. желто-лимонные, в мае. **А. нитенс**



(*A. nitens*, блестящая). Колумбия. Цв. котоварные, в маѣ. 2—3 ф. **А. Портеана** (*A. Porteana*, Портеа). Бразилія. Цв. оранжевые, летомъ. 2 ф. **А. пумила** (*A. pumila*, малая). Бразилія. Цв. оранжево-пурпуровые, летомъ. 8 д. **А. пунктата** (*A. punctata*, точечная). Южная Америка. Цв. ярко-желтые, в ноябрь. **А. фасциаторъ** (*A. fascinator*, обворожительный). Новая Грешада. Цв. ярко-котоварные. 1 1/2 ф.

**АФЕЛЕКСИСЪ** (*Aphelaxis*). *A.*—частица отрицанія и *axis*—видъ. С. сложноподцвѣтныхъ. Низкорослыя куст. оранж. рр. съ „безсмертными“ цв. Хорошей волокнистой торф. 2 ч. и лисг. 1 ч. съ добавлениемъ песку и нѣкоторого количества дрѣв. угля. Пересадка въ февралѣ. Черенки—весной и летомъ изъ полувывѣрившей древесины, въ песокъ, подъ стекломъ, въ холод. оранжереѣ.

**А. хумилис** (*A. humilis* низкий). М. Доб. Над. Цв. головки пурпуровыя, въ апрѣлѣ. 2 ф. Сип. **А. макранта** (*maecantha*) или *Хелиттерумъ хумиле* (*Helipterum humile*). Имѣетъ нѣсколько разновидностей. **А. эрикоидесъ** (*A. ericoides*, похожий на верескъ). М. Д. Н. Цв. гол. бѣлые, въ апрѣлѣ. 1 ф.

**АФЕЛІЯ** (*Azelia*). Адамъ *Afzelius* (Afzelius) проф. ботаники въ Упсалѣ. С. бобовыхъ. (10). Африка, троп. Азія. Теплолюбивыя деревья. Песчанисто-дернов. Черенками, въ теплицѣ, въ песокъ, подъ закрытіемъ.

**А. африкана** (*A. fricana*, африканская). Сьерра-Леоне. Цв. красные, въ июлѣ. 30 ф.

**АХИЛЛЕЯ** (*Achillea*). Существуетъ преданіе, будто Ахиллесъ открывалъ цѣлебныя свойства этого р. С. сложноподцвѣтныхъ. (100). Сѣв. полушаріе. Многол. трав. рр. Обыкн. садовая. Дѣленіемъ корней весной, черенками и сѣменами.

**А. миллефоліумъ** (*A. millefolium*—тысячелистная). Русская гречка, тысячелистникъ. Разновидность *розеумъ* (*roseum*,—розовая) употребляется иногда въ садахъ. 1—3 ф. **А. томентозумъ** (*A. tomentosum*, пушистая). Съ желтыми цв., летомъ. 8—12 д. **А. филипендулина** (*A. filipendulina*, съ листьями какъ у Спирея филипендулы). Кавказъ. Цв. желтые въ июлѣ—сентябрѣ. 4—5 ф. Наз. также **А. эваторіумъ** (*A. eupatorium*). **А. эгиптика** (*A. aegyptiaca*, египетская). Цв. ярко-желтые. 1 1/2—2 1/2 ф.

**АФИЛЛАНТЕСЪ** (*Aphyllanthes*). *Aphyllanthes*—безлиственный и *anthos*—цвѣтокъ. С. лилейныхъ. (1). Средиземное побережье. Многолѣт. трав. р., похожее на осоку. Песчанисто-торф., солнечное положеніе и защита отъ морозовъ. Сѣменами, въ оранжереѣ и дѣленіемъ корней.

**А. монспелиэнзисъ** (*A. monspeliensis*, изъ Монпелье). Юж. Франція. Цв. темно-синими головками, въ июлѣ, л. нѣтъ.

**АХИМЕНЕСЪ** (*Achimenes*). *Chcimitano*—заблутъ; по чувствительности рр. къ холоду. С. геснеріевыхъ. (20). Тропич. Америка. Тепл. многол. рр. Клубни представляются съ феврала до марта, чтобы имѣть рр. постоянно въ цвѣту. Старую землю стряхиваютъ и клубни сажаютъ по одиночкѣ въ легкую песчанистую землю; поливаютъ вначалѣ немного. Когда клубни дадутъ ростки дюйма въ 2, пересаживаютъ въ горшки, корзинки и т. п. въ волокнистую торфяную, пополамъ съ листовою землей и съ 1/4 ч. овечьего навоза и достаточнымъ количествомъ рѣчного песку, чтобы смѣсь была разсыпчатая и сѣроватого цвѣта. Водостокъ долженъ быть хорошій; на черенки полезно положить мохъ. Горшки ставятъ поближе къ свѣту, въ сильное солнце—затѣняютъ. Поливать обильно и по временамъ жидкимъ удобрениемъ. Вытѣгивающійся ростъ прищипывать, чтобы вызвать болѣе густой и обильный цвѣтами. Къ каждому растенію ставить палочки симметрично, но такъ, чтобы не были замѣтны. Опрыскиваніе утромъ и вечеромъ водой полезно. По отцвѣтеніи поливка уменьшается, нуженъ воздухъ для вызрѣванія клубней. Когда макушки стеблей засохнутъ, горшки кладутъ набокъ въ теплое и сухомъ мѣстѣ, гдѣ температура не понижается болѣе, какъ до 8° и держатъ рр. сухо до новой пристановки. Отъ триса, научка и вшей—рр. окуриваютъ, когда совершенно сухъ ихъ листъ. Размнож.: 1) черенками въ песчанистой землѣ (торфяною пополамъ съ пескомъ), въ теплѣ; 2) листьями, втыкая въ такую-же землю какъ черенки; 4) чешуйками клубней, которые сѣютъ какъ сѣмена, и 4) сѣменами, которые мелки; земля для посѣва должна быть выровнена и предвѣрительно полита; сѣмена засыпаются слегка пескомъ; поливаются осторожно и закрываются стекломъ. Всходы разсаживаютъ, когда ихъ можно ухватить. Всѣ эти способы размноженія принимать лучше весной.

**А. грандифлора** (*A. grandiflora*—крупноподцвѣтный). Мексика; цв. крупныя фиолетовыя, въ июлѣ. 1 1/2 ф. **А. лонгифлора** (*A. longiflora*—длинноподцвѣтный). Гватемала. Цв. фиолетовые съ бѣлымъ глазкомъ, въ июлѣ и августѣ. 1 ф. **А. патенсъ** (*A. patens*—попныый). Мексика. Цв. голубовато-фиолетовые, въ июлѣ. 1 ф.

Эти три вида дали многочисленныя помѣси, которыя обычно и воспитываются въ садахъ.

**АЦАЛЕЯ** (*Azalea*). *Azaleos*—сухой,

безплодный, по мѣсту произрастанія. С. вересковыхъ. Въ садовомъ отношеніи дѣлать: на выносимыя—понтійскія и оранжерейныя—индійскія, —*Ацалея понтіка* и *A. индика*. Черныя всѣ съ опадающими лл., вторыя, за исключеніемъ одного вида *скалмита*, съ остающимися на зиму. Размн. понтійскія—отводкой, летомъ и осенью, и нуждаются въ песчан. торф., а индійскія въ глини. дерн съ торф. Индійскія разводять отъ сѣмянъ и черенковъ изъ крѣпкого, но неперезрѣлаго роста, въ песокъ, подъ стекломъ. Темп. летомъ 13—20, зимой 6—10°. И тѣ, и другія ацалеи образовали много помѣсей, и тѣ и другія способны къ ранней выгонкѣ въ цвѣтъ.

#### а) Понтійскія ацалеи.

**А. арборесценсъ** (*A. arborescens*, древовидная). Пенсильванія. Цв. крупныя, красноватые, въ маѣ. 10—20 ф. **А. бальзаминифлора** (*A. balsaminiflora*). Японія. Цв. яркіе шарлахово-красные **А. вискоза** (*A. viscosa*, липкая). С. Америка. Цв. бѣлые, пахучіе, въ июлѣ. 2 ф. У разновидностей *нитиды* (*nitida*) цв. съ краснымъ оттикомъ, въ апрѣлѣ. **А. календуляцеа** (*A. calendulacea*, похожая на погонки). Пенсильванія до Каролины. Цв. желтые, оранжевые, красные и красно-бронзовые, въ июлѣ. 10—15 ф. **А. ледифолия** (*A. ledifolia*, съ лл. баговинки). Китай. Цв. чисто бѣлые, въ мартѣ 2—6 ф. **А. нудифлора** (*A. nudiflora*, съ голыми цв.). С. Америка. Цв. разной окраски. Образовали съ календуляцеа, понтіка и вискоза весьма много помѣсей. **А. понтіка** (*A. pontica*, понтійская). Кавказъ. Левантъ. Также имѣетъ чрезвычайно много помѣсей съ цв. разныхъ окрасокъ и притомъ неосатыхъ. **А. специоза** (*A. speciosa*, отъ индѣя). С. Америка. Цв. шарлаховые и оранжевые, въ маѣ. 3—4 ф. **А. хиспида** (*A. hispida*, колючая). Нью-Йоркъ. Цв. бѣлые съ краснымъ ободкомъ, въ июлѣ. 10 ф.

#### б) Индійскія ацалеи.

**А. амѣна** (*A. amena*, изящная). Китай. Цв. почти колокольчатые, ярко-карминные. 1 ф. **А. индика** (*A. indica*, индѣя). Китай. Цв. бѣлые. 3—5 ф. **А. синензисъ** (*A. sinensis*, китайская). Китай. Японія. Цв. огненно-красные, въ маѣ. 3—4 ф.

Всѣ названныя виды образовали и продолжаютъ образовывать гибриды и уклоненія съ безчисленнымъ множествомъ разнообразно окрашенныхъ цвѣтовъ.

**АЦАРА** или **АЗАРА** (*Azara*). *Azara* (*Azara*)—испанецъ, покровительствовавшій ботаникѣ. С. биксовыхъ. (12). Чили. Оранж. куст. рр. съ душистыми цв. Глини. дерн. съ торф. и пескомъ.

Черенками изъ вызрѣвшего роста, въ песокъ, подъ стекломъ, на умеренномъ теплѣ.

**А. дентата** (*A. dentata*, зубчатая). Цв. желтые, въ июлѣ. 12 ф. **А. интегрифолия** (*A. integrifolia*, съ цѣльными лл.). Цв. желтые, осенью, очень душистые. 18 ф. **А. микрофилля** (*A. microphylla*, съ мелкими лл.). Чилие и Валдивія, Чр. зеленоватые, осенью. 12 ф. Самый выносливый видъ.

**АЦЕНА** (*Acaena*). *Akaia*—колючка: на чашечкѣ и плодахъ колючки С. розовыхъ (30). Умѣренные и холодные пояса Америки, Южн. Африка. Оранж. низкія полукуст. рр. Обыкновен. садов. Черенками, дѣленіемъ и сѣменами.

**А. микрофилля** (*A. microphylla*, мелколистная). Новая Зеландія. Цв. зеленоватые, головками съ длинными красно-малиновыми нитями, летомъ. 1—2 д. Сип. *A. novae-zealandiae* (*A. Novae-Zelandiae*). **А. макрофилля** (*A. macrophylla*, многолистная). Чили. Цв. зеленоватые, головками, въ июлѣ. 6 до 1 ф.

**АЦЕРАСЪ** (*Aceras*). *A.*—безъ и *keras*—рогъ; у губы цвѣтка нѣтъ шпорцы. С. орхидей. (1). Европа. С. Африка.

**А. антропифора** (*A. anthropophora*—песущій человека). Цвѣтокъ походитъ на висящаго человека. Цв. зеленоватые, губа съ красной каймой, въ июлѣ. 1 ф.

**АЦЕРАЦИУМЪ** (*Aceratium*). *A.*—безъ и *keras*—рогъ, у тычинокъ нѣтъ отростковъ. С. липовыхъ. (1). Амбонна.

**А. оппозицифоліумъ** (*A. oppositifolium*, съ супротивными лл.). Тепл. дрѣв. р. Цв. бѣлые, въ июлѣ. 20 ф.

**АЦЕРЪ** (*Acer*). **КЛЕНЪ**. *Acer*—твердый и острый. С. мыловниковыхъ. (50). Европа, Сѣв. Америка, С. Азія, Гималаи. Древесн. и кустар. выносн. или оранж. рр. Хорошо дренированная, глубокая, глини. дерн. Японскія разновидности пальматумъ и японикумъ—для горшечныхъ. Сѣменами, осенью или весной, отводкой и прививкой (препм. пестролистые формы).

**А. дазикарпумъ** (*A. dasycarpum*, толстоплодный). С. Америка. 40 ф. (*A. virginianum*, *A. glutinum*, *A. tomentosum*, *A. eriocarpum*). **А. кампестре** (*A. campestre*, полевой). *Пакленокъ Чернокленина*. Европа (отъ Москвы до Кавказа), 20 ф. Имѣетъ разновидности: *аустриакумъ* (*austriacum*, австрийскій); *колышнумъ* (*collinum*, горный); *левигатумъ* (*levigatum*, мягколистный); *напумъ* (*napum*, пшавокосный); *таурикумъ* (*tauricum*, крымскій); *вариегатумъ* (*variegatum*, пестрый); *гексакарпумъ* (*hexacarpum*, пушисто-плодный). **А. макрофиллюмъ** (*A. macrophyllum*, крупнолистный). С. Калифорнія. 60 ф. **А. монспессуланумъ** (*A. monspessulanum*, изъ Монпелье). Юж. Европа. 10—20 ф.



**А. пенсильваникумъ** (*A. pensylvanicum*, пенсильванскій). С. Америка. 20 ф. (*A. striatum*, *striatum*—полосатый). **А. пиктумъ** (*A. pictum*, расписной). Умб. Азия. 15—20 ф. Имѣетъ разновидности: *variegatum* (*variegatum*, пестрый), *concinnum* (*concinnum*, смякающийся), *marmoratum* (*marmoratum*, мраморный) и *rubrum* (*rubrum*, красный). **А. платаноидесъ** (*A. platanoides*), похожий на платанъ) *Кленъ собственный*. Европа; въ Россіи почти отъ С.-Петербурга. 50 ф. Имѣетъ разновидности: *variegatum* (*variegatum*, расписной), *laciniatum* (*laciniatum*, съ разрезанными листьями) и *Schwedleri* (*Schwedleri*, Шведлеровъ). **А. псевдо-платанусъ** (*A. pseudo-platanus*, ложный платановый). *Лавръ*. Европа. Сред. Россія и южнѣе. 30—60 ф. Имѣетъ разновидности: *albo-variegata* (*albo-variegata*, бѣло-пестрый), *flavo-variegata* (*flavo-variegata*, желто-пестрый), *longifolia* (*longifolia*, длиннолистый) и *purpureum* (*purpureum*, пурпуровый). **А. рубрумъ** (*A. rubrum*, красный). Канада. 20 ф. **А. рупи-нёрвумъ** (*A. rubiginum*, съ красными жилками). Японія. **А. сахаринумъ** (*A. sacharinum*, сахарный). С. Америка. 40 ф. Изъ сока получается сахаръ. **А. татарикумъ** (*tataricum*, татарскій). *Некленъ*. Европа. Въ Россіи отъ Петербурга. 20 ф. Одно изъ первыхъ растений, распускающихся весною. Разновидность *Ginnala* (*Ginnala*)—съ листьями, у которыхъ средняя лопасть вытянута. **А. японикумъ** (*A. japonicum*, японскій). Японія. 20 ф. **А. цирцидатумъ** (*A. circutatum*, закрученный). С.-З. Америка. 5—6 ф.

**АЦИСЪ** (*Acis*). *Acis*—пастухъ сицилійскій, сынъ Фауна и нимфы Симетиды. С. амариллясовыхъ. Прем. Южн. Европа. Оранж. или полувын. маленькія луков. пр. Песков. глин. дер.

**А. аутомналисъ** (*A. autumnalis*, осенній). Португалія. Цв. бѣлые, осенью. 4—6 д. **А. грандифлорусъ** (*A. grandiflorus*, крупноцвѣтный). Пундидіа. Цв. бѣлые, крупнѣе прочихъ, въ августѣ. 6 д. **А. розеусъ** (*A. roseus*, розовый). Корейка. Цв. розовые, въ августѣ. 3 д.

**АЦИФІЛЛЯ** (*Aciphylla*). *Akis*—острие и *phyllon*—листь. С. зонтичныхъ. (20). Новая Зеландія. Австралія. Многол. полувын. трав. пр. Песков. легкая. Съ-менами или дѣленіемъ весной.

**А. Коленсои** (*A. Kolensoi*, Коленсо). Нов. Зеландія. Цв. бѣлые, лл. колоchie. 6—9 ф. **А. скварроза** (*A. squarrosa*, жесткая). Нов. Зеландія. Колочее р., похожее на предыдущее.

**АЦИНѢТА** (*Acineta*). *Akineta*—неподвижный; губа безъ сочлененія. С. орхидей. (8). Тропич. Америка, Оранжер. эпифиты. Волоки. торф. пополамъ съ

торф. мохомъ. По окончаніи роста держать сухо.

**А. Баркери** (*A. Barkeri*, Баркера). Цв. желтые съ ярко-карминными, лѣтомъ. Р. долго остается въ красотѣ. **А. Хумбольдти** (*A. Humboldtii* Гумбольта). Колумбія. Цв. палевые, въ маѣ. Сип. *Anguloa superba* (*Anguloa superba*).

**АЦИОТИСЪ** (*Aciotis*) *Akis*—острие и *otis*—ухо; по формѣ лепестковъ. См. чернотыковыхъ. Тепл. многол. трав. пр. Глин. дерн. съ торф. и пескомъ. Черенками изъ молодого роста въ торф. землѣ, въ теплѣ, подъ прикрытіемъ.

**А. акватика** (*A. aquatica*, водяной). Ю. Америка. Цв. бѣлые, мелкіе, въ июлѣ. 6 д. до 1 ф. Горшокъ съ р. держать въ водѣ. **А. дисколоръ** (*A. discolor*, разноцвѣтный). Тринидадъ. Цв. мелкіе красные. 1 ф.

**АЮГА** (*Ajuga*). *A*—безъ и *jugon*—ядро, по чашечкѣ, которая не двугубая. С. губоцвѣтныхъ. (30). Европа. Востокъ. Большею частью многол. травяни. пр. до-вольствующіяся обыкновенной садовой землей. Размнож. посѣвомъ весною или осенью, либо дѣленіемъ.

**А. геневензисъ** (*A. genevensis*, жене-вская). Европа. Цв. розовые, голубые и бѣлые, въ маѣ. 6 д. — 1 ф. **А. ориенталис** (*A. orientalis*, восточная). В. Европа. Цв. голубые, въ маѣ. 1—1½ ф. Многолѣт. **А. пирами-далисъ** (*A. pyramidalis*, пирамидальная). *Русская букавица*. Европа. Цв. голубые или пурпуровые, въ маѣ—июлѣ. Многолѣт. 6 д. **А. репансъ** (*A. repans*, ползучий). *Жилучка*. Европа. Цв. голубые—розовые, въ маѣ. Многол. 6 д. Имѣетъ разновидности съ пестрыми и темными лл.

**БАБИАНА** (*Babiana*) *Babianer*, по голландски, значитъ обезьяна-паньянъ; мо-лодые луковичы этихъ пр. ѣдятъ обезья-ны. С. косатниковыхъ. (30). Южн. Африка съ М. Д. Н. Оранж. лук пр. Дѣтками. Песчан. торф. съ глин. дерн. Во время роста обильно поливать; во время покоя держать сухо. Посаженные въ горшки зиму держать въ простѣнкѣ или оранже-реѣ. Высаживать на лѣто на воздухъ выпустить до морозовъ и оберегать въ за-щитѣ.

**В. дистиха** (*B. disticha*, двурядная). Цв. блѣдно-голубые, съ запахомъ гіацинта, въ июлѣ—июлѣ. 6 д. **В. плихата** (*B. plicata*, складчатая). Цв. блѣдно-фіолетовые, съ запахомъ гвоздики, въ маѣ—июлѣ. Сип. **В. церулесценсъ**, **В. рефлексъ** (*B. cerulescens*, *B. reflexa*). **В. стрикта** (*B. stricta*, прямая). У цв. вѣтви. сегменты бѣлые, внутр. сине-лиловые, съ чернымъ пятномъ у основанія, въ маѣ. Имѣетъ разновидности:

*angustifolia* (*angustifolia*), цв. съ запахомъ; *villosa* (*villosa*), цв. ярко-карминные; *rubro-nigra* (*rubro-nigra*), цв. ярко-голубые, съ малиновыми основаніями; *sulcifera* (*sulcifera*), цв. желтоватые.

**БАВИНГТОНІЯ** (*Babingtonia*). Въ честь кембриджскаго ботаника Чарльса Бавингтона (*Babington*). С. миртовыхъ. (1). Оранжерейн. куст. р. Черенки изъ полувызрѣвшаго роста въ песокъ, подъ закрытіемъ. Торф. пополамъ съ глин. дерн. и съ добавленіемъ листов., сухого коровьяго навоза и песку. Зимой темпер. 6 до 8°.

**В. камфоросма** (*B. camphorosma*, съ запахомъ камфоры). Австралія. Цв. блѣдно-малиновые, лѣтомъ. 7 ф.

**БАВОЧКА**. Чешуекрылое насекомое, которое, находясь въ состояніи *гусеницы*, наноситъ вредъ растеніямъ. Бываетъ дневная, сумеречная и ночная, по вре-мени бодрствованія.

**БАВОЛЬНИКОВЫЯ** пр. (*bombaceae*). Соединены съ с. навозниковыхъ.

**БАГІЯ** (*Bahia*). Происхожденіе на-званія неизвѣстно. С. сложноцвѣтныхъ. С. Америка. Многол. трав. пр. Размнож. дѣленіемъ. Легкая, песчанистая.

**В. ляната** (*B. lanata*, пушистая). Сѣв. Америка. Цв. головки желтыя. 6—15 д.

**БАГУЛЬНИКЪ**, **БАГУНЪ**. См. Ле-думъ.

**БАДАНЪ**. См. Саксифрага.

**БАДЪЯНЪ**. См. Иланцидумъ.

**БАЗЕЛЬЯ** (*Basella*). Такъ зовется р. на Малабарѣ. С. базельевыхъ. (2). Азия, Африка. Теплич. многол. пр., не имѣющая садоваго значенія; на родинѣ, въ Индіи и въ тропич. странахъ, упо-требляются въ пищу какъ шпинатъ.

**В. альба** (*B. alba*, бѣлая). Индія. Цв. бѣлые, въ августѣ. 8 д. Хороша въ под-вѣсныхъ вазахъ.

**БАЗЕЛЬЕВЫЯ** пр. (*basellaceae*). Отдѣлъ лебедовыхъ, заключающій въ себѣ травянистыя, выходящія породы.

**БАЗИДІЯ**. Кѣточка плодоснаго слоя гриба, на верху которой развиваются обычно четыре отростка, несущіе споры. Грибы съ такимъ плодоснымъ слоемъ называются *базидіальными*.

**БАКЧА**, **БАКША**, **БАХЧА**, **БАШ-ТАНЪ**. Огородъ въ полѣ, въ которомъ разводятъ преимуществ. арузы, дыни, огурцы.

**БАКУЛОМЕТРІЯ**. Наука съемки мѣстности и измѣренія высотъ посред-ствомъ колебѣ.

**БАКТРИСЪ** (*Bactris*). *Bactron*—палка; изъ молодыхъ стволовъ дѣлаютъ

трости. С. пальмъ, (100). Троп. Америка. Теплич. пр. Съ-менами и отпрысками. Глин. дерн. съ торф. и пескомъ поровну. Темп. лѣтомъ 15—23, зимой 13°.

**В. бакулифера** (*B. baculifera*, произво-дищій трости). *Пенангъ*. Южн. Америка. Ван перистыя, длиною 2—6 ф. **В. каріотефолія** (*B. cariotetifolia*, съ лл. Коріоты). Бразилія. Ван перистыя, клиновидныя; пень 30 ф. **В. Марая** (*B. Maraja*, Марая). Ба-гін. Чехлы колоchie. 30—50 ф. **В. палли-диспина** (*B. pallidispina*, съ блѣдными плами). Сип. **В. флависпина** (*B. flavispina*).

**БАКУЛЯРІЯ** (*Bacularia*). *Baculum*—трость. С. пальмъ. Тепл. низкорослыя пр. съ вост. берега троп. Австралія.

**В. моностахія** (*B. monostachya*, съ однимъ колосомъ). Нов. южн. Валлисъ. Ван перистыя, пониклыя, длин. 6—12 д. 10 ф. Сип. *Areca monostachya* (*Areca monostachya*).

**БАКГОУЗІЯ** (*Backhousia*). Ботаникъ Джемсъ *Бакоузъ* (*Backhouse*) путеше-ствовалъ въ Австралію и Южн. Африку. С. миртовыхъ. (4). Вост. Австралія. Оранж. куст. Черенки изъ полувызрѣвшаго роста, въ апрѣлѣ, въ песокъ, подъ стекломъ. Глин. дерн. съ торф. и пес-комъ. Темпер. лѣтомъ 11 до 19°, зимой 4 до 7°.

**В. миртифолія** (*B. myrtifolia*, съ лл. мирты). Нов. южн. Валлисъ. Цв. бѣлые, въ маѣ. 16 ф.

**БАКХАРИСЪ** (*Baccharis*). *Bacchus*—Бахусъ, по винному запаху корней. С. сложноцвѣтныхъ. (250). Америка. Черенки подъ стекломъ, безъ тепла или въ теплѣ, смотря по тому, какое р.: тепл., оранж. или воздушн. Глин. дерн. съ торф.

**В. халимифоліусъ** (*B. halimifolius*, съ лл. Халимуса). С.-Ам. С. Шт. Цв. головки бѣлыя, въ июлѣ. 6—12 д.

**БАКАУТЪ**. См. Гвайкумъ.

**БАКЛАЖАНЪ**. См. Солянумъ.

**БАЛАГАНЪ**. Сарай, временное дос-точное строеніе, для хранения растений.

**БАЛЬЗАМОДЕНДРОНЪ** (*Balsamo-dendron*). *Balsamon*—бальзамъ и *dendron*—дерево. С. мѣшечковыхъ. (6). Ара-бія, троп. Африка. Тепл. ор. р. Песча-нистая дерн. съ перегноемъ. Черенки изъ зрѣлага роста, въ апрѣлѣ, подъ стек-ломъ, въ теплѣ. Темпер. лѣтомъ 13—21, зимой 10—12°.

**В. цейланикумъ** (*B. zeylanicum*, цей-лонскій). О. Цейлонъ. Цв. бѣлые. 30 ф.

**БАЛЬБИСІЯ** (*Balbisia*). Джіованни *Балбиста* *Балбисъ* (*Balbis*), проф. ботаники въ Туринѣ. С. гераниевыхъ. (1). Перу, Чили. Оранж. куст. р. Размнож.



черенками из полувызрѣвшаго роста, въ песокъ, подъ стекломъ, или сѣменами. **В. вертициллята** (*V. verticillata*, кол. чатаи). Чили. Цв. большіе желтые, осенью. 3—6 ф.

**БАЛЗАМИНОВЫЯ** pp. (*balsamiferae*). Отдѣлъ семействъ гераниевыхъ, цв. которыхъ имѣютъ большіе, клубочковые, сегменты, оканчивающіеся копическимъ шпорцемъ; наиболѣе извѣстный родъ—**Импаціенсъ**.

**БАЛЗАМИНЪ**. См. Импаціенсъ.

**БАМБУЗА** (*Bambusa*). *Bambusa*—малайское названіе. С. злаковъ. (24). Троп. Азія, троп. Америка. Оранж. и тепл. pp. Отпрысками, осенью. Сильная глин. дерн. Лѣтняя темп. 13—25, зимняя 10—13°.

**В. арундинацеа** (*V. arundinacea*, тростниковая). Индія. Стебель пряморослый въ 50—60 ф. Хотя это р. теплолюбное, но на лѣто можетъ быть высажено въ грунтъ. **В. violасценсъ** (*V. violascens*, почти фиолетовая). Китай. Стебли вѣтвистые, фиолетоваго цв. Сип. *V. nana* (*V. nana*). **В. aurea** (*V. aurea*, золотистая). Китай. Стебель тонкій, лл. менѣе сизые, чѣмъ у нана. 10 ф. **В. митисъ** (*V. mitis*, малая). Кохинхина и Японія. Стебли конусообразные, лл. темнозеленые. 40 ф. Довольно выносливый видъ. **В. нана** (*V. nana*, низкая). Индія. Теплич. видъ. Лл. ланцетовидные, сизые. 6—8 ф. Сип. *V. glauca* (*V. glauca*). **В. Рагамовскіа** (*V. Ragatowskii*, Рагамовскаго). Китай, Японія. Лл. имѣютъ пунпестую полосу. Сип. *V. tessellata* (*V. tessellata*). Выносливые другіе. **В. Симоніи** (*V. Simonii*, Симона). Китай и Японія. Лл. узкіе, иногда съ бѣлыми полосками. 10 ф. **В. стріата** (*V. striata*, полосатая). Китай. Стебель съ желтыми и зелеными полосками. 6—20 ф.

**БАНАНОВЫЯ** pp. (*musaceae*). Отдѣлъ идириныхъ pp. (*scitamineae*).

**БАНАНЪ**. См. Муза.

**БАНИСТЕРІЯ** (*Banisteria*). Миссіонеръ Джонъ *Banister* *Banister* (*Banister*)—путешествовалъ въ XVII ст. въ Виргинію, и описалъ ея pp. С. мальнигивыхъ. (60). Троп. Америка. Теплич. дрв. и куст., иногда дѣлкія pp. Глин. дерн. съ листов., торф. и пескомъ. Черенки изъ вызрѣвшаго роста, въ песокъ, подъ стекломъ и въ теплѣ.

**В. спленденсъ** (*V. splendens*, великолѣпная). Южн. Америка. Р. цѣлое. Цв. желтые. **В. фульгенсъ** (*V. fulgens*, блестящая). Вестиндія. Р. цѣлое. Цв. желтые. **В. хризифилла** (*V. chrysophylla*, золотистолестная). Бразилія. Р. цѣлое. Цв. темно-оранжевые. **В. Хумбольдтіана** (*V. Humboldtiana*, Гумбольдтова). Южн. Америка. Р. цѣлое. Цв. желтые. **В. ци-**

**лиата** (*V. ciliata*, рѣсничная). Бразилія. Р. вьющаяся. Цв. крупныя оранжевые.

**БАНКСІЯ** (*Banksia*). Сэръ Джозефъ Банксъ (*Banks*), президентъ лондонской академіи наукъ. С. протейныхъ. (46). Австралія. Оранжер. куст. pp. Сѣмена. если можно достать, сѣять точасть по полученію въ песокъ. торф. землѣ въ оранжерей; всходы разсадить отдѣльно, какъ только можно ухватить, иначе пропадутъ. Нѣкотор. виды разн. отводкой. другіе—прививкой, обычно же черенками изъ вызрѣвшаго роста, съ лл., подъ стекломъ. Песчанисто-торф. съ добавленіемъ для сильно растущихъ глин. дерн. Темп. лѣтомъ 8—15, зимой 2—6°.

**В. дриандроидесъ** (*V. dryandroides*, похожая на Дриандру). Лл. перисто-разрѣзныя почти до сред. жилки, разрывы треугольные, на нижней сторонѣ красно-коричневые. 5—6 ф. **В. кверцифолія** (*V. quercifolia*, съ дубовыми лл.). Лл. продолговатоконпидные съ глубоко-выемчатымъ краемъ. 5 ф. **В. колылина** (*V. collina*, съ холмовъ). Лл. широко-линейные, внизу серебристые. 6—8 ф. **В. окциденталисъ** (*V. occidentalis*, западная). Съ зап. берега Австраліи. Цв. желтые, довольно красныя, съ апрѣля по августъ. 5 ф. **В. спеціоза** (*V. speciosa*, отъѣнная). Лл. перисто-разсѣченные, почти до средней жилки, разрывы полукруглые, съ остриемъ на концѣ. 6 ф. **В. ѣмуля** (*V. emula*, соперничашая). Лл. линейные, продолговатые, къ основанію суживающіеся. 20 ф.

**БАПТИЗІЯ** (*Baptisia*). *Baptisia*—красить. С. бобовыхъ. (14). Сѣв. Америка. Трав. многол. pp. Глин. дерн. Дѣленіемъ и сѣменами въ парникъ.

**В. альба** (*V. alba*, бѣлая). Цв. бѣлые, въ іюль. 2 ф. **В. аустралисъ** (*V. australis*, южная). Цв. голубые, въ іюль. 4—5 ф. **В. перфоліата** (*V. perfoliata*, съ сквозными лл.). Цв. мелкіе, желтые, въ августъ. 3 ф. **В. тинкторія** (*V. tinctoria*, красильная). Цв. желтые, 2—3 ф. **В. экзальтата** (*V. exaltata*, восхитительная). Цв. темно-голубые, въ іюль. 3—4 ф.

**БАРАНЧИКИ**. См. Примула.

**БАРАВИНСКОЕ, БАРАВИНКА, БРАВИНСКОЕ**. Яблоко средней поры поспѣванія и величины, желтоватаго цвѣта съ румянцемъ; кислаго вкуса. разсмычатое; хорошо въ мочкѣ.

**БАРАНИ ТРАВА**. См. Аришка.

**БАРБАРЕЯ** (*Barbarea*). Прежде называлась *herba Barbarae*. С. крестоцвѣтныхъ. (6). По всей земной поверхности. Выносливая многол. трав. pp. Всякая садовая. Разн. черенками, отпрысками, дѣленіемъ, сѣменами.

**В. вульгарисъ** (*V. vulgaris*, обыкновенная). *Желтяница*. Въ садахъ воспитывается

только махровая, или пестролистная форма. 1½ ф.

**БАРБАРИСОВЫЯ** pp. (*berberidaceae*). Кустарники или многол. травы. pp., изъ которыхъ много красивыхъ садовыхъ. Наиболѣе извѣстныя роды—**Берберисъ**, **Эпимедиумъ** и **Пандина**.

**БАРБАЦИНІЯ** (*Barbacenia*). Маркизъ *Барбацена* (*Barbacena*)—губернаторъ въ Минасъ-Герасъ. С. амариллисовыхъ. (18). Бразилія, Венецуэла, Гвиана. Тепл. многол. трав. pp. Дѣленіемъ. Песчанисто-дерн. Темп. лѣтомъ 13—21, зимой 6—10°.

**В. вульгарисъ** (*V. vulgaris*, обыкновенная). Цв. желтые. 1½ ф. Есть форма съ пестрыми лл.

**БАРБИЕРІЯ** (*Barbieria*). *Барбье* (*Barbier*)—франц. врачъ и ботаникъ, авторъ соч. „Principes généraux de pharmacologie ou de matière médicale“. С. бобовыхъ. Южн. Америка. Тепл. куст. pp. Черенками изъ полувызрѣвшаго роста, въ песокъ, подъ стекломъ. Песчанисто-торф. Темп. лѣтомъ 16—24, зимой 8—10°.

**В. полифилла** (*V. polyphylla*, многолистная). Порто-Рика. Цв. шарлаховые. Сип. *Клиторея полифилла* (*Clitoraea polyphylla*) и *Галактія пинната* (*Galactia pinnata*).

**БАРВИНОКЪ**. См. Винка.

**БАРКЕРІЯ** (*Barkeria*). *Баркеръ* (*Barker*) славился своими орхидеями въ Вирмингемѣ. С. орхидей. Тепл. Дѣленіемъ. Волокнист. торф. съ торф. мхомъ. Темп. лѣтомъ 13—21, зимой 10—12°.

**В. меланоккаулонъ** (*V. melanocaulon*, съ черными стеблями). Коста-Рика. Цв. розово-пурпурные, въ августъ. 1 ф. Растеніе рѣдкое. **В. скиннеріа** (*V. Skinneri*, Скинера). Гватемала. Цв. темно-розовые. 1½ ф. У разновидности *супербумъ* (*superbum*) цв. темно-розовые. **В. спектабилисъ** (*V. spectabilis*, красивая). Гватемала. Цв. лилово-розовые съ бѣлой губой. **В. элегансъ** (*V. elegans*, изящная). Мексика. Цв. темно-розовые, зимой. 2 ф.

**БАРЕЛІЯ** (*Barklia*). Сэръ *Баркли* (*Barkly*)—губернаторъ въ Ю. Австраліи. С. бобовыхъ. Оранж. древесн. pp. Глин. дерн. съ листов. Сѣменами и черенками изъ полувызрѣвшаго роста, въ песокъ, подъ стекломъ, въ оранж.

**В. сирингифолія** (*V. syringifolia*, съ лл. сирени). Моретонскій заливъ. Цв. золотисто-желтые. 30 ф.

**БАРЛЕРІЯ** (*Barleria*). Франц. ботаникъ XVII ст. *Барреле* (*Barrelier*). С. акантовыхъ. (60). Азія, Африка, Америка. Теплич. куст. pp. Глин. дерн. съ торф. и перегноемъ. Черенками молодого

роста, подъ стекломъ, въ теплицѣ, въ какой-же з., съ почвеннымъ нагрѣвомъ.

**Б. Лейхтенштейніана** (*V. Leichtensteiniiana*, Лейхтенштейнова). Ю. Африка. Угловые колосы изъ прицѣпныхъ, обрѣзанныхъ книзу; все р. бѣло-пунисетов. **В. Маккеніи** (*V. Mackenii*, Макъ Кена). Наталь. Цв. пурпуровые, весной.

**БАРНАДЕЗІЯ** (*Barnadesia*). *Барнадезъ* (*Barnades*)—испанскій ботаникъ. С. сложноцвѣтныхъ. (10). Южн. Африка. Оранж. куст. pp. Торф., съ глин. дерн. и пескомъ поровну. Сѣменами въ парникъ, въ мартъ, или черенками, въ апрѣль, изъ полувызрѣвшаго роста, въ песокъ, подъ стекломъ. Темп. лѣтомъ 12—21, зимой 6—10°.

**В. розеа** (*V. rosea*, розовая). Южн. Америка. Цв. головки розовыя, въ май. 1½ ф.

**ВАРОСМА** (*Barosma*). *Барыс*—тяжелый и *осме*—запахъ, но крѣпкому запаху лл. С. рутовыхъ. (15). Южн. Африка. Низкорослая куст. pp. съ М. Д. Н. Черенками изъ полувызрѣвшаго роста, въ іюль, подъ стекломъ, въ песокъ, безъ подогреванія. Песчан.-дернов. съ торф. Темп. лѣтомъ 13, зимой 2—4°.

**В. діюка** (*V. dioica*, двудомная). Цв. пурпуровые, въ апрѣль. 1—2 ф. **В. пурхелля** (*V. pulchella*, красивая). Цв. бѣло-розовые, въ февраль. 1—3 ф. **В. сerratифолія** (*V. serratifolia*, съ зубчатыми лл.). Цв. бѣлые, въ май—іюль. 1—3 ф.

**ВАРОМЕТРЪ**. Снарядъ для измѣренія давленія атмосфернаго воздуха, а по немъ—будущей погоды, или возвышенности мѣста.

**БАРИНГТОНІЯ** (*Barringtonia*). Действъ *Баррингтонъ* (*Barrington*), членъ лондонской академіи наукъ. С. миртовыхъ. (20). Азія, Африка, Америка. Теплич. дрв. и куст. pp. Черенками съ вызрѣвшимъ ростомъ, подъ стекломъ, въ сильномо теплѣ. Глин. дерн. съ торф. Темп. зимой 12—14, лѣтомъ 17—25°.

**В. спеціоза** (*V. speciosa*, отъѣнная). Инд. архипелагъ. Цв. пурпуровые съ бѣлыми. 5—6 ф.

**БАРСКАЯ СПѢСЬ**. См. Лихнисъ.

**БАРТОНІЯ** (*Bartonia*). Д-ръ *Бартонъ* (*Barton*), американскій ботаникъ, проф. въ Филадельфіи. С. лозовыхъ. Полувыносливыя одно- и многол. трав. pp.; послѣднія на зиму относятся въ защиту отъ мороза. Однол. размнож. сѣменами, въ апрѣль, на воздухъ или въ тепловатомъ парникѣ. Песчан. дерн. съ торф.

**В. альбесценсъ** (*V. albescens*, бѣловатая). Чили. Цв. желтые, въ іюль. 1—4 ф. Многол. **В. aurea** (*V. aurea*, золотистая).



Калифорния. Цв. золотисто-желтые, в июне. 1 ф.

**ВАРХАТЦЫ.** См. Тагетесы.

**БАССИЯ** (*Bassia*). Фердинандо *Басси* (*Bassi*) — врач и директор ботанич. сада в Болоньи. С. сапотовых. (30). Остиндия, Малайский архипелаг. Тепл. дер. с млечным соком. Глн. дерн. с торф. Черенки изъ выросшего роста, в песок, под стеклом, в сильном тепл.

**Б. бутираcea** (*B. butyracea*, масляная). Непаль. Цв. желтые, в сентябре. 30 ф. **Б. латифолия** (*B. latifolia*, широколистная). Индия. Цв. желтые, в октябре, 50 ф. **Б. лонгифолия** (*B. longifolia*, длиннолистная). Малабар. Цв. желтые, в сентябре. 150 ф.

**БАТАТЬ.** См. Бататас.

**БАТАТАСЪ** (*Batatas*). Местное название. С. бьюнковых. В настоящее время этот род соединен с *Ипомеа*. Теплич. клубневые выросшиеся. Черенки изъ клубневых побегов в песок, в тепл., под стеклом. Песчанистодернов. с волокон. торф. Во время роста поливка жидким удобрением. Темпер. летом 13—24, зимой 7—10°.

**Б. биньонийдес** (*B. bignonioides*, биньонийный). Каенна. Цв. темно-пурпуровые, в июле. **Б. Каванильезии** (*B. Cavaniillesii*, Каванильезия). Цв. красноватые, в августе. Отечество — неизвестно. **Б. паникулата** (*B. paniculata*, метельчатый). Индия. Цв. крупные, пурпуровые, в июле. **Б. эдулис** (*B. edulis*, съедобный). Остиндия. Цв. белые снаружи, пурпуровые внутри. Стебель ползучий, редко выходящий. Клубень употребляется вместо картофеля и называется *Batata* или *Patata*.

**БАТЕМАННИЯ.** См. Бетмания.

**БАУЕРА** (*Bauera*). Франц *Бауер* (*Bauer*) — немецкий живописец. С. камнеломковых. (3). Умфр. Австралия, Нов. Зеландия. Оранжево-ползуч. Черенки в песчанистой з., под стеклом. Песчанодернов. с торф. Темп. летом 8—13, зимой 3—6°.

**Б. рубиоидес** (*B. rubioides*, похожий на малину). Нов. Южн. Валлис. Цв. блдно-красные или розовые. 1—2 ф. Сил. *B. рубиоидес* (*B. rubioides*).

**БАУТИНИЯ** (*Bauhinia*). Иоганн и Каспар *Баутины* (*Bauhin*) — знаменитые ботаники XVI ст. С. бобовых. (130). Тропич. страны. Теплич. куст. рр. Черенки изъ полувзросшего роста, в песок, летом, во влажной и теплой спелой атмосфере. Легкая, песчанистодернов. с торф. Темп. летом 13—23, зимой 10—13°.

**Б. variegata** (*B. variegata*, пестрая).

Малабар. Цв. красные с белыми и желтыми пятнами, в июне. 20 ф. **Б. коримбоза** (*B. corimbosa*, щитковая). Индия. Цв. малиновые, летом. Выходящий куст. **Б. наталензис** (*B. natalensis*, изъ Натали). Натали. Цв. белые, в сентябре.

**БАФИЯ** (*Baphia*). *Barthe* — краска; р. производить красящее вещество. С. бобовых. (6). Троп. Африка, Мадагаскар. Тепл. рр. Черенки в песчан. торф. Летом темп. 13—24, зимой 10—13°.

**Б. нитида** (*B. nitida*, глянцевитая). Сьерра Леоне. Цв. белые, в июне. 30 ф.

**БАШМАЧКИ.** См. Циприпедиум.

**БЕАУФОРТИЯ.** См. Бофортия.

**БЕАУМОНТИЯ.** См. Бомонтия.

**БЕАУКАРНЕА.** См. Бокарнеа.

**БЕБЕРА** (*Bœbera*). *Bœber* (*Bœber*) — нем. ботаник. С. сложноцветных. (1). Мексика. Оранжево-куст. Черенки изъ окрышного роста, под стеклом.

**Б. инкана** (*B. incana*, белесоватая). Мексика. Цв. головки золотисто-желтые. Стебли волосистые. 1½ ф.

**БЕГОНИЕВЫЕ** рр. (*begoniaceae*). Семейство, содержащее обширное количество полезных садовых растений и состоящее изъ двух только родов *Бегония* и *Бегониса*, которая еще не введена в садах.

**БЕГОНИЯ** (*Begonia*). *Begon* (*Bégon*) — французский покровитель садоводства. С. бегонийных. (360). Троп. Америка, Азия, Африка. Теплич. кустар. или полукуст. рр. с корневищем или клубнем. Многие отъ сгиба, высаживаемые как только созреют, или следуя весной. Черенки весной или осенью, предварительно обсушив в изъ, в песчан. земл., с слабым нагревом. Клубневые — делением при началъ роста; отъ зимой требуют меньше тепла на 2—5°. Глн. дернов. с песком и переносим. Темп. летом 13—17, зимой 7—10°.

**Б. акутилоба** (*B. acutiloba*, остро-лопастная). Мексика. Корневище мясистое, лл. ланцетно-сердцевид. Цв. белые, летом. **Б. альбо-кокинеа** (*B. albo-coccinea*, бело-красная). Индия. Безъ стебля. Лл. широко-овальные. Цв. ярко-красные, летом. Сил. *B. Граммия* (*B. Grammii*). **Б. амбилис** (*B. ambilis*, милолиная). Ассам. Стебель ползучий; лл. овальные; цв. розовые или белые, летом. **Б. амена** (*B. amoena*, приятная). С. Индия. Корневище клубневое. Стебли изъ. Цв. блдно-розовые, летом. Сил. *B. ерза* (*B. egera*). **Б. Беркелей** (*B. Berkeleyi*, Беркел). Клубневая. Лл. длинные; цв. розовые, зимой. Садовый гибрид. **Б. баливиензис** (*B. boliviensis*, изъ Боливии). Боливия. Клубневая. Лл. лан-

цетов., зубчатые; цв. большие шарлаховые, летом. **Б. Брюантия** (*B. Bruntii*, Брюантона). Садов. гибрид. Лл. зеленые с коричневыми оттенками; цв. белые или розовые, летом. **Б. Вейчии** (*B. Veitchii*, Вейча). Перу. Клубневая. Лл. округло-сердцевид., лопастные. Цв. красно-кишечные, летом. Один изъ видовъ, с которым образовались воспитываемые теперь в садах клубневые бегонии. **Б. Верскаффелтиана** (*B. Verschaffeltiana*, Верскаффелтиана). Гибридъ отъ *B. каролинеолия* и *B. маниката*. Лл. большие овально-лопастные, цв. розовые, зимой. **Б. геранийдес** (*B. geranioides*, гераниевообразная). Патали. Клубневая. Лл. лопастные, почковидные, зубчатые. Цв. белые, летом. **Б. гландулоза** (*B. glandulosa*, железковая). Коста-Рика. Лл. сердцевид., лопастные; цв. блдно-зеленоватые. **Б. гогоензис** (*B. gogoensis*, изъ Гого. Суматра). Лл. щитовидные, косые; цв. блдно-розовые. **Б. гумилис** (*B. humilis*, низкая). Тринидад. Лл. полусердцевид. остро-конечные; цв. белые, летом. Однолетняя. **Б. Дедалеа** (*B. Daedalea*, обожима). Мексика. Лл. большие, с рыжеватыми волосками и ренчатными краями; цв. белые с розовыми. **Б. Дрегги** (*B. Dregii*, Дрега). М. Д. Н. Лл. косовые, выш. красноватые; цв. белые, летом. **Б. Инграмми** (*B. Ingramii*, Инграма). Садов. гибридъ отъ *B. фуксийдес* и *B. нитида*. Цв. зимой. **Б. импералис** (*B. imperialis*, императорская). Мексика. Лл. большие, широкие, сердцевидные, жесткие, темно-лиловые; цв. белые. **Б. инкарната** (*B. incarnata*, тлесная). Мексика. Лл. косово-сердцевид., остроконечные, зубчатые; цв. большие, красные, зимой. **Б. Кларки** (*B. Clarkii*, Кларка). Перу и Боливия. Клубневая. Лл. косо-сердцевидные, зубчатые. Цв. ярко-красные, летом. **Б. кокинеа** (*B. coccinea*, красная). Боливия. Кустарная. Лл. овальные; цв. красные, летом. **Б. коридеа** (*B. coriacea*, кожистая). Клубневая. Боливия. Лл. почковидные; цв. розовые, летом. **Б. кринита** (*B. crinita*, волосная). Боливия. Лл. овально-сердцевид.; цв. розовые, весной. **Б. коантина** (*B. xanthina*, с желтыми цв.). Ботани. Лл. овально-сердцевидные, остроконечные; цв. золотисто-желтые, летом. **Б. Кунтиана** (*B. Kunthiana*, Кунта). Венецула. Лл. ланцетовидные; зеленые на верхней, ярко-малиновые на нижней стороне; цв. белые, летом. **Б. лациниата** (*B. laciniata*, с разрывными лл.). Непаль. Южн. Китай. Лл. сердцевидные; цв. белые, весной. **Б. Линдлейана** (*B. Lindleyana*, Линдлей). Гватемала. Лл. щитовидные; цв. белые, зимой. **Б. Линчiana** (*B. Lynchiana*, Линча). Мексика. Лл. косовые, овально-сердцевидные; цв. крупные, красно-малиновые, зимой. В

садах назыв. *B. Рёзлии* (*B. Roetzlii*). **Б. максима** (*B. maxima*, большая). Мексика. Лл. большие, косовые, округло-сердцевидные; цв. белые, летом. **Б. макулита** (*B. maculata*, пятнистая). Боливия. Лл. косовые, продолговато-ланцетные, кожистые; цв. коралловые, летом. **Б. малябарика** (*B. malabarica*, малабарская). Малабаръ и Цейлон. Лл. сердцевидные, косовые, зубчатые, с белыми пятнами; цв. розовые, летом. **Б. маниката** (*B. manicata*, покрывная). Мексика. Лл. косовые, сердцевидные; цв. малиновые, зимой. **Б. мегафилля** (*B. megaphylla*, большелистая). Мексика. Лл. ланцетно-сердцевидные; цв. белые, зимой. **Б. моноптера** (*B. monoptera*, однокрылая). Боливия. Лл. почковидные, зубчатые, цв. белые, летом. **Б. наталензис** (*B. natalensis*, изъ Натали). Натали. Клубневая. Лл. полусердцевидные, косовые с белыми пятнами; цв. блдно-розовые, зимой. **Б. нитида** (*B. nitida*, блестящая). Ямайка. Лл. большие, глянцевитые; цв. большие розовые, зимой. Сил. *B. облика*, *B. пурпуреа*, *B. pulchra*, *B. purpurea*. **Б. октопеталя** (*B. octopetala*, восьмилепестковая). Перу. Лл. сердцевидные, с глубокими лопастями; цв. блдно-зеленоватые, осенью. Сил. *B. грандифлора* (*B. grandiflora*). **Б. опулифолия** (*B. orulifolia*, с лл. каппы). Нов. Гренада. Лл. овальные, продолговатые, зубчатые; цв. белые, весной. **Б. пикта** (*B. picta*, рослистая). Гималаи. Лл. овально-остроконечные; цв. блдно-розовые, осенью. **Б. Пирсеи** (*B. Pearcei*, Пирса). Боливия. Клубневая. Лл. ланцетовидно-сердцевидные, остроконечные, выш. розовые; цв. ярко-желтые, летом. Одна изъ родоначальных бегоний равнодушных теперь. **Б. платифолия** (*B. platifolia*, с лл. явора). Боливия. Лл. почковидные, лопастные; цв. большие, розовые, летом. **Б. престониензис** (*B. prestoniensis*, Престона). Гибридъ между *B. цинцбарина* и *B. нитида*. **Б. призматокарпа** (*B. prismatocarpa*, с призматическими плодами). Троп. Зан. Африка. Лл. косово-сердцевидные, трех-пятнолопастные; цв. оранжевые или желтые, летом. Самая низкорослая. Тепличная. **Б. пруниата** (*B. pruinata*, запиванная). Центр. Америка. Лл. большие, щитовидные; цв. белые, зимой. **Б. раменталеа** (*B. ramentacea*, чешуйчатая). Боливия. Лл. овально-почковидные, нижняя сторона чешуйчатая; цв. малиновые и белые, весной. **Б. Рекса** (*B. Rex*, королевская). Ассам. Лл. широко-овальные, косовые, зубчатые, темнозеленые, с широкою серебристою каймой; цв. блдно-розовые. Дала многочисленное покровные формы. **Б. ричинифолия** (*B. riciniifolia*, с лл. клещевника). Садовый гибридъ между *B. гераниефолли* и *B. немифолли*.



**Б. Ричардсiana** (B. Richardsiana, Ричардса). Клубневая. Наталь. Лл. дваневидно-лопастные; цв. белые, летом. **Б. розе-флора** (B. roseiflora, розовцвѣтная). Клубневая. Перу. Лл. округло-почковидные, волнистые; цв. ярко-розовокрасные, летом. **Б. рубрикаулис** (B. rubicaulis, съ красными черешками). Перу. Лл. косовокіе, овальные; цв. внутри белые, снаружи розовые, летом. **Б. рубро-венія** (B. rubro-venia, съ красными жилками). Сиккимъ. Лл. эллиптические или ланцетовидные, съ белыми пятнышками; цв. белые съ розовыми жилками, летом. **Б. семперфлоренс** (B. semperflorens, постоянно цвѣтущая). Бразилія. Лл. округло-овальные, сердцевидные; цв. белые или розовые, осенью. **Б. стигмоза** (B. stigmata, вѣтвистая). Бразилія. Лл. косовокіе, острые, сердцевидные, съ коралловыми пятнами; цв. белые. **Б. Сутерланді** (B. Sutherlandi, Сутерланда). Клубневая. Наталь. Лл. удлинено-ланцетовидные, вверху лопастные; цв. красно-оранжевые, съ темно-красноватымъ отгиномъ, летом. **Б. Твайтэзи** (B. Thwaitesii, Твайтеза). Цейлонъ. Лл. съ сердцевидными основаниями, бронзово-зеленые съ белыми крапинами; цв. белые; пухляется во влажной, спертый тепл. атмосферѣ. **Б. фальцифолія** (B. falcifolia, съ серповидными лл.). Перу. Лл. согнутые, острокопечные, съ белыми пятнами; цв. ярко-красные, летом. **Б. фоліоза** (B. foliosa, листовная). Гренада. Лл. мелкіе, продолговато-овальные, темнозеленые; цв. белые съ розовымъ отгиномъ, летом. Спн. **микрорифилія** (B. microrhyncha). **Б. Фрѣбели** (B. Fockeli, Фрѣбеля). Клубневая. Экуадоръ. Лл. сердцевидные, острокопечные, лопастные, зубчатые; на верхней сторонѣ мѣдно-зеленые, на нижней—красно-розовые; цв. мелкіе, белые, летом. **Б. фуксioидес** (B. fuchsioides, похожая на фуксію). Нов. Гренада. Лл. продолговато-овальные, немного серповидные, зубчатые, съ красноватыми краями; цв. темно-пурпуровые, яркіе, летом. Спн. **Б. миниата**. **Б. хербacea** (B. herbacea, травянистая). Бразилія. Лл. продолговато-острокопечные, ланцетовидные, зубчатые; цв. белые, мелкіе, весной. **Б. циннабарина** (B. cinnabarina, киноварно-красная). Боливія. Лл. косовокіе, зубчатые; цв. средней величины, красные, летом. **Б. Челсоуи** (B. Chelsoii, Челсен). Клубневая. Садовый гибридъ отъ *B. Седени* и *B. болевензис*. Лл. косовокіе, ланцетовидные; цв. крупные, красно-оранжевые, летом. **Б. Шмидтиана** (B. Schmidtiana, Шмидтова). Бразилія. Лл. косо-сердцевидные, овально-острокопечные, маленкие, съ металлическимъ отливомъ; цв. белые, мелкіе, зимой. **Б. Эвансiana** (B. Ewansiana, Эванса). Клубневая. Ява, Китай, Японія. Лл. косо-

бокіе, полу-сердцевидные, лопастные; цв. многочисленныя, тѣсные, большіе, летом. Спн. *Б. дискоторъ*, *Б. грандис*. **Б. экзимія** (B. eximia, превосходная). Гибридъ отъ *B. рубро-венія* и *B. Твайтэзи*. Лл. бронзово-пурпуровые, съ краснымъ отгиномъ. **Б. эхиносепала** (B. echinosepala, съ колючими долями). Бразилія. Лл. мелкіе, косые, зазубренные; цвѣты белые, летом.

**БЕДФОРДИЯ** (Bedfordia). По герцогу *Бедфорду* (Bedford). С. сложноцвѣтныхъ. Оранж. куст. pp., схожія съ *Какалія*. Черенки немного просунуты передъ посадкой въ песчанистую землю. Песчан.-дерн. съ торф. и битыми черепками поровну. Темп. летомъ 10—17, зимой 3—6°.

**Б. салицина** (B. salicina, похожая на иву). Викторія и Тасманія. Цв. головки желтыя, въ апрѣлѣ. 3 ф. Спн. *Какалія салицина* (Casalia salicina).

**БЕЗСМѢРТНИКИ, СУХОЦВѢТЫ** или **ИММОРТЕЛИ**. Такъ называются цвѣты, у которыхъ окрашенные прицвѣтники сохраняютъ въ значительной степени свой цвѣтъ послѣ того, какъ срѣзаны и высохли. Главнѣйшіе сухоцвѣты даютъ виды: *Акроклинумъ*, *Афелексисъ*, *Вайтція*, *Роданте*, *Ксерантемумъ* и *Хеликризумъ*.

**БЕЗПОКРОВНЫЙ** цвѣтокъ. Немнѣющій ни чашечки, ни вѣнчика.

**БЕЗПОЛЫЙ**. Не принадлежащій ни къ какому полу, не имѣющій ни тычинокъ, ни пестиковъ.

**БЕЗСТВОЛЬНЫЙ**. Немнѣющій видимаго, надземнаго стебля.

**БЕЗСѢМЯНКА**. Груша среднихъ размѣровъ, зеленоватого цвѣта, съ румянцемъ, тупо-конической формы и прекраснаго вкуса.

**БЕЗСѢМЯНОДОЛЬНЫЯ** pp., не имѣющія сѣмянодолей или сѣмянныхъ листьевъ. Такъ обыкновенно называютъ тайноцвѣтныя pp., — напоротники, мхи, грибы и пр.

**БЕЗЦВѢТНИКЪ**. См. *Эпимедиумъ*.

**БЕКЕЯ** (Wæske). Авраамъ *Векъ* (Wæsk)—шведскій врачъ, другъ Линнея. С. миртовыхъ. (50). Австралія. Оранж. куст. pp. Черенками весной, подъ стекломъ. Песчанисто-торф. съ кусками глины. дерн. Темп. зимой 3—5°.

**Б. виргата** (B. virgata, вѣточная). Нов. Каледонія. Цв. белые, въ сентябрѣ. 2—3 ф. **Б. диосмефолія** (B. diosmeifolia, съ лл. диосмы). Австралія. Цв. белые, въ августѣ 1—2 ф. **Б. фрутесценс** (B. frutescens, кустистая). Китай. Цв. белые, въ ноябрѣ. 2—3 ф.

**БЕЛОПЕРОНЕ** (Beloperone). *Belos* — дугъ и *perone* — полоса, по лукообразному связнику пыльниковъ. С. акантовыхъ. (30). Троп. Америка. Тепл. куст. pp. Черенками. Рыхлая глина. дерн. Темп. зимой 6—10, летомъ 12—17°.

**Б. violacea** (B. violacea, фиолетовая). Нов. Гренада. Цв. фиолетовые. 3 ф.

**ВЕЛЬЯДОННА**. См. *Атропа*.

**ВЕЛЬЛЕВАЛІЯ** (Bellevallia). *Bellevallia* (Bellevall) — французскій ботаникъ. С. лилейныхъ. Южи. Европа, В. Азія. Въ настоящее время родъ этотъ слитъ съ *Хиацинтусъ*. Выносившіе луковичныя pp. Обыкн. садовая. Отпрысками и сѣменами, высаживаемыми тотчасъ по вырѣваніи.

**Б. романа** (B. romana, римская. Римскій гіацинтъ). Италия. Цв. белые, кистью, весной. 6 д. Спн. *Б. оперкулата* и *Хиацинтусъ романусъ* (B. oreculata и *Hyacinthus romanus*). Въ значительномъ количествѣ употребляется для ранней выгонки.

**Б. сириака** (B. syriaca, сирийская). Сирія. Цв. белые, въ маѣ. 1 ф.

**ВЕЛЬЛИДИАСТРУМЪ** (Bellidiastrum). *Bellis* — маргаритка и *astrum* — звѣзда, по цв. головкамъ. С. сложноцвѣтныхъ. Низкорослыя многол. трав. pp., схожія съ *Астеръ*. Глин. дерн., листов. и торф. вѣтвь. Дѣленіемъ рано весной или тотчасъ послѣ цвѣтенія.

**Б. Михельлі** (B. Michellii, Михеля). Австрія. Цв. головки белые, въ іюнѣ. 1 ф.

**ВЕЛЬЛИСЪ** (Bellis). *Bellus* — красивый. С. сложноцвѣтныхъ. (8). Сѣв. полушаріе. Глин. дерн. Садовыя разновидности разны, дѣленіемъ послѣ цвѣтенія, или сѣменами въ мартѣ.

**Б. переннисъ** (B. pereennis, многолѣтній). *Маргаритка*. Почти по всей Европѣ. Цв. головки белые, въ іюнѣ. Имѣетъ много разновидностей какъ съ белыми, такъ и съ красными махровыми цв., а также съ пестрыми лл. (*аукубефолія*). **Б. ротундифолія цѣрулесценс** (B. rotundifolia cœrulescens, съ округлыми лл., красноватымъ). Марокко. Цв. головки съ меньшимъ числомъ болѣе широкихъ лучевыхъ цв.; на зиму защищать отъ морозовъ.

**ВЕЛЬЛИУМЪ** (Bellium). *Bellis* — маргаритка, по сходству цвѣтовъ. С. сложноцвѣтныхъ. (3). Средиземное побережье. Сѣменами и дѣленіемъ. Песчанистая съ торфяной.

**Б. белидиoidес** (B. bellidioides, похожій на *Bellis*). Италия. Однол. Цв. головки белые, съ іюня до сентября. **Б. минутумъ** (B. minutum, очень маленкій). Ливантъ. Цв. головки белые съ желтымъ, съ іюня до сентября. Многол.

**БѢМЕРІЯ** (Bœhmeria). Рудольфъ *БѢмеръ* (Bœmer) — нѣмецкій ботаникъ. С. крапивныхъ. (45). Китай, Японія, С. Америка.

**Б. нивеа** (B. nivea, снѣжная). Китай. Цв. зеленоватые; лл. бѣлопушистые. 3—4 ф. Полукуст. р. Песчанистая, дѣленіемъ. Единственный видъ заслужив. вниманія для садовыхъ цѣлей.

**БЕНТАМІЯ** (Benthania). *Бентамъ* (Bentham) — знаменитый англійскій ботаникъ. С. дереновыхъ. (2). Японія, Индія. Оранж., а въ умѣренномъ климатѣ выносивые кустарники. Глин. дерн., нѣсколько влажная. Положеніе защищенное. Сѣменами въ оранжереѣ, или отводкою, осенью.

**Б. фрагифера** (B. fragifera, съ цв. земляники). Непаль. Цв. крупныя, белые, съ іюня до октябрия. 10—15 ф. **Б. японика** (B. japonica, японская). Японія. Цв. желтовато-красные, весной. 8 ф.

**БЕРАРДІЯ** или **БЕРАРІЯ** (Berardia). *Бераръ* (Berard) — проф. химіи въ Монпелье. С. сложноцвѣтныхъ. (1). Высокія горы Зап. Европы. Сѣменами, весной.

**Б. субакаулис** (B. subacaulis, почти безстебельная). Цв. головки бѣловатыя, 3—4 д.

**БЕРБЕРИДОПСИСЪ** (Berberidopsis). *Berberis* — барбарисъ и *opsis* — похожій. С. барбарисовыхъ. (1). Чили. У насъ — оранж. вьющійся кустъ. Обыков. садовая. Сѣменами весной, отводкою осенью, черенками весной.

**Б. кораллина** (B. corallina, красно-коралловый). Чили. Цв. красные.

**БЕРБЕРИСЪ** (Berberis). *Berberis*, по-арабски, означаетъ плодъ, имѣющій форму раковины. С. барбарисовыхъ. (Бо-лѣе 50). Европа, Азія, Сѣв. Америка. Обычно выносив. куст. pp., смотря по происхожденію. Выносивые довольствуются обыков. садовой з., прочіе — глин. дерн. съ торф. и пескомъ. Отпрысками, отводками осенью, вырѣванными черенками осенью же, въ песокъ, въ оранж.; сѣменами осенью и весной; наконецъ — прививкой.

**Б. аквифоліумъ** (B. aquifolium, съ лл. падуба). С. Америка. Цв. желтые, весной; лл. колючіе. 3—6 ф. **Б. буксифолія** (B. buxifolia, съ лл. самшита). Магеллановъ прол. Цв. желтые, въ іюнѣ; листья сидятъ 18 д. Спн. *Б. дулисис* (B. dulcis). **Б. Валихиана** (B. Wallichiana, Валиховъ). Непаль. Цв. желтые, весной; лл. съ рѣсничками. 6 ф. **Б. вулгарисъ** (B. vulgaris, обыкновенный). *Барбарисъ*. Цв. желтые, кистями, весной. Лл. обратно-яйцевидные. 8—20 ф. Имѣетъ разновидности съ желты-



ми, фиолетовыми, пурпуровыми, черными и белыми плодами и съ пурпуровыми лл. **В. Дарвини** (V. Darwinii, Дарвина). Южн. Чили. Цв. оранжевые, въ маѣ. Лл. продолговатые. 2 ф. **В. канадэнзисъ** (V. canadensis, канадскій). Канада. Цв. пониклыми кистями, желтые, весной; лл. продолговатые, обратно-ланцетовидные, зубчатые. 4 ф. **В. непалэнзисъ** (V. nepalensis, изъ Непала). Непаль. Цв. желтые въ тонкихъ кистяхъ, весной; лл. перистые. 4 ф. **Син. Mahonia nepalensis** (Mahonia nepalensis). **В. репенсъ** (V. repens, ползучий). С. Америка. Цв. желтые изъ чешуйчатыхъ почекъ, весной; лл. перистые. 1—2 ф. **Син. Mahonia repens** (Mahonia repens). **В. синэнзисъ** (V. sinensis, китайскій). Китай. Цв. въ кистяхъ, въ маѣ; лл. продолговатые, тупые. 3—6 ф. **В. флорибунда** (V. floribunda, многоцвѣтн.). Непаль. Цв. многоцвѣтными кистями, въ июлѣ. Лл. обратно-ланцетовидные. 10 ф. **В. Форчуни** (V. Fortunei, Форчуна). Китай. Цв. мелкіе, по концамъ вѣтвей, кистями, въ июлѣ; лл. линейно-ланцетовидные. 4 ф. **В. эмпетрифолия** (V. empetrifolia, съ лл. Empetrum). Магеллановъ проливъ. Цв. ползучими, желтые, въ маѣ; лл. пучками, линейные. 1½—2 ф. **В. японика** (V. japonica, японскій). Китай и Японія. Цв. махручными кистями, желтые, весной. Лл. сердцевидные.

**БЕРГАМОТЬ**. См. Цитрусь.

**БЕРГЕРА** (Bergera). **Бергеръ** (Berger)—датскій ботаникъ. С. рутовыхъ. Оранже. дер., обычно относимы къ Мурраю. Глин. дерн. съ торф. Черенками изъ вырѣзаннаго роста, срѣзанными по кольцу, въ песокъ, подъ стекломъ, въ теплѣ, или отводкой.

**В. Кёниги** (V. Koenigi, Кёнига). Индія. Цв. зеленовато-желтые, мелкіе, въ июлѣ. 40 ф.

**БЕРЕЗА. БЕРЕЗОВЫЙ ЁРНИКЪ. В. СТЛАНЕЦЪ. БЕРЕЗА ЧЕРНАЯ.** См. Ветуля.

**БЕРЕЗКА.** См. Пирюли.

**БЕРЕЗОВИКЪ.** См. Болетусъ.

**БЕРЕЗОВЫЯ** породы (betuleae). Отдѣлъ древесныхъ или кустарныхъ пр. сбрасывающихъ на зиму листь. Цвѣточн. покрыва не бываетъ, или онъ представленъ прицѣпками; цвѣты однодомные, сережками, по двѣ или по три. Плодъ—сухой, сжатый какъ чечевица, часто крылатый, пераскрывающійся орѣшекъ. Листья очерченные, простые съ прилистниками. Сюда относятся роды Ветуля и Альнусъ.

**БЕРЕСКЛѢДЪ.** См. Эвонимусъ.

**БЕРЕСТА.** Верхній слой березовой коры.

**БЕРКЕЯ** (Berkheya). **Беркей** (Berk-

hey)—датскій ботаникъ. С. сложнопѣстныхъ. (30). Южн. Африка. Оранжевый. многол. трав. и куст. пр. Песчан. дерев. Многол. размл. черенками въ песокъ, подъ стекломъ; трав.—дѣлениемъ весной.

**В. грандифлора** (V. grandiflora, крупноцвѣтная). М. Д. Н. Цв. головки желтыя, въ июлѣ. 2 ф. **В. пурпуреа** (V. purpurea, пурпуровая). Ю. Африка. Цв. головки пурпуровыя, въ июлѣ. 3 ф. Въ умеренномъ климатѣ воздушное многол. трав. р.

**БЕРТОЛЬДІЯ** (Bertholletia). Луи Клодъ **Бертолле** (Berthollet) извѣстный французскій химикъ. С. миртовыхъ. (1). Троп. Америка.

**В. эксцельза** (V. excelsa, высокая). Изъ Пара. Высокое до 100 ф. тепл. дерево въ смѣси глин. дерн. съ торф., размл. вырѣзанными черенками, въ песокъ, на тепломъ грунѣ. Темп. лѣтомъ 13—20, зимой 10—12°.

**БЕРТОЛОНІЯ** (Bertolonia). Итальянскій ботаникъ **Бертолони** (Bertoloni)—авторъ „Rariorum Italiae plantarum Decades“ и др. С. черноствольныхъ. (6). Южн. Америка. Тепл. низкоросл. пр. съ красивыми листьями. Глин. дер., торф. и песокъ поровну. Размнож. черенками и сѣменами. Держать постоянно подъ колпакомъ.

**В. макулата** (V. maculata, пятнистая). Бразилія. Цв. пурпурово-фиолетовые; лл. сердцевидные, пушистые. **В. мarmorата** (V. marmorata, съ извилистыми разводами). Бразилія. Лл. продолговато-овальные съ большими жилками, нижняя сторона ярко-пурпуровая. **В. пубесценсъ** (V. pubescens, пушистая). Эквадоръ. Лл. овально-остроконечные, ярко-зеленые съ поперечнаго цвѣта полосой до низу; верхняя сторона съ длинными белыми полосками.

**БЕРІЯ** (Baeria). К. М. **Бэръ** (Baer)—русскій ученый, академикъ. С. сложноцвѣтныхъ. (5). Калифорнія. Однолѣт. Сѣять въ апрѣлѣ, въ обыкновен. садовую з.

**В. хризостема** (V. chrysostema, съ золотисто-желтымъ устьемъ). Калифорнія. Цв. головки желтыя, рано лѣтомъ. 1 ф.

**БЕРХЕМІЯ** (Berchemia). **Берхемъ** (Berchem)—французскій ботаникъ. С. рутовыхъ. (10). Сѣв. Индія, Ява, Китай, С. Америка. Оранже. цвѣткія пр. Сѣменами, черенками и дѣлениемъ.

**В. волюбилисъ** (V. volubilis, вьющаяся). Каролина. Цв. зеленоватые, въ июлѣ. Въ умеренномъ климатѣ—р. выносливое, въ обыкновен. садовой землѣ.

**БЕРЦЕЛИЯ** (Berzelia). **Берцелиусъ** (Berzelius)—знаменитый шведскій химикъ. С. бруннѣныхъ. (17). Южн. Африка. Оранже. куст. пр. Полувырѣзанные черенки въ песокъ, въ тепломъ грунѣ. Глин. дерн.

съ торф. Темп. лѣтомъ 13—17, зимой 10—12°.

**В. ланугиноза** (V. lanuginosa, шерстистая). М. Д. Н. Цв. головки белыя, въ горшочки, въ июлѣ—августѣ. Лл. пушистые. 1—2 ф.

**БЕСѢДКА.** Легкое, небольшое строеніе для отдыха и украшенія.

**БЕСЛЕРІЯ** (Besleria). **Беслеръ** (Besler)—швейцарскій аптекарь. С. ресне-ропійныхъ. (50). Троп. Америка. Теплич. полукуст. пр. Черенки, предвременно нѣсколько обсушенные, въ песокъ, на нагрѣтомъ грунѣ. Глин. дерн. съ торф. Темп. лѣтомъ 13—22, зимой 8—12°.

**В. грандифлора** (V. grandiflora, крупноцвѣтная). Бразилія. Цв. желтые съ красными крапками. 3 ф. **В. инкарната** (V. incarnata, съ ягодами тѣлеснаго цвѣта). Гвіана. Цв. пурпуровые. 2 ф. Р. травни. многол. **В. кокцинеа** (V. coccinea, съ шаро-лаховаго цвѣта ягодами). Гвіана. Цв. желтые. 3 ф. Вьющееся куст. пр.

**БЕССЕРА** (Bessera). **В. Бессеръ** (Besser)—ботаникъ-путешественникъ, проф. вилленскаго университета. С. лилейныхъ. Оранже. луков. пр. Глин. дерн. съ торф. и пескомъ. Отпрысками.

**В. элгансъ** (V. elegans, нарядная). Мексика. Цв. шароховые сплошн. или съ белымъ, съ июли до сентября.

**БЕТМАННІЯ** (Batemannia). **Батманъ** (Bateman)—коллекторъ и культиваторъ орхидей, написавшій „Monograph of odontoglossum“ и др. сочиненія. С. орхидей. Малорослые теплич. эпифиты, которые можно держать и въ горшкахъ. Дѣлениемъ и отпрысками. Торф. съ торф. мохомъ. Темп. лѣтомъ 16—24, зимой 13—15°.

**В. Вальліси** (V. Wallisii, Уоллеса). Колумбія. Цв. зеленоватые снаружи, каштановые внутри. 1 ф. **В. грандифлора** (V. grandiflora, крупноцвѣтная). Новая Гренада. Цв. оливково-зеленые съ красно-коричневыми полосками. Луковицы 3—4 д. длиною.

**БЕТУЛЯ** (Betula). По однимъ—отъ *betu*—кельтскаго названія березы, по другимъ—отъ *batuo*—колотить: римскіе ликторы колотили народъ березовыми палками. С. плюсковоыхъ березовыхъ. (25). Европа, Азія, Сѣв. Америка. Древесныя или кустарн. пр. Обыкн. садовая, но лучше—несчастливо-дерн. Сѣменами Весной и отводкой осенью; низкорослые виды и разновидности—прививкой.

**В. альба** (V. alba, бѣлая). **Береза**. Умѣр. и холод. пояса сѣв. полушарія. Цв. желтоватые, въ апрѣлѣ—маѣ; созр. плодъ въ августѣ—сентябрѣ. 50—60 ф. Разновидности: *альба пурпуреа* (бѣло-пурпуровая), лл. пурпуровые; *далеккарлика* (dalecarlica, дале-

карійская,—шведская), лл. глубоко перисто-разсѣченные; *лицината-пендула* (laciniata pendula, съ разсѣченн. лл., пониклая), лл. темнозеленые, расщепленные, вѣтви плакучія; *макрокарпа* (macrocarpa, крупноплодная), съ женск. сережками длинными; *пендула* (pendula, плакучая), вѣтви тонныя, плакучія, *побитика* (pontica, понтийская) съ болѣе крупными лл., *пубесценсъ* (pubescens, пушистая), съ пушистыми лл., *уртицифолия* (urticifolia, съ лл. крапиво), лл. глубоко разсѣченные, зубчатые и пушистые, *фоліисъ варіегатисъ* (foliis variegatis) съ пестрыми лл. **В. бойпаттра** (V. Bhojpattra, Бойпатра). Гималаи. Цв. въ маѣ, лл. продолговатые, остроконечные, низкіе, сторона коричневатая. 50 ф. **В. гляндулоза** (V. glandulosa, железковая). Канада. Цв. въ маѣ; лл. обратно-ланцетовидные, съ цѣлымъ основаниемъ, вѣтви съ железками. 60—70 ф. **В. даурика** (V. dahurica, даурская). **Черная береза**. Сибирь. Цв. въ мартѣ, крупнѣе обыкновен.; лл. овальные, узкіе, неправильно зубчатые. 30—40 ф. **В. лютеа** (V. lutea, желтая). Новая Скотія. Лл. широкіе, овальные, остроконечные. 70—80 ф. **Син. В. эксцельза** (V. excelsa). **В. пана** (V. papa, низкая). **Березовый стланикъ**. Лапландія, Швеція, С. Россія. Цв. примостояч. сережками, въ апрѣлѣ—маѣ, лл. округлые, зубчатые. 1—3 ф. **В. нѣгра** (V. nigra, черная). Нов. Джерсей до Каролины. Лл. овально-ромбическіе, двузубчатые, внизу пушистые. 60—70 ф. **В. папирадеа** (V. papyracea, бумажная). С. Америка. Лл. овальные, остроконечные, двукратно-зубчатые. 60—70 ф. **В. популифолия** (V. populifolia, съ лл. тополя). Канада. Лл. дельтовидные, остроконечные, неравнозубчатые. 30 ф. **В. пумила** (V. pumila, карликовая). Канада. Лл. округло-овальные, внизу густо-пушистые. 2—3 ф. **В. фрутикоза** (V. fruticosa, кустарная). **Березовый ёрникъ**. В. Сибирь. Лл. округло-овальные, почти равнозубчатые, гладкіе. 5—6 ф.

**БЕТОНИКА.** См. Стахисъ.

**БѢТА** (Beta). **Bett**—кельтское слово, означающее красный, по корню. С. лебедовыхъ. (13). Европа, Азія, Сѣв. Америка. Полувыносливыя двул. трав. пр. Глубокая, сильная, рыхлая. Сѣменами на воздухъ послѣ морозовъ или въ оранж.

**В. вульгарисъ** (V. vulgaris, обыкновенная). **Буряки**. **Свекла**. Ю. Европа. Цв. зеленоватые въ августѣ. Образовавшійся въ первый годъ корень употребляется въ пищу; для полученія отъ него сѣмянъ зиму сохраняется въ защитѣ отъ мороза. 4 ф. **В. цѣкла** (V. Cicla, сицилійская). **Мангольдъ**. **Кормовая свекла**. Португалія. Цв. зеленоватые. Лл. съ толстыми жилками; корня почти нѣтъ. 6 ф. Разновидность *ва-*



*piegata* (variegata), павѣтная подъ названіемъ бразильской или чилийской свеклы съ большими лл. (иногда въ 3 ф. длины и 1 ф. ширины), имѣетъ желтыя или шарлаховыя, либо красно-малиновыя жилки и употребляются для декораций.

**БЕФАРИЯ** или **БЕХАРИЯ** (*Befaria* s. *Bejaria*). *Бехаря* (*Bejar*)—испанскій ботаникъ. С. вересковыхъ. (12—15). Горы. троп. Америки. Оранж. куст. пр. близкія къ рододендрону. Черенки изъ молодого роста, въ песчанистой з., въ сильномъ теплѣ. Глин. дерн. съ торф.

**Б. глѣука** (*B. glauca*, сизая). Ю. Америка. Цв. тѣлесные, въ июнь. 3—6 ф. **Б. ледифолия** (*B. ledifolia*, съ лл. богровника). Ю. Америка. Цв. пурпуровые. 3—4 ф. **Б. эстуансъ** (*B. aestuans*, блестящая). Перу. Цв. пурпуровые 10—15 ф. Спп. *Акуна облонга* (*Aquina oblonga*).

**БЕШОРНЕРІЯ** (*Beschorneria*). *Г. Бешорнеръ* (*Beschorner*)—нѣмецкій ботаникъ. С. амариллисовыхъ. (3) Мексика. Оранж. сочная пр. Уходъ какъ за Агаве.

**Б. Тонелли** (*B. Tonelli*, Тонели). Мексика. Цв. кроваво-красные, темные. 3 ф.

**ВИВЕРШТЕЙНИЯ** (*Biebersteinia*). Фридрихъ Маршалъ *Виверштейнъ* (*Bieberstein*)—русскій ботаникъ, авторъ „*Flora Taurico-Sinica*“ и др. сочиненій. С. рутовыхъ. (3). Азия. Выноса. многол. трав. пр. Глин. дерн. съ торф. и пескомъ. Съеменами весной, черенками лѣтомъ.

**Б. одора** (*B. odora*, душистая). Алтай. Цв. желтые, въ маѣ. 1 ф.

**ВИВІКА**. См. Пеганумъ.

**ВИВОНЕА** (*Bivonaea*). Антонио *Вивона Бернарди* (*Bivona-Bernardi*)—сицилійскій ботаникъ. С. крестоцвѣтныхъ. (1). Сицилія. Песчан. дерновал. Съеменами весною, на мѣстѣ.

**Б. лютеа** (*B. lutea*, желтая). Сицилія. Цв. желтые, мелкіе, въ апрѣлѣ. 3—6 д. Р. однолѣтнее.

**ВИГЕЛОВІЯ** (*Bigelovia*). Д-ръ *Вигеловъ* (*Bigelov*)—авторъ „*Florula bostoniensis*“. С. сложноцвѣтныхъ. Куст., полудекъ и многол. трав. пр. Черенками и съеменами. Обыкновен. садовая.

**Б. нудата** (*B. nudata*, голая). Нов. Джерсей. Цв. головки желтыя, въ сентябрѣ. 1—2 ф. Трав. многол. **Б. Ховарди** (*B. Howardii*, Говарда). Калифорнія. Цв. головки желтыя. Спп. *Линосирисъ Ховарди* (*Linosyris Howardii*). Низкій кустъ.

**ВИДЕНСЪ** (*Bidens*) *Bis*—дважды и *dens*—рубчикъ, по съеменамъ. С. сложноцвѣтныхъ. (50). Широко распространенный по земной поверхности одно и

многол. трав. пр., не имѣющія значенія въ садоводствѣ.

**ВИКСА** (*Vixa*). Мѣстное имя. С. биксовыхъ. (2). Троп. Америка. Тел. деревья. Черенки изъ полувзрѣвшаго роста въ песокъ, подъ стекломъ, на тепломъ грунтѣ. Волокнист. торф. съ глин. дерн. Темп. лѣтомъ 15—24, зимой 8—13°.

**Б. орегеліана** (*B. Orellana*). *Ореанка*. Вестиндскіе о-ва. Цв. блѣдно-персиковые, въ маѣ до октябрі. 30 ф. Съемена покрыты мякотью, заключающею красящее вещество «арнатто».

**ВИКСА**. Жестиной коробокъ съ открывающеюся крышкою. Служитъ для собиранія въ него растеній при герборизаціи. **ВИКСОВЫЯ** пр. (*bixaceae*, *bixineae*). Семейство тропическихъ кустарниковъ и древесныхъ породъ, не представляющихъ особаго садоваго значенія. Къ нему принадлежатъ роды Ацара, Вика и Флякурція.

**ВИЛЬБЕРГІЯ** (*Billbergia*). *Вилльбергъ* (*Billberg*)—шведскій ботаникъ. С. бромеліевыхъ. (20). Троп. Америка. Тел. пр. Отпрысками и дѣленіемъ. Песчан. дерн. съ торф. и тѣкаторымъ количествомъ перегноя. Темп. лѣтомъ 13—19, зимой 10—13°.

**Б. Бараквиніана** (*B. Baraquiniana*, Бараквинна). Бразилія. Цв. зеленые, прицв. ярко-шарлаховые, весною рано. Лл. съ бѣлыми поперечными полосками. 1½ ф. **Б. иридофолія** (*B. iridifolia*, съ лл. косатика). Рио-Жанейро. Цв. красные съ желтоватыми и синими полосками, въ мартѣ. 1 ф. **Б. Кенеліана** (*B. Queneliana*, Кенели). Гвѣана. Цв. темно-пурпуровые. 6 ф. **Б. Либоніана** (*B. Liboniana*, Либона). Бразилія. Цв. кораллово-красные, зимой. 1 ф. **Б. Лиетцеи** (*B. Lietzei*, Лиетца). Бразилія. Цв. розовые съ малиновыми прицв. **Б. мармората** (*B. marmorata*, краморная). Цв. темно-голубые. Лл. съ красно-бурыми полосками и пятнами. **Б. розео-маргината** (*B. roseo-marginata*, съ розовыми краями). Троп. Америка. Цв. голубые съ розовыми прицв., въ январѣ. 1½ ф. Спп. *Б. рубро-маргината* и *Кенелія розео-маргината* (*B. rubro-marginata*, *Kennelia roseo-marginata*). **Б. зебрѣна** (*B. zebrina*, зебровая). Южн. Америка. Цв. зеленые, прицв. лососевого цвѣта. 1½ ф. Спп. *Геликодэ зебрѣна* (*Helicodae zebrina*).

**ВИЛЬЯРДБЕРА** (*Billardiera*). Жанъ *Лябиллардьеръ* (*Labillardiere*)—знаменитый французскій ботаникъ и путешественникъ. С. питтоспоровыхъ. (10). Австралія. Оранж. выющія пр. Съеменами въ теплѣ, въ апрѣлѣ; черенками въ маѣ, июнь, подъ стекломъ. Глин. дерн. съ торф. Темп. лѣтомъ 8—16, зимой 4—7°.

**Б. лонгифлора** (*B. longiflora*, длинноцвѣтная). Валь-Діеменова земля. Цв. желтоватые, мѣняющіеся на пурпуровые, въ маѣ до августа. Ягоды голубыя. Спп. *Б. овалисъ* (*B. ovalis*). **Б. сканденсъ** (*B. scandens*, вѣшная). Австралія. Цв. сначала бѣлые, потомъ пурпуровые съ іюня до сентябрі. Спп. *Б. ангиустифолия*, *Б. мутабилисъ* (*B. angustifolia*, *B. mutabilis*).

**ВИНЬОНІЙНЫЯ** пр. (*bignoniaceae*). Многочисленное семейство древесныхъ или кустарниковъ выющихся, либо цѣпляющихся раст. Наиболѣе извѣстные роды: Виньонія, Жакаранда, Калальна, Текома и Эккремокарпусъ.

**ВИНЬОНІЯ** (*Bignonia*). Аббатъ *Виньонъ* (*Bignon*)—библиотекарь Лудовика IV. С. виньоніиныхъ. (100). Самыя красивыя выющія пр., живущія въ тропич. лѣсахъ обонхъ полушарій; изъ нихъ въ сады не введено и десятой доли. Тел. лиственные. Размн. молодыми боковыми побѣгами, лѣтомъ, въ песокъ, подъ стекломъ, на тепломъ грунтѣ. Темп. лѣтомъ 13—20, зимой 6—10°.

**Б. варьабилісъ** (*B. variabilis*, измѣнчивая). Каракасъ. Цв. бѣлые съ желтой трубкой, въ іюнь до августа. **Б. карпеолата** (*B. carpeolata*, прищипочная). Свѣ. Америка. Цв. оранжевые съ апрѣля до августа. Въ умеренномъ климатѣ вынослива. **Б. клематисъ** (*B. Clematis*, похожая на Клематисъ). Каракасъ. Цв. бѣлые снаружи, желтоватые внутри. **Б. магнифика** (*B. magnifica*, великолѣпная). Колумбія. Цв. отъ свѣтло-розовыхъ до красно-пурпуровыхъ, лѣтомъ. **Б. паллида** (*B. pallida*, блѣдноватая). С. Винцентъ. Цв. блѣдно-лиловые съ желтой трубкой, въ іюль. **Б. спеціоза** (*B. speciosa*, особенная). Уругвай. Цв. малиновые съ пурпуровымъ отливомъ, въ маѣ. Спп. *Б. нѣкта* (*B. picta*). **Б. флорибунда** (*B. floribunda*, многочислѣтная). Мексика. Цв. пурпуровые. **Б. Шерере** (*B. Cherere*, Шерера). Гвѣана. Цв. оранжевые, съ іюня до ноябрі.

**ВИРКА**. Снарядъ для собиранія съ дерева плодовъ (яблокъ, грушъ и т. п.) и представляющій собою шесть со стаканомъ.

**ВИРСОНИМА** (*Byrsonima*). *Бирса*—шкура, *nimius*—мало употребительный: въ Бразиліи кора этого р. иногда употребляется для дубленія. С. мальпигіевыхъ. Тел. деревья или кусты. Черенки изъ полувзрѣвшаго роста въ песокъ, подъ стекломъ, на тепломъ грунтѣ. Глин. дерн. съ торф. Темп. лѣтомъ 12—22, зимой 10—15°.

**Б. альтиссима** (*B. altissima*, самая высокая). Гвѣана. Цв. бѣлые, въ іюль. 60 ф. **Б. люцида** (*B. lucida*, блестящая). Кари-

бейскіе остр. Цв. малиновые, въ маѣ. 8 ф. **Б. хризифолія** (*B. chrysophylla*, золотисто-листая). Ю. Америка. Цв. желтые, въ августѣ. 14 ф.

**ВИСКУТЕЛЬЯ** (*Biscutella*). *Bis*—два, *scutella*—тарелочка, по формѣ стручка. С. крестоцвѣтныхъ. (13). Средиземн. побережье. Калифорнія. Вынослива одно- и многол. трав. пр. Съеменами. Садоваго значенія не имѣютъ.

**ВИТНЕРІЙНЫЯ** или **ВЮТНЕРІЙНЫЯ** пр. (*büttnerieae*). Отдѣлъ с. названныхъ.

**ВИФРЕНАРИЯ** (*Bifrenaria*). *Bis*—дважды и *fraenum*—полоса, по соединенію пыльниковъ массъ. С. орхидей. (10). Бразилія, Гвѣана, Колумбія. Тел. эпифитъ. Дѣленіемъ и отпрысками. Торф. съ мохомъ, углемъ и черенками. Воспитываются въ горшкахъ и вазахъ. Темп. лѣтомъ 14—24, зимой 13—15°.

**Б. ауранціака** (*B. aurantiaca*, оранжевая). Демерара. Цв. оранжевые, въ октябрѣ. 9 д. **Б. вителиана** (*B. vitellina*, желтопал). Бразилія. Цв. желто-пурпуровые, въ іюль. 1 ф. **Б. Хардвеніи** (*B. Hardwenii*, Гардвена). Бразилія. Цв. большіе, желто-коричневые, губа бѣлая съ желтыми пятнами, въ іюнь. 1½ д. Спп. *Скутикарія Хардвеніи* (*Scuticaria Hardwenii*). Имѣетъ разновидности: *белла* (*bella*) съ бѣловатыми цв., *пардаліна* (*pardalina*, леопардовая) съ цв. желтыми, по которымъ кругловатыя коричневыя пятна.

**ВІАРУМЪ** (*Biarum*). Старинное названіе р. С. ароидей. (2). Средиземное побережье. Такой же уходъ, какъ за Арумъ, съ которымъ имѣетъ много общаго.

**Б. тенуифолиумъ** (*B. tenuifolium*, узколистный). Юж. Европа. Цв. (чехоль) темный коричнево-пурпуровый, въ іюнь. 6 д. Спп. *Б. граминеумъ* и *Б. констриктумъ* (*B. gramineum* et *B. constrictum*).

**ВИОФИТУМЪ** (*Biophytum*). *Bios*—жизнь и *phyton*—растеніе; лл. тѣкаторыхъ чувствительны къ дотрогиванію. С. ксилитыхъ. Многол. трав. пр., достигающія смѣсою глин. дерн. съ торф. Съеменами, весною, въ парникѣ.

**Б. сенситивумъ** (*B. sensitivum*, чувствительный). Индія и Китай. Цв. мелкіе, желтые, въ іюль. Лл. съ продолговатыми, тупоконечными листочками, складывающимися отъ малѣйшаго прикосновенія.

**ВЛАНКИРОВАНИЕ**. Выбѣлка, главнымъ образомъ, овощей для приданія имъ болѣея пѣжности. Достигается удаленіемъ свѣта и лишеніемъ зеленого вещества способности разлагать воду и углекислоту.

**БЛЕКНУТЬ**. Завядать, вянуть, засыхать.



**БЛЕРИЯ (Blæria).** Патрик *Блэйрз* (Blair)—практический врачъ въ Бостонѣ. С. вересковыхъ. Оранж. куст. рр. изъ Южи. и Тропич. Африки. Черенками молодого роста, въ песокъ, подъ стекломъ. Песчанисто-дерн. Темп. лѣтомъ 10—15, зимой 2—50°.

**В. артикулата** (V. articulata, членистая). М. Д. Н. Цв. красноватые, въ май. 1 ф.

**БЛЕТІЯ (Bletia).** Дюгъ Луи *Блетъ* (Blet)—испанскій ботаникъ. С. орхидей. (20). Троп. Америка, Китай, Японія. Теплич. земныя орхидей. Дѣленіемъ корней, послѣ цвѣтенія или при вступленіи въ покой. Торфян. съ глин. дерн. и пескомъ, съ примѣсью перегноя. Темп. лѣтомъ 14—26, зимой 7—12°.

**В. хиацинтина** (V. hyacinthina, гиацинтовая). Китай. Цв. пурпуровые, въ апрѣль до юня. Довольно вынослива. **В. Шепардъ** (V. Shepherdii). Ямайка. Цв. пурпуровые съ желтымъ основаніемъ губы, зимою. **В. Шерратіана** (V. Sherrattiana, Шерратта). Нов. Гренада. Цв. розово-пурпуровые.

**БЛЕФАРИСЪ (Blepharis)** *Blepharis*—глазныя рѣсницы, но бахромчатымъ прицѣпникамъ. С. акантовыхъ. Низкорослыя куст. или трав. теплич. и оранж. рр. Уходъ какъ за Акантусъ.

**В. капензисъ** (V. capensis, капскій). М. Д. Н. Цв. голубые, въ июль. 1 ф. Оранж. двул. **В. прокумбенсъ** (V. procumbens, распростертый). М. Д. Н. Цв. голубые, въ июль. 1 ф.

**БЛЕФИЛИЯ (Blephilia).** Происхождение названія—то же, что и для Блефарисъ. С. губоцвѣтныхъ. (2). Сѣв. Америка. Многол. трав. рр. сходящая съ Монарда. Обыкновенная садовая. Дѣленіемъ весной.

**В. хираута** (V. hirsuta, волосистая). Виргинія. Цв. пурпуровые или голубые, въ июль. 1—2 ф. **В. циліата** (V. ciliata, рѣсничатая). С. Америка. Цв. голубые, въ июль. 1—2 ф.

**БЛЕХНУМЪ (Blechnum).** Греческое названіе папоротника. С. папоротниковъ. (60). Тропич. страны. Теплич. и оранж. рр.

**В. аустрале** (V. australe, южный). Юж. Америка. Ваи перистыя 9—18 д. длинной, 2—3 д. шириной. Оранж. **В. бразиліензе** (V. brasiliense, бразиліскій). Бразилія. Перу. Ваи длин. 2—4 ф., шир. 6—16 д., перистыя. Теплич. **В. лонгифоліумъ** (longifolium, длиннолистный). Троп. Америка. Ваи перистыя, длин. 6—9 д., шир. 3—5 д. Тепл. **В. нитидумъ** (V. nitidum, блестящій). Бразилія. Ваи перистыя, длин. болѣе фута, шир. 4—6 д. Тепл. **В. ориентале** (V. orientale, восточный). Австралія, юж. Китай, Гималаи. Ваи перистыя, длин. 1—3 ф., шир.

3—8 д. Оранж. **В. окцидентале** (V. occidentale, западный). Вестиндія, къ югу Чили и Ю. Бразилія. Ваи перистыя, длин. 9—18 д., шир. 4—8 д. Тепл. и оранж. **В. сепрулятумъ** (V. serrulatum, запыленный). Флорида. Ваи перистыя, длин. 1—2 ф., ширин. 6—9 д. Тепл. и оранж. **В. хастатумъ** (V. hastatum, копьевидный). Южн. Америка. Ваи длин. 9—18 д., шир. 2—4 д., перистыя, перья серповидныя. Оранж.

**БЛЕХУМЪ (Blechnum).** Происхождение названія невѣстно. С. акантовыхъ. (5). Троп. Америка, Филипп. ост. Тепл. многол. трав. рр. Черенками весной и лѣтомъ. Торф. съ глин. дерн. Темп. лѣтомъ 13—18, зимой 7—10°.

**В. Броуна** (V. Brownii, Броуна). Вестиндія. Цв. бѣлые, лѣтомъ. 2 ф.

**ВЛОНА** или **ВОДОНА**. Распавшіеся наростъ на деревѣ, напр. на березѣ.

**ВЛОНЪ** или **ВОДОНЪ**. Молодые вѣтвицы, еще не одеревѣвшія, слои дерева.

**ВЛОШКИ, ВЛОШКАРА, ЗЕМЛЯНЫЯ ВЛОХИ, ПОПРЫГУШКИ.** Маленькіе чучки, питающиеся л. рр.

**БЛЮМЕНБАХІЯ (Blumenbachia).** Юг. *Блуменбахъ* (Blumenbach)—проф. сравнительной анатоміи въ Геттингенѣ. С. лазовыхъ. (12). Америка. Вьющаяся или цѣпкая одно-дву-, или многол. трав. рр. со жгучими волосками. Земля—сбыки. садовая. Сѣменами весной, въ горшки, въ тепловатомъ мѣстѣ.

**В. инсигнисъ** (V. insignis, замѣчательная). Чили. Однолѣтн. стелющаяся р. Цв. бѣловатые, съ красноватыми чешуйками, въ июль. 1 ф. **В. конторта** (V. contorta, скрученная). Перу. Оранж. вьющаяся р. Цв. красно-оранжевые, въ июль. **В. короната** (V. coronata, увѣнчанная). Чили. Цв. бѣлые, въ июль. Низкорослое двул. Сил. *Кайдофора короната* (Cajophora coronata). **В. чукуитензисъ** (V. chuquitensis, чукуитанская). Перу. Полу-выносливое многол. трав. р. Цв. красныя.

**БЛЯКЕЯ (Blakea).** Мартинъ *Блакъ* (Blake)—покровитель наукъ. С. черноустыхъ. Тепл. куст. рр. Черенками изъ довольно окрѣпшаго роста въ песчанисто-торф. з., подъ стекломъ, въ тепломъ грунтѣ. Торф. съ глин. дер. Темп. лѣтомъ 13—28, зимой 8—10°.

**В. квинквенервія** (V. quinquenervia, пятинервная). Тринидадъ. Цв. бѣлые, въ июль. 10 ф. **В. тринервія** (V. trinervia, трехнервная). Ямайка. Цв. бѣлые, въ июль. 8 ф.

**БЛАНДФОРДИЯ (Blandfordia).** По маркизу *Бландфорду* (Blandford). С. лилейныхъ. (4). Австралія. Оранж. луков.

рр. Глин. дерн. пополамъ съ торф. Отпрысками, сѣменами или дѣленіемъ.

**В. ауреа** (V. aurea, золотистая). Нов. Ю. Валлисъ. Цв. золотисто-желтые, колокольчатые, лѣтомъ. 1—2 ф. **В. грандифлора** (V. grandiflora, крупноцвѣтная). Нов. Ю. Валлисъ. Цв. карминово-розовые, большіе, въ июль. 2 ф. **В. Куннингаміи** (V. Cunninghamii, Куннингама). Валлисъ. Цв. красно-бронзовые, въ июль. 3 ф. **В. нобилисъ** (V. nobilis, благородная). Нов. Ю. Валлисъ. Цв. оранжевые съ желтыми краями, въ июль. 2 ф. **В. фламмеа** (V. flammæa, пламенная). Австралія. Цв. тускло-желтые, въ июль. 2 ф. Разновидности: *принцепс* (princeps, великолѣпная), цв. ярко-оранжевые, лѣтомъ; *элегансъ* (elegans, изящная), цв. малиновые, лѣтомъ.

**ВОАБАВЪ**. См. Адаксонія.

**ВОВАРТІЯ (Bobartia).** *Бобартъ* (Bobart)—проф. ботаники въ Оксфордѣ, въ XVII ст. С. косатиковыхъ. (6). Южн. Африка. Многол. оранж., на лѣто высаживаемая на воздухъ. Посѣвъ въ апрѣль, дѣленіе весной или осенью. Песчан. дерн.

**В. глядіата** (V. gladiata, мечевидная). М. Д. Н. Цв. желтые, въ июль. 2 ф. Сил. *Марика глядіата* (Marica gladiata). **В. спатацеа** (V. spathacea, чехолчатая). М. Д. Н. Цв. желтые, въ июль. 9 д.

**ВОВОВІЯ рр. (leguminosae).** Весьма обширное семейство древесныхъ, кустарныхъ и травянистыхъ много- и однолѣтнихъ породъ, распространенныхъ по всей земной поверхности. Оно подраздѣляется на три отдѣла: мотыльковыхъ (papilionaceae), цезальпиніевыхъ (cesalpineae) и мимозовыхъ (mimosae). Въ семействѣ 293 рода и 5,300 видовъ.

**ВОВОВНИКЪ**. См. Аминдалюсъ.

**ВОВОКЪ**. См. Диптерикъ.

**ВОВРОВИКЪ**. См. Спаргіумъ.

**ВОВЫ КОНСКІЕ** или **ОГОРОДНЫЕ**. См. Фаба.

**ВОВЪ**. Стручокъ или сѣмечко такого стручка.

**ВОВІЯ** или **ВОВІЯ** (Bowiea). *Бови* (Bowie)—ботаническій коллекторъ для кьюскаго сада. С. лилейныхъ (1). Южн. Африка.

**В. волюбилісъ** (V. volubilis, вьющаяся). Стебель часто въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ не производитъ л., вьющейся; корень—луковича. Цв. немногіе, въ октябрѣ. Оранж. р., нуждающаяся въ легкой землѣ и размножаемое сѣменами или отпрысками.

**БОГОРОДИЦКАЯ РУЧКА**. См. Анастатика.

**БОГОРОДИЦЫНЫ СЛЕЗКИ**. См. Конкскъ.

**БОГОРОДСКАЯ ТРАВА**. См. Тимусъ.

**БОЖЬЕ ДЕРЕВЦО**. См. Артемизія **БОЖЬЯ КОРОВКА**. Жучекъ, какъ самъ, такъ особенно его личинка, питается листовыми вшами (тлей), и потому полезенъ для рр.

**БОЖЬЯ ТРАВА**. См. Тритонелія.

**ВОКОВОЕ**. Яблоко средней поры поспѣванія, плоской формы, среднихъ размѣровъ, желтаго цвѣта, съ румянцемъ, вкусомъ съ краскомъ, весьма пріятнымъ.

**ВОКАРНІЯ (Beaucarnea).** Личное названіе—*Бокарне* (Beaucarne). С. лилейныхъ. Оранж. рр. изъ Мексики. Волокн. глин. дерн. съ пескомъ; во время роста обильная поливка. Черенками, но обычно сѣменами.

**В. глаука** (V. glauca, сизая). Лл. пониклые, сизые, длиною 2—3 ф. Стебель внизу раздутый. **В. лонгифолія** (V. longifolia, длиннолистная). Лл. узкіе, пониклые, въ 6—10 ф. длиною. **В. рекурвата** (V. recurvata, съ дугообразными лл.). Лл. длинныя, линейныя, изящно согнутыя. Сил. *Пинценектитія туберкулата* (Pincenectitia tuberculata).

**ВОККОНИЯ (Vossconia).** Паоло *Боккони* (Vossconi)—ботаникъ въ Сициліи. С. маковыхъ. (3). Чили, Перу, Мексика, Китай. Теплич. оранж. или воздушн. кустарныя рр. Черенками въ песокъ и теплѣ. Волокн. песчан. дерн. Темп. лѣтомъ 12—20, зимой 10—13°.

**В. кордата** (V. cordata, сердцевидная). Китай. Цв. бѣдно-красныя, лѣтомъ; стебли густые, лл. большіе, округло-сердцевидные. 5—8 ф. Въ умеренномъ климатѣ вынослива. **В. фрутесценсъ** (V. frutescens, кустарная). Мексика. Цв. зеленоватые, въ октябрѣ. Лл. продолговатые, перисторазсѣченные. 3—6 ф. Оранж. или теплич.

**ВОЛѢТУСЪ (Boletus).** *Bolos*—масса. Родъ содержащій грибы, у которыхъ плодовое ложе состоитъ изъ трубочекъ. Къ нему принадлежатъ наиболѣе употребительныя. **В. едудисъ** (V. edulis, съдобный). *Бѣлый грибъ*. **Воровикъ**, **В. скаберъ** (V. scaber, жесткій). *Ворезовикъ* съ разновидностью *ауранціакусъ* (aurantiacus) *Подосиновикъ*, **В. ангулярисъ** (V. annularis, кольчатый). *Масляникъ*, и мн. др.

**БОЛЕУМЪ (Boleum).** *Bolos*—масса, по стручкамъ. С. крестоцвѣтныхъ. Куст. р., высаживаемое на зиму въ защиту. Сѣять весной, въ парникѣ.

**В. асперумъ** (V. asperum, жесткій). Италия. Цв. бѣлые, въ июль. 1 ф.

**ВОЛОТНИЦА**. См. Андромеда.

**ВОЛЬТОНІЯ (Boltonia).** *Болтонъ*



(Bolton)—английскій ботаникъ. С. сложноподчѣтныхъ. (12). С. Америка. Воздушныя многол. трав. Обыкн. садовая. Дѣленіемъ весной или осенью.

**В. астероидея** (В. *asteroides*, похожая на Астру). С. Америка. Цв. головки тѣлесныя, въ августѣ. 2 ф. **В. глассифолія** (В. *glassifolia*, съ лл. вайды). С. Америка. Цв. головки малиновые, въ сентябрѣ. 1½ ф.

**БОМАРЕА (Bomarea)**. Происхождение названія неопредѣленное. С. амариллисовыхъ. (50). Южн. Америка. Легкая, сильная изъ торф., листов. глин. дер. и песку. Выющаяся оранж. или въ умѣренномъ климатѣ воздуш. рр., защищаемыя слегка покрывкой. Сѣменами или дѣленіемъ. Сѣять въ теплѣ.

**В. Вильямси** (В. *Williamsii*, Вильямса). Нов. Гренада. Цв. розовые. **В. Кальдасиана** (В. *Caldasiana*, Кальдаса). Перуанскіе Анды. Цв. желтые съ красно-малиновыми пятнышками. **В. олиганта** (В. *oligantha*, съ малымъ числомъ цвѣтовъ). Перу. Цв. снаружи красноватые, внутри — желтые. **В. Шуттлворси** (В. *Shuttleworthii*, Шуттлворса). Богота. Цв. съ киповарными и свѣтло-желтыми сегментами.

**БОМБАКСЪ (Bombax)**. *Bombax* — одно изъ названій на греческомъ языкѣ хлопка; въ плодахъ заключается хлопчатое вещество. С. мальвовыхъ (12). Троп. Азія, Африка и Америка. Тепл. древ. рр. Черенки съ молодымъ ростомъ, но отвердѣлымъ основаніемъ, въ песокъ, подъ стекломъ, въ теплѣ. Глин. дер. съ торф. Темп. лѣтомъ 13—24, зимой 8—12°.

**В. цейба** (В. *Ceyba*, Цейба). Южн. Америка. Цв. крупные, блѣдно-розовые. 100 ф.

**БОМОНТІЯ (Beaumontia)**. *Beaumontia* (Beaumont)—английскій геологъ. С. кутровыхъ. (4). Остиндія, Малайск. архип. Тепл. цѣпка рр. Черенки изъ полувзрѣлаго роста. Волокнистая, глин. дерн. съ торф. Темп. лѣтомъ 13—17, зимой 8—12°.

**В. грандифлора** (В. *grandiflora*, крупноцвѣтная). Читагонгъ и Сильхетъ. Цв. большіе, бѣлые, въ июнѣ.

**ВОННАЯ (Bonnaea)**. *Bonnaea* (Bonpaу)—нѣмец. ботаникъ. С. норичниковыхъ. Остиндія. Тепл. одно-, дву- и многол. стелящаяся рр. Сѣменами, дѣленіемъ и черенками. Сильная песчанисто-перновал.

**В. брахикарпа** (В. *brachycarpa*, короткосѣменная). Остиндія. Цв. фиолетовые, въ июнѣ. Однол. **В. вероницефолія** (В. *veronicaeifolia*, съ лл. вероники). Остиндія. Цв. малиновые, въ августѣ. Двухъ **В. рептансъ** (В. *reptans*, ползучая). Остиндія. Цв. голубые, въ июлѣ. Многолѣт.

**ВОННЕТІЯ (Bonnetia)**. Шарль Бон-

не (Bonnet)—французскій ботаникъ. С. тернстреміевыхъ. Тепл. древ. и куст. рр. Черенками изъ молодого роста, подъ стекломъ, въ теплѣ. Глин. дерн. съ торф. Темп. лѣтомъ 13—22, зимой 10—12°.

**В. сессилия** (В. *sessilis*, сидячая). Гвѣана. Цв. пурпуровые. 15 ф.

**ВОНАТЕА (Bonatea)**. *Bonatea* (Bonato)—проф. ботаники въ Падувѣ. С. орхидей. (1). Мысъ Д. Н.

**В. специоза** (В. *speciosa*, особенная). Близка къ Хабенаріи и требуетъ того же ухода. Цв. бѣлые, въ августѣ. 2 ф.

**ВОНГАРДІЯ (Bongardia)**. Генрихъ Бонгаръ (Bongard)—русскій ботаникъ. С. барбарисныхъ. (1). Сред. Азія. Многол. клубневое трав. р. При хорошемъ дренажѣ глин. дерн. съ торф., листов. и пескомъ поровну. Зимовать въ защитѣ отъ мороза.

**В. Раувольфии** (В. *Rauwolfii*, Раувольфа). Сирія. Персія. Цв. золотисто-желтые, въ маѣ. 6 д. Сип. *Леонтице хризогонумъ* (Leontice chrysogonum).

**БОРАГО (Borago)**. Происхождение названія неопредѣленное. С. бурачниковыхъ. (3). Средиземное побережье. Одно- и многол. травяни. рр. Обыкновен. садов. Сѣменами, а многол.—дѣленіемъ весной или черенками.

**В. лаксифлора** (В. *laxiflora*, рыхлоцвѣтная). Корейка. Цв. блѣдно-голубые, въ маѣ до августа. Двухъ **В. лонгифолія** (В. *longifolia*, длиннолистая). Нумидія. Цв. голубые, съ июля до августа. Однол. **В. официнализъ** (В. *officinalis*, аптечное). *Огуречная трава*. Ср. Россія. Цв. голубые, пурпуровые или бѣлые. 1—2 ф. Однол.

**БОРАССУСЪ (Borassus)**. Такъ называлъ Линней чехолъ покрывающій цвѣторасположеніе финика. С. пальмъ. Тепл. древ. рр. (2). Троп. Азія и Африка. Сѣменами Глин. дерн. съ торф. Темп. лѣтомъ 13—26, зимой 13—15°.

**В. флабеллиформисъ** (В. *flabelliformis*, вѣерообразный). Индія. Лл. почти округлые, складчатые. 30 ф. **В. этиопикумъ** (В. *ethiopicum*, эфиопскій). Запад. троп. Африка. Лл. округлые, складчатые на длинныхъ черешкахъ. Пенъ по срединѣ раздѣлитъ.

**БОРВОНІЯ (Borbonia)**. По *Гастону Бурбонскому*—герцогу орлеанскому, сыну Генриха IV. С. бобовыхъ. (13). Южн. Африка. Оранж. древ. рр. Черенками въ песокъ, въ апрѣлѣ, подъ стекломъ, въ спертномъ воздухѣ. Глин. дер. съ торф. Темп. лѣтомъ 8—17, зимой 4—6°.

**В. барбата** (В. *barbata*, бородастая). М. Д. Н. Цв. желтые, въ июлѣ. 3—4 ф. **В. крената** (В. *crenata*, зубчатая) М. Д. Н. Цв. желтые, въ июлѣ. 3—6 ф.

**БОРДЮРЪ**. Кромка, койма или кайма; окраекъ; окаемокъ. Вообще—это узкая и длинная грядка съ разнообразными растеніями; должна быть выше остальной поверхности и хорошо дренажена. Насажается весной. При ширинѣ въ 2—3 ф. въ ней могутъ сидѣть рр. не болѣе, какъ въ два ряда, болѣе высокія—къ задней сторонѣ. Достоинство бордюра—ровное и продолжительное цвѣтеніе. Дать опредѣлительныя указанія, какъ насадить бордюръ, нельзя,—это дѣло вкуса, но едва ли не лучший бордюръ образуется изъ многол. трав. рр. въ смѣси съ лѣтниками. Узкій бордюръ дѣлается изъ одного и того же растенія, газона и даже нѣкоторыхъ неорганическихъ предметов,—желѣзныхъ, глинѣныхъ, форфоровыхъ частей. Бордюръ дерновый долженъ быть достаточно широкъ, чтобы его удобно косить. Для устройства бордюра необходимо сначала выровнять мѣсто, подсыпавъ земли въ углубленіяхъ и снявъ съ выступившихъ мѣстъ.

**БОРЁЦЪ**. См. Аконикумъ.

**БОРОВИКЪ**. См. Болетусъ.

**БОРОВИНКА**. Яблоко. См. Барвинское.

**БОВОРОЙ КОЛОКОЛЬЧИКЪ**. См. Кампанула.

**БОВОРОЙ ЛѢСЪ**. Сѣсновый строевой лѣсъ по суходолу—*оельмо*—хрищеватое, сухое, подъ хвойнымъ лѣсомъ.

**БОРОДАВНИКЪ**. См. Церинте.

**БОРОДАВЧАТЫЙ**. Усѣянный со сучками, въ видѣ бородавочекъ.

**БОРОДЧАТЫЙ**. Имѣющій бородку, какъ у птичьего пера.

**БОРОЗДА**. Полоска или канавка, сдѣланная сохою, плугомъ или лопатой.

**БОРОЗЦЫЛЬНИКЪ**. Легкая соха, или плужокъ для проведенія борозды.

**БОРОЗДИТЬ**. Дѣлать борозды

**БОРОЗДНИКЪ**. 1) Брусомъ съ зубьями для проведенія борозды подъ рядовой посѣвъ; 2) мотыга для полаты сорной травы; 3) маленькая коса (горбуша) для срѣзки сорной травы по бороздамъ гряды.

**БОРОНА**. Земледѣльческое орудіе для разбивки комьевъ послѣ всаженія. Состоитъ изъ продольныхъ и поперечныхъ *грядокъ*, расположенныхъ рѣшеткою въ 16 кѣтокъ; она связана *взвѣзками* или *вѣтвями*, въ которыхъ заключены *зубья*. Самая простая борода—*суковатка*, состоитъ изъ еловыхъ жердей съ оставленными сучьями (смычье) въ 2 четверти длины, или изъ расколотыхъ суковатыхъ лѣсницъ, связанныхъ *вѣтвями* или *закрутками*; къ бороны при-

вертываются оглобли. Для глубокой плужной пашни употребляется тяжелая борода,—или изъ деревянныхъ брусковъ съ желѣзными зубьями, или вся желѣзная; на ровной кочковатой и твердой почвѣ употребляется борода *кольчатая*, состоящая изъ звеньевъ, соединенныхъ кольцами, гнувшихся во все стороны.

**БОРОНІЯ (Boronia)**. Франческо Борони (Boroni)—итальянецъ, слуга д-ра Синторна, собиравшій ему въ Греціи рр. С. рутозыхъ. (67). Австралія. Оранж. куст. рр. Черенками средн. плотности, въ песокъ, подъ стекломъ, въ умѣр. теплѣ. Песч. торф. съ древ. углемъ. Темп. лѣтомъ 13—17, зимой 6—8°.

**В. Друмонди** (В. *Drummondii*, Друмонда). Цв. розово-малиновые, лѣтомъ. 2 ф. **В. мегастигма** (В. *megastigma*, съ большимъ рыльцемъ). Цв. желтые внутри, свѣтло-пурпуровые снаружи, душистые. 1 ф. **В. пинната** (В. *pinata*, перистая). Цв. малиновые, съ февраля по май. 1—3 ф. **В. серрулата** (В. *serrulata*, мелко-зубчатая). Портъ-Джексонъ. Цв. темно-розовые, въ июлѣ 1—5 ф.

**БОРОНОВАТЬ. БОРОНИТЬ**. Обдѣлывать всаженный слой бороной.

**БОРТОНІЯ (Burtonia)**. *Burtonia* (Burton)—коллекторъ кюсскаго сада. С. бобовыхъ. (7). Австралія. Оранж. куст. рр. Сѣять въ мартѣ—апрѣлѣ въ песчанисто-торф. землю. Черенками съ полу-взрѣвшимъ ростомъ, въ песокъ, подъ стекломъ. Волокн. торф. съ песчан. глин. дерн. и кусками древ. угля. Хорошій дренажъ. Темп. лѣтомъ 13—17, зимой 6—8°.

**В. конферта** (В. *conferta*, со скученными цв.). Австралія. Цв. фиолетовые, въ июлѣ 2 ф. **В. скабра** (В. *scabra*, грубая). Австралія, по Лебейей р. Цв. пурпуровые, въ апрѣлѣ. Сип. *В. пухлякеля* (В. *pulchella*).

**БОРТЪ**. Край. Крайняя полоса.

**БОРЪ**. См. Паникумъ.

**ВОСВѢДЛІЯ (Boswellia)**. *Boswellia* (Boswell) эдинбургскій ботаникъ. Сем. мѣшечниковыхъ. (4). Индія, Африка. Теплич. древ. рр. Черенками въ песокъ, подъ стекломъ. Глин. дерн. съ торф. Темп. лѣтомъ 13—22, зимой 8—13°.

**В. серрата** (В. *serrata*, зазпленная). Индія. Цв. желтоватые. 20 ф.

**ВОСКѢТЪ**. Группы кустовъ или деревь.

**ВОССІЕА (Bossiea)**. Натуралистъ *Боссе Ламартиеръ* (Bossier Lamartinière)—сопровождалъ въ кругосвѣтномъ путешествіи Лаперуза. С. бобовыхъ. (34). Австралія. Оранж. куст. рр. Черенками



изъ полувызрѣвшаго роста, подъ стекломъ, въ апрѣлѣ. Глин. дернов. съ торф. и пескомъ. Сѣять въ мартѣ, въ умѣр. теплотѣ. Темп. лѣтомъ 13—19, зимой 4—8°.

**В. дистиха** (*B. disticha*, двустрочная). Лебяжья рыба. Цв. желтые, съ марта до мая. 1½ ф. **В. линнѣоидея** (*B. linnaeoides*, похожая на Линнѣю). Австралія. Цв. желтые, въ маѣ. Р. стелющиеся. **В. линофилля** (*B. linophylla*, съ лл. льна). Австралія. Цв. оранжевые съ пурпуровымъ, съ іюля до августа. 1—4 ф. **В. ромбифолія** (*B. rhombifolia*, съ ромбическими лл.). Австралія. Цв. желтые, въ апрѣлѣ. 1—3 ф. Спн. **В. лентикюларисъ** (*B. lenticularis*).

**ВОССІЯ** (*Boscia*). Луи Боскъ (*Bosc*) франц. проф. земледѣлія С. каперцовыхъ. Тепл. куст. рр. Волокн. глин. дерн. съ торф. Черенками изъ вызрѣвшаго роста, въ пескѣ, теплѣ, подъ стекломъ. Темп. лѣтомъ 13—21, зимой 12°.

**В. сенегалензисъ** (*B. senegalensis*, сенегальская). Сенегаль. Цв. мелкіе, бѣлые. 3 ф.

**ВОСТРИХЪ**. Жучокъ, гусеница котораго живетъ въ заболони хвойныхъ деревьевъ.

**ВОТАНИКА**. Наука о растеніяхъ.

**ВОТАНИЗИРОВАТЬ**. Искать и собирать растенія для ихъ изученія.

**ВОТВА**. Зелень, —стволь и листья травяныхъ растеній; у хлѣбныхъ она зовется соломой, у гороха, бобовъ и фасоли — тѣлою, или кѣтиной, у лука, чеснока — перомъ, у капустъ — качаномъ или кочнемъ, либо выломъ.

**ВОТРИХІУМЪ** (*Botrychium*). *Botrys* — кисть, вѣтвь, по расположенію споробиделии. С. папоротниковъ. (10—12). Сбв. полушаріе. Песчан. дерн., сильная.

**В. виргиніанумъ** (*B. virginianum*, виргинскій). Орегонъ и С. Америка. Вѣт. дельтовидный, перистый. 4—12 д. **В. люкарія** (*B. lunaria*, луковидный), *Ключъ-травка*. С. Европа. Пенекъ длин. 1—4 д., безплодный сегменты длин. 1—3 д., шир. ½ до 1 д., съ клиновидно-щитовидными раздѣлами, плодосн. вѣтка той-же величины, съ метелкой споробиделии. **В. тернатумъ** (*B. ternatum*, тройчатый). Нутка и Гудзоновъ зал. Пенекъ 1—2 ф.; вѣт. дельтовидная, четырехперистая; плодосносный стебелекъ длин. въ 6—9 д., съ дельтовидной метелкой. Р. оранжевое.

**БОУЭНІЯ** (*Bowenia*). Боуэнъ (*Bowen*) — губернаторъ Куинсленда. С. цикадей. (2). С.-З. Австралія. Оранж. рр. похожий на папоротники. Уходъ какъ за Цикаста.

**В. спектабилисъ** (*B. spectabilis*, крапивоая). Куинслендъ, Австралія. Лл. дву-

ристо-раздѣч., стебель низкій, толстый, цилиндрическій. Цв. шипками. У разновидности *serregulata* (serregulata) края раздѣловъ листьевъ зазубненные.

**БОУЦЕРОЗІЯ** (*Boucerosia*) *Boukeros* — съ бычьими рогами, по закривленнымъ лопастямъ воротничка (коронки). С. ласточниковыхъ. (12). Остиндія, Аравія, С. Африка, Южн. Персія, Сицилія. Оранж. сочн. рр., сродныя со *Stapelia*. Черенки предварительно обсушить съ нижнихъ концовъ. Песчан. дерн., съ толченымъ кирпичемъ и черенками; при развиги — поверхностное удобрение коровьимъ перегноемъ или жидкое удобрение. Темп. зимой 3—8, при сухомъ содержаніи, лѣтомъ 12—22° — при влажномъ.

**В. марокканъ** (*B. marocana*, марокканская). Марокко. Цв. красно-пурпуровые, темные съ желтыми концентрическими линіями. 4 д.

**БЕОФОРТІЯ** (*Beaufortia*). Въ честь герцогини Маріи Бефоръ (*Beaufort*). С. миртовыхъ. (12). Западн. Австралія. Оранж. куст. рр. Черенками изъ полувызрѣвшаго роста, въ пескѣ, безъ нагрѣванія. Глин. дерн. съ торф. Темп. лѣтомъ 8—12, зимой 3—7°.

**В. пурпуреа** (*B. purpurea*, пурпуровая). Запад. Австралія. Цв. ярко-шарлаховые. Спн. *B. splendens* (*B. splendens*).

**БОЧКА**. — Деревянная посуда, состоящая изъ *ладокъ* или *кадокъ*, связанныхъ обручами, двухъ *донъ*, врезанныхъ въ *утро*. Въ просверленную дыру вставляется *кранъ* (вертокъ) или она закрывается *зводомъ*; въ водовозной бочкѣ прорѣзывается еще *наливъ*. Бочка мѣрная содержитъ 40 ведеръ.

**БОЯРЫШНИКЪ** обшчн. и сибирскій. См. Кратѣгусъ.

**БРАВЕЙОМЪ** (*Brabeium*). *Brabeion* — скипетръ, по расположенію цвѣт. С. протейныхъ. Оранж. дер. Уходъ какъ за Банксія.

**В. стеллятифоліумъ** (*B. stellatifolium*, съ лл. звѣздочками). М. Д. Н. Цв. бѣлые пахучіе, въ августѣ. Лл. кольчатые. 15 ф.

**БРАВІНСКОЕ** яблоко. См. Бравинское. *В. бѣлое* — похоже на бравинское обшчн., но безъ румянца.

**БРАВОА** (*Bravoa*). *Bravo* (*Bravo*) — мексиканскій ботаникъ. С. амариллисовыхъ. (3). Мексика. Оранж. или полувыносливыя лукович. рр. Отпрысками. Легкая, рыхлая, глин. дерн. Темп. лѣтомъ 13—22, зимой 6—10°.

**В. геминифлора** (*B. geminiflora*, двувѣтковая). Мексика. Цв. ярко-оранжевые, въ іюль.

**БРАТЕА** или **БРАХЕА** (*Brahea*).

*Тихо Браге* (*Tycho Brahe*) — знаменитый астрономъ. С. пальмъ. (4). Мексика, Техасъ. Теплич. Сѣменами, привозимыми съ родины. Сильная легкая глин. дерн. съ волокн. торф. Темп. лѣтомъ 15—24, зимняя 13—17°.

**В. дѣльцисъ** (*B. dulcis*, сладкая). Мексика. Лл. почти округлые, съ черенками пушистыми и съ шипами, пень толстый.

**БРАЗИЛЕТТА**. См. Цезальпинія.

**БРАЗИЛЬСКОЕ САНДАЛЬНОЕ ДЕРЕВО**. См. Цезальпинія.

**БРАЛЬНИКЪ БРАЛЬНИЦА**. Снарядъ для снѣтня съ дерева плодовъ (яблокъ, грушъ), тоже что бирка.

**БРАНДУШКИ**. См. Орнитогалумъ.

**БРАССАВОЛА** (*Brassavola*) *Brassavola* (Brassavola) — венеціанскій ботаникъ. С. орхидей. (20). Троп. Америка. Тепл. рр. Дѣленіемъ. Торф. съ черенками и торф. мохомъ, но лучше — на чуркахъ. Темп. лѣтомъ 17—26, лѣтомъ 10—15°.

**В. венѣза** (*B. venosa*, съ жилками). Гондурасъ. Цв. мелкіе, бѣлые, губа съ жилками. **В. Гиббсiana** (*B. Gibbsiana*, Гиббса). Цв. бѣлые съ покладными пятнами. **В. глянѣка** (*B. glauca*, сизая). Вера-Круизъ. Цв. желтые, рано весной. 1 ф. **В. Дигбайяна** (*B. Digbyana*, Дигбея). Гондурасъ. Цв. бѣлые, губа съ пурпуровымъ пятномъ, зимой. 9 д. **В. линейата** (*B. lineata*, линейная). Южн. Америка. Цв. крупные, бѣлые, душистые.

**БРАССІКА** (*Brassica*) — название, употребленное Плиніемъ, происходящее отъ кельтскаго *bresic*, что означаетъ капусту. С. крестоцвѣтныхъ. (80). Европа, Азія, Африка. Полезнѣйшая въ нашемъ обиходѣ огородная рр. Посѣвъ въ парникъ или тепличкѣ весной; всходы рассадить на гряды.

**В. олерacea** (*B. oleracea*, огородная). Зап. Европа. Цв. желтые, большіе, въ маѣ — іюнь. 1—3 ф. Образовала разновидности, имѣющія, каждая, многочисленныя формы, составляющія сорта, а именно: *анѣфала* (acerphala) — *браунколь*, *кудрявая капуста*; *аспарагоидея* (asparagoides) — *брокколи* или *спаржевая капуста*; *ботритисъ* (botritis) — *цвѣтная капуста*; *капитата* (capitata) — *кочанная капуста*; *булліята* (bulbifera) — *пальмеобразная капуста*; *каулорана* (caulorapa) — *коляба* *сверхъ земли*; *фруктѣоза* (fruticosa), *кустовая капуста*; *геммифера* (gemmifera) — *бросселевская* или *широколистная*; *сабауда* (sabauda) — *булліята* *взрѣвшая* или *зеленая капуста*. **В. рапа** (*B. rapa*, Туринскій). *Брокколи*. **В. напусъ** (*B. napus*). *Рпа*.

Послѣдніе два корнеплодные вида, кроме

признаковъ листьевъ, имѣютъ весьма много общаго и причисляются некоторыми къ той же типической формѣ.

Для всѣхъ капустныхъ рр. — земля сильная, удобренная, для корнеплодныхъ больше глубокая. Рр. оставляемая на смена сохраняются зимою въ защитѣ отъ мороза.

**БРАССІЯ** (*Brassia*). *Brassia* (Brass) — англійскій коллекторъ. С. орхидей. (20). Троп. Америка. Тепл. рр. Волокн. дерн., хороший дренажъ. Темп. та же, что для *Brassavola*. Дѣленіемъ.

**В. антеротесъ** (*B. antherotes*, великолѣпная). Троп. Америка. Цв. желтые съ коричневыми полосками. **В. каудата** (*B. caudata*, съ хвостомъ). Вестиндія. Цв. желтые съ коричневыми полосками, губа съ зеленоватыми крапинками. 1 ф. **В. Лансаяна** (*B. Lancesana*, Ланса). Суринамъ. Цв. желтые съ коричневыми крапинками. 9 д. **В. макулата** (*B. maculata*, пятнистая). Ямайка. Цв. желтые съ коричневыми пятнами. Рано весной.

**БРАТСТВО. ОДНО-МНОГО-БРАТСТВО**. Сропаніе питей тычинокъ въ одинъ или нѣсколько пучковъ.

**БРАУНКОВЪ**. См. Брасника.

**БРАХІЗЕМА** (*Brachysema*). *Brachys* — короткій, *sema* — флагъ; флагъ у цв. очень малъ. С. бобовыхъ. (14). Австралія. Оранж. цѣвкія рр. Сѣять въ мартѣ, въ теплѣ. Черенками изъ полувызрѣвшаго роста, лѣтомъ, въ пескѣ, подъ стекломъ. Глин. дерн. съ торф. и малымъ количествомъ песку. Темп. лѣтомъ 8—15, зимой 6—8°.

**В. латифоліумъ** (*B. latifolium*, широколистная). Австралія. Цв. шарлахово-малиновые, въ апрѣлѣ.

**БРАХІКОМЕ** (*Brachycome*). *Brachys* — короткій, *come* — волосъ. С. сложноцвѣтныхъ. (40). Австралія, Новая Зеландія, южная Америка. Полувыносливая много или однол. рр., покрытая волосками. Сѣять въ умѣр. парникѣ, въ мартѣ.

**В. иберидифолія** (*B. iberidifolia*, съ лл. ибериса). Австралія. Цв. головки бѣлыя или голубыя, съ темною серединою, лѣтомъ и осенью. 1 ф.

**БРАХИЛЕНА** (*Brachylaena*). *Brachys* — короткій и *laena* — покровъ, по коротко-листной оберткѣ. С. сложноцвѣтныхъ. (6). Юж. Африка. Оранж. куст. рр. Черенками съ полувызрѣвшимъ ростомъ, въ пескѣ, подъ стекломъ. Глин. дерн. съ торф.

**В. нерифолія** (*B. nerifolia*, съ лл. олеандра). М. Д. Н. Цв. головки желтыя, въ августѣ до ноября. 2 ф.

**БРАХИСПАТА** (*Brachyspatha*). *Brachys* — короткій, *spatha* — чехоль. С. аро-



идей. Темл. клубневый многол., уходъ за которыми такой же, какъ за Аморфофаллюсомъ.

**В. вариабиліс** (*V. variabilis*, измѣнчивая). Индія. Цв. пахнутъ отвратительно, по короткое время; чехолъ зеленовато-пурпуровый, початокъ почти бѣлый. 3 ф.

**БРАХИСТЕЛМА** (*Brachystelma*). *Brachys* — короткій, *stelma* — коронка. С. ласточниковыхъ. Оранже. клубневый многолѣтній рр. съ М. Д. Н. Черенками въ песокъ и теплѣ; дѣленіемъ корней. Волокн. глин. дерн. Темп. лѣтомъ 13—19, зимой 7—11°.

**В. туберозумъ** (*V. tuberosum*, клубневый). Цв. пурпуровые, въ июль. 1½ ф.

**БРАХИХИТОНЪ** (*Brachychiton*). *Brachys* — короткій, *chiton* — панцирь, рр. покрыты чешуйками и пастельными волосками. С. стержневыхъ. (6) Австралія. Черенками изъ молодого роста, въ песокъ, подъ стекломъ. Глин. дернов.

**В. Видвильліи** (*V. Bidwillii*, Бидвилли). Австралія. Цв. ярко-красные.

**БРАХИОТУМЪ** (*Brachyotum*). *Brachys* — короткій, *otos* — ухо, по придатку при основаніи пыльниковъ. С. черноустовыхъ. Оранже. куст. р., по уходу схожее съ Плеромомъ.

**В. конфертумъ** (*V. confertum*, скученный). Перу. Анды. Цв. пурпуровые, въ ноябрь.

**БРЕДІЯ** (*Bredia*). Проф. Ванъ-Бредъ (*Van-Bred*). С. черноустовыхъ (1). Оранже. кустъ. Разн. черенками съ вырѣзаннымъ ростомъ, въ песокъ, подъ стекломъ, въ теплѣ, или сѣменами. Глин. дерн съ листов. и торф.

**В. хирзута** (*V. hirsuta*, волосатая). Японія. Цв. розово-малиновые, осенью.

**БРЭЙНІЯ** (*Brainea*). *Brayne* (*Braine*) садовладѣлецъ въ Гонконгѣ. С. папоротниковыхъ (1). Китай тепл.

**В. insignis** (*V. insignis*, замѣчательный). Гонг-Конгъ, Ванъ длиною 2—3 ф., шир. 8—12 д., перистый.

**БРЭКСІЯ** (*Brexia*). *Brexia* — дождь: большіе лл. защищаютъ отъ дождя. С. камеломковыхъ. (2). Мадагаскаръ. Темл. древ рр. Черенками съ полувызрѣвшимъ ростомъ, въ песокъ, подъ стекломъ, на тепломъ грунтѣ. Песчанисто-торф. съ добавленіемъ ½ глин. дерн. Темп. лѣтомъ 13—20, зимой 8—10°.

**В. мадагаскаріензисъ** (*V. madagascariensis*, мадагаскарская). Мадагаскаръ. Лл. продолговато-яйцевид. Цв. зеленоватые. 20 ф.

**БРИЛАНТЕЗІЯ** (*Brillantaisia*). Ботаникъ *Brillante* (*Brillantaisia*). С. акантовыхъ. (8). Троп. Африка, Мадагаскаръ. Теплич. низкіе куст. рр. Уходъ какъ за Барлеріей.

**В. оваріензисъ** (*V. ovariensis*, оваріенская). Зап. Африка. Цв. фиолетово-голубые, въ мартѣ, 3 ф. Р. походить на большой величии Сальвіа.

**БРИЦА** (*Briza*) — поникать, клониться ко сну. С. злаковъ (10). Европа, Азія, С. Африка. Сѣменами, въ обычныхъ земляхъ.

**В. максіма** (*V. maxima*, большая). Юж. Европа. Колоски продолговато-сердцевидные, въ июль — июль. 1½ ф. **В. медіа** (*V. media*, средняя). *Клоннезъ*. Сѣв. и Средняя Европа. Колоски широко-овальные, въ июль. 1 ф. **В. миноръ** (*V. minor*, малая). Сред. и Сѣв. Европа. Колоски трехугольные, въ июль — июль. 8 д. Снп. *В. gracilis* и *minima* (*V. gracilis*, *V. minima*).

**БРИАНТУСЪ** (*Bryanthus*). *Bryon* — мохъ и *anthos* — цвѣтокъ. С. вересковыхъ. (3). С. З. Америка, В. Сибирь. Низкорослые кустарнички. Разн. обычно отводкой, осенью, или черенками подъ стекломъ. Песчан. торф. съ небольшимъ количествомъ глин. дерн.

**В. эмпетриформисъ** (*V. empetriformis*, похожий на Эмпетрумъ). С. З. Америка. Цв. красновато-пурпуровые. 6 д. **В. Гмелини** (*V. Gmelini*, Гмелина). Камчатка, Беринговъ прол. Цв. красные, 2—3 д.

**БРИОНИЯ** (*Bryonia*). *Bryo* — воспроизводитъ, вслѣдствіе образованія клубня въ одно лѣто С. тыквенныхъ. (7). Европа, Канарскіе о. Многол. клубневый трав. рр. съ вьющимися стеблями. Вьюсливые виды хороши для оранжерей палатеръ, темл. воспитываются въ горшкахъ и расправляются по шпаламъ. Сильная глин. дерн. Сѣменами или дѣленіемъ клубня.

**В. діюика** (*V. dioica*, двудомная). Европа. Цв. темноватые, въ май до сентября. Плоды красные. Воздушное. **В. лацциноза** (*V. laeiniosa*, съ разрывными лл.). Цейлонъ. Цв. желтые, въ июль; плоды красные съ большими полосками. Тепличное.

**БРИОФИЛЛЮМЪ** (*Bryophyllum*). *Bryo* — производитъ и *phyllon* — листь; рр. вырастаютъ изъ корешковъ, пробивающихся на краѣ листьевъ. С. топашиковыхъ. (4). Темл. рр. Сильная глин. дерн. Въ горшкахъ. Темп. лѣтомъ 13—83°, зимой 8—13°.

**В. калицидумъ** (*V. calycinum*, чашечный). Индія. Цв. желто-красные, въ апрѣль. 2—3 ф. Воспитывается какъ замѣчательность.

**БРИЯ** (*Brya*). *Bryo* — воспроизводитъ; сѣмена произрастаютъ до опаденія съ дерева. С. бобовыхъ. Темл. куст. р. Сѣменами и черенками въ парникѣ. Сильная, волокнистая глин. дерн. Темп. лѣтомъ 13—24°, зимой 8—10°.

**В. эбенусъ** (*V. ebenus*, эбенное дере-

во). Вестиндія. Цв. ярко-желтые, въ июль — августъ. 12—14 ф.

**БРОВАЛЛІЯ** (*Browallia*). Юганъ *Броваль* (*Browall*), епископъ въ Або, защищающій систему Линнея отъ Зигесбека. С. поричниковыхъ. (6). Троп. Америка. Однол. оранже. Сѣять въ умеренномъ теплѣ въ апрѣль. Рыхлая, сѣнная земля.

**В. грандифлора** (*V. grandiflora*, крупноцвѣтная). Перу. Цв. бѣлые съ лиловатымъ оттѣнкомъ, въ июль, 1—3 ф. **В. демисса** (*V. demissa*, низкая). Панама. Цв. бѣло-голубые, иногда красные или пурпуровые, въ июль. 6 д. до 1 ф. **В. Жемсони** (*V. Jamesoni*, Жемса). Нон. Гренада. Цв. ярко-оранжевые, въ июль, 4 ф. **В. элата** (*V. elata*, высокая). Перу. Цв. темно-голубые, въ июль. 1½ ф.

**БРОДІЕА** (*Brodiaea*). *Бродай* (*Brodie*) — шотландскій ботаникъ. С. лилейныхъ. С. и вѣтроп. Ю. Америка. Оранже. лукович. рр., размножаемы отпрысками. Песчанисто торф. Темп. лѣтомъ 13—17, зимой 3—5°.

**В. грацилис** (*V. gracilis*, изящная). Калифорнія. Цв. темно-желтые съ коричневыми жилками, въ июль. 3—4 д. **В. грандифлора** (*V. grandiflora*, крупноцвѣтная). С. Америка. Цв. сине-пурпуровые, лѣтомъ. 1½ ф. **В. капitata** (*V. capitata*, головчатая). Калифорнія. Цв. темно-фиолетовые, въ май. 1—2 ф. **В. кокцинея** (*V. coccinea*, шарлаховая). Калифорнія. Цв. съ кроваво-красной трубкой и желтыми сегментами, въ июль. 1½ ф. **В. конгеста** (*V. congesta*, густо-головчатая). Георгія. Цв. голубые, лѣтомъ. 1 ф. Есть разновидность *альба* (*alba*) съ бѣлыми цвѣтами. **В. лактеа** (*V. lactea*, млечно-бѣлая). Калифорнія. Цв. бѣлые, въ июль. 1 ф. **В. мультифлора** (*V. multiflora*, многоцвѣтная). Калифорнія. Цв. сине-пурпуровые, въ май. 1—1½ ф.

**БРӨККОЛИ**. См. Брассика.

**БРОМГЕДІЯ** (*Bromheadia*). Сэръ Эд. Финчъ *Бромедъ* (*Bromhead*). С. орхидей. Теплич. Отпрысками. Черенки съ мохомъ и пескомъ. Горшокъ съ растеніемъ ставится въ плошку, въ которую наливается вода. Темп. лѣтомъ 8—13, зимой 4—8°.

**В. палиюстрисъ** (*V. palustris*, болотная). Сингапуръ. Цв. бѣлые, губа съ пурпуровыми черточками, въ июль. 2 ф.

**БРОМЕЛІЕВЫЯ** рр. См. ананасовыя.

**БРОМЕЛІЯ** (*Bromelia*). *Бромель* (*Bromel*) — шведскій ботаникъ. С. бромеліевыхъ. (5). Троп. Америка. Темл. многол. трав. рр. Отпрысками. Сильная глин. дерн. съ хорошимъ дренажемъ. Темп. лѣтомъ 13—24, зимой 8—12°.

**В. биколоръ** (*V. bicolor*, двуцвѣтная)

Цв. Цв. шарлаховые, въ мартѣ. Снп. *В. Жуанвиллеи* и *Питкернцевой* (*V. Joinvillei*, *V. Pitcairniaefolia*). **В. брактеата** (*V. bracteata*, съ красными прицвѣтниками). Ямайка. Цв. малиновые, въ сентябрь. 2 ф. **В. Фернанде** (*V. Fernandae*, Фернанда). Пара. Цв. желтоватые, въ июль. 2—3 ф.

**БРОМУСЪ** (*Bromus*). *Bromos* — по гречески — дикий овесъ. С. злаковъ. (40). По всей земной поверхности. Сѣменами, весной, въ обычныхъ земляхъ.

**В. брицеформисъ** (*V. brizaeformis*, похожий на Бризу). Ср. Европа. Двухлѣтняя трава съ поникшими колосками, выш. въ 2 ф. Колоски немного крупнее, чѣмъ у *Briza maxima*.

**БРӨНЗОВКА** (*Cetonia*). Жукъ блестящаго зеленого цвѣта, объѣдающій цвѣты на плодовыхъ деревьяхъ.

**БРОНЪЯРТІЯ** (*Brongniartia*). Адольфъ *Броньяръ* (*Brongniart*) — знаменитый французскій ботаникъ. С. бобовыхъ. Оранже. полукуст. рр. Черенками въ песокъ, подъ стекломъ, изъ молодого роста. Песч. дерн. и волокн. торф. Темп. лѣтомъ 8—13, зимой 3—7°.

**В. подалириойдесъ** (*V. podalyrioides*, похожая на Подалирію). Новая Испанія. Цв. пурпуровые, крупные, въ сентябрь. 1 ф. **В. серицеа** (*V. sericea*, шелковистая). Мексика. Цв. пурпуровые, въ сентябрь. 1 ф.

**БРОСИМУМЪ** (*Brosimum*). *Brosim* — съдобный, по плодамъ. С. крапивныхъ. (8). Тропич. Америка. Темл. куст. и древ. рр. Черенками изъ вырѣзаннаго роста, въ теплому грунтѣ, въ песокъ. Волокнистая глин. дерн. Темп. лѣтомъ 13—20, зимой 8—10°.

**В. Аликастумъ** (*V. Alicastum*). Ямайка. Цв. — сережки шаровидныя; лл. овально-ланцетовидные. 6 ф.

**БРОУНЕА** (*Brownea*). Патрикъ *Броунъ* (*Browne*) — докторъ, авторъ „Исторіи Ямайки“. С. бобовыхъ. (8). Троп. Америка. Теплич. куст. рр. Черенками изъ вырѣзаннаго роста, въ песокъ, подъ стекломъ, на сильномъ теплѣ. Глин. дерн. и торф. Темп. лѣтомъ 13—23, зимой 8—10°.

**В. Арица** (*V. Aryza*). Колумбія. Цв. самого яркаго шарлахового цвѣта, большіе, лѣтомъ. 20—40 ф. **В. грандисеръ** (*V. grandisera*, крупно-головая). Каракасъ. Цв. красные, большими колосками, въ июль. 10—20 ф. **В. кокцинея** (*V. coccinea*, шарлаховая). Венецуела. Цв. шарлаховые, съ июля по августъ. 6—10 ф. **В. макрофилля** (*V. macrophylla*, крупнолистая). Центр. Америка. Цв. красные, въ густыхъ головкахъ до 3 ф. въ окружности. **В. рацемоза** (*V. racemosa*, кистевая). Каракасъ. Цв. розовые, кистями, въ июль. 8 ф.



**БРОУТОНІЯ** (*Broughtonia*). Артуръ *Броутонъ* (*Broughton*)—англійскій ботаникъ. С. орхидей. (4). Вестиндія. Тепл. эпифиты. Дѣленіемъ. Или на чуркахъ, или въ горшкахъ на черенкахъ съ волокнист. торф. Лѣтомъ—высокая темп. и влажный воздухъ, зимой—ниже и суше. Темп. лѣтомъ 16—24, зимой 10—15°.

**В. сангвінеа** (*B. sanguinea*, кроваво-красная). Ямайка. Цв. кроваво-красные, лѣтомъ. 1½ ф.

**БРОУНЛОВІЯ** (*Brownlowia*). Леди *Броунлоу* (*Brownlow*)—дочь сэра Юма, покровительствовавшая ботаники. С. лиственных. Тепл. древ. рр. Черенками изъ вызрѣваго роста, въ теплѣ. Сильная гни. дерн. Темп. лѣтомъ 13—20, зимой 7—10°.

**В. элата** (*B. elata*, высокая). Индія. Цв. желтые, въ маѣ, 60 ф.

**БРУНКРЕСЪ** (*C. Пастурциумъ*).

**БРУНИЙНЫЯ** (*Bruniaceae*). Верескообразные, сильно развѣтвленные кустарники съ мелкими листьями. Типическій родъ—*Брунія*.

**БРУНІЯ** (*Brunia*). *Ле-Брюнъ* (*Le Brun*),—голландецъ, путешественникъ по Востоку. С. брунійныхъ (10). Юж. Африка. Оранж. куст. и полукуст. рр. Черенками изъ молодого роста въ песокъ, подъ стекломъ, лѣтомъ. Песчан. торф. Темп. лѣтомъ 1—15, зимой 3—8°.

**В. нодиофлора** (*B. nodiflora*, съ пониклыми цв.). М. Д. Н. Цв. бѣлые, въ июлѣ. 1—3 ф.

**БРУНОНІЯ** (*Brunonia*). Робертъ *Брунъ* (*Brown*),—знаменитый въ свое время ботаникъ. С. гуденовскихъ (1). Австралія. Оранж. многол. трав. р. Размнож. дѣленіемъ рано весной. Переной съ лист. или торф. и малымъ количествомъ глин. дерн.

**В. аустралис** (*B. australis*, южная). Австралія. Цв. голубые. 1 ф.

**БРУНОВІЯ** (*Brunsvigia*). По династіи *Браунсвейга*. С. амариллисовыхъ. (8). Юж. Африка. Луков. оранж. или полувыносливыя рр. Опирысками. Глин. дерн. съ волокн. торф. Можно на лѣто высаживать на воздухъ.

**В. Жозефина** (*B. Josephinae*, Жозефины). М. Д. Н. Цв. шароховые. 1½ ф. **В. Купера** (*B. Cooperi*, Купера). М. Д. Н. Цв. сѣрно-желтые съ красными краями. 1½ ф. **В. мультифлора** (*B. multiflora*, многоцвѣтная). М. Д. Н. Цв. красные. 1 ф. **В. токсикарія** (*B. toxicaria*, ядовитая). М. Д. Н. Цв. малиновые, въ сентябрѣ. 1 ф. **В. фальската** (*B. falcata*, серповидная). М. Д. Н. Цв. красные, въ маѣ. 9 дюйм.

**БРУСНИКА**. См. *Вакциниумъ*.

**БРУСНИЧНЫЯ** (*vacciniaceae*). Куст. или низкорослыя древ. рр., часто эпифиты, обычно изъ сѣв. умѣр. пояса, но попадающіеся въ южн. Америкѣ и Индіи, а также въ Азіи, Африкѣ, на Мадагаскарѣ и въ Австраліи. Всѣхъ родовъ 26, а видовъ около 320. Изъ родовъ наиболѣе замѣчательны: *Вакциниумъ*, *Кавендишия*, *Таммисія*, *Темистоклея* и *Тибодія*.

**БРУНФЕЛЬСІЯ** (*Brunfelsia*). Отто *Брунфельс* (*Brunfels*), картузіанскій монахъ—врачъ, издавшій въ 1530 г. первые рисунки рр. С. поричниковыхъ (20). Юж. Америка, Вестиндія. Тепл. куст. рр. Черенками въ песокъ и теплѣ. Сильная, глин. дерн. волокнистая. Темп. лѣтомъ 13—20, зимой 8—10°.

**В. акумината** (*B. acuminata*, съ острокопечными лл.). Рио-жанейро. Цв. розово-фіолетовые, въ апрѣлѣ. 1—2 ф. **В. американа** (*B. americana*, американская). Вестиндія. Цв. сначала желтые, потомъ бѣлые, очень душистые, въ июлѣ. 4 ф. **В. калицина** (*B. calycina*, кашневидная). Бразилія. Цв. пурпуровые, почти круглый годъ. 2 ф. **В. Линденіана** (*B. Lindeniana*, Линденова). Бразилія. Цв. ярко-пурпуровые. **В. хидрангеоформисъ** (*B. hydrangeaeformis*, похожая на *Хидрангею*). Бразилія. Цв. красивые розово-фіолетовые, въ апрѣлѣ. 1—3 ф.

**БРУССОНЕЦІЯ** (*Broussonetia*). *Бруссонетъ* (*Broussonet*)—франц. натуралистъ. С. крапивныхъ. (3). Малайск. архип., Китай, Японія. Въ общемъ эти рр. походятъ на тутовые деревья. Хорошая обыкновен.; побѣгами и черенками изъ вызрѣваго роста, осенью въ холод. оранж. или сѣменами, весной на воздухъ.

**В. папирифера** (*B. papirifera*, производящая бумагу). Китай. Цв. зеленоватые, въ маѣ; лл. лопастные, большіе. 10—20 ф. Вынослива въ умѣренномъ климатѣ.

**БРЮСЕА** (*Brucea*). Джемсъ *Брюсъ* (*Bruce*)—путешественникъ по Африкѣ. С. симарубовыхъ. (5). Троп. Азія, Африка, Австралія, Индія. Черенками съ вызрѣваго роста въ песокъ, подъ стекломъ, на тепломъ грунтѣ. Темп. лѣтомъ 12—20, зимой 8—10°.

**В. суматрана** (*B. sumatrana*, съ Суматры). Суматра. Цв. темнопурпуровые, въ маѣ. 20 ф.

**БУВАРДІЯ** (*Bouvardia*). Шарль *Буваръ* (*Bouvard*)—директоръ парижскаго *Jardin du Roi*. С. мареновыхъ (26). Мексика, Гватемала. Нов. Гренада. Оранж. полукуст. рр. Сѣменами въ теплѣ. Черенками изъ молодого роста и корней весной, въ теплѣ. Рыхлая волокн. Темп. лѣтомъ 8—17, зимой 6—10°.

**В. ангиустифолія** (*B. angustifolia*, узко-

лиственная). Мексика. Цв. блѣдно-розовые, въ сентябрѣ. 2 ф. **В. жасминифлора** (*B. jasminiflora*, съ цв. жасмина). Ю. Америка. Цв. бѣлые, душистые, зимой. **В. лейанта** (*B. leiantha*, гладко-цвѣтная). Мексика. Цв. шароховые, съ июля до ноябля. 2 фута. **В. лонгифлора** (*B. longiflora*, длинноцвѣтная). Мексика. Цв. бѣлые. 2—3 фута. **В. трифилла** (*B. triphylla*, трехлиственная). Мексика. Цв. шароховые, въ июлѣ. 2—3 ф. **В. флыва** (*B. flava*, желтая). Мексика. Цв. желтые, пониклые, въ маѣ. 2 ф.

Кромѣ этихъ, въ садахъ возмѣшивается очень много разновидностей какъ съ простыми, такъ и съ махровыми цв.

**БУГЕЙНВИЛЬДЕЯ** (*Bougainvillea*). *Бугейвилль* (*Bougainville*)—французскій мореплавателъ. С. ночевѣтныхъ. (8). Тропич. Америка. Черенками въ песокъ, на нагрѣтомъ грунтѣ. Песчан. волокнист. дернов. Темп. лѣтомъ 13—19, зимой 8—12°.

**В. глѣбра** (*B. glabra*, гладкая). Бразилія. Цв. метелкой съ розовыми острокопечными прицвѣтниками, самые цв.—желтые. Лѣтомъ. **В. спекіоза** (*B. speciosa*, особенная). Бразилія. Прицвѣтники большіе, сердцевидные, лилово-розовые; цв. желтые, съ марта до іюня.

**БУДДЕЛЕЯ** (*Buddleia*). Адамъ *Буддей* (*Buddle*)—его собраніе сухихъ растений хранится въ Британскомъ Музѣ. С. догакіевыхъ. (70). Троп. Азія, Африка и Америка. Тепл. или оранж., либо полувыносливыя куст. рр. Черенками изъ вызрѣваго роста, подъ стекломъ, въ сентябрѣ.

**В. азіатика** (*B. asiatica*, азиатская). Индія. Цв. бѣлые, душистые, въ августѣ 3 ф. Тепличная. **В. глобоза** (*B. globosa*, шаровидная). Чили. Цв. красно-пурпуровые. 15—20 ф. Полувынослива.

**БУЗИНА**. См. *Самбукъ*.

**БУКАШНИКЪ**. См. *Язіоне*.

**БУКВИЦА БѢЛАЯ**. См. *Примула*.

**БУКЛАНДІЯ** (*Bucklandia*). *Букландъ* (*Buckland*)—деканъ вестминстерскаго собора, а потомъ профессоръ геологій въ оксфордскомъ университетѣ. С. двоимѣстниковыхъ. (2). Гималаи, Суматра. Оранж. древ. рр. Черенками изъ вызрѣваго роста, въ песокъ, подъ стекломъ, въ умѣренномъ теплѣ. Песчанисто-дерн. съ торф. и листов.

**В. популнеа** (*B. populnea*, похожая на тополь). Гималаи. Лл. блѣдно-зеленые, 100 ф.

**ВУКСУСЪ** (*Buxus*). *Вукносъ*—плотный, по древесности. С. малочисленныхъ. (19). Южн. Европа и вообще страны сѣвернаго полушарія. Оранжевые, а въ умѣрен-

номъ климатѣ воздушныя куст. рр. Сѣменами, какъ только созрѣютъ; черенками съ молодымъ ростомъ, осенью; отводками; наконецъ—дѣленіемъ.

**В. балеарика** (*B. balearica*, балеарскій). Южн. Европа. Лл. зеленовато-желтые, продолговато-эллиптич., кожистые. 15—20 ф. **В. семпервиренс** (*B. sempervirens*, всегда зеленый). *Самшитъ*. *Пальмовое дерево*. Ю. Европа, Кавказъ. Лл. продолговато-линейные, выпуклые, кожистые, глянцевитые. Имѣетъ много разновидностей.

**ВУКЪ**. См. *Фагусъ*. **В. бѣлый**. См. *Карпинусъ*.

**БУЛАВАСТЫЙ**. Имѣющій округленную форму набадашиника, головки.

**БУЛЕВАРЪ**. **БУЛЬВАРЪ**. Убитая возвышенная дорожка для пешеходовъ, обсаженная деревьями, кустами и цвѣтами.

**БУЛЬБИНЕ** (*Bulbine*) *Bolbos*—луковица. С. липейныхъ. (20). Юж. Африка. Травянистыя или луков. оранжевой или полувыносливыя рр. Дѣленіемъ и отпрысками. Для оранжер. темп. лѣтомъ 8—17, зимой 3—6°.

**В. алоидесъ** (*B. aloides*, алоидное). М. Д. Н. Цв. желтые. 1 ф. Спн. *Антерикумъ алоидесъ* (*Anthericum aloides*). **В. аннуа** (*B. annua*, однолѣтнее). М. Д. Н. Цв. желтые, въ маѣ—июнѣ. Самый выносливый видъ. **В. каулесценсъ** (*B. caulescens*, имѣющій стебель). М. Д. Н. Цв. желтые, въ маѣ. Спн. *В. фрутесценсъ* (*B. frutescens*).

**БУЛЬВОКОДУМЪ** (*Bulbocodium*). *Bolbos*—луковица, *kodion*—шерсть, по крову луковицы. С. лисичныхъ. (1). Испанія. Р. похожее на *Крокъ*. Черезъ каждые два года пересаживать на новое мѣсто. Песчан. дернов. Размнож. дѣтками.

**В. вернумъ** (*B. vernum*, весенній). Испанія. Цв. пурпурово-фіолетовые съ бѣлыми погонками, рано весной. 4—6 д. Есть разновидность съ пестрыми лл.

**БУЛЬБОФИЛЬЮМЪ** (*Bulbophyllum*). *Bolbos*—луковица, *phyllon*—листь; лл. выходятъ изъ вершины луковицы. С. орхидей. (80). Тропич. страны. Любопытны, но не особенно красивыя рр. Теплич. эпифиты рр., воспитываемые на чуркахъ, съ подстилкою мха.

**В. барбигерумъ** (*B. barbigerum*, бородачій). Сьерра-Леоне. Цв. коричнево-зеленые. **В. Лобби** (*B. Lobbi*, Лобба). Ява. Цв. желтые, крупныя, съ пурпуровыми пятнами, лѣтомъ. **В. ретикулатумъ** (*B. reticulatum*, сѣтчатый). Бразилія. Цв. бѣлые съ пурпуровыми полосками; самый красивый. **В. сіамензе** (*B. siamense*, сіамскій). Сіамъ. Цв. блѣдно-желтые, съ пурпуровыми полосками. Содержится въ горшкахъ.



**БУЛЬДЕНЕЖЬ.** См. Вибурнумъ.

**БУНХОЗИЯ (Bunchosia).** *Bunchos*—арабское название кофе, по сходству съ мянъ того и другого р. С. малининыхъ. (22). Троп. Америка, Ямайка. Тенл. куст. и др. рр. Черенками изъ вырвшаго роста, подъ стекломъ, въ теплѣ. Песчан. дерн. съ торф. Темп. лѣтомъ 12—23, зимой 8—10°.

**Б. аргентеа (B. argentea, серебристая).** Каракасъ. Цв. желтые, въ июлѣ 10 ф. **Б. одората (B. odorata, душистая).** Картагена. Цв. желтые, душистые, въ маѣ 7 ф.

**БУПЛЕВРУМЪ (Bupleurum).** Происхождение названія не выяснено. С. зонтичныхъ. (90). Европа, Азія, С. Африка и С. Америка. Оранж. и выносливы одно и многол. трав. рр. Однол. — съменами весной, многол. — дѣленіемъ весной или черенками въ мартѣ, апрѣлѣ. Песчан. дернцвал.

**Б. граминофоліумъ (B. graminifolium, съ лл. злака).** Испанія. Воздушный многол. Цв. желтые, въ июнѣ 3 ф. **Б. фрутицесценсъ (B. frutescens, кустистый).** Испанія. Цв. мелкими зонтиками, въ августѣ. **Б. фрутикозумъ (B. fruticosum, кустарникъ).** Испанія. Съ продолговатыми листьями обертки, лл. кожистые; кора на стеблѣ и вѣтвяхъ пурпуровая. 3 6 ф.

**БУРАВЪ, БУРАВКИЪ, БУРЪ.** Стальная полутрубка съ винтовымъ покомъ и поперечною колодочкой для буренія и сверленія.

**БУРБРИДЖЕА (Burbridgea).** *Burbridgea* (Burbridge) нашелъ это р. С. инбирныхъ (1). Борнео. Уходъ какъ за Алыниа

**Б. нитида (B. nitida, блестящая).** Борнео. Цв. ярко-оранжевые, лѣтомъ 2—4 ф.

**БУРАКИ.** См. Бета.

**БУРАЧНИКОВЫЯ (boraginaceae, boragineae).** Обширное семейство изъ травянистыхъ и кустарныхъ растений со скорновиднымъ цвѣторасположеніемъ. Въ числѣ другихъ родовъ, къ этому семейству принадлежатъ: Анхуза, Бораго, Литоспермумъ, Мюзотисъ, Циноглоссеумъ и Эхиумъ.

**БУРЛИНГТОНІЯ (Burlingtonia).** Графиня *Бурлингтона* (Burlington) покровительствовала садоводству. С. орхидей. Тенл. эпифиты. Дѣленіемъ: отдѣленные части укрѣпляются на чуркахъ съ подкладкою. Во время роста — влажный воздухъ, въ состояніи покоя — сухе. Темп. лѣтомъ 15—26, зимой 10°.

**Б. Батеманни (B. Batemanni, Бетмена).** Ю. Америка. Цв. бѣлые, губа свѣтло-малиновая. **Б. венуста (B. venusta, очаровательная).** Бразилія. Цв. бѣлые съ легкимъ малиновымъ оттѣнкомъ, губа желтоватая.

**Б. декора (B. decora, красивая).** Бразилія. Цв. бѣлые или розовые съ розовыми пятнами; губа бѣлая. **Б. кандида (B. candida, бѣлая).** Демерара. Цв. бѣлые, въ апрѣлѣ — маѣ. **Б. ригида (B. rigida, жесткая).** Бразилія. Цв. пурпуроватые съ губою, изъюющею малиновыя пятнышки. 1 ф.

**БУРСАРИЯ (Bursaria).** *Bursa* — кошелекъ, по зерновкамъ. С. питтоспоровыхъ (смолянобѣяниковыхъ). Австралія. (3). Оранж. куст. рр. Черенками изъ молодого роста, въ песокъ, подъ стекломъ. Песчан. торфян. съ волокнистой глини. дерн. Темп. зимой 4—6°.

**Б. спиноза (B. spinosa, колючая).** Австралія. Цв. мелкіе, бѣлые, съ іюля до декабря. 10 ф.

**БЪРСЕРА (Bursera).** *Bursera* (Burser) — итальянскій ботаникъ. С. инбирныхъ. (40). Троп. Азія и Америка. Тенл. др. рр. Черенками подъ стекломъ, на нагрѣтомъ грунтѣ. Песчан. торф. съ волокнист. глини дерн. Темп. лѣтомъ 13—23, зимой 8—10°.

**Б. сerratа (B. serrata, съ зазубренными лл.).** Индія. Цв. бѣловатые. 25 ф.

**БУРТОНІЯ.** См. Бортонія.

**БУРХАРДИЯ (Burchardia).** *Burchardia* (Burchard) — ботаникъ. С. лилейныхъ. Оранж. многол. трав. рр. Песчан. торфян. или торф. съ малымъ количествомъ глини. дерн. Огпрысками или дѣленіемъ.

**Б. умбеллята (B. umbellata, зонтичная).** Австралія. Цв. бѣлые, въ августѣ. 2 ф.

**БУРХЕЛЛЯ.** См. Бурчелля.

**БУРЧЕЛЛЯ (Burchella).** *Burchella* (Burchell) — путешественникъ по Южн. Африкѣ и Бразиліи. С. маревыхъ. (1). М. Д. Н. Тенл. куст. Съ бѣл. глини. дерн. съ волокнистой торф. и пескомъ. Черенками изъ невольн. вырвшаго роста, въ песокъ, подъ стекломъ, на умѣренномъ нагрѣтомъ мѣстѣ.

**Б. капензисъ (B. capensis, капская).** Цв. темно-шарлаховые, въ мартѣ. 3—5 ф., а въ природѣ 12—14 ф. Сип. *Б. булбаліна (B. bulbalina).*

**БУРЫЙ цвѣтъ.** Коричневый, кофейный и ореховый.

**БУРЬАНЪ.** Крупнотравянистая сорная травянистая растенія, также Артемизія (см. это слово).

**БУССЕНГОТІЯ (Boussingaultia).** *Bousseno* (Boussengault) — знаменитый французскій химикъ. С. лебедовыхъ. (10). Троп. Америка. Подувыносливыя рр. Съменами. и дѣленіемъ корней. Торф. съ сильною глини. дерн. Темп. 12—17 лѣтомъ и 6—10° зимой.

**Б. базеллоидесъ (B. baselloides, похожая на Базелью).** Южн. Америка. Цв.

бѣлые, дѣлающіеся черными, пахучіе, мелкіе, поздно осенью. Стебли вьющіеся, краснаго цвѣта.

**БЪТЕА.** См. Бютеа.

**БЪТЕНЪ.** См. Миррисъ.

**БЪТОМУСЪ (Butomus).** *Bous* — быкъ; *temno* — рѣзать, острые лл. рѣжутъ губы скотинѣ, которая ѣстъ р. С. частушковыхъ. Многол. травяни. водяныя рр. Дѣленіемъ корней, весной.

**Б. умбеллятусъ (B. umbellatus, зонтичный).** *Сусакъ.* Дикорастущій въ болотахъ и озеркахъ. Цв. розовые, зонтикомъ, лѣтомъ 2—3 ф.

**БУТОНЪ.** Цвѣтная почка, распуковка.

**БУФТАЛЬМУМЪ (Bupthalmum).** *Bous* — быкъ, *ophthalmum* — глазъ, по диску цвѣтка. С. сложноцвѣтныхъ. (4). Сред. и Южн. Европа. Многол. выносливыя рр. Дѣленіемъ весной или осенью.

**Б. грандифлорумъ (B. grandiflorum, крупноцвѣтный).** Австрія. Цв. головки большія, желтыя, съ іюня до октября. 1½ ф.

**Б. салицифоліумъ (B. salicifolium, съ лл. ивы).** Австрія. Цв. головки желтыя, въ іюнѣ. 1½ ф. **Б. специозиссимумъ (B. speciosissimum, красивѣйшій).** Юж. Европа. Цв. головки желтыя, въ іюлѣ. 2 ф. Сип. *Телекия специозиссима (Telekia speciosissima).*

**БУШЕА (Bouchea).** К. и П. *Буше (Bouché)* — нѣмецкіе садоводы и натуралисты. С. вербеновыхъ. (17). Троп. страны. Тенл. и оранж. травянистыя или полукустарн. рр. Глини. дерн. съ песчан. торф. Черенками въ песокъ, подъ стекломъ, на умѣренномъ тенлѣ, весной.

**Б. псевдогервао (B. pseudogeravao, ложная гервао).** Бразилія. Цв. пурпуровые съ бѣлымъ звномъ, въ сентябрѣ. 2—5 ф. Многол. тенл.

**ВЫЛНИКЪ.** См. Артемизія.

**ВЪЛЕНА.** См. Хюнциамусъ. *Б. сибирская.* См. Скополия.

**ВЪЛЕНЬЕ.** Дѣланіе зеленыхъ частей бѣлыми. См. Вланкитанъ.

**ВЪЛКА. ВЪЛѢВКА.** См. Галеопсисъ.

**ВЪЛКОВОЕ ВЕЩЕСТВО. ВЪЛКОВАЯ ТКАНЬ. ВЪЛОКЪ.** Вещество, находящееся подъ внутренней оболочкой (кожицей) съмени, окружающее зародышъ. Бѣлка иногда не бываетъ. Вообще бѣлковая вещества суть органическія соединенія, въ составъ которыхъ, кромѣ организованныхъ, входитъ сѣра. Тамъ, гдѣ эти вещества скоплены, онѣ представляютъ шаровидныя зерна, называемыя зернами *алеурона*.

**ВЪЛОЗОРЪ.** См. Парнассия.

**ВЪЛОКРЫЛЬНИКЪ.** См. Калужница.

**ВЪЛОБОРОДОВСКОЕ.** Яблоко средней поры поспѣванія; продолговатой формы, среднихъ размѣровъ, желтаго цвѣта съ румянцемъ, кислотатаго вкуса. Хорошо для мочки. *Б. Боковое.* См. Боковое.

**ВЪЛУХА.** См. Антеннарія.

**ВЪЛЫЙ ГРИВЪ.** См. Болетусъ.

**ВЪЛЬ.** Грибокъ, поражающій преимущ. розаны. Сорть яблока.

**ВЪЛѢНКА (Pieris).** Бѣлаго цв. бабочка, гусеница которой питается лл. и наноситъ своею прожорливостію значительный вредъ огороднымъ рр., — капустѣ, рѣпѣ, брюквѣ. Также р. Лейкоумъ.

**БЪТЕА (Butea).** Графъ *Бьютъ (Bute)* — покровитель ботаники. С. бобовыхъ. (3). Троп. Азія. Тенл. куст. рр. Черенки изъ молодого роста, въ песокъ, на тепломъ грунтѣ, подъ стекломъ. Глини. дерн. съ торфяной. Темп. лѣтомъ 13—19, зимой 8—10°.

**Б. суперба (B. superba, превосходная).** Коромандель. Цв. темно-шарлаховые. Р. лазящее. 40 ф.

**ВАЙЛѢЗІЯ (Waillesia).** *Вайлесъ (Wailles)* — коллекторъ орхидей. С. орхидей. (6). Малайскій полуостр. и архипелагъ, о. Тихаго океана и Австралія. Земн. тепл. орхидей. Уходъ какъ за блетіа.

**В. пикта (W. picta, росписная).** Ява. Цв. снаружи желтые, внутри охристые съ красно-бурыми пятнышками. Сип. *В. розеа (W. rosea), Диподиумъ пиктумъ (Dipodium pictum), В. пунктата (W. punctata, точечная).* Австралія. Цв. красные съ пурпуровыми крапинками. Сип. *Дендробиумъ пиктатумъ, Диподиумъ пиктатумъ (Dendrobium punctatum, Dipodium punctatum).*

**ВАЙТЦІЯ (Waitzia).** *Вайтцъ (Waitz)* путешественникъ — ботаникъ, изслѣдовавшій растительность Явы. С. сложноцвѣтныхъ. (6). Австралія. Оранж. однол. Уходъ какъ за Целозія.

**В. aurea (W. aurea, золотистая).** Цв. головки довольно большія, лѣтомъ. 1—2 ф. Сип. *Морна нитида (Morna nitida), В. нивеа (W. nivea, сѣжно-бѣлая).* Цв. головки довольно большія, прицвѣтничковая обертка бѣлая или малиновая, либо желтоватая, лѣтомъ. 1½ ф. Сип. *Морна нивеа (Morna nivea).*

**ВАЙЯ или ВАЯ.** Вѣтвь папоротника или цикадеинаго р.

**ВАКЦИНИУМЪ (Vaccinium).** Древ.-латинское названіе, употребленное Виргиліемъ и Плиніемъ. С. брусничныхъ. (100). Сѣв. умѣр. страны и тропич. горы. Пре-



нмуш; вынос. кустар., рѣдко эпифитный рр. Торф. Съемами, весной, под стеклом. Оранж. виды выставлять на это на воздух для вызрѣванія роста.

**В. витис-идеа** (*V. vitis-idaea*, виноградъ съ горы Ида). *Брускина*. Европа. Цв. малиновые, колокольчатые; плоды красные, шаровидные, стебли тонкіе, лл не опадаютъ на зиму, стелющиеся. **В. караказанумъ** (*V. caracasana*, каракасскій). Каракас. Цв. одноостронніе, красноватые, колокольчатые, въ іюль. 4 ф. Оранж. **В. коримбозумъ** (*V. corimbosum*, щитковій). С. Америка. Цв. бѣлые или слегка розоватые, весной; плоды голубые. 5—10 ф. **В. лейкоботрисъ** (*V. leucobotrys*, съ бѣлыми кистями). Бенгалъ. Цв. бѣлые, какъ бы изъ воску, лѣтомъ; плоды бѣлые съ 5 темными пятнышками пониже верхн. конца. Оранж. 4—7 ф. **В. мортинія** (*V. mortinia*, мортинія). Анды. Цв. розовые, весной. 2—3 ф. Полу-вын. куст. р. **В. пенсилванікумъ** (*V. pennsylvanicum*, пенсилванскій). С. Америка. Цв. бѣлые или нѣжно розоватые, весной. 9—12 д. **В. стаминѣумъ** (*V. stamineum*, пычатый). С. Америка. Цв. тускло-пурпуровые или желто-зеленоватые; плоды зеленоватые или желтые, крупные, грушевидные. 2—3 ф. **В. формозумъ** (*V. formosum*, красивый). С. Америка. Цв. красные или красноватые, плоды голубые, сладкіе. 2—3 ф. **В. эритринумъ** (*V. erythrinum*, красный). Ява. Цв. красно-коралловые, въ октябрь. 1½ ф. Тепл. куст. раст.

**ВАЛЕНБЕРГІЯ** (*Wahlenbergia*). *Валенбергъ* (*Wahlenberg*)—авторъ „*Flora lapponica*“, † 1851. С. колокольчиковыхъ. (30). Южн. Африка. Тропич. Африка. Средиземн. побережье, 3. Европа. Оранж. или вып. однол. либо многол. трав. рр. Уходъ какъ за Кампанула.

**В. саксиколья** (*W. saxicola*, любящая скалы). Нов. Зеландія. Цв. блѣдно-лиловые, въ іюнь. 2—8 д. Мног. оранж. Син. **В. винцефолія** (*W. vincaefolia*). **В. тенуифолія**, тонколистная). Далмація. Цв. фиолетовые, въ іюнь или іюль. 3—6 д. Полувынос. многол. Син. **В. дальматика**, *Эдгайнтусъ тенуифоліусъ* (*W. dalmatica*, *Edgajanthus tenuifolius*). **В. хедерацеа** (*W. hederacea*, похожая на плющъ). Европа. Цв. голубые, въ іюль и августъ. Однол. Син. *Кампанула хедерацеа* (*Campanula hederacea*).

**ВАЛЕРΙΑНѢЛЬЯ** (*Valerianella*). Уменьшительное *Valeriana*. С. мауновыхъ. (50). Европа. С. Африка, 3. Азія и С. Америка. Вынос. однол. рр. Обыкн. сад. Съемами весной.

**В. олиготорія** (*V. olitoria*, кухонная). *Машъ-саладъ*. *Полевой салатъ*. Европа. Цв. блѣдно-лиловые, въ апрѣль до іюня;

лл. продолговато-ланцетовидные. 6 д. Превосходное салатное р.

**ВАЛЕРІАНА** (*Valeriana*). *Valere*—быть здоровымъ, по сильнымъ дѣлѣбнымъ свойствамъ. С. мауновыхъ. (150). Пренн. сѣв. умѣр. поясъ и вѣт троп. Ю. Америка; или въ Бразиліи и Остиндіи. Почти всѣ вынос. многол. трав. рр., не имѣющія садового значенія. Обыкн. сад. Дѣленіемъ.

**В. фу-ауреа** (*V. Phu-var. aurea*, *Земляной ладанъ* золотистый). Европа. Цв. бѣлые, ползунтинами, съ золотисто-желтыми молодыми вѣтками. 2 ф.

**ВАЛЕРІАНА КРАСНАЯ**. См. Цен-трантусъ.

**ВАЛЕРІАНОВЫЯ**. См. Мауновыя.

**ВАЛЪ**. Земляная насыпь гребнемъ или грядкой. Въ валу отличаютъ: *подбѣшу* (основаніе), *гребень* (верхнюю часть) и *крутости* (обочины).

**ВАЛЬДІВІЯ** (*Valdivia*). Городъ Вальдивія въ Чили, въ окрестностяхъ котораго найдено р. С. камнеломковыхъ. (1). Полувынос. кустъ, въ настоящее время исчезнувшій изъ садовъ.

**В. Гейяна** (*V. Gayana*, Гей). Отъ Чили до Вальдави. Цв. красные. 6 д.

**ВАЛЬДШТЕЙНІЯ** (*Waldsteinia*). Графъ Францъ фонъ *Вальдштейнъ* (*Waldstein*)—нѣм. ботаникъ и писатель. С. розановыхъ. (4). Сред. и Вос. Европа, С. Азія и В. умѣр. Америка. Полувын. или вынос. многол. трав. рр., похожія на Фрагарія. Обыкн. сад. Съемами и дѣленіемъ.

**В. трифолія** (*W. trifolia*, трехлистная). В. Европа. Цв. желтые, въ апрѣль и май. 4—6 д. **В. ффрагаріоидесъ** (*W. fragarioides*, похожая на Фрагарію). С. Америка. Цв. желтые, въ іюнь. Син. *Дамбарда ффрагаріоидесъ*, *Комаропсисъ ффрагаріоидесъ* (*Dalibarda fragarioides*, *Comaropsis fragarioides*).

**ВАЛЬСУРА** (*Walsura*). Мѣстное названіе. С. ясенковыхъ. (12). Индія и Инд. архип. Тепл. древ. рр. Уходъ какъ за Хлороксиломъ.

**В. писцидія** (*W. piscidia*, рыбій ядъ). Индія. Цв. желтые, въ іюнь. 20 ф. Кора отравляетъ рыбу. **В. робуста** (*W. robusta*, сильная). Индія. Цв. бѣлые, въ іюнь. 20 и болѣе ф.

**ВАЛЬДІЗІЯ** (*Vallesia*). Франциско *Вальдесъ* (*Valles*)—врачъ Филиппа II испанскаго, † 1592. С. кутровыхъ. (2). Америка. Тепл. куст. рр. Уходъ какъ за Вальярисъ.

**В. дихотомъ** (*V. dichotoma*, вѣтвящаяся виллообразно на двое). Перу. Цв. бѣлые, въ май. 3 ф.

**ВАЛЬДІЗІЯ** (*Vallisneria*). Антоніо *Вальдесери* (*Vallisneri*)—падуанскій проф. ботаники, † 1730. С. лягушниковыхъ. (1). Оранж. или тепл. водян. р. изъ жаркихъ и умѣренныхъ странъ.

**В. спиралисъ** (*V. spiralis*, спиральная). Цв. мелкіе, зеленоватые, въ іюль. Дл. узкіе длиннее, если вода глубока. Муж. цв. на короткой ножкѣ, женскіе на длинной, завитой спиралью, и плавающіе на водѣ; при разцвѣтаніи мужскіе цвѣты отрываются, всплываютъ и опыляютъ женскіе. После этого спиральный черешокъ женскаго цвѣтка сокращается и цв. уносится на дно, гдѣ и вызрѣваютъ въ немъ сѣмена.

**ВАЛЬДІХІЯ** (*Wallichia*). Д-ръ *Вальмъ* (*Wallich*)—датскій ботаникъ, описавшій рр. Индіи. С. пальмъ. (3). Остиндія. Низкорослая теплич. пальма. Плотная глин. дерн. Съемами, или укоренившимися отростками.

**В. каріотойдесъ** (*W. caryotoides*, похожая на Каріотъ). Индія. Лл. перистые, длин. 3—8 ф., листочки эндячіе, длиною въ 1—1½ ф.

**ВАЛЬДОТА** (*Vallota*). Пьеръ *Вало* (*Valot*)—франц. ботаникъ, † 1623. С. амариллисовыхъ. (1). Ю. Африка. Оранж. луков. р. Волокн. глин. дерн. съ листов. и песткомъ, по ровну. Отпрысками.

**В. пурпуреа** (*V. purpurea*, пурпуровая). Цв. красные, въ май. 2—3 ф. Имѣетъ нѣсколько разновидностей.

**ВАЛЬЯРИСЪ** (*Vallisaris*). *Валло*—заключатъ въ себѣ. На Явѣ изъ этого р. дѣлаютъ изгородь. С. кутровыхъ. (6). Троп. Азія, Малайскій архип. Тепл. выщ. куст. рр. Песков. волокн. гл. дерн. съ волокн. торф. Черенками изъ боковаго окрѣпшаго роста въ песокъ, въ парникъ, въ май. Темп. зимой 10—13, лѣтомъ 13—24°.

**В. пергуларія** (*V. perglularia*, Пергуларія). Индія. Цв. бѣлые, пахнущіе козломъ.

**ВАНГУЕРІЯ** (*Vangueria*). Въ Мадагаскаръ В. эдулисъ зовется Воавангуеръ. С. мареновыхъ. (30). Тропич. страны, за исключеніемъ Австраліи. Тепл. куст. или древ. рр. Глин. дерн. съ торф. Черенками въ такой же з., въ парникъ. Темп. зимой 8—10, лѣтомъ 13—24°.

**В. велютина** (*V. velutina*, бархатистая). Мадагаскаръ. Цв. желтовато-зеленые, въ май. 3 ф. **В. эдулисъ** (*V. edulis*, съѣдомая). Мадагаскаръ. Цв. зеленые, въ іюнь; плоды съѣдомые, похожіе на яблоки. 12 ф.

**ВАНДА** (*Vanda*). Мѣстное индѣйское названіе. С. орхидей. (30). Остиндія, Малайскій архип., Троп. Австралія. Тепл. эпифитъ. Въ корзинахъ съ ¾, толщины слоемъ изъ битыхъ черенковъ и остальной ¼ чистаго торф. мха; пуждаются въ свѣтъ болѣе другихъ орхидей. Во время

роста, съ марта или апрѣля до октября—сильная влажность и теплота не ниже 17 или 19°, при солнцѣ даже 24° и выше; зимой темп. 13—15° ночью.

**В. инсигнисъ** (*V. insignis*, замѣчательная). Молуккскіе о. Цв. блѣдно-коричневые съ темно-пестолыми пятнышками; губа бѣлая съ розово-пурпуровымъ лимбомъ, въ май и іюнь. **В. Каткартіи** (*V. Cathcartii*, Каткарта). Синимъ. Цв. снаружи бѣлые, внутри желтые съ красно-коричневыми полосками, губа бѣлая съ желтымъ ободкомъ. Син. *Арачидите каткарти* (*Arachanthie Cathcartii*). **В. Парішии** (*V. Parishii*, Паріша). Мульмейнъ. Цв. буро-бронзовые съ малиновымъ отгнкомъ, губа ярко-малиновая, съ бѣлою переднею частью, лѣтомъ. **В. Роксбургіи** (*V. Roxburghii*, Роксбургъ). Бенгалъ. Цв. свѣтло-зеленые съ буро-оливковыми черточками; губа фиолетово-пурпуровая съ бѣлыми боковыми лопастями, лѣтомъ. **В. Сандеріана** (*V. Sanderiana*, Сандери). Филиппинскіе о. Цв. малиновые, боковыя доли зеленовато-желтыя съ темно-малиновою свѣткой; губа съ красно-пурпуровымъ основаніемъ и шеолодно-пурпуровымъ кончикомъ, въ сентябрь и октябрь. **В. суависъ** (*V. suavis*, душистая). Ява. Цв. бѣлые съ кроваво-пурпуровыми пятнышками и черточками, губа розовая. Цв. душистые. **В. тересъ** (*V. teres*, круглая). Бурма. Цв. бѣлые съ розовыми лепестками и ярко-розовою губой, у которой желтое устье, въ іюнь и августъ. **В. трикозоръ** (*V. tricolor*, трехцвѣтная). Ява. Цв. душистые, бѣлые снаружи, блѣдно-желтые внутри; губа розовая, дискъ съ 5 бѣлыми линиями и бѣлымъ же основаніемъ. Имѣетъ нѣск. разновидностей. **В. Хукеріана** (*V. Hookeriana*, Хукера). Борнео. Цв. бѣлые съ розовыми пятнышками, губа бѣлая съ розовыми черточками и крапинками, въ сентябрь. **В. цѣрулеа** (*V. caerulea*, голубая). Казин. Цв. голубые, губа синія, осенью.

**ВАНІЛЬЯ** (*Vanilla*). Испанское *vainilla*—означаетъ маленький чехолъ; по плодамъ. С. орхидей. (20). Троп. страны. Тепл. высоко-выщ. вѣтвистыя орхидей. Торф. съ торф. мхомъ. Сильная теплота способствуетъ развитію. Черенками; такъ какъ стебель даетъ корни, то частями его.

**В. планифолія** (*V. planifolia*, плосколистная). Вестиндія. Цв. зеленые или внутри бѣлые. Стручки цилиндрическіе, длиною въ 6 д. Это—лучшая продажная ваніль.

**ВАРРЕА** (*Warrea*). *Варръ* (*Warre*)—коллекторъ, нашедшій впервые р. С. орхидей. (2). Бразилія, Перу, Колумбія. Земн. теплич. орхидей. Уходъ какъ за Файюсъ.

**В. трикозоръ** (*W. tricolor*, трехцвѣт-



на). Бразилія. Цв. большіе, желтоватые, губа желтая съ пурпуровымъ и бѣлымъ, въ июль—июль. Сил. *Maxillaria Barreana* (Maxillaria Waggeana).

**ВАРЪ.** Хвойная смола, очищенная и сгущенная варкою. Варъ бываетъ бѣлый и черныи.

**ВАСИЛѢКЪ.** См. Пентауреа.

**ВАСИЛЬБЕВСКАЯ** вишня. Одинъ изъ сортовъ владимірской или вязниковской вишни.

**ВАСИЛЬКОВЫЙ** цвѣтъ. Ярko, густо-голубой.

**ВАТЕРПАСЪ.** Снарядъ, показывающій плоскость по уровню, какъ стоитъ поверхность воды. Состоитъ изъ *минейки* (лежащей) и *отатса*, прикрѣпленнаго къ стоящему бруску, или изъ стеклянной трубки, въ которую влущенъ пузырекъ воздуха.

**ВАТОЧНИКЪ.** См. Асклепиадъ.

**ВАТСОНІЯ.** См. Уатсонія.

**ВАХЕНДОРФІЯ** (*Wachendorfia*). *Вахендорфъ* (*Wachendorf*)—проф. ботаники въ Утрехтѣ, † 1758. С. кровянико-выхъ. (7). Ю. Африка. Оранж. клубеньки многол. трав. пр. Песков. глин. дерн. съ добавл. торф. Отпрысками или сѣменами.

**В. тирсифлора** (*W. thyrsoflora*, съ цв. расположенными тирсомъ). Цв. макушечн. колосыми, красноватые, въ апрѣль, 2 ф.

**ВАХТА.** См. Меніантесъ.

**ВАШИНГТОНІЯ** (*Washingtonia*). Джоржъ *Уашингтонъ* (*Washington*)—знаменитый американскій патриотъ. С. пальмъ. (2). Ю. Калифорнія и Аризоня. Оранж. вѣршая пальма. Уходъ какъ за Хамропсомъ.

**В. филифера** (*W. filifera*, производилъ нити). Калифорнія. Лл. округлые, вѣрныя на колочихъ черешкахъ; пластинка глубоко-разсѣченная по краямъ съ нитями. 20—40 ф. Сил. *Брахда филламентоза*, *Притчардія филламентоза*, *П. филифера* (*Brahea filamentosa*, *Pritchardia filamentosa*, *P. filifera*).

**ВЕДѢЛІЯ** (*Wedelia*). Георгъ Вольфгангъ *Ведель* (*Wedel*)—нѣм. ботаникъ, проф. въ Гейѣ, † 1721. С. сложноцвѣтныхъ. (45). Жаркія страны. Теплич. и оранж. однол. либо многол. трав. или полукуст. пр. Гл. дер. съ пескомъ. Сѣменами, черенками и дѣленіемъ. Цв. желтые.

**В. радіоза** (*W. radiosa*, лучистая). Бразилія. Цв. въ июль. 2 ф. Оранж. полукуст. **В. хиспида** (*W. hispida*, щетинистая). Мексика. Цв. въ июль. 1½ ф. Оранж. многол. трав. Сил. *Цексменія текана* (*Lexmia texana*).

**ВЕДРО.** Деревянная, желѣзная или кожаная или иная непромокаемая посуда для воды и др. жидкостей; она имѣетъ *уши* и *дужку* или *пересты*. Мѣрное ведро содержитъ 30 ф. перебранной воды, или 10 кружекъ (8 штофовъ), или 16 бутылочъ.

**ВЕЗИКАРІЯ** (*Vesicaria*). *Vesica*—пузырь, по вздутымъ стручкамъ. С. крестоцвѣтныхъ. (20). Умѣр. С. Америка, Ю. Европа, Сирія, Персія и Андскія горы. Одно-и многол. пренмущ. выносл. трав. пр. Однол.—сѣменами, многол.—дѣленіемъ. Земли садовая, обыкн.

**В. грандифлора** (*V. grandiflora*, крупноцвѣтная). Техасъ. Цв. желтые, большіе, въ июль. 1 ф. Однол. **В. утрикулата** (*V. utriculata*, мышечатая). Ю. Европа. Цв. желтые, похожіе на цв. желтофіолы, въ апрѣль до іюня. 1 ф. Многол.

**ВЕЙНМАННІЯ** (*Weinmannia*). *Вейнманнъ* (*Weinmann*)—аптекарь въ Регенсбургѣ, † 1737. С. камсоломковыхъ. (50). Малайск. полуостр. и остр., о. Маскаренскіе и Тихого Ок., Австралія, Нов. Зеландія и троп. умѣр. Ю. Америка. Тепл. или оранж. древ. либо куст. пр. Легкая, сильная. Черенками въ песков. з., въ парникѣ.

**В. глѣбра** (*W. glabra*, гладкая). Ямайка. Цв. бѣлые, въ январь. 6 ф. Тепл. куст.

**ВЕЙЧІЯ** (*Veitchia*). Джемсъ *Вейчъ* (*Veitch*)—одинъ изъ представителей знаменитаго въ наше время садоваго заведенія въ Челси, Лондонѣ. С. пальмъ. (4). О. Фиджи и Ново-Гибридскіе. Перистыя тепл. пальмы. Уходъ какъ за Кентіа.

**В. іоганнисъ** (*V. iohannis*, Джона Вейча). О. Фиджи. Лл. перистые. Сил. *Кентія іоганнисъ* (*Kentia iohannis*).

**ВЕЛЬВИЧІЯ** (*Welwitschia*). Д-ръ *Вельвичъ* (*Welwitsch*)—извѣстный путешественникъ-ботаникъ, † 1872. С. хвойниковыхъ. (1). Ю.-З. Африка.

**В. мирабилисъ** (*W. mirabilis*, удивительная). Все р. въ продолженіе своего существованія имѣетъ только два лл. Замѣчательно своими исключительными признаками, но не можетъ считаться садовымъ.

**ВЕЛЬЛЕЯ** (*Velleia*). *Веллей* (*Vellei*)—майоръ англійской службы, занимавшійся изслѣдованіемъ водорослей † 1806. С. гуденовѣвыхъ. (11). Австралія. Оранж. мног. трав. пр. Уходъ какъ за Гуденіа.

**В. парадокса** (*V. paradoxa*, необычайная). Цв. желтые, въ июль.

**ВЕЛЬЛОЗИЯ** (*Vellozia*). *Веллозъ* (*Velloz*)—португальскій натуралистъ. С. амарилисовыхъ. (50). Троп. и Южн. Африка, Мадагаскаръ и Бразилія. Тепл. или оранж. пр. съ одеревеняющимися

стволомъ. Песков. торф. Сѣменами и отпрысками. Темп. зимой 4—8, лѣтомъ 13—22°.

**В. ретинервисъ** (*V. retinervis*, сѣтчато-нервная). Наталь и Трансвааль. Цв. голубые; лл. длинныя, линейныя, жесткіе. Оранж. Сил. *Ксерофита ретинервисъ* (*Xerophyta retinervis*). 12 ф. **В. сквамата** (*V. squamata*, чешуйчатая). Органіа горы. Цв. красно-оранжевые, лѣтомъ. Стебель низкій, покрытый остатками опавшихъ листьевъ, какъ-бы чешуей. Тепл. Сил. *Барбацинія сквамата* (*Barbascenia squamata*).

**ВЕЛЬФИЯ** (*Welfia*). Королевскій ганноверскій домъ Гвельфовъ. С. пальмъ. (2). Центр. Америка. Тепл. пр. Сильная глин. дерн. съ листовою и коровымъ переносомъ. Сѣменами.

**В. регія** (*W. regia*, королевская). Нов. Гренада. Лл. перисторазсѣченные, перья узкія, внизу бѣловатаго цв. Стволъ у взрослыхъ р. выш. 60 ф., лл. длиною въ 20 ф.

**ВЕЛЬДІЯ** (*Vella*). Происхожденіе неясное: будто отъ кельтскаго *vcler*,—названія подобнаго р. С. крестоцвѣтныхъ. (3). Испанія. Оранж. полукуст. пр. Глин. дерн. съ пескомъ. Черенками изъ молодого роста, въ песокъ, подъ рамой.

**В. псевдо-цитизусъ** (*V. pseudo-cytisus*, ложный Цитизусъ). Цв. желтые, въ апрѣль—май. 2—3 ф.

**ВЕНДЛАНДІЯ** (*Wendlandia*). Генрихъ *Вендландъ* (*Wendland*)—бывшій директоръ ганноверскаго бот. сада, † 1828 г. С. мареновыхъ. (60). Троп. Азія. Тепл. или оранж. кустар. или низко-древ. пр. Песков. глин. дерн. съ волокни. торф и древ. углемъ. Черенками изъ конечнаго роста, въ песокъ, въ парникѣ, въ май. Темп. зимой 6—10, лѣтомъ 13—22°.

**В. паникулата** (*W. paniculata*, метельчатая). Индія. Цв. бѣлые, въ июль. 6 ф. Прилистники узкіе. **В. тинкторія** (*W. tinctoria*, красильная). Индія. Цв. бѣлые, въ июль. 6 ф. Прилистники широкіе.

**ВЕНЕРІНЫ КОСЫ.** См. Саксифрага.

**ВЕНИДИУМЪ** (*Venidium*). Происхожденіе названія давнишмъ его ботаникомъ не объяснено. С. сложноцвѣтныхъ. (18). Ю. Африка. Оранж. или полувывосл. многол. трав. пр. Уходъ какъ за Арктотисъ.

**В. календулацеумъ** (*V. calendulaceum*). Цв. лучевые свѣтло-желтые, дисковые почти черные, въ июль до октябрия. 6—12 д.

**ВЕНТИЛЯГО** (*Ventilago*). *Ventilio*—бытъ на вѣтру, по маленькимъ крылышкамъ на верху плода. С. крушиновыхъ. (10). Троп. страны. Тепл. куст. пр. Уходъ какъ за Берхеміа.

**В. мадраспатана** (*V. madraspatana*,—

вѣроятно такъ называется мѣстно). Индія. Цв. зеленые, колосками, въ июль.

**ВЕРАТРУМЪ** (*Veratrum*). Древне-латинское названіе, вѣроятно, отъ *vero*—дѣйствительно и *ater*—черный, по цвѣту корня. С. лилейныхъ. (9). Европа. Русская Азія и С. Америка. Выносл. многол. трав. пр. Обыкновен. садов. Дѣленіемъ и сѣменами.

**В. альбумъ** (*V. album*, бѣлый). *Чемеріа бѣлая*. Европа, Сибирь. Цв. снаружи зеленоватыя, внутри—бѣлые, въ июль, лл. плотныя, складчатые, продолговатыя. 3—4 ф. Имѣетъ нѣсколько разновидностей. **В. нигрумъ** (*V. nigrum*, черный). *Чемеріа черная*. Центр. Европа. Цв. темно-пурпуровые, въ июль. Нижніе лл. продолговатые. 2—3 ф. Стебель внизу утолщенный, какъ-бы луковичей.

**ВЕРВА ВѢЛАЯ и В. КРАСНАЯ.** См. Саликсъ. *В. Воловская*. См. Витексъ.

**ВЕРВАСКУМЪ** (*Verbascum*). Древне-латинское названіе, встречаемое у Плинія. С. норичниковыхъ. (100). Европа. С. Африка, З. и центр. Азія. Большей частью выносливыя двул. или многол. травяни. либо кустарн. пр. Обыкновен. садовая. Сѣменами.

**В. олимпікумъ** (*V. olympicum*, олимпійскій). Таврскія горы. Цв. золотисто-желтые; лл. овальные. 1 ф. Сил. *В. формозумъ* (*V. formosum*). **В. феніцеумъ** (*V. phoeniceum*, фіолетовый). Юж. Европа. Цв. фіолетовые, розовые или почти бѣлые; лл. овальные. 3 ф. Сил. *В. ферругінеумъ* (*V. ferrugineum*). **В. Шейхія** (*V. Chaixii*, Ше). Ю. и центр. Европа. Цв. желтые, лл. пушистые. 3 ф.

**ВЕРВЕЗИНА** (*Verbesina*). Измѣненное *Verbena*, съ которою сходны нѣкот. виды. С. сложноцвѣтныхъ. (50). Жаркія мѣстности Америки. Тепл. или оранж., либо выносл. одно- и многол. трав. пр., кустарники или полукуст. Сильная песков. глин. дерн. Сѣменами и дѣленіемъ.

**В. алая** (*V. alata*, крылатая). Вестиндія. Цв. головки съ желто-оранж. лучевыми цв., въ августъ. Стебель крылатый. 2 ф. Тепл. р. **В. пиннатифида** (*V. pinnatifida*, съ перисторазсѣченными лл.). Мексика. Цв. головки блѣдно-желтыя, въ августъ. 3 ф. Оранж.

**ВЕРВЕЙНИКЪ.** См. Лизимахія.

**ВЕРВЕНА** (*Verbena*). Древне-латинское названіе, употребленное Виргиліемъ и Плиніемъ. С. желѣзниковыхъ. (80). Оранж. или выносл. одно- или многолѣтн., трав. либо полукуст. пр., почти исключительно изъ Америки. Сильная. Сѣменами въ парникъ пораньше весной, или черенками изъ молодого роста, на которомъ нѣтъ цв.



**В. венóза** (*V. venosa*, сь сильно развитыми жилками). Бразилія. Цв. лиловые или синеватые; дл. продолговатые. 2 ф. Полувыноса. красивое р.

Въ садахъ воспитывается весьма много различныхъ разновидностей, происшедшихъ частью помесью. Въ последнее время Вербены постигла какая-то болѣзнь, вслѣдствіе которой эти рр., и безъ того трудно выносящая зиму въ оранжерейномъ помѣщеніи, стали погибать, а выведенныя отъ сохранившихся растений черенковые экземпляры выходятъ очень неудовлетворительные; поэтому ихъ теперь отъ черенковъ почти вовсе не разводятъ, а ежегодно сьѣтъ сѣменами съ хорошихъ сортовъ.

**ВЕРВЕНОВЫЯ** или **ЖЕЛѢЗНЯКОВЫЯ** рр. (*verbena*сae). Трав. кустар. и др. рр., широко разселенныя по странамъ жаркихъ климатовъ и преимущественно въ южныхъ умѣренныхъ. Многія изъ нихъ представляютъ экономич. значеніе, другія—весьма красивыхъ представителей садовой флоры. Къ первымъ, между прочимъ, относится древесное р. тикъ или текъ. Въ семействѣ заключались 59 родовъ съ 700 видами; наиболѣе извѣстны: Вербена, Витексъ, Клеродендронъ и Лянтана.

**ВЕРВЮДНИКЪ**. См. Алыхаго.

**ВЕРВЮЖІЙ КОРМЪ**. См. Цигофиалюмъ. *V. жвостъ*. См. Карагана.

**ВЕРЕВОЧНИКОВЫЯ** рр. (*restia*сae). Обычно многолѣтнія травянистыя рр. съ горизонтальнымъ или ползучимъ корневищемъ, встрѣчаемыя преимущественно въ Ю.-З. Африкѣ и Австраліи; часть ихъ растетъ въ Новой Зеландіи, одинъ видъ въ Чили и одинъ въ Кохинхинѣ. Въ этомъ семействѣ около 230 видовъ и 20 родовъ, въ томъ числѣ Вильденонія и Ресціо.

**ВЕРЕСКОВЫЯ** рр. (*ericaceae*). Обширное сем. преимущественно кустарныхъ и полукустарныхъ рр., распространенныхъ по всему земному шару (рѣдко въ Австраліи). Видовъ около 1,300, родовъ—87, изъ коихъ наиболѣе извѣстны: Арбутусъ, Гаулетерія, Кассандра, Піерисъ, Пиролія, Рододендронъ и Эрика.

**ВЕРНЕРІЯ** (*Werneria*). *Вернеръ* (*Werner*)—проф. минералогія въ Фрейбургѣ, † 1817 г. С. сложновѣтвистыхъ. (17). Анды Ю. Америки. Оранж. многол. трав. рр. Легкая. Дѣленіемъ корней.

**В. фрѣида** (*W. frigida*, холодная). Квнт. Цв. гол. желтыя, въ февраль, 9 д.

**ВЕРНОНІЯ** (*Vernonia*). *Вернонъ* (*Vernon*)—ботан.-путешественникъ по С. Америкѣ. С. сложновѣтвистыхъ. (380). Жаркія страны Америки. Тепл., оранж. и выноса. одно- или многол. травяц., либо

кустар.; фр. Сильная рыхлая. Сѣменами, черенками или дѣленіемъ.

**В. аксиліфолія** (*V. axillifolia*, цвѣтущая въ углахъ лл.). Бразилія. Цв. головки пурпурово-фіолетовыя, въ октябрь. 1½ ф. Тепл. куст. р. **В. одорантиссима** (*V. odorantissima*, сильно пахучая). Каракасъ. Цв. головки пурпуровыя, въ октябрь. 4 ф. Тепл. полукуст. р.

**ВЕРОНИКА** (*Veronica*). Происхожденіе названія сомнительное: нѣкоторые производятъ отъ *heira cicon*—священный образъ, основываясь на преданіи о св. Вероникѣ, С. норичниковыхъ. (160). Умѣр. и холодные климаты. Оранж. или выноса. трав., кустар., рѣдко др. рр. Однол. въ обыкн. садов. сѣменами, куст.—черенками подъ рамой весной или лѣтомъ. Глин. дерн. съ торф.; темп. зимой 3—6.

**В. Андерсоніи** (*V. Andersonii*, Андерсона). Садов. гибридъ. Цв. синева-фіолетовые, въ іюль. 1½ ф. Полувыноса. куст.

**В. виргиніи** (*V. virginica*, виргинская). С. Америка. Цв. бѣлые или голубоватые, въ іюль. 2—6 ф. Снн. *Лептандра виргиніи* (*Leptandra virginica*). **В. инкава** (*V. incana*, бѣлесоватая). *Сердечная трава*. Россія. Цв. голубые, въ іюль; лл. пушистые. 2 ф. **В. карнозула** (*V. carnosula*, тѣлесная). Нов. Зеландія. Цв. бѣлые, лѣтомъ.

Оранж. куст. р. **В. Лайаллі** (*V. Layallii*, Лайяли). Нов. Зеландія. Цв. бѣлые, лѣтомъ. 5—15 д. Оранж. куст. **В. пингвицфолія** (*V. pinguifolia*, съ жирными лл.). Нов. Зеландія. Цв. бѣлые, въ іюль. 4 д.—4 ф.

Оранж. куст. **В. спиката** (*V. spicata*, колосовая). *Приходная трава*. Европа. Цв. голубые, густымъ колосомъ. 6—18 д. Выноса. **В. Хулькеана** (*V. Hulkeana*, Хулька). Новая Зеландія. Цв. лиловые, лѣтомъ. 1—3 ф. Полувыноса. куст. **В. эллиптича** (*V. elliptica*, эллиптическая). Нов. Зеландія, Чили, Огненная З., Фалклендскіе о. Цв. большіе, бѣлые, въ іюль 5—20 ф. Снн.

*В. декуссата* (*V. decussata*).

**ВЕРСКАФФЕЛЬТІЯ** (*Verschaffeltia*). Амбрузъ *Верскаффелтъ* (*Verschaffelt*), бывшій знаменитый гентскій садоводъ. С. пальмъ. (1). Тепл. пальма. Уходъ какъ за Стевенсонія.

**В. сплендида** (*V. splendida*, великолѣпная). Сейшельскіе о. Лл. 4—7 ф. длиной и 3—5 шир. клиновидно-обратно-яйцевидные, ярко-зеленые, двурасчѣченные. 80 ф. Стволъ колючій.

**ВЕРТИКАЛЬ**. Отвѣсъ. Перпендикуляръ.

**ВЕРТИКОРДИЯ** (*Verticordia*). *Верто*—переворачивать и *cor, cordis*—сердце; прозвище Венеры, которой посвящена была мирта. С. миртовыхъ. (37). Австра-

лія. Оранж. куст. рр. Песков. глин. дерн. съ листов. Черенками изъ полузрѣлаго роста, въ парникѣ.

**В. инсигнис** (*V. insignis*, замѣчательная). Цв. малиновые, въ апрѣлѣ. 1—2 ф. Куст. р. **В. нитенсъ** (*V. nitens*, блестящая). Цв. золотисто-желтые, въ апрѣлѣ. 2 ф. Куст. р. Снн. *Хризорроде нитенсъ* (*Chrysorrhoe nitens*).

**ВЕРХЪ**. Оконечность, сторона обращенная къ небу.

**ВЕСЛИНГІЯ**. (*Veslingia*). *Веслингъ* (*Vesling*)—проф. ботаники въ Падуѣ, путешествовалъ по Востоку. С. сложновѣтвистыхъ. (3). Троп. Африка. Тепл. однол. рр. Сильная, всякая. Сѣменами.

**В. сатива** (*V. sativa*, съѣдомая). Венецуела до Буеносъ-Айреса. Цв. головки золотисто-желтыя, въ августѣ и сентябрѣ, 6 ф. Снн. *Верберзіи сатива*, *Гизотія олеифера* (*Verbesina sativa*, *Guizotia oleifera*).

**ВЕСНА**. Время года между зимой и лѣтомъ, со вступленіемъ солнца въ знакъ овна,—съ 9 марта по 9 іюня.

**ВЕСНУХА**. См. Анемоне.

**ВЕСПУЧІЯ** (*Vespucia*). *Америго Веспучи* (*Vespucci*)—по которому названа Америка, † 1512. С. частушнихъ. (4). Тропич. Ю. Америка. Тепл. водян. трав. рр. Сѣменами или побѣгами.

**В. Хумбольдтіи** (*V. Humboldtii*, Гумбольдта). Венецуела до Буеносъ-Айреса. Цв. съ 3 внутр. желтыми сегментами, въ маѣ. Снн. *Лимнохарис Хумбольдтіи*, *Хидрохлеис Коммерсо́ни* (*Limncharis Humboldtii*, *Hydrochleis Commersoni*).

**ВЕСТІЯ** (*Vestia*). *Вестъ* (*Vest*)—проф. въ Гратцѣ, † 1840. С. пасленовыхъ. (1). Оранж. кустъ. Уходъ какъ за Пеструмъ.

**В. лициойдесъ** (*V. lycioides*, похожая на Лициумъ). Чили. Цв. желтые, въ іюль. 3 ф.

**ВЕСТРИНГІЯ** (*Westringia*). *Вестрингъ* (*Westring*)—лейбъ-медикъ шведскаго короля. С. губоцвѣтныхъ. (11). Вѣт. троп. Австралія. Оранж. куст. рр. Легкая, сильная. Черенками изъ молодого роста, подъ рамой.

**В. розмариноформисъ** (*W. rosmariniformis*, похожая на розмаринъ). Цв. бѣдно-голубые, въ іюль. Нѣск. формъ.

**ВѢЧЕРЪ**. Пора дня между его концомъ и ночью: время около заката солнца. Обычно считается съ 6 или 7 час. по полудни до полуночи.

**ВИБОРГІЯ** (*Viborgia*). Эрикъ *Виборгъ* (*Viborg*),—проф. ботаники въ Копенгагенѣ, † 1822. С. бобовыхъ. (7). Ю. Африка. Оранж. куст. рр. Песков. глин. дерн. съ волокн. торф. Черенками изъ молодого роста, въ песокъ, подъ рамой, въ маѣ.

**В. обкордата** (*V. obcordata*, съ обратно-сердцевидными лл.). Цв. желтые, макушечными кистями, въ іюль. 3—6 ф. Снн. *Кроталарія флорибунда* (*Crotalaria floribunda*).

**ВИВУРНУМЪ** (*Viburnum*). Древнелатинское названіе, встрѣчаемое у Виргилія и др. классиковъ. С. жимолостныхъ. (80). Умѣр. страны сѣв. полушарія, Вестиндія и Мадагаскаръ. Предпочтительно выноса. куст. и др. рр. Почти всякая земля. Отводкой или черенками изъ полузрѣлаго роста, въ песокъ, подъ рамой. Упомянутые виды, гдѣ не обозначено—сѣв.-американскіе съ бѣлыми цв.

**В. дентатумъ** (*V. dentatum*, съ зубчатыми лл.). Цв. полузонтиками на ножкахъ, въ іюнь. 5—10 ф. **В. дилататумъ** (*V. dilatatum*, расширенный). Японія. Цв. бѣлые, сидячими полузонтиками, въ іюнь. 10 ф. **В. макроцефалюмъ** (*V. macrocephalum*, широкоголовый). Китай. Цв. сложными полузонтиками; обоюполие цв. большіе, въ іюнь. Лл. овальные. 20 ф. Снн. *В. Форчуни* (*V. Fortunei*).

Оранж. **В. одорантиссимумъ** (*V. odoratissimum*, благоуханнѣйшій). Китай. Казія на горяхъ. Цв. съ запахомъ Олеа фразгансъ (*Olea fragrans*), цвѣтками на ножкахъ, въ маѣ. Оранж. **В. опулюсъ** (*V. opulus*). *Калина*. Европа. Цв. бѣлые полузонтиками, въ іюль—іюль; плоды красные. 6—8 ф. Снн. *В. эдуле*, *В. оксикокосъ* (*V. edule*, *V. oxycoccos*). Разновидность *стерилисъ* (*sterilis*) или *бульденежъ* имѣетъ всѣ цв. безплодные, образующіе шаровидный полузонтикъ. Выноса. **В. плікатумъ** (*V. plicatum*, складчатый). Японія. Цв. всѣ безплодные, какъ у бульденежа, въ маѣ.

4—6 ф. Оранж. **В. тинусъ** (*V. tinus*). *Самшитъ*. Ю. Европа. Цв. бѣлые, до распускания розоватые, съ декабри по мартъ. Плоды темно-голубые. 8—10 ф. Холодно-оранж. р. Имѣетъ нѣсколько разновидностей.

**ВИВІАНІЯ** (*Viviania*). Доминико *Вивіани* (*Viviani*)—проф. ботаники въ Генуѣ, † 1840. С. гераниевыхъ. (8). Троп. Ю. Америка. Тепл. или оранж. трав., полукуст. или кустар. рр. Глин. дерн. съ торф. и пескомъ. Черенками изъ молодого роста, въ песокъ, въ парникѣ. Темп. зимой 6—8, лѣтомъ 13—17°.

**В. грандифолія** (*V. grandifolia*, крупнолистная). Чили. Цв. бѣлые или красные, въ іюль. 1—2 ф. **В. парвифолія** (*V. parvifolia*, мелколистная). Чили. Цв. розовые, въ іюль. 1—2 ф.

**ВИГАНДІЯ** (*Wigandia*). *Вигандъ* (*Wigand*)—епископъ Помераніи, † 1587. С. водолостныхъ. (3). Гористыя мѣстности троп. Америки. Тепл. или оранж. трав. рр. Глин. дерн. съ волок. торф. и пескомъ. Сѣменами въ парникъ весной; черенками изъ свѣжаго роста. Темп. зимой



8—10, лѣтомъ 13—24°. Нѣк. могутъ быть высажены въ концѣ мая на воздухъ.

**В. Вигьери** (W. Vigieri, Вигье). Мексика. Цв. съ зеленой большой чашечкой и лиловымъ вѣнчикомъ, осенью; дл. овально-эллиптические 6 ф. **В. макрофилля** (W. macrophylla, большелистная). Каракасъ. Цв. лиловые, въ апрѣлѣ; дл. эллиптически-сердцевидные, волосистые, сверху ржавые. 10 ф. Сип. **В. каракаса** (W. caracasana).

**ВИГЬЕРА** (Viguiera). **Вигье** (Viguier), — книгопродавецъ въ Монпелье, ботаникъ. С. сложноцвѣтныхъ. (60). Жаркія страны Америки. Оранж. одно- или многол. трав. pp. Уходъ какъ за Хеліантусъ.

**В. линейрисъ** (V. linearis, съ линейными дл.). Мексика. Цв. головки желтыя. 2 ф. Сип. **Хеліантусъ линейрисъ** (Helianthus linearis).

**ВИРГИЛЬДІЯ** (Virgillia). Древній поэтъ **Виргилій**. С. бобовыхъ. (1). Оранж. дерево, нуждающееся въ такомъ же уходѣ, какъ Виминарія.

**В. капензисъ** (V. capensis, съ М. Д. Н.). Ю. Африка. Цв. розово-пурпуровые, въ июлѣ. Сип. **Подальрія капензисъ** (Podalyria capensis).

**ВИДРИНГТОНІЯ** (Widdringtonia). Капитанъ англійскихъ войскъ **Виддрингтонъ** (Widdrington) — путешествовавшій съ ботан. цѣлью въ Испанію. С. хвойныхъ. (3). Ю. Африка, Мадагаскаръ. Оранж. куст. или дрв. pp. Уходъ какъ за Кальитрисъ.

**В. купрессоидесъ** (W. cupressioides, похожая на Купрессусъ). Ю. Африка. Дл. остроконечные, вѣтви пирамидальныя. 4—10 ф.

**ВИДЪ** (species). Собрание индивидуумъ растеній, на столько между собою схожихъ, что можно предположить одно, общее имъ происхожденіе. Видъ производитъ только себѣ подобныхъ. Нѣсколько видовъ, схожихъ по общимъ признакамъ, получаютъ названіе **рода**, а нѣсколько схожихъ родовъ соединяются въ **разрядъ, отдалъ, семейство**. Особн составляющія видъ и различающіяся мелкими признаками образуютъ **видоизмѣненіе** или **разновидность**.

**ВИКА**. См. Онобрихисъ.

**ВИКТОРІЯ** (Victoria). Королева англійская **Викторія**. С. кувшинковыхъ. (1). Равноденственная Америка. Въ стоячихъ водахъ глубиною въ 4—6 ф. Тепл. водяное р. Сѣменами; глин. дерн.; въ бассейнахъ, температура воды которыхъ не должна опускаться ниже 24°.

**В. регія** (V. regia, королевская). Цв. широко въ 1 ф. и болѣе; лепестки наружные

бѣлые, внутренніе — переходящіе постепенно въ тычинки и дѣлающіеся розовыми, лѣтомъ; дл. плавающие, шириною въ 4—6 1/2 ф., сначала овальные, потомъ округлые съ завернутыми сверху краями.

**ВИЛА. ВИЛЫ**. Орудіе, состоящее изъ рукоятки съ двумя, тремя, четырьмя и пятью **роженцами** или **зубцами**, образующими **развѣтв.** Служитъ для разбиванія и разрыхленія земли, а также для приѣма и отбоя. Это — одно изъ необходимыхъ садовыхъ орудій. Дву- и трехзубныя хороши для перетраиванія, подѣла и перебивки навоза, четырехъ и пятизубныя — самыя полезныя при копаніи, разбивкѣ и ровненіи рыхлой земли. Вилы эти необходимы также при выемкѣ растеній для пересадки, или для выкапыванія корнеплодовъ. Вилы бываютъ также маленькія — **ручные**, употребляемыя при выемкѣ и посадкѣ; онѣ дѣлаются съ тремя плоскими зубцами и съ короткой рукояткой. Вилы должны быть сдѣланы изъ хорошей стали, чтобы не сгибались, а съ другой стороны — не были бы хрупки.

**ВИЛЬДЕНОВІЯ** (Willdenowia). Карлъ **Вильденовъ** (Willdenow), — проф. ботаники въ Берлинѣ, † 1812. С. веревочниковыхъ. (8). Ю. Африка. Оранж. трав. pp. похожихъ на тростникъ. Глин. дерн. съ торф. дѣленіемъ.

**В. тересъ** (W. teres, круглая). Цв. колосыми или метелкой. Соломина вышиною въ 3 ф.

**ВИЛЬМЕТИЯ** (Willemetia). **Виллеметъ** (Willemet), — авторъ "Herbarium mauritanum", † 1790. С. крушинныхъ. (1). Оранж. куст. р. Песков. гл. дерн. съ торф. Черенками, въ пескѣ, подъ рамой.

**В. африкана** (W. africana, африканская). Ю. Африка. Цв. бѣлые, полусонтиками, въ маѣ. 10—12 ф. Сип. **Нолтія африкана** (Noltia africana).

**ВИЛЬДУГВЕЯ**. См. Уилльюбей.

**ВИЛЛЯНОВА** (Villanova). **Виллянова** (Villanova) — проф. ботаники въ Валенсіи. С. сложноцвѣтныхъ. (7). Перу, Колумбія, Мексика. Оранж или выносл. трав. pp.

**В. хризантемойдесъ** (V. chrysanthemoides, похожая на Хризантемумъ). Скалистыя горы. Цв. желтыя. 1—2 ф.

**ВИЛЬЯРСІЯ** (Villarsia). Матіасъ **Вильяресъ** (Villarez) — испан. ботан. С. масличныхъ. (10). Троп. страны. Тепл. куст. или низкія дрв. pp. Уходъ какъ за Оляскъ.

**В. мукроната** (V. mucronata, съ остроконечными дл.). Чили. Цв. бѣлые, душистые, въ сентябрѣ и октябрѣ. Дрв. р.

**ВИЛЬЯРСІЯ** (Villarsia). **Вильяресъ** (Villars) — проф. ботан. въ Греноблѣ. † 1814. С. горечавковыхъ. (10). Ю. Африка и Австралія. Оранж. болотн. трав. pp. Торф. съ пескомъ; горшки съ pp. ставятся въ воду. Дѣленіемъ или сѣменами.

**В. парнаассифолія** (V. parnassifolia, съ дл. какъ у Парнассіа). Австралія. Цв. желтые. **В. рениформисъ** (V. reniformis, почковидная). Австралія. Цв. желтые. Сип. **Менянхтесъ экзальтата** (Menyanthes exaltata).

**ВИЛЬМОРИНІЯ** (Vilmorinia). Пьеръ Лун **Вильморенъ** (Vilmorin), извѣстный сѣмяноторговецъ и культиваторъ. С. бобовыхъ. (3). Санъ-Доминго. Тепл. куст. pp. Уходъ какъ за Клиторія.

**В. мультифлора** (V. multiflora, многоцвѣтная). Цв. пурпуровые, въ маѣ. 6 ф. Сип. **Клиторія мультифлора** (Clitoria multiflora).

**ВИМИНАРІЯ** (Viminaria). **Вименъ** — побѣгъ, по длиннымъ безлистнымъ побѣгамъ. С. бобовыхъ. (1). Глин. дерн. съ торф. Черенками изъ ползучаго роста, въ апрѣлѣ, подъ рамой, или сѣменами въ парникѣ.

**В. денудата** (V. denudata, обнаженная). Австралія. Цв. желто-оранжевые, въ августѣ. 10—20 ф.

**ВИНКА** (Vinca). У древнихъ римлянъ р. называлось Vinca и Pervinca. С. кутровыхъ. (10). Широко-распространенныя тепл., оранж. или выносл. трав. или полукуст. pp. Для тепл. и оранж. волоки. глин. дерн. съ частью перегноя; черенками изъ молодого роста, по его возобновленію весной. Выносл. — во всякой землѣ и дѣленіемъ весною.

**В. майоръ** (V. major, большой). **Барвинокъ**. Средизем. Побережье. Цв. голубые, въ августѣ. Полувыносл. многол. 1 ф. и выше. Сип. **В. акутифолія** (V. acutifolia).

**В. миноръ** (V. minor, меньшая). **Барвинокъ**. **Молочная трава**. Европа. Цв. сине-пурпуровые, въ апрѣлѣ — маѣ, дл. овально-эллиптические; р. распростертое. **В. розеа** (V. rosea, розовая). Ю. Флориды, Тропикъ. Цв. бѣлые съ малиновымъ глазкомъ, иногда розовые, въ мартѣ до октябрия. Оранж. или тепл. р.

**ВИННЫЙ СКУРТУТЪ**. Яблоко, отзываются вкусомъ вина, прочное, съ румянцемъ.

**ВИНОГРАДКА**. Порода яблокъ, похожихъ на крымскія; сидятъ кучками, какъ-бы виноградныя грозды.

**ВИНОГРАДНИКЪ**. Садъ для разведенія винограда.

**ВИНОГРАДНИЦА**. Оранжерея дляращенія столового винограда.

**ВИНОГРАДНЫЯ** pp. (ampelidaeae). Цвѣлющіяся pp., распространенныя по жаркимъ и тропическимъ странамъ. Видовъ, принадлежащихъ къ этому с., насчитываютъ до 250, распределенныхъ по тремъ родамъ, изъ которыхъ главнѣйшіе — Амелопсисъ и Витисъ.

**ВИНОГРАДЪ**. См. Витисъ.

**ВИНЦЕТОКСИКУМЪ** (Vincetoxicum). **Винсегъ** — побѣждать и **токсикумъ** — ядъ; по предполагаемымъ свойствамъ противудія. С. асхотниковыхъ. (70). Умѣр. и жаркія страны, но рѣдко подъ тропиками. Тепл., оранж., либо выносл. многол. трав. или полукуст. pp. Уходъ какъ за Цинакумъ.

**В. официнале** (V. officinale, аптечный). **Чертова борода**. Европа. Цв. бѣлые, въ маѣ. 1—3 ф. Сип. **Цинакумъ винцетоксикумъ** (Cynanchum vincetoxicum). Р. японікумъ (V. japonicum, японскій) Японія. Цв. бѣловатые, лѣтомъ. Р. немного выносл.

**ВИНЬЯ** (Vigna). Доминикъ **Винни** (Vigni) — проф. въ Падуѣ, написавшій въ 1627 г. комментарий къ книгамъ Теофраста. С. бобовыхъ. (30). Жаркія страны. Тепл. или оранж., либо выносл. трав. pp. Сѣменами въ добрую з.

**В. катіангъ** (V. catiang, катіангъ). Остидія. Цв. желтые или красноватые, въ июлѣ или августѣ. Однол. выносл. вьющ. р. Сип. **Доліхосъ синензисъ** (Dolichos sinensis) и **Фазеолусъ Риккардианусъ** (Phaseolus Riccardianus).

**ВИОЛЯ** (Viola). Древне-латинское названіе, употребленное Виргиліемъ и др. и отбѣчающее греческ. *ιον.* С. фиалковыхъ. (100). Сѣв. умѣр. климаты, Южн. Америка, Ю. и В. Африка, Австралія и Нов. Зеландія. Большею частью выносл. многол. трав. pp. Обыкн. садов. Сѣменами, черенками и дѣленіемъ. Въ садахъ встрѣчаются во многихъ разновидностяхъ и формахъ.

**В. корнута** (V. cornuta, рогатая). Швейцарія, Пиренеи. Цв. голубые, въ маѣ до іюня. Изъ многочисленныхъ формъ, лучшая **перфектнъ** (perfection). **В. кукульята** (V. cucullata, клубучкован). С. Америка. Цв. фиолетовые или пурпуровые, рано весной. Имѣетъ пестролистную форму. **В. Монбьяна** (V. Munbyana, Монби). Алжирія. Цв. фиолетовые или желтые, большіе, весной. **В. одората** (V. odorata, душистая фиалка). Европа. Цв. голубые, бѣлые или красно-пурпуровые, душистые, въ мартѣ до мая. Имѣетъ много разновидностей. **В. педата** (V. pedata, со стоповидными дл.). С. Америка. Цв. ярко-голубые, иногда бѣдные и даже бѣлые, очень крупныя, въ маѣ и іюлѣ. Сип. **В. флабеллифолія** и **В. флабеллата** (V. flabellifolia, V. flabellata).



Имѣть нѣсколько разновидностей. **В. педункулата** (*V. pedunculata*, на ножкахъ). Калифорнія. Цв. темно-желтые, крупные, весной. Оранжев. **В. ротомагензисъ** (*V. rothomagensis*, руанская). Франція и Бельгія. Цв. ярко-голубые, съ черными черточками, съ апрѣля до августа. **В. трикологъ** (*V. tricolor*, трехцвѣтный). *Анютини глаза*. Европа. Цв. трехцвѣтные, съ мая до сентября. Въ садахъ выведено весьма много разновидностей и гибридныхъ формъ. **В. хедерацеа** (*V. hederacea*, похожая на Плющъ). Европа. Цв. голубые, иногда бѣлые, въ июль. Сип. *Эретионъ хедерацеумъ*, *Э. рениформе* (*Ereption hederaceum*, *E. reniforme*).

**ВИРЗИНГЪ.** См. Брассика.

**ВИСКУМЪ** (*Viscum*). Древне-латинское названіе, заимствованное у Виргилія и соответствующее греческому *ixos*. С. ремнецвѣтниковыхъ. (30). Умѣр. и жаркія страны земной поверхности. Тепл., оранжев. и выш. кустар. пр., поселяющіяся на деревьяхъ паразитами.

**В. альбумъ** (*V. album*, бѣлый). *Омѣла*. Европа. Цв. зеленые, въ мартъ до мая; плоды бѣлые, клейкіе. 1 ф. Садового значенія не имѣетъ.

**ВИСМІА** (*Vismia*). *Де Висм* (*De Visme*)—торговый домъ въ Лиссабонѣ. С. вѣтрообойныхъ. (20). Трон. Америка и З. троп. Африка. Тепл. деревья и кусты. Глин. дерн. съ торф. Черенками въ пескѣ, въ парникѣ. Темп. зимой 8—10, лѣтомъ 13—24°.

**В. глѣбра** (*V. glabra*, гладкая). Перу. Цв. красные, въ июль. 6 ф. **В. гвианензисъ** (*V. guianensis*, гвианская). Гвиана. Цв. желтоватые, въ августъ. 8 ф. **В. гвинееизисъ** (*V. guineensis*, гвинейская). Гвинея. Цв. бѣловатые, въ май. 6 ф.

**ВИСНЕА** (*Visnea*). *Висне* (*Visne*)—лиссабонскій купецъ, занимавшійся ботаникой. С. тернстрѣмійныхъ. (1). Оранжев. древ. р. Уходъ какъ за Эвріа.

**В. моканера** (*V. mocanera*, моканскій). Капарекіе о. и Мадера. Цв. мелкіе, въ мартъ.

**ВИССОНЪ** (библейскій). См. Госсипумъ.

**ВИСТАРІА** (*Wistaria*). Каспаръ *Вистаръ* (*Wistar*)—проф. анатоміи въ Пенсильваніи. † 1818. С. бобовыхъ. (5). С. Америка, Китай, Японія. Оранжев. цѣпкіе кусты. Сильная глин. дерн. Отводкой, лѣтомъ.

**В. хинензисъ** (*W. chinensis*, китайская). Китай. Цв. бѣлыя розоватыя, кистями, въ май и июль. Сип. *В. синензисъ*, *Глицине синензисъ*. *Г. хинензисъ* (*W. sinensis*, *Glycine sinensis*, *G. chinensis*). Имѣетъ нѣсколько разновидностей. **В. японика** (*W. japo-*

*nica*, японская). Японія. Цв. бѣлые, кистями, въ июль—августъ. Выющійся кустъ.

**ВИТЕКСЪ** (*Vitex*). Древне-латинское названіе С. желѣзняковыхъ. (60). Жаркія страны земной поверхности, лѣсокъ. въ умѣр. Азіи и Ю. Европѣ. Тепл., оранжев. и вышос. древесн. или куст. пр. Глин. дерн. съ торф. Черенками въ пескѣ, въ парникѣ.

**В. агнус-кастусъ** (*V. Agnus castus*, Агнецъ непорочный). *Верба воломская*. Ю. Европа. Цв. бѣдно-лиловые, въ августъ. 6 ф. **В. Линдена** (*V. Lindenii*, Линдена). Колумбія. Цв. лиловые съ красными черточками, въ май.

**ВИТИСЪ** (*Vitis*). Древне-латинское названіе, взятое у Виргилія и др. и происходящее, вѣроятно, отъ *vico*—связывать, по обвивающему росту. С. виноградныхъ. (230). Трон. страны, но рѣдко въ троп. Америкѣ. Тепл., оранжев., а въ умѣр. климатахъ—вышос. цѣпкія, иногда выющіяся куст. пр. Глин. дерн. Черенками, въ парникѣ.

**В. винифера** (*V. vinifera*, дающій вино). *Виноградъ*. Ю. Каспійскаго м. Цв. желтоватые, въ июль—июль; плоды бѣлые или зеленоватые до темнопурпуровыхъ. Р. назвѣстное съ отдаленныхъ библейскихъ временъ, какъ дающее вино. Въ холодныхъ климатахъ, а южные сорта и въ умѣренныхъ, содержатся подъ защитой стекляннихъ построекъ. Имѣетъ много разновидностей и формъ. **В. эстивалисъ** (*V. aestivalis*, лѣтній). С. Америка. Цв. пахнутъ резедой, въ май—июль; плоды черные, съ налетомъ, мелкіе, вкушенные, поспѣвающие въ сентябрь. 20 ф. **В. Лябруска** (*V. Labrusca*, *Изабелла*—виноградъ). С. Америка. Цв. съ запахомъ, какъ у резеды, въ июль; плоды темнопурпуровые или янтарнаго цв., съ мускатнымъ вкусомъ. Сип. *В. Тунбергіи* (*V. Thunbergii*). В. ляната (*V. lanata*, пушистый). Гималай. Цв. зеленые, мелкіе, въ май. Лл. сердцевидно-овальные, краснѣющие осенью.

**ВИТСЕНІА** (*Witsenia*). *Витсенъ* (*Witsen*)—голландскій покровитель ботаниковъ. С. косатиковыхъ. (1). Оранжев. куст. р. Песков. торф. Дѣленіемъ или сѣменами.

**В. коримбоза** (*W. corymbosa*, щитковая). Ю. Африка. Цв. сине-пурпуровые, въ июль. Стебель высокій, ветвящійся.

**ВИТТАРІА** (*Vittaria*). *Витта*—лента, по узкимъ ваямъ. С. папоротниковыхъ. (13). Тропич. страны. Тепл. пр.

**В. линейата** (*V. lineata*, линейная). Вест-индія, Гвинея. Ваи длин. въ 6—18 д., шир. до  $\frac{3}{8}$  д. Сип. *Тинелопсисъ линейата* (*Tineopsis lineata*).

**ВИТФЕЛДІА** (*Whitfieldia*). *Вуит-*

*фелдъ* (*Whitfield*)—коллекторъ африканскихъ пр. С. акантовыхъ. (2). Тропич. Африка. Тепл. куст. пр. Уходъ какъ за Барлерія.

**В. латеріція** (*W. lateritia*, кирпично-красная). Цв. съ красною чашечкой и красно-оранжевымъ вѣнчикомъ, съ октября до марта. 3 ф.

**ВИТХЕДІА.** См. Уайтхедія.

**ВИЦІА** (*Vicia*). Древне-латинское названіе, встречаемое у Виргилія. С. бобовыхъ. (100). Умѣр. пояса Сѣв. полушарія и Ю. Америки. Большею частью вышос. одно-или многол. трав. пр., не имѣющія садового значенія. Обыкн. садов. Однол.—сѣменами; многол.—дѣленіемъ.

**В. аргентеа** (*V. argentea*, серебристая). Цв. малиновые, въ июль; дл. серебристые. 1 ф. Мног. **В. онобрихойдесъ** (*V. onobrychoides*, похожая на Онобрихисъ). Ю. Европа. Цв. пурпуровые. 2 ф. Однол.

**ВИШЕННИКЪ. ВИШНЯКЪ.** Вишневая роща, лѣсокъ, садъ.

**ВИШНИ ЖИДОВСКІЯ или ПЕСЬИ.** См. Физалисъ. *В. лобовная*. См. Солянка. *В. дикая*, *В. обыкновенная*, *В. шпанская*. См. Церасусъ.

**ВКАПЫВАТЬ.** Зарывать въ яму, заваливая землей.

**ВКУСЪ.** Свойство плода и др. части растений, отдѣляемыхъ на языкъ.

**ВЛАГАЛИЩЕ.** Обертка вокругъ стебля, образуемая основаніемъ листового черенка.

**ВНУТРЕРОСЛЫЙ.** См. Однодольный.

**ВНѢРОСЛЫЯ.** См. Двудольныя.

**ВОАНДЦЕЯ** (*Voandzeia*). Мѣстное названіе на Мадагаскарѣ. С. бобовыхъ. (1). Тепл. трав. р. Уходъ какъ за Арахисъ.

**В. субтерранеа** (*V. subterranea*, подземная). Тропикки. Цв. бѣдно-желтые, въ июль. 3 д.

**ВОУАПА** (*Vouapa*). Мѣстное названіе въ Гвианѣ. С. бобовыхъ. (3). Гвиана. Тепл. древ. пр. Песков. глин. дерн. съ добавленіемъ торфяной. Черенками изъ зрѣлаго роста въ пескѣ, въ парникѣ.

**В. бифолія** (*V. bifolia*, двулистная). Цв. фиолетовые, въ май. 10 ф. Сип. *Макролобיוםъ бифоліумъ* (*Macrolobium bifolium*).

**ВОДЪ.** Стихійная жидкость, ниспадающая въ видѣ дождя и снѣга, образующая на землѣ родники, ручьи, рѣки, озера и моря. Кипящая вода образуетъ *паръ*, мерзлая *ледъ*. Состоитъ изъ газовъ *водорода* и *кислорода*.

**ВОДОГОНЪ.** См. Тамусъ.

**ВОДОСТОКЪ. ДРЕНАЖЪ.** Устра-

неніе застоя воды—условіе необходимое для благосостоянія растенія, произрастающаго на воздухѣ, а тѣмъ болѣе въ горшкѣ. Нижний слой земли, изъ котораго не удаляется застойная, излишняя, вода, окисаетъ и вызываетъ гніеніе корней. На воздухѣ водостокъ устраивается проложеніемъ водосточныхъ или дренажныхъ трубъ, въ горшкахъ—слоемъ изъ веществъ, между которыми вода протекаетъ легко,—битыхъ черепковъ, крупнаго песку и т. п.

**ВОДОЛИСТОВЫЯ** пр. (*hydrophyllaceae*). Малочисленное сем. травянистыхъ однолѣтнихъ или многолѣтнихъ, рѣдко полукустарныхъ породъ, встречаемыхъ большею частью въ сѣверо-запад. Америкѣ. Родовъ 16 и видовъ 150. Главнѣйшіе роды Гидролеа, Гидрофильлюмъ, Немофила, Фацелія и Эмменанте.

**ВОДОПДЪ. КАСКАДЪ.** Паденіе воды съ уступа на уступъ. Въ саду составляетъ очень красивую часть. Если есть природное паденіе воды съ болѣе возвышенной части, то русло водопода обдѣлывается прилично стило, причѣмъ и ручью, въ который стекаетъ вода, дается красивое извилистое направленіе, а подъ струей и около кладутся въ живописномъ безпорядкѣ камни. Стороны водопода обсаживаются соответствен. растеніями.

**ВОДЯНКА.** См. Эмпетрумъ.

**ВОДЯНКОВЫЯ** пр. (*empetraceae*). Кустарныя растен. съ непадающими листьями, похожія на верески. Цв. маленкіе, одиночные или собранные. Распространены по сѣвер. умѣренному и арктическому поясамъ, также въ Чили и Огненной землѣ. Родовъ 3, видовъ 4. Роды: Корема, Цератіола и Эмпетрумъ.

**ВОДЯНОЕ РАСТЕНІЕ.** Живущее въ водѣ; бываетъ *плавающее*, когда листья и цвѣты находятся поверхъ воды, и *погруженное*, когда все растеніе находится подъ водой. На воспитаніе водяныхъ пр. въ садахъ вообще обращается вниманіе меньше, чѣмъ бы это заслуживало, тѣмъ болѣе, что это не представляетъ затрудненій. Наиболѣе хороши и годны сѣдъ. водяныя растенія: для оранжевыхъ и теплицы,—апоногонъ, герпестисъ, дамассоніумъ, лимнохарисъ, нелумбіумъ, нимфеа, писція, понтедерія, сальвинія, талия, періанеа, увирандра, викторія и циперусъ, а для открытаго водоема—ализма, бутумусъ, вилларсія, хоттонія, калла, менцантесъ, нуфаръ, полигонумъ, сагитарія, тифа, трапа.

**ВОЗДУХЪ.** Среда, окружающая земной шаръ и образующая его атмосферу. Чистый—состоитъ изъ кислорода (21) и



азота (79 частей по объему), съ различнымъ количествомъ водяныхъ паровъ.

**ВОЛКОЦВѢТЬ.** См. Лябурнумъ.

**ВОЛОЖСКИЙ ОРѢХЪ.** См. Юглансъ.

**ВОЛОСКИ.** Трубчатые нити, вырастающія на поверхности разныхъ частей.

**ВОЛОСНИКЪ.** См. Гераниумъ.

**ВОЛЧЬЕ ЛЫКО.** См. Дафно.

**ВООДСІЯ.** См. Вудсія.

**ВОРВАНЪ.** Жидкій жиръ рыбій или морскихъ животныхъ.

**ВОРГУЛЕКЪ** или **ВОРГУНОКЪ.** Яблоко позднее, продолговатое, желтоватого цвѣта, гладкое, кисло-сладкое, сочное; отлично сохраняется въ лежку и мочкѣ.

**ВОРМИЯ (Wormia).** Олафъ *Вормисъ* (Wormius)—датскій натуралистъ. С. дильшеневыхъ. (9). Австралія, Маскаренскіе о., Троп. Азія. Тепл. дрв. рр. Легкая песчаная гл. дерн. Черенками изъ полуврѣлаго роста, въ песокъ, въ парникѣ. В. *Ворбиджеи* (W. Burbidgei, Ворбиджа). С. Борнео. Цв. золотисто-желтые, блѣдные, въ іюль.

**ВОРОНІЙ ГЛАЗЪ.** См. Парисъ.

**ВОРОНОКЪ.** См. Пёонія.

**ВОРСОВАЛЬНЫЯ ШИШКИ.** См. Дипсакусъ.

**ВОРСЯНКА.** См. Дипсакусъ.

**ВОРСЯНКОВЫЯ** рр. (dipsaceae). Дву- и многолѣт. травянистыя рр. почти исключительно умѣренныхъ странъ. Родовъ пять, въ томъ числѣ Дипсакусъ, Скабоза и Цефаларія.

**ВОСКОВНИКЪ.** См. Мирика.

**ВОСКОВНИКОВЫЯ** рр. (myricaceae). Древесныя и кустарныя, часто ароматическія рр., широко распространенныя по Европѣ, умѣренной и троп. Азіи и С. Америкѣ. Въ корѣ многихъ заключается вязкое смолистое вещество; кромѣ того въ нихъ же содержится воскъ, бензойная кислота и танинъ. Все с. ограничено однимъ родомъ—Мирика, содержащимъ до 35 видовъ.

**ВОСКЪ.** Вещество, выделяемое пчелами изъ растительныхъ частей для построения сотовыхъ ячеекъ (вошницъ), а также образуемое растеніями на различныхъ частяхъ. Воскъ растительный отличается составомъ отъ пчелинаго, хотя имѣетъ много съ нимъ общаго.

**ВОСТОКЪ.** Часть, обращенная къ мѣсту восхожденія солнца.

**ВОСТАНКА.** См. Церпентъ.

**ВОШІЗИЕВЫЯ** рр. (voschysiaceae). Малочисленное сем. древесныхъ, нерѣдко

очень высокихъ рр., содержащихъ смолистый сокъ и цѣлющихъ, либо выходящихъ кустарниковъ, сосредоточенныхъ въ троп. Америкѣ. Родовъ семь, видовъ около ста. Изъ родовъ наиболее известны Вошизія, Квалея и Тригонія.

**ВОШІЗИЯ (Voschysia).** Мѣст. гвианское названіе. С. вошизиевыхъ. (40). Бразилія, Гвиана, В. Перу и Нов. Гренада. Тепл. куст. или дрв. рр. Глин. дерн. съ торф. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ песокъ, въ парникѣ.

**В. гвианензисъ** (V. guianensis, гвианская). Гвиана. Цв. желтые, душистые, стоячими кистями, въ августѣ. 12 и болѣе ф. **В. томентоза** (V. tomentosa, пушистая). Гвиана. Цв. желтые, пониклыми кистями, въ августѣ. 25 ф.

**ВОШЪ** растительная, или **ТЛЯ.** См. это слово.

**ВРАЗѢЖКУ.** Въ шахматномъ порядкѣ—одинъ рядъ противъ промежутокъ другого.

**ВРИГТИЯ.** См. Ураитія.

**ВСКОРѢДИТЬ.** Забороновать легко землю.

**ВУДВАРДІЯ (Woodwardia).** Томасъ Дженкинсонъ *Вудвардъ* (Woodward)—англійскій ботаникъ. С. папоротниковыхъ. (6). Умѣр. страны С. полушарія до тропиковъ. Оранж. рр.

**В. ареолата** (W. areolata, раздѣленная лучами). Соед. Штаты. Ван 9—12 д. продолговато-ланцетовидныя перистыя. Сн. **В. angusti-фолія** (W. angustifolia). **В. ради-кансъ** (W. radicans, укореняющаеся). Ю. Европа, Канарскіе о. Ван 3—4 ф. длиной, перистыя; перья ланцетовидныя. Имѣетъ форму *христата* (cristata) съ гребенчатыми перьями.

**ВУДСІЯ (Woodsia).** Джозефъ *Вудсъ* (Woods)—авторъ „The Tourist's Flora“. † 1864. С. папоротниковъ. (14). Прем. умѣр. и холодныя страны. Мелкіе тепл., оранж. или выносл. папоротники.

**В. молилизъ** (W. mollis, мягкая). Мексика, Гватемала. Ван ланцетовидныя, перистыя; перья сидячія. Оранж. р. Сн. *Физематіумъ молилизъ* (Physematum mollis).

**В. obtusa** (W. obtusa, тупая). Отъ Соед. Шт. до Перу. Ван продолговато-ланцетовидныя, дву- или трехперистыя. Сн. **В. Ферриніана** (W. Ferriniana).

**ВУДФОРДІЯ (Woodfordia)** *Вудфордъ* (Woodford)—англійскій ботаникъ. С. плакуновъ. (1). Тепл. куст. Уходъ какъ за Лейантусъ.

**В. флорибунда** (W. floribunda, со скупченными цв.). Индія. Цв. шарлаховые, въ маѣ, іюнь. 1—4 ф. Сн. **В. томентоза**,

*Гризлея томентоза* (W. tomentosa, Grisleya tomentosa).

**ВУЛЬФЕНІЯ (Wulfenia).** *Вульфенъ* (Wulfen)—авторъ ботан. сочиненій. С. поричниковыхъ. (4). Гималаи, З. Азія, Каринтія. Полувын. многол. трав. рр. Глин. дерн. съ торф. Дѣленіемъ или сѣменами.

**В. каринтіака** (W. carinthiaca, каринтская). Альпы Каринтіи. Цв. голубые, въ іюль.

**ВУЛЬФІЯ (Wulfia).** *Вульфъ* (Wulff), авторъ „Flora borussica“, † 1767. С. сложнопѣстныхъ. (8). Троп. Америка. Тепл. многол. трав. рр. Легкая. Сѣменами или дѣленіемъ.

**В. макулата** (W. maculata, пятнистая). Бразилія. Цв. головки желто-оранжевыя, въ іюль. 3 ф. Сн. *Гимноломиа макуллатумъ* (Gymnolomia maculatum).

**ВУРМБЕА (Wurmbea).** *Вурмбъ* (Wurmbe)—секретарь батавской академіи наукъ. С. лилейныхъ. (7). Ю. Африка и Австралія. Оранж. луков. рр. Песк. торф. съ небольшимъ количествомъ глин. дерн. Сѣменами или отпрысками.

**В. кампанулата** (W. campanulata, колокольчатая). Ю. Африка. Цв. блѣдные, въ маѣ—іюнь. 6—12 д. Сн. **В. курчурелъ**, *Меліантіумъ монопеталумъ* (W. purpurea, Melianthium monopetalum).

**ВШІВИЦА.** См. Педикюларисъ.

**ВШІВЫЙ ЛЕВЪ.** Личинка сѣтчатокрылаго насѣкомаго,—*златолазки* (Chrysopa), питающаяся листовыми вшами (тлей).

**ВЫГОНКА.** Доведеніе растенія до необычно ранняго цвѣтенія или плодоношенія. Одно изъ самыхъ важныхъ садовыхъ производствъ, совершаемыхъ въ то время, когда наружная температура низка или измѣнчива, когда свѣтъ незначителенъ. Плодовые деревья возбуждаются къ раннему росту искусственнымъ нагрѣваніемъ воздуха; принесшія плоды вступаютъ въ покой раньше, чѣмъ на воздухѣ. Выгнанныя цвѣт. раст. источаются этимъ пасліемъ такъ, что на слѣдующій годъ становятся неспособными цвѣсти, имъ дается одинъ или два года для отдыха въ грунтѣ. Подготовленіе растеній къ выгонкѣ составляетъ также весьма важное условіе въ успѣшномъ производствѣ. Самая выгонка должна дѣлаться постепеннымъ усиленіемъ температуры. Въ пасмурную погоду нельзя давать такой же высокой температуры, какъ въ ясный день, иначе ростъ будетъ слабый.

**ВЫДЫХАНІЕ.** Испусканіе воздуха, испареніе, производимое органами листа, называемыми *дышальцами* или *устьицами*.

**ВЫДѢЛЕНІЕ.** Органическое вещество, образуемое внутри или выступающее наружу у растенія.

**ВЫЗРѢВАНІЕ.** Достиженіе сѣлости плодомъ или ростомъ.

**ВЫЗУВЕРННЫЙ.** Край съ округлыми зубчиками,—круглозубчатый.

**ВЫЗЫВАНІЕ. ВЫМЕРЗАНІЕ.** Погибель отъ мороза.

**ВЫЛАМЫВАНІЕ** сучьевъ, почекъ. Устраненіе ломкою, а не рѣзкой Оно обычно дѣлается для удаленія лишнихъ почекъ, цвѣтовъ и побѣговъ въ раннюю пору ихъ образованія, для привлеченія сока къ болѣе сильнымъ и необходимымъ для полученія лучшихъ вѣтвей, цвѣтовъ или плодовъ. Оно преимущ. дѣлается въ плодовыхъ рр., воспитываемыхъ подъ стекломъ, для того, чтобы удержать размеры растенія. Требуется большого соображенія и навыка; дѣлается въ самую раннюю пору образованія выламываемыхъ частей, какъ только ихъ можно ухватить пальцами.

**ВЫМИРАНІЕ.** Поголовная гибель вслѣдствіе несоотвѣстныхъ естественныхъ или искусственныхъ условій.

**ВЫНОСЛИВЫЯ** рр. Переносимыя измѣнчивымъ климатъ и зимующія безъ вреда на воздухѣ, также тѣ изъ однолѣтнихъ, которые высѣваются прямо въ грунтъ, въ отличіе отъ *полувывносимыхъ*, нуждающихся въ защитѣ на зимнее время отъ морозовъ или высѣваемыхъ, предварительно высаженные на воздухъ, въ тепломъ помѣщеніи.

**ВЫПѢЛЫВАТЬ. ВЫПОЛОТЬ.** Очистить отъ сорной травы.

**ВЫПИРАНІЕ.** Вытаскиваніе, выковыриваніе корня или всего растенія вслѣдствіе дѣйствія мороза. Имѣя это въ виду, не слѣдуетъ привязку вновь посаженныхъ растеній къ колыямъ или опорамъ оставлять на зиму, потому что эта привязка будетъ препятствовать вымерзанию растенію опуститься снова въ землю.

**ВЫРАЩИВАТЬ.** Выводить, заботясь о доставленіи молодому растенію необходимаго для его роста и силы.

**ВЫРОЖДЕНІЕ.** Перерожденіе, произведеніе поколѣнія, не похожаго на материнское растеніе.

**ВЫРЫВАТЬ.** Выкапывать, вынимать изъ земли; выдергивать съ силою.

**ВЫСАДОКЪ.** Молодое растеніе высаженное изъ горшка, парника, теплицы, питомника на воздухъ. О плодовыхъ деревьяхъ говорится *присадокъ*. Полувыносимыя высаживаются въ открытый



грунтъ обыкновенно только на лѣто. См. также *мѣстико*.

**ВЫСАЖИВАТЬ. ВЫСАДИТЬ.** Пересаживать, вынимать и сажать на другое мѣсто.

**ВЫСОКОСТВОЛЬНЫЙ.** Выгнанный въ стволъ относительно высокаго размѣра.

**ВЫСОТСКОЕ** яблоко. Сортъ средней поры поспѣванія, довольно крупный, желтоватый съ росписью, продолговатой формы, съблѣнный хорошаго вкуса; хороше въ мочкѣ.

**ВЫСПѢВАНІЕ.** Поспѣваніе; достиженіе зрѣлости, спѣлости.

**ВЫСТАВКА.** Собраніе замѣчательнаго на показъ и для состязанія.

**ВЫСТАВЛЯТЕЛЬ. ВЫСТАВИТЕЛЬ. ВЫСТАВЩИКЪ.** Представившій на выставку. Экспонентъ.

**ВЫСТРИГАНІЕ.** Удаленіе частей пожнищами.

**ВЫТАНУТЫЙ, ВЫТАНУВШІЙ.** СЯ. Ростъ необычно длинный и слабый. Растенія тянутся или отъ слишкомъ тѣснаго, или отъ недостаточно близкаго къ свѣту помѣщенія ихъ. Растенія мягко-древесныя и молодые побѣги тянутся отъ недостатка свѣта и воздуха, или отъ избытка тепла и влажности. — Тянущееся растеніе не можетъ быть сильнымъ.

**ВЫШЕДУШИВАТЬ. ВЫШЕДУШИТЬ.** Очищать сѣмена отъ шелухи.

**ВЬЮНКОВЫЯ** рр. (*convolvulaceae*). Обширное сем. изъ травянистыхъ и кустарныхъ, обычно вьющихся рр. съ млечнымъ сокомъ. Цвѣты правильные, одиночные. Листья очередные, безъ прилистниковъ. Содержитъ до 700 видовъ и роды Ватаста, Ипомея, Калистерія, Конвольвулюс и Фарбитисъ.

**ВѢРОЛИСТНЫЙ.** Имѣющій листья очертаніемъ похожіе на вѣрѣ.

**ВѢЮЩЕЦВѢТНЫЕ** рр. Отдѣлъ двусѣмеловыхъ, большинство кот. имѣетъ цвѣтки съ чашечкою и вѣничкомъ, причѣмъ вѣнички бываютъ срослолепестный и подпестичный.

**ВѢНОКЪ.** Плетеница изъ вѣтокъ, листьевъ, зелени съ цвѣтами, дѣлаемая обыкновенно ободомъ.

**ВѢНИКЪ.** Верхняя часть цвѣтка, состоящая изъ лепестковъ отдѣльных или сросшихся.

**ВѢТВИСТЫЙ.** Раздѣленный на густыя и частыя вѣтви.

**ВѢТВЬ. ВѢТКА.** Отростокъ, побѣгъ дерева изъ сука или часть стебля. *Пень* или *моина* пускаетъ *сучья*, они дѣлятся

на *вѣтви*, *вѣтки*, а отъ нихъ идутъ *побѣги*. У растений мелкихъ, травянистыхъ первое дѣленіе тоже называется вѣтками, вѣточками.

**ВѢТЕРЬ.** Движеніе или теченіе воздуха. По направленію называется странами свѣта, по силѣ — бурей, сильнымъ, среднимъ, слабымъ, тихимъ; по постоянству направленія — постояннымъ, преобладающимъ, измѣчивымъ, переходнымъ и пр., по свойству — сухой, влажный, теплый, холодный.

**ВѢТРОВОЙ.** Плоды или сучья половинные и сбѣтые вѣтромъ.

**ВЯЗЕЛЬ.** См. Коронилія.

**ВЯЗНИКЪ.** См. Статице.

**ВЯЗЬ.** См. Ульмусъ.

**ГАГЕА.** См. Гэжеа.

**ГАГНЕВИНА** (*Gagnebina*). *Гagnebin* (*Gagnebin*) — ботаникъ XVII ст. С. бобовыхъ. (1). О. Маврикія. Тепл. куст. Торф. съ глины дерн сѣменами, въ парникѣ весной, предварительно размочивъ въ теплой водѣ; черенками изъ полувырѣннаго роста, въ парникѣ, въ апрѣлѣ. Темп. лѣтомъ 13—20, зимой 7—10°.

**Г. тамарисцина** (*G. tamariscina*, тамарисковал). О. Маврикія. Ц. желтые. 6 ф.

**ГАЗОНЪ.** Муровъ. Дернъ. Лужайка. Хорошо сдѣланный и въ порядкѣ содержанія газонъ — весьма важная принадлежность сада. Долженъ быть ровной поверхности, — безъ ямокъ и бугровъ чѣмъ обширнѣе, тѣмъ лучше, но тѣмъ замѣтнѣе его недостатки. Приготавливается съ осени; только при хорошемъ водостокѣ можетъ быть удовлетворителенъ; земля не должна быть легкая, а скорѣе плотная; вскопанное и уравнированное мѣсто остается на зиму, чтобы улеглось и уплотнилось, а весной его или застилаютъ дернинами однообразной толщины и убиваютъ ихъ, или закрываютъ травой; сѣять должно рѣдко, въ тихую погоду и потомъ слегка поволочить граблями, а когда покажутся всходы — укатать тяжелымъ каткомъ. Можно сѣять траву и съ осени. Подновлять газонъ можно посѣпаніемъ его, весной или осенью, хорошей легкой землей, а мохъ уничтожать — забрызгиваніемъ послѣ дождя известію.

**ГАЗЪ.** Воздухообразное вещество, входящее въ составъ многихъ твердыхъ, жидкихъ и воздухообразныхъ тѣлъ. Газъ *осапительный* имѣетъ чрезвычайно вредное вліяніе на растенія, содержащіеся тамъ, гдѣ имъ освѣщается, вслѣдствіе пересыханія воздуха и отдѣленія губительно дѣйствующихъ продуктовъ горѣнія газа.

**ГАЙЛУССАЦІЯ.** См. Гейлюсакія.

**ГАЙНИКЪ.** См. Неоттія и Эпилактысъ.

**ГАЛЕАНДРА** (*Galeandra*), *Galea* — племъ и *анг.* *andros*, тычинка; по греческому мужск. органу на вершинѣ столбика. С. орхидей. (6). Бразилія, Мексика. Теплич. земныя орхидеи. Торф. въ горникахъ. Чаше обмывать отъ краснаго напуска.

**Г. Бауери** *лютеа* (*G. Baueri lutea*, Бауэра желтая). Гвиана. Цв. желтые, съ іюня до августа. 6 д. Рѣдкое р. **Г. девоніана** (*G. Devoniana*, девонская). Ю. Америка. Цв. бѣлые, въ разное время года. 2 ф. **Г. нивалисъ** (*G. nivalis*, снѣжно-бѣлая). Тропич. Америка. Цв. яркіе, оливковые, съ бѣлою губою, у которой фиолетовое пятно посрединѣ.

**ГАЛЕГА** (*Galega*). *Galea* — молоко; полагаютъ, что р. это увеличиваетъ молочный удой. С. бобовыхъ. (3). Ю. Европа, З. Азія. Многол. трав. рр. Сильная глини. дерн. Дѣленіемъ корней и сѣменами.

**Г. официнальсъ** (*G. officinalis*, аптечная). *Рутовка*, Ю. Европа. Цв. голубые, лѣтомъ. 3—4 ф. Есть разновидность *альбифлора* (*albiflora*) съ бѣлыми цв., растущая дико въ Персіи, 2—3 ф., и называемая также *персика* (*persica*, персидская). **Г. ориентальсъ** (*G. orientalis*, восточная). Кавказъ. Цв. голубые. 2—4 ф. Отличается отъ предыдущей ползучимъ корнемъ и простыми, извилистыми стеблями.

**ГАЛЕОПСИСЪ** (*Galeopsis*) *Gale* — хорека, *opsis* — подобіе, — цв. походятъ будто на мордочку хорька. С. губоцвѣтныхъ. (12). Европа, Азія. Однолѣтн. трав. рр. Обыки. садовая. Сѣменами.

**Г. верзиколоръ** (*G. versicolor*, разноцвѣтный). *Зябля*. Цв. желтые, съ пурпуровымъ пятномъ на нижней губѣ, лѣтомъ и въ осень. **Г. ладанумъ** (*G. Ladanum*, ладанный). *Билка*, *Биллака*. Цв. пурпуровые, лѣтомъ и осенью. Оба растенія — наши полевые, между хлѣбными злаками.

**ГАЛИПЕА** (*Galipea*). Мѣстное названіе одного изъ индѣйскихъ видовъ. С. рутовыхъ. (20). Троп. Америка. Теплич. древесн. и кустарн. рр. Уходитъ какъ за *Эритрохитонъ*.

**Г. макрофилля** (*G. macrophylla*, крупнолистная). Бразилія. Цв. розовые или бѣлые. 2 ф. **Г. одоратиссима** (*G. odoratissima*, очень душистая). Рио-Жанейро. Цв. бѣлые, очень душистые, въ маѣ. 2 ф.

**ГАЛІУМЪ** (*Galium*). Названіе встречаемое у Diosкорида и производное отъ *gala* — молоко, н. ч. р. употреблялось для свертыванія молока. С. мареновыхъ. (250). По всѣмъ умѣреннымъ поясамъ

земной поверхности. Одно- и многол. трав. рр., составляющія сорныя травы, въ садоводствѣ не употребляемыя.

**ГАЛЬТОНІЯ.** См. Гольтонія

**ГАЛЬФІМІЯ** (*Galphimia*). Анна-грамма Мальпигія. С. мальпигіевыхъ. (10). Тропич. Америка. Тепл. кустарн. рр. съ желтыми цв. Торф. съ глины дерн. Черенками изъ зрѣлаго роста въ песокъ, въ парникѣ. Темп. лѣтомъ 13—20, зимой 4—10°.

**Г. глянца** (*G. glauca*, сизая). Мексика. Дл. внизу сизые.

**ГАЛЬЯРДІЯ** (*Gaillardia*). *Гальяръ* (*Gaillard*) — французъ, покровительствовавшій ботаникѣ. С. сложнцвѣтныхъ. (8). С. и Ю. Америка. Орнам. одно- и многол. трав. рр. Легкая, рыхлая, сильная земля. Сѣменами, въ февралѣ, мартѣ, въ теплѣ. Гдѣ многол. зимуютъ — черенками и дѣленіемъ.

**Г. амблиодонъ** (*G. amblyodon*, тупо-зубчатая). Техасъ. Цв. головки съ лучами кроваво-красными, въ октябрѣ. 2—3 ф. Однол. **Г. аристата** (*G. aristata*, щетинистая). Соед. ам. Шт. Цв. головки желтыя. 1/2 ф. Многол. **Г. пульхелля** (*G. pulchella*, красивая). С. Амер. Цв. головки крупнѣе чѣмъ у др., лучевые цв. красно-малиновые съ желтыми кончиками, осенью. 2—3 ф. Однол. Замѣчательна разновид. *Лоренціана* (*Lorenziana*), у нея всѣ цвѣточки превратились въ трубчатые, трехлопастные.

**ГАЛІАКСІЯ** (*Galaxia*). *Gala*, *galaktos* — молоко; по соку. С. косатиковыхъ. (3). Ю. Африка. Орнам. луковичн. рр. Песчанист. торф. съ небольшимъ количествомъ волокнистой глины. дерн. Отпрысками.

**Г. овата** (*G. ovata*, яйцевидная). Мысъ Д. Н. Цв. темно-желтые, въ маѣ до сент.; почти беззесельное р.

**ГАЛІАХЪ** (*Galax*). *Gala* — молоко, по бѣлымъ цв. С. діапонзевыхъ. (1). Каролина. Низкорослое многолѣт. трав. р. Листов. съ малымъ количествомъ глины. дерн. и древесн. углемъ. Дѣленіемъ, осенью.

**Г. афилля** (*G. aphylla*, безлистный). С. Америка. Цв. бѣлые, въ іюлѣ. 3—6 д.

**ГАЛАКТИТЕСЪ** (*Galactites*). *Galaktos* — молоко, по бѣлымъ жилкамъ лл. С. сложнцвѣтныхъ. (3). Средизем. побережье. Одно- или двул. трав. рр. Садовая обикн. Сѣменами, весной.

**Г. томентоза** (*G. tomentosa*, пушистый). Цв. головки пурпуровыя, въ іюлѣ. 1/2 ф. Р. содержитъ млечный сокъ.

**ГАЛАКТОДЕНДРОНЪ** (*Galactodendron*). *Galaktos* — молоко и *dendron* — дерево, по млечному соку. С. крапивоныхъ.



Теперь относится къ роду *Бросимумъ*. *Г. utile* (G. *utile*, полезный, — *Palo de vasa*). Растетъ въ Венецелѣ; встрѣтитъ можно только въ ботаническихъ садахъ.

**ГАЛАНТУСЪ** (*Galanthus*). *Gala*; или *Galaktos* — молоко и *anthos* — цвѣтокъ по окраскѣ. С. амариллисовыхъ. (5). Европа, 3. Азія. Выносл. луковичн. рр. Садовая обикн. Можно воспитывать и въ горшкахъ, но къ ранней выгонкѣ не способны.

**Г. нивалисъ** (G. *nivalis*, снѣжно бѣлый). *Подснежникъ*. Европа. Цв. бѣлые; три внутр. сегмента съ зелеными пятнышками внутренней сторонѣ. 4—6 д. Имѣетъ нѣсколько разновидностей. **Г. пликатусъ** (G. *plieatus*, складчатый). Крымъ. Цв. мелче и зеленоватые. 6 д. **Г. эльвесіи** (G. *Elwesii*, Эльвеса) Малая Азія. Внутр. сегменты съ небольшою выемкою на концахъ и съ зеленымъ пятномъ у основанія. 6—12 д.

**ГАРДЕНІЯ** (*Gardenia*). Александръ *Гарденъ* (Garden) — американскій ботаникъ. С. мареновыхъ. (60). Троп. страны. Тепло и оранже. кустарн. рр. Торф. 3/4, глини. дерн. 1 ч. съ нѣкоторымъ количествомъ дрв. угл. Черенками изъ вызрѣвшаго роста въ песчан. торф. землѣ въ горшкѣ по одиночкѣ, въ тепло. парникѣ. Темп. лѣтомъ 13—24, зимой 6—10°.

**Г. нитида** (G. *nitida*, блестящая). Сьерра Леоне. Цв. бѣлые, въ октябрь—ноябрь. 3 ф. Тепло. **Г. Тунбергій** (G. *Thunbergia*, Тунбергій). Центр. и южн. Африка. Цв. бѣлые, большіе, пахучіе, съ января до марта. 4—5 ф. Оранже. **Г. флориды** (G. *florida*, цвѣтоносная). Китай. Цв. бѣлые, пахучіе, въ августѣ. 2—6. Тепло. Имѣетъ разновидности *Форчуни* (*Fortunei*) — съ больш. крутыми цв. и *варіеата* (*variegata*) — съ пестрыми лл., а также съ махровыми цвѣтами, которая предпочтительно и воспитывается въ садахъ.

**ГАРДОКІЯ** (*Gardoquia*). Донъ-Діего *Гардоки* (Gardoqui), испанскій финансистъ XVIII стол., доставлявшій средства къ изданію флоры Перу. С. губоцвѣтныхъ. (26). Мексика, Андеіскіе горы въ Чили. Оранже. полукустар. рр. Глин. дерн. съ торф. и пескомъ. Черенками изъ полузрѣлаго роста, въ песокъ, подъ стекломъ.

**Г. мультифлора** (G. *multiflora*, многоцвѣтная). Чили. Цв. шарлаховые или пурпуровые, въ апрѣль. 1 ф.

**ГАРНЕЦЪ**. Мѣра сыпучихъ тѣлъ; восьмая доля четверти.

**ГАРПУСУСЪ**. Вареная, очищенная, твердая и ломкая смола.

**ГАРРИЯ** (*Garrya*). Майкель *Гарри* (Garry) — помощникъ Дугласу при его изслѣдованіяхъ флоры С.-З. Америки. С.

дереновыхъ. (8). Калифорнія, Мексика, Антильскіе о. Полувыносл. и оранже. куст. рр. Глин. дерн. съ торф. Черенками изъ полузрѣлой древесины въ песчан. дернов., въ затѣненіи.

**Г. эллиптика** (G. *elliptica*, эллиптическая). Калифорнія. Цв. зеленоватые, весной, 8—10 ф.

**ГАРСІНІЯ** (*Garcinia*). Лорансъ *Гарсенъ* (Garcin) — французскій врачъ и путешественникъ. С. гуммигутовыхъ. (36). Троп. Азія, троп. Африка. Новая Каледонія. Тепло. дрв. рр. Глин. дерн. съ торф. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ песокъ, въ тепло. парникѣ.

**Г. Мангостана** (G. *Mangostana*, Мангостанъ). Молуккскіе о. Цв. красные, похожіе на махровую розу о 4 лепесткахъ; плоды круглые, въ средней величинѣ апельсинъ; считаются самыми вкусными во всемъ свѣтѣ плодами. 20 ф.

**ГАРУГА** (*Garuga*). Мѣстное названіе. С. мѣшечковыхъ. (10). Троп. Азія и Америка, Австралія. Тепло. дрв. Уходъ какъ за Босвеллія.

**Г. пинната** (G. *pinnata*, перистая). Ост-индія. Цв. желтоватые. 60 ф.

**ГАСТЕРІЯ** (*Gasteria*). *Gaster* — брюхо, по брюшистому основанію цвѣтка. С. лилейныхъ. (50). М. Д. Н. Сочныя рр., очень близкія къ Алоэ, уходъ за которыми примѣнимъ и къ нимъ.

**Г. бревифолия** (G. *brevifolia*, съ короткими лл.) Цв. красные, въ іюль. **Г. дистиха** (G. *disticha*, двустрочная). Цв. шарлаховые. Имѣетъ много разновидностей. **Г. макулата** (G. *maculata*, пятнистая). Цв. шарлаховые. 6—9 д. **Г. пұльхра** (G. *pulehna*, красивая). Цв. шарлаховые. 6 д.

**ГАСТОНІЯ** (*Gastonia*). *Gastone* Бурбонскій — побочный сынъ франц. короля Генриха IV. С. аралиевыхъ. (1). О. Маврикія. Тепло. кустарникъ, сродный съ Аралія и нуждающийся въ такомъ же уходѣ.

**Г. кутиспонгія** (G. *cutispongia*, съ корою какъ губка). Цв. бѣлые съ зеленымъ. Кора губчатая.

**ГАСТРОДІЯ** (*Gastrodia*). *Gaster* — брюхо, по брюшистому спереди столбику. С. орхидей. (7). Австралія, Новозеландія и о. Индѣйскаго Океана. Земныя орхидеи, нуждающіяся въ такомъ же уходѣ, какъ Погонія.

**Г. Коннинггэма** (G. *Cunninghamii*, Коннинггэма). Цв. тускло-зеленые съ бѣлыми крапинками, стебли выпш. 1—2 ф. Сип. **Г. сезамойдесъ** (G. *sesamoides*).

**ГАСТРОЛОБИУМЪ** (*Gastrolobium*). *Gaster* — брюхо и *lobos* — стручокъ, по вздутымъ стручкамъ. С. бобовыхъ. (32). Зал.

Австралія. Оранже. многол. рр. Торф. съ глин. дерн. Съѣменами, обмоченными въ горячую водѣ, въ парникѣ, весной и черенками изъ полузрѣлаго роста, въ маѣ; не терпятъ окисанія земли или застоя воды. Темп. зимой 3—6°.

**Г. билобумъ** (G. *bilobum*, двулопастный). Цв. зеленые, въ мартѣ до мая; высокій кустъ. **Г. калицидумъ** (G. *calycidum*, съ большою чашечкой). Цв. желтые. Пряморослый кустъ.

**ГАУЛЬТЕРІЯ** (*Gaultheria*). *Gaultheria* — натуралистъ въ Канадѣ. С. вересковыхъ. (90). Америка, Нов. Зеландія. Оранже. кустарникъ или низкорослая дрв. рр. Торф. или песч. дерн. Отводками и съѣменами. Темп. 2—6° зимой.

**Г. антипода** (G. *antipoda*, изъ антипода). Нов. Зеландія. Цв. бѣлые или малиновые. 6 ф. **Г. прокумбенсъ** (G. *procumbens*, стелящаяся). С. Америка. Цв. бѣлые, въ іюль. Выносл. **Г. ферругинеа** (G. *feruginea*, ржавая). Бразилія. Цв. малиновые, въ іюль. Низкій оранже. кустарникъ. **Г. фрагрантиссима** (G. *fragrantissima*, очень душистая). Гималаи. Цв. бѣлые, въ апрѣль. Оранже. красивый кустарникъ.

**ГАУРА** (*Gaura*). *Gauvros* — превосходный, по красотѣ цв. С. анагриковыхъ. (20). Сѣв. Америка. Одно- и многол., рѣдко кустар., почти выносл. рр. Легкая з. Съѣменами.

**Г. Линдгеймера** (G. *Lindheimeri*, Линдгеймера). Техасъ. Цв. розоватые. 4 ф. Одно- и многол. р.

**ГАУССІЯ** (*Gaussia*). *Gauss* (Gauss) — нѣм. математикъ С. пальмъ. (2). Куба, Порторико. Средней величины пальмы съ перисто-разсѣченными лл. Уходъ какъ за Хамедореа. Въ садахъ преимущественно встрѣчаются **Г. Гисбрехтіи** (G. *Giesbreghtii*), называемая также *Хамедореа Гисбрехтіи* и *Ореодокса вентрикоза* (*Chamaedorea Giesbreghtii* or *Oreodoxa ventricosa*) и **Г. принцепсъ** (G. *princeps*).

**ГАЦАНІЯ** (*Gazania*). *G. Гаца* (Gaza) † 1478 г., переведшій ботанич. сочиненія Теофраста на латинскій языкъ. С. сложноцвѣтныхъ. (24). Ю. Африка. Оранже. красивый рр. Торф. съ глин. дерн. Черенками изъ бокового роста, въ песокъ, подъ колпакомъ. Темп. зимой 3—6°.

**Г. павонія** (G. *paronia*, павлиноная). М. Д. Н. Цв. желтые съ коричн. пятнами у основанія лепестковъ, въ іюль 1 1/2 ф. **Г. splendida** (G. *splendens*, великолѣпная). М. Д. Н. Цв. ярко-оранжевые съ бѣлымъ и чернымъ пятномъ у основанія лепестковъ. 1 1/2 ф. **Г. унифлора** (G. *uniflora*, одноцвѣтная). М. Д. Н. Цв. головни желтыя, въ іюль—августъ. 1 ф.

**ГВАЙЯКУМЪ** (*Guaiacum*). Названіе мѣстное, южно-американское. С. парнолистныхъ. (8). Вестиндія и троп. С. Америка. Тепло. дрв. и куст. рр. Сильная песчанистая, волокнистая глин. дерн. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ апрѣль — маѣ, въ песокъ, въ тепло. парникѣ. Темп. лѣтомъ 13—24, зимой 8—12°.

**Г. официнале** (G. *officinale*, аптечный) *Бакаутъ*. Ямайка. Цв. голубые, въ іюль. Дрв. и имѣетъ ароматич. запахъ. 30 ф.

**ГВАТТЕРІЯ** (*Guatteria*). *Гваттери* (Guatteria) — италійскій ботаникъ, бывшій проф. въ Пармѣ. С. ановыхъ. (50). Жаркія страны Нового свѣта. Тепло. орнамент. дрв. или кустарн. рр. Глин. дерн. съ торфян. и пескомъ. Черенками изъ полузрѣлаго роста, въ апрѣль, въ парникѣ.

**Г. оурегю** (G. *ouregou*, ouregou). Карибейскіе острова. Цв. желтоватые. Высокое дерево. Сип. *Анона хризопетала* (*Anona chrysopetala*).

**ГВОЗДИКА**, см. Каріофильность.

**ГВОЗДИЧНЫЯ** рр. (*scaryophyllaceae*). Обширное сем. травянистыхъ рр. съ стеблями, у которыхъ утолщенные колѣна. Цвѣты макушечные, одиночные, либо расположенные кистью, метелкой или полузонтикомъ. Листья цѣльные, супротивные. Наиболее извѣстные роды — *Аренарія*, *Диантусъ*, *Лихнисъ*, *Санонарія*, *Силенъ* и *Церастумъ*.

**ГДОНСКАЯ ГРУША**, иначе **МИЛѢПИНСКАЯ** и **ХРЯПА**. Сорть, формою похожій на грушу безъѣмянку, но съ желтой кожей съ румянцемъ; мякоть твердая.

**ГЕБЕНОВЫЯ** рр. (*ebenaceae*). Семейство дрв. или кустарныхъ породъ жаркихъ странъ. Чашечка остающаяся, 3—7 раздѣльная, вѣнчикъ 3—7 раздѣльной. Листья супротивные, рѣдко очередные. Родовъ 6, видовъ около 250. Изъ родовъ особенно важны: *Диоспиротъ*, *Маба*, *Роїена*, *Тетраклисъ* и *Эйклеа*. Нѣкоторыя гебеновыя производятъ очень крѣпкую дрв. и, называемую подѣ имѣетъ „черного дерева“.

**ГЭЖЕА** (*Gegea*). Сэръ Томасъ *Гэжъ* (Gage) — англійскій ботаникъ † 1820. С. лилейныхъ. (20). Европа, Азія, С. Африка. Луковичн. рр. съ желтыми цв. Легкая з. Отпрысками весной и осенью.

**Г. лютеа** (G. *lutea*, желтая). Европа и Азія. Россия. Цв. весной. 6 д.

**ГЕЙЛУСАКІЯ** (*Geylussakia*). *Гей-Лусакъ* (Gay-Lussac) — знаменитый французск. химикъ, † 1850. С. брусничныхъ. (40). Бразилія, Анды Венецуэлы. Оранже.



или полувывослив. кустарн. pp. Ухожд. как за Вакциниумъ.

**Г. резиноза** (*G. resinosa*, смолистая). С. Америка. Цв. красноватые, въ маѣ, июнь. 1—3 ф. Лл. покрыты смолистымъ веществомъ. **Г. фрондоза** (*G. frondosa*, листовная). С. Америка. Цв. зеленовато-пурпуровые, въ маѣ, июнь. Плоды голубые, събдоные. 3—6 ф.

**ГЕЙСОНЪ** (*Geissois*). *Geisson* — черепичатая крыша; смена налегаютъ какъ черепица. С. камнеломковыхъ. (4). Австралия; Нов. Каледонія, о. Фиджи. Тепл. деревья. Торф. съ глини. дерн. Черенками въ парникѣ.

**Г. рацемоза** (*G. racemosa*, кистевой). Нов. Каледонія. Цв. малиново-красные. 20 ф.

**ГЕЙССОМЕРІЯ** (*Geissomeria*). *Geisson* — черепица, *meris* — часть; по черепицатамъ прицвѣтникамъ. С. акантовыхъ. (10). Бразилія, Ямайка. Тепл. куст. pp. Торф. съ глини. дерн., пескомъ и коровьимъ перегноемъ. Черенками изъ вызрѣлаго роста, въ парникѣ.

**Г. кокцинея** (*G. coccinea*, шарлаховая). Ямайка. Цв. шарлаховые, въ августѣ. 3 ф.

**ГЕЙССОРИЦА** (*Geissorhiza*). *Geisson* — черепица и *rhiza* — корень; по покропу луковичъ. С. косатиковыхъ. (30). Юж. Африка, Мадагаскаръ. Оранж. или полувывосл. лукович. pp. Ухожд. какъ за Галаксія.

**Г. грандисъ** (*G. grandis*, крупноцвѣтная). М. Д. Н. Цв. блѣдно-желтые (палеые), въ маѣ. **Г. инфлекса** (*G. inflexa*, согнутая). М. Д. Н. Цв. ярко-желтые съ пурпуровыми пятнами у основанія сегментовъ, въ маѣ. 1 1/2 ф. Сш. **Г. вагината** (*G. vaginata*). **Г. рошензисъ** (*G. rochenensis*, Дель Ромы). М. Д. Н. Цв. голубые съ малиновыми крапинками по срединѣ. 9 д.

**ГЕЛЬСЕМІУМЪ**. См. Жельсемуиъ.

**ГЕЛАЗИНЕ** (*Galasine*). *Gelasine* — щечная ямочка; поэтическое примѣненіе къ цв. С. косатиковыхъ. (1). Южн. Америка. Оранж. лукович. р. Песчанистая. Отпрысками и сѣменами, дающими pp., цвѣтущія на третій годъ.

**Г. азуреа** (*G. azurea*, лазуревая). Рио-Жанейро. Цв. голубые съ бѣлыми и черными пятнышками внизу сегментовъ, въ маѣ. 1 ф.

**ГЕНИПА** (*Genipa*). Мѣстное названіе одного изъ видовъ — Генепара. С. магносовыхъ (8). Троп. Америка, Вестиндія. Теплич. куст. или низкія древ. pp. Ухожд. какъ за Гарденія.

**Г. американа** (*G. americana*, американская). Вестиндія. Цв. бѣлые, лѣтомъ. 20—30 ф.

**ГЕНИСТА** (*Genista*). Названіе, встречаемое у Виргилія. С. бобовыхъ. (70). Европа, С. Африка и 3. Азія. Оранж. и воздушн. кустарн. pp. Ухожд. какъ за Цитизустъ.

**Г. англика** (*G. anglica*, английская). Европа. Цв. желтые, лѣтомъ. 1—2 ф. **Г. виргата** (*G. virgata*, вѣтвевая). Мадера. Цв. желтые, въ маѣ. 3—4 ф. **Г. радиата** (*G. radiata*, лучистая). Ю. Европа. Цв. желтые, лѣтомъ. 1—3 ф.

**ГЕНЦИАНА** (*Gentiana*). *Генций* — царь илирійскій, задержавшій въ плѣну римскихъ пословъ; онъ первый замѣтилъ лечебное дѣйствіе этого р. С. горечавковыхъ. (200). Европа, 3. Азія, С. Африка, Австралія. Одно- и многол. трап. pp. Глубокая глини. дер. Сѣменами, которыя всходятъ туго; не терпятъ пересадки при дѣленіи; вообще размноженіе трудное.

**Г. акаулисъ** (*G. acaulis*, безстебельная). Альпы швейцарскія и пиренейскія. Цв. голубые съ 5 желтыми пятнышками внутри, съ марта по май. 2—4 д. **Г. альгида** (*G. algida*, холодная). Сибирь. Цв. мелкобѣлые съ голубоватыми крапинками и черточками, въ июнь, июль. 3—6 д. **Г. Андрьюсисъ** (*G. Andrewii*, Андрюса). С. Америка. Цв. голубые. 1—2 ф. **Г. асклепиада** (*G. asclepiadea*, ласточкина). Ю. и В. Европа. Цв. голубые, въ июль. 6—18 д. **Г. аффилисъ** (*G. affinis*, схожая). С. Америка. Цв. голубые, лѣтомъ. 4—12 д. **Г. баварика** (*G. bavarica*, баварская). Центр. Европа. Цв. темно-голубые, въ июль. 3 д. **Г. верна** (*G. verna*, весенняя). Европа. Цв. лазуревые, въ маѣ, 3 д. имѣетъ нѣсколько разновидностей. **Г. Кетесбей** (*G. Catesbaei*, Кетесбей). Каролина. Цв. свѣтло-голубые, въ августѣ. 6—12 д. **Г. круциата** (*G. cruciata*, крестовая). Европа. Цв. блѣдно-голубые, въ июнь, июль. 6 д. **Г. курру** (*G. kurroo*, курру). Гималайскія горы. Цв. лазуревые съ бѣлыми черточками у горлышка, въ октябрь. **Г. лутея** (*G. lutea*, Желтая горечавка). Европа. Цв. желтые, въ июль. 4—6 ф. **Г. орната** (*G. ornata*, украшенная). Гималаи. Цв. блѣловатые съ голубыми черточками, въ маѣ. **Г. пиренейка** (*G. pyrenaica*, пиренейская). Пиреней. Цв. снаружи зеленоватые съ голубымъ краемъ, въ апрѣль. 3 д. **Г. пневмонанте** (*G. pneumonanthe*, *Синіе колокольчики*). Сѣв. полушаріе. Цв. темно-лазуревые, въ августѣ. 6—12 д. **Г. пунктата** (*G. punctata*, точечная). Европ. Альпы. Цв. желтые съ пурпуровыми крапинками, въ июнь. 1—2 ф. **Г. септемфиды** (*G. septemfida*, септиразсѣченная). Персія. Цв. лазуревые, въ июнь, июль. 6—18 д. **Г. форчуни** (*G. Fortunei*, Форчуна). С. Китай. Цв. темно-голубые съ бѣлыми крапинками, въ декабрь.

**ГЕОДОРУМЪ** (*Geodorum*). *Ge* — земля и *doron* — даръ. С. орхидей. (3). Остиндія. Тепл. земн. орхидей. Волокн. торф. Въ низкой, влажной теплицѣ.

**Г. цитринумъ** (*G. citrinum*, лимоннаго цвѣта). Цв. желтые, въ октябрь до декабря. 1 ф.

**ГЕОНОМА** (*Geonoma*). Происхожденіе названія темное: *geonotos* — значить искусный въ земледѣліи. (100). Троп. Америка. Тепл. низкорослая пальма. Сильная печен. дерн. Сѣменами. Темп. лѣтомъ 13—22, зимой 10—13°.

**Г. грацилисъ** (*G. gracilis*, тонкая). Бразилія. Лл. перистые, дугообразные, перья длиннее. Похожи на *кокосъ Ведделіана* (*Cocos Weddelliana*). **Г. Кардери** (*G. Carderi*, Кардера). Колумбія. Лл. перистые, перья шир. до 2 1/2 д. **Г. конгеста** (*G. congesta*, сжатая). Коста-Рика. Лл. пальчатые или двураздѣленные, либо раздѣленные на нѣсколько сегментовъ. **Г. марціана** (*G. Martiana*, Мартиуса). Коста-Рика. Лл. съ дугообразною вершиной, красно-малиновые когда молоды. **Г. Портеана** (*G. Porteana*, Порты). Нов. Гренада. Лл. перистые, дугою. Изящная пальма. **Г. прокумбенсъ** (*G. procumbens*, распростертая). Троп. Америка. Лл. перистые, пониклые. **Г. пумила** (*G. pumila*, низкая). Троп. Америка. Лл. широкіе, глубоко раздѣленные. **Г. Шоттиана** (*G. Schottiana*, Шотта). Бразилія. Лл. перистые, перья узкія. **Г. элегансъ** (*G. elegans*, изящная). Бразилія. Лл. перистые, конечныя перья двураздѣленные; молодыя малиноваго цвѣта.

**ГЕОРГИНА**. См. Далія.

**ГЕОФФРЕЯ**. См. Жоффрѣя.

**ГЕРАДІЯ**. См. Жерардія.

**ГЕРАНИЕВЫЯ** pp. (*geraniaceae*). Травянистыя, полу-кустарныя, кустарныя и иногда древесныя растенія съ красивыми часто цвѣтами. Содержатъ около 20 родовъ и 750 видовъ, распространенныхъ по умѣренному и тропическому поясамъ, но преимущественно встречаемыхъ въ Южной Африкѣ. Многие виды имѣютъ вяжущія и ароматическія свойства, многіе благовонныя, а другіе имѣютъ мускусый запахъ. Изъ родовъ наиболее извѣстны: Гераніумъ, Пеларгоніумъ, Тропеолумъ и Эродіумъ.

**ГЕРАНИУМЪ** (*Geranium*). Названіе, употребленное Dioscoridomъ; *geranos* — журавль, — по подобію плодинокъ клюва этой птицы. С. гераниевыхъ (100). Встрѣчается во всѣхъ частяхъ свѣта. Вывосливыя трав. pp., рѣдко кустарныя. Садовая, обыкн. Сѣменами и дѣленіемъ.

**Г. анемонѣфоліумъ** (*G. anemonaeifolium*).

Ним, съ лл. анемоны). Мадера. Цв. красно-пурпуровые, въ маѣ. 1—2 ф. Оранж. **Г. аргентеумъ** (*G. argenteum*, серебряный). С. Италия. Цв. свѣтло-красные съ темными полосками, въ июнь, июль. 3 д. **Г. атлантискумъ** (*G. atlanticum*, атлантискій). Америка. Цв. блѣдно-пурпуровые, въ июнь. 1—1 1/2 ф. **Г. дахурикумъ** (*G. dahuricum*, даурскій). Даурія. Цв. пурпуровые, въ июнь. 1 1/2 ф. **Г. иберікумъ** (*G. ibericum*, испанскій). Испанія. Цв. голубые, крупныя, лѣтомъ и осенью. 1 ф. **Г. Ламберти** (*G. Lamberti*, Ламберта). Неаполь. Цв. ярко-лиловые, лѣтомъ и осенью. **Г. макрорризонъ** (*G. macrorhizon*, съ большимъ корнемъ). Ю. Европа. Цв. темно-красные или ярко-пурпуровые, въ маѣ до июля. 1 ф. **Г. макулатумъ** (*G. maculatum*, пятнистый). С. Америка. Цв. блѣдно-лиловые. 1 1/2 ф. **Г. фёумъ** (*G. phoeniceum*, тусклый). Центр. и 3. Европа. Цв. темно-коричневые, въ маѣ и июнь. **Г. пратензе** (*G. pratense*, полевой). *Журавельникъ*. Европа. Цв. голубые, большіе, лѣтомъ. 2—3 ф. **Г. сангвинейный** (*G. sanguineum*, кроваво-красный). *Волосникъ*. Европа, 3. Азія. Цв. красно-малиновые или кроваво-красные, лѣтомъ. 1—2 ф. **Г. стріатумъ** (*G. striatum*, полосатый). Ю. Европа. Цв. малиновые съ темными жилками, въ маѣ до сентября. **Г. сильватікумъ** (*G. sylvaticum*, лѣсной) *Змеевка*. Европа. Цв. пурпуровые или голубые съ малиновыми жилками, въ июнь, июль. 2 ф. **Г. пинереумъ** (*G. cinereum*, сѣрый). Пиреней. Цв. блѣдно-красные съ черными черточками, въ июнь. 6 д. **Г. Эндрессіи** (*G. Endressii*, Эндресса). Пиреней. Цв. блѣдно-розовые съ темными жилками, лѣтомъ. 1 футъ.

**ГЕРВАРІЙ**. Травникъ. Собираніе сухихъ растеній.

**ГЕРВОРИЗАЦІЯ**. Собираніе растеній для составленія гербарія.

**ГЕРМАФРОДИТЪ** Цвѣтокъ, имѣющій и тычинки и пестики.

**ГЕРТНЕРА** (*Gertnera*). Иосифъ *Гертнеръ* (Gaertner) — знаменитый нѣмецкій ботаникъ, † 1791. С. логаніевыхъ. (25). 3. Африка, о. Маврикія, Малайскіе о., Мадагаскаръ. Тепл. куст. и древ. pp. Глини. дерн. съ торф. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ апрѣль, въ песокъ, въ парникѣ. Темп. лѣтомъ 13—20, зимой 7—10°.

**Г. рацемоза** (*G. racemosa*, кистевая). Индія. Цв. бѣлые съ желтымъ, чрезвычайно душистые, въ апрѣль. 20 ф.

**ГЕСНЕРА** (*Gesnera*). Конрадъ *Геснеръ* (Gesner) † 1565 — знаменитый люрихскій ботаникъ. С. геснеріевыхъ. (50). Бразилія, Колумбія, Мексика, Перу. Большую частію клубневая травянист. pp.



Легкая волокни. глини. дерн. съ торфяной и листовой по-ровну, съ добавленіемъ песку. Съменами, черенками и клубнями.

**Г. Купера** (*G. Cooperi*, Купера). Бразилія. Цв. ярко-шарлаховые съ крапинками въ горлышкѣ, въ маѣ. 20 ф. **Г. негелодиоидея** (*G. nageoides*, похожая на Негелодио). Садов. гибридъ. Цв. малиново-розовые съ красными разводами; лѣтомъ. Имѣетъ много формъ. **Г. пирамидалис** (*G. pyramidalis*, пирамидальная). Садов. гибридъ. Цв. темно-оранжевые, горлышко и губа — свѣтло-оранжевые съ пятнышками, зимой. 2 ф. **Г. экзоніензис** (*G. exoniensis*, изъ Эксоніера). Цв. красно-оранжевые съ желтыми горлышкомъ, зимой.

**ГЕСНЕРІЙНІЙ** *pp.* (*gesneriaceae*). Травянистыя, кустарныя, рѣдко деревянистыя *pp.* съ красиво расписными вѣтвицами. Имѣютъ 71 родъ и 700 видовъ, растущихъ въ разныхъ частяхъ свѣта, преимущественно же въ жаркихъ странахъ Америки. Нѣкоторые называютъ это семейство *цирандровыми* (*cyrtandraceae*). Приблизительно родовъ служатъ: Ахименесъ, Беслерія, Геснера, Глоксинія, Стрептокарпусъ и Циртандра.

**ГЕТЕА** (*Goethea*). *Geme* (J. W. Goethe) — знаменитый нѣмецкій поэтъ и ботаникъ. С. мальвовыхъ. (4). Бразилія. Тепл. куст. *pp.* Песч. глини. дерн. Черенками, въ песокъ, въ парникѣ.

**Г. макуана** (*G. macrocarpa*, Макуа). Цв. бѣлые. 2 ф. **Г. мультифлора** (*G. multiflora*, многоцвѣтная). Цв. съ подчасечкой изъ многочисленныхъ малиновыхъ или красныхъ прицвѣтничковъ, въ сентябрь. Спн. *Pavonia Vivoti* (*Pavonia Vivoti*).

**ГЕТИЛЬДИСЪ** (*Gethyllis*). Уменьшительное *gethion* — дукъ-порей. С. амариллисовыхъ. (5). Южн. Африка. Оранжев. лукович. *pp.* съ М. Д. Н. Песчан. торф. съ глини. дерн. Съменами и отпрысками.

**Г. вильдлова** (*G. villosa*, волосатый). Цв. бѣлые, въ июль — июль. 9 д. **Г. ланцеолатя** (*G. lanceolata*, ланцетовидный). Цв. бѣлые, въ июль. 9 д.

**Г. спиралис** (*G. spiralis*, спиральный). Цв. бѣлые, въ июль и июль. 9 д.

**ГЕТТАРДА** (*Guettarda*). *Guetard* (Guettard) — французскій ботаникъ, † 1786. С. мареновыхъ. (50). Тропич. Америка. Теняч. орнам. низкорослыя деревеси. или кустарн. *pp.* Торф. съ глини. дерн. Черенками, въ песокъ, въ парникѣ. Общій уходъ, какъ за Гвайякумъ.

**Г. одората** (*G. odorata*, душистая). Троп. Америка. Цв. красноватые, лѣтомъ. 6—10 ф. Кустарн.

**ГЕУМЪ** (*Geum*). Название, взятое у Плинія. С. розановыхъ. (40). Европа, Азія, Африка, Америка, — по умѣреннымъ

и холоднымъ поясамъ. Многолѣт. травяни. *pp.* Песчан. глини. дерн. съ листовой. Съменами и дѣленіемъ, весной.

**Г. кохичеумъ** (*G. coccineum*, шарлаховый). Греція, Малая Азія. Цв. пурпуровые. 6—15 д. **Г. монтанумъ** (*G. montanum*, горный). Европа. Цв. желтые, прямо-стоячіе, весной. 6—12 д. **Г. пиренейскіе** (*G. pyrenaicum*, пиренейскій). Пиренеи. Цв. желтые, пониклые, въ июль. 1½ ф. **Г. ривале** (*G. rivale*, поручейный). *Гравислатъ*. Холодный уѣтр. страны. Цв. красноватые, пониклые, въ июль. 1—3 ф. **Г. трифлорумъ** (*G. triflorum*, трехцвѣтковый). С. Америка. Чашечка темно-пурпуровая, лепестки бѣлые, на концахъ красно-пурпуровые, въ июль. **Г. элатумъ** (*G. elatum*, высокий). Гималайскія горы. Цв. золотисто-желтые, въ июль.

**ГИБРИДИЗАЦІЯ**. Большая часть сортовъ цвѣт. *pp.* достигла своихъ достоинствъ гибридизаціей, производимой нанесеніемъ цвѣтца одного растенія на рыльце другого, когда оно въ состояніи воспринять вліяніе цвѣтца. Обыкновенно рыльце при этомъ дѣлается слизистымъ; у мн. *pp.* это происходитъ когда собственные пыльники цвѣтка еще не раскрылись, у др. — когда цвѣтъ уже выснался; тамъ, гдѣ пыльники открываются въ одно время съ состояніемъ рыльца къ воспріятію цвѣтца, должно удалить всѣ тычинки до ихъ раскрытія и зацѣпить цвѣтки отъ настькомыхъ, которыя могутъ начесть цвѣтки не того растенія, съ кот. производится гибридизація.

**ГИБРИДЪ** или **ХИВРИДЪ**. Помѣсь двухъ видовъ, помощью гибридизаціи.

**ГИГРОМЕТРЪ**. **ГИГРОСКОПЪ**. Снарядъ для опредѣленія степени влажности въ воздухѣ, — влагомеръ, необходимый въ садоводствѣ. Онъ дѣлается изъ двухъ термометровъ, изъ которыхъ шарикъ одного затянута кисеей, съ кондомъ опущеннымъ въ воду. Наблюденіемъ разности показаній термометровъ, при пособіи особыхъ таблицъ, опредѣляется степень влажности воздуха.

**ГИДАТИДА**. Червь малаго размѣра, заводящійся въ разныхъ частяхъ растеній.

**ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ИЗВЕСТЬ** или **ЦЕМЕНТЪ**. Составъ твердѣющій въ водѣ, — водостойкій, водокрѣпкій.

**ГИЛИЯ**. См. Хилия.

**ГИЛЬЗА**. Бумажная или жестяная коробочка или мѣшечекъ для сохраненія семянъ и плодовъ.

**ГИЛЬБЕНІЯ** (*Gillenia*). *Gillenia* (Arnoldus Gillenius) — ботаникъ XVII стол. С. розановыхъ. (2). С. Соед. Шт. Многол. трав. *pp.* Торф. дѣленіемъ, весной

**Г. трифоліата** (*G. trifoliata*, трехлиственная). Цв. красные или бѣлые, въ июль. 1½ ф.

**ГИЛЬБЕНІЯ**. См. Жильбизия.

**ГИЛИБЕРТІЯ**. См. Жилибертія.

**ГИМЕНІЙ**. Плодоносный слой гриба.

**ГИМНЕМА** (*Gymnema*). *Gymnos* — нагой и *meta* — нить; коронки соединяющей тычинки нѣтъ. С. ласточниковыхъ. (25). Африка, троп. Азія, Австралія. Тепл. вьющіеся куст. и полукуст. *pp.* Волоки. глини. дерн. и песчан. торф. Черенками изъ бокового роста, весной, въ песокъ, въ парникѣ.

**Г. лактиферумъ** (*G. lactiferum*, съ млечнымъ сокомъ). Троп. Азія. Цв. желтые, въ июль. Сокъ употребляется цѣйлонцами вмѣсто коровьяго молока. **Г. тингенсъ** (*G. tingens*, жгучая). Троп. Гималаи. Цв. бѣдно-желтые, въ июль.

**ГИМНОГРАММЕ** (*Gymnogramme*). *Gymnos* — нагой и *gramma* — нить, по спорнымъ мѣшечкамъ. С. папоротниковыхъ. (100). Троп. Азія, Африка, Америка, Австралія, Полинезія. Препмун. тепл. папоротники, нижняя сторона вай ихъ покрыта желтымъ или серебристо-бѣлымъ налетомъ.

**Г. декомпозиата** (*G. decomposita*, премного-сложное). Ю. Америка. Вай ланцетовидно-дельтовидныя, 4—5 перисторазсѣченныя. **Г. лепторифилля** (*G. leptorphylla*, съ мелкими лл.). Умѣренные страны земн. шара. Вай 2—4 ф. длинной, широкодельтовидныя, 2—3 перисторазсѣченныя. Одинъ изъ немногихъ однолѣтнихъ папоротниковъ. **Г. Персея** (*G. Pearcei*, Персея). Перу. Вай 6—12 д. длинной, 3 перисторазсѣченныя. **Г. тартарея** (*G. tartarea*, адское). Троп. Америка. Вай 1—2 ф. длин., дельтовидныя, двуперисторазсѣченныя. **Г. шизофилля** (*G. schizorphylla*, съ разрывными лл.). Ямайка. Вай 1½—2 ф. длинной, мелко-разсѣченныя. **Г. яваніка** (*G. javanica*, явайское). Тропич. страны Старого Свѣта. Вай 1—4 ф. длинной, 1—2 перисторазсѣченныя.

**ГИМНОКЛАДУСЪ** (*Gymnocladus*). *Gymnos* — нагой и *klados* — вѣтвь, по голымъ вѣтвямъ зимой. С. бобовыхъ. (1). Сѣв. Соед. Шт. Древесн. р. Сильная, глубокая, рыхлая. Черенками изъ корней или съменами.

**Г. канадѣнзисъ** (*G. canadensis*, канадскій). Цв. бѣлые, въ маѣ до июля. 30—60 ф.

**ГИМНОЛОМІЯ** (*Gymnolomia*). *Gymnos* — нагой и *loma* — бахрома, по малому хохолу у семянъ. С. сложно-цвѣтныхъ. (16). Оранжев. или полувысока. трав. *pp.* предпочтительно изъ Мексики и центр. Америки. Уходъ какъ за Хелиантусъ.

**Г. мультифлора** (*G. multiflora*, многоцвѣтная). Новая Мексика. Цв. головки желтыя, осенью. 1—3 ф. Спн. *Helianthus multiflora* (*Helianthus multiflora*).

**ГИМНОСТАХИСЪ** (*Gymnostachys*). *Gymnos* — нагой и *stachys* — колосъ, по безлистнымъ лл. стеблямъ. С. ароидеиныхъ. (1). Австралія. Оранжев. многол. трав. р. Торф. съ глини. дерн. Отпрысками и дѣленіемъ.

**Г. ансеръ** (*G. ansera*, обоюдный). Цв. бѣлые, мелкіе, въ июль. Лл. прямые, съ сильными жилками. 1—3 ф.

**ГИМНОСТАХИУМЪ** (*Gymnostachyum*). *Gymnos* — голый и *stachys* — колосъ; вѣрнотн, по отсутствію прицвѣтничковъ. С. акантовыхъ. (14). Остиндія и о. Малайскаго архипелага. Теплич. орнамент. трав. *pp.* Уходъ какъ за Эрантеумъ.

**Г. венуста** (*G. venusta*, прелестный). Бенгаль. Цв. пурпуровые, въ сентябрь. 5 д.

**Г. цейляникумъ** (*G. ceylanicum*, цейлонскій). Цейлонъ. Цв. мелкіе, красные, бѣлые съ зелеными и желтыми кончиками, зимой.

**ГИНАНДРОПСИСЪ** (*Gynandropsis*). *Gyne* — жена, *andros* — мужъ и *opsis* — подобіе: тычинки какъ-бы сидятъ на перистыхъ тычинкахъ. С. каларовыхъ. (10). Тропич. страны обоихъ полушарій. Однолѣтн. оранжев. трав. *pp.* Уходъ какъ за Клеоме.

**Г. кокцинея** (*G. coccinea*, Кокумбін). Цвѣты шарлаховые, лѣтомъ 6—9 ф. **Г. пентафилля** (*G. pentaphylla*, пяти-листный). Остъ и Вестиндія. Цв. бѣлые, въ июль — июль. 2 ф.

**ГИНЕРІУМЪ** (*Gynierium*). *Gyne* — жена и *erion* — шерсть; рыльца — пушистыя. С. злаковъ. (3). Тропич. Америка. Оранжев. или полувысока. травяни. *pp.* Рыхлая, сильно унавоженная. Съменами, въ парникѣ. Пушистые колосы срѣзаны позднѣе лѣтомъ.

**Г. аргентеумъ** (*G. argenteum*, серебристый). Умѣр. часть троп. Америки. Цв. въ длинной, густой шелковистой метелкѣ, на ножкѣ въ 6—10 ф., осенью. Есть разновидность съ пурпуроватыми и желтоватыми метелками.

**ГИНКГО** (*Ginkgo*). Название японское. С. хвойныхъ. (1). С. Китай, Японія. Дерево съ опадающими на зиму лл. Въ умѣр. климатѣ выносливо. Размнож. съменами.

**Г. билоба** (*G. biloba*, дву-лопастное). С. Китай. Лл. вѣерообразные, разсѣченные наверху, съ параллельными жилками. Плоды съѣдобныя. 60—80 ф. Имѣетъ нѣсколько формъ. Спн. *Silisburia adiantifolia* (*Silisburia adiantifolia*).



**ГИНУРА** (*Gynura*). *Gyne*—жена и *oura*—хвост; по удлинному рыльцу. С. сложноцвѣтныхъ. (20). Тропич. страны восточн. полушарія. Теплолюб. многолѣт. травяни. рр. Песчан. глини. дерн. съ торф. Черенками.

**Г. аурантиака** (*G. aurantiaca*, оранжевая). Ява. Цв. головки ярко-оранжевыя, въ февралѣ. 2—3 ф.

**ГИПСОФИЛА** (*Gypsophila*). *Gypsos*—известь, *philos*—любить, по предпочтению известковой земли. С. гвоздичныхъ. (50). Европа и Азія. Вынослив. одно или многол. трав. рр. Суховатая садовая, съ примѣсью мѣловой, либо битаго кирпича. Сѣменами, черенками и дѣленіемъ.

**Г. паникулѣта** (*G. paniculata*, метельчатая). Европа. Цв. бѣловатыя, мелкіе, многочисленныя, въ августѣ. 2—3 ф. **Г. Стівенія** (*G. Stevenii*, Стевена). Кавказъ. Цв. бѣлые, въ іюль. 1—2 ф. **Г. герастіоидесъ** (*G. cerastioides*, похожая на Церастіумъ). Гималай. Цв. бѣлые съ красными жилками, въ маѣ. 3½ ф.

**ГИПСЪ**. Пережженная сѣрная известка, жадно впитывающая воду и съ нею быстро твердѣетъ. Алебастръ.

**ГІЙФА**. Безцвѣтныя нитевидныя клѣточки, составляющія тѣло грибовъ.

**ГИШЕНОТІЯ** (*Guichenotia*). *Гишено* (Antoine Guichenot)—французскій садоводъ и путешественникъ. С. навозниковыхъ. (6). Въ-троемъ. Австралія. Оранж. куст. рр. Глини. дерн. съ торф. Черенками, въ песокъ, подъ стекломъ.

**Г. ледифолия** (*G. ledifolia*, съ л. какъ у баговника). Цв. бѣлые, весной. Сип. *Лазіопеталумъ Бауера* (*Lasiopetalum Baueri*). **Г. макранта** (*G. macrantha*, крупноцвѣтная). Цв. пурпуровые, большіе, въ мартѣ.

**ГІАЦИНТЪ РІМСКІЙ**. См. Бельлевалія.

**ГЛАЗОКЪ**. Почка листовая, распуколка въ первоначальномъ состояніи; глазокъ *бородавкой*—дающій ростокъ.

**ГЛЕДИЧІЯ** (*Gleditsia*). Готтлибъ *Гледичъ* (Gleditsch) † 1786,—директоръ берлинскаго ботан. сада. С. бобовыхъ. (6). Оранж. деревья умиротнаго климата. Земля обик. Сѣменами, которая предварительно мочить день въ теплой водѣ.

**Г. триаканта** (*G. triacantha*, съ тремя иглами). Соед. Шт. Цв. зеленоватыя, лѣтомъ. 30—50 ф. Имѣетъ нѣсколько разновидностей.

**ГЛЕЙХЕНІЯ** (*Gleichenia*). *Глейхенъ* (Gleichen) † 1783,—нѣмецкій ботаникъ. С. папоротниковыхъ. (27). Троп. и жаркія страны южн. полушарія. Теплолюб. и оранж. рр. Ухоть см. папоротники.

**Г. дикарпа** (*G. dicarpa*, дву-плодная). Австралія. Доли лопастей перистыхъ вай полузруглыхъ. Теплолюб. Имѣетъ нѣск. разновидностей. **Г. дихотома** (*G. dichotoma*, развилкастая). Троп. страны. Стебли зигзагомъ, ди- и трихотомическіе. Тепло. Сип. **Г. ферругинеа**, **Г. германна**, **Г. рудибервисъ** (*G. ferruginea*, *G. Hermannii*, *G. rufinervis*). **Г. лонгиссима** (*G. longissima*, длиннѣйшая). Китай. Японія. Вай длинныя, перья многочисленныя. Оранж. Сип. **Г. Банкрофтія**, **Г. инантеа**, **Г. глаука**, **Г. экцельза** (*G. Bancroftii*, *G. gigantea*, *G. glauca*, *G. exelsa*). **Г. пектината** (*G. pectinata*, гребенчатая). Троп. Америка. Стебель зигзагомъ, перья развилкатыя. Тепло. **Г. пубесценсъ** (*G. pubescens*, пушистая). Троп. Америка. Стебель и черешки пушистые. Сип. **Г. лонгипинната**, **Г. Маттеусіи**, **Г. томентоза**, **Г. фурката** (*G. longipinnata*, *G. Matthewsii*, *G. tomentosa*, *G. furcata*). Тепло. **Г. рупестрисъ** (*G. rupestris*, каменнотая). Австралія. Перья округлыя. Оранж. **Г. цирцината** (*G. cirripata*, закрученная). Австралія. Лопасті перьевъ овальныя. Теплолюб. Сип. **Г. микрофилла**, **Г. спеллунгъ** (*G. microphylla*, *G. spelluncae*).

**ГЛІВА**. Родъ груши.

**ГЛИКОСМИСЪ** (*Glycosmis*). *Glykys*—сладкій и *osme*—запахъ, по приятному запаху л. и цв. С. рутовыхъ. (5). Троп. Азія, Австралія. Теплолюб. дерн. и кустарн. рр. Сильная перегнойная. Черенками въ песокъ, въ парникъ.

**Г. пентафилла** (*G. pentaphylla*, пяти-лиственный). Остиндія. Цв. бѣлые, въ іюнь—іюль. 20 ф.

**ГЛИНА**. Землистое вещество, отличающееся плотностью и способностью вслѣдствіе того задерживать влагу. Глинистая почва—холодная почва, улучшаемая смѣшеніемъ съ болѣе рыхлою,—пескомъ, известью, торфяною землею.

**ГЛНФѢА** (*Glyphaea*). *Glyphe*—рѣзба, по плоду. С. липовыхъ. (2). Троп. Африка. Ухоть, какъ за Анейба.

**Г. грьюіоидесъ** (*G. grewioides*, похожая на Грьюію). Бенгала. Цв. яркіе желтые, въ сентябрѣ.

**ГЛИФОСПЕРМА** (*Xlyphosperma*). *Glyphe*—рѣзба и *sperma*—сѣмя, по сѣменамъ. С. лилейныхъ. (1). Мексика. Выносливое р., близкое къ европейскому Антеркумъ. Песчанистая, сухая; на зиму лучше вынимать и сохранять сухо.

**Г. Пальмери** (*G. Palmeri*, Пальмера). Свв. Мексика. Цв. бѣлые, звѣздочками.

**ГЛИЦИНЕ** (*Glycine*). *Glykys*—сладкій: у одного вида л. и корни имѣтъ сладкій вкусъ. С. бобовыхъ. (12). Африка,

Троп. Азія, Австралія. Тепло. или оранж. выходящая, либо стеющаяся травяни, иногда полукуст. рр. Торф. съ глини. дерн. и пескомъ. Черенками изъ молодого роста, весной, въ песокъ, подъ стекломъ, или сѣменами въ парникъ весной.

**Г. хедизаройдесъ** (*G. hedisaroides*, эспаретовидное). Гипеня. Цв. пурпуровые, въ іюнь, Р. теплолюб.

**ГЛИЦИРРИЦА** (*Glycyrrhiza*). Названіе, употребленное Dioscoridomъ и производимое отъ *glykys*—сладкій и *rhiza*—корень. С. бобовыхъ. (12). Средиземн. побережье, ухтр. Азія, Америка. Многол. выносл. рр. Глубокая песчанисто-глини. дерн. Дѣленіемъ.

**Г. глабра** (*G. glabra*, гладкая). Европа. Цв. бѣдно-голубые, лѣтомъ и осенью. 3—4 ф. Изъ корня—«солодованаго», извлекается лакрица.

**ГЛОБВА** (*Globba*). Мѣстное названіе одного изъ видовъ. С. имбирныхъ. (24). Остиндія, Малайск. архип. Тепло. многол. трав. рр. Дѣленіемъ корней. Песчан. дернов.

**Г. атро-сангвиней** (*G. atrosanguinea*, кровиво-красная). Борнео. Цв. желтые, въ продолженіе большей доли года. 1—1½ ф. Сип. **Г. кокцинея** (*G. coccinea*). **Г. Шомбургіи** (*G. Schomburghii*, Шомбургка). Сіамъ. Цв. золотисто-желтые, въ августѣ. 6—12 д.

**ГЛОБУЛЯРІЯ** (*Globularia*). *Globulus*—шарикъ, по формѣ цв. С. селягныхъ. (12). Сред. Европа, Средиземн. побережье, Восточн. Канарск. о. Выносл. и оранж. многол. травяни, кустарн. или полукустарн. рр. Песчан. дернов. съ торф. Сѣменами весной, черенками изъ молодыхъ побѣговъ весной, въ песокъ, въ парникъ.

**Г. вулгарисъ** (*G. vulgaris*, обыкновенная). Европа. Цв. головки ярко-голубыя. 6—12 д. Трав. выносл. **Г. аліпумъ** (*G. Alpinum*, Аліпумъ). Ю. Европа. Цв. головки бѣлыя; 2 ф. Оранж. кустарн. р. **Г. нудикаулисъ** (*G. nudicaulis*, съ безлиственными стеблями). Ю. Европа. Цв. голубыя, 6 д. Травяни. выносл. р.

**ГЛОБУЛИНЪ**. Вѣжковое тѣло, растворяющееся въ слабомъ растворѣ поваренной соли.

**ГЛОДЪ**. См. Дерепъ.

**ГЛОКСИНІЯ** (*Gloxinia*). *Глоксинъ* (В. Р. Gloxin)—кольмарскій ученый, писавшій о ботаникѣ. С. геснеріиныхъ. (6). Троп. Америка. Тепло. многол. трав. рр. Листовая, не вполне перенрывающая, пополамъ съ торфяной и съ добавленіемъ песку и дрв. угли. Сѣменами и черенками л. Въ общемъ ухоть, какъ за Геснера.

**Г. глабра** (*G. glabra*, гладкая). Троп. Америка. Цв. бѣлые, звѣз. желтый съ пурпуровыми крапинками, въ августѣ. 9 д. Сип. **Г. фимбриата** (*G. fimbriata*). **Г. макулѣта** (*G. maculata*, испятнанная). Ю. Америка. Цв. голубые, въ іюнь до октябрия. 1 ф. **Г. паллидифлора** (*G. pallidiflora*, блѣдноцвѣтная). Санта Марта. Цв. блѣдно-голубые, въ августѣ. 1 ф.

Кромѣ этихъ, къ видамъ причисляютъ **Г. диверсифлора** (*G. diversiflora*, разноцвѣтная) и **Г. геснероидесъ** (*Gesneroides*), произведенія въ садахъ путемъ помѣси.

Растенія эти имѣютъ очень много разновидностей, произведенныхъ искусственно и дѣлятся на имѣющіе цвѣтки пониклые и прямо-ростущіе.

**ГЛОРИОЗА** (*Gloriosa*). *Gloriosus*—славнѣйшій; по красотѣ цвѣтовъ. С. лилейныхъ. (3). Азія, Африка. Теплолюб. лукович. рр. Сѣмь изъ глини. дерн., торфяной, листовой, коровьяго перегноя и песку, поровну. Сѣменами и отпрысками.

**Г. суперба** (*G. superba*, превосходная). Троп. Азія и Африка. Цв. яркіе темно-оранжевые съ краснымъ, лѣтомъ. 6 ф.

**ГЛОССОДІЯ** (*Glossodia*). *Glossa*—языкъ и *eidos*—похожій; по придаткамъ внутри цвѣтка. С. орхидей. (4). Австралія. Земныя оранжер. орхидей. Песч. глини. дерн. съ торф. Дѣленіемъ.

**Г. майоръ** (*G. major*, большая). Цв. голубые, въ іюнь. Сип. *Калладенія майоръ* (*Caladenia major*). **Г. миноръ** (*G. minor*, меньшая). Цв. голубые, въ іюнь. Сип. *Калладенія миноръ* (*Caladenia minor*).

**ГЛОССУЛЯ** (*Glossula*). *Glossa*—языкъ, по язычковымъ сегментамъ губы. С. орхидей. (1). Гонт-Контъ. Теплолюб. клубневый рр. Ухоть, какъ за Глоссодія.

**Г. тентакулята** (*G. tentaculata*, щупальцевая). Цв. мелкіе, зеленые, въ декабрь. 9 д.

**ГЛУВИНА**. Вышина въ обратномъ смыслѣ; размѣръ, до котораго опускается въ землю сѣмя при посѣвѣ и корень при посадкѣ растенія.

**ГЛУХАЯ КРАПИВА**. См. Ляміумъ.

**ГЛЫБА**. Комъ земли или мерзлаго навоза.

**ГЛЯДИОЛЮСТЬ** (*Gladiolus*). Уменьшительное *gladius*—мечъ. С. косатиныхъ. (90). Сред. Европа, Средиземн. побережье, Троп. и Южн. Африка. Песч. глини. дерн. съ торф. Воздушн. и оранж. или полувыносл. лукович. рр. Сѣменами и отпрысками (дѣтками).

**Г. бландусъ** (*G. blandus*, красивый). М. Д. Н. Цв. бѣлые съ красными мѣтками, трубка желтая. 6 д. 2 ф. **Г. брахидандрусъ** (*G. brachyandrus*, съ короткими тычинка-



ми). Тронич. Африка. Цв. ярко-шарлаховые, въ июль. 2 ф. **Г. бизантинусъ** (*G. byzantinus*, византийскій). Турція. Цв. красные, въ июль. 2 ф. **Г. кардинальскій** (*G. cardinalis*, кардинальскій). М. Д. Н. Цв. шарлаховые съ белыми пятнами, въ июль и августъ. 3—4 ф. **Г. круэнтусъ** (*G. cicutus*, кроваво-красный). Наталь. Цв. ярко-красные съ желтоватымъ основаніемъ. 2—3 ф. **Г. куспидатусъ** (*G. cuspidatus*, —круто-отсвѣченный). М. Д. Н. Окраска различна, обычно съ пурпуровыми и красными мѣтками на нижнихъ сегментахъ; въ маѣ и июль. 2—3 ф. **Г. пиліо** (*G. rapilio*, жотыльковый). М. Д. Н. Цв. свѣтло-пурпуровые съ темно-пурпуровыми и золотистыми мѣтками. 3 ф. **Г. пситтакусъ** (*G. psittacus*, попуганчій). Ю.-В. Африка. Трубка вѣнчика зеленоватая съ пурпуровыми черточками, лимбъ шарлаховый съ желтыми черточками и крапинками. 3 ф. **Г. Саундерса** (*G. Saundersii*, Саундерса). М. Д. Н. Цв. красно-карминовые съ белыми пятнышками, осенью. 2—3 ф. **Г. флорибундусъ** (*G. floribundus*, съ пучечными цв.). М. Д. Н. Цв. отъ блѣловатыхъ до тѣлесныхъ съ красною жилкой, въ маѣ. 1 ф.

Въ садахъ возмѣшивается громадное число формъ, составляющихъ поколѣіе двухъ главныхъ разновидностей, *бренкалейензисъ* и *гандавензисъ*, произведенныхъ искусственно помысью.

**ГЛАУКСЪ** (*Glaux*). Название, взятое у Diosкорида для р., имѣющаго алый цвѣтъ. С. первоцвѣтныхъ. (1). Европа, Востокъ. По солончакамъ. Многолѣтнее низенькое р., рѣдко встрѣчаемое въ садахъ. Песчан. и влажная. Размножается сѣменами.

**Г. маритима** (*G. maritima*, морской). Цв. блѣдно-малиновые, лѣтомъ. 3—6 д.

**ГЛАУЦИУМЪ** (*Glaucium*). *Glaux* —связный, по лѣту ал. С. маковыхъ. (6). Южн. Европа, З. Азія, С. Африка. Одно- и многол. воздушн. травяни. рр. Хорошая садовая. Сѣменами.

**Г. флауумъ** (*G. flavum*, желтый). Европа, С. Африка и З. Азія. Цв. ярко-желтые, крупные, въ июль до августа. 1—2 ф. Син. *Г. литеумъ* (*G. luteum*). **Г. фѣніцеумъ** (*G. phoeniceum*, пурпуровый). Европа. Цв. красно-малиновые съ черными пятнами внизу каждого лепестка, въ июль. 9 д. Син. *Г. корникулятумъ* (*G. corniculatum*).

**ГМЕЛИНА** (*Gmelina*). *Гмелина* (*Gmelin*)—русскій академикъ и путешественникъ по Россіи. С. вербеновыхъ. (8). Остиндія, В. Азія до Китая, Малайскій архип. и троп. Австралія. Теплолюб. древесн. рр. Сильная волокн. глини. дерн. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ песокъ, въ парникъ.

**Г. Ридіи** (*G. Rheedii*, Рида). Остиндія. Цв. белые, въ июль до августа. 20 ф.

**ГНАТЬ**. Выводитъ растенія ранѣе обычного времени. Отсюда *гонка*—заплате такою выводкою.

**ГНАФАЛІУМЪ** (*Gnaphalium*). *Gnaphalon* —мягкій пухъ. С. сложноцвѣтныхъ. (100). Отъ тропиковъ до арктическаго пояса. Песч. дернов. съ листвою, сѣменами и черенками. Въ садахъ почти не встрѣчаются. Заслуживаетъ вниманіе только.

**Г. декурренсъ** (*G. decurrens*, низбегающій). Сѣв. Америка. Цв. гол. бѣлые, въ июль—августъ. 2—3 ф.

**ГНИДІЯ** (*Gnidia*). Такъ назывался у древнихъ лавръ. С. ягодковыхъ. (40). Южн. Африка. Оранж. кустар. рр. Песчан. торф., при хорошемъ дренажѣ,—застой воды губителенъ. Черенками изъ молодого роста, въ песокъ подъ стекломъ.

**Г. пинифолия** (*G. pinifolia*, съ ал. хвойнаго). М. Д. Н. Цв. бѣлые, очень душистые, въ мартѣ—апрѣль. 1 ф.

**ГНИЛЕЦЪ. ГНИЛИЦА**. Грибъ (*Merulius lacrymans*), уничтожающій деревянныя постройки, главнымъ образомъ подвалы и погреба съ овощами и плодами.

**ГНИЕНІЕ**. Тлѣніе, обращеніе въ прахъ, вслѣдствіе разложенія, производимаго преимущественно развитіемъ мелкихъ организмовъ,—грибковъ.

**ГНѢЗДО**. Углубленіе занимаемое нѣсколькими сѣменами или клубнями: посѣвъ бобовъ, посадка картофеля гнѣздами; дѣтскія нѣк. бромелій образуютъ гнѣздо.

**ГОВЕНІЯ** (*Govenia*). *Gouen* (*Gouen*)—англійскій садоводъ, выведшій нѣсколько гибридовъ рокодедроповъ. С. орхидей. (16). Троп. Америка. Теплолюб. земный орхидей. Уходъ, какъ за Влегія.

**Г. Гарднери** (*G. Gardneri*, Гарднера). Бразилія. Цв. бѣлые, съ пятнышками. 2 ф.

**ГОДЕЦІЯ**. См. Энотера.

**ГОДИЧНЫЙ**. Былающій въ годъ разъ.

**ГОДИШОДІЯ** (*Gaudichaudia*). Шарль Годино (*Gaudichaud*)—франц. натуралистъ, сопровождавшій въ кругосвѣтномъ плаваніи Фрейсине. С. мальпигіиныхъ. (12). Мексика, Нов Гренада и Венецуэла. Теплолюбивы, обычно вьющ. кустарники. Уходъ, какъ за Гальфиміа.

**Г. цинанхойдесъ** (*G. cynanchoides*, похожая на Цинанхусъ). Мексика. Цв. желтые. 10 ф.

**ГODOBАЛЫЙ**. Переговдававшій. Однолѣтокъ.

**ГОДОЙЯ** (*Godoya*). *Годой* (*Godoy*)—прозванный „княземъ мира“, испанецъ

† 1839 г., заключавшій миръ Испаніи съ Франціей. С. охновыхъ. (2). Перу и Нов. Гренада. Тепло. древ. рр. Торф. съ глини. дерн. Черенками изъ зрѣлаго роста въ песокъ, въ сильномъ теплѣ. Темп. лѣтомъ 13—22, зимой 8—10°.

**Г. splendida** (*G. splendida*, великолѣпная). Колумбія. Цв. бѣлые, душистые. 10 ф.

**ГОДЪ**. Продолженіе времени, въ какое солнце возвращается въ прежнее мѣсто; состоитъ изъ 12 мѣсяцевъ, съ 52 недѣлями, съ однимъ или двумя днями. Кругооборотъ четырехъ временъ года.

**ГОЛЕНАСТЫЙ**. Непомѣрно вытянувшійся, удлиннвшійся. Стебель длинный, безъ вѣтвей и листьевъ.

**ГОЛЛАНДСКАЯ ГВОЗДИКА**. См. Диантусъ.

**ГОЛОВКА**. Особое шаровидное цвѣто-расположеніе сложноцвѣтныхъ. Название нѣкоторыхъ плодовъ (маковія головки).

**ГОЛУВИНСКАЯ ГРУША**. Плодъ среднихъ размѣровъ, желтаго цвѣта, хорошаго вкуса.

**ГОЛУВОЙ**. Свѣтло-синій, лазуревый цвѣтъ, ярко-небесный.

**ГОЛУБОЕЪ**. Сортъ яблока.

**ГОЛЪТОНІЯ** (*Galtonia*). Френсисъ Голтъонъ (*Galton*), — авторъ описанія Южной Африки. С. лилейныхъ. (2). Ю. Африка. Оранж. или воздушн. луковичныя рр. Сильная листвою. съ песчан. торф. Отпрысками или сѣменами, дающими черезъ четыре года цвѣтущія рр.

**Г. кандикаея** (*G. candicans*, бѣлая). М. Д. Н. Цв. бѣлые, большіе, душистые, трубчатые, пониклые. Син. *Гиацинтусъ кандикаея* (*Hyacinthus candicans*).

**ГОМФІЯ** (*Gomphia*). *Gomphos*—дубинка, по формѣ плода. С. охновыхъ. (8). Южн. Америка, Африка и Азія. Тепло. древ. и куст. рр. Двѣ ч. волокон. глини. дерн. и остальное торф. съ небольшимъ количествомъ песку. Черенками изъ почти зрѣлаго роста, въ песокъ, въ парникъ.

**Г. оливеформисъ** (*G. olivaeformis*, маслиннообразная). Бразилія. Цв. ярко-желтые, въ маѣ. 10—15 ф. Син. *Г. декорансъ* (*G. decorans*).

**ГОМФОКАРПУСЪ** (*Gomphocarpus*). *Gomphos*—дубинка и *karpos*—плодъ, по брюшистымъ плодикамъ. С. ласточниковыхъ. (80). Ю. и троп. Африка, Аравія, Центр. и Сѣв. Америка. Оранж. трав. или полукустарныя рр. Песчан. глини. дерн. и волокон. торф. Сѣменами, весной, въ парникъ или черенками изъ боковыхъ побѣговъ, въ то время какъ р. трогается въ ростъ, въ парникъ, въ песокъ.

**Г. фрутикозусъ** (*G. fruticosus*, кустарный). М. Д. Н. Цв. бѣлые, въ июль до сентября. 5—7 ф.

**ГОМФОЛОВІУМЪ** (*Gompholobium*). *Gomphos*—дубинка и *lobos*—стручокъ. С. бобовыхъ. (24). Австралія. Оранж. куст. рр. Торф. съ глини. дерн., не просѣяныя, съ добавкою песку и древ. угля мелкими кусочками. Дренажъ хорошій, поливка внимательная. Черенками изъ молодого роста, весной, подъ колпакомъ, въ тѣни.

**Г. грандифлорумъ** (*G. grandiflorum*, крупно-цвѣтный). Цв. желтые, крупные, въ июль. 2 ф. **Г. Найтіанумъ** (*G. Knightianum*, Найта). Цв. малиновые или пурпуровые, въ августъ. 1 ф. и выше. Син. *Г. гетерофиллюмъ* (*G. heterophyllum*). **Г. полиморфумъ** (*G. polymorphum*, многообразный). Цв. шарлаховые, въ мартъ до августа. Син. *Г. грандифлорумъ*, *Г. педункуларе*, *Г. тинге* и *Г. венулозумъ* (*G. grandiflorum*, *G. pedunculare*, *G. tenue* et *G. venulosum*). **Г. венустумъ** (*G. venustum*). Цв. пурпуровые, въ апрѣль до июля. 1—3 ф.

**ГОМФРЕНА** (*Gomphrena*). Измѣненіе *Громфѣна*, названія, даннаго Плиніемъ какому-то амарантусу. С. амарантовыхъ. (70). Троп. Америка, Азія и троп. Африка. Полувынослив. одно-, дву- и многол. трав. рр. Уходъ какъ за Целозіа.

**Г. глобоза** (*G. globosa*, съ шаровидными цв.). Индія. Цв. головки различныя, въ июль. 1½ ф. Имѣетъ много разновидностей; по окраскѣ цв. и росту,—*напа* (*papa*) едва ли не лучшая изъ нихъ, съ красными цв. и вышиною въ 5 д.

**ГОНАТАНТУСЪ** (*Gonatanthus*). *Gonia*—уголъ и *anthos*—цвѣтокъ, по согнутому цв. чехлу С. арондеевыхъ. (2). Гималаи. Тепло. многол. рр. Уходъ какъ за Каландумъ.

**Г. сарментозусъ** (*G. sarmentosus*, —цѣпляющійся). Цв. пахучіе; чехолъ золотисто-желтый; въ маѣ. Лл. красношпещренныя.

**ГОНГОРА** (*Gongora*). Антонио Кабеллеро де Гонгора (*Cabellero*)—вице-король ново-гранадскій, покровитель Муциуса. С. орхидей. (20). Троп. Америка. Тепло. эпифиты. Въ корзинкахъ съ торф. и мхомъ и древесн. углемъ. Дѣленіемъ. Темп. лѣтомъ 15—26, зимой 10—15°.

**Г. макулата** (*G. maculata*, пятнистая). Демерара. Цв. желтые съ красно-розовыми пятнами, въ маѣ, 1½ ф.

**ГОНИДІЙ**. Особого рода клѣточка между гифами лишая, имѣющая сходство съ водорослевою.

**ГОНОКАЛИКСЪ** (*Gonocalyx*). *Goni*—уголъ и *calyx*—чашечка, по угловатой чашечкѣ. С. брусничныхъ. (1). Новая Гренада. Холодно-оранж. кустарн.



Песч. глин. дерн. съ волокн. торф. Черенками изъ полузрѣлаго роста въ песокѣ, въ парникѣ. Темп. зимой 8—12, лѣтомъ 13—23°.

**Г. пульхеръ** (*G. pulcher*, красивый). Цв. ярко-красные съ бѣлымъ, весной.

**ГОПОЛОВУСЪ** (*Gonolobus*). *Gonia* — уголь и *lobos* — стручекъ. С. ласточниковыхъ. (70). Троп. и Сѣв. Америка. Тепл., оранж. или вынос. цвѣлющаяся, либо распотертыя куст. и полукуст. рр. Глин. дерн. съ торфян. Черенками въ песокѣ, подъ стекломъ. Выносливыя нуждаются въ большомъ количествѣ песку и размнож. тоже сѣменами.

**Г. каролинѣнзисъ** (*G. carolinensis*, каролинскій). Каролина. Цв. пурпуровые, въ июнѣ и июль. Оранж.

**ГООДЕНІЯ**. См. Гуденія.

**ГОРБУША**. Тонкая, изогнутая коса на короткой рукояткѣ, удобная для кошения на неровномъ мѣстѣ, между кочками и т. п.

**ГОРВЪ**. Выпуклость на поверхности. Кладутъ черепокъ на водосточное отверстіе горшка, при посадкѣ р., *горбомъ* вверхъ, чтобы стекала вода.

**ГОРДОНІЯ** (*Gordonia*). *Gordon* (Alex. Gordon) — лондонскій садоводъ, современникъ Филиппа Миллера. С. терн-стрѣмійныхъ. (10) С. Америка и троп. Азія. Оранж. или вынос. куст. рр. Волокн. торф. или листовая съ пескомъ. Сѣменами и отводкой.

**Г. аномала** (*G. anomala*, необычная). Троп. Азія. Цв. бѣлые, въ ноябрѣ, 3 ф. Оранж. **Г. лавіанта** (*G. lasiantha*, съ цв. покрытыми волосами). С. Америка. Цв. бѣлые, въ июль и августъ. 8—10 ф. Полувынос. **Г. пубесценсъ** (*G. pubescens*, пушистая). С. Америка. Цв. бѣлые, душистые, въ августъ. 4—6 ф. Вынос.

**ГОРЕЧАВКА**. См. Генціана.

**ГОРЕЧАВКОВЫЯ** рр. (*gentianeae*). Многочисленное семейство одно- или многолѣтнихъ, иногда кустарниковъ рр., широко распространенныхъ по земной поверхности. Растенія эти имѣютъ горькія свойства. Родовъ 49, видовъ — 520. Изъ родовъ наиболѣе замѣчательны: Вильярсія, Генціана, Линнайтеумъ, Лизіантусъ, Меніантусъ, Хиронія и Хлора.

**ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ**. Лежащій по уровню, на что отвѣтъ падаетъ прямымъ угломъ — перпендикулярно.

**ГОРИЗОНТЪ**. Окраина земной поверхности; граница отдѣляющая видимую часть неба и земли отъ невидимой.

**ГОРИЦВѢТЬ**. См. Адонисъ.

**ГОРДЫШЕО**. Отверстіе идущее раструбомъ, обыкновенно въ центрѣ цвѣтка.

**ГОРДЯНАЯ ТРАВА**. См. Кампанула.

**ГОРДЯНКА**. См. Антеннарія, Оробушъ, Прунелля и Лигенарія.

**ГОРНЫЙ**. Альпійскій, растущій въ природѣ на горахъ, болѣе или менѣе возвышенныхъ надъ уровнемъ моря.

**ГОРОХОВИКЪ**. См. Зерновка гороховая.

**ГОРОХЪ**. См. Пизумъ.

**ГОРСТЬ**. Количество забираемое въ одну пригоршню.

**ГОРЧИЦА**. См. Синаписъ.

**ГОРШОКЪ**. Округлый глиняный сосудъ усѣченно-коническаго вида, съ прямой тулей, пошире къверху, съ водосточнымъ однимъ или нѣсколькими отверстіями внизу и иногда по бокамъ, вызженный на огнѣ. Горшки дѣлаются изъ разныхъ материаловъ; лучшіе — изъ хорошей скважистой глины, равномерно вызженные и безъ поливы (не глазурированные). Кверху горшокъ долженъ быть шире, чтобы свободно вынимался комъ. По верхнему краю бываетъ иногда ободокъ. Горшки для орхидей — шире и мельче, чѣмъ обыкновен., притомъ съ большимъ числомъ отверстій и по сторонамъ. Для выбѣленія рр. употребляются горшки со съемнымъ верхомъ, который наставляютъ по выростанію стебля. Наконецъ для альпійскихъ рр. употребляютъ горшки съ двойными сторонами, чтобы въ промежуткѣ держать воду, сырой мохъ или влажный песокъ. Для обращиванія черенковъ горшки имѣютъ запячля, на котор. накладывается стеклянный колпакъ.

**ГОССИПІУМЪ** (*Gossypium*). Названіе, употребленное Плиніемъ. С. малявовыхъ. (3). Троп. страны. Тепл. многол. травя. или куст. рр. Сильная легкая земля. Сѣменами, въ теплѣ, весной. Одинъ изъ самыхъ важныхъ родовъ растит. царства, — доставляетъ хлопокъ.

**Г. бѣлая** (*G. Bahia*, бама). Самый производимый видъ, доставляетъ всего болѣе хлопка. Есть, говоритъ, помѣсь съ *Hibiscus esculentus*. **Г. барбадензе** (*G. Barbadosense*, изъ Барбадоса). Барбадосъ. Цв. желтые съ пурпуровымъ пятномъ у основанія лепестковъ, въ сентябрѣ. 5 ф. **Г. хербациеумъ** (*G. herbaceum*, травянистый). *Библейскій Виссонъ*. *Хлопчатникъ*. Остиндія. Цв. желтые съ пурпуровымъ пятномъ у основанія каждого лепестка, въ июль. 3—4 ф.

**ГОТИЧЕСКІЙ**. Стиль зодчатый, свойственный Готамъ, западной Европѣ въ

среднихъ вѣкахъ, отличающийся торжественною возвышенностію.

**ГРАВИЛКА**. Маленькія грабли, какъ рука съ пальцами для сбора ягодъ съ низкихъ кустовъ (напр. брусники), а также для разрыхленія земли вокругъ растений.

**ГРАВИТЬ**. Грести, сгребать граблями.

**ГРАВЛИ**. Ручная борова. Состоитъ изъ хребта, — бруска или пластины со сквозными дырками до 12, въ которые вколочены *зубья* и *грабловница* — палка въ ростъ человека, воткнутая по срединѣ хребта, отвѣсно зубьямъ. Необходимое орудіе въ садоводствѣ для сраженія поверхности передъ посѣвомъ, для сгребанія въ кучу вычесокъ, травы, листьевъ и пр. Бываютъ или всѣ деревянные, или всѣ желѣзные, или деревянные съ желѣзными зубьями. Желѣзные для садовыхъ работъ — самыя необходимыя и быв. разнаго размѣра.

**ГРАВЪ**. См. Карпинусъ.

**ГРАВОВСКІЯ** (*Grabowskia*). *Grabowskij* (*Grabowsky*) — аптекаръ и ботаникъ, жившій въ Олафѣ, въ Силезіи, † 1842. С. пасленовыхъ. (5). Вѣт-тропич. Юж. Америка. Полувынос. кустарники. Песч. глин. дерн. Черенками изъ вызрѣвшаго роста осенью или весной въ парникѣ.

**Г. бѣрхаавіефолія** (*G. boerhaaviefolia*, съ л. какъ у Берхава). Перу. Цв. свѣтло-голубые, въ апрѣлѣ. 6 ф. **Г. дуплика́та** (*G. duplicata*, удвоенная). Ю. Бразилія. Цв. зеленоватые, въ июль.

**ГРАВЕЗІЯ** (*Gravesia*). *Grav* (*Graves*) — написавшій о рр. Сѣв. Франціи и путешествовавшій по Мадагаскару. С. черноустовыхъ. (2). Мадагаскаръ. Теплич. трав. рр. съ изящно испещренными л. Сильная песчан. глин. дерн. Сѣменами и черенками въ парникѣ. Темп. лѣтомъ 13—22, зимой 8—12°.

**Г. гуттата** (*G. guttata*, испятнанная). Л. темно-зеленые съ красно-розовыми пятнышками, расположенными линіями. Имѣютъ нѣсколько разновидностей, изъ нихъ лучшія: *margaritacea* и *superba*).

**ГРАВИЛАТЬ**. См. Геумъ.

**ГРАВІЙ**. Крупный песокъ, дресва, христъ.

**ГРАДУСЪ**. Часть окружности круга, опредѣляющая величину угла, а также степень температуры на термометрѣ.

**ГРАММАНГІСЪ** (*Grammangis*). *Gramma* — письмо; вѣроятно, по пятнышкамъ на цв. С. орхидей. (2). Мадагаскаръ, Ява. Теплич. эпифиты. Уходъ какъ за Сакколябіумъ.

**Г. Хуттони** (*G. Huttoni*, Хуттона). Ява. Цв. блѣдно-коричневые съ поперечными шоколаднаго цв. черточками, въ июнѣ.

**ГРАММАНТЕСЪ** (*Grammanthes*). *Gramma* — письмо и *anthos* — цвѣтокъ; на лепесткахъ изображеніе буквы V, вслѣдствіе чего тотъ-же родъ называется *Vai-anthes* (Фауантесъ). С. толстянковыхъ. (1). Южн. Америка. Полувынос. однол. Торф. или легкая песчанистая. Сѣменами, весной, въ парникѣ.

**Г. хлорѣфлора** (*G. chloraeflora*, желто-цвѣтнй). Цв. сначала желтые, потомъ красные съ изображеніемъ буквы V у основанія каждой лопасти, въ июль. 4—5 д.

**ГРАММАТОКАРПУСЪ** (*Grammatocarpus*). *Grammata* — буквы и *carpos* — плодъ; по мѣткамъ на плодахъ. С. лазовыхъ. (1). Чили. Полувынос. однолѣт. выносея р., близкое къ Лоазе. Земля легкая. Весною, въ парникѣ, сѣменами.

**Г. волюбиліс** (*G. volubilis*, вьющійся). Цв. желтые, лѣтомъ.

**ГРАММАТОФИЛЛІУМЪ** (*Grammatophyllum*). *Grammata* — буквы, *phyllon* — листъ. По мѣткамъ на л. С. орхидей. (4). Малайскій полуостр. и архип. Теплич. эпифиты. Въ просторныхъ горшкахъ съ торфян.; хорошій дренажъ; обильная поливка. Дѣленіемъ луковицъ.

**Г. мультифлорумъ** (*G. multiflorum*, многоцвѣтнй). Манилья. Цв. зеленые, коричневые, пурпуровые, лѣтомъ. 2 ф. **Г. специозумъ** (*G. speciosum*, отменно-красивый). Ява. Цв. золотисто-желтые, зимой. 9—10 ф.

**ГРАПТОФИЛЛІУМЪ** (*Graptophyllum*). *Grapp* — писать и *phyllon* — листъ, по испещреннымъ л. С. акантовыхъ. (5). Австралія и о. Тихаго океана. Теплич. орнамент. кустарн. Торфян. съ глин. дерн. Черенками изъ довольно вызрѣвшаго роста, съ частью древесины и коры, въ песокѣ, въ парникѣ.

**Г. хортензе** (*G. hortense*, садовый). Отчество неизвѣстно, по р. это весьма обширно разводится въ тропич. странахъ по красивымъ пестрымъ л. Цв. красно-малиновые, въ июль—августъ.

**ГРАФІТЬ**. Карандашный камень, изъ котораго дѣлается такъ называемый свинцовый карандашъ; это — уголь съ небольшою примѣсью желѣза.

**ГРАЦА**. Трезубый крюкъ, въ видѣ когтей, для очистки грядъ отъ сорной травы. (Слово происходитъ отъ нѣм. *Kratzen*).

**ГРАЦИОЛЯ** (*Gratiola*). Уменьшительное *gratia* — милость; по врачевнымъ свойствамъ. С. норичниковыхъ. (20). Центр.



Европа, С. Америка и вѣв-тропич. Австралия. Обильно и красиво цвѣтущія травянистыя выносливыя рр. Сильная, нѣсколько влажная садовая. Дѣленіемъ корней, весной.

**Г. aurea** (G. aurea, золотистая) С. Америка. Цв. золотисто-желтые, въ маѣ, 4 д. **Г. официналис** (G. officinalis, аптечная). Европа. Цв. блѣднатыя съ пурпуровыми черточками, въ маѣ, 1 ф.

**ГРЕБЕНЧАТЫЙ**. Перисторазсѣченный, съ многочисленными, частыми и узкими сегментами, похожий на гребень.

**ГРЕВИЛЛЕЯ** (Grevillea). *Grevillea* (Greville)—покровитель ботаники. С. протейныхъ. (160). Австралия, Нов. Каледонія. Оранж. кустар. и древесн. рр. Волокнист. глин. дерн. съ торфян. Послѣ цвѣтенія пересаживать; остальной уходъ, какъ за Цитизусъ.

**Г. акантифолія** (G. acanthifolia, съ дл. какъ у акантуса). Австралия. Цв. красноватые, въ июнѣ, 4 ф. **Г. альпіна** (G. alpina, альпійская). Австралия. Цв. красные съ желтымъ, въ маѣ, 4 ф. Сил. **Г. альпестрис** (G. alpestris). **Г. Банксии** (G. Banksii, Банкса). Австралия. Цв. красные, въ августѣ, 15 ф. **Г. лавандулѣца** (G. lavandulacea, съ дл. какъ у лавандулы). Австралия. Цв. ярко-розовые, весной. Сил. **Г. розеа** (G. rosea). **Г. макростилис** (G. macrostylis, съ длиннымъ столбикомъ). Австралия. Цв. карминовые съ желтымъ, въ апрѣлѣ, 4—6 ф. **Г. пуніцеа** (G. punicea, красная). Австралия. Цв. темно-красные. Прямоослѣный кустъ. Сил. **Лизанте спикіоза** (Lysanthe spiciosa). **Г. робуста** (G. robusta, сильная). Австралия. Цв. сранжевые, въ июнѣ. Самый лучший и менѣе прихотливый видъ. **Г. серіцеа** (G. sericea, шелковистая). Австралия. Цв. розовые. Прямой или раскидистый кустъ. Сил. **Г. дубіа**, **Лизанте серіцеа** (G. dubia, Lysanthe sericea). **Г. Телеманиана** (G. Telemaniana, Телеманна). Австралия. Цв. ярко-красные съ желтоватыми кончиками, весной. Сил. **Г. Прейси** (G. Preissi). **Г. фасцикулата** (G. fasciculata, пучечная). Австралия. Цв. ярко-красные, весной. 3—4 ф. Сил. **Г. аспера линейрис** (G. aspera linearis).

**ГРЕВІЯ**. См. Грюія.

**ГРЕЙГІЯ** (Greigia). **С. А. Грейгъ** (Greig)—президентъ Импер. Р. Общества Садоводства, въ С.-Петербургѣ, † 1887. С. бромелиевыхъ. (2). Чили. Тепл. многол. трав. рр. Уходъ какъ за Бильбергія.

**Г. сфаселата** (G. sphacelata, опаленная). Чили. Цв. розовые, лѣтомъ; дл. мечевидные съ острыми по краямъ иглами. 3 ф. Сил. **Бильбергія сфаселата** (Billbergia sphacelata).

**ГРЕЙІЯ** (Greigia). Сэръ **Грей** (George Grey)—губернаторъ канской колоніи, въ которой найдено было р. С. мыловнико-выхъ. (1). Наталь. Оранж. кустар. р. нуждающееся въ полномъ свѣтѣ. Песчан. глин. дерн. Съеменами и черенками изъ полу-вызрѣвшаго роста.

**Г. Сутерланда** (G. Sutherlandi, Сутерланда). Цв. красивые, въ мартѣ.

**ГРЕСТЬ**. Тащить волокомъ мелкое, сыпучее, захватывая его, обыкновенно граблями.

**ГРЕЦКІЙ ОРѢХЪ**. См. Юглансъ.

**ГРЕЧА**. См. Фагонпирумъ.

**ГРЕЧИШНЫЕ** рр. (polygonaceae, polygonaceae). Широко распространеныя травяни. куст. и даже древесн. рр.; послѣднія—изъ троп. Америки, кустар.—изъ восточ. части срезидеи. побережья, а трав.—изъ умѣренныхъ и гористыхъ странъ. Имѣютъ весьма важное экономич. значеніе. Родовъ 30, распространенныхъ въ 600 видахъ. Изъ родовъ наиболѣе извѣстны: Кокколоба, Молденбекія, Полигонумъ, Реумъ и Фагонпирумъ.

**ГРИБЪ** Тайноцвѣтное растение, высшія формы котораго имѣютъ *корешокъ* или *пестикъ* и *шляпку*; исподъ шляпки есть *мездра* или *бужарма*.

**ГРИЗЕЛИНІЯ** (Griselinia). *Гризелини* (Griselinia), итальянскій ботаникъ XVII стол. С. деревьевыхъ. (8). Нов. Зеландія, Чили, Бразилія. Тепл. куст. рр. Сильная, легкая глин. дерн. Черенками изъ вызрѣвшаго роста, въ апрѣлѣ, въ песокъ, въ парникъ; также отводкой.

**Г. литторалис** (G. littoralis, побережная). Нов. Зеландія. Цв. мелкіе, покрытые золотистыми волосками. 10—12 ф.

**ГРИНДЕЛІЯ** (Grindelia). *Гриндель* (Grindelia)—нѣмецкій ботаникъ, † 1836. С. сложноцвѣтныхъ. (20). С. и вѣв-троп. Ю. Америка. Полувыносл. двулѣтн. или многолѣтн. травяни. и кустар. рр. Торф. съ глин. дерн. Съеменами весной или осенью, въ оранжереѣ или парникъ, также черенками и дѣленіемъ. Темп. зимой 4—7°.

**Г. глютиноза** (G. glutinosa, липкая). Перу. Цв. головки желтыя, въ январѣ или декабрѣ, 2 ф. Кустарн. **Г. грандифлора** (G. grandiflora, крупноцвѣтная). Техасъ. Цв. головки оранжевыя, лѣтомъ, 2½—3 ф. Двулѣтн. **Г. инулоидес** (G. inuloides, похожая на девисилъ). Мексика. Цв. головки желтыя. 1½ ф. Кустарн.

**ГРИСЛЕЯ** (Grisleia). *Грислей* (Grisley)—ботаникъ XVII ст., написавшій по португальскому ботанику. С. плакуновыхъ. (1). Венецуела и Нов. Гренада. Теплич. кустарникъ. Волокни. и песчан. глин. дерн. и торф. Черенками весной изъ молодыхъ

побѣговъ, въ песокъ, въ парникъ. Темп. лѣтомъ 13—20, зимой 8—10°.

**Г. секунда** (G. secunda, цвѣтущая сбоку). Цв. блѣдно-малиновые. 4—6 ф.

**ГРИФФІНІЯ** (Griffinia). Уильямъ *Гриффинъ* (Griffin)—покровитель ботаники. С. амариллисовыхъ. (8). Бразилія. Теплич. луковичн. рр. Волокни. глин. дерн.; по прекращеніи роста, луковицы нѣкоторое время не поливаются. Съеменами, какъ посѣвнымъ, или весной—отпрысками. Темп. во время роста 13—21, въ состояніи покоя 4—8° и держать сухо.

**Г. дриадесъ** (G. dryades, лѣсная). Цв. пурпурово-лиловые. **Г. орната** (G. ornata, украшенная). Цв. нѣжно-голубые съ лиловымъ оттиномъ, дѣлающіеся бѣлыми. **Г. хіацинтѣна** (G. hyacinthina, хіацинтовая). Цв. голубые, низу—бѣлые.

**ГРИАСЪ** (Grias). *Grao*—ѣсть; плодъ съѣдомый. С. миртовыхъ. (3). Троп. Америка. Тепл. деревья. Сильная песчан. глинистая, дерн. Черенками изъ вызрѣвшаго роста, въ песокъ, въ парникъ. Темп. лѣтомъ 13—22, зимой 8—10°.

**Г. каулифлора** (G. cauliflora, цвѣтущая на стеблѣ). Вестиндія. Цв. бѣлые, изъ стараго стебля, не красивые, но чрезвычайно душистые; ягоды овальныя, величиною въ куриное яйцо, коричневаго цвѣта. 30—50 ф.

**ГРОВАЯ** (Grobua). Лордъ **Грей Гробъ** (Lord Grey of Groby)—патронъ садоводства, † 1836. С. орхидей. (2). Тепличные эпифиты изъ Бразиліи. Плоскія корзинныя съ торфяникомъ, волокни. торф. з. и черенками. Дѣленіемъ. Темп. лѣтомъ 13—26, во время роста; зимой 10—14° и сухо.

**Г. Амхерстіи** (G. Amherstiae, Лэди Амхерст). Цв. съ охристыми пятнами, въ сентябрѣ, 6 д.

**ГРОЗДЪ**. **ГРОЗДІЕ**. Кисть плодовой, особенно виноградныхъ, также луковичъ и др.

**ГРОНОВІЯ** (Gronovia). *Гроновіусъ* (Gronovius)—лейденскій ботаникъ, другъ Линнея, † 1763. С. доазовыхъ. (1). Техасъ и Венецуела. Цѣнное тепличное или оранж. однолѣтн. трав. р., похожее на Бріонію. Песч. дернов. Съеменами въ парникъ; всходы разсадить въ отдѣльные горшки и направлять по опорамъ. Волоски жгутъ какъ крапина.

**Г. сканденсъ** (G. scandens, лазящая). Цв. мелкіе, желтые, въ июнѣ—юль.

**ГРОТЬ**. Пещера. Подземелье. Подземный проходъ.

**ГРОХОТИТЬ**. Просѣвать, просѣвать чрезъ грохотъ.

**ГРОХОТЬ**. Крупное проволоочное или веревочное рѣшето для очистки зеренъ

и просѣйки садовой земли, песку и т. п. Бываетъ крупный и мелкій.

**ГРУДНИЧНИКЪ**. См. Абутилонъ.

**ГРУЗДЪ**. Грибъ—*Lactarius piperitus*.

**ГРУНТЬ**. Материкъ. Земля. Почва. Фонт, основной цвѣтъ.

**ГРУПИРОВАТЬ**. Соединять, собирать купами, кучками, связью.

**ГРЪХВА**. Тоже что бруква.

**ГРЪША**. См. Пирусъ.

**ГРЪШАНКА**. См. Пиролья.

**ГРЪШОВКА**. Ранній сортъ яблока; кожа желтая, съ румянцемъ; форма плосковатая, верху острая. *Г. тѣмеккая*. См. Таскинское.

**ГРЪЖНАЯ ТРАВА** См. Андрозаце и Полиподіумъ.

**ГРЪЗНИКЪ**. См. Азарумъ.

**ГРІОІЯ** (Grewia). Несомнѣно *Грѣя* (Grew), англійскій ученый, знаменитый сочиненіемъ объ анатоміи рр. С. линовыхъ. (60). Жаркія страны Африки, Азии, Австраліи. Теплич. куст. или древесн. рр. Песчан. глинисто-дерн. съ торфяной. Черенками въ песокъ, въ парникъ.

**Г. окциденталис** (G. occidentalis, западная). М. Д. П. Цв. пурпуровые, въ полѣ до сентябрю, 10 ф.

**ГРЯДЪ**. **ГРЯДКА**. Врытая, хорошо обдѣланная возвышенная или углубленная, либо наравнѣ съ общеою поверхностью земли, полоса для посѣва и посадки растений. Огородная или школьная гряда дѣлается не шире полутора арш., чтобы легче человеку полоть и ухаживать за растениями. Разстояние между грядами—борозда, дѣлается въ полтаршина,—болѣе или менѣе. Гряда называются *теплой*, когда она состоитъ изъ земли, насыпанной на навозъ, который можетъ лежать или поверхностно, или въ вырытомъ для него углубленіи. Грядками-же называютъ и клумбы въ саду, съ цвѣтущими растениями. Садовымъ грядамъ и грядкамъ даютъ разнообразное очертаніе, тогда какъ огородныя дѣлаются всегда прямыми, по шнуру. *Гряды теплыя*—дѣлаются на сгнивавшемъ веществѣ, отдѣляющемъ теплоту, которая необходима для роста и развитія нѣжныхъ растений. Эти гряды особенно полезны весной. Лучшимъ нагрѣвательнымъ веществомъ признается навозъ, хорошо смѣшанный пополамъ съ сухимъ листомъ, чтобы дѣйствіе навоза не было слишкомъ сильно и не кончалось бы скоро. Для ровнаго тепла по всей грядѣ необходимо ровно и плотно укладывать согревающій матеріалъ.

**ГУАНІЯ** (Gouania). *Гуанъ* (Gouan)—проф. ботаники въ Монпелье, † 1821.



С. крушиновых (30). Тропич. Америка, Азия и Африка. Тепл. лазия куст. пр. имения лишь ботанический интерес.

**ГУАНО.** Птичий навоз преимущ. съ морских островов и береговъ.

**ГУАРЕА (Guarea).** Мѣстное название на о. Кубъ. С. ясенниковъ. (30). Троп. Америка. Дрв. и куст. тепл. пр., рѣже встречаемыя въ садахъ. Уходъ, какъ на Гвайякумъ.

**ГУАЦУМА (Guazuma).** Мѣстное мексиканское название. С. стеркулиевыхъ (5). Тропич. страны обоихъ полушарій. Теплолюб. орнж. деревья. Торф. съ глини. дерн. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ песокъ, въ парникъ. Въ общемъ, уходъ, какъ за Гвайякумъ.

**Г. ульмифолія (G. ulmifolia),** съ лл. какъ у пальмы. Вестиндія. Цв. желтые, съ 2 пурпуровыми остиями, въ августъ. 40—60 ф. Сип. *Bubroma guazuma* (Bubroma Guazuma).

**ГУБА. ГУБКА.** Одно изъ раздѣленій цвѣтоточнаго покрова, имѣющее обычно нижнее положеніе.

**ГУБЦВѢТНЫЙ.** Цвѣтокъ—тотъ, у кот. сростнолистный покровъ раздѣленъ на два неравные лоскута, — верхній и нижній, называемыхъ губами.

**ГУБЦВѢТНЫЯ** пр. (labiatae). Чрезвычайно обширное семейство травянистыхъ, кустарныхъ, полукустарныхъ и даже древесныхъ растений, встречаемыхъ обычно въ умеренной полосѣ Старого свѣта. Названо по очертанію цвѣтка (губоцвѣтнаго). Одна изъ самыхъ натуральныхъ группъ пр. Родовъ 140, видовъ 2600. Многіе представители содержатъ тетуши масла. Изъ принадлежащихъ сюда родовъ должно назвать Аннзохию, Ляміумъ, Колеусъ, Куніа, Лофантесъ, Перилла, Сальвіа, Хиссонусъ, Эолантусъ.

**ГУДАЙЕРА** или **ГУДИЕРА (Goodyera).** *Гудайеръ* (Goodyer), — англійскій ботаникъ. С. орхидей. (25). Европа, Мадера, Троп. Азия, С. Америка, Нов. Зеландія, Маскаренскіе о. Выносл., орнж. и тепл. земныя орхидеи, у нѣк. листья бѣл. темно-бархатные, какъ у анекдохлюсовъ. Тепл. и орнж.—въ горшкахъ, или кашкахъ съ торф. и пескомъ; полвка обильная, во время роста; размнож. черенками съ частью корня, въ парникъ. Выносливы въ затѣненномъ положеніи, во влажн. торф. съ толченымъ песчанникомъ.

**Г. велютина (G. velutina),** бархатистая. Японія. Цв. бѣлые съ розовымъ оттѣнкомъ; лл. пурпурово-зеленые съ бѣлыми жилками. Полу-вынослива. **Г. дисколоръ (G. discolor),** разно (дву) цвѣтная. Ю. Америка. Цв. бѣлые съ желто-лимоннымъ пятномъ на губѣ,

кот. скручена. Зимой. Лл. темно-зеленые бархатистые, съ бѣлыми черточками. Орнж. Лучшій видъ. **Г. макранта (G. macantha),** большецвѣтная. Японія. Цв. розовые, большіе, въ іюль. Лл. съ желтымъ краемъ. Полувынослива. Сип. **Г. пикта (G. picta).** **Г. пубесценс (G. pubescens),** пушистая. С. Америка. Цв. бѣлые, лл. съ серебристыми жилками. Холодно-орнж.

**ГУДЕНІЯ (Goodenia).** Д-ръ *Гудиновъ* (S. Goodenough), — епископъ карлайльскій (+ 1827), авторъ монографіи Карекса. С. гудиниевыхъ. (70). Австралія. Орнж. травянистыя и полукустарн. пр. Смѣсь глини. дерн. съ торфяной. Черенками, весной, въ парникъ. Темп. зимой 4—6°.

**Г. грандифлора (G. grandiflora),** крупно-цвѣтная. Цв. желтые, въ іюль. 3—4 ф. Травяни. **Г. овата (G. ovata),** яйцевидная. Цв. желтые, въ іюль. Кустарн. или полукуст. **Г. стеллигера (G. stelligera),** съ звѣздчатыми волосками. Цв. желтые, въ іюль. Многол. трап.

**ГУДЕНОВІЙНЫЯ** пр. (goodenovicaceae). Семейство изъ травянистыхъ, полукустарныхъ, рѣдко кустарныхъ пр. съ млечнымъ сокомъ, встречающихся почти исключительно въ Австраліи, — нѣсколько видовъ Сцевола растутъ въ Новой Зеландіи, на о. Тихаго океана и по берегамъ рѣкъ тропическихъ и жаркихъ поясовъ Африки, Азии и Америки, одинъ же родъ Калогине встречается въ Китаѣ. Въ этомъ сем. 20 родовъ и 200 видовъ. Наибольше замѣчательные роды: Вельвея, Гуденія, Дампiera, Лемноллія и Сцевола.

**ГУЕВИНА (Guevina).** Мѣстное название. С. протейныхъ. (1). Чили. Орнж. дерево. Торф. съ глини. дерн. Черенками, въ песокъ, подъ стекломъ.

**Г. авелляна (G. avellana),** Ляцина. Цв. бѣлые, въ іюль. 40 ф.

**ГУИЛЬЕЛМА (Guilhelma).** Королева Фредерика *Виллеммина* (Гуильельмина) — королева баварская. С. пальмъ. (3). Тропич. страны, Ю. Америка. Тепл. пальмы. Уходъ какъ за Бактрией.

**Г. специоза (G. speciosa),** отъинная. Амазонское р. Ван перистыя въ 2—4 ф. длиною, черешковые влагалища съ тонкими черными, острыми иглами. Стволъ высочій, густо покрытый иглами, тонкій. Сип. *Бактрия Гасипаесъ* (Bactris Gasipaes).

**ГУММИГУТОВЫЯ** или **КАМЕДЕКАПИЛЬНИКОВЫЯ** пр. (guttiferae). Деревья и куст., заключающие камедистый сокъ. Растутъ во влажныхъ и жаркихъ тропическихъ странахъ, преим. Ю. Америки и Азии; не многія встречаются въ Африкѣ. Въ семействѣ 24 рода и 230 видовъ. Примѣры родовъ: Гарцинія, Калофиллумъ, Клузія и Маммеа.

**ГУНДЕЛИЯ (Gundelia).** **А. Гундельсгеймеръ (Gundelsheimer)** — вѣдѣнскій ботаникъ, сопровождавшій Турнефорта. С. сложноцвѣтныхъ. (1). В. Азия. Песчан. торф. Дѣленіемъ.

**Г. Турнефортіи (G. Tournefortii),** Турнефорта. Цв. головки пурпуровыя, въ іюль—августъ. 1½ ф.

**ГУННЕРА (Gunnera).** *Гуннеръ* (Gunner) — шведскій епископъ и ботаникъ, + 1773. С. сланогодишниковыхъ. (11). Австрія, Малайскій арх., Нов. Зеландія, ос. Тихаго океана и южн. Американскіе; также въ Ю. Африкѣ и на Андахъ до Мексиканскаго залива. Полувыносл. или выносл. многол. травяни. пр. Дѣленіемъ. Сильная глини. дерн.

**Г. маниката (G. manicata),** влагалитная. Южн. Бразилія, изъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ бываютъ морозы. Лл. 12 до 20 ф. въ окружности, на черешкахъ въ 4—6 ф. **Г. скабра (G. scabra),** жесткая. Чили. Цв. красноватые, лл. шир., въ 4—5 ф., на колючемъ черешкѣ въ 3—6 ф.

**ГУСЕНИЦА.** Состояніе чешуекрылаго насѣкомаго, въ которомъ наноситъ вредъ пр., питающъ ихъ частями до превращенія въ куколку.

**ГУСТАВІЯ (Gustavia).** Король шведскій *Густавъ III* (Gustav) — покровитель Линнея. С. миртовыхъ. (11). Троп. Америка. Теплолюб. древесн. и кустар. пр. Сильная глинисто-дерн. Черенками изъ зрѣлаго роста въ песокъ, въ парникъ. Темп. лѣтомъ 13—26°, зимой 10—13°.

**Г. грацильіма (G. gracillima),** весьма изящная. Нов. Гренада. Цв. красно-розовые, въ сентябрѣ. **Г. инсигнисъ (G. insignis),** замѣчательная. Троп. Америка. Цв. бѣлые, въ іюль. **Г. птерокарпа (G. pterocarpa),** съ плодами, имѣющими летучки. Отличается отъ Г. инсигнисъ, только тѣмъ, что плодишки крылатый.

**ГУТА-ПЕРКА. ГУТА-ПЕРЧА.** См. Изонандра. Дерево, сокъ котораго криплетъ на воздухѣ и идетъ на множество различныхъ подѣлокъ.

**ГУТЕРРЕЦІЯ (Gutierrezia).** Происхождение не выяснено. С. сложноцвѣтныхъ. (20). Америка отъ Красной р. до Мексики, частію Чили. Травяни. или полукустарн. пр., имѣющія ботаническое значеніе, но въ садахъ не воспитываемыя.

**ГУЦМАННІЯ (Guzmannia).** *Гуцманъ* (Guzman) — испанскій натуралистъ. С. бромелиевыхъ. (4). Троп. Америка. Тепл. эпифитъ. Травяни. торф. съ травяни. глини. дерн. и дрв. углемъ съ черенками. Дѣленіемъ и отпрысками. Темп. лѣтомъ 13—21°, зимой 10—12°.

**Г. триколоръ (G. tricolor),** трехцвѣт-

ная). Цв. бѣлые съ блѣдно-желтыми прицвѣтниками, имѣющими темно-пурпуровые кончики, лѣтомъ. **Г. эритролепис (G. erithrolepis),** красно-чешуйчатая). Цв. бѣлые, въ шарлаховыхъ прицвѣтникахъ.

**ДАВЕЦІЯ (Daboecia).** Мѣстное название въ Ирландіи. С. вересковыхъ. (1). Ирландія, 3. Франція, С. Испанія, Азорск. о. Кустарн. р. Песчан. торф. съ малымъ количествомъ глини. дерн. Отводкой или черенками, подъ стекломъ.

**Д. полифолія (D. polifolia),** съ лл. какъ у Polium). Цв. бѣлые, розовые или пурпуровые, въ іюль до сентября. 1—2 ф. Сип. *Menziesia полифолія* (Menziesia polifolia).

**ДАВАЛІЯ (Davallia).** *Давалъ* (Davall) — швейцарскій ботаникъ. С. папоротниковыхъ. (60). Троп. Азия, Малайск. архип., остр. Тихаго океана, Африка, Канарск. ос., Испанія, Португалія. Орнж. жерейн. пр.

**Д. аффилисъ (D. affinis),** сродная. Цейлонъ. Ван широкіи, дельтовидно-ланцетовидныя, 3 или 4 перистыя. **Д. диссекта (D. dissecta),** разсѣченная). Ява. Ван дельтовидныя, 4-перистыя. **Д. канариенсисъ (D. canariensis),** канарская). Испанія. Ван дельтовидныя, 4-перистыя. **Д. паллида (D. pallida),** блѣдная). Борнео. Ван почти дельтовидныя, 4-перистыя. **Д. пентафилля (D. pentaphylla),** пятилиственная). Ява. Вай съ 2—3 парами боковыхъ и однимъ макушечнымъ сегментомъ. **Д. пиксидата (D. pixedata),** коробчатая). Нов. Юж. Валлисъ. Ван дельтовидныя, 3—4 перистыя. **Д. репенс (D. repens),** ползучая). Борнео. Ван просто перистыя. Сип. **Д. хемиптера, Одонтолома репенс (D. hemiptera, Odontoloma repens).** **Д. солида (D. solida),** твердая). О. Люсонъ. Ван дельтовидныя, трехперисто-разсѣченныя. **Д. тенуифолія (D. tenuifolia),** нѣжно-лиственная). Тропич. Азия. Ван овальные, 3-перистыя. **Д. Тайермани (D. Tuermanni),** Тайермана). 3. берегъ Африки. Ван длинно-дельтовидныя, 3 или 4 перистыя. **Д. фидженсисъ (D. fijiensis),** съ Фиджи). Фиджи. Ван широко-дельтовидныя, 4-перистыя. **Д. хирта (D. hirta),** волосистая). С. Индія. Ван широкіи, дельтовидныя, 3—4 перистыя. Сип. **Д. фирма** и **Д. скабрула (D. firma et D. scaberrula).** **Д. элегансъ (D. elegans),** изящная). Тропич. страны Старого свѣта. Ван широко-дельтовидныя, 3-перистыя. Имѣетъ разновидности *элатъ* и *флаксидо* (elata, flaccida).

**ДАВИДСОНІЯ (Davidsonia).** *Давидсонъ* (Davidson) нашелъ это растение въ плантаціяхъ сахарнаго тростника. С. камнеломковыхъ (1). Австралія. Теплолюб. куст. р. Черенками, подъ стекломъ, въ теплѣ. **Д. прүриенс (D. pruriens),** производ-



щая зудь). Австралия. Въ Европѣ еще не цвѣло. Лл. непарно-перистые, усаженные волосками, производящими зудъ при дотрагиваніи.

**ДАВИЗИЯ (Daviesia)** *Daviesia* (Davies) — ботаникъ къ Валлисѣ. С. бобовыхъ (55). Австралія. Оранж. куст. и полукуст. прр. Глин. дерн. съ торф. и пескомъ. Черенками изъ вызрѣвшаго роста, въ песокъ, подъ стекломъ, или сѣменами въ парникъ. Темп. лѣтомъ 10—20, зимой 2—6°.

**Д. латифолия (D. latifolia)**, широколистная). Цв. желто-оранжевые, въ маѣ. 2—5 ф.

**ДАЗИЛИРІОНЪ (Dasylirion)** *Dasylirion* — густой и *lirion* — лилія. С. лилейныхъ. (8). Мексика, Техасъ. Оранж. орнамент. прр. Песчан. дернов. Сѣменами. Темп. лѣтомъ 13—22, зимой 6—10°.

**Д. акротрихумъ (D. acrotrychum)**, съ волосистыми кончиками). Мексика. Цв. бѣлые; лл. розеткой, согнутые, съ желтоватыми краями. 12 ф. **Д. глаукофиллюмъ (D. glaucophyllum)**, съ млечно-бѣлыми лл.). Мексика. Цв. бѣлые, лл. длинные, широкіе, съ зубчатыми краями. Сип. *Д. глаукумъ (D. glaucum)*.

**ДАИСЪ (Dais)** — факель, по пѣвоторасположенію. С. ягдовыхъ. (2). Ю. Африка, Мадагаскаръ. Оранж. куст. или дрв. прр. Смѣсь глин. дерн. съ торф. Черенками изъ полузрѣлаго роста или корней, въ апрѣлѣ, въ песокъ, въ развод. парникъ. Темп. 10—20 лѣтомъ, 4—6° зимой.

**Д. котинифолия (D. cotinifolia)**, съ лл. желтими). М. Д. Н. Цв. малиновые, въ іюнѣ. Даетъ самое крѣпкое волокно, употребляемое въ Африкѣ.

**ДАКРИДИУМЪ (Dacrydium)** *Dacrydium* — уменьшительное, *dakry* — слеза, по смолистымъ выделениямъ. (10). Малайск. арх. Нов. Зеландія, Новая Зеландія, Тасманія. С. хвойныхъ. Орнамент. деревья съ пониклыми вѣтвями.

**Д. купресойнумъ (D. supressum)**, кипарисный). Нов. Зеландія лл. бѣдно-зеленые, мелкіе, прижатые. 60—100 ф. Рость пирамидальный. **Д. таксодесъ (D. ta-xoides)**, тисообразный). Нов. Зеландія. Лл. очередные, плотно-лежащіе, серповидные; вѣтви почти вертикальны. Кустъ конической формы.

**ДАКТИЛИСЪ (Dactylis)** *Dactylis* — палецъ, вѣроятно по размѣрамъ соцветій. С. злаковъ. (1). Европа, Азія, С. Америка. Дикорастущій злакъ, пригодный для посяна на влажныхъ мѣстахъ.

**Д. гломерата (D. glomerata)**, клубочко-ный). *Евж.* Колоски многоцвѣтные, по одну сторону, образующіе густую вѣтвистую метелку, въ іюнѣ. Р. многолѣтнее. Имѣетъ

пестролистную форму, — *variegata* (variegata), въ большомъ употребленіи въ садахъ.

**ДАКТИЛОКТЕНІУМЪ (Dactyloctenium)** *Dactylos* — палецъ и *ktenion* — гребешокъ; по гребенчатымъ колоскамъ. С. злаковъ. Однолѣтн. африканскія прр. почти не встрѣчающіяся въ садахъ.

**ДАЛЕА**. См. Дэлеа.

**ДАЛЕШАМПИЯ (Dalechampia)** *Dalechampia* — извѣстный французскій врачъ, ботаникъ и физиологъ, † 1588. С. молочайныхъ. (60). Тропич. страны. Тепл. вьющіяся прр. Торф. съ глин. дерн. Черенками, осушивъ предвѣрительно нижніе концы, въ песокъ, подъ стекломъ, въ апрѣлѣ. Темп. лѣтомъ 13—24, зимой 8°.

**Д. Редліана (D. Raeziana)**, Редля). Вера-Крупъ. Цв. малиново-розовые, душистые. Какъ исключеніе, р. невьющееся. Имѣетъ бѣлую разновидность *альба* (alba).

**ДАЛИВАРДА (Dalibarda)** *Dalibarda* — французскій ботаникъ. С. розановыхъ. (3). С. Америка, Гималаи. Низкоросл., многол. прр. съ ползучими стеблями или корневищами. Глубокая торф. дѣленіемъ.

**Д. репенсъ (D. repens)**, ползучая). С. Америка. Цв. бѣлые, въ маѣ и іюнѣ; стебли ползучіе. Сип. *Д. кордата* и *Д. виоледидесъ (D. cordata et D. violaeoides)*.

**ДАЛЬБЕРГІЯ (Dalbergia)** *Dalbergia* — Николай Дальбергъ (Dalberg) — шведскій ботаникъ, † 1820. С. бобовыхъ. (64). Троп. Азія Африка, Америка, Австралія. Тепл. древесныя или вѣтвистыя кустар. прр. Смѣсь изъ глин. дерн. съ торф. и пескомъ. Черенками изъ молодого роста, въ мартѣ, въ песокъ, на слабомъ теплѣ. Темп. лѣтомъ 13—24, зимой 8—10°.

**Д. латифолия (D. latifolia)**, широколистная). Остиндія. Цв. бѣлые, въ маѣ. 30 ф. **Д. сиссо (D. sissoo)**, сиссо). Бенгалъ. Цв. бѣлые, въ маѣ. 30 ф.

**ДАЛИЯ (Dahlia)** *Dahlia* (Dahl) — шведскій ботаникъ, ученикъ Линнея. С. сложнораздѣльныхъ. (5). Мексика. Извѣстныя травянистыя многол. прр., называемыя обычно *георгинами*. Сильная, вѣсколько тяжелая съ сѣменами, черенками, дѣленіемъ клубней и иногда прививкой.

**Д. варьябилисъ (D. variabilis)**, измѣничивая). Мексика. Цв. головки чрезвычайно разнообразной окраски, въ августѣ — сентябрѣ. Этотъ видъ произвелъ большинство формъ нынѣ воспитываемыхъ. Въ дикомъ состояніи — цвѣтокъ не махровый, въ которомъ торчавые цв. трубчатые желтые, а лучевые — окрашены въ разной степени яркій шарлаховый цвѣтъ. Сип. *Д. кроката* и *Д. суперфлюи (D. crocata, D. superflua)*.

**Д. имперіалисъ (D. imperialis)**, императорская). Мексика. Цв. головки бѣлыя съ лиловымъ оттѣнкомъ и красными черточками при основаніи лепестковъ, колокольчатые, пониклые. 10—12 ф. Можетъ на воздухѣ оставаться недолго и въ концѣ сентября должно убираться въ оранжерею. **Д. жуарепіи (D. Juarezii)**, Жуарена). Форма образованная въ садахъ, въ Мексикѣ. Цв. головки ярко-махровыя, неправильной формы. 3 ф.

**ДАММАРА (Dammara)**. Мѣстное названіе. С. хвойныхъ. (10). Малайск архип., Нов. Зеландія, Нов. Зеландія, Австралія. Оранж. прр. Глин. дерн. съ пескомъ. Черенками изъ молодого окрѣпшаго роста. Тмп. лѣтомъ 10—21, зимой 3—6°.

**Д. аустралис (D. australis)**, южная). Нов. Зеландія. Вѣтви большія, распростертыя; лл. линейныя, густые, кожистые. 120—150 ф. **Д. ориенталисъ (D. orientalis)**, восточная). Молуккскіе остр. Вѣтви вертикальныя, лл. овальные. 100 ф. Им. разновидность *альба* (alba) съ болѣе длинными лл.

**ДАМНАКАНТУСЪ (Damnacanthus)** *Damnacanthus* — побѣждать и *acanthos* — игла, по острому игламъ. С. мареновыхъ. (2). Японія, Сип. Китай, Бенгалъ. Оранж. куст. прр. Песчан. глин. дерн. съ торф. или листов. Черенками въ песокъ, въ разводочн. парникахъ.

**Д. майоръ (D. major)**, большій). Японія. Цв. бѣлые, пахучіе, ягоды красныя.

**ДАМПЬЕРА (Dampiera)** *Dampiera* — капитанъ Дампьеръ (Dampier) — знаменитый кругосвѣтнй мореплавателъ, принесшій услугу естеств. наукамъ. С. гуденовѣвыхъ. (30). Австралія. Оранж. полукуст. прр. Водокнист. глин. дерн. съ волоки. торф. и пескомъ. Черенками подъ стекломъ.

**Д. Броуни (D. Brownii)**, Броуна). Цв. голубые, въ іюлѣ. 1—2 ф. Сип. *Д. овали-фобія (D. ovalifolia)*.

**ДАНЕА (Danaea)** *Danaea* — Пьеръ Мартенъ Дана (Dana) — написавшій монографію о пьомонскихъ растеніяхъ. С. папоротниковыхъ. (12). Вестиндія. Глин. дерн. съ торф. Теплич.

**Д. алята (D. alata)**, крылатая). Вестиндія. Ван перистыя, корневища деревянистыя.

**ДАРВИНІЯ (Darwinia)** *Darwinia* — Д-ръ Дарвинъ (Darwin) — авторъ поэмы, "The botanic Garden". С. миртовыхъ. (23). Австралія. Оранж. кустарн. прр. Глин. дерн. съ торф. и пескомъ. Черенками изъ молодого роста, въ песокъ, подъ стекломъ. Тмп. лѣтомъ 10—20, зимой 3—6°.

**Д. макростегія (D. macrostegia)**, съ большими обертками). Цв. желтые съ красными черточками; обертки колокольчатые, въ іюнѣ. 2—3 ф. Сип. *Генетиллисъ ту-*

*лифера (Genethyllis tulipifera)*. **Д. фимбриата (D. fimbriata)**, бахромчатая). Цв. малиновые, обертки лицевидныя, въ іюнѣ. 1—2 ф. Сип. *Генетиллисъ фимбриата (Genethyllis fimbriata)*. **Д. Хукеріана (D. Hookeriana)**, Гукера). Во всѣхъ частяхъ меньше *Д. макростегія*. Сип. *Генетиллисъ Хукеріана (Genethyllis Hookeriana)*.

**ДАРЛИНГТОНІЯ (Darlingtonia)** *Darlingtonia* — американскій ботаникъ. С. сарацениевыхъ. (1). Калифорнія. Травян. оранж. р. Рубчатый мохъ съ торф. а. и кусочками дрв. угля съ пескомъ. Подъ колпакомъ. Сѣменами.

**Д. калифорника (D. californica)**, калифорнская). Калифорнія. Цв. свѣтло-зеленые съ желтыми лепестками, изгибающимися темными красно-коричневыми жилки, въ апрѣлѣ. Купинны зеленые, верхн. ихъ часть и устье съ бѣлыми крапичками и красноватыми жилками. 1—1½ ф.

**ДАТИСКА (Datiscia)**. Происхождение названія неизвѣстно. С. датисковыхъ. (2). З. Азія, Непаль, Востокъ. Травян. многол. Хорошая садовая. Сѣменами и дѣленіемъ.

**Д. каннабіна (D. cannabina)** похожая на коноплю). Критъ и З. Азія. Цв. желтые, лл. перистые. 3—4 ф.

**ДАТИСКОВЫЯ прр. (datisceae)**. Малочисленное семейство растеній близкихъ съ бегоніями. Это — травянистыя, или древесныя породы. Извѣстно только три рода: Датиска, Октомелесъ и Тетраме-лесъ.

**ДАТУРА (Datura)**. Происхождение названія неясное. С. пасленовыхъ. (12). Умѣр. и жаркія страны. Однолѣт., куст. и дрв. прр. Сильная глин. дерн. Однол. сѣменами въ парникъ; многол., кустар. — черенками въ легкой землѣ, на тепломъ грунтѣ, подъ стекломъ нѣжные — зимой въ оранжерей, въ тмп. 2—4°.

**Д. арбореа (D. arborea)**, древесная). Перу. Цв. бѣлые, въ августѣ. 7—10 ф. Оранж. кустар. Сип. *Бругмансія кандида (Brugmansia candida)*. **Д. Метелъ (D. Metel)**, Метель). Тропич. страны. Цв. бѣлые, душистые, въ іюнѣ. 2 ф. Однол. **Д. метеллоидесъ (D. meteloides)**, похожая на Метель). Калифорнія. Цв. голубовато-фіолетовые или бѣлые. Оранж. съ неопадющими лл. Сип. *Д. Урайтли (D. Wrightii)*. **Д. сангвинеа (D. sanguinea)**, кроваво-красная). Перу. Цв. желто-оранжевые, пониклые, лѣтомъ. 3—12 ф. Оранж. **Д. суавеоленсъ (D. suaveolens)**, съ пріятнымъ запахомъ). Мексика. Цв. бѣлые, пахучіе, въ августѣ. 10—15 ф. Оранж. дрв. **Д. фастуоза (D. fastuosa)**, колючая). Остиндія. Цв. фіолетовые снаружи, бѣлые внутри, въ іюлѣ. 2—3 ф. Однол.



**ДАУКУСЪ** (*Daucus*). Название заимствованное у Dioscorida. С. зонтичныхъ. (20). Европа, Азия, С. Африка. Дв. и одол. трав. рр. Глин. дерн. съ пескомъ. Съеменами.

**Д. карота** (*D. carota*). *Морковь*. Европа, С. Африка, С. и З. Азия до Индии. Цв. белые, летомъ. 1—2 ф. Въ культурѣ весьма много сортовъ, отличающихся величиною, формою и цвѣтомъ. Разводятся или прямо на воздухъ, или—раннѣе, въ парникѣ. Малой величины назыв. *каротель*.

**ДАФНЕ** (*Daphne*). Теофрастъ называлъ такъ лавръ. С. ягодковыхъ. (36). Европа, Азия, С. Африка, Малайск. архипелагъ. Вынос. или оранж. кустар. рр. Глин. дерн. съ торф. по ровну. Съеменами, черенками и прививкой.

**Д. Мецерѳумъ** (*D. Mezgerium*). *Ягодки*. *Волче лыко*. Европа. Цв. красные, по 3, 4 или по 2, появляющіеся до лл. рано весной. 3—4 ф. Имѣетъ разновидности съ белыми и осенью цвѣтущими цв. **Д. одора** (*D. odora*, душистая). Китай. Цв. пурпуровые, душистые, въ мартѣ. 3 ф. Оранж. съ опадающими лл. **Д. понтика** (*D. pontica*, понтийская). В. Европа. Цв. зеленые, душистые, въ апрѣлѣ, маѣ. 4—5 ф. Есть разновидность съ пестрыми лл.

**ДВОЕОБЪЕМНИКОВЫЯ** или **ДВУМЪСТНИКОВЫЯ** рр. (*hamamelidaceae*). Малочисленное сем. кустарныхъ или низкорослыхъ древесныхъ породъ изъ умеренныхъ и тропическихъ поясовъ Азии, Южн. Африки и Сѣв. Америки. Родовъ 15, видовъ 30. Сюда относятся: Букиндія, Гаммелисъ, Карлионисъ и Ликвидамбаръ.

**ДВОИТЬ** землю. Пахать или выкапывать землю дважды, — вдоль и поперекъ.

**ДВУДОЛЬНЫЯ** рр. Тоже, что двусѣменоходныя.

**ДВУЛѢТНИЙ**. Двугодовой, полное развитіе котораго совершается въ два лѣта, отъ исхода изъ сѣмени до вызрѣванія плода; въ первый годъ растеніе растетъ, а во второй цвѣтетъ, даетъ плодъ и умираетъ. Выносилвыя двулѣтнія рр. высѣваются на воздухъ въ июль и остаются на зиму въ грунтъ; полувывосилвыя высѣваются тамъ-же, но зимуютъ въ защитѣ отъ мороза, а летомъ высаживаются на воздухъ.

**ДВУМУЖІЕ**. Двучичниковые цвѣты.

**ДВУПЕРИСТЫЙ**. Съ двукратными перышками, — палистями.

**ДВУПЕРИСТОРАЗСѢЧЕННЫЙ**. Когда и первичные и вторичные сегменты раздѣлены, но не до самаго низу.

**ДВУПЛОДНЫЙ**. Далошій въ годъ два плода.

**ДВУПОЛЫЙ**. Соединяющій въ себѣ тычинки и пестики, тоже, что гермафродитъ.

**ДВУСОИЛІЕ**. Съ четырьмя тычинками, изъ которыхъ двѣ выше, длиннѣе.

**ДВУСКАТНЫЙ**. О крышѣ, устроенной на два ската, — въ два шара. Теплицы съ двускатными крышами ставятся одной стороной на востокъ, другой—на западъ.

**ДВУСЪМЕНОДОЛЬНЫЯ** или **ДВУДОЛЬНЫЯ** рр. Одинъ изъ двухъ большихъ отдѣловъ, на которые раздѣляютъ явнотѣтныя растенія. Главнѣйшіе признаки ихъ—слѣдующіе: части цвѣтовъ четверныя или пятерныя; зародышъ съ супротивными или кольчатыми сѣменодольми; листья обычно съ вѣтвящимися жилками; стебель съ корою, сердцевинной и древесной между ними; древесныя породы увеличиваются въ ширину слоемъ древесины, отлагаемымъ снаружи прежней, а коры—слоемъ, образующимся на внутренней сторонѣ прежней коры.

**ДВУЦВѢТКОВЫЙ** **ДВУЦВѢТОЧНЫЙ**. Обо двухъ цвѣткахъ, съ двумя цвѣтками.

**ДВУЦВѢТНЫЙ**. Имѣющій двойную окраску.

**ДѢВІЯ** (*Devua*). Сэръ Г. *Деву* (*Davy*), знаменитый химикъ. С. черноустовыхъ. Этотъ родъ называется нынѣ *Меріанія*.

**ДЕГЕРЕНІЯ** (*Deherainea*). Пьеръ Поль *Дегеренъ* (*Deherain*) — французскій естествоиспытатель. С. миреновыхъ. (1). Мексика. Теплич. кустъ. Песчан. дернов. съ волокнист. торф. Черенками съ вызрѣвшимъ въ песокъ, въ разводч. парникѣ.

**Д. смарагдина** (*D. smaragdina*, изумрудная). Мексика. Цв. зеленые, лл. продолговато-ланцетовидные. 3 ф. Сип. *Теофраста смарагдина* (*Theophrasta smaragdina*).

**ДѢГОТЬ**. Смолистая, пригорѣлая жидкость, выгоняемая огнемъ. Высшая разбора—*чистый*, низшаго—*черный*, *корчажнѣй*.

**ДЕЙЦІЯ** (*Deutzia*). Иоганъ *Дейцъ* (*Deutz*)—голландскій натуралистъ, пріятель Тунберга. С. камеломковыхъ. (7). Гималаи, С. Китай, Японія. Глин. дерн. съ небольшимъ количествомъ песку. Полувывос., а въ умеренномъ климатѣ вынос. куст. рр. Черенками.

**Д. грацилис** (*D. gracilis*, изящная). Японія. Цв. белые, въ апрѣлѣ 1—2 ф. **Д. крената** (*D. crenata*, съ кругозубчатыми лл.). Японія. Цв. белые. 4—8 ф. Сип. **Д. скабра** и **Д. Форчуна** (*D. scabra*, *D. Fortunei*). Имѣетъ разновидности *флоре-плена*

(*more-pleno*) съ белыми махровыми и *purpurea-plena* (*purpurea-plena*) съ свѣтло-малиновыми махровыми же цвѣтами. Р. это хорошо выгоняется къ раннему цвѣтенію.

**ДЕКАВЕЛОНЕ** (*Decabelone*). *Дека* — десять и *belone* — игла, по десяти отроскамъ снаружи вѣтчика. С. ласточниковыхъ. (3). Южн. Африка, Ангола. Оранж. многолѣтн. сочныя рр. Песчан. дернов. съ черенками; поливка жидкимъ удобрениемъ во время роста. Черенками весной, предварительно низу обсушенными. Тмп. летомъ 13—21, зимой 4—8°.

**Д. Баркли** (*D. Barklyi*, Баркли). По Оранжевой рѣкѣ. Цв. желтоватые съ кроваво-красными пятнами. 6 д.

**ДЕКАЙНЕА** (*Decaisnea*). Жозефъ *Декайне* (*Decaisne*) — бывш. директоромъ парижскаго *Jardin des Plantes*; † 1882. С. барбарисовыхъ. (1). Гималаи. Глин. дерн. Съеменами или черенками, въ парникѣ.

**Д. инсигнис** (*D. insignis*, замѣчательная). Сиккимъ-Гималаи, на значительной высотѣ. Цв. зеленоватые, безъ лепестковъ, въ маѣ; плоды съдомые. 8 ф. Приморозный кустъ.

**ДЕКСТРОЗЪ** или **ВИНОГРАДНЫЙ САХАРЪ**. Углеводъ, образующійся въ растеніяхъ, вѣроятно, изъ тростниковаго сахара.

**ДЕКУМАРІЯ** (*Decumaria*). *Декума* — десятый, по десятичному числу цвѣточ. частей. С. камеломковыхъ. (1). Каролина, до Флориды. Вышея р. Легкая сильная з. Черенками, летомъ, подъ стекломъ, въ затѣненіи. Близка къ Филadelphusъ.

**Д. барбара** (*D. barbara*, дикая). Южн. Соедин. амер. Штаты. Цв. белые съ приятнымъ запахомъ, въ июлѣ. Сип. **Д. сарментоза** (*D. sarmentosa*).

**ДЕЛАВѢШЕА** (*Delabachea*). *Делавешъ* (*De la Beche*) — извѣстный англійскій геологъ. С. стеркулиевыхъ. Родъ нынѣ отнесенъ къ *Стеркуліи*.

**ДѢЛЕА** (*Dalea*). С. *Даль* (*Dale*) — англійскій ботаникъ. С. бобовыхъ. (90). Америка. Оранж. травян. или кустарн. рр. Песоч. дерн. съ волоки. Глин. дерн. и пескомъ. Съеменами и черенками изъ полурѣзго роста, подъ стекломъ. Темп. зимой 3—7°.

**Д. алопекуroidесъ** (*D. alopecuroides*, батлачниковая). Соед. Штаты. Цв. блѣловатые, летомъ. 1—2 ф. Однол. **Д. мутабилис** (*D. mutabilis*, измѣнчивая). Мексика. Цв. вначалѣ белые, но потомъ фиолетовые, въ октябрѣ. 1½ ф. Многол. Сип. **Д. биколоръ** (*D. bicolor*).

**ДЕЛИМА** (*Delima*). *Делимо* — гладить, полировать; по жесткимъ листьямъ, упо-

требляемымъ для полировки. (1). Троп. Азия. Теплич. куст. Смѣсь глин. дернов. съ волокнист. торф., въ которомъ количествомъ песку и дрес. угля. Черенками изъ молодого роста въ песокъ, въ разводч. парникѣ, въ апрѣлѣ. Темп. летомъ 13—24, зимой 8—10°.

**Д. сарментоза** (*D. sarmentosa*, цѣпкал). Цв. белые, лл. широко-ланцетов.

**ДЕЛОСТОМА** (*Delostoma*). *Delos* — явственный и *stoma* — ротъ, по широко-раскрытымъ цв. С. бипоній. (4). Колумбія и Перу. Уходъ, какъ за Бишоніа.

**Д. денгату** (*D. dentatum*, зубчатый). Перу. Цв. крупные, голубые, въ октябрѣ.

**ДЕЛЬФИНІУМЪ** (*Delphinium*). Название заимствовано у Dioscorida. С. лютиковыхъ. (40). Умѣр. страны. Одно-, дву- и многол. воздуш. рр. Глубоко перекопанная, удобренная. Съеменами въ грунтъ, весной; многол. — дѣленіемъ весной и осенью.

**Д. аяцисъ** (*D. Ajacis*, Аяковъ). *Риттершоры*, *Кавамерскія горы*. З. Европа. Цв. голубые, пурпуровые и белые разныхъ оттѣнковъ, летомъ. 1—1½ ф. На лепесткахъ ясное изображеніе буквъ А, I, А. Имѣетъ махровыя формы. **Д. азуреумъ** (*D. azureum*, лазурный). С.-З. Америка. Цв. лазурные, въ июлѣ. 3 ф. **Д. грандифлорумъ** (*D. grandiflorum*, крупнотѣтны). Сибирь. Цв. голубые, простые или махровые, въ июлѣ. 1—2 ф. Имѣетъ много разновидностей, между прочими: *альбумъ*, *пальмидумъ*, *рубрумъ*, *синевисъ* (*album*, *pallidum*, *rubrum*, *sinensis*). **Д. дазикарпумъ** (*D. dasycarpum*, съ пушистыми плодами). Кавказъ. Цв. голубые съ темно-корич. лепестками, въ июлѣ. 4—6 ф. **Д. кардинале** (*D. cardinale*, кардинальскій). Калифорнія. Цв. ярко-шарлаховые съ желтымъ краемъ у лепестковъ, въ августѣ. 3—4 ф. **Д. кашмиріанумъ** (*D. cashmirianum*, кашмирскій). Кашмиръ. Цв. голубые, въ июлѣ. 1—1½. **Д. нудикауле** (*D. nudicaule*, съ голымъ стеблемъ). Калифорнія. Цв. красные съ желтыми лл., летомъ, 10—18 д. **Д. формозумъ** (*D. formosum*, великолѣпный). Востокъ. Цв. голубые, летомъ. 1½—3 ф.

**ДЕЛАВРЕА** (*Delarbrea*). *Делабрѣ* (*Delabre*) — французскій натуралистъ. С. аралиевыхъ. (2). Нов. Каледонія. Теплич. кустарн. рр. Уходъ, какъ за Аралія.

**Д. спектабилис** (*D. spectabilis*, замѣчательная). Лл. неравномерно перистые; перья лопастины и зубчатые, стебель пятичлѣстный. Сип. *Аралія спектабилис* и *А. конциппа*. (*Aralia spectabilis*, *A. concinna*).

**ДЕМІЯ** (*Daemia*). Мѣстное арабское названіе. С. ласточниковыхъ. (6). Троп. Азия и Африка. Теплич. вьющаяся рр.



Волокн. торф. съ глин. дерн. и нѣкоторымъ количествомъ песку. Черенками изъ боковыхъ вѣтокъ, въ песокъ, въ разводч. парничкѣ. Темп. лѣтомъ 13—24, зимой 8—10°.

**Д. экстенза** (*D. extensa*, распростертая). Остиндія. Цв. съ рѣснчатымъ вѣнчикомъ, въ июлѣ. 3 ф. Син. *Raphistemma ciliatum* (*Raphistemma ciliatum*).

**ДЕМОНОРОПСЪ** (*Daemonorops*). Происхождение неясное. С. пальмъ. Родъ, причисляемый нынѣ къ Каламусъ, такой же культуры.

**Д. меланохетесъ** (*D. melanochaetes*, съ черными колочками). Малайск. архипелагъ. Лл. перистые съ черенками, усеченными острыми колочками. 150 ф. **Д. палебанникусъ** (*D. palembanicus*, изъ Палебанга). Суматра. Лл. перистые, на нижней сторонѣ имѣющие колочки; молодые — ярко-коричневые. **Д. періакантусъ** (*D. pericanthus*, съ комочками, расположенными кольцами). Суматра. Лл. широко-овальные, перистые; колочки расположены кольцами. **Д. плюмоусъ** (*D. plumosus*, перистый). Индія. Лл. темнозеленые, действительно перистые, съ черенками, густо покрытыми колочками, у которыхъ концы черные, а основанія бѣлые.

**ДЕНДРОБИУМЪ** (*Dendrobium*). *Dendron* — дерево и *bios* — жить, въ означеніе того, что рр. эти — эпифиты. С. орхидей. (300). Тропич. страны, Малайскій архип. Эпифитныя тепличныя и оранжер. орхидеи. Волокн. торф. съ нѣсколькими черенками кладется въ горшокъ и въ ней утверждаются рр. Или въ развѣр. горшка вырѣзается дубовая чурка, къ ней привязывается р. и промежутки наполняются упомянутою смѣсью. Этимъ предупреждается застой влажности. Темп. во время роста 13—25, во время покоя 10—13° для тепл. и ниже — для оранж. видовъ.

**Д. агрегатумъ** (*D. aggregatum*, скупенный). С. Индія. Цв. темно-желтые, въ мартъ до мая. Оранж. **Д. Афродите** (*D. Aphrodite*, Афродитовый). Мульмейнъ. Цв. желто-янтарные, губа оранжевая, въ июлѣ. Оранж. Син. **Д. нодатумъ** (*D. podatum*). **Д. ауреумъ** (*D. aureum*, золотистый). Индія. Цв. желтые, на губѣ коричневые и пурпуровые пятнышки, въ февралѣ. Син. **Д. хетерокарпумъ** (*D. heterocarpum*). **Д. Бенсоніе** (*D. Bensoniae*, Бенсона). Бурма. Цв. бѣлые, на губѣ оранжевое пятно, въ май — июнь. Оранж. **Д. бигибумъ** (*D. bigibbum*, съ двумя шпорцами). Куинслендъ. Цв. ярко-розовые, въ сентябрь — октябрь. Оранж. **Д. Воксалліи** (*D. Vochalii*, Воксали). Мульмейнъ. Цв. бѣлые, съ пурпуровыми кончиками, губа съ желтымъ пят-

номъ, въ февралѣ — мартъ. Тепл. **Д. Бримеріанумъ** (*D. Brumerianum*, Бримеровъ). Бурма. Цв. желтые, въ мартъ — апрѣль. Тепл. **Д. Вардіанумъ** (*D. Wardianum*, Вардовскій). Ассамъ. Цв. бѣлые, вверху розово-малиновые, губа внизу оранжевая съ двумя розово-малиновыми пятнышками, въ май. Тепл. **Д. гратіозиссимумъ** (*D. gratiosissimum*, прелестнѣйшій). Мульмейнъ. Цв. бѣлые съ розовыми отливомъ и кончиками, губа съ желтымъ пятномъ, Тепл. Син. **Д. Буллеріанумъ** (*D. Bullerianum*). **Д. Дальгоузіанумъ** (*D. Dalhousianum*, леди Дальгоуза). Индія. Цв. желтые, темные, губа съ двумя темно-малиновыми пятнами, въ апрѣль — май. Тепл. **Д. денсифлорумъ** (*D. densiflorum*, густоцвѣтный). Индія. Цв. желтые, губа оранжевая, въ апрѣль — май. Тепл. **Д. Девоніанумъ** (*D. Devonianum*, Девона). Остиндія. Цв. бѣлые съ розовыми кончиками, губа съ такимъ же ободкомъ и оранжевыми внизу пятнышками, въ мартъ — апрѣль. Тепл. **Д. Драконисъ** (*D. Dracopis*, драценовый). Мульмейнъ. Цв. бѣлые, у губы низъ розовый. Тепл. Син. **Д. Эбурнеумъ** (*D. eburneum*). **Д. Женкинсіи** (*D. Jenkinsii*, Женкинса). С. Индія. Цв. бѣло-охристые, съ желтыми краями, въ мартъ — апрѣль. Оранж. **Д. кариниферумъ** (*D. cariniferum*, съ килемъ). Бурма. Цв. бѣлые съ желтыми кончиками, губа съ краснымъ гребешкомъ, въ апрѣль. Оранж. **Д. Кингіанумъ** (*D. Kingianum*, Кинга). Куинслендъ и Нов. Юж. Валлисъ. Цв. фиолетово-пурпуровые, въ февралѣ. Оранж. **Д. клаватумъ** (*D. clavatum*, булаваебный). Ассамъ. Цв. ярко-желтые, на губѣ малиновое пятно, лѣтомъ. Тепл. **Д. крассинодъ** (*D. crassinode*, съ толстыми колѣнами). Бурма. Цв. бѣлые съ пурпуровыми черточками, губа съ оранжевымъ пятномъ, въ февралѣ — мартъ. Тепл. **Д. кристаллиноумъ** (*D. crystallinum*, хрустальный). Бурма. Цв. бѣлые съ розовыми и пурпуровыми кончиками, губа съ желтымъ пятномъ и пурпуровыми черточками, лѣтомъ. Тепл. **Д. Линавіанумъ** (*D. Linawianum*, Линава). Китай. Цв. бѣло-розовые, губа съ малиновыми кончиками, зимой. Оранж. **Д. литуифлорумъ** (*D. lituiflorum*, съ трубчатými цв.). Остиндія. Цв. розово-пурпуровые, губа бѣлая, въ апрѣль. Тепл. **Д. лютеолумъ** (*D. luteolum*, желтоватый). Мульмейнъ. Цв. желтые какъ медь, съ оранжевою губою, въ мартъ. Оранж. **Д. Макъ-Картіе** (*D. Mac Carthiae*, Макъ-Карта). Цейлонъ. Цв. сине-вышневые, губа свѣтлая, иногда бѣлая, въ июнь. Не ниже 10° во время покоя. **Д. макрофиллюмъ** (*D. macrophyllum*, крупнолистный). Филиппинскіе о. Цв. зеленовато-желтые, губа съ пурпуровыми крапинками и черточками, Тепл. **Д. монолиформе** (*D. monoliforme*,

четочный). Китай и Японія. Цв. бѣлые съ пурпуровыми пятнами на губѣ, въ май, превосходно пахнущіе. Оранж. **Д. нобиле** (*D. nobile*, благородный). Китай. Цв. крупные, бѣлые съ розовыми кончиками, губа впереди розово-малиновая, внизу темно-карминовая, съ января до апрѣля. Оранж. **Д. Парішии** (*D. Parishii*, Парина). Мульмейнъ. Цв. розово-пурпуровые, губа розовая съ двумя пурпуровыми пятнами. Тепл. **Д. Пьерардіи** (*D. Pierardii*, Пьерара). Остиндія. Цв. бѣлые или нѣжно-малиновые, губа желтая съ пурпуровыми черточками у основанія. Зимой. Оранж. **Д. примулиноумъ** (*D. primulinum*, первоцвѣтный). Мульмейнъ. Цв. свѣтло-малиновые, губа бѣлая съ голубымъ отливкомъ, въ февралѣ и мартъ. Оранж. **Д. пульхеллумъ** (*D. pulchellum*, красивый). Свѣ. Индія. Цв. розоватые, губа розовая съ оранжевымъ основаніемъ, въ мартъ. Тепл. **Д. сангвинолентумъ** (*D. sanguinolentum*, съ кроваво-краснымъ отливкомъ). Цейлонъ. Цв. желтые съ розовыми жилками и пурпуровыми кончиками, губа бѣлая съ пурпуровыми пятнами. Тепл. **Д. скабрилинге** (*D. scabrilingue*, жестко-язычный). Бурма. Цв. зеленоватые, мѣняющіеся въ бѣлые, но губа зеленоватая съ желтымъ и оранжевыми полосками, весной. Тепл. **Д. специозумъ** (*D. speciosum*, красивый). Вост. Австралія. Цв. бѣлые или желтоватые, губа съ черными крапинками, осенью. Оранж. **Д. суависсимумъ** (*D. suavisissimum*, очень хорошо пахнущій). Бурма. Цв. ярко-желтые, губа съ коричнево-пурпуровымъ пятномъ, въ июнь. Тепл. **Д. супербиенсъ** (*D. superbiens*, превосходный). С. Австралія. Цв. свѣтло-пурпуровые съ коричневымъ отливкомъ, осенью. Тепл. **Д. транспаренсъ** (*D. transparens*, прозрачный). Ассамъ. Цв. бѣлые, прозрачные съ пурпуровыми кончиками, губа съ темно-карминовымъ пятномъ, обведеннымъ желтымъ, въ мартъ. Тепл. **Д. Фальконеріи** (*D. Falconeri*, Фальконера). Индія. Цв. бѣлые съ пурпуровыми кончиками, губа съ пурпуровымъ пятномъ, въ май. Тепл. **Д. Фармера** (*D. Farmeri*, Фармера). Индія. Цв. бѣдно-палевые, губа золотисто-желтая, въ май. Тепл. **Д. хризантумъ** (*D. chrysanthum*, съ золотистыми цв.). Непаль. Цв. ярко-желтые, губа бахромчатая съ карминовымъ пятномъ, въ сентябрь. Оранж. **Д. хризотисъ** (*D. chrisotia*, золотистый). Ассамъ. Цв. золотисто-желтые, губа оранжевая съ двумя пурпуровыми пятнами, лѣтомъ. Тепл. **Д. хсантофлебиумъ** (*D. xanthophlebium*, съ желтыми жилками). Мульмейнъ. Цв. бѣлые, губа съ оранжевымъ пятномъ. Тепл.

Кромѣ приведенныхъ видовъ есть много красивыхъ разновидностей и гибридовъ. Изъ послѣднихъ лучшими считаются *Айне-*

*аврели*, *Лукіанумъ* и *эндочарисъ* (*Ainsworthii*, *Leechianum* et *endocharis*).

**ДЕНДРОМЕКОНЪ** (*Dendromecon*). *Dendron* — дерево, *mekon* — макъ, по цв., похожимъ на макъ, растущій на деревь. С. маковыхъ. (1). Калифорнія. Кустар. р. Сильная глин. дерн. рыхлая. Черенками и сѣменами.

**Д. ригида** (*D. rigida*, жесткій). Калифорнія. Цв. желтые, въ июнь.

**ДЕНДРОПАНАКСЪ** (*Dendropanax*). *Dendron* — дерево: древесный папанаксъ. С. аралиевыхъ. (20). Троп. Америка, Азія, Японія, Китай. Тепл. лѣств. рр. Песчан. дернов. съ волокн. торф. Черенками изъ молодого роста весной и лѣтомъ.

**Д. аргентеусъ** (*D. argenteus*, серебристый). Бразилія. Цв. очередные, продолговатые, на верхней сторонѣ серебристые съ зелеными жилками, нижняя сторона пурпуровая, стебель съ пятнами.

**ДЕНДРОСЕРИСЪ** (*Dendroseris*). *Dendron* — дерево, *seris* — родъ эндивія; по древесному росту и листьямъ похожимъ на эндивію. С. сложноцвѣтныхъ. (7). Хуанъ-Фернандецъ. Оранж. древ. рр. Сильная глин. дерн. Сѣменами. Темп. лѣтомъ 11—15, зимой 6—10°.

**Д. макрофилля** (*D. macrophylla*, крупнолистный). Цв. головки темно-оранжевые, лѣтомъ. 10 ф.

**ДЕНДРОХИЛЮМЪ** (*Dendrochilum*). *Dendron* — дерево и *cheilos* — губа; цв. имѣютъ губу и растутъ на деревьяхъ. С. орхидей. (3). Малакка, Малайск. архип., Филипп. ос. Уходъ, какъ за Дендробіумъ.

**Д. глумасеумъ** (*D. glumaceum*, пленчатый). Филиппинскіе о. Цв. бѣловатые, душистые, весной. Тепл. **Д. филиформе** (*D. filiforme*, нитевидный). Манилла. Цв. зеленовато-желтые, въ июнь, июль. Тепл.

**ДЕНДРОЛОГІЯ**. Ученіе о деревьяхъ и кустарникахъ растеній.

**ДЕНДРОМЕТРЪ**. Снарядъ для измѣренія деревь на корню, — въ вышину и толщину. Лѣсомѣръ.

**ДЕННОЙ. ДНЕВНОЙ**. Бывающій въ теченіе дня. Растеніе, цвѣтущее днемъ и свѣтлѣющее свои цвѣты вечеромъ.

**ДЕНТАРИЯ** (*Dentaria*). *Dens* — зубъ; по корнямъ. С. крестоцвѣтныхъ. (10). Европа, Азія. Красивая, выносливая многол. трава. рр. Легкая, сильная земля при влажномъ положеніи. Сѣменами и дѣленіемъ.

**Д. дигитата** (*D. digitata*, пальцеобразная). Юж. Европа. Цв. ярко-пурпуровые, въ май. 1½ ф. **Д. дифилля** (*D. diphylla*, двулистная). С. Америка. Цв. бѣлые внутри, пурпуровые снаружи, въ май. 6 д. до



1 ф. Д. полифилла (D. polyphylla, многолистная). Венгрия. Цв. молочно-белые, крупные, в мае. 1 ф.

**ДЕНЬ.** Время от восхода до заката солнца. Сутки.

**ДЕПАРИЯ** (Derapia). *Derap* — чашка, по формѣ обертки. С. папоротниковъ. (6). Перу, Нов. Гренада, Сандвич. о. Тепл. пр.

**Д. концинна** (D. concinna, чистая). Перу. Ван двуперистый. Син. *Д. Метьюзи* (D. Matthewsii). **Д. пролифера** (D. prolifera, перерослая). Сандвич. о., Валлисъ. Ван перистый. Син. *Д. Макрей* (D. Macraei).

**ДЕПРЕА** (Deprea). *Депре* (Depre) — коллекторъ мексиканскихъ пр. С. мареновыхъ пр. Уходъ, какъ за Бувардія.

**Д. эритрохиза** (D. erythrorhiza, съ красными корнями). Цв. желтые. 1—3 ф.

**ДЕРЕВО.** Многолѣтнее растеніе съ высокимъ твердымъ стволомъ, отъ котораго идутъ вѣтви. Это самое крупное и рослое растеніе, которое выгоняетъ отъ корня одинъ пенъ или лѣсину и состоитъ изъ древесины (древесныхъ волоконъ), придающей ему плотность и крѣпость.

**ДЕРЕВЦО.** Дерево съ короткимъ стволомъ, дѣлящимся на сучья.

**ДЕРЕВЯНИСТЫЙ.** Состоящій частью изъ древесины.

**ДЕРЕЗА.** См. Карагана.

**ДЕРЕНОВЫЯ** пр. (cornaceae или corneae). Небольшое сем. изъ древесныхъ и кустарниковъ, рѣдко травянистыхъ пр. Цвѣты махучечными или угловатыми зонтиками или головками. Листья супротивные или очередные, безъ прилистниковъ. Содержитъ около 20 родовъ, изъ которыхъ наиболѣе извѣстны въ садахъ Аукуба, Гаррія и Корнусъ.

**ДЕРЕНЪ.** См. Корнусъ.

**ДЕРНОВАЯ ЗЕМЛЯ.** Приготовленная изъ перепрѣвшаго дерна.

**ДЕРНИЩЕ.** **ДЕРНОВИЩЕ.** Мѣсто, съ котораго снятъ дернъ.

**ДЕРНОРѢЗЪ.** Снарядъ для рѣзки и подъема дерну.

**ДЕРНЪ.** **ДЕРНОВИНА.** **ДЕРНО.** **ДЕРНЬЕ.** Верхній слой почвы, густо заросшій злакомъ.

**ДЕСЕРТНЫЙ ПЛОДЪ.** Употребляемый въ пищу въ сыромъ, естественномъ видѣ.

**ДЕСМАНТУСЪ.** (Desmanthus). *Desma* — пучекъ и *anthos* — цвѣтокъ, по расположенію цв. С. бобовыхъ. (8). Сѣв. и южн. Америка. Тепл. полукуст. и куст. пр., весьма рѣдко встрѣчаемы въ садахъ.

**ДЕСМОДИУМЪ** (Desmodium).

*Desmos* — пучокъ, по тычинкамъ. С. бобовыхъ. (125). Жаркія страны. Полукуст. и кустарн. теплич. и оранж. пр. Смѣсь песчан. дернов. съ торф. Черенками въ развод. парничкѣ и сѣменами.

**Д. гирансъ** (D. gyrans, поверточный), *закрутъ*. Остиндія. Цв. фиолетовые, въ іюль. 1—3 ф. Лл. тройчатые, у котор. два супротивные листочка движутся: когда одинъ вверхъ, то другой внизъ. **Д. канадѣнзе** (D. canadense, канадскій). С. Америка. Цв. красно-пурпуровые, въ іюль. 4—6 ф.

**ДЕСМОНКУСЪ** (Desmoncus). *Desmos* — пучекъ и *onkos* — крюкъ, ребра лл. оканчиваются согнутыми остриями. С. пальмъ. (25). Троп. Америка. Тепл. пальм. Песч. глин. дерн. Сѣменами въ парничкѣ. Темп. — лѣтомъ 14—24, зимой 10—13°.

**Д. гранатѣнзисъ** (D. granatensis, изъ Нов. Гренады). Колумбія. Лл. съ двумя парами перистыхъ листочковъ. **Д. миноръ** (D. minor, меньшій). Вестиндія. Лл. перистые, до 20 сегментовъ.

**ДЕФОНТЕНЕА** (Desfontainea). *Дефонтанъ* (Desfontaines) — знаменитый француз. ботаникъ, † 1833. С. логаніевыхъ. (1). Анды чилийскія и новогренадскія. Оранж. кустъ. Глин. дерн. съ торф. Черенками на тепловатомъ грунтѣ.

**Д. спиноза** (D. spinosa, колючая). Цв. шарлаховые съ желтымъ краемъ, въ августѣ. 3 ф.

**ДЕЯНИКОВЫЯ** пр. (fiscoides и mesembryanthemeae). Обширное (около 450 видовъ) сем. растений, разселенныхъ по тропическому и жаркому поясамъ; это — низкорослыя кустарники, полукустарники и травянистыя пр. Наиболѣе извѣстны роды Мезембриантемумъ и Тетрагонія.

**ДЖАКСОНІЯ** (Jacksonia). *Д. Джексона* (Jackson) — шотландскій ботаникъ. С. бобовыхъ. (28). Австралія. Оранж. безлистный кустар. или полукуст. пр. Торф. съ глин. дерн. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ песокъ, подъ стекломъ, въ апрѣлѣ.

**Д. скопарія** (J. scoraria, похожая на дереву). Цв. желтые. 2—6 ф. Древесное р.

**ДЖЕМСІЯ** (Jamesia). *Д-ръ Эдвинъ Джексъ* (James), американскій ботаникъ — нашелъ это растеніе первый. С. камнеломковыхъ. (1). Колорадо, Скалистыя горы. Вынос. или полувын. кустарникъ. Обыкн. садов. Сѣменами или черенками изъ зрѣлаго роста, въ песков. глин. дерн.

**Д. американа** (J. americana, американская). Цв. белые, въ іюль.

**ДЖЕМСОНІЯ** (Jamesonia). *Д-ръ Уильямъ Джексонъ* (Jameson) — проф. ботаники въ Квинто. С. папоротниковыхъ. (1). Нов. Гренада до Перу на Андахъ. Оранжер. р.

**Д. имбриката** (J. imbricata, настельная). Ван въ 6—18 д. длиной и 2—3 д. шир., перистая.

**ДЖЕРДОНІЯ** (Jerdonia). *Хирургъ Жердонъ* (Jerdon) — знаменитый орнитологъ. С. геснерійныхъ. (1). Нейльгерійскія горы. Тепл. многол. трав. пр. Песков. глин. дерн. Сѣменами, въ теплѣ.

**Д. индіка** (J. indica, индійская). Цв. лилово-розовые, осенью. 3 д.

**ДЖЕФФЕРСОНІЯ** (Jeffersonia). *Джефферсонъ* (Jefferson) — бывший президентъ соед. ам. Штатовъ, † 1826. С. бербарисовыхъ. (2). Сѣв. Америка и Манчжурія. Вынос. многол. трав. пр. Песков. торф. Дѣленіемъ и сѣменами тотчасъ по созрѣванію.

**Д. дифилла** (J. diphylla, двулистная). Теннесси. Цв. белые съ желтыми тычинками, весной. 3—6 д.

**ДИГИТАЛИСЪ** (Digitalis). *Дигитъ* — палець, по цвѣтамъ. С. поричниковыхъ. (18). Европа, С. Африка, З. Азія. Вынос. двулѣтн. и многол. пр. Обыкновен. садовая. Сѣменами.

**Д. амбигуа** (D. ambigua, двойкій). Европа. Цв. желтоватые съ коричневой сѣткой, въ іюль—августъ. 2—3 ф. Син. *Д. грандифлора* и *Д. охroleuca* (D. grandiflora, D. ochroleuca). Р. многол. **Д. пурпуреа** (purpurea, пурпуровый). *Патеростичная трава*. З. Европа. Цв. пурпуровые съ темными внутри крапинками, которые окружены белымъ, лѣтомъ. Имѣетъ разновидности съ белыми цв.

**ДИДИМОКАРПУСЪ** (Didymocarpus). *Didymos* — двойной и *karpos* — плодъ, по двойнымъ плодикамъ. С. геснерійныхъ. (58). Индія, Малайск. архип. Тепл. многол. трав. пр. Смѣсь изъ глин. дер. съ торф., сухимъ коровьимъ пометомъ и пескомъ. Черенками изъ молодого роста въ песокъ, въ разводномъ парничкѣ. Темп. лѣтомъ 13—22, зимой 6—10°.

**Д. кринита** (D. crinita, волосатый). Пуло-Пенангъ. Цв. белые съ пурпуровымъ отблѣнкомъ, въ іюль. 1 ф. **Д. примулефолія** (D. primulaefolia, съ лл. примулы). Цейлонъ. Цв. лиловые, въ ноябрѣ. 3—6 д.

**ДИЗОКАКТУСЪ** (Disocactus). *Dis* — вдвое, *isos* — равный и *cactus* — кактусъ, лопестки и доли удвоенные. С. кактусовыхъ. Родъ этотъ соединяетъ нѣтъ съ Филокактусъ.

**ДИДИМОСПЕРМА** (Didymosperma). *Didymos* — двойной и *sperma* — сѣмя, по сѣменнымъ плодамъ. С. пальмъ. (6). Малайск. архип. Теплич. пальмы, требующія такого же ухода, какъ Арека.

**Д. панумъ** (D. panum, пѣжная). Ассамъ и Казія. Ван перистый, сверху зеленый,

на нижней сторонѣ сизый. Син. *Валлихія нана* (Wallichia nana).

**ДИДИМОХЛЕНА** (Didymochlaena). *Didymos* — двойной и *chlaina* — покровъ, по крышкамъ споровыхъ кучекъ. С. папоротниковыхъ. (1). Троп. страны. Теплич. папоротникъ. Темп. лѣтомъ 13—25, зимой 8—10°.

**Д. лунолата** (D. lunulata, полумѣсяцъ). Троп. Америка. Ван длинный (4—6 ф.), двуперистый. Син. *Аспидиумъ трукатумъ* (Aspidium truncatum).

**ДИЗА** (Disa). Происхождение названія неопредѣленное. С. орхидей. (50). Тропич. и южн. Африка, Маскаренскіе о. Оранж. земный. Глин. дерн. съ торф. и частью песку. Дѣленіемъ. Темп. — лѣтомъ 13—22, зимой 6—10°.

**Д. грандифлора** (D. grandiflora, крупноцвѣтная). Столовыя горы. Цв. свѣтло-розовые, шарлаховые и золотисто-желтые, въ іюль—іюль. 2—3 ф. **Д. мегацерасъ** (D. megaceras, съ большими рогами). Цв. белые съ пурпуровыми внутри пятнами, въ августѣ. 1—2 ф.

**ДИКІЙ.** Дикоростущій, состоящій въ природномъ видѣ, не воздѣланный человекомъ.

**ДИКІЙ ФИНИКЪ.** См. Диоспирозъ.

**ДИККІЯ** (Dyckia). Князь *Сальмъ-Дикъ* (Salm-Dyck) — нѣмецкій ботаникъ. С. бромелиевыхъ. (6). Бразилія. Оранж. сочные. Глин. дерн. 2 ч. и раст. перегной 1 ч. съ добавленіемъ песку. Отпрысками. **Д. аргентеа** (D. argentea, серебристая). Лл. длинные, розеткой, плотные, съ белыми чешуйками на обѣихъ сторонахъ.

**ДИКЛИПТЕРА** (Dieliptera). *Di-clis* — двойчатковый и *pteron* — крыло; по другѣмъ двойчатымъ крылатымъ плодикамъ. С. акантовыхъ (50). Троп. страны. Тепл. и оранж. одно- и многол. трав. пр., рѣдко встрѣчаемы въ садахъ, за исключеніемъ ботаническихъ.

**ДИКЛИТРА.** См. Дицентра.

**ДИКСОНІЯ** (Dicksonia) *Дж. Диксонъ* (Dickson) — англійскій ботаникъ. С. папоротниковыхъ. (40). Троп. Азія, Индія, Нов. Зеландія, Ю. Америка, Мадера, Азорскіе о. Тепл. и оранж., преимущественно американскіе и полинезійскіе, папоротники. Легкая волокна. Глин. дерн. поровну съ торф. и 1/2 ч. песку. Темп. лѣтомъ 12—21, зимой 7—10°.

**Д. антарктика** (D. antarctica, антарктическая). Ван ромбональные, трехперистыя. Древовидное оранж. р. **Д. Вертеброана** (D. Berteroana, Бертера). Хуан-Фернандесъ. Ван ромбональные, трехперистыя. Древовидное оранж. р. **Д. Менцизія** (D. Menziesii, Менциса). Сандвичевы



ос. Ван трехперистый. Теплич. *D. regalis* (*D. regalis*, царская). Мексика. Ван продолговато-дельтовидный, трехперистый. Древоидное, оранже. *D. Sellowiana* (*D. Sellowiana*, Селлова). Бразилия. Ван широко-ланцетовидный, двухперистый. Тепл. *D. fibrosa* (*D. fibrosa*, волокнистая). Новая Зеландия. Ван ромбoidalный, трехперистый. Древоидное, оранже. *D. chrysotricha* (*D. chrysotricha*, с золотистыми волосками). Ява. Ван двуперистый; средний черенок внизу с желтобурыми волосками. Древоид. тепл.

**ДИКТАМУСЪ** (*Dictamnus*). Название, взятое у Гипократа. *S. рутовых*. (1). Ю. Европа, Кавказ, С. Китай. Многол. трав. *p. 3*. Обыкн. Сѣменами, дѣленіемъ. *D. альбусъ* (*D. albus*, бѣлый). *Ассенизъ*. В. Европа, Азия. Цв. длинными кистями, свѣтло-пурпуровые съ бѣлыми жилками, въ маѣ—іюль. Сип. *D. Фраксинелла* (*D. Fraxinella*).

**ДИКТИАНТУСЪ** (*Dictyanthus*). *Dictyon*—сѣтка и *anthos*—цвѣтокъ, по росписи вѣдника. С. ласточниковыхъ. (4). Мексика. Красивый тепл. вьющийся *pp.* Уходъ какъ за Пассифлорой.

*D. Павонія* (*D. Pavonii*, Павона). Цв. бѣловатые, съ шпильками и жилками, въ сентябрѣ.

**ДИКТИОКСИФИУМЪ** (*Dictyoxiphium*). *Dictyon*—сѣтка и *xiphon*—мечъ, вав. мечевидный, съ жилками. С. папоротниковыхъ. (1). Троп. Америка. Теплол. папоротникъ.

*D. панамѣнзе* (*D. panamense*, панамскій). Троп. Америка. Ван широкія, низку съуживающіяся равномерно, цѣльныя.

**ДИКТИОСПЕРМА** (*Dictyosperma*). *Dictyon*—сѣтка и *sperma*—сѣмя; сѣмянная шелуха сѣтчатая. С. пальмъ. (4). Маскарекскіе о. Тепличныя пальмы. Уходъ какъ за Арекой.

*D. альбумъ* (*D. album*, бѣлая). О. Маврикія. Лл. длинныя, перистыя, съ черешками имѣющими бѣлый пушокъ. 30 ф. Сип. *Арека алба* (*Arecas alba*). *D. ауреумъ* (*D. aureum*, золотистая). Сейшельскіе о. Лл. перистыя съ длинными, вислыми перьями, черешки желтоватые. Сип. *Арека ауреа* (*Arecas aurea*).

**ДИЛВІНІЯ** (*Dillwynia*). Льюисъ Вестонъ *Дилвинъ* (*Dillwin*)—англійскій ботаникъ, изучавшій водоросли, † 1855. С. бобовыхъ. (10). Австралія. Оранже. куст. *pp.*, похожая на верески. Песчан. торф. 2 ч., волок. глин. дер. 1 ч. съ добавленіемъ песку и др. угля. Черенками и сѣменами. Темп. 10—19 лѣтомъ и 3—12 зимой.

*D. хиспида* (*D. hispida*, волосистая). Цв. темныя, красно-пурпуровыя, головками, въ

маѣ, 3—6 ф. Сип. *D. скабра* (*D. scabra*). *D. эрицифолія* (*D. ericifolia*, съ л. вереска). Цв. желтыя, въ маѣ. Имѣетъ нѣсколько разновидностей.

**ДИЛЬДЕНІЕВЫЯ** *pp.* (*dillenia-seae*). Довольно обширное сем. древесныхъ, кустарныхъ и полукустарныхъ травянистыхъ породъ, сродныхъ съ магноліевыми. Цв. бѣлые или желтыя, часто красныя, обоеполыя или многополыя, рѣдко двуполныя. Плодъ изъ 2—5 плодинокъ. Родовъ 7, видовъ 200, растущихъ преимущественно въ Австраліи, Индіи и Сѣв. Америкѣ. Нѣкот. даютъ большіе древесные стволы, др. производятъ плоды. Изъ родовъ наиболѣе извѣстны: Делима, Дилленія, Кандольеа и Тетратека.

**ДИЛЛЕНІЯ** (*Dillenia*). *Дилленіусъ* (*Dillenius*), профессоръ ботаники оксфордскаго университета. С. дилленіевыхъ. (9). Троп. Азия. Теплич. куст. и древесн. *pp.* Легкая песчанистая глин. дерн. Сѣменами и черенками изъ полужрѣлаго роста, въ разводочномъ парничкѣ. Темп. лѣтомъ 13—26, зимой 7—10°.

*D. пентагіна* (*D. pentagyna*, съ пятью плодиками). Индія. Цв. желтыя, въ мартѣ. 20 ф. Сип. *Кольбертія коромандельна* (*Colbertia coromandelina*). *D. скабрелла* (*D. scabrella*, жестковатая). Ассамъ и Силхетъ. Цв. желтыя, душистыя. Раскидистый куст. *D. спеціоза* (*D. speciosa*, отменная). Ост-индія. Цв. бѣлые, 40 ф.

**ДИЛАТРИСЪ** (*Dilatris*). *Dilata*—расширять; по отверстымъ цв. С. кровяниковыхъ. (2). Мысъ Добр. Над. Оранже. трав. *pp.* Уходъ какъ за Ангиоцантусъ. Темп.—лѣтомъ 10—20, зимой 3—6°.

*D. вискоза* (*D. viscosa*, липкій). Цв. голубые. 9 л. *D. коримбоза* (*D. corimbosa*, щитковый). Цв. пурпуровые. 1 ф.

**ДИМОРФАНТУСЪ** (*Dimorphanthus*). *Dimorphos*—о двухъ формахъ, потому что цв. бываютъ полныя и неполныя. С. аралиевыхъ. Родъ этотъ теперь соединенъ съ Араліей и *pp.*, къ нему относящіяся, нуждаются въ такомъ же уходѣ, какъ Аралія.

*D. манджурікусъ* (*D. mandschuricus*, манчжурскій). Манчжурія. Лл. 3—5 ф. длинной и такой же почти ширины, двуперистые, пушистыя и колочіе. 6—10 ф.

**ДИМОРФОТЭКА** (*Dimorphotheca*). *Dimorphos*—о двухъ формахъ, *theca*—цв. ложе; дисковые цв. двухъ формъ. С. сложноцвѣтныхъ. (20). Ю. Африка. Однол. многол. полувыносл., либо оранже. *pp.* Глин. дерн. Однол.—сѣменами, въ тепломъ мѣстѣ, потомъ посадить въ маѣ на воздухъ; многол. черенками.

*D. грамнифолія* (*D. graminifolia*, съ

лл. какъ у злака). Цв. головки большія, лучев. пв. бѣлые на верхней и буро-оранжевыя на нижней сторонѣ, дисковые—темно-пурпуровые, въ маѣ, 1—2 ф. Сип. *Календула грамнифолія* (*Calendula graminifolia*). *D. Трагусъ* (*D. Tragus*, Трагусъ). Цв. бѣлые съ пурпуровымъ, распускающіеся утромъ и свертывающіеся вечеромъ, въ маѣ, іюль. 2 ф. Сип. *Календула Трагусъ* (*Calendula Tragus*). *D. хризантемифолія* (*D. chrysanthemifolia*, съ лл. какъ у Хризанты). Цв. головки крупныя, желтыя, раскрывающіяся около 11 ч. утра и свертывающіяся около 3 ч. по полудни, въ маѣ, іюль. 2 ф. Сип. *Календула хризантемифолія* (*Calendula chrysanthemifolia*).

**ДИПКАДИ** (*Dipsadi*). Происхожденіе неясно. С. лилейныхъ. (20). Ю. Европа, троп. и южн. Африка, Остиндія. Полувыносл. луков. *pp.* Сѣсь изъ легкой глин. дерн. съ листов. Отпрысками, весной.

*D. серотина* (*D. serotina*, поздно цвѣтущая). Испанія. Цв. кантеновые, въ іюль. 9 дюйм.

**ДИПЛОЛЕНА** (*Diplolaena*). *Diplos*—двойной и *laena*—покрывъ, по покрову плода. С. рутовыхъ. (4). Ю.-З. Австралія. Оранже. куст. Торф. съ добавленіемъ глин. дерн. Черенками изъ молодого роста. Темп. лѣтомъ 10—20, зимой 3—6°.

*D. грандифлора* (*D. grandiflora*, крупноцвѣтная). Цв. головки желтыя, въ апрѣлѣ. 4—5 ф.

**ДИПЛОПАПУСЪ** (*Diplorappus*). Въ настоящее время родъ этотъ соединенъ съ Астеромъ.

**ДИПЛОТЕМИУМЪ** (*Diplothemium*). *Diplos*—двойной и *thema*—влагище. С. пальмъ. (5). Бразилія. Теплич. *pp.* Сильной гл. дер. 2 части, торф. 1 ч. и песку 1 ч. Сѣменами. Темп. лѣтомъ 13—26, зимой 8—13°.

*D. каудесценсъ* (*D. caudescens*, со стеблемъ). Лл. перистыя, длиною до 2 ф., темно-зеленыя на верхней, серебристо-бѣлыя на нижней сторонѣ. Сип. *Цероксилонъ нивеумъ* (*Ceroxylon niveum*).

**ДИПЛАДЕНІЯ** (*Dipladenia*). *Diplos*—двойной и *aden*—железа; по придатку изъ двухъ железокъ у личинки. С. кутровыхъ (24). Троп. Америка. Тепло. оранже. вьющ. *pp.* Волок. торф. съ достат. колич. песку. Черенками изъ молодого роста, весной, въ песокъ съ торф. з. подъ стекломъ, въ тепломъ грунтѣ. Темп. лѣтомъ 13—22, зимой 3—6°.

*D. амабиліс* (*D. amabilis*, пріятная). Цв. розово-карминныя, въ маѣ до сентября. 10 ф. Есть гибридъ между *D. красноподой* и *спленденсъ*. *D. амѣна* (*D. amoen*, пр-

вящаяся). Садовая разновидность. Цв. малиновые, цвѣтутъ легче, чѣмъ у *амабиліс*. *D. боливиѣнзисъ* (*D. boliviensis*, болівійскій). Боливія. Цв. бѣлые съ золотисто-желтымъ вѣномъ. *D. Брирлейяна* (*D. Brearleyana*, Брирлей). Садовый гибридъ. Цв. малиновые, потомъ дѣлающіеся ярко-карминными. *D. диадема* (*D. diadema*, диадема). Садовая разновидность. Цв. пѣжно-малиновые съ розовымъ отливомъ. *D. инсигнисъ* (*D. insignis*, замѣчательная). Цв. розово-пурпуровые. Садовая происхожденія. *D. нобилисъ* (*D. nobilis*, благородная). Садовая разновидность. Цв. пурпурово-розовые, мѣняющіеся на красно-оранжевые. *D. регина* (*D. Regina*, царичина). Цв. розоватыя, дѣлающіеся темнорозовыми. Садовая происхожденія. *D. гибрида* (*D. hybrida*, гибридная). Садовый гибридъ. Цв. яркіе красно-малиновые.

**ДИПЛЯКУСЪ** (*Diplacus*). *Dis*—два и *plakos*—послѣдъ; послѣдъ раздѣленъ на двое. С. норичниковыхъ. (14). Жаркіе пояса. Полувыносл. *pp.* Относятся теперь къ роду Мимулюсъ. Сильн. глин. дерн. съ торф. Темп. лѣтомъ 10—19, зимой 3—6°.

*D. глутинозусъ* (*D. glutinosus*, липкій). Цв. оранжевые. 3 ф.

**ДИПСАКУСЪ** (*Dipsacus*). Название заимствовано у Diosкорида. Сем. норичниковыхъ. (12). Европа, Азия, С. Африка. Двудѣт., болѣею частью выносл. *pp.* Всякая садовая. Сѣменами.

*D. фуллонумъ* (*D. fullonum*, валильная). *Ворсанка*. *Ворсовальная шизка*. Европа. Цв. головки бѣловатые, пыльники пурпуровые, въ іюль. 4—6 ф.

**ДИПТЕРИКСЪ** (*Dipterix*). *Dis*—двойной и *pteryx*—крыло; по чашечкѣ. С. бобовыхъ. (8). Троп. Америка. Тепло. деревья. Глин. дерн. Черенками подъ стекломъ, во влажномъ теплѣ. Садовая значенія не имѣютъ.

*D. одората* (*D. odorata*, душистый). Гвиана. Даетъ бобокъ тонка или тонкинскій. Цв. пурпуровые. 60 ф.

**ДИРВИЛЛЯ** (*Diervilla*). *Дирвилля* (*Dierville*)—франц. хирургъ. С. жимолостныхъ. (7). С. Америка, Японія, Китай. Оранже. и выносл. куст. *pp.* Обыкн. садовая, или глин. дерн. разоваленная пескомъ. Черенками весной или осенью и отпрысками.

*D. грандифлора* (*D. grandiflora*, крупноцвѣтная). Японія. Цв. малиновые, ранней весной. 8 ф. Сип. *D. амабиліс* (*D. amabilis*). Имѣетъ нѣсколько разновидностей. *D. розеа* (*D. rosea*, розовая). Китай. Цв. розовые или бѣлые, весной. 6 ф. Имѣетъ нѣсколько разновидностей.



**ДИРКА** (*Dirca*). *Dirka*—фонтан; р. встречается во влажных мѣстах. С. ягодковых. (2). С. Америка. Выносл. кустарн. рр. Торф. влажная земля. Съеменами и отводками.

**Д. палистрис** (*D. palustris*, болотная). Цв. желтоватые, въ мартѣ—апрѣль. 2—5 ф.

**ДИСОДИЯ** (*Dysodia*). *Dysodes*—дурнопахучій. С. сложноцвѣтных. (10). Мексика, Центр. Америка. Оранжев. трав. рр. Глин. дерн. съ пескомъ. Съеменами, дѣленіемъ и черенками.

**Д. грандифлора** (*D. grandiflora*, крупноцвѣтная). Цв. головки ярко-оранжевыя. 1—2 ф. Многол. Спн. *Кломенокма монтана*, *Комаклиниумъ аурантиакумъ* (*Clomeposoma montana*, *Comaclinium aurantiacum*). **Д. пубесценс** (*D. pubescens*, пушистая) есть настоящее название *Бибера чикана*.

**ДИСЕММА** (*Disemma*). Соединенъ теперь съ *Пассифлора*.

**ДИСКАРИЯ** (*Discaria*) *Discos*—дискъ, по большому, мясистому ложу. С. крушиновыхъ. (13). Австралія, Нов. Зеландія. Оранжев. куст. рр. Песч. глин. дерн. съ торф. Черенками въ песокъ, подъ стекломъ, въ апрѣль. Темп. лѣтомъ 10—20, зимой 3—6°.

**Д. сerratифолия** (*D. serratifolia*, съ пильнозубоватыми л. л.). Цв. зеленоватые, въ июнь. 6—10 ф. Спн. *Колетія сerratифолия* (*Colletia serratifolia*).

**ДИСКОМИЦЕТЪ**. Сумчатый грибокъ, у котораго плодородный слой находится на поверхности.

**ДИСЕТЪ**. Часть между тычинками и плодникомъ, обыкновен. чешуйчатая или кольцевая. Центральная часть сложноцвѣтныхъ цвѣтовъ, состоящая изъ трубчатыхъ цвѣточковъ.

**ДИСПОРИУМЪ** (*Disporum*). *Dis*—двойной или вдвое и *poros*—отверстіе; причина неясна. С. лилейныхъ. (12). С. Америка, тропич. Азія, Японія. Травян. выносл. многол. рр. Торф. Съеменами и дѣленіемъ весной до начала роста.

**Д. лянугиноза** (*D. lanuginosa*, пушистый). Ю. Каролина. Цв. желтые, въ май. 1 ф. **Д. пулькомъ** (*D. pullum*, тусклый). Китай. Цв. коричневыя, въ сентябрь. 1½ ф. Спн. **Д. фульгумъ** (*D. fulvum*).

**ДИСТЕГАНТУСЪ** (*Disteganthus*). *Distegos*—двухъ-этажный и *anthos*—цвѣтокъ, по расположенію вѣтника надъ ложемъ. С. бромеліевыхъ. (1). Кайсина. Уходъ какъ за *Бромеліей*.

**Д. скарлатинусъ** (*D. scarlatinus*, шарлаховый). Центральные л. яркіе шарлаховые. Спн. *Бромелія амазоника* (*Bromelia amazonica*).

**ДИСТИЛИУМЪ** (*Distylium*). *Dis*—дважды, *stylos*—пестикъ. С. двоемѣстниковыхъ. (3). Китай, Японія, Казія. Оранжев. дер. Въ садахъ встрѣчается только японское *Д. рацемозумъ* (*D. racemosum*) съ пестролистною формою.

**ДИСХИДИЯ** (*Dischidia*). *Dischides*—двурасщепленный, по сегментамъ чашечки. С. ласточниковыхъ. (24). Остиндія, Малайскій архип., Троп. Австралія. Цѣпкія оранжев. рр. Песч. глин. дерн. Черенками въ песокъ и въ теплѣ. Темп. лѣтомъ 13—22, зимой 7—10°.

**Д. нуммуларія** (*D. nummularia*, съ листьями похожими на монеты). Куинслендъ. Цв. мелкіе бѣлые, въ августѣ. 6 д. Эпифитъ съ млечнымъ бѣлымъ сокомъ.

**ДИФИЗА** (*Diphysa*). *Dis*—двойной и *physa*—пузырь, по стручку, который по сторонамъ имѣетъ воздушн. С. бобовыхъ. (4). Центр. Америка. Песчан. дернов. съ волокнист. торф. Темп. лѣтомъ 13—20, зимой 3—6°.

**Д. картагенензисъ** (*D. carthagenensis*, картагенская). Картагена. Цв. желтые. 6—10 ф.

**ДИФИЛЛЕЯ** (*Diphyllia*). *Dis*—двойной и *phyllon*—листъ, на каждомъ стеблѣ только по два л. С. барбарисовыхъ. (1). Сѣв. Америка. Выносл. или полувывосл. многол. трав. Торф. Дѣленіемъ, весной.

**Д. цимоза** (*D. cymosa*, полувонтичная). С. Америка. Цв. бѣлые, лѣтомъ; ягоды голубыя, круглыя. 6—10 ф.

**ДИФФЕНБАХИЯ** (*Dieffenbachia*). *Dieffenbach*—нѣмцкій ботаникъ. С. ароидей. (6). Троп. Америка. Пряморослая, многол. травян. тепл. рр. Уходъ какъ за *Каладіумъ*. Содержать острый ядовитый сокъ, поэтому ни которой части этихъ рр. въ ротъ брать не должно. Темп. лѣтомъ 13—25, зимой 9—12°.

**Д. амёна** (*D. amoena*, приятная). Троп. Америка. Лл. темнозеленые съ бѣлыми и желтыми продолговатыми пятнами. **Д. Бараквиніана** (*D. Barquiniana*, Бараккина). Бразилія. Лл. свѣтло-зеленые съ неправильными бѣлыми пятнами и бѣлыми черешками. **Д. Баузеи** (*D. Baueri*, Бауза). Гибриды. Лл. желтовато-зеленые съ темно-зелеными и бѣлыми неправильными пятнами. **Д. бразиліензисъ** (*D. brasiliensis*, бразильская). Бразилія. Лл. темнозеленые съ бѣлыми и свѣтло-зелеными пятнами. **Д. Вальлизи** (*D. Wallisii*, Вальиса). Колумбія. Лл. темнозеленые съ сѣроватыми перистыми пятнами по сторонамъ главной жилки. **Д. лати-макулата** (*D. latimaculata*, съ широкими пятнами). Бразилія. Лл. темные, сѣро-зеленые съ бѣлыми поперечными полосками и неправильными желто-зелеными пятнышками.

ми и капинками. **Д. Леопольди** (*D. Leopoldi*, Леопольда). Ю. Америка. Лл. атласисто-зеленые, съ широкою бѣлою среднею жилкою и съ бѣлою каймою. **Д. магнифика** (*D. magnifica*, великодушная). Венецуела. Лл. тускло-зеленые съ бѣлыми пятнами и крапинками. **Д. маэстикъ** (*D. majestica*, величественная). Лл. темно-зеленые, съ ярко-желтыми пятнами и серебристою перистою полоскою по срединѣ. **Д. нобилис** (*D. nobilis*, благородная). Бразилія. Лл. темно-зеленые съ бѣлыми пятнами, за исключениемъ края. **Д. принцесъ** (*D. princeps*, знаменитая). Бразилія. Лл. темно-зеленые съ нѣсколькими желтоватыми пятнами и серебристою по срединѣ полоскою. **Д. Регина** (*D. Regina*, королева). Юж. Америка. Лл. зеленоватые, съ бѣлыми пятнами, по которымъ свѣтло-зеленые пятна, съ узкою каймою и болѣе темными мѣтками. **Д. Рексъ** (*D. Rex*, королевская). Ю. Америка. Лл. темно-зеленые, переходящіе у краевъ въ свѣтло-зеленые съ бѣлыми угловатыми пятнами. **Д. Челсъони** (*D. Chelsoni*, Челси). Колумбія. Лл. атласистые, зеленые съ сѣрою полоскою по срединѣ, отъ которой идутъ перистые лучи. **Д. збурнеа** (*D. eburnea*, какъ слоновою костью). Бразилія. Лл. нѣжного свѣтло-зеленаго цвѣта съ бѣлыми пятнами и черточками.

**ДИХОРИЗАНДРА** (*Dichorisandra*). *Dis*—дважды, *chorizo*—дѣлать и *ater*—пыльный, по двустороннему пыльному. С. коммелиновыхъ. (28). Троп. Америка, Бразилія. Тепл. многол. трав. рр. съ орнаментальными л. и красивыми цв. Смѣсь изъ глин. дерн. поровну съ листов. и добавкою песку. Съеменами, черенками, дѣленіемъ. Темп. лѣтомъ 13—22, зимой 3—10°.

**Д. лейкофтальмусъ** (*D. leucophthalmus*, съ бѣлыми глазами). Бразилія. Цв. голубые съ пурпуровымъ отливомъ, внизу бѣлые, въ июнь. Лл. эллиптически-ланцетов., полосатые. 1—1½ ф. **Д. музайка** (*D. musaica*, мозаичная). Майна. Цв. ярко-лазуревые, осенью; лл. остроколючные, темно-зеленые съ бѣлыми зигзагами и черточками, красно-пурпуровые на нижней сторонѣ. 1½ ф. **Д. тирифлора** (*D. thyrsiflora*, съ цв. тирсомъ). Бразилія. Цв. темно-голубые плотнымъ тирсомъ, лѣтомъ и осенью; лл. широкіе, влагалищные, темно-зеленые. 4 ф.

**ДИХРОСТАХИСЪ** (*Dichrostachys*). *Dochroos*—двухцвѣтный и *stachys*—колосъ, нижніе цв. колоса иной краски чѣмъ верхніе. С. бобовыхъ. (4). Троп. Африка и Азія. Тепл. куст. рр. Уходъ, какъ за *Мимоза*.

**Д. платикарпа** (*D. platycarpa*, съ плоскими стручками). Ангола. Цв. въ верхней части колоса—ярко-желтые въ нижней—розовые.

**ДИХРОТРИХУМЪ** (*Dichrotrichum*). *Dichroos*—двухцвѣтный и *thrice*—волосокъ, по разноцвѣтнымъ волоскамъ на сѣменахъ. С. геснеріевыхъ. Тепл. многол. трав. рр., требующія такого же ухода, какъ *Эхинопсисъ*. Глин. дерн. съ торф. и дрес. углемъ. Темп. лѣтомъ 16—24, зимой 12—16°.

**Д. тернатеумъ** (*D. ternatum*, тройчатый). Молуккскіе о. Цв. красно-малиновые, въ июль.

**ДИЦЕНТРА** (*Dicentra*) или **ДИКЛИТРА** (*Diclytra*), неправильно **ДИЕЛИТРА** (*Dielytra*). *Dis*—дважды и *kentron*—шпора, по двупористымъ цв. С. дымниковыхъ. (12). С. Америка, Зан. Азія, Гималаи, Японія. Травян. многол. рр. Сильная легкая. Дѣленіемъ весной.

**Д. спектабилис** (*D. spectabilis*, красивая). Японія, Ю.-В. Сибирь. Цв. розово-малиновые, весной и лѣтомъ. 2 ф. Имѣетъ разновидность съ бѣлыми цв. **Д. таликтрифолия** (*D. thalictrifolia*, съ лл. таликтрума). Умѣр. Гималаи. Цв. желтые, душистые, крупныя, осенью. Спн. *Дактиланталис таликтрифолия* (*Dactylicarpus thalictrifolia*). **Д. формоза** (*D. formosa*, красивая). С. Америка. Цв. ярко-красные, въ май. 6 д. Спн. *Фумарія формоза* (*Fumaria formosa*). **Д. хризанта** (*D. chrysantha*, золотистая). Калифорнія. Цв. золотисто-желтые, осенью. 3—5 ф. **Д. экзимиа** (*D. eximia*, отборная). Соед. Ам. Штаты. Цв. красно-пурпуровые, весной и лѣтомъ, 9 до 18 д.

**ДИЦИРТА** (*Dicyrta*). *Dis*—дважды и *kyrtos*—согнутый; нижняя часть устья внутри съ двумя складками. С. геснеріевыхъ. (2). Сред. Америка. Низкія трав. рр., требующія такого же ухода, какъ *Ахименсисъ*.

**Д. кандида** (*D. candida*, бѣлая). Цв. бѣлые, въ июль. 1½ ф.

**ДИЧЪ. ДИЧОКЪ**. Дикорастущее или выведенное изъ сѣмени, но не привитое еще, растение. Побѣгъ, выросшій изъ непривитой части.

**ДИАГОНАЛЬ. ДОЛОНЪ. ИСКОСИНА**. Черта проведенная съ угла на уголъ угольника.

**ДИАКАЛЬПЕ** (*Diacalpe*). *Dia*—чрезъ и *calpis*—урна, по расположенію споровѣстлища. С. папоротниковъ. (1). Троп. Азія. Тепл. папоротникъ.

**Д. аспидиодесъ** (*D. aspidioides*, похожий на *Аспидіумъ*). Малайск. архип. Ван трехперистый.

**ДИАНЕЛЛЯ** (*Dianella*). Божество лѣсовъ—*Диана*, п. ч. рр. встрѣчаются въ лѣсахъ. С. лилейныхъ. (8). Австралія, Нов. Зеландія, о. Южн. океана. Оранжев. лукович. рр. Глин. дерн. съ торф. Съе-



намн весною, въ парникѣ и дѣленіемъ. Темп. лѣтомъ 10—20, зимой 3—7°.

**Д. левисъ** (*D. laevis*, гладкая). Нов. Юж. Валлис. Цв. голубоватые, весной. 2 ф. Сип. **Д. струмбоа** (*D. strumosa*). **Д. тасманика** (*D. tasmanica*, изъ Тасманіи). Цв. голубые; плоды синіе, дающие красоту р.

**ДИАНТЕРА** (*Dianthera*). *Dis*—два и *anthera*—пыльник; но болѣе или менѣе разставленными гнѣздами пыльниковъ. С. акаантовыхъ. (80). Тропич. страны. Теплич. трав. или кустар. рр. Торф. съ глини. дерн. Черенками, въ песокъ, въ разводч. парникѣ. Темп. лѣтомъ 13—23, зимой 7—10°.

**Д. Полиана** (*D. Pohlana*, Поля). Бразилія. Цв. пурпуровые, привиты, темно-красные, въ мартѣ. Сип. **Порфироккома ланцеолата** (*Porphyrocoma lanceolata*). **Д. пилата** (*D. ciliata*, рѣсничатая). Венецелла. Цв. фиолетовые съ бѣлымъ звонкомъ, зимой. Кустарн. Сип. **Белопероне пилата** (*Beloperone ciliata*).

**ДИАНТУСЪ** (*Dianthus*). *Dios*—божественный и *anthos*—цвѣтокъ. Названіе, взятое у Теофраста. (70). Европа, Азія, С. и Ю. Африка. Многол. трав., болѣею частью выносливыя рр. Легкая, сильная Сѣменами, дѣленіемъ, черенками, отводкой.

**Д. альпестрисъ** (*D. alpestris*, съ горы). Должны Европ. Альпъ. Цв. красные, въ іюль. 6—9 д. **Д. альпизусъ** (*D. alpinus*, альпійскій). Австрійскія Альпы. Цв. темно-розовые съ карминными пятнами, въ іюль. 3—4 д. **Д. арбускулусъ** (*D. arbusculus*, маленькое деревцо). Китай. Цв. ярко-пурпуровые, въ іюль. 1½ ф. Оранже. **Д. аргентусъ** (*D. argenteus*, песчаный). Куколка. С. и В. Европа. Цв. бѣлые; лепестки раздѣлены болѣе чѣмъ до половины, съ яркимъ пятномъ и прижатыми у оснований волосками, лѣтомъ. **Д. атрогубенсъ** (*D. atrogubens*, черно-красный). Ю. и В. Европа. Цв. темно-красные, мелкіе, лѣтомъ. 1 ф. **Д. барбатусъ** (*D. barbatus*, бородастый). Турецкая воздика. Ю. и В. Европа. Цв. различно окрашенные, лѣтомъ. Имѣть весьма много разновидностей. **Д. Гельцери** (*D. Hölzteri*, Гельцера). Турецкая, Цв. малиновые. **Д. каріофиллусъ** (*D. Caryophyllus*). Голландская воздика. Юж. Европа. Цв. почти всѣхъ красокъ, притомъ простые и махровые съ разнообразною росписью. **Д. круентусъ** (*D. cicutus*, кровавый). В. Европа. Цв. кроваво-мариновыя, лѣтомъ. **Д. неглектусъ** (*D. neglectus*, пренебреженный). Ю.-З. Европа. Цв. темно-розовые, лѣтомъ. 2—4 д. **Д. плюмаріусъ** (*D. plumarius*, плюмажная). В. Европа. Цв. бѣлые или пурпуровые, простые или махровые, болѣе или менѣе бахромчатые, лѣтомъ. 9—12 д. **Д. Сегуери** (*D. Seguieri*, Сегье). Красавочка. В. Азія, В. Сибирь. Цв. розово-пурпуровые,

лѣтомъ. **Д. супербусъ** (*D. superbus*, превосходный). Дваичья красота. Европа и Азія. Цв. розовые, очень душистые, особенно къ ночи. 9—18 д. Им. разновидность **Гарднері** (*Gardneri*) изъ Китая, —оранж. или полувыносливую, выгоняемую рано. Цв. у ней разрывные. **Д. фимбриатусъ** (*D. fimbriatus*, бахромчатый). Испанія. Цв. розовые, лѣтомъ. 1 ф. полувынослив. **Д. Фишери** (*D. Fischeri*, Фишера). Россія. Цв. розовые, лѣтомъ. **Д. фрагрансъ** (*D. fragrans*, душистый). Кавказъ. Цв. бѣлые съ пурпуровымъ, съ іюли до сентября. Полувынослив. **Д. хинензисъ** (*D. chinensis*, китайскій). Китайская воздика. Китай. Цв. различно окрашенные, простые или махровые, лѣтомъ. 6—12 д. Душ. **Д. цезіусъ** (*D. caesiuss*, сильный). Европа. Цв. нѣжно-розовые пахучіе. 3—6 д.

**ДИАПЕНСИЯ** (*Diapensia*). *Dis*—два и дважды, и *pente*—пять: пять долей чашечки и пять тычинокъ съ лепестковидными нитями. С. диапенсиновыхъ. (2). Норвегія. С. альпійскіе полукуст. Глини. дерн. съ торф. Сѣменами и дѣленіемъ.

**Д. лаппоника** (*D. lapponica*, лапландская). Норвегія, Лапландія, С. Америка. Цв. бѣлые, въ іюль. 1—2 ф.

**ДІАСЦІЯ** (*Diascia*). *Diaskeo*—наслаждаться, по красотѣ цв. С. норичниковыхъ (20). Южн. Африка. Оранже. однол. трав. рр. Сѣменами, какъ прочіе нѣжныя лѣтники, потомъ на воздухъ.

**Д. Варберѣ** (*D. Barbergae*, г-жи Варберъ). Цв. розово-малиновые, въ іюль. 1 ф.

**ДИОНЕА** (*Dionea*). *Dionea*—одно изъ именъ Венеры, въ предположеніи, что она была дочъ Юпитера и Дианы. С. рослянковыхъ. (1). Каролина, Флорида. Трав. тепл. мног. рр. Торф. съ живымъ торф. мохомъ. Горшокъ долженъ стоять въ водѣ близъ рамы, въ теплой оранжереѣ. Сѣменами, а обычно дѣленіемъ. Темп. лѣтомъ 13—24, зимой 8—12°.

**Д. мусцигуля** (*D. muscipula*, ловящая мухъ). Мухоловка. Цв. бѣлые, щитками, въ іюль—августъ. Лл. корневые съ двумя раздражительными лопастями, имѣющими по краямъ длинныя волоски и складывающимися, когда средніе волоски бываютъ раздражены.

**ДИООНЪ** (*Dioon*). *Dis*—два и *oon*—яйцо: подъ каждой чешуйкой два яичка. С. цикадей. (2). Мексика. Оранже. орнамент. рр. Смѣсь изъ хорошей глини. дерн. съ пескомъ. Во время роста нуждаются въ большомъ теплѣ. Сѣменами. Темп. лѣтомъ 13—26, зимой 10—12°.

**Д. эдуле** (*D. edule*, съѣдомый). Лл. сизо-зеленые, перистые; стволы до 3 ф. въ окружности. Плоды употребляютъ въ пищу.

**ДИОСКОРЕА** (*Dioscorea*). Въ память Diosкорида, жившаго во времена рим-

скаго императора Нерона. С. диоскорейныхъ. (150). Европа, Австралія, Азія, Америка. Листв. орнам. теплич. трав. рр. съ клубнями и выходящими стеблями. Зимую держатъ въ прохладномъ (не холодномъ) помещеніи, въ горшкахъ, въ песокъ. Смѣсь изъ легкой волокнистой, глини. дерн. и перегноя, поровну. Дѣленіемъ клубней, когда они въ состояніи покоя. Темп. лѣтомъ 13—22, зимой 8—12°.

**Д. Бататасъ** (*D. Batatas*, Бататъ). Цв. бѣлые, лл. темно-зеленые, глянцеовитые, стебли однол. пурпуровые. 6—9 ф. Клубнями. Или полагали замѣнить картофель. **Д. бульбифера** (*D. bulbifera*, производящая луковички). Остиндія. Цв. зеленоватые, лл. широкіе, сердцевидные. **Д. мультиколоръ** (*D. multicolor*, многоцвѣтный). Ріонегро. Лл. ярко-зеленые съ бѣлыми пятнами, наиболѣе собранными у главной жилки. Имѣть весьма много красивыхъ разновидностей.

**ДИОСКОРЕЙНЫЯ** рр. (*dioscoreaceae*). Выходящая кустарница или травянистая рр., встрѣчаемая обычно въ тропическихъ странахъ. Большее число этихъ рр. производятъ клубни (ямсъ), употребляемые въ пищу какъ картофель. Типическій родъ—Диоскорея.

**ДИОСМА** (*Diosma*). *Dios*—божественный и *osme*—запахъ, по хорошему запаху лл. С. рутовыхъ. (12). Ю.-З. Африка. Маленькія оранже. рр., похожія на верески. Волокн. торф. съ пескомъ. Черенками въ песчан. торф. подъ стекломъ на легкомъ теплѣ. Темп. лѣтомъ 10—20, зимой 3—6°.

**Д. эрикоидесъ** (*D. ericoides*, похожая на эрику). Цв. бѣлые съ розовымъ сверху отгиномъ, въ февраль до іюли. 1—3 ф.

**ДИОСПИРОСЪ** (*Diospyros*). Названіе, взятое у Теофраста, производимое отъ *dios*—божественный и *pyros*—пшеница,—божественная пшеница. С. гебенныхъ. (154). Азія, Африка, Австралія. Тепл., оранже. и вынослив. деревья и кустарники. Оранже. не требуютъ особаго ухода и разнот. черенками изъ полузрѣлаго роста;—тепличныя изъ черенковъ вполне зрѣлаго роста, въ песокъ, въ развод. парникѣ, на сильно нагрѣтой почвѣ.

**Д. виргиніана** (*D. virginiana*, виргинскій). С. Америка. Цв. желтые, въ іюль; плоды золотисто-желтые, величиною въ сливу. 20—30 ф. **Д. Какі** (*D. Kaki*, Какі). Китай. Цв. зеленоватые; плоды, зрѣлые, желтые, шаровидные, въ маленький апельсинъ, дов. вкусные. **Д. Лотусъ** (*D. Lotus*, Лотусъ). Хурма. Дикій финикъ. Юж. Европа, Востокъ. Цв. красноватые, въ іюль; плоды: зрѣлые, желтые, сладкіе съ вяжущимъ вкусомъ, велич. въ вишню. 20—30 ф. **Д. Мазели** (*D. Mazeli*, Мазели). Японія. Плоды

красно-оранжевые, сферическіе, созрѣвающие въ ноябрѣ.

**ДИУРИСЪ** (*Diuris*). *Dis*—двойной и *oura*—хвостъ; по двумъ хвостовиднымъ долямъ. С. орхидей. (15). Австралія. Оранже. земныя рр. Торфянистая

**Д. альба** (*D. alba*, бѣлый). Н. Ю. Валлис. Цв. бѣлые, розовые, зеленые, коричнево-пурпуровые, въ августѣ. 1 ф. **Д. макулата** (*D. maculata*, пятнистый). Куинслендъ. Цв. желтые, въ мартѣ. Сип. **Д. курвиформіа** и **пардина** (*D. curvifolia*, *D. pardina*). **Д. пунктата** (*D. punctata*, точечный). Австралія. Цв. голубые или пурпуровые. 1—2 ф. Сип. **Д. элиангиса** и **элонгата** (*D. eliantha*, *D. elongata*).

**ДИХЕА** (*Dichea*). *Dicha*—двурядный, по двустороннимъ лл. С. орхидей. (12). Троп. Америка, Вестиндія. Теплич. эпифиты. На чуркѣ съ малымъ количествомъ торф. мха.

**Д. пикта** (*D. picta*, росписанная). Тринидадъ. Цв. зеленые съ пурпуровыми крапинками.

**ДЛАНЕВИДНОРАЗСѢЧЕННЫЙ** или **СТОПООБРАЗНЫЙ**. Похожій на птичью лапу, лапчатый, раздѣленный на боковые лоскуты.

**ДОВЕНІЯ** (*Daubenia*). Ч. **Добѣни** (*Daubeny*)—проф. ботаники въ Оксфордѣ. С. лилейныхъ. (3). Мысъ Д. Н. Маленькія лукович. оранже. рр. Песчан. дернов. съ торф. Отпрысками.

**Д. ауреа** (*D. aurea*, золотистая). Цв. желтые, въ іюль. 3 д. **Д. фұлва** (*D. fulva*, гризно-желтая). Цв. тускло-красно-оранжевые, въ іюль. 6 д.

**ДОДЕКАТЕОНЪ** (*Dodecatheon*). *Dodeka*—двѣнадцать и *theos*—боги; фантастическое названіе. С. первоцвѣтовыхъ. (3). Сѣв. Америка, С.-З. Африка. Орнаментальныя выносливыя трав. рр. Смѣсь глини. дерн. съ листов. Дѣленіемъ весной или осенью. Не способны къ приостановкѣ для ранняго цвѣтенія и вообще не любятъ лѣтомъ прямого солнечнаго свѣта.

**Д. интегрифолюмъ** (*D. integrifolium*, цельнолистный). С. Америка. Цв. темно-розовые, рано лѣтомъ. 4—6 д. **Д. Мэадія** (*D. Meadia*, Мэадія). С. Америка. Цв. розово-пурпуровые, бѣлые или лиловые, въ апрѣль—май. 3—7 д. Имѣть нѣсколько прекрасныхъ формъ и между прочими: **гигантеумъ** (*giganteum*) съ самыми крупными цв. распускающимися раньше обычнаго времени для другихъ, **лицифоліумъ** (*lanceifolium*), со Скалистыхъ горъ, имѣть розовые цв., книзу желтые, цвѣтущіе поздно весной (сип. **Д. Джеффри**,—*Jeffreyi*), **фригидумъ** (*frigidum*) изъ зап. части С. Америки, съ цвѣтами красновато-пурпуровыми и **элансъ**



(elegans) съ цв. болѣе темными, чѣмъ у др. **ДОЖДЕМЪРЪ**. Оброметръ. Снарядъ для измѣренія количества выпавшаго дождя или снѣга.

**ДОЖДЬ. ДОЖЖИКЪ**. Вода въ капляхъ или струями изъ облаковъ. *Омничекъ*—самый мелкій дождь, *морося*, *брызг*, *стужа*—еще мелче; *косоголестя*, *подстѣга*—косою, по направленію сильнаго вѣтра; *грозный*—съ грозой.

**ДОЛГОНОСИКЪ**. Жукъ съ хоботкомъ. Личинка его приноситъ значительный вредъ разнымъ плодамъ, преим. гороху.

**ДОЛИХОСТЬ** (Dolichos). *Dolichos*—длинный, по длиннымъ цѣпнымъ стеблямъ. С. бобовыхъ. (20). Азія, Африка, Австралія, Юж. Америка. Тепл., оранже. и выносл. травян. или полукуст. рр. Сѣменами, или черенками корней, въ пескѣ, подъ стекломъ.

**Д. лигнозусъ** (D. lignosus, деревянистый). Индія. Цв. розовые, въ іюль. Оранже.

**ДОЛЮКАРПУСЪ** (Dolioscarpus). *Dolios*—обманчивый и *karpus*—плодъ, плоды красивы, но ядовиты. С. дѣленіевыхъ. (20). Троп. Америка. Глин. дерн. съ торф. и малымъ колич. песку. Черенками въ разводочномъ парникѣ. Темп. лѣтомъ 13—24, зимой 8—10°. Тепл. куст. рр.

**Д. Калинеа** (D. Calinea, Калинея). Гвиана. Цв. бѣлые, въ апрѣль. Тепл. выюц.

**ДОЛЯ**. Часть, совокупность которыхъ составляетъ чашечку цвѣтка или вѣтвиное кольцо. Бываетъ обычно зеленая, но иногда цвѣтная и похожая на лепестокъ; равнымъ образомъ отдѣльная отъ другихъ, или сросшаяся болѣе или менѣе краями въ трубку или чашу.

**ДОМБЕЙЯ** (Dombeya). *Домбей* (Jos. Dombey) — франц. ботаникъ, путешествовавшій въ Перу и Чили вѣстѣ съ Рюйномъ и Павономъ. С. стеркулиевыхъ. (24). Африка, Маскаренскіе о. Орнамент. тепл. дер. или куст. рр. Песчан. глин. дерн. и дернистая торф. Черенками изъ почти зрѣлаго роста, въ пескѣ, въ парникѣ, въ апрѣль.

**Д. Бургессіи** (D. Burgessiae, Бургессы). Ю. Африка. Цв. бѣлые, бѣлые, съ розовымъ низу, съ августа до декабря. **Д. Мастерси** (D. Mastersii, Мастерса). Троп. Африка. Цв. бѣлые, пахучіе.

**ДООДІЯ**. См. Дудія.

**ДОРЕМА** (Dorema). *Dorema* — ядъ. С. зонтичныхъ. (4). Персія, Белуджистанъ, Киргизскія степи. Выносл. многол. трав. рр. Обыкновен. садовая. Сѣменами.

**Д. аммоніакумъ** (D. ammoniacum, аміачная). Египетъ, Персія. Цв. бѣлые. 7 ф. Производитъ аміачную камедь (gummi ammoniacum).

**ДОРИКНИУМЪ** (Dorycnium). *Dorycnium*—копы. С. бобовыхъ. (6). Европа, 3. Азія, С. Африка, Канарскіе о. Полувыносл. и выносл. травян. или полукуст. рр. Обыкновен. садовая, нѣсколько сухая. Сѣменами и дѣленіемъ.

**Д. суфрутикозусъ** (D. suffruticosum, полукустарный). Ю. Европа. Цв. бѣлые, въ іюнь. 2 ф.

**ДОРИАНТЕСЪ** (Doryanthes). *Doryanthes*—копы и *anthos*—цвѣтокъ, по высокимъ цв. стеблямъ. С. амариллисовыхъ. (2). Австралія. Глин. дерн. пополамъ съ листов. Отпрысками. До цвѣта р. приобтѣкаетъ значит. размеры. Темп. лѣтомъ 13—21, зимой 5—8°.

**Д. Пальмери** (D. Palmeri, Пальмера). Куинслендъ. Цв. красные, съ болѣе свѣтлою среднею частью. 8—16 ф. **Д. экзельза** (D. exelsa, высочій). Нов. Юж. Валлис. Цв. ярко-пурпуровые, крупные, лѣтомъ. 8—16 ф.

**ДОРОГА ПОДЪВЪЗЖАЯ**. Хорошо сдѣланная обходится дорого, особенно когда вѣтъ подъ рукой необходимаго матеріала, тѣмъ не менѣе это необходимо. Дорога должна быть хорошо расположена, дренажирована и по сдѣланію чисто содержать. Дренажный слой долженъ быть не тоньше 1 фута, на него насыпается крупный щебень, на такую-же толщину, и затѣмъ болѣе мелкій матеріалъ; все это порознь и въ общемъ укатывается тяжелымъ каткомъ и посыпается пескомъ.

**ДОРОЖКА**. Устройство дорожекъ—весьма не легкое и не дешевое дѣло. Хорошая дорожка требуетъ красиваго, удобнаго расположенія и прочаго устройства, допускающаго возможность во всякую погоду ходить по ней. Это достигается хорошимъ водостокомъ или поверхностнымъ или подземнымъ,—дренажнымъ. Ширина дорожки обуславливается ея назначеніемъ: возвышеніе средины, не будучи на столько круто, чтобы затрудняло хожденіе, должно имѣть постепенный склопъ къ бокамъ. Дорожки должны быть устроены изъ плотнаго матеріала, хорошо утрамбованы, имѣть ровную поверхность, съ соответствующею насыпкою гравія или крупнаго песку.

**ДОРОНИКУМЪ** (Doronicum). Арабское названіе—*doronigi*. С. сложновѣтвыхъ. (12). Европа, Азія. Многол. выносл. трав. рр. Обыкновен. садовая, лучше легкая, сухая. Сѣменами и дѣленіемъ.

**Д. альтаикумъ** (D. altaicum, алтайскій). Алтай. Цв. головки желтыя, въ іюль. 1 ф. **Д. аустриакумъ** (D. austriacum, австрийскій). Европа. Цв. головки желтыя, лѣтомъ. 1—1½ ф. **Д. кавказикумъ** (D. caucasicum, кавказскій). Европа, Азія. Цв. го-

ловки желтыя, крупныя, весной. 1 ф. **Д. пардалианхесъ** (D. pardalianches, леопардовый). Европа. Цв. головки желтыя, весной. 1½—3 ф. Р. это считается ядовитымъ.

**ДОРЕТЕНІЯ** (Dorstenia). Теод. *Дорстенъ* (Dorsten)—нѣмецкій ботаникъ, 1552. С. крапивныхъ. (45). Троп. Америка, Остіндія. Тепл. трав. рр. Сильная песч. глин. дерн. Сѣменами въ парникѣ весной и черенками до начала роста.

**Д. аргентата** (D. argentata, серебрястая). Юж. Бразилія. Лл. эллиптическіе съ серебрястой полосой по срединѣ, стебель пурпуровый. **Д. Манни** (D. Mannii, Манна). 3. ч. троп. Америки. Цв. на стеблѣ въ видѣ свѣдовъ отъ опавшихъ лл., въ ноябрь; лл. эллиптическіе, темно-зеленые, тусклые, 1 ф.

**ДОССИНІЯ** (Dossinia). *Доссинъ* (Dossin), бельгійскій ботаникъ. С. орхидей. (1). Борнео. Земная тепл. орхидея. Уходъ какъ за Анектохилою.

**Д. мarmorата** (D. marmorata, мраморная). Есть настоящее названіе *Анектохилоя Лоуи*. Снн. *Хейростылис мarmorата* (Cheirostylis marmorata).

**ДОУНИНГІЯ** (Downingia). Англичанинъ *Довнингъ* (Downing) — покровительствовалъ садоводству. С. колокольчиковыхъ. (4). Калифорнія, Чили. Однол. красивая рр. Сѣменами весной, въ парникѣ.

**Д. пульхелла** (D. pulchella, красивая). Калифорнія. Цв. ярко-голубые съ бѣлыми глазками, лѣтомъ. 6 д. Снн. *Клинтонія пульхелла* (Clintonia pulchella). **Д. элегансъ** (D. elegans, изящная). С.-З. Америка. Цв. голубые съ большими внизу черточками, лѣтомъ. 6 д.

**ДРАБА** (Draba). Названіе взято у Dioscorida. С. крестоцвѣтныхъ. (150). Европа, Америка, Нов. Зеландія, Австралія, Фанкландск. о. Одно- и многол. трав. рр. Глин. дер. съ торф. для нѣжныхъ и песчан. глин. дерн.—для болѣе выносливыхъ. Сѣменами и дѣленіемъ.

**Д. айцойдесъ** (D. Aizoides, похожая на айцойдъ). Европа. Цв. желтые, рано весной. 2—3 д. **Д. айцонъ** (D. Aizoon, Айцонъ). По горамъ Зап. Европы. Цв. ярко-желтые, въ апрѣль. 3 д. Снн. **Д. циліарисъ** (D. ciliaris). **Д. альпина** (D. alpina, альпійская). С. Европа. Цв. золотисто-желтые, въ апрѣль. 3 д. **Д. гляціалисъ** (D. glacialis, ледяная). Сибирь. Цв. желтые, въ май. 2 д. **Д. нивалисъ** (D. nivalis, снѣжно-бѣлая). Арктич. Европа. Цв. бѣлые, въ апрѣль. 1—2 д.

**ДРАКЕА** (Drakea). Миссъ *Драке* (Drake)—ботаническая рисовальница. С. орхидей. (3). Австралія. Оранже. земн. орхидея. Глин. дерн. съ торф. и пескомъ. Дѣленіемъ.

**Д. эластикъ** (D. elastica, упругая). Имѣетъ на пожвѣ только одинъ цвѣтокъ, похожій на летящее насекомое; цв. этотъ движется при малѣйшемъ колебаніи воздуха.

**ДРАКОННИКЪ**. См. Арумъ.

**ДРАКОНОВЪ КОРЕНЬ**. См. Дракункулюсъ.

**ДРАКОНТИУМЪ** (Dracontium). Названіе взято у Гипократа. С. ароидныхъ. (6). Троп. Америка. Тепл. орнамент. рр. Волокн. глин. дерн. съ переносимъ и листов. Дѣленіемъ корней. Темп. лѣтомъ 13—23, зимой 7—10°.

**Д. асперумъ** (D. asperum, жесткій). Лл. стогоподные, 3—5 раздѣленные, чехолъ буро-пурпуровый, Снн. **Д. элатумъ** и **Аморфобаллюсъ нивозусъ** (D. elatum; Amorphophallus nivosus). **Д. Кардери** (D. Carderi, Кардера). Антиоквія. Лл. трехраздѣльные, черешки пестрые. 3 ф.

**ДРАКОФИЛЛУМЪ** (Dracophyllum). *Драконъ*—драконъ и *phyllon*—листь, по лл. похожимъ на лл. Драцена дроко. С. эпакрисовыхъ. (25). Австралія, Нов. Зеландія, Нов. Каледонія. Оранже. кустар. или низкія древ. рр. Глин. дерн. съ торф. и пѣкот. кол. песку. Темп. зимой 3—6°.

**Д. грациле** (D. gracile, изящный). 3. Австралія. Цв. снѣжно-бѣлые, въ іюль. **Д. капитатумъ** (D. capitatum, головчатый). 3. Австралія. Цв. бѣлые, лѣтомъ.

**ДРАКОЦЕФАЛУМЪ** (Dracoscephalum). *Драконъ*—драконъ и *kephale*—голова, по открытому зѣву цв. С. губоцвѣтныхъ. (20). Европа, Азія. Одно- и многол. трав. рр. Первые — сѣменами, остальные дѣленіемъ и черенками.

**Д. алтаиензе** (D. altaianse, алтайскій). Сибирь. Цв. голубые, въ іюль. 6—9 д. Снн. **Д. грандифлорумъ** (D. grandiflorum). Многол. **Д. аустриакумъ** (D. austriacum, австрийскій). Европа. Цв. голубые, въ іюль. ½ ф. Многол. **Д. перегринумъ** (D. peregrinum, красивый). Сибирь. Цв. голубые, въ іюль. Р. стелющиеся, многол. **Д. Рюйшанумъ** (D. Ruyschianum, Рюйша). *Синій зефиръ*. Европа. Цв. пурпуровые, въ іюль. 2 ф. Многол. У японской разновидности *японикумъ* (japonicum) цв. бѣлые со средней губой, обведенной голубымъ. **Д. специозумъ** (D. speciosum, отмытый). Гималай. Цв. пурпуровато-синіе, въ іюль. 1½ ф. Многол.

**ДРАКУНКУЛОСЪ** (Dracunculus). Уменьшительное *Drakon*, черешки пестрые какъ шкура змѣи. С. оронидейныхъ. (2). Юж. Европа. Выносл. клубневая рр. Сильная легкая з.

**Д. вулгарисъ** (D. vulgaris, обыкновенный). *Драконовъ корень*. Юж. Европа. Чехолъ буро-пурпуровый, въ іюль. 1½ ф.



Син. *Арумъ Дракукултусъ* (*Arum Dracunculifolius*). **Д. кретикусъ** (*D. creticus*, критский). О. Критъ. Чехолъ буро-пурпуровый. 1½ ф.

**ДРАЦЕНА** (*Dracena*). *Dracoena* — самка дракона. С. лилейныхъ. (36). Жаркая страна. Телл. орнам. листь. рр. Близи къ Кордилине и отъ нихъ отличаются только плодами. Глин. дер. поровну съ комками торф. и древ. углемъ. Черенками въ развод. парничкѣ.

**Д. Гольдайана** (*D. Galdieana*, Гольдай). З. ч. троп. Африки. Цв. бѣлые; лл. удлиненно-сердцевидные съ темно-зелеными и серебристо-бѣлыми поперечными разводами. **Д. Драко** (*Draco*). *Драконовое дерево*. Канарскіе о. Цв. зеленоватые; лл. линейно-ланцетов., цѣльные, сизые. Молодой экземпляръ красивѣе старого. **Д. концинна** (*D. coccinea*, красная). О. Маврикія. Лл. узкіе, тускло-зеленые съ красно-пурпуровыми краями. 6 ф. **Д. Линдена** (*D. Lindenii*, Линдена). Бразилія. Лл. темно-зеленые съ млечно-бѣлыми и желтоватыми продольными полосами. **Д. фринойдесъ** (*D. frunoides*, похожая на Фриніумъ). Фернандо-По. Лл. широко-овальные, жесткіе, темно-зеленые съ блѣдно-желтыми крапинками.

**ДРЕВЕСИНА**. Древянистые части растений; древесныя волокна.

**ДРЕВОНАСАЖДЕНІЕ**. Разведение деревъ не отъ сѣмянъ, а посадкою молоденька.

**ДРЕВОСВЕРЛЫШЧИКИ**. Бабочки, гусеницы которыхъ живутъ въ древесинѣ, въ которой сверлятъ ходы.

**ДРЕВОФДЫ**. Жуки, личники которыхъ живутъ большими обществами подъ корою или въ самой корѣ дерева и тѣмъ губятъ р.

**ДРЕМА**. См. Лихнискъ.

**ДРЕНАЖЪ**. Отведение воды. Осушка болота и почвы подземными трубами. Устройство водосточнаго слоя въ горшкѣ.

**ДРЕПАНОКАРПУСЪ** (*Drepanocarpus*). *Drepanon* — коса и *carpos* — плодъ, по закривленному стручку. С. бобовыхъ. (8). Троп. Америка. Телл. куст. рр. Торф. съ глин. дерн. Черенками изъ почти вырѣзанаго роста въ песокъ, въ разводоч. парничкѣ.

**Д. лунатусъ** (*D. lunatus*, полулунный). Цв. бѣлые. 6—10 ф.

**ДРЕСВА**. Крупный песокъ. Гравій. Хряцѣ.

**ДРИМИСЪ** (*Drimys*). *Drimys* — жгучій, по горькому вкусу коры. С. магнолиевыхъ. (5). Австралія, Юж. Америка, Новая Зеландія, Борнео. Оранж. дер. Песч. глин. дерн. Черенками изъ полу-

зрѣлаго роста, въ песокъ, въ холодномъ парничкѣ.

**Д. Винтѣри** (*D. Winteri*, Витера). Юж. Америка. Цв. млечно-бѣлые, пахнущіе жасминомъ. 25 ф. Син. *Винтѣра ароматика* (*Wintera aromatica*).

**ДРИМОПСИСЪ** (*Drimiopsis*). *Drymos* — дерево и *opsis* — подобіе. С. лилейныхъ. (6). Троп. и Южн. Африка. Оранж. луков. рр. Уходъ какъ за Дриміа.

**Д. Керкіи** (*D. Kirkii*, д-ра Керка). Заинбаръ. Цв. бѣлые, въ июлѣ. 9 д.

**ДРИМИЯ** (*Drimya*). *Drimys* — жгучій, по соку корня. С. лилейныхъ. (15). Троп. и Юж. Африка. Оранж. луков. рр. Песч. глин. дерн. съ листов. или торф. Отпрысками. Темп. лѣтомъ 8—16, зимой 2—5°. Пересаживать при началѣ роста, послѣ заивація лл. вовсе не поливать.

**Д. ланцѣфолія** (*D. lanceifolia*, съ ланцетовидными лл.). М. Д. Н. Цв. пурпуровые, въ сентябрѣ. ¼ ф. **Д. медія** (*D. media*, средняя). М. Д. Н. Цв. бѣлые, въ августѣ.

**ДРИМОГЛОССУМЪ** (*Drymoglossum*). *Drymos* — дерево и *glossum* — языкъ, по мѣсту нахождения и формѣ вай. С. папоротниковыхъ. Телл. ползучія рр. Глин. дерн. съ торф. Дѣленіемъ. Темп. лѣтомъ 13—22, зимой 7—10°.

**Д. пилоселлоидесъ** (*D. piloselloides*, похожій на волосатикъ, — пилоселла). Остиндія. Вай безплодные округлыя, плодоносныя продолговато-линейныя.

**ДРИМОДА** (*Drymoda*). *Drymodes* — лѣсной, — эпифитныя рр. С. орхидей (1). Австралія. Телл. р. На чуркѣ съ корой.

**Д. пикта** (*D. picta*, росписная). Мульмейнъ. Цв. желто-зеленоватые съ коричневыми полосками.

**ДРИМОНИЯ** (*Drymonia*). Отъ *drymos* — дерево, по находженію на дубовыхъ вѣтвяхъ. С. геснеріевыхъ. (15). Троп. Америка. Телл. распростертыя куст. или выходящія на деревьяхъ рр. Сильная песчан. глин. дерн. Черенками въ песокъ, въ развод. парничкѣ. Темп. лѣтомъ 13—21, зимой 8—10°.

**Д. мармората** (*D. marmorata*, съ разводами). Гвѣана. Цв. млечно-бѣлые. **Д. туріальвѣ** (*D. Turrialvae*, Туріальва). Верагуа. Цв. бѣлые, крупныя.

**ДРИМОФЛЕУСЪ** (*Drymophloeus*). *Drymos* — дерево и *phloeus* — кора. С. пальмъ. (12). Нов. Гвинея, Молуккскіе о., Троп. Австралія. Телл. рр. Глин. дерн. съ листов. и поверхностнымъ коровымъ удобреніемъ. Темп. лѣтомъ 15—24, зимой 13—15°.

**Д. оливѣформисъ** (*D. olivaeformis*, съ плодами похожими на маслинны). Молуккскіе о. Лл. съ продолговато-клиновидными сег-

ментами сверху зубчатыми, вѣерообразные. Син. *Птичосперма Румфії* (*Ptychosperma Rumphii*).

**ДРИПЕТЕСЪ** (*Drypetes*). *Drypto* — раздирать, по колочесты. С. молочайныхъ. (9). Бразилія, Вестиндія и Флорида. Оранж. куст. рр. Торф. съ глин. дерн. Черенками изъ корней въ песокъ. Глин. дерн. подъ стекломъ, въ тѣлѣ.

**Д. кроцеа** (*D. crocea*, шафрановый). Вестиндія. Цв. оранжевые, въ июлѣ. 6 ф.

**ДРИПСИСЪ** (*Drypis*). Названіе, взятое у Теофраста. С. гвоздичныхъ. (1). Средиземное побережье. Трав. многол. Черенками въ песокъ з., подъ стекломъ, или сѣменами.

**Д. спиноза** (*D. spinosa*, съ иглами). Юж. Европа. Цв. блѣдно-малиновые или бѣлые, въ июлѣ. 6 д.

**ДРИАНДРА** (*Drilandra*). *Drilandra* (Dryander) — шведскій ботаникъ, † 1810. С. протейныхъ. (48). З. Австралія. Оранж. куст. рр., нуждающіеся въ такомъ же уходѣ, какъ Банксія.

**Д. армата** (*D. armata*, колочая). Цв. головки желтыя, листья съ колочками, 2—4 ф. Син. **Д. favosa** (*D. favosa*). **Д. нивеа** (*D. nivea*, сѣжно-бѣлая). Лл. на верхней сторонѣ темно-зеленые, на нижней сѣжно-бѣлые. 2—3 ф. **Д. плюмбоза** (*D. plumosa*, перистая). Лл. темно-зеленые на верхней, бѣлые на нижней сторонѣ. 3 ф. **Д. птеридифолія** (*D. pteridifolia*, съ лл. какъ у папоротника). Цв. головки желтыя, лл. перисто-разсѣченные. 1½ ф. Син. **Д. блеснифолія** и **Д. перовза** (*D. blechnifolia*, *D. nervosa*).

**ДРИАСЪ** (*Dryas*). Отъ *Dryades* — дриады, нимфы дубовыхъ лѣсовъ; лл. напоминаютъ дубовые. С. розовыхъ. (2). Европ. Альпы, Кавказъ, С. Америка. Низкія куст. рр. Торф. влажн. Черенками, дѣленіемъ и сѣменами.

**Д. Друммонди** (*D. Drummondii*, Друммонда). С. Америка. Цв. золотисто-желтые, въ июлѣ. **Д. октопеталя** (*D. octopetala*, съ восемью лепестками). С. полушаріе. Цв. бѣлые, въ июлѣ.

**ДРИОБАЛАНОПСЪ** (*Dryobalanops*). *Dryos* — дерево, *balanos* — желудь и *ops* — подобіе, по виду, представляющему древесное р., производящее плоды, похожее на желуди. С. двукрыло-плодниковыхъ (*dipterosagreae*). (1). Инд. архип. Телл. дерево, дающее камфору.

**Д. ароматика** (*D. aromatica*, ароматическій). Цв. желтые. 100 ф. Жидкій сокъ даетъ камфарное масло, сгущенный — кристалл. суматранскую камфору.

**ДРОЗЕРА** (*Drosera*). *Droseros* — роса, отъ волосковъ рр. кажутся какъ бы

покрытыми росой. С. росяниковыхъ. (100). Европа, Азія, Африка, Америка, Австралія. Одно- и многол. травянист. иногда луковичн. рр. Торфяникъ съ торф. з. Сѣменами тотчасъ по вызрѣваніи.

**Д. бина́та** (*D. binata*, двойчато-листная). Австралія. Цв. бѣлые, съ июля до сентябрю. 6 д. Син. **Д. дишотомъ** (*D. dichotoma*). Многол. **Д. пельтата** (*D. peltata*, щитовидная). Австралія. Цв. малиновые. 1 ф. Однол. **Д. ротундифолія** (*D. rotundifolia*, круглолистная). *Рослянка*. Европа. Цв. бѣлые, въ июлѣ—августѣ. 4 д. Однол. **Д. спатуляна** (*D. spatulata*, съ лопатчатыми лл.). Австралія. Цв. пурпуровые, въ июлѣ. 3 д. Многол. **Д. филиформисъ** (*D. filiformis*, нитевидная). С. Америка. Цв. крупныя, пурпуровыя, съ іюня до августа, 1 ф. Многол.

**ДРОЗОФИЛЬЮМЪ** (*Drosophyllum*). *Drosos* — роса и *phyllon* — листь, по железкамъ на лл., дающимъ видъ росы С. росяниковыхъ (1). Испанія, Португалія, Африка. Оранж. полукуст. Легкая песч. глин. дерн. Сѣменами.

**Д. луститанікумъ** (*D. lustranicum*, португальскій). Испанія, Португалія, Африка. Цв. большіе желтые, лѣтомъ. 2—3 д.

**ДУВРОВКА**. См. Тейкриумъ.

**ДУВЪ**. См. Кверкусъ.

**ДУВАЛІЯ**. См. Дювалія.

**ДУВАУА**. См. Дюва.

**ДУГЛАСІЯ** (*Douglasia*). *Дугласъ* (Douglas) — ботаникъ и коллекторъ рр. въ С.-З. Америкѣ. С. первоувѣтныхъ. (4). Европа, С. Америка. Полукуст. Многол. рр. Глин. дерн. съ торф. Сѣменами.

**Д. нивалисъ** (*D. nivalis*, бѣло-сѣнная). Скалистыя горы. Цв. малиновые, рано весной. 3 д.

**ДУДІЯ** (*Doodia*). Самуель *Дуди* (Doodu) — ботаникъ и аптекарь въ Лондонѣ, † 1706. С. папоротниковыхъ. (6). Австралія, Нов. Каледонія, Цейлонъ, Сандвичевы о. Оранж. травяни. папоротники. Глин. дерн. съ торф. Дѣленіемъ передъ самымъ началомъ роста. Темп. лѣтомъ 10—20, зимой 5—8°.

**Д. аспера** (*D. aspera*, грубая). Умѣр. Австралія. Вай продолговато-ланцетовидныя, перистыя. **Д. медія** (*D. media*, средняя). Австралія. Вай ланцетовидныя, перистыя.

**ДУДКИ**. См. Ангелика.

**ДУЛЯ**. Груша.

**ДУМАЗІЯ**. См. Дюмасія.

**ДУРАНТА**. См. Дюранта.

**ДУРІО** (*Durio*). Плодъ этого р. на языкѣ малайцевъ называется *дуріонъ*. С. мальвовыхъ. (1). Инд. и Малайскій архип.



пелагъ. Тепл. дерево, производящее плодъ въ человѣческую голову. Торф., глин. дерн. и листов. Черенками изъ вызрѣлаго роста въ песокъ и развод. парн.

**Д. цибетинусъ** (*D. zibethinus*, цибетское). Индѣйскій и Малайскій архип. Цв. бѣлые. 80 ф.

**ДУХОВАЯ ГРУША** или **РОХМАН-КА**. Мелкій сортъ очень вкусной, пѣжной груши, желтоватаго цвѣта съ румянцемъ.

**ДУХОВОЕ**. См. Антоновское яблоко.

**ДУШИСТАЯ СМОЛКА**. См. Асперула. **Д. горошекъ**. См. Литирусъ.

**ДУШИЦА**. См. Ориганумъ.

**ДЫМЪ** и **КОПОТЬ**. Вредны потому, что закупориваютъ дыхательныя отверстія (устыща) листьевъ, и заслоняютъ свѣтъ. Дымъ сосѣднихъ фабрикъ, заведеній особенно вреденъ, если содержитъ газъ сѣрнистой кислоты, которая въ состояніи убить р., будучи примѣшена къ воздуху въ самомъ маломъ количествѣ одной миллионной доли. Не менѣе губительно дѣйствуетъ и газъ соленой (хлороводородной) кислоты.

**ДЫМЯНКОВЫЯ** pp. (*fumariaceae*). Травянистыя pp., распространенныя по умѣренному и жаркому поясамъ сѣвернаго полушарія. Имѣютъ горькій и островатый вкусъ. Изъ семи родовъ наиболѣе известны Адлмуй, Гипекоумъ, Днцентра, Коридалис и Фумарія. Видовъ около ста.

**ДЫННОЕ** и **ЗВОНКОЕ** яблоко. Ранній сортъ съ ароматнымъ дыннымъ вкусомъ; угластое, мелкое яблоко.

**ДЫНЬ**. См. Кукумисъ.

**ДЫХАЛЬЦО**. Устыща, отверстіе въ ткани кожицы листьевъ.

**ДЭВИЦА ВЪ ЗЕЛЕНИ**. См. Ни геляя.

**ДЭВИЧЬЯ КРАСОТА** См. Диантусъ.

**ДЭВНИКЪ**. См. Партениумъ.

**ДЭТКА**. Отростокъ. Молодая луковичка.

**ДЮБУАЗІЯ** (*Duboisia*). Луи Дюбуа (*Dubois*)—французскій ботаникъ. С. ласленовыхъ. (1). Нов. Юж. Валисъ, Оранж. дерево. Смѣсь песч. глин. дерн. съ торф. Черенками подъ стекломъ.

**Д. мюпоройдесъ** (*D. muporoides*, похожая на Мюпорумъ). Цв. бѣлые. 6—15 ф.

**ДЮВАЛІЯ** (*Duvalia*). Дюваль (*Duval*)—франц. ботаникъ. С. ласточниковыхъ. (10). Южн. Африка. Сочныя оранж. низкія pp. Песч. глин. дерн. съ битыми черепками, съ поверхност. удобреніемъ коровьимъ перегноемъ. Черенками съ обсохшими нижними концами. Темп. зимой 4—10, лѣтомъ 13—21°.

**Д. кордеруаи** (*D. Corderoyi*, Кордеруа). Цв. оливково-зеленые съ пурпуровою бахромой. **Д. полита** (*D. polita*, полнорванная). Цв. буро-пурпуровые, лѣтомъ.

**ДЮВОВА** (*Duvaua*). Огюсть Дюво (*Duvau*)—франц. ботаникъ. С. сердечниковыхъ. (4). Юж. Америка. Полувыносл. куст. pp. Песчан., сухая з. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ песокъ, подъ стекломъ, въ умѣренномъ теплѣ.

**Д. депенденсъ** (*D. dependens*, вислиця). Цв. желтоватые, въ июнь—июль. 10—12 ф.

**ДЮЙМЪ**. Ширина большого перста; двѣнадцатая доля фута,  $\frac{1}{25}$  доля аршина, содержащая 10 линий. Въ вершкѣ  $1\frac{1}{2}$  дюйма.

**ДЮМАСІЯ** (*Duamsia*). Дюма (*Dumas*)—франц. химикъ. С. бобовыхъ. Оранж. цѣпкія pp. Ухоть, какъ за Клитория.

**Д. вильоза** (*D. villosa*, пушистая). Троп. Азія, Африка и др. Цв. желтые, въ августѣ.

**ДЮРАНТА** (*Duranta*). Касторъ Дюрантъ (*Durantes*)—врачъ и ботаникъ, † 1590. С. вербеновыхъ. (5). Ю. Америка, Вестиндія. Тепл. куст. pp. Глин. дерн. по ровну съ торфяной. Черенками въ теплѣ, ранней весной. Темп. лѣтомъ 13—21, зимой 6—10°.

**Д. Плюмьери** (*D. Plumieri*, Плюмье). Юж. Америка. Цв. голубые, въ октябрь. 15 ф.

**ДЯТЛИНА-СВѢЧКА**. См. Трифоліумъ.

**ЕЖА**. См. Дактилисъ.

**ЕЖЕВІКА**. См. Рубусъ.

**ЕЖОВКА**. См. Арбутусъ.

**ЕЛЬ**. См. Пицеа.

**ЕЛЬЯНЪ**. Еловый лѣсъ.

**ЕРЛЫКЪ**. Записочка съ обозначеніемъ названія. Надпись. Сигнатура.

**ЕСТЕСТВЕННОЕ** семейство. Отрядъ, группа схожихъ родовъ растений.

**ЖАВА**. Лягушка съ бородавками, весьма полезное въ садоводствѣ и огородничествѣ животное, питающееся наѣвками, наносщими вредъ растеніямъ.

**ЖАКАРАНДА** (*Jacaranda*). Бразильское мѣстное названіе. С. биньоніиныхъ. (30). Троп. Америка. Тепл. кустар. или дрв. pp., нѣсколько похожія на Акацію. Смѣсь изъ песков. торф. и волоки. глин. дерн. Черенками изъ зрѣлаго роста, лѣтомъ, въ песокъ, въ теплѣ.

**Ж. мимозифолія** (*J. mimosifolia*, съ

л. мимозы). Бразилія. Цв. голубые, рано лѣтомъ. 10 ф. Кустъ. **Ж. томентоза** (*J. tomentosa*, пушистая). Мексика. Цв. темно-пурпуровые, снаружи пушистые, въ июнь. 20 ф. Кустъ.

**ЖАКЕМОНТІЯ** (*Jacquemontia*). Жакемонъ (*Victor Jacquemont*)—французскій натуралистъ и путешественникъ по Остиндіи. С. вьюнковыхъ. (36). Троп. Африка и Америка. Теплич. вьюн. pp. Ухоть какъ за Ипомея.

**Ж. violасценсъ** (*J. violascens*, фиолетовая). Мексика до Бразиліи. Цв. блѣдно-голубые, съ июля до сентября, 6 ф. **Ж. канесценсъ** (*J. canescens*, сѣвчатая). Богота. Цв. сніе, въ июнь—июль, 6 ф.

**ЖАКІНІЯ** (*Jacquinia*). Н. Ж. Жакъ (*Jacquin*)—проф. ботаники въ Лейпцигѣ, знаменитый ботаникъ, † 1817. С. прищипанныхъ. (6). Троп. Америка. Теплич. куст. pp. Песков. торф. съ небольшимъ колич. волокист. глин. дерн. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ песокъ, въ парникѣ. Темп. лѣтомъ 13—26, зимой 12—15°.

**Ж. армиллярисъ** (*J. armillaris*, бра-летная). Вестиндія. Цв. бѣлые, въ июль. Коричневые съ желтымъ, сѣмена напыляются и носятся какъ браслеты въ Вестиндіи. **Ж. аурантиака** (*J. aurantiaca*, оранжевая). Сандвичевы о. Цв. оранжевые, съ апрѣля до сентября. 3—6 ф.

**ЖАСМИНЪ**. См. Ясминумъ. **Ж. ВОЗДУШНЫЙ** или **САДОВЫЙ**. См. Филадельфусъ.

**ЖЕЛВАЧНИКИ** (*Cecidomya*). Мелкіе комары, личинки которыхъ причиняютъ урождания и наросты на pp.

**ЖЕЛЕЗА**. Органъ, вырабатывающій сокъ.

**ЖЕЛОВОКЪ**. Длинная и узкая впадина.

**ЖЕЛѢЗНОЕ ДЕРЕВО**. См. Парротія.

**ЖЕЛѢЗНЯКОВЫЯ** pp. См. вербеновые.

**ЖЕЛѢЗНЯКЪ**. См. Фломисъ.

**ЖЕЛТОГОЛОВНИКЪ**. См. Мелямпирумъ.

**ЖЕЛТОДРЕВЕСНИКОВЫЯ** pp. (*xanthoxyleae*). Семейство, слитое съ рутовыми раст. (*rutaceae*).

**ЖЕЛТОФІОЛЬ**. См. Хейрантусъ.

**ЖЕЛТЯНИЦА**. См. Барбареа.

**ЖЕЛУДНИКОВЫЯ** pp. (*hippocastaneae*). Прежде составили отдѣльное семейство, соединенное нынѣ съ мыловниковыми растеніями (*sapindaceae*).

**ЖЕЛУДЬ**. Плодъ дуба.

**ЖЕЛЬСЕМІУМЪ** (*Gelsemium*). *Gelsemium*, по итальянски, значить жасминъ. С. логаніевыхъ (3). С. Америка, Суэцкая, Китай. Оранж. вьюн. кустарн. pp. Сильная глин. дерн. Черенками въ парникѣ. **Ж. семпервиренсъ** (*G. sempervirens*, всегда зеленый). Юж. Соед. Шт. Цв. ярко-желтые, душистые, весной. Спн. *Ж. нитидумъ* (*G. nitidum*).

**ЖЕНИШОКЪ МЕКСИКАНСКІЙ**. См. Агератумъ.

**ЖЕНСКІЙ ЦВѢТОКЪ**. Содержащій пестикъ или пестики.

**ЖЕСТКОКРЫЛЫЯ**. Обширный отдѣлъ наѣвковыхъ, по просту называемый жуками и заключающій въ себѣ очень много вредныхъ для pp. животныхъ, какъ въ совершенномъ состояніи, такъ и въ личинкахъ.

**ЖИГУНѢЦЪ**. См. Клематисъ.

**ЖИДОВНИКЪ**. См. Мирікарія и Халимохендронъ.

**ЖИЖА НАВОЗНАЯ**. Жидкое удобреніе.

**ЖИЛИВЕРТІЯ** (*Gilibertia*). Жильберъ (*Gilbert*), † 1814, — француз. ботаникъ и врачъ. С. аралиевыхъ. (3). Троп. Америка. Теплич. куст. pp. Песчан. торф. съ волокист. глин. дерн. Черенками изъ молодого роста, въ парникѣ. Темп. лѣтомъ 13—22, зимой 7—10°.

**Ж. бразиліенсисъ** (*G. brasiliensis*, бразильская). Цв. зеленоватые, въ февралѣ—мартѣ. 4—6 ф.

**ЖИЛКА**. Нервъ. Выдавшіеся на листьяхъ ребрышки, сквозящая въ ткани листа сѣтъ.

**ЖИЛЬЕВІЯ** (*Gilliesia*). Жилье (*Gillies*)—д-ръ въ Чили. С. лилейныхъ (3). Чили. Оранж. лукович. pp. Глин. дерн. съ торф. Отпрысками.

**Ж. граминѣя** (*G. graminea*, травянистая). Вальпарайсо. Цв. зеленые, въ сентябрѣ. 1 ф.

**ЖИМОЛОСТНЫЯ** pp. (*saprifoliaeae*). Довольно многочисленное сем. изъ кустарниковъ и травянистыхъ, иногда вьющихся растений съ макушечными цвѣтами въ полусонтикахъ или угловыми; вѣнчикъ верхній, правильный или неправильный. Листья супротивные, безъ прилистниковъ. Наиболѣе известные роды: Вибурнумъ, Линнея, Лонгера и Самбукусъ.

**ЖИМОЛОСТЬ**. См. Лонгера.

**ЖЕРАРДІЯ** (*Gerardia*). Джонъ Жерардъ (*Gerard*), † 1607, — авторъ знаменитаго «Herbal» и искусный садовникъ. С. поричниковыхъ. (30). Ю. и С. Америка. Одно- и многол. трав. pp. Сильная, рыхлая. Сѣменами.



**Ж.** кверцифолія, (*G. quercifolia*, съ лл. какъ у дуба). Соед. Шт. Цв. желтые, въ июль—августъ. Многол. **Ж.** педикуларія (*G. pedicularia*, вишвал). Соед. Шт. Цв. желто-лимонные. 2—3 ф. Многол. **Ж.** пурпуреа (*G. purpurea*, пурпуровая). Соед. Шт. Цв. пурпуровые, въ июль. 1—2 ф. Однол.

**ЖИРОВОЙ** побѣгъ. Не образующій плодonoсныхъ почекъ, а только листовыхъ.

**ЖОФРЕА** (*Geoffrea*). Д-ръ *Жоф-фра* (*Geoffroy*) — французъ, авторъ „*Materia medica*“. С. бобовыхъ. (4). Троп. Америка. Тепл. деревня. Торфъ съ глини. Черенками изъ зрѣлаго роста въ песокъ, въ парникъ. Темп. лѣтомъ 15—20, зимой 7—10°.

**Ж.** спинулоза (*G. spinulosa*, иглистая). Бразилія. Цв. желтые, вѣтки съ губчатою корою. **Ж.** суперба (*G. superba*, превосходная). Бразилія. Цв. желтые. 24 ф.

**ЖУЖЕЛИЦА.** Жукъ, истребляющій другихъ вредныхъ въ садоводствѣ насекомыхъ.

**ЖУКЪ.** Общее названіе жесткокрылыхъ.

**ЖУРАВѢЛЬНИКЪ.** См. Гераніумъ.

**ЖЮССЬЕА** (*Jussieu*). По цѣлому ряду ученыхъ *Жюссѣ* (*Jussieu*). С. онагриновыхъ. (30). Троп. Америка. Тепл. или оранж. кустарникъ, рѣдко дерев. рр. Глини. дерн. Сѣменами или дѣленіемъ.

**Ж.** овалифолія (*J. ovalifolia*, съ яйцевидными лл.). Мадагаскаръ. Цв. бѣлые. **Ж.** репенсъ-грандифлора (*J. repens-grandiflora*, ползучая крупноцвѣтная). С. Америка, по болотамъ. Цв. желтые, съ мая по августъ. 2—3 ф. **Ж.** фрутесценсъ (*J. frutescens*, кустарная). Цв. желтые, въ июль.

**ЗАВОЛОНЪ.** Наружные молодые, не отвердѣвшіе еще слои древесныя, подъ корою, подъ болонью, мезгой.

**ЗАВОРНИКЪ.** Чѣмъ забранъ заборъ, изъ чего онъ сдѣланъ,—досокъ, пластинъ, жердей.

**ЗАВОТВѢТЬ.** Зарости густо сорной травой.

**ЗАВРѢЗГАТЬ** пескомъ. Посыпать самымъ тонкимъ слоемъ песку мелкія посѣянные сѣмена. Приемъ, употребляемый для предупрежденія подгниванія, — подпыванія молодыхъ всходовъ.

**ЗАВЯДАТЬ. ЗАВЯНУТЬ.** Винуть, начинать блекнуть, увядать.

**ЗАВЯЗЬ. ПЛОДНИКЪ. ЯИЧНИКЪ** (*ovarium*). Часть пестика, содержащая лички и несбывающаяся изъ явнoцвѣтныхъ только у хвойныхъ, цикадей и хвойныхъ. Молодой плодъ, только-что образовавшійся.

**ЗАГЛУШАТЬ.** Оспливать однимъ растеніемъ другія, отнимать отъ нихъ просторъ, свѣтъ и воздухъ.

**ЗАЖИВАТЬ.** Заростать. Затягиваться. Пораненіе заживаетъ защитою отъ воздуха—замазкою или обверткою. Рана обрѣзаннаго сука или вѣтви заживается тѣмъ скорѣе, чѣмъ ровнѣе она сдѣлана острымъ ножомъ, какъ можно ближе къ мѣсту выростанія.

**ЗАКАПЫВАТЬ.** Зарывать, класть въ яму и заваливать землей. Отличается отъ прикапывать, когда р. только нижними частями закапывается въ землю.

**ЗАКЛЮКА.** Крючокъ изъ развѣтвленной вѣтки, для прикрѣпленія припильнаго отводка.

**ЗАКОМЕЛЬНЫЙ. ЗАКОМЛИСТЫЙ. ЗАКОМЛЯСТЫЙ.** Стволъ съ толстыми комлями.

**ЗАКОРЕНИТЬСЯ.** Укрѣпиться корнями, которые вновь образовались.

**ЗАКОРМИТЬ** гряду. Поставить кромки, обнести досками, чтобы не осыпалась земля.

**ЗАКРѢТЬ.** См. Десмодиумъ.

**ЗАКѢТЫВАТЬ.** Обвертывать и обвязывать рогожей, соломой, хвоей, отъ стужи и животныхъ.

**ЗАЛАМЫВАТЬ.** Надламывать, сгибать угломъ вѣтви или побѣгъ, для привлеченія сока.

**ЗАЛИВАТЬ.** Дѣлать неумѣренную поливку, отчего должно погибнуть растеніе. Заморить излишней поливкой.

**ЗАЛУВЕНѢТЬ.** Покрѣпиться лубомъ, дубянымъ слоемъ.

**ЗАЛУЖИТЬ.** Дать мѣсту зарости дерномъ. Образовать газонъ, лугъ.

**ЗАМАЗКА.** Всякій составъ, въ видѣ тѣста, для замазыванія, составляемый изъ мѣла и масла. При замазываніи класть замазку ровно, по сухому мѣсту и въ сухое время. Замазка на сыромъ маслѣ имѣетъ преимущество болѣе ровнаго высыхания безъ трещинъ.

**ЗАМАЧИВАТЬ.** Напитать водою, промочить: мочалу для привязки, также посуду, горшки.

**ЗАНАВОЖИВАТЬ.** Завалить, удобрить навозомъ.

**ЗАНОГТИЦА.** См. Паронихія.

**ЗАПАХЪ.** Что слышится обонаніемъ; хорошее—благоніе, дурное—вонь.

**ЗАПУСКАТЬ. ЗАПУСТИТЬ.** Оставить на произволъ: безъ очистки, безъ полотья, безъ ухода.

**ЗАРАЗИХОВЫЯ** рр. (*orobancha-*

сеа). Безлистья, чужеродныя травянистыя растенія различнаго, кромѣ зеленого, цвѣта, встрѣчаемыя въ Европѣ, Сѣв. Америки и тропикъ. Азіи, Африкѣ и Южн. Австраліи. Видовъ 150, родовъ 11. Наиболѣе извѣстенъ родъ Оробанхе.

**ЗАРОДЫШЪ.** Прозвѣщающее начало въ сѣмени, пускающее изъ себя стебель и корень.

**ЗАРОСТЬ.** Часть, выходящая при посѣвѣ споры папоротника, хвоща, моха, на которой находятся органы, утолщаемые, по значенію, половымъ органамъ явнoцвѣтныхъ.

**ЗАСАДОКЪ.** Засаженная часть огорода, сада и пр.

**ЗАСКОРѢЗНУТЬ.** Засохнуть. Зачерствѣть.

**ЗАСТУПЪ.** Желѣзная лопата разнoй величины для копки, на деревянномъ черенѣ, или окованная внизу лопата. Необходимое садовое орудіе. Владѣть заступомъ не такъ легко и просто какъ обыкновенно думаютъ, и между умѣлымъ и неопытнымъ рабочимъ въ этомъ случаѣ замѣчается большая разница. Умѣть владѣть заступомъ научаетъ только практика, требующая, чтобы перекопанное мѣсто имѣло ровную поверхность. Нужно умѣть одинаково ловко копать держа верхъ череня и правой и лѣвой рукой. При окапываніи мѣста пронизаннаго корнями вмѣсто заступа лучше употребить вилы. Заступъ по окончаніи работы должно обтирать и хранить подъ навѣсомъ, — заржавѣвшимъ заступомъ работать трудно.

**ЗАСУШИТЬ.** Погубить растеніе отъ недостатка влажности.

**ЗАТРАМБОВАТЬ.** Убить землю ручной бабой, толмачемъ, трамбовкой.

**ЗАТРУСИТЬ.** Засыпать мелкимъ пескомъ или землей, напр. сѣмена, которая не углубляютъ, или соломой для легкой покрывки на зиму растений или на время всхода сѣмянъ.

**ЗАТѢНЕНІЕ.** Тамъ гдѣ нужно, дается не съ полнымъ устраненіемъ солнца, а съ нѣкоторымъ только ограниченіемъ его свѣта. Постоянное затѣненіе ослабляетъ рр., поэтому когда солнца нѣтъ—оно снимается.

**ЗАУВѢЙ.** Мѣсто подъ тѣною, гдѣ плохо растетъ.

**ЗАХВОИВАТЬ. ЗАХВЮТЬ.** Покрывать хвоей или хворостомъ и соломой.

**ЗАЩИТА.** Весьма важна при содержаніи нѣжныхъ рр. Мѣстность, защищенная всегда въ этомъ случаѣ лучше открытой, а когда ее нѣтъ, прибѣгаютъ къ искусственной. Особенно она необходима

отъ холода и вѣтра. Защита состоитъ также въ различнoй обвязкѣ рр., связываніи нѣсколькихъ въ одинъ пучекъ, закрываніи корней матеріаломъ, не пропускающимъ холода, нагребаніи сѣнга и т. п.

**ЗАЯЧЬЯ СОЛЬ.** См. Широлія.

**ЗВОНЕЦЪ.** См. Рипантусъ.

**ЗВОНКОЕ** яблоко. См. дынное.

**ЗВѢРОВОЙ.** См. Хиперикумъ. **З. СИНИЙ.** См. Дракоцефаломъ.

**ЗВѢРОВОЙНЫЯ** рр. (*hypericineae*). Травянистыя, кустарныя, рѣдко древесныя раст., имѣющія 8 родовъ и 210 видовъ, распространяющихся по умѣреннымъ и теплымъ странамъ земной поверхности. Многіе виды содержатъ въ себѣ желтый млечный сокъ и жирное масло; нѣкоторые имѣютъ послабляющія, другія — вяжущія свойства. Изъ родовъ особенно важны Асцидумъ, Харонга и Хиперикумъ.

**ЗЕММАННІЯ** (*Seemannia*). В. *Земманн* (*Seemann*) — ботаникъ и путешественникъ, † 1871. С. геснеріевыхъ. (1). Тепл. многол. трав. р. Ухождъ какъ за Геснера.

**З. сильватика** (*S. sylvatica*, лѣсная). Перу. Цв. ярко-шарлаховые, зимой. 3 — 4 ф.

**ЗЕЛЕНОЦВѢТНЫЯ** (*chloranthaceae*). Семейство тропич. древесныхъ или кустар., рѣдко травяни. рр. съ мелкими цв. Изъ немногихъ родовъ наиболѣе извѣстенъ *Хлорантусъ* (*Chloranthus*), у одного вида, — *Х. никотинкуса* (*Ch. nicotinicus*) цв. мелкіе, пахучіе, которые, говорятъ, кладутся китайцами въ чай, для аромата.

**ЗЕЛЕНЪ.** Лиственная одежда растеній: древесная листва, огородная трава, полевая—листья травы. Также огородная овощъ и преимущественно лиственная.

**ЗЕЛѢНЫЙ.** Цвѣтъ травы разныхъ оттѣнковъ, даваемый хлорофилломъ.

**ЗЕМЛЯНАЯ ГРУППА.** См. Хелипантусъ. *З. бляха*. См. Бляшки. *З. ладонъ*. См. Валеріана. *З. орехи*. См. Арахисъ.

**ЗЕМЛЯНИКА.** См. Фрагарія.

**ЗЕМЛЯНОЙ ЧЕРВЪ. ДОЖДЕВОЙ ЧЕРВЪ.** Питается не растеніемъ, а наземными частями земли, поэтому вредитъ только своими норами.

**ЗЕМЛЯ.** Почва, слой болѣе или менѣе глубокой. Въ садоводствѣ употребляются слѣд. земли: *вересковая* (изъ сопрѣвшихъ листьевъ и вѣтвей вереска, замѣняемая почти у всѣхъ заграничныхъ садоводовъ торфяной), *дерновая*, глинисто и песчанисто дерновая (изъ перепрѣвшихъ дернинъ), *комлостная* (прослоенная какимъ



побудь удобреніемъ) и *торфяная* (изъ перегнившего торфа). Кромѣ того *песокъ*, который долженъ быть чистый, болѣе или менѣе крупный, рѣчной или вымывъ отъ жвакнстыхъ частей.

**ЗЕМНОВОДНОЕ РАСТЕНІЕ.** Живущее и въ водѣ и на сушѣ.

**ЗЕРНО.** Съёмка растений.

**ЗЕРНОВКА.** Одногнздный и односѣмянный плодъ съ перепончатой оболочкой, прнрощенъ къ сѣмени (пшено, кукуруза и плоды др. хлѣбныхъ злаковъ).

**ЗЕРНОВКА ГОРОХОВАЯ** или **ГОРОХОВИКЪ**. Чернаго цвѣта жучокъ, личинка котораго живетъ въ горошинахъ и бобинкахъ, завезенный въ Европу, гонорятъ изъ Америки въ XVIII столѣтіи. Яички складываются на молодые стручки; выходящія изъ нихъ личинки прогрызаютъ стручокъ, выдѣляются въ мягкія зерна и въ нихъ остаются на зиму, превращаясь въ куколку, а весной вылетая жучкомъ. Присутствіе личинки въ сѣмени узнается по темному пятну на кожнѣ или по ея прозрачности въ какомъ нибудь мѣстѣ. Въ предупрежденіе размноженія этого жучка должно сѣять только отборными сѣменами, или поруженіемъ бобовъ и гороха съ признаками присутствія въ нихъ личинки въ кипяткомъ, но не болѣе какъ на минуту, иначе сѣмена теряютъ всхождсть.

**ЗИБЕРА (Siebera).** *Zieber* (Sieber) — чехъ, ботаникъ, путешествовавшій по Востоку, † 1844 г. С. зонтичныхъ (14). Австралія. Оранже. многол. трав. рр. Уходъ какъ за Трахимаемъ.

**З. Бильярдьері ланцетолата** (*S. Billaudieri lanceolata*; Бильярдьері ланцетовидная). Цв. бѣлые. 2—3 ф.

**ЗИГЕСБЕКІЯ (Siegesbeckia).** *Zigeebeck* (Siegesbeck) — германскій ботаникъ. С. сложноцвѣтныхъ. (2). Перу. Тропич. страны. Однол. травяни. обыкн. садовая. Сѣменами.

**З. оріенталисъ** (*S. orientalis*). Подъ тропиками. Цв. гол. желтые, въ августѣ, 2 ф.

**ЗИГОСПОРА.** Споры нитчатыхъ водорослей, производящая новое недѣлимое

**ЗИМА.** Время года между осенью и весной, отъ иступленія солнца въ знакъ козерога (9 декабря) до вступленія его въ знакъ овна (8 марта).

**ЗИМНІЙ ПЛОДЪ.** Сохраняющійся до зимы и дѣлающійся тогда годнымъ къ употребленію.

**ЗИМОВАТЬ.** Провести, продержать зиму.

**ЗИМУЮЩІЯ** р. Переносища зиму на воздухъ.

**ЗИННИНГІЯ (Sinningia).** *Zinning* (Sinning) — университетскій садовникъ въ Боннѣ. С. геснеровыхъ. (16). Бразилія. Тепл. многол. трав. рр. Уходъ какъ за Глоксиніей.

**З. концинна** (*S. concinna*, красивая). Цв. въ верхн. части пурпуровые, въ нижней — желтые, лѣтомъ и осенью **З. конспиква** (*S. conspicua*, поразительно-красивая). Цв. желтые, 1 ф. Снн. *Билландирия конспиква*, *Розанбоія конспиква*, *Р. орната* (*Biglandularia conspicua*, *Rosanova conspicua*, *R. ornata*). **З. спеціоза** (*S. speciosa*, отъинная). Цв. типическіе фіолетовые, но у разновидностей и гибридовъ различно окрашенные; эти формы сливаются подъ садовымъ названіемъ Глоксиній. Снн. *Глоксинія Пассингеміи* (*Gloxinia Passinghamii*), *Г. спеціоза* (*G. speciosa*), *Лигерія спеціоза* (*Ligeria speciosa*). **С. Юнгіана** (*S. Juingiana*, Юнга). Цв. фіолетовые или пурпуровые, лѣтомъ, 1 — 1½ ф. Гибридная форма.

**ЗЛАКИ (gramineae).** Однолѣтнія или многолѣтнія травянистыя рр., въ просторѣчьи „травы“. Семейство это широко распространено по всей земной поверхности и занимаетъ первостепенное мѣсто въ числѣ полезныхъ для человѣка и его домашн. животныхъ. Хлѣбные злаки — слѣд.: *пшеница* (*Triticum sativum*), *рожь* (*Secale cereale*), *ячмень* (*Hordeum vulgare*, *distichum* и пр.), *овесъ* (*Avena sativa*) — разводимые кавказскимъ племенемъ въ сѣверномъ и умѣренномъ поясахъ; *рисъ* (*Oryza sativa*), *просо* (*Panicum miliaceum*) — распространенные между азіатскими племенами. Сюда же относятся *сахарный тростникъ* (*Saccharum officinarum*), — дико растущій въ тропической Азіи правдоимый весьма давно въ Остиндіи. Многие злаки употребляются въ лекарства (разные виды *Triticum*, *Cynodon*, *Dactylon*, *Andropogon*, *Arundo Donax*, *Calamagrostis* и др.). Въ садахъ также разводятъ нѣкоторые орнаментальныя злаки (*Arundinaria falcata*, *Metake*, *Arundo Donax*, *mauritanica*, *Bambusa arundinacea*, *Gynerium argenteum*, *Panicum plicatum*, *Phalaris arundinacea* и пр.).

**ЗМЪВІВІКЪ.** См. Орхисъ.

**ЗМЪВКА.** См. Гераніумъ.

**ЗОВНИЦА.** См. Педикулярисъ.

**ЗОЗУЛЬКИ РЯБЫЯ.** См. Ципринидіумъ.

**ЗОЛА.** Землистые или минеральныя части, остающіяся послѣ сжженія горючаго тѣла. Составляетъ одно изъ лучшихъ удобреній. Зола *растений* (и торфяная) весьма полезна въ мокромъ, холодномъ грунтѣ; зола *каменнаго* угля — тоже хороша для удобренія, но хуже пер-

вой; если въ ней много окалины, то она лучше для тяжелой, нежели для легкой земли.

**ЗОЛОТАРЕВКА, ЗОЛОТАРЕВ-СКОЕ ЯБЛОКО.** Поздній сортъ, рѣпообразной формы, зеленоватаго цвѣта; дозрѣвая въ лѣтѣ пріобрѣтаетъ хороший вкусъ и рассыпчатую мякоть.

**ЗОЛОТУШНИКОВЫЯ** рр. См. поричниковыя.

**ЗОЛЬНИКЪ.** См. Антильскій.

**ЗОНА.** Полоса, поясъ, черта идущая вокругъ листа или плода.

**ЗОНТИКЪ.** Цвѣтрасположеніе въ видѣ ручного зонтика.

**ЗОНТИЧНЫЯ** рр. (*umbelliferae*). Травянистыя, рѣдко древесныя рр., распространеныя преимущ. по сѣв. полушарію. Если въ этихъ рр. мало декоративныхъ, то этотъ недостатокъ съ избыткомъ пополяется полезными огородными, — морковъ, петрушка, сельдерей, кервель, анисъ, укропъ, принадлежатъ къ зонтичнымъ. Въ семействѣ считаютъ болѣе 150 родовъ и 1300 видовъ. Представителями можно назвать: *Аніумъ*, *Даукусъ*, *Миррисъ*, *Нартексъ*, *Пеucedанумъ*, *Сіумъ*, *Смирніумъ*.

**ЗООСПОРА.** Крупинка, обладающая способностью двигаться и размножатъ безполовымъ способомъ низшія рр. Она состоитъ изъ тѣла съ заостреннымъ концомъ и рѣсничекъ, помощью которыхъ движется въ водѣ.

**ЗРѢЛОСТЬ.** Состояніе зрѣлаго, окончившаго свое развитіе.

**ЗУДЕНЬ (Tetrachus telarius или Acarus telarius)** или *паучекъ*. Маленькій, едва замѣтный простымъ глазомъ паучекъ, поселяющійся на нижней сторонѣ лл. рр. содержимыхъ сухо и наносящій значительный вредъ. Увлажненіе опрыскиваніемъ признается существенно полезнымъ средствомъ отъ нападенія этого паразита.

**ЗѢВЪ.** Глубина полости въ цвѣточныхъ частяхъ. Продолженіе устья сростно-лепестнаго цвѣточнаго покрова.

**ЗЯБРА.** См. Галеопсисъ.

**ИВБЕРТСОНІЯ (Ibbertsonia).** Миссисъ Агнесъ *Иббертсонъ* (Ibbertson), — авторъ многихъ работъ по раст. физиологии. С. бобовыхъ. (3). Мысъ Д. Н. Оранже. куст. рр. Песч. глинисто-дерн. съ волокн. торф. Сѣменами въ парникѣ, весной, или черенками изъ боковаго роста, въ песокъ, въ апрѣль — май, подъ колпакомъ. Темп. зимой 4—6°.

**И. генистойдесъ** (*I. genistoides*, походящая на гениста). Цв. желтые, лѣтомъ.

**ИБЕРИДѢЛІЯ (Iberidella).** Уменьшительное Иберисъ. С. крестоцвѣтныхъ. (6). Европа, Сирія, Персія, Мал. Азія, Гималаи. Травяни. или полу-кустар. горныя рр. Легкая. Сѣменами и дѣлещемъ.

**И. ротундифолія** (*I. rotundifolia*, круглолистная). Европ. Альпы. Цв. лилово-розовые съ желтымъ глазкомъ, пахучіе, въ апрѣль. 3—6 д.

**ИБЕРИСЪ (Iberis).** *Iberia* — древнее названіе Испаніи. С. крестоцвѣтныхъ. (20). Южн. Европа, Зап. Азія. Одно- и двул. травяни. либо полукуст. рр. Обыкновен. садов. Сѣменами, въ мартѣ или апрѣлѣ, либо въ августѣ или сентябрѣ. Полукустарныя также черенками или дѣленіемъ.

**И. гибрильтарика** (*I. gibraltarica*, гибралтарскій). Гибралтаръ. Цв. бѣлые съ розовымъ или малиновымъ отблескомъ, рано весной. 1—2 ф. **И. коронарія** (*I. coronaria*, съ цв. вѣнкомъ). Отечество неизвѣстно. Цв. бѣлые, удлинненными головками, въ іюль. Однол. 1 ф. **И. корреѳолія** (*I. corraefolia*, съ лл. какъ у коррѣя). Цв. бѣлые, крупные, плоскими головками, въ май и іюнь. Садов. гибриды, полу-кустар. роста, размножаемый отводкой или черенками. **И. саксаѣтилс** (*I. saxatilis*, скальный). Юж. Европа. Цв. бѣлые, щитками, весной и лѣтомъ. 3—6 д. Куст. **И. семперфлоренсъ** (*I. semperflorens*, постоянно цвѣтущій). Италія. Ц. бѣлые, крупные, пахучіе, осенью и весной. Многол. съ неоппадающимъ л. Нижнее р. 1—2 ф. **И. семпервиренсъ** (*I. sempervirens*, постоянно зеленый). Юж. Европа. Цв. бѣлые, весной и лѣтомъ. 9 — 12 д. Куст. **И. Тенорейна** (*I. Tenoreana*, Теноре). Ю.-З. Европа. Цв. пурпуровые или бѣловатые, въ май. Многол. трав. 6 д. **И. умбеллѣлата** (*I. umbellata*, зонтичный). Южн. Европа. Цв. обычно пурпуровые, но бываютъ и иной окраски, зонтиками, весной и лѣтомъ. 6 — 12 д. Имѣетъ нѣсколько разновидностей по окраскѣ цвѣтовъ и росту самого р.

**ИВА.** См. Саликсъ.

**ИВОВЫЯ** рр. (*sallicineae*). Деревья и кустарники преим. сѣвернаго умѣреннаго и холоднаго климата, немногіе растутъ въ Южн. Африкѣ и Ю. Америкѣ. 2 рода (Популюсъ и Саликсъ), видовъ по однимъ 150, по другимъ 300.

**ИГЛА.** Остроконечная одревенѣлая часть, которая торчитъ изъ стебля или вѣтки. **И. Христовѣ.** См. Паллурусъ.

**ИДЕЗІЯ (Idesia).** *Iobrantz Idesia*



(*Xobrantia Ides*), голландский путешественник по Китаю. С. бисовых. (1). Япония. Высокое орнам. дерево, выносящее умфр. климат. Весной и осенью черенками из полувзрѣвшаго роста, в песковатой глин.-дерн., в парникъ; либо сѣменами также в парникъ.

**И. поликарпа** (*I. polycarpa*, многоплодная). Цв. двудомные, безлепестковые, дл. большие, сердцевидные. Син. *Поликарпа Максимовича* (*Polycarpa Maximowiczii*) и *Максимовича японика* (*Flacourtia japonica*).

**ИЗАТИСЪ** (*Isatis*). *Isaro* — ровнять, в предположении, что р. дѣлает кожу гладкою. С. крестоцвѣтныхъ. (30). Южн. Европа и З. Азия. Одно- и двулѣт. трав. рр. Сѣменами весной, во всякой садовой землѣ.

**И. тинкторія** (*I. tinctoria*, красильный). *Синилинъ*. Европа и С. Азия. Цв. желтые, несной. 2—4 ф. Двулѣт. Даетъ сплюснутую краску.

**ИЗВЕСТЬ**. Известковая земля; углекислая известь (кальций); пережженный известнякъ.

**ИЗГОРѢ ЖИВАЯ**. Тынъ, насаждение в видѣ забора или сплошной стѣны; дѣлается изъ кустарныхъ и древесныхъ растений, частью какъ ограда, частью же для раздѣленія частей сада. Вновь посаженная требуетъ большого вниманія, — подвязки, очистки земли отъ сорныхъ травъ и разрыхленія, а иногда и поливки земли; в послѣдствіи уходъ за ней ограничивается надлежащей обрѣзкой.

**ИЗОМЕРИСЪ** (*Isomeris*). *Isos* — равный и *meris* — часть; лепестки, тычинки и столбики одной длины. С. канарскихъ. (1). Калифорнія. Полувыносл. куст. р. Песков. глин. дерн. сѣ лиственной. Черенками изъ зрѣлаго роста, осенью.

**И. арбореа** (*I. arborea*, древесный). Цв. желтые, крупные, в маѣ. 10 ф.

**ИЗОЛОМА** (*Isoloma*). *Isos* — равный и *toma* — край; у вѣтвика лопасти ровныя. С. геснеріевыхъ. (60). Зап. полушаріе. Тепл. трав. рр. Уходъ какъ за Геснера.

**И. хондэнзе** (*I. hondense*, Хондеская). Хонда, Нов. Гренада. Чашечка сѣ красными зубчиками, вѣтвникъ желтый, в декабрь. 1 ф. При вѣтваторой спаровки, можно заставить цвѣсти во всякое время года. Син. *Геснерія хондэнзисъ* (*Gesneria hondensis*).

**ИЗОНАНДРА** (*Isonandra*). *Isos* — равный и *andros* — мужъ; число плодоносныхъ и безплодныхъ тычинокъ тоже С. сапотовыхъ. (6). Индія, Цейлонъ. Тепл. деревья сѣ млечнымъ сокомъ. Песков. торф. сѣ волоками. глин. дерн. Черенками изъ пескѣ, в парникѣ.

**И. гутта** (*I. gutta*). *Гутта-перчевос дерево*. Борнео. Цв. незначительные, дл. кожистые. Настоящее названіе дерева, дающаго гутта-перчу, есть *Дихорписъ гутта* (*Dichorpsis gutta*).

**ИЗОПІРУМЪ** (*Isopyrum*). *Isos* — равный и *pyrus* — пиенца. С. лютиковыхъ. (7). Умфр. страны сѣвер. полушарія. Многол. низкорослыя трав. рр. Упоминаемый ниже видъ встрѣчается в садахъ, размнож. сѣменами и довольствуется всякою садовою з.

**И. таликтроидесъ** (*I. thalictroides*, похожий на василистникъ). Европа. Цв. мелкіе, бѣлые, весной. 9—15 д.

**ИЗОПЛѢКСИСЪ** (*Isoplexis*). *Isos* — равный и *plexis* — складывать; верхній сегментъ чашечки одной длины сѣ губой. С. поричниковыхъ. (2). Мадера, Канарскіе о. Оранже. куст. рр. Песков. глин. дерн. сѣ лиственной. Черенками изъ полувзрѣлаго роста в пескѣ, подъ стекломъ, весной.

**И. канаріензисъ** (*I. canariensis*, канарскій). Канарскіе о. Цв. золотисто-желтые, в июль. 3—4 ф. Син. *Дигиталисъ канаріензисъ* (*Digitalis canariensis*). **И. сцетрумъ** (*I. scetrum*, скипетровый). Мадера. Цв. желтовато-коричневые, в июль. 3—4 ф.

**ИЗОПОГОНЪ** (*Isopogon*). *Isos* — равный и *pogon* — борода, по бахромѣ у всего соцветія. С. протейныхъ. (29). Австралія. Оранже. кустар. рр. Волокн. глин. дерн. 3 ч., волокн. торф. 1 ч. и сѣмѣи изъ древ. угля сѣ толчеными черепками 1 ч. Черенками изъ зрѣлаго роста в пескѣ, в парникѣ. Темн. лѣтомъ 8—20, зимой 2—6°.

**И. анемونیфоліусъ** (*I. anemonifolius*, сѣ дл. какъ у анемона). Цв. желтые, в июль; дл. перисторазсѣч 4—6 ф. **И. кунеатусъ** (*I. cuneatus*, клиновидный). Цв. бѣдно-пурпуровые, в июль. Лл. удлинено-ланцетовидные. 7—8 ф. **И. лонгифоліусъ** (*I. longifolius*, длиннолиственный). Цв. желтые, в апрѣль. Лл. линейно-ланцетовидные. 2—8 ф. **И. розеусъ** (*I. roseus*, розовый). Цв. малиновые, в апрѣль; лл. перистые. 1—4 ф. **И. сфероцефалусъ** (*I. sphaerocephalus*, сѣ шаровидными головками). Цв. сѣ желтыми волосками в мартѣ. Лл. линейно-ланцетовидные. 4 ф.

**ИЗОТОМА** (*Isotoma*). *Isos* — равный и *toma* — сѣченіе, сегменты вѣтвника равныя. С. колокольчиковыхъ. (8). Австралія, Вестиндія. Тепл. и оранже. трав. многол. рр. Уходъ какъ за Лобелія.

**И. аксиллярисъ** (*I. axillaris*, угловая). Австралія. Цв. голубые, осенью. 1 ф. Многол. оранже. **И. лонгифлора** (*I. longiflora*, длинноцвѣтная). Вестиндія. Цв. бѣ-

лые, лѣтомъ. Многол. оранже. Очень ядовитое р.

**ИЗОТРОПИСЪ** (*Isotropis*). *Isos* — равный и *tropis* — киль, по формѣ ладьи. С. бобовыхъ. (8). Австралія. Оранже. трав. или полукуст. рр. Уходъ какъ за Хорннема.

**И. стріата** (*I. striata*, бороздчатый). Цв. желтые сѣ пурпуровыми черточками, крылья и ладьи пурпуровые, весной. 6—18 д. Син. *Хорннема спартіоидесъ* (*Chorizema spartioides*).

**ИЗОХІЛЮСЪ** (*Isochilus*). *Isos* — равный и *chilos* — губа. С. оранжей. (5). Мексика, Вестиндія до Бразилія. Тепл. эпифиты. Уходъ какъ за Целогице.

**И. линейарисъ** (*I. linearis*, линейный). Мексика. Цв. пурпуровые, весной. 1 ф.

**ИКАЦИНА** (*Isacina*). По сходству вѣтвей сѣ деревомъ, называемымъ Икако С. морщинниковыхъ. (4). З. троп. Африка. Тепл. кустар. рр. Сильная песчан. глин. дернов. сѣ лиственной. Черенками изъ молодого роста, в песчан. глин. дерновой, в парникѣ.

**И. Манны** (*I. Mannii*, Манна). Заливъ Гвинейскій. Цв. желтые, в октябрь. Корень — клубень. в 6—12 д. в діаметрѣ. Р. выносея.

**ИКСАНТУСЪ** (*Ixanthus*). *Isos* — омега и *anthos* — цвѣтокъ, по липкому цвѣтку. С. горечавковыхъ. (1). Канарскіе о. Оранже. двул. трав. р. Волокнистая глин. дерн.; мѣсто свѣтлое, освѣжаемое воздухомъ в оранжей. Сѣменами весной. **И. вискоза** (*I. viscosa*, липкій). Цв. желтые сѣ бѣлой трубкой, в июль. 1—1½ ф.

**ИКСІОЛІРИОНЪ** (*Ixiolirion*). Сочетаніе *Ixia* сѣ *Leirion* (лилія), т. е. лилія похожая на иксию. С. амариллисовыхъ. (2). Центр. Азия. Полувыносл. луковичныя рр. Легкая глин. дерн. Луковичы осторожно вынимаются осенью и сохраняются в зацѣтѣ отъ мороза.

**И. колпаковскіанумъ**, (*I. Kolpakowskianum*, — Колпаковского). Берегъ о. Сайрона. Цв. бѣлые или голубые, лѣтомъ 1 ф. **И. татарикумъ** (*I. tataricum*, татарскій). Сред. Азия. Цв. голубые, в июль. 1—1½ ф. Син. *И. монпанумъ* (*I. monpanum*).

**ИКСІЯ** (*Ixia*). Такъ названъ Теофрастомъ птичій клей, — р. дано это названіе по клейкому соку. С. косатиковыхъ. (25). Юж. Африка. Оранже. луковичн. рр. Песч. глин. дерн. сѣ листов. Отпрысками и сѣменами, отъ кот. на четвертый—пятый годъ луковичы зацвѣтаютъ.

**И. виридифлора** (*I. viridiflora*, сѣ зелеными цв.). Цв. зеленоватые сѣ крапин-

ками, в маѣ — июнь. 1 ф. Имѣетъ нѣсколько разновидностей. **И. капиллярисъ** (*I. capillaris*, волосная). Цв. тѣлесные, в апрѣль. 1½ ф. Син. *Морфи́ксія аулика* (*Morphixia aulica*). **И. макулата** (*I. maculata*, пятнистая). Цв. оранжевые в маѣ и июнь. 2 ф. **И. одората** (*I. odorata*, душистая). Цв. желтые, пахучие, в маѣ — июль. 1 ф. **И. патенсъ** (*I. patens*, пониклая). Цв. малиновые, в апрѣль. 1 ф. **И. специоза** (*I. speciosa*, отъинная). Цв. темно-красные, в маѣ — июль. 6 д. **И. гибрида** (*I. hybrida*, гибридная). Цв. бѣлые, в апрѣль — маѣ. 1 ф.

**ИКСОДІЯ** (*Ixodia*). *Ixodes* — липкій, по липкому выдѣленію р. С. сложноцвѣтныхъ. (1). Австралія. Оранже. куст. р. Песков. глин. дерн. сѣ небольшимъ кол. волокн. торф. Черенками изъ молодого роста, весной, в пескѣ, в парникѣ.

**И. ахиллеоидесъ** (*I. achilleoides*, похожая на ахиллею). Цв. головки бѣлые, в июль. 1½ ф.

**ИКСОРА** (*Ixora*). Названіе малабарскаго плода, которому приносятъ в жертву цв. пѣвот. видовъ этого рода. С. мареновыхъ. (100). Троп. Азия и Африка, а также частью Австралія и о. Тихаго Океана. Тепл. кустар. или низкія деревья рр. Волокн. торф. сѣ добавленіемъ лиственной и песку. Черенками сѣ короткими междоузліями и дов. твердыми, в песч. торф., в тепл. парникѣ.

**И. кокцинеа** (*I. coccinea*, шарлаховая). Остиндія. Цв. ярко-красные, лѣтомъ. Син. **И. грандифлора** (*I. grandiflora*). Имѣетъ нѣсколько разновидностей. **И. Колѣи** (*I. Colei*, Коля). Цв. бѣлые. Есть помѣсь **И. кокцинеа** сѣ **И. стріата альба** (*I. coccinea* + *I. striata alba*). **И. концинна** (*I. coccinea*, красивая). Цв. сначала лососевые, потомъ малиновые. Гибридъ **И. макротіреа** (*I. macrothyrsa*, сѣ крупными соцветіями). О. Ю. океана. Цв. темно-красные сѣ возрастаніемъ дѣлающіеся малиновыми. Син. **И. Дюффіи** (*I. Duffii*). **И. Пилгрими** (*I. Pilgrimii*, Пилгрима). Цв. ярко-оранжевые. Гибридъ **И. принцепсъ** (*I. princeps*, главный). Ява. Цв. бѣлые, перемѣняющіеся в красновато-оранжевые. **И. Уильямси** (*I. Williamsi*, Уильямса). Цв. красновато-лососевые. Пропехождение садовое. **И. фўльгенсъ** (*I. fulgens*, блистательная). Ява. Цв. красно-оранжевые. 3—4 ф. **И. яваніка** (*I. Javanica*, явайская). Ява. Цв. оранжевые, лѣтомъ. 3—4 ф.

**ИЛЕКСЪ** (*Ilex*). Такъ называлъ Виргилій дубъ. С. надубовыхъ. (145). Умфр. и троп. поясъ, обильно в Южн. Америкѣ, рѣдко в Австраліи и Африкѣ. Кустарн. и древ. рр., выносящія климатъ



сред. и южн. зап. Европы. Песковатая глинисто-дерн. Сѣменами, подобно Крайгусу, и черенками, а также прививкой. Цв. бѣлые.

**И. аквицоліумъ** (*I. Aquifolium*, съ колочими лл.). *Иадубъ*. Европа и З. Азія. Цв. полузонтикомъ. 10—40 ф. Плоды красные. Имѣетъ весьма много разновидностей съ простыми и пестрыми лл. разнообразныхъ формъ. **И. дипирема** (*I. dipirema*, двусѣмянный). С. Индія. Цв. мелкіе, угловые, въ апрѣль—маѣ; лл. эллиптические. Плоды темно-коричневые. 12 ф. **И. корнута** (*I. cornuta*, рогатый). С. Китай. Л. съ тремя ягодами, какъ бы рогами. **И. крената** (*I. crenata*, зубчатый). Японія. Цв. пониклые; лл. овальные, круглозубчатые. Имѣетъ нѣсколько разновидностей. **И. латифолия** (*I. latifolia*, широколиственный). Японія. Лл. овальные, тупые. 20 ф. **И. опака** (*I. opaca*, тусклый). Соед. амер. Штаты. Цв. рыхлыми пучками у основанія вѣтвей, въ маѣ—іюнь. Лл. овальные, плоскіе. 20—40 ф.

**ИЛЕМЪ. ИЛИМЪ. ИЛЬМА.** См. Ульмусъ.

**ИЛЬДЦЕБРОВЫЯ** (*Illecebraceae*). Семейство изъ 17 родовъ и 90 видовъ одно- и многолѣтнихъ травянистыхъ, рѣдко кустарныхъ или полу-кустарныхъ пр., встречаемыхъ преимущественно по жаркимъ и сухимъ странамъ, нѣкоторые растутъ и въ Южной Европѣ и Сѣв. Африкѣ. Изъ родовъ должно назвать Ильдцебрумъ, Маронихіа и Склерагустъ.

**ИЛЬДЦЕБРУМЪ** (*Illecebrum*). Названіе, заимствованное у Плинія. С. ильдцебровыхъ. (1). С. Африка и Зап. Европа. Однолѣт. выносливое р., предпочитающее влажную торф. землю. Размножается сѣменами.

**И. вертицилллатумъ** (*I. verticillatum*, колчатый). Цв. красивые, бѣлые, лѣтомъ. 1—3 д.

**ИЛЪ.** Глинистая, вязкая, мелкозернистая природою земля, обыкновенно на днѣ водъ, или осадокъ бывшихъ водъ.

**ИЛЬИЦИУМЪ** (*Illicium*). *Ильцио*—восхищать, по благоволю. С. магнолиевыхъ. (5). С. Америка, В. Азія. Полувыносл. куст. пр. Песков. глин. дерн. съ торф. На зиму сохранять въ оранжереѣ. Черенками изъ молодого роста, лѣтомъ, въ песокъ, подъ стекломъ.

**И. анисатумъ** (*I. anisatum*, съ запахомъ аниса). *Бадьянъ. Звѣздчатый анисъ*. Китай, Японія. Цв. желтоватые, мелкіе, лѣтомъ. 4 ф. Въ Японіи считается священнымъ деревомъ. Снп. **И. религіозумъ** (*I. religiosum*). **И. флориданумъ** (*I. floridanum*, флоридскій). Флорида. Цв. красивые, съ апрѣля до іюня. 8 ф.

**ИМАНТОФИЛЛЮМЪ** (*Imantophyllum*). *Imas, imantos*—ремень и *phyllo*—листь; по ремневиднымъ лл. С. амариллисовыхъ. Пр. эти теперь присоединены къ роду Кливія и приводятся здѣсь подъ прежнимъ названіемъ потому, что подъ нимъ все еще извѣстны въ садахъ. Волокн. глин. дерн. съ листовой и древ. углемъ. Полезно прибавлять дрв. уголь и костяную муку. Сѣменами и отпрысками.

**И. Гардени** (*I. Gardeni*, Гардена). Наталь и Трансваль. Цв. желтые или красно-оранжевые, зимой; лл. въ 1—2 ф. длиной. **И. миниатумъ** (*I. miniatum*, суриковый). Наталь. Цв. темно-оранжевые, весной и лѣтомъ. Лл. двусторонние, 1—2 ф. длиной. Имѣетъ нѣсколько гибридныхъ формъ. **И. циртантифлорумъ** (*I. cyrtanthiflorum*, съ цв. Циртантуса). Цв. лососевые или свѣтло-красные, большіе, съ болѣе свѣтлою среднею частью; зимой и весной. Полагаютъ, что это—гибридъ между *И. миниатумъ* и *Кливіа нобилис*.

**ИМВІРЬ** или **ИНВІРЬ.** См. Цингиверъ.

**ИМОРТЕЛИ.** См. Безсмертники.

**ИМПАЦИЕНСЪ** (*Impatiens*). *Impatiens*—непереносимый: по упругости плодика, съ которою онъ выбрасываетъ сѣмена. С. гераниевыхъ. (135). Оранж., или выносл., одно- или двул., иногда полукуст. пр. изъ тропич. Азіи и Африки, рѣдко Европы, С. Америки, С. Азіи и Южной Африки. Однол.—сѣменами, весной, въ обыкн. садов.; оранж.—черенками, въ парникѣ, или сѣменами. Вообще земля сильная, рыхлая.

**И. амфората** (*I. amphorata*—кубышечный). З. Гималаи. Цв. свѣтло-пурпуровые, въ августъ—сентябрь. 3—6 ф. Однол. **И. бальзамина** (*I. balsamina*). *Бальзаминъ*. Троп. Азія. Цв. красные, лѣтомъ. 1—2 ф. Снп. *Бальзаминъ жортезисъ* (*Balsamina hortensis*). Имѣетъ много садов. разновидностей съ простыми и махровыми цв., высокого и низкого роста. Оранжер. или полувыносл. **И. Вокери** (*I. Wokeri*, Уокера). Цейлонъ. Цв. шарлаховые, зимой, 1—1½ ф. Тепл. многол. **И. Жердоніе** (*I. Jerdoniae*, нисъ Жердонъ). Остиндія. Цв. большіе, доли зеленые, боковыя—ярко-желтыя, шпора ярко-красная, лѣтомъ. Тепл. многол. **И. Ройлеи** (*I. Roylei*, Ройли). Индія. Цв. пурпуровые, зонтиками, въ августъ. 10 ф. Однол. выносл. Имѣетъ нѣсколько разновидностей. **И. султани** (*I. Sultan*, султанскій). Занзибаръ. Цв. шарлаховые. Тепл. многол., цвѣтущій почти непрерывно. **И. фляксиды** (*I. flaccida*, повалый). Цейлонъ. Цв. ярко-пурпуровые, лѣтомъ. 6—18 д. Оранж. однол. Имѣетъ

разновидность съ бѣлыми цв., слышную въ садахъ подъ названіемъ *И. султани альба* и *И. платипетала альба* (*I. Sultan* alba, *I. platipetala* alba). **И. Хукериана** (*I. Hookeriana*, Гукерова). Цейлонъ. Цв. бѣлые съ малиновыми черточками, крупнее, зимой. 2½ ф. Тепл. многол.

**ИНВІРНЫЯ** пр. (*scitamineae*). Обыкновенно многол. трав. пр. съ ползучимъ корневищемъ, изъ жаркихъ климатовъ. Составляютъ весьма полезныхъ въ экономическомъ и садовомъ отношеніи представителей раст. царства. Родовъ 36, видовъ около 450. Главнѣйшіе роды: Альпинія, Каппа, Куркума, Маранта, Муза, Хедикумъ и Цингиверъ.

**ИНГА** (*Inga*). Мѣстное южно-американское названіе. С. бобовыхъ. (140). Юж. Америка, преимущественно Гвіана и Бразилія. Тепл. кустар. или дрв. пр. Торф. съ глин. дерн. Черенками изъ молодого роста, весной и лѣтомъ, въ песчан. торф., въ парникѣ.

**И. макрофилля** (*I. macrophylla*, крупнолистая). Кумана. Цв. желтые. 20 ф. **И. пульхеррима** (*I. pulcherrima*, красивая). Мексика. Цв. шарлаховые, лѣтомъ. 10 ф.

**ИНДИВИДУЙ. ИНДИВИДУУМЪ.** Недѣлимое. Особь.

**ИНДИГОФЕРА** (*Indigofera*). *Indigo*—индиго, синія краска и *fero*—носить; нѣк. виды даютъ индиго. С. бобовыхъ. (220). Африка, Америка, Азія и Австралія. Тепл., оранжер. и полувыносл. трав., кустар. и полу-куст. пр. Глин. дерн. съ листов. Сѣменами, или черенками изъ зрѣлаго роста въ песокъ, на легкомъ теплѣ, подъ стекломъ.

**И. аустралис** (*I. australis*, австралийская). Австралія. Цв. розовые, съ марта до іюня. 3—4 ф. Оранж. Снп. **И. ангулата** и **И. сильватика** (*I. angulata*, *I. sylvatica*). **И. Герардиана** (*I. Gerardiana*, Герарда). Цв. блѣдно-красные, въ іюль. Снп. **И. флорибунда** (*I. floribunda*). Одинъ изъ наиболѣе выносливыхъ видовъ, кустар. роста. **И. тинкторія**, (*I. tinctoria*, красильная). Остиндія. Цв. блѣдно-красные съ темно-красными крыльями и лопей, въ іюль. 4—6 ф. Полукуст. тепл. Видъ наиболее разводимый.

**ИНКАРВИЛЛЕА** (*Incarvillea*). *Инкарвилл* (*Incarvillea*),—іезуитъ въ Китаѣ, корреспондентъ Б. де-Жюссей въ 1743 С. бингонійныхъ. (4). Китай, Туркестанъ. Оранж. или полувыносл. многол. пр. Сѣмь изъ глин. дерн., съ торф. и пескомъ. Дѣленіемъ корней или сѣменами.

**И. Ольге** (*I. Olgae*, Ольгина). Туркестанъ. Цв. ярко-розовые, лѣтомъ. 3—4½ ф. Снп. **И. Кулманни** (*I. Koormannii*).

**ИНОКАРПУСЪ** (*Inocarpus*). *Is*,

*inos*—волокну и *karpos*—плодъ, по волокнуистому околоплоднику С. бобовыхъ. (3). О. Тихаго и Индѣйскаго океана. Тепл. деревья. Глин. дерн. съ торф. Черенками изъ полузрѣлаго роста, въ песокъ, въ парникѣ.

**И. эдулис** (*I. edulis*, съдомый). О. Юж. океана. Цв. бѣлые, лѣтомъ. 20 ф.

**ИНУЛИНЪ.** Крахмалъ особаго рода, встречаемый въ корняхъ и корневищахъ многихъ сложноцвѣтныхъ.

**ИНУЛЯ** (*Inula*). Происхожденіе неясное. С. сложноцвѣтныхъ. (56). Европа, Азія и Африка. Выносл. трав. пр. Садовая обикн. Сѣменами или дѣленіемъ.

**И. glandulosa** (*I. glandulosa*, железистая). Кавказъ. Цв. головки желтыя, въ іюль—августъ. 2 ф. **И. Хукери** (*I. Hookeri*, Гукера). Синкимъ Гималаи. Цв. головки желтыя, пахучія, въ сентябрь. 1 ф.

**ИПОМЕА** (*Ipomaea*). *Ips*—выюнокъ и *otolos*—подобный, по сходству съ выюнкомъ (конвольвулюсъ). С. выюнк. (400). Тепл. и выносл., выходящая и распростертая трав., рѣдко кустар. пр. широко распространенная по всѣмъ теплымъ климатамъ. Волокн. глин. дерн. съ переносомъ и листовой. Сѣменами, весной, въ парникѣ или теплицѣ, а многолѣт. черенками изъ бобового роста въ торф. зематъ въ тепл. парникѣ.

**И. бона-ноксъ** (*I. Bona-nox*, доброй ночи). Троп. Америка. Цв. бѣлые, въ іюль—августъ. 10 ф. Тепл. выюц. **И. Квамоклитъ** (*I. Quamoclit*, квамоклитъ). Троп. Америка. Цв. темно-красные, въ іюль до сент. Лл. перистые. Тепл. выюц. **И. Лирія** (*I. Learii*, Лира). Цейлонъ. Цв. голубые, въ іюль до сентября. Быстро растущая тепл. выюцающаяся ипомея. **И. пандурата** (*I. pandurata*, лирообразная). Соед. Штаты. Цв. бѣлые съ пурпуровымъ зѣвомъ, въ іюнь. **И. пурга** (*I. purga*, слабительная). Халапа. Цв. розово-пурпуровые, осенью. Тепл. выюц. Снп. *Экзогоніумъ пурги* (*Exogonium purga*). Это—настоящее р. дающее корень ялапы. **И. пурпуреа** (*I. purpurea*, пурпуровая). Тропич. Америка. Цв. темно-пурпуровые, въ іюнь до сентября. 10 ф. Это р. въ каталогахъ сѣмено-торговцевъ называется *Конавольвулюсъ майоръ* (*Convolvulus major*). Снп. *Конавольвулюсъ пурпуреа* (*Conv. purpurea*). Р. воздушное. **И. рубро-церулеа** (*I. rubro-coerulea*, красно-синяя). Ю. Мексика. Цв. въ бутонѣ бѣлые съ малиновымъ концомъ, распустившись—синие-пурпуровые, въ іюль—августъ. Тепл. выюц. Снп. **И. Хукеріи** (*I. Hookerii*). **И. филикаулис** (*I. filicaulis*, тонкостебельная). Троп. страны. Цв. бѣлые съ ярко-пурпуровымъ горлышкомъ, въ іюль. Тепл. однол. Стебель сильно вѣтв.



вится. **И. хедерацеа** (*I. hederacea*, плющевидная). Троп. страны. Цв. светло-голубые, в июль до сентября. Полувыносл. однол. Сии. **И. нил** (*I. nil*). Дает смолу «Фарбитзинг». **И. Хорсфалли** (*I. Horsfallii*, Хорсфалли). Остиндия. Цв. ярко-розовые, зимой. Тепл. выощ. сь неопад. лл.

**ИРГА**. См. Амеланше и Котонеастеръ. **ИРЕЗИНЕ** (*Iresine*). **Иресин**—персть, по пушистымъ вѣткамъ. С амарантовыхъ (18). Троп. Америка. Полувыносл. травяни. или полукуст. рр. Сѣменами весной, черенками вь парникъ весной.

**И. Линдена** (*I. Lindenii*, Линдена). Эквадоръ. Лл. узкие ланцетовидные, темные кроваво-красные съ амарантовой серединой. **И. Хербстия** (*I. Herbstii*, Хербста). Ю. Бразилія. Лл. сердцевидные, глубоко двулостные, верх. сторона темно-каштанового цв. съ карминными жилками, нижняя темно-малиновая. Имѣетъ нѣсколько разновидностей.

**ИРИАРТЕА** (*Iriartea*). **Хуанъ Ириарте** (*Juan Iriarte*)—испанскій ботаникъ. С. пальмъ. (5) Троп. Америка. Песокъ съ глини. дерн. Сѣменами.

**И. дельтоидеа** (*I. deltoidea*, дельтовидная). Перу. Лл. перистые. На р. нѣтъ колочекъ. Сии. **И. робуста** (*I. robusta*).

**ИРИСЬ** (*Iris*). Название данное Гипократомъ. С. косатиковыхъ, (100). Умѣр. страны сѣв. полушарія. Большею частью вынослив. трав. рр. съ ползучимъ или клубневымъ корневищемъ. На основаніи образованія корневища Ирисы дѣлятся на 2 группы: клубневые или луковичные (ксифіоны, или англійскіе или испанскіе) разнуж. сѣменами, весной, вь парникъ; черезъ три года луковки будутъ на столько развиты, что дадутъ цвѣтъ; равнымъ образомъ ихъ размножаютъ и отпрысками; виды съ ползучимъ корневищемъ (германскіе) размножаютъ предпочтительно дѣленіемъ или отводкой, когда корневища трудно даютъ корни. Всѣ вообще ирисы чувствительны въ пересадкѣ. Плотная глини. дерн., для другихъ же вь сѣнѣ съ торф.; положеніе освѣщаемое солнцемъ, но защищаемое отъ в. и с. вѣтровъ.

**И. Ирисы съ ползуч. корневищемъ** (собственно Ирисы): **И. aurea** (*I. aurea*, золотистый). З. Гималаи. Цв. ярко-желтые, вь июль. 3—4 ф. **И. балканска** (*I. balcanica*, балканскій). С. Ораклія. Цв. пурпурово-лиловые, вь апрѣль. 1 ф. **И. бифлора** (*I. biflora*, двуцвѣточный). Ю. Европа. Цв. фиолетово-пурпуровые, вь апрѣль. Сии. **И. фрэгранс**, **И. нудикаулис**, **И. суббифлора** (*I. fragrans*, *I. nudicaulis*, *I. subbiflora*). **И. варіегата** (*I. variegata*, пестрый). В. Европа. Верхъ цв. темномалиновый, середина жел-

тая съ коричневыми жилками, вь маѣ. 1—1½ ф. **И. верайколоръ** (*I. versicolor*, разноцвѣтный). С. Америка. Цв. темно-малиновые, вь июль. 1—2 ф. **И. вѣрна** (*I. verna*, весенній). Ю. Соед. Шт. Цв. оранжевые съ черными пятнами, весной. Стебли почти нѣтъ. **И. Ирисы съ корневищемъ луковичнымъ** (ксифіоны, или англійскіе, или испанскіе): **И. алаята** (*I. alata*, крылатый). Испанія, Алжирія. Цв. желтые, вь октябрѣ до декабря. 1 ф. **И. вульгаре** (*I. vulgare*, обыкновенный). Португалія. Цв. ярко-пурпуровые, вь июль. 1—2 ф. **И. ксифіодесъ** (*I. xiphoides*, похожий на Ксифіонъ). Пиреней. Цв. желтые съ пурпуровымъ, вь июль. 1—2 ф. Сии. **И. англика** (*I. anglica*) и **Ксифіонъ латифолиумъ** (*Xiphion latifolium*). Португалія. Цв. ярко-пурпуровые, вь июль. 1—2 ф. **И. персика** (*I. persica*, персидскій). Малая Азія до Персіи. Цв. желтовато-лиловые, пахучіе фіалками, вь февраль и мартъ. **И. ретикулата** (*I. reticulata*, сѣтчатый). Кавказъ. Цв. фиолетово-пурпуровые, темные, съ болѣе свѣтлымъ нѣлемъ и желтою полоскою, вь февраль—мартъ. **И. тингитана** (*I. tingitana*, танжерскій). Танжеръ. Цв. лилово-пурпуровые. 2—3 ф. **И. филифолія** (*I. filifolia*, тонколистный). Гибралтаръ. Цв. темно-пурпуровые. 1—2 ф. Сии. **Ксифіонъ минимана** (*Xiphion tingitana*). **И. Хистріо** (*I. histrio*, комедіантскій). Палестина. Цв. пурпурово-лиловые съ желтымъ, вь февраль. 1 ф. **И. германска** (*I. germanica*, германскій). Ю. и Центр. Европа. Цв. пурпуровые, душистые, вь маѣ. Имѣетъ много разновидностей. **И. граминеа** (*I. graminea*, съ лл. какъ у злаковъ). Ю. и Центр. Европа. Цв. пурпурово-лиловые, вь маѣ. **И. Гольденстедтіана** (*I. Goldenstedtiana*, Гольденстедта). Сибирь. Цв. бѣлые, вь июль. 2 ф. Сии. **И. халопила**, **И. стеногине** (*I. halophila*, *I. stenogine*). **И. Дуглазіана** (*I. Douglasiana*, Дугласа). Калифорнія. Цв. пурпурово-лиловые, вь июль. 6—12 д. **И. иберика** (*I. iberica*, изъ Арменіи). Кавказъ. Цв. бѣлые или лиловатые, съ жилками темнаго коричнево-пурпуроваго цв., лѣтомъ. 3—6 д. **И. кретензисъ** (*I. cretensis*, съ о. Крита). Греція, Малая Азія, Критъ и Ионическіе о. Цв. лиловые, вь апрѣль—маѣ. Стебли нѣтъ. **И. кристата** (*I. cristata*, гребенчатый). В. Соед. Штаты. Цв. блѣдно-лиловые, вь апрѣль—маѣ. 6 д. **И. лѣвигата** (*I. laevigata*, гладкій). Сибирь и Японія. Цв. ярко-пурпуровые темные, вь июль. Сии. **И. Кемпфера** (*I. Kaempferi*). Имѣетъ нѣсколько разновидностей. **И. лютеценсъ** (*I. lutescens*, желтоватый). Ю. Европа. Цв. блѣдно-желтые, вь апрѣль. 2 ф. **И. Моннье́ри** (*I. Monnierii*, Монье). Критъ. Цв. ярко-лимонные, душистые, вь июль—июль. 3—4 ф. **И. неглектъ** (*I.*

*neglecta*, пренебреженный). Цв. ярко-лиловые, вь июль. 1½—2 ф. Имѣетъ очень много разновидностей. **И. окролейка** (*I. osroleuca*, желто-бѣлый). Отечество неизвѣстно. Цв. желтые съ бѣлыми краями, вь июль. 3 ф. **И. псевдо-анкорусъ** (*I. pseudo-anagallis*, ложный Аниръ). **Косатикъ**. Европа. Цв. желтые, вь апрѣль—маѣ. Извѣстное болотное или водяное р. Есть разновидность съ пестрыми лл. **И. пумила** (*I. pumila*, низкій). Европа. Мал. Азія. Цв. пурпурово-лиловые, вь апрѣль—маѣ. 4—5 д. **И. рубро-маргината** (*I. rubro-marginata*, съ красными каемками). Скутари. Цв. зеленые съ пурпуровымъ, весной, 4 д. **И. самбуцина** (*I. sambucina*, бузинный). Европа, Малая Азія. Цв. пурпуровые, съ запахомъ бузины; ин. вь маѣ. 2 ф. **И. сибирска** (*I. sibirica*, сибирскій). Южн. и Центр. Европа до Сибири. Цв. лилово-голубые, вь маѣ и июль. 1½—2 ф. Имѣетъ много формъ. Махровые сорта не красивы. **И. скваленсъ** (*I. squaleus*, испачканный). Европа, Азія. Цв. пурпурово-лиловые, пахучіе бузиной, вь маѣ—июль. 2—3 ф. Имѣетъ разновидности **атро-пурпуреа** и **лавендулацеа** (*I. atro-purpurea* et *lavendulacea*). **И. сузіана** (*I. susiana*, сузіанскій). Левантъ. Цв. бѣлые съ темно-коричневыми черточками и пятнышками, вь апрѣль. 1—1½ ф. **И. текторумъ** (*I. tectorum*, кровельный). Японія. Цв. лиловые съ темными жилками, вь июль. 1 ф. Сии. **И. томилорфа** (*I. tomiolopha*). **И. тубероза** (*I. tuberosa*, клубневой). Левантъ. Цв. тускло-пурпуровые, вь маѣ. 1 ф. **И. унгвкулариъ** (*I. unguicularis*, съ ноготкомъ). Алжирія. Цв. бѣлые съ желтымъ и лиловымъ, вь февраль. Сии. **И. стилоса** (*I. stylosa*). **И. флавесценсъ** (*I. flavescens*, желтоватый). В. Европа и З. Азія. Цв. желто-лимонные, вь маѣ. 2—3 ф. **И. флорентина** (*I. florentina*, флорентинскій). Ю. Европа. Цв. бѣлые съ зелеными и коричневыми ноготками, пахучіе, вь маѣ. 2—3 ф. **И. фетидиссима** (*I. foetidissima*, вонючій). З. Европа. Цв. синева-лиловые, вь июль. 2—3 ф. **И. хамедриъ** (*I. chamaedris*, низкій). Ю. Европа. Цв. желтые, вь апрѣль. 4—6 д.

**ИСЕРТІЯ** (*Isertia*) **Исертъ** (*Isert*)—пѣмскій хирургъ. С. мареновыхъ (15). Бразилія, Гвиана, Новая Гренада. Тепл. куст. рр. Торф. съ глини. дерн. Черенками, весной и лѣтомъ, вь тепл. вь парникъ.

**И. кокцинеа** (*I. coccinea*, шарлаховая). Гвиана. Цв. шарлаховые, вь июль. 8—12 ф.

**ИСОПЪ**. См. Хищнецъ.

**ИСТОЧЕНІЕ КЛЕЯ**. Случается у деревь въ косточковыми плодами, — вишни, сливы и персика. У послѣдняго

оно болѣе, чѣмъ у другихъ опасно. Въ слабой степени уничтожается частымъ обмываніемъ ствола водою лѣткой, въ сырую погоду; въ сильной степени—неизлечимо. Случается чаще при слишкомъ сильно удобренной почвѣ отъ избытка роста. Иногда помогаетъ удаление крупныхъ вѣтвей и соответственное прищипываніе молодого роста. Обрѣзка корней и пересадка въ болѣе тощую землю тоже иногда помогаютъ. Въ послѣднее время найдено, что истечение клея производятъ грибокъ, — *Conium Beijerinckii*.

**ИСТОДОВЫЯ** рр. (*polygaleae*). Травянистыя или полукустарныя, иногда вьющіяся, либо цѣлкія кустарныя и низкія древесныяя роды, встречающіяся по умѣреннымъ и теплымъ странамъ земной поверхности. Въ семействахъ 15 родовъ и около 400 видовъ. Припѣрами родовъ могутъ служить Моннина, Муральтія и Полягаля.

**ИСХАРУМЪ** (*Ischarum*). **Ischein**—не удаваться; по малоразвитому чехлу. С. ароидеиныхъ. Присоединенъ къ Биарумъ.

**ИТЕА** (*Itea*). Слово это на греч. языкѣ означаетъ иву. С. камнеломковыхъ. (5). С.-З. Америка, Японія, Китай, Ява, Гималайскія горы, Казія, Оранж. или выносл. кустарн. и древ. рр. Песков. дернов. Сѣменами, отпрысками и отводками.

**И. виргиника** (*I. virginica*, виргинская). С. Америка. Цв. бѣлые, вь июль. 6—7 ф.

**ИХНОКАРПУСЪ** (*Ichnocarpus*). **Ichnos**—слѣдъ и **karpus**—плодъ, по мелкости плодинокъ. С. кутровыхъ. (9). Остиндія, Малайскій архип., В. Азія и троп. Австралія. Тепл. куст. рр. Темп. лѣтомъ 13—21, зимой 8°.

**И. фрутеценсъ** (*I. frutescens*, кустарный). Троп. Азія и Австралія. Цв. пурпуровые, мелкіе, вь июль и августъ.

**ИЕРИХОНСКАЯ РОЗА**. См. Анастатка.

**ИЕРУСАЛИМСКАЯ ВЕРБА**. См. Элѣагнусъ.

**ІОНЕ** (*Ione*) **Іоне**—одна изъ перендъ. С. орхидей. (3). Въ настоящее время родъ этотъ соединенъ съ Бульбофіаломъ и требуетъ тѣхъ-же условій воспитанія.

**І. палеацеа** (*I. paleacea*, пленчатая). Верх. Ассамъ. Цв. доли блѣдно-зеленыя съ красными полосками, лепестки блѣдно-желтые, губа красно-бурая, вь октябрѣ. 9 д.

**ІОНИДИУМЪ** (*Ionidium*) **Іон**—фіалка и **eides**—похожіи. С. фіалковыхъ. (40). Пренн. троп. Америка. Оранж. трав. или полукуст. рр. Торф. съ глини. дерн. Трав. виды — сѣменами или дѣленіемъ, полу-



куст.—черенками, въ песокъ подъ прикритіемъ.

**I. ипеакауанха** (*I. ipescanaha*, ипеакауанховій). Юж. Америка. Цв. бѣлые, въ июль. 1½ ф. Изъ корня получается «бѣлая» ипеакауана. **I. капензе** (*I. capense*, капскій). М. Д. Н. Цв. бѣлые, лѣтомъ. 6—12 д. Стебли кустарные. **I. полигалѣ-фоліумъ** (*I. polygalifolium*, съ лл. какъ у полигалы). Южн. Америка. Цв. зелено-ватожелтые или бѣлые, лѣтомъ. Стебли кустарн. 1 ф.

**ИОНОПСИДИУМЪ** (*Ionopsidium*). *Ion*—фіалка и *opsis*—подобіе. С. крестоцвѣтныхъ. (2). Португалія, Сицилія и Алжиръ. Вынослив. однол. трав. рр. Съ-менами; земля обыкнов., положеніе затѣнное.

**I. акауле** (*I. ascaule*, безстебельный). Португалія. Цв. лиловые, лѣтомъ и зимой. 2—3 ф.

**ИОНОПСИСЪ** (*Ionopsis*). *Ion*—фіалка и *opsis*—похожій. С. орхидей. (10). Троп. Америка отъ Мексики до Бразиліи и Остиндіи, теплич. эпифиты. Уходъ какъ за Бурлингтоніа.

**I. паникулата** (*I. paniculata*, метельчатый). Бразилія. Цв. бѣлые или нѣжно-розовые. **I. утрикуляріоидесъ** (*I. utricularioides*, похожій на Утрикуляріо). Троп. Америка. Цв. бѣлые съ малиновымъ отбѣнкомъ у основанія губы. Сип. **I. тенера** (*I. tenera*).

**ИОСТЕФАНЕ** (*Iostephane*). *Ion*—фіалка и *stephane*—повязка, вѣнокъ; по фіолетовымъ лучамъ. С. сложноцвѣтныхъ. (2). Полувынослив. и оранж. многол. трав. рр. Песчан. Съменами и дѣленіемъ.

**I. хетерофилля** (*I. heterophylla*, разнолистная). Цв. головки пониклыя, лучевые цв. фіолетовые, осенью. 1½ ф.

**ИОХРОМА** (*Iochroma*). *Ion*—фіолетовый и *chroma*—цвѣтъ, по окраскѣ цв. С. пасленовыхъ (15). З. троп. Америка. Оранж. дерев. и куст. рр. Уходъ какъ за Пеструмъ.

**I. ланцеолата** (*I. lanceolata*, съ ланцетовидными лл.). Чилийскіе Анды. Цв. темно-пурпуровые съ писина, лѣтомъ. 4—5 ф. Куст. **I. фухсиоидесъ** (*I. fuchsoides*, похожая на фухсию). Анды въ Квинтиніи. Цв. оранжевые, лѣтомъ. 5 ф. Куст.

**ІУДИНО ДЕРЕВО**. См. Церцисъ.

**КАВАКА. КАВАЧКИ.** Тыквы.

**КАБОМБА** (*Cabomba*). Мѣстное названіе въ Гвианѣ. С. кувшинковыхъ. Маленькія плавающие водныя рр. со щитовидными лл. и желтыми цв. Глин. дерн. на днѣ неглубокаго поддонника. Дѣленіемъ

корней. Зимой — въ теплицѣ, лѣтомъ въ оранжереѣ.

**К. акватика** (*C. aquatica*, водяная). Гвиана. Цв. въ июль. Сип. **Нектрисъ акватика** (*Nectris aquatica*). **К. каролинеана** (*C. carolineana*, каролинійская). Ю. Амер. Штаты. Похожа на первую.

**КАВАЛЕРНИКОВЫЯ** рр. (*passifloreae*). Дерв., куст. и трав. рр. съ простымъ, цѣпкимъ или вьющимся ростомъ, изъ тропич. поколо-тропич. странъ, преим. Ю. Америки. Многія имѣютъ экономич. значеніе; нѣк. приносятъ съѣдобные плоды. Въ сем. 19 родовъ и около 250 видовъ. Примѣры родовъ: Гиноплеура, Карика, Пассифлора и Таксонія.

**КАВАЛЕРСКІЯ ШПОРЫ.** См. Дельфиніумъ.

**КАДИЛО ПАХУЧЕЕ.** См. Мелитисъ.

**КАДСУРА** (*Kadsura*). Названіе мѣстное японское. С. магноліиныхъ. (7). Гористыя мѣстности вост. части троп. Азій. Оранж. вьющ. куст. рр. Обыкновен. садовая. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ песокъ, подъ стекломъ.

**К. японика** (*K. japonica*, японская). Японія. Цв. бѣлые, съ іюня до сентябри. Имѣть форму съ пестрыми лл.

**КАЗЕАРИЯ** (*Casearia*). **Казеариусъ** (*Casearius*)—сотрудникъ Ріда въ составленіи „*Nortus malabaricus*“. С. самидовыхъ. Тепл. дерев. рр. Легкая, песчанисто-волоки. дерн. Черенками въ песокъ, подъ стекломъ, въ теплѣ. Темп. лѣтомъ 13—22, зимой 8—12°.

**К. хираута** (*C. hirsuta*, волосатая). Ямайка. Цв. желтые, 8 ф. **К. рамифлора** (*C. ramiflora*, съ цв. въ вѣткахъ). Гвиана. Цв. желтовато-зеленые. 4 ф.

**КАЗЕЙНЪ** растительный. Бѣлковое вещество, не растворимое въ чистой водѣ, но растворимое въ присутствіи щелочей и нѣк. солей.

**КАЗИМИРЪ** (*Casimiroa*). По кардиналу *Казимиру Гомецу* (*Casimiro Gomez*). С. рутовыхъ. Тепл. кустар. и дерев. рр. съ плодами съѣдобными. Сильная глин. дерн. съ волоки. торф. Черенками подъ стекломъ, въ песокъ и теплѣ. Темп. лѣтомъ 13—22, зимой 8—12°.

**К. эдулисъ** (*C. edulis*, съѣдобная). Мексика. Цв. зеленоватые, плоды велич. въ апельсинъ, оранжевые, при созрѣваніи зеленоватые, вкусомъ напоминаютъ персики.

**КАЗУАРИНА** (*Casuarina*). По сходству тонкихъ, пониклыхъ и безлистныхъ вѣтокъ съ перьями казуара С. казуариновыхъ. (24). Австралія, Нов. Каледонія, Малайск. архип. Оранж. дерев. рр. Съ-менами и черенками изъ полузрѣвшаго

роста, въ апрѣлѣ, въ песокъ, подъ стекломъ. Глин. дерн. съ торф., пескомъ и дерев. угл. Темп. лѣтомъ 10—17; зимой 4—10°.

**К. дистыля** (*C. distyla*, двупестичная). Австралія. Чешуйки шишекъ безъ придатковъ. Вѣтки овальные. 15 ф. **К. стрикта** (*C. stricta*, прямая). Австралія. Чешуйки шишекъ косматые, молодыя вѣтки вилыя. 18 ф. Сип. **К. квадривалвисъ** (*C. quadrivalvis*). **К. эквизети-фолія** (*C. equisetifolia*, съ лл. какъ у хвоща). Чешуйки шишекъ съ рѣсничками. Вѣтки вилыя, круглыя. 15 ф.

**КАЗУАРИНОВЫЯ** рр. (*casuarinae*). Безлистные древесныя или кустарныя растения съ колѣнчатыми стеблями и бороздчатыми междоузліями. Цвѣты однополые, тычковые—отдѣльными колѣсами, расположенными цилиндрическими колосами; пестичные—въ плотныхъ угловыхъ головкахъ. Плодъ—крылатый орѣшекъ, покрытый утолстившимся прицвѣтникомъ. Единственный родъ—Казуарина.

**КАЙМА. КАЕМКА. КОИМА** Край. Полоса по краю.

**КАКАЛІЯ** (*Cacalia*). Названіе *Cacalia* встрѣчается у Dioscorida. С. сложноцвѣтныхъ. Многол. трав. рр., схожія съ Сенеціо и нуждающіяся въ такомъ же уходѣ.

**К. суавеолесъ** (*C. suaveolens*, душистая). С. Америка. Цв. головки бѣлыя, осенью. 3—5 ф. **К. тубероза** (*C. tuberosa*, клубневая). Сѣв. Америка. Цв. головки бѣловатыя, въ іюнѣ. 2—6 ф.

**КАКИЛЕ** (*Sakile*). Названіе арабское. С. крестоцвѣтныхъ. (2). Ю. Европа, С. Америка, Австралія. Однолѣтнее по берегамъ моря. Съменами, весной. Песчаннистая.

**К. маритима** (*C. maritima*, приморское). Ю. Европа, С. Америка, по морскимъ берегамъ. Цв. крупные, лиловые, лѣтомъ и осенью. 1 ф.

**КАКТУСОВЫЯ** рр. (*cactaeae*). Обширное семейство сочныхъ растений съ иглами на цилиндрическихъ, угловатыхъ плоскихъ или листообразныхъ стебляхъ. Цвѣты весьма разнообразны, — большіе или мелкіе, обычно одиночные, сидячіе, рѣдко въ пучкахъ; скоро оцвѣтающіе; лепестки расположены въ нѣсколько рядовъ и постепенно переходятъ въ многочисленныя доли, сросшіяся съ плодникомъ. Плодъ мясистый, одногнѣздный, многосѣмянный. Сюда относятся: Кактусъ, Мамиллярія, Мелоктусъ, Оуниця, Перескैया, Гипсалисъ и Цереусъ. Что касается ухода, то, несмотря на нѣкоторыя особенности, всѣмъ необходима высокая

температура и нѣкот. влажность во время роста, сухой воздухъ и сухая земля—при вызрѣваніи, а низкая темп. во время покоя. Въ одномъ случаѣ темп. въ 22—25° не будетъ высока, въ другомъ—она можетъ быть достаточною въ 4°. Размножаются въ тепломъ грунтѣ съ-менами и черенками, которыхъ основанія должны быть обсушены. Земля — песчанистоглин. дерн. пополамъ съ торф. и на половину съ пескомъ и листовою или сухимъ коровьимъ удобреніемъ и черенками. Поливка уменьшается съ того времени какъ цвѣтъ грядъ измѣняется. Вообще темп. лѣтомъ 13—25, зимой 4—8°.

**КАЛЕА** (*Calea*). **Калосъ**—красивый, по цвѣтамъ. С. сложноцвѣтныхъ. Жаркія страны Нов. Свѣта. Теплич. травянистыя или низкоросл. кустарныя рр. Размн. поствомъ въ мартѣ, и черенками во всякое время, въ песокъ, въ теплой грядкѣ, подъ стекломъ. Темп. лѣтомъ 13—19, зимой 10—13°.

**К. уртицѣ-фолія** (*C. urticaefolia*, съ лл. крапивы). Вера-Круцъ. Цв. желтые, въ июль. 2 ф. **К. ямаицѣ-наисъ** (*C. jamaicensis*, ямайская). Ямайка. Цв. пурпуровые, въ іюнѣ. 3 ф.

**КАЛЕАНА** (*Caleana*). **Калей**—директоръ бот. сада въ Сант-Винцентѣ. С. орхидей. Оранж. земныя орхидеи изъ Австраліи. Волокн. торф. съ глин. дерн. и нѣк. количествомъ древесн. угля.

**К. майоръ** (*C. major*, большая). Цв. коричнево-зеленые, въ іюнѣ. **К. нигрита** (*C. nigrita*, чернопоятая). Цв. коричнево-зеленые, въ іюнѣ.

**КАЛЕКТАЗІЯ** (*Calectasia*). **Калосъ**—красивый и *stachys* — колосъ. С. ситниковыхъ. Оранж. многол. рр. съ звѣздчатыми цв. Глин. дерн. Дѣленіемъ. Темп. зимой 2—6°.

**К. ціанеа** (*C. cyanea*, голубая). Австралія. Цв. ярко-голубые, въ іюнѣ.

**КАЛЕНДУЛЯ** (*Calendula*). **Calendae**—первый день мѣсяца, по безпрерывному почти цвѣтенію. С. сложноцвѣтныхъ (20). Сред. Европа, Канарскіе о. Оранж. и воздушн. однолѣт. нѣк. кустарныя рр. Воздушн. однол., съютъ въ грунтъ или въ парникъ, а потомъ высаживаютъ на воздухъ, въ маѣ; оранжер. размн. черенками. Песч. дерн. для воздуш.; глин. дерн. съ торф. для оранж.

**К. мадеренсисъ** (*C. maderensis*, мадерская). О. Мадера. Многол. Цв. головки оранжевые, въ мартѣ. 2 ф. **К. официна-лисъ** (*C. officinalis*, аптечная). **Ноготки**. Ю. Европа. Однол. Цв. головки оранжевыя, съ іюня до сентябля. 3 ф. Имѣть много садовыхъ разновидностей; изъ нихъ



*пролифера* (*proliфера*) даетъ вокругъ главной головки нѣсколько боковыхъ на отдѣльныхъ ножкахъ, какъ у подобной формы Маргаритки (Веллель).

**КАЛИКОТОМЕ** (*Calycotome*) *Kalux*, — *kalykos* чашечка и *tome*—отсѣченіе губы чашечки опадаютъ. С. бобовыхъ (4). Средиземное побережье. Иглестый кустар. рр. Уходъ какъ за Цистусъ.

**К. спиноза** (*C. spinosa*, иглестое). Генуа, Корсика. Цв. желтые, въ июль—июль. 5—6 ф.

**КАЛИКОФИЛЛЮМЪ** (*Calycophyllum*). *Kalux*—чашечка и *phyllon*—листъ. Одинъ изъ зубчиковъ чашечки вытиснутъ въ окрашенный прицветникъ. С. мареновыхъ. Теплох. куст. рр. Глин. дерн. съ торф. и нѣк. количествомъ песку и дрв. угля. Черенками изъ полувызрѣвшей древесины, подъ стекломъ, на тепломъ грунѣ. Темп. лѣтомъ 12—24, зимой 8—10°.

**К. кандициссимумъ** (*C. candidissimum*, бѣлѣйшій). Куба. Цв. бѣлые, колокольчатые. 20 ф.

**КАЛИНА**. См. Вибурнумъ.

**КАЛІПСО** (*Calypso*). *Kalipso*—нимфа, по другимъ *kalypso*—скрыватьсѣ, по мѣсту произрастанія. С. орхидей (1) С. Европа, Азія, Америка. Земная орхидея. Побѣгами Песчан. дернов. съ торф.

**К. бореалис** (*C. borealis*, сѣверная). Высокія широты с. полушарія. Цв. одиночные, свѣтло-розовые, съ желтымъ ребромъ на губѣ, похожей на губу циприпидума, лѣтомъ. 1 ф.

**КАМЕДЕКАПЕЛЬНИКОВЫЯ** рр. См. гуммигутовые.

**КАЛИПТРАНТЕСЪ** (*Calyptranthes*). *Kalyptra*—покрышка, колпакъ и *anthos*—цвѣтокъ, по крышечкѣ на цв. С. миртовыхъ. Тепл. куст. рр. Глин. дерн. съ торф. Отводкою и черенками въ теплѣ. Темп. лѣтомъ 13—23, зимой 8—10°.

**К. сизигіумъ** (*C. sizygium*, Синигіумъ). Ямайка. Цв. бѣлые, въ маѣ, 10—12 ф. **К. хитракулія** (*C. chitraculia*, хитракулія). Ямайка. Цв. бѣлые, мелкіе, въ мартѣ, 10 ф.

**КАЛИПТРОГИНЕ** (*Calyptragine*). *Kalyptra*—колпачекъ и *gynē*—жена, пестикъ; по формѣ послѣдняго. С. пальмъ (6). Троп. Америка. Теплох. Уходъ какъ за Геопомъ.

**К. Гисбрехтіана** (*C. Giesbreghtiana*, Гисбрехтіана). Мексика. Лл. перистые, длин. 2—5 ф., пень короткій, или его вовсе не бываетъ. Спн. *Геопомъ Гисбрехтіана*, *Г. magnifіка* и *Г. Веркайфеліумъ* (*Geopoma Giesbreghtiana*, *G. magnifіca* и *G.*

*Verschaffeltii*). **К. спацигера** (*C. spicigera*, ушастая). Гватемала. Ваи неправильно перистый, въ 2—3 ф. длиной. Пень толстый. 5 ф. **К. Шварцъ** (*C. Swartzii*, Шварца). Ямайка. Ваи равномерно перисто-разсѣченныя. Пень гладкій. 50—60 ф.

**КАЛИПТРОКАЛИКСЪ** (*Calyptrocalyx*). *Kalyptra*—колпачекъ и *calyx*—чашечка, по формѣ вѣшняго покрова. С. пальмъ. (1). Уходъ какъ за Каламусъ.

**К. спикатусъ** (*C. spicatus*, колючій). Молукке о. Ваи перисто-разсѣч. 12 ф. Спн. *Арека* и *Пинаппа глобоза* (*Arecas et Pinanga globosa*).

**КАЛИСТЕГИЯ** (*Calystegia*). *Kalux*—чашечка и *stegē*—покрывало, по двухъ прицветникамъ, скрывающимъ чашечку. С. вьюнковыхъ. (8). Умѣренные и тропич. пояса. Цвѣткіи и вьющіеся травяни. многол. рр. Обыкновен. садовая. Дѣленіемъ.

**К. дахурика** (*C. dahurica*, даурская). Даурия. Цв. пурпурово-розовые, въ июль. Дѣленіемъ р. **К. рубесценс** (*C. rubescens*, пушистая). Китай. Воспитывается только махровая форма. Цв. тѣсно-розовые, лѣтомъ и осенью. Вьющаяся. **К. солданелля** (*C. soldanella*, похожая на солданеллу). По морскимъ берегамъ Нѣмецкаго м. Цв. свѣтло-розовые, въ июль. Песчаная.

**КАЛИТРИСЪ** (*Calythrix*). *Kalux*—чашечка и *thrix*—воловокъ. С. миртовыхъ. Оранж. куст. Глин. дерн. съ торф. и пескомъ. Черенками изъ концовъ вѣтвей, въ апрѣлѣ, маѣ, въ песокъ, подъ стекломъ. Темп. лѣтомъ 8—16, зимой 2—5°.

**К. тетрагона** (*C. tetragona*, четырехгранный). Австралія. Цв. бѣлые, 2 ф. Спн. **К. эрикоидесъ**, **К. глѣбра** (*C. ericoides*, *C. glabra*).

**КАЛИФРУРИЯ** (*Caliphuria*). *Kalos*—красивый и *phoura*—тюрьма, по красивой оберткѣ, покрывающей цвѣты. С. амарилисовыхъ. Оранж. лукович. рр. Дѣтками. Песчан. дерн. съ листов. торф. и пескомъ.

**К. субедентата** (*subedentata*, съ рѣдкими зубчиками). Колумбія. Цв. бѣлые, зимой. 1½ ф. **К. Хартвергіана** (*C. Hartwegiana*, Гартвеганна). Нов. Гренада. Цв. зеленые, въ маѣ. 1 ф.

**КАЛИКАНТУСЪ** (*Calycanthus*). *Kalux*, *kalykos*—чашечка и *anthos*—цвѣтокъ, по окрашенной чашечкѣ. С. чашечковидныхъ. (3). Сѣв. Америка. Выносливы или почти выносливы куст. рр. Песчан. дернов. Тинистое положеніе. Отводками. Относиваніемъ конечной почки вызывается образованіе двухъ цв. почекъ.

**К. глѣукусъ** (*C. glaucus*, сѣрый). Калифорнія. Цв. пурпуровые, въ маѣ, 4—6 ф. Спн. **К. фертилусъ** (*C. fertilis*). **К. лѣвигатусъ** (*C. laevigatus*, гладко-лиственный). Пенсильванія, по горамъ. Цв. пурпуровые, въ маѣ. 3—4 ф. **К. окциденталисъ** (*C. occidentalis*, западный). Калифорнія. Цв. красно-пурпурные, пахучіе, съ іюня до октяб. 6—12 ф. Спн. **К. макрорхиллюсъ** (*C. macrophyllus*). **К. флоридусъ** (*C. floridus*, изъ Флориды). Каролина. Цв. бѣлые, съ запахомъ яблоковъ, въ маѣ. Древесина и корни съ сильнымъ камфарнымъ запахомъ. 4—6 ф. Имѣетъ нѣсколько разновидностей.

**КАЛОДЕНДРОНЪ** (*Calodendron*). *Kalos*—красивый, *dendron*—дерево. С. рутовыхъ. (1). Южн. Африка. Оранж. дерево. Черенками изъ полувызрѣвшей древесины, въ песокъ, подъ стекломъ, на умѣренно-нагрѣтомъ грунѣ. Песчан. дерн. Темп. лѣтомъ 8—19, зимой 4—8°.

**К. капэнзисъ** (*C. capensis*, съ мыса Доброй Надежды). М. Д. Н. Цв. тѣлеснаго цвѣта. 40 ф. Одна изъ самыхъ лучшихъ дрв. породъ мыса Д. Н.

**КАЛОПОГОНЪ** (*Calopogon*). *Kalos*—красивый и *pogon*—борода; по бахромчатой губѣ. С. орхидей. (4). С. Америка. Оранж. Дѣленіемъ клубневыхъ корней. Глин. дерн. съ торф. Темп. лѣтомъ 10—19, зимой 6—8°.

**К. пухлѣллоусъ** (*C. pulchellus*, красивый). С. Америка. Цв. пурпуровые, поздно лѣтомъ. 1½ ф. Спн. *Лимодорумъ пухлѣллоусъ* (*Limodorum pulchellus*).

**КАЛОРИФЕРЪ**. Печь. Тонка. Снарядъ для согрѣванія помѣщенія.

**КАЛОСКОРДУМЪ** (*Caloscordum*). *Kalos*—красивый и *skorodon*—чеснокъ. С. лилейныхъ. Полувыносл. луковичный рр. схожий съ Алыумъ и требующій такого же ухода, какъ Калохортусъ.

**К. неринефлорумъ** (*C. nerineiflorum*, съ цв. какъ у Нерине). Чусанъ. Цв. розовые, въ июль—июль. 6 д.

**КАЛОСТЕММА** (*Calostemma*). *Kalos*—красивый и *stemma*—вѣнокъ. С. амарилисовыхъ. (3). Австралія. Оранж. лукович. рр. Дѣтками. Песч. дерновая съ листов. торф.

**К. альбумъ** (*C. album*, бѣлый). Цв. бѣлые, въ маѣ. 1 ф. **К. лютеумъ** (*C. luteum*, желтый). Цв. желтые, въ ноябрѣ. 1 ф. **К. пурпуреумъ** (*C. purpureum*, пурпуровый). Цв. пурпуровые, въ ноябрѣ. 1 ф.

**КАЛОТАМНУСЪ** (*Calothamnus*). *Kalos*—красивый и *thamnus*—кустъ. С. миртовыхъ. (22). 3. Австралія. Оранж. куст. рр. Черенками изъ молодого роста внизу вызрѣвшаго, подъ стекломъ. Песч.

торф. съ волокон. глин. дерн. Темп. лѣтомъ 10—19, зимой 3—6°.

**К. вильдса** (*C. villosa*, косматый). 3. Австралія. Цв. шарлаховые, въ июль до сентября. 2—4 ф. **К. квадратифидъ** (*C. quadrifida*, четыре-растѣленный). 3. Австралія. Цв. шарлаховые, въ июль. 2—4 ф.

**КАЛОТИСЪ** (*Calotis*). *Kalos*—красивый, *otis*, *otos*—ухо; по чешуйчатому холку сѣмянъ. С. сложноцвѣтныхъ. (15). Австралія. Оранж. травяни. многол. Дѣленіемъ. Песч. дернов. Темп. лѣтомъ 10—16, зимой 2—5°.

**К. кунейфолія** (*C. cuneifolia*, клиновидная). Австралія. Цв. головки голубыя, въ июль—августъ. 1 ф.

**КАЛОТРОПИСЪ** (*Calotropis*). *Kalos*—красивый, *tropis*—повернутый, по вѣтвику нѣкоторыхъ. С. ластовниковыхъ (3). Жаркія страны Азіи и Африки. Теплох. куст. Волокн. глин. дерн. съ небольшимъ колич. песку. Сѣменами въ мартѣ, въ парникѣ; черенками изъ полувызрѣвшей древесины, въ песокъ, въ апрѣлѣ, подъ стекломъ.

**К. гигантеа** (*C. gigantea*, великанская). Индія. *Акундъ-Еркунъ* или *Мударъ*,—мелкий сокъ котораго—сильное проносное, славящееся въ Индіи. Цв. бѣлые, въ августѣ. 6 ф.

**КАЛОФАКА** (*Calophaca*) *Kalos*—красивый и *phake*—чечевица; по красивому р., дающему вкусныя бобинки. С. бобовыхъ (7). Россія, Востокъ. Сѣменами въ мартѣ; черенками подъ стекломъ. Легкая глин. дерн.

**К. вольгарика** (*C. wolgarica*, волгская). *Растиникъ волжскій*. *Май-Караганъ*. Астрахань. Цв. желтые, въ маѣ—июль. 2—3 ф.

**КАЛОФАНЕСЪ** (*Calophanes*). *Kalos*—красивый и *phaino*—казаться; по цвѣтамъ. С. акантовыхъ (20). Троп. Азія, Африка, С. Америка. Многол. воздушн. или оранж. трав. рр. Дѣленіемъ въ мартѣ. Глин. дер. съ торф. или песчан. дерн.

**К. облонгифолія** (*C. oblongifolia*, съ продолговатыми лл.). Флорида. Цв. голубые, въ августѣ. 1 ф.

**КАЛОФИЛЛЮМЪ** (*Calophyllum*). *Kalos*—красивый и *phyllon*—листъ. С. гуммигутовыхъ. (43). Троп. Америка и Азія. Теплох. дрв. рр. Черенками изъ полувызр. роста, въ песокъ, подъ стекломъ, на умѣренно-нагрѣтомъ грунѣ. Торф. съ глин. дерн. Темп. лѣтомъ 12—24, зимой 8—10°.

**К. калаба** (*C. Calaba*, Калаба). Вестиндія. Цв. бѣлые, душистые. 30 ф. **К. инфиллюмъ** (*C. inophyllum*, съ волоконистыми лл.). Тропич. страны Старого свѣта. Цв. бѣлые. 90 ф. плоды красноватые, въ



гречей орхей. **К. такамагана** (*C. takamagana*). О. Бурбонъ. Цв. белые. 30 ф.

**КАЛОХИЛЮСТЬ** (*Colochilus*). *Kallos*—красивый и *cheilos*—губа. С. орхидей. Земная орхидей, близкая к Эпипактису. Уходъ какъ за *Baicia*.

**К. палюдозусъ** (*C. paludosus*, болотный). Австрали. Цв. зеленоватые съ коричневыми, въ маѣ—июнь, 9 д.

**КАЛОХОРТУСЪ** (*Calochortus*). *Kallos*—красивый и *chortos*—трава. С. лилейныхъ (30). С. Америка, Мексика. Полувынос. луков. Отпрысками. Песч. дерн. пополамъ съ торф. Вынная луковицы изъ грунта на зиму, ихъ обсушить, потомъ спрятать.

**К. альбусъ** (*C. albus*, белый). Калифорния. Цв. сѣбно-бѣлые. 1—1½ ф. Снп. *Циклоботри алба* (*Cyclobothra alba*). **К. Бентами** (*C. Benthani*, Бентама). Сьерра Невада. Цв. желтые, въ июль—августъ. 4—8 д. **К. венустусъ** (*C. venustus*, изящный). Калифорния. Цв. бѣлые, крупные. 1½ ф. Имѣеть нѣск. разновидностей. **К. Гоннисона** (*C. Gunnisoni*, Гоннисона). Скалистые горы. Цв. сѣдно-лиловые, большіе. **К. лиляцинусъ** (*C. lilacinus*, лиловый). Калифорния. Цв. блѣдно-малиновые. 6—8 д. **К. лютеусъ** (*C. luteus*, желтый). Калифорния. Цв. зеленовато-желтые, въ сентябрь. 6 д. **К. Нутталли** (*C. Nuttallii*, Нутталли). Калифорния. Цв. бѣлые или зеленоватые, имѣющие красныя полоски, въ июль. 6 д. **К. пухлякельюсъ** (*C. pulchellus*, прекрасный). Калифорния. Цв. ярко-желтые, лѣтомъ. **К. пурпуреусъ** (*C. purpureus*, пурпуровый). Мексика. Цв. снуржи пурпуровые съ зеленымъ, внутри—желтые, въ августъ. 3 ф. **К. спленденсъ** (*C. splendens*, великодушный). Калифорния. Цв. сѣдно-лиловые, крупные, въ августъ. 1½ ф. **К. сѣрулеусъ** (*C. caeruleus*, голубой). Сьерра Невада. Цв. лиловые съ голубыми пятнышками, въ июль. 3—6 д. **К. элегансъ** (*C. elegans*, изящный). Калифорния. Цв. зеленовато-бѣлые съ пурпуровымъ основаніемъ. 8 д.

**КАЛУЖНИЦА**. См. Кальта.

**КАЛДИЛЮВІЯ**. См. Кодкдлувія.

**КАЛДИГОНУМЪ** (*Callygonum*). *Kallos*—красота и *goni*—кожный составъ, по безлистнымъ сочлененіямъ. С. гречишныхъ. (20). Азия, С. Америка. Возд. кустъ. Земля обикнов.

**К. Паллязія** (*C. Pallasia*, Палласа). *Тарлокъ*. Берега Каспійскаго м. Цв. бѣловатые, въ маѣ. 3—4 ф.

**КАЛЛИКАРПА** (*Callicarpa*). *Kallos*—красота и *karpos*—плодъ, по красивымъ ягодамъ. С. вербеновыхъ (30). Троп. Азия, Японія, Австралія, Полинезія, С. и

Ср. Америка, Вестиндія. Тепл. и оранж. куст. рр. Черенками въ песокъ, землѣ, на парѣтомъ грунтѣ. Гли. дерн. съ торф. Темп. лѣтомъ 13—20, зимой 8—10°.

**К. американа** (*C. americana*, американская). Южн. Америка. Цв. красные, мясистые; ягоды фіолетовыя. 6 ф. Оранж. **К. ланата** (*C. lanata*, пушистая). Индія. Цв. пурпуровые, въ июль. Ягоды пурпуровыя. 3 ф. На Цейлонѣ листья замѣняютъ бетель. Тепличная. **К. пурпуреа** (*C. purpurea*, пурпуровая). Индія. Цв. незамѣчательные; ягоды темнофіолетовыя. 3 ф. Тепличная.

**КАЛЛИКОМА** (*Callicoma*). *Kallos*—красота и *come*—волосъ; по скученнымъ цв. головкамъ. С. камнеломковыхъ (1). Вост. Австралія. Оранж. кустарникъ. Черенками изъ полувызр. роста, подъ стекломъ, въ песокъ. Песчанисто-дерновая.

**К. сerratифолия** (*C. serratifolia*, съ зубчатыми лл.). Нов. Южн. Валлисъ. Цв. желтые, съ маѣ до августа. 4 ф.

**КАЛЛИПРОРА** (*Calliprora*). *Kallos*—красота, *prora*—передъ, по красотѣ цв. спереди. С. лилейныхъ. (2). Калифорнія. Сродни съ *Бродіа*, лукович. рр. Песчанистая, сильная. Отпрысками, когда достигнутъ порядочной величины.

**К. лютеа** (*C. lutea*, желтая). С. Калифорнія. Цв. коричнево-пурпуровые, лѣтомъ. 9 д. Снп. *Бродіа оксидесъ*, *Милла оксидесъ* (*Brodiaea ixioideis*, *Milla oxioideis*).

**КАЛЛИРРОЕ** (*Callirhoe*). *Kallos*—дочь рѣчнаго бога Ахелоса. С. мальвовыхъ (7). Сѣв. Америка. Однол. и многол. клубневый рр. Песчан. дерн. съ листоват. Сѣменами и дѣленіемъ.

**К. дигитата** (*C. digitata*, перстовидное). Техасъ. Многол. Цв. пурпуровые, въ августъ. 3 ф. **К. инволюкрата** (*C. involucreta*, оберточное). С. Америка. Цв. вишневые, въ июль. Многол. **К. Папаверъ** (*C. Papaver*, маковое). Луизиана. Цв. красно-фіолетовые. 3 ф. Многол. Снп. *Нутталліа Папаверъ* (*Nuttallia Papaver*).

**КАЛЛИПСИХЕ** (*Callipsyche*). *Kallos*—красота и *psyche*—бабочка, по красивымъ цвѣтамъ. С. амараллисовыхъ. Оранж. луков. Сильная песчан. дерновая съ лист., при хорошемъ дренажѣ. Сѣменами и отпрысками. По завиданіи лл. давать меньшую поливку, но не пересушивать.

**К. аурантика** (*C. aurantiaca*, оранжевое). Анды Эквадора. Цв. темно-золотисто-желтые. 2 ф. **К. мирабилисъ** (*C. mirabilis*, удивительное). Перу. Цв. желтовато-зеленые. 3 ф. **К. эйкродесъ** (*C. eicroides*, похожее на Эйкрозію). Мексика. Цв. шарлаховые съ зеленымъ, въ мартѣ. 2 ф.

**КАЛЛИСТЕМОНЫ** (*Callistemon*).

*Kallos*—красота *stemon*—тычинки; у мн. видовъ тычинки ярко-красныя. С. миртовыхъ. (14). Австралія. Новая Каледонія. Оранж. куст. рр. Сѣменами въ мартѣ, въ парникѣ, черенками изъ не слишкомъ отвердѣлой древесины, подъ стекломъ, въ апрѣль—маѣ. Волокнистая торф. съ песчанисто-волокнутой дернов. и дрел. углемъ. Темп. лѣтомъ 8—16, зимой 3—6°.

**К. линейарисъ** (*C. linearis*, съ линейными лл.). Нов. Юж. Валлисъ. Цв. шарлаховые, въ июль. 4—6 ф. **К. специозусъ** (*C. speciosus*, красивый). 3. Австралія. Цв. шарлаховые, въ мартѣ до июля. 5—10 ф. Снп. *Метросидеросъ специоза* (*Metrosideros speciosa*).

**КАЛЛИСТЕФУСЪ** (*Callistephus*). *Kalistos*—самый красивый и *stephus*—вѣнокъ, по придаткамъ сѣмянъ. С. сложноцвѣтныхъ. (1). Азия. Однолѣт. воздушное. Открытое положеніе и сильная гли. дерн. Сѣменами въ мартѣ, въ парникѣ; на воздухѣ—въ маѣ. Снп. *Каллистемма* (*Callistemma*).

**К. хинензисъ** (*C. chinensis*, китайскій). *Китайская астра*. Китай. Цв. гол. пурпуровые, въ июль. 2 ф. Кит. астра произвела тѣ многочисленныя и разнообразныя уклоненія по росту, величинѣ, окраскѣ и образованию цвѣтовъ, которые распространены въ цвѣтникахъ.

**КАЛЛИТРИСЪ** (*Callitris*). *Kallistos*—красивѣйшій, по всему р. С. хвойныхъ. (14). Африка, Мадагаскаръ, Австралія, Нов. Каледонія. Оранж. рр. похожія на кипарисъ. Сѣменами и черенками подъ стекломъ, осенью. Песчан. дерн.

**К. квадривалвисъ** (*C. quadrivalvis*, четырехстворчатый). Варваріскія влад. Дерево въ 15—20 ф. Лл. сплюснутые.

**КАЛЛИХРОА** (*Callichroa*). *Kallos*—красота и *chroa*—цвѣтъ, по яркой окраскѣ цвѣтовъ. С. сложноцвѣтныхъ. Родъ этотъ соединенъ теперь съ *Laila* (*Laila*). Воздушн. однолѣт., высѣваемы въ мартѣ, въ парникѣ, и высаживаемы на воздухѣ въ маѣ.

**К. платиглосса** (*C. platiglossa*, длинноязычковая). Калифорнія. Цв. головки желтые, осенью. 1 ф. Снп. *Лайя платиглосса* (*Laila platiglossa*).

**КАЛЛИАНДРА** (*Calliandra*). *Kallos*—красота и *andros*—тычинка, по длиннымъ, шелковистымъ красивымъ тычинкамъ. С. бобовыхъ. (80). Троп. Америка, Остиндія. Теплич. куст. рр. Черенками съ довольно взрѣвшею древесиной, въ песокъ, подъ стекломъ, въ теплѣ. Торф. съ гли. дерн. Темп. лѣтомъ 13—24, зимой 8—10°.

**К. Твидіи** (*C. Tweediei*, Твидел). Бразилія. Цв. красные, въ мартѣ—апрѣль. 6 ф.

**КАЛЛЮНА** (*Calluna*). *Calluno*—месты, по употребленію рр. на вѣшечки. С. вересковыхъ. (1). Европа. С. З. Азия. Изрѣдка въ С. Америкѣ. Воздуш. куст. р. **К. вульгарисъ** (*C. vulgaris*, обыкновенная). *Верескъ*. Цв. розовые, длинными колосками, съ июля до сентября. 1—3 ф. Имѣеть много разновидностей.

**КАЛМІЯ** (*Kalmia*). Петеръ *Кальмъ* (*Kalm*)—ученикъ Линнея, путешествовалъ въ Канадѣ и С. амер. штатахъ, а потомъ былъ проф. въ Або. † 1799. С. вересковыхъ. (6). Куба, С. Америка отъ Флориды до Калифорніи и арктическаго пояса. Оранж. или вынослив. кустар. рр. Торф. Черенками изъ молодого роста, въ песокъ, торф., подъ стекломъ, или сѣменами.

**К. ангустифолия** (*K. angustifolia*, узколистная). Канада. Цв. пурпуровые, или малиновые, ранней весной. 2—3 ф. Имѣеть нѣсколько разновидностей. **К. глаука** (*K. glauca*, сизая). Цв. пурпурово-лиловые, весной. 1—2 ф. **К. латифолия** (*K. latifolia*, широколистная). Гористыя мѣстности Канады, 3. Флориды и др. Цв. розовые или бѣлые, лѣтомъ. 3—10 ф.

**КАЛТА** (*Caltha*). Сокращеніе *Kalatos*—бокалъ, по цвѣт. покрову. С. лютиковыхъ. (9). Европа, Азия, С. Америка. Вынос. трав. мног. Сѣменами, или дѣленіемъ, въ мартѣ, апрѣль. Рр. побережныя.

**К. лептосепала** (*C. leptosepala*, съ нѣжными долями). С.-З. Америка. Цв. бѣлые, въ маѣ—июль. 1 ф. **К. палюстрисъ** (*C. palustris*, болотная). *Калужница* (около-лука). Дико-растущее по тонкимъ мѣстамъ травян. р. Цв. золотисто-желтые, весной. 1. ф. Имѣеть махровыя разновидности: *плена монстроза* и *пана* (*monstrosa plena* и *pana plena*); кромѣ ихъ сѣверо-американскія *бифлора* (*biflora*) и *парнассифлора* (*parnassiflora*). **К. радикансъ** (*C. radicans*, укореняющаяся). Европа. Цв. ярко-желтые, въ апрѣль—маѣ. 6 д.

**КАЛЛЯ** (*Calla*). *Kallos*—красота. С. ароидей (1) Сѣв. и ср. Европа.

**К. палюстрисъ** (*C. palustris*, болотная). *Виллокриликъ*. Наме болотное р. Чехолъ бѣлый, початокъ состоитъ въ нижней части изъ женскихъ, въ верхней—изъ обоимъ половъ цв. 6 д. *Калля этиопика* есть *Ричардіа* (*Richardia*) *этиопика* (*Richardia* *athiopica*).

**КАЛЦЕОЛЯРИЯ** (*Colceolaria*). *Calceolus*—башмачекъ, или туфелька, по формѣ вѣшечки. С. поричковыхъ. (120). Андскія горы, Нов. Зеландія. Подраздѣляются на травянистыя и кустарныя. Чтобы раньше цвѣли травянистыя—сѣять въ августъ и дѣлать изъ нихъ черенки. Кустарныя размнож. черенками изъ мо-



лодого твердого роста под стекломъ, въ августъ—сентябръ и въ мартъ. Земля для горшечныхъ—легкая, сильная, для грунтовыхъ—съ преобладаніемъ глинисто-дерн. Темп. лѣтомъ 8—13, зимой 2—6°.

**К. амплексикаулис** (*C. amplexicaulis*, съ объемлющими лл.). Перу. Полувыносн. трав. Цв. желтые, въ июлѣ. 1½ ф. **К. арахноидеа** (*C. arachnoidea*, паутинная). Чили. Травяни. Цв. пурпуровые, въ июлѣ до сентяб. 1 ф. Стебли покрыты мелкимъ пушкомъ, какъ-бы паутиной. **К. биколоръ** (*C. bicolor*, двуцвѣтная). Перу. Полукуст. Цв. желтые, съ июлѣ до нояб. 2—3 ф. Сил. **К. диффуза** (*C. diffusa*). **К. виолацеа** (*C. violacea*, фиолетовая). Чили. Кустар. Цв. блѣдно-фиолетовые, въ июлѣ. 2 ф. **К. Павоніи** (*C. Pavonii*, Павона). Перу. Травяни. Цв. желтые, въ июлѣ. 2—4 ф. **К. плантагинеа** (*C. plantaginea*, похожая на Плантаго). Чили. Травяни. Цв. желтые. 1 ф. **К. скабиозефолія** (*C. scabiosaefolia*, съ лл. скабьозы). Перу. Цыпка съ непадающими лл. Цв. блѣдно-желтые съ мая до октяб. Р. довольно пушистое. **К. хиссопифолія** (*C. hyssopifolia*, съ лл. хиссопа). Чили. Кустарн. Цв. желтые, въ маѣ до августа. 1—2 ф.

Чистыя видовыя каландрины встрѣчаются въ садахъ рѣдко, за то разнообразны, или гибридные формы самыхъ разнообразныхъ окрасокъ и разноразличныя цвѣтовъ воспеваются во множествѣ.

**КАЛАНХОЕ** (*Kalanchoe*). Мѣстное китайское названіе. С. толстяковыхъ. (22). Троп. Азія. Троп. и южн. Африка, Бразилія. Тепличныя, либо оранж. кустар. рр. Уходъ какъ за Крассула.

**К. грандифлора** (*K. grandiflora*, крупноцвѣтная). Индія. Цв. ярко-желтые, дов. крупные, въ маѣ. 2 ф. Оранж. **К. крената** (*K. crenata*, съ зубчатыми лл.). Сера-Леоне. Цв. желтыми кистями, осенью. 1—2 ф. Тепл. куст. **К. фарингаса** (*K. farinosa*, мушкетер). Сокотра. Цв. шарлаховые, зонтиками, лѣтомъ. 6—12 ф. Тепл.

**КАЛЯДЕНІЯ** (*Caladenia*). *Kalos* — красивый, *aden* — железа. С. орхидей. Троп. рр. изъ Новой Зеландіи и Австраліи. Извѣстно около 30 видовъ, но въ садахъ не встрѣчаются.

**КАЛЯДИУМЪ** (*Caladium*). Произхожденіе названія неопредѣленно. С. ароидей. (7). Троп. Америка. Тепл. трав. и полукуст. рр. Волокнистая, сильная Травяни. размножаются дѣленіемъ. Темп. лѣтомъ 13—24, зимой 8—10°. Число типическихъ видовъ ограниченное, но разнородностей, происшедшихъ какъ въ природѣ, такъ и въ садахъ, чрезвычайно много.

**К. аргиритезъ** (*C. argyrites*, серебри-

стый). Пара. Лл. маленькіе, стрѣловидные, зеленоватые съ серебристою росписью. **К. биколоръ** (*C. bicolor*, двуцвѣтный). Бразилія. Лл. щитовидные, сердцевидно-стрѣловидные съ блѣлою серединой. 1 ф. **К. Верскаффельтіи** (*C. Verschaffeltii*, Верскаффельта). Пара. Лл. сердцевидные, съ ярко-красными пятнами. **К. Девосіанумъ** (*C. Devosianum*, Девосія). Пара. Лл. углестые съ блѣлыми и малиновыми пятнами. **К. Кокіи** (*C. Kochii*, Коха). Пара. Лл. съ блѣлыми пятнами. **К. Леопольди** (*C. Leopoldi*, Леопольда). Пара. Лл. зеленые съ красными разводами и малиновыми пятнами. **К. макрофиллумъ** (*C. macrophyllum*, крупнолистный). Пара. Лл. блѣдно-зеленые, съ зеленовато-блѣлыми пятнами. **К. макулятумъ** (*C. maculatum*, пятнистый). Юж. Америка. Лл. продолговатые съ сердцевиднымъ основанием, пятна мелкія блѣлыя. **К. мarmorатумъ** (*C. marmoratum*, мраморный). Гвайявилъ. Лл. стрѣловидно-овальные, бутылочно-зеленые съ сѣроватыми и серебристыми пятнами. **К. рубровеніумъ** (*C. rubrovenium*, съ красными жилками). Пара. Лл. сѣровато-зеленые съ красными жилками. **К. сангвинолентумъ** (*C. sanguinolentum*, съ кроваво-красными пятнами). Амазонская р. Лл. съ блѣлою серединою, искрапаною красными пятнами. **К. Шантини** (*C. Chantini*, Шантена). Пара. Лл. ярко-карминные съ блѣлыми пятнами и темно-зеленымъ краемъ. **К. Шомбургіи** (*C. Schomburgkii*, Шомбургка). Бразилія. Лл. зеленые съ блѣлыми жилками. Сил. **К. Шеллеріи** и **Алоказія аргиронейра** (*C. Schoelei*, *Alocasia argyoneura*).

**КАЛАМАГРОСТИСЪ** (*Calamagrostis*). *Calamos* — тростникъ, *agrostis* — злакъ. (5). Европа, Азія, Африка и Америка. Большею частію выносивыя рр., пугающіяся въ обычныхъ садовой землѣ и размножаемыя сѣменами.

**К. ланцеолата** (*C. lanceolata*, ланцетовидная). Метла. По влажнымъ лѣсамъ. Цв. пурпуровые, въ июлѣ. 3 ф. **К. стрікта** (*C. stricta*, приморская). По болотамъ. Цв. коричневыя, въ июлѣ. 2 ф.

**КАЛАМИНТА** (*Calamintha*). *Kalos* — красивый *mintha* — мята. С. губоцвѣтныхъ. (40). Европа, Азія, Африка и Америка. Обыкновенныя многол. трав. рр., размножаемыя побѣгами и дѣленіемъ. Обыкновенная.

**К. грандифлора** (*C. grandiflora*, крупноцвѣтная). Цв. пурпуровые, въ июлѣ. 1 ф.

**КАЛЯМУСЪ** (*Calamus*). *Calamos* — тростникъ, упоминаемый Теофрастомъ. С. пальмъ. (200). Троп. Азія и Африка. Теплич. пальмы. Глини. дерн. пополамъ съ листов. Размн. сѣменами. Темп. лѣтомъ 13—22, зимой 8—10°. Обильная поливка.

**К. асперримусъ** (*C. asperimus*, самый жесткій). Ява. Лл. перистые, 3—12 ф. длинной; черешки съ длинными, частыми черными колочками. **К. виминалис** (*C. viminalis*, тонкостебельный). Ява. Лл. перистые. 1—2 ф.; у черешка основаніе съ блѣлыми глами. **К. лептоспадикс** (*C. leptosporadix*, съ нѣжными чешками). Индія. Лл. перистые; черешки внизу имѣютъ 3—4 длинныхъ иглы. **К. Льюизианусъ** (*C. Lewisianus*, Льюиса). Индія. Лл. перистые, раскидистые; основаніе черешка широкое съ темно-коричневою нижнею частью, усаженою длинными, плоскими, черными иглами. **К. Ройлеанусъ** (*C. Royleanus*, Ройля). Гималаи. Лл. перистые, черешки съ темно-зелеными глами. **К. спектабилис** (*C. spectabilis*, красивый). Малакка. Лл. перистые, съ немногими перьями.

**КАЛЯНДРИНІЯ** (*Calandrinia*). *Каландринія*—италийскій ботаникъ въ началѣ XVIII стол. С. портулаковыхъ. (60). Тропич. Америка, Австралія. Одно- или многол. трав. рр. Сѣменами на мѣстѣ или въ горшкахъ, изъ которыхъ высаживаются со ступомъ, п. ч. пересадки не терпятъ. Цвѣтуть только при ясномъ солнцѣ. Легкая песчанистая.

**К. грандифлора** (*C. grandiflora*, крупноцвѣтная). Чили. Цв. пурпуровые, въ июлѣ. 1 ф. **К. Менциезіи** (*C. Menziesii*, Менциеса). Калифорнія. Цв. малиново-пурпуровые, съ июня до сентяб. Стебли стелющіеся. Сил. **К. спеціоза** (*C. speciosa*). **К. умбеллата** (*C. umbellata*, зонтичная). Перу. Цв. ярко-малиновые, лѣтомъ. 6 д. Превосходное двул. р.

**КАЛЯНТЕ** (*Calanthe*). *Kalos* — красивый и *anthos* — цвѣтокъ. С. орхидей. (40). Троп. Азія и Африка, Японія, Спр. и Юж. Америка, Нов. Каледонія. Земныя теплич. рр. Дѣленіемъ и отпрысками. Глини. дерн. съ торф. и пескомъ. Поверхностное удобреніе коровьимъ перегноемъ. Дренажъ — самое важное условіе; постоянно влажное содержаніе кома; достаточный свѣтъ. Темп. лѣтомъ 13—22, зимой 8—12°.

**К. Вейчии** (*C. Veitchii*, Вейча). Гибридъ между *C. вестита* и розеа, назыв. также *Лиматодесъ розеа* (*Limatodes rosea*). Цв. ярко-розовые, съ блѣлымъ зѣвомъ, зимой. 3 ф. **К. вератрифолія** (*C. veratrifolia*, съ лл. вератрума). Индія. Цв. блѣлые, съ мал. по июлѣ. 2—3 ф. **К. вестита** (*C. vestita*, одѣтая). Бурма. Цв. блѣлые, въ ноябрѣ; лл. опадающіе, 2½ ф. Имѣетъ нѣсколько разновидностей: *игнео-кокцинеа* (*igneo-coccinea*), съ основаніемъ столба пурпуровымъ окруженнымъ огненно-краснымъ, съ о. Борнео, *ниваліс* (*nivalis*), съ чисто-блѣлыми цв., съ о. Ява; *рубро-окулата* (*rubro-ocu-*

*lata*), съ цв. блѣлыми въ серединѣ съ красн. малиновымъ кольцомъ, въ октябрѣ до февралѣ; *Турнери* (*Turneri*), съ цв. блѣлыми, по серединѣ розовыми, съ Явы. **К. Доминіи** (*C. Dominyi*, Домини). Гибридъ между *К. Мазюка* и *К. вератрифолія*; цв. лиловые, губа — темно-пурпуровая. **К. Зибольдіи** (*C. Sieboldii*, Зибольда). Японія. Цв. большіе, желтые. 1 ф. **К. Мазюка** (*C. Masuka*, Мазюка). Индія. Цв. темно-фиолетовые, губа — пурпуровая. Съ июня до августа. Колосъ въ 3—4 ф. длины. **К. Петри** (*C. Petri*, Петра Вейча). Полинезія. Походить на вератрифолія, но безъ желтаго выроста у губы.

**КАЛЯТЕЯ** (*Calathea*). *Calathos* — корзиночка, кузовокъ, по рыльцу или потому, что въ юж. Америкѣ изъ лл. дѣлаютъ корзинки. С. ивбирныхъ. (60). Троп. Америка, З. Африка. Тепл. трав. многол. рр. Дѣленіемъ. Песчан. торф. съ волокнист. глини. дерн. Темп. лѣтомъ 13—19, зимой 10—12°.

**К. арректа** (*C. arrecta*, приморская). Экуадоръ. Лл. на верхней сторонѣ атласисто-зеленые, на нижней красно-рубиновые. **К. Баракини** (*C. Baraquinii*, Баракена). Амазонская р. Лл. свѣтло-зеленые съ серебристо-блѣлыми полосками. **К. бѣлая** (*C. bella*, красивая). Бразилія. Лл. сѣровато-зеленые съ краями и двумя центральными темно-зелеными полосками. **К. Вальлизи** (*C. Wallisii*, Валисса). Южн. Америка. Лл. зеленые съ темно-зелеными полосками. **К. Ванденъ-Хекеи** (*C. Vanden-Heskei*, Ванденъ-Гека). Бразилія. Лл. темно-зеленые съ поперечными болѣе свѣтлыми полосками, сред. жилка съ серебристыми краями. **К. Вейчии** (*C. Veitchii*, Вейча). З. Троп. Америка. Лл. ярко-зеленые съ полудлунными желтыми пятнами по сторонамъ; нижн. поверхность пурпуровая. 3 ф. **К. иллюстрис** (*C. illustris*, блестящая). Экуадоръ. Лл. свѣтло-зеленые съ болѣе темными поперечными полосками, сред. жилка матовая съ двумя блѣлыми полосками отъ основанія до вершины, нижн. сторона пурпуровая. **К. Керховіана (*C. Kerchoviana*, Керхова). Бразилія. Лл. сердцевидные, сѣровато-зеленые съ рядомъ пурпуровыхъ пятенъ по сторонамъ средней жилки. **К. леопардина** (*C. Leopardina*, леопардовая). Бразилія. Лл. желтоватые съ темно-зелеными пятнами. 2 ф. **К. Линдѣни** (*C. Lindeni*, Линдена). Перу. Лл. темно-зеленые съ желтоватыми пятнами; нижн. сторона пурпуровая. **К. Макуана** (*C. Makouana*, Макуа). Троп. Америка. Край лл. темно-зеленые, середина полупрозрачная, съ желтоватыми, блѣлыми и темно-зелеными продолговатыми пятнами; черешки тонкіе, пурпуровые. Сил. **К. оливарисъ** (*C. olivaris*). **К.****



**Массанжеана** (C. Massangeana, Массанжа). Бразилія. Лл. оливково-зеленые, по срединѣ и по бокамъ жилотъ серебристо-зеленые, изъ которыхъ отдѣляются серебристо-бѣлые полосы; часть прилегающая съ серебристой срединѣ съ большими коричнево-пурпуровыми пятнами. Вся роспись напоминаетъ крылья бабочки. **К. микансъ** (C. micans, блестящая). Троп. Америка. Лл. темно-зеленые съ серебристыми полосками. **К. нитенсъ** (C. nitens, глянцевитая). Бразилія. Лл. зеленые, глянцевитые съ болѣе темными полосками. **К. орната** (C. ornata, украшенная). Колумбія. Лл. желтоватые съ широкими темно-оливковыми поперечными полосами; нижн. сторона пурпуровая. 1 ф. Имѣетъ нѣсколько разновидностей, изъ которыхъ лучшія: *албо-линеата* (albo-lineata), *магестика* (majestica), *регалис* (regalis) и *розео-линеата* (roseo-lineata). **К. пардина** (C. pardina, барсолова). Нов. Гренада. Лл. блѣдно-зеленые съ коричневыми пятнами. Цв. большіе, желтые. **К. принцесъ** (C. princeps, величественная). Перу. Лл. съ широкими желтыми краями. **К. тубиспата** (C. tubispatha, съ трубчатимъ чехломъ). Троп. Америка. Лл. зеленовато-желтые, съ продолговатыми коричневыми пятнами. **К. зебрѣна** (C. zebra, зебровая). Бразилія. Лл. бархатисто-зеленые съ зеленовато-пурпуровыми полосками; нижняя сторона темно-зеленая, пурпуровая. Одна изъ обыкновеннѣйшихъ, тѣмъ не менѣе полезнѣйшихъ калятей.

**КАМАРИДИУМЪ** (Camaridium). *Katara*—сводъ, подугообразную рыльцу. С. орхидей. Троп. теплич. орхидей. Тор. фиол. мѣхъ съ черепками, въ корзинѣ. Темп. лѣтомъ 13—26, зимой 10—15°.

**К. охroleйкумъ** (C. ochroleucum, желтоватый). Тринидадъ. Цв. желтоватые, въ іюль. 1 ф.

**КОМАССІЯ** (Comassia). Американскіе индѣйцы, употребляющіе въ пищу луковицы одного изъ видовъ, зовутъ ихъ *коамассъ*, отсюда — названіе рода. Луков. пр. изъ С. Америки. С. лилейныхъ. (2). Выноса. въ песч. торф. и затѣненіи. Дѣленіемъ и сѣменами.

**К. эскулента** (C. esculenta, съѣдобная). Колумбія. Цв. голубые до бѣлыхъ, лѣтомъ. 1 ф. **К. Фразера** (C. Fraseri, Фразера). Вост. шт. С. Америки. Цв. блѣдно-голубые, мельче, тѣмъ у C. esculenta. 1 ф.

**КАМБЕССЕДЕЗІЯ** (Cambessedesia). *Cambessedesia* (Cambessedes)—сотрудникъ Огюста С. Илера въ составленіи «Flora Brasiliæ meridionalis». С. черноустовыхъ. (8). Темп. трав. или куст. пр. Черенками изъ полувыр. роста въ песчан. з., подъ стекломъ и въ теплѣ. Торф. съ пескомъ.

**К. парагвайензисъ** (C. paraguayensis, парагвайская). Парагвай. Цв. блѣдно-розовые, въ іюнѣ. Травян. многол. 10 д.

**КАМБИЙ** (Cambium). Образовательный сокъ, находящійся весною между корою и древесиною вѣтрослыхъ или двухъмѣнодолныхъ породъ.

**КАМЕДЬ**. Растительный, древесный клей.

**КАМЕЛЬІЯ** (Camellia). *Камеллусъ-моравскій* иезуитъ С. тернстремійныхъ. (15, включая Теа). Вост. и троп. Азія. Инд. архип. Оранже. кустарники пр. Прививкой въ теплому грунту, въ защитѣ отъ солнца, въ мартѣ-апрѣлѣ, черенками изъ вызрѣвшаго роста, въ песокъ, въ закрытомъ, затѣненномъ мѣстѣ, на легкомъ телѣ. Глин. дерн. съ коровинымъ перегноемъ и углемъ. Темп. лѣтомъ 8—16, зимой 2—6°.

**К. олейфера** (C. oleifera, дающая масло). Китай. Цв. бѣлые, многочисленные, пахучіе, въ ноябрѣ. 6—8 ф. **К. японика** (C. japonica, японская). Японія. Китай. Цв. разной окраски. 20 ф. Имѣетъ чрезвычайно много разнообразныхъ формъ, какъ по сложенію, такъ и по окраскѣ цвѣтовъ, отъ бѣлыхъ до ярко-малиновыхъ и красныхъ. **К. теифера** (C. theifera, чайная). *Чайное дерево*. Китай, Японія, Индія. Цв. бѣлые, съ ноябрю до весны. 2—6 ф. Прежде называлось *Теа боха* и *T. viridis* (Thea bohea, T. viridis). Зеленый и черный чай получаютъ съ того-же р., но приготовляются различно. *Цейтонный* чай получается изъ болѣе молодыхъ лл.

**КАМЕНИСТЫЙ УЧАСТОКЪ**. Отдѣленіе воздушнаго сада, предназначенное для многолѣтнихъ травянистыхъ и низкихъ кустарныхъ растений, между которыми помѣщаются породы альпійскія, съ высокими горъ. Кам. уч. можетъ быть устроенъ какъ на естественной, такъ и на искусств. покатоости. Растенія, въ него сажаясь, помѣщаются въ гнѣзда, образованные изъ камня, причемъ земля въ нихъ составляется соответственно требованіямъ породы; точно также съ этими требованіями соотнобразуютъ и самое положеніе растенія.

**КАМНЕЛОМКОВЫЯ** пр. (Saxifragaceae). Древесн., кустарн. или травян. пр. изъ умеренныхъ и холодныхъ странъ. рѣдко тропическихъ. Въ семействѣ 75 родовъ и 540 видовъ. Изъ родовъ наиболѣе замѣчательны: Астиальбе, Кунонія, Рибесъ, Саксифрага, Франкоа, Хидрангеа и Эскаллонія.

**КАМОЕНСІЯ** (Camoensia). Луисъ Камоенсъ (Camoens)—знаменитый португальскій поэтъ. С. бобовыхъ (2). Троп.

**3. Африка**. Темп. куст. пр. Глин. дерн. съ лист. Черенками въ песокъ, подъ стекломъ, на тепломъ грунту или сѣменами въ теплицѣ. Темп. лѣтомъ 15—24, зимой 13—16°.

**К. максима** (C. maxima, большая). Ангола. Цв. бѣлые или желтоватые. Изъ всѣхъ извѣстныхъ бобовыхъ цв. ея—самые большіе, до 1 ф. длины.

**КАМПАНА** (Campana). *Ситрапа*—колоколь, по формѣ цв. С. гесперійныхъ. (6). Троп. Америка. Темп. трав. выноса. многол. пр. Уходъ какъ за Геспера.

**К. грандифлора** (C. grandiflora, крупноцвѣтная). Санта Фе. Цв. бѣлые съ малиновыми крапичками и полосками, въ іюнѣ. 3 ф.

**КАМПАУЛЯ** (Campanula). Уменьшенительное *ситрапа*—колоколь, по формѣ цв. С. колокольчиковыхъ. (320). Европа, Азія, Африка. Одно, дву- и многол. пр. Однол. сѣменами, весной, на мѣстѣ; двул. на грядкѣ или въ парникѣ, въ апрѣлѣ-маѣ, черенками, вслѣдствіе чего принимаютъ характеръ многол. Наконецъ, многол. дѣленіемъ. Вестиндскіе, Австраліи-скіе и Южно-европ. сохраняются въ оранжереѣ и даже содержатся въ теп. 3.—обыкновен. или для горшечныхъ съ торфяной и перегноемъ.

**К. Альбионіи** (C. Allionii, Альбионіи). Пьемонтскія Альпы. Цв. мелкіе, голубые, съ іюля до сентября. Стелющиеся. 3—4 д. Трав. многол. возд. **К. альпина** (C. alpina, альпійская). Европ. Альпы. Цв. темно-голубые, въ іюль. 3—9 д. Трав. многол. возд. **К. барбата** (C. barbata, бородастая). Европ. Альпы. Цв. пониклые, блѣдно-голубые, въ іюнѣ. 6—18 д. Имѣетъ разновидность съ бѣлыми цв. Многол. трав. возд. **К. бето-ницефолія** (C. betonicaefolia, съ лл. бетоники). Олимпъ въ Вѣннѣ. Цв. сине-пурпуровые, въ маѣ. 1½ ф. Двул. возд. **К. бонониензисъ** (C. Bononiensis, болонская). Италия. Цв. сине-фиолетовые, дов. мелкіе, въ іюль. 2—3 ф. Есть разновидность съ бѣлыми цв. **К. Вальдштейниана** (C. Waldsteiniana, Вальдштейна). Венгрія. Цв. фиолетовые, въ іюнѣ. 4—6 д. Возд. многол. трав. **К. Ванъ-Гуттеи** (C. Van Houttei, Вангутта). Гибридъ. Цв. темно-пурпуровые, въ іюль-августѣ. 2 ф. **К. гарганика** (C. garganica, изъ Гаргана). Италия. Цв. голубые, съ мая до сентября. 3—6 ф. Многол. стелющиеся. **К. гломерата** (C. glomerata, скученная). *Приточникъ*. Ср. и Сѣв. Европа. Цв. фиолетовые или бѣлые, скученными головками, съ мая до сентября. 1—2 ф. Имѣетъ нѣсколько разновидностей и, между прочими, съ махровыми цв. **К. грандисъ** (C. grandis, больша). Натоли. Цв. блѣдно-фиолетовые, въ

августѣ. 6—9 д. Оранже. трав. многол. **К. изофилля** (C. isophylla, съ равными лл.). С. Италия. Цв. сине-лиловые, въ августѣ. Сип. **К. флорибунда** (C. floribunda). Полувып. трав. Имѣетъ разновидность съ цв. бѣлыми. **К. карпатика** (C. carpathica, карпатская). Трансильванія. Цв. голубые, съ іюня до августа. 9 д. Многол. **К. коллиана** (C. collina, пахотная). Кавказъ. Цв. темно-голубые, въ іюль. 1 ф. Многол. **К. лактифлора** (C. lactiflora, съ млечно-бѣлыми цв.). Кавказъ. Цв. съ голубоватымъ отгиномъ, въ іюль-сентябрѣ. 2—6 ф. Полувыноса. многол. трав. **К. медіумъ** (C. medium, средней величины). Юж. Европа. Цв. голубые, пурпуровые и бѣлые, въ іюль. Полувын. двулѣтн. **К. нитидъ** (C. nitida, блестящая). С. Америка. Цв. бѣлые или голубые, простые или махровые. лѣтомъ. 3—9 д. Многол. **К. нобилисъ** (C. nobilis, благородная). Китай. Цв. красновато-фиолетовые или бѣлые, въ іюль. 2 ф. Полувып. многол. **К. перегрина** (C. peregrina, иноземная). Г. Ливанъ. Цв. темно-фиолетовые, въ іюль. Полувын. многол. **К. персицефолія** (C. persicifolia, съ лл. какъ у персика). *Колокольчики*. С. и сред. Европа. Цв. отъ голубыхъ до бѣлыхъ всѣхъ оттенковъ, въ іюль. 1—3 ф. Имѣетъ много видовыхъ разновидностей. Многол. выноса. **К. пулльа** (C. pulla, рыжеватая). В. Европа. Цв. сине-фиолетовые, въ іюнѣ. 3—6 д. Многол. Сильная песч. торф. съ лист. **К. пузилья** (C. pusilla, маленькая). Юж. Европа. Цв. отъ темно-синихъ до бѣлыхъ, пониклые, въ іюль-августѣ. Сип. **К. румилъ** (C. rumila). Выноса. многол. **К. пирамидалисъ** (C. pyramidalis, пирамидальная). Европа. Цв. свѣтло-голубые до бѣлыхъ, съ темнымъ низомъ, въ іюль. 4—5 ф. Хороша въ горникахъ. Многол. **К. Райнера** (C. Raineri, Райнера). Швейцарія, Италия. Цв. голубые, въ іюнѣ. 2—3 д. Многол. полувын. **К. рапункулоидесъ** (rapunculoides, похожа на рапункулъ). *Боровой колокольчикъ*. Ср. Европа. Цв. фиолетово-синие, пониклые, въ іюнѣ. 2—4 ф. Многол. **К. рапункулозъ** (C. rapunculus, рапункулъ). Европа. Цв. голубые или бѣлые, въ іюль. 2—3 ф. Многол. **К. ротундифолія** (C. rotundifolia, круглолистная). *Ломотная трава*. Ср. и С. Европа. Цв. темно-голубые, пониклые, въ іюнѣ до августа. 6—12 д. Многол. Имѣетъ нѣсколько разновидностей. **К. сарматика** (C. sarmatica, сарматская). Кавказъ. Цв. блѣдно-голубые, въ іюль. 1—2 ф. Многол. **К. спещіоза** (C. speciosa, особенная). Ю. Европа. Цв. голубые, пурпуровые или бѣлые, въ іюнѣ-іюль. 12—18 д. Многол. **К. тиреоидеа** (C. thyrsoidea, тиреоидная). Европ. Альпы. Цв. свѣтло-желтые, въ іюль. 1—1½ ф. **К. Томассиніана** (C. Tomassiniiana, То-



массина). Италия. Цв. блѣдно-голубые, въ июль—августъ. 9—12 д. Многол. **К. трахелиумъ** (*C. Trachelium*, —горловая). Горная трава. С. и Сред. Европа. Цв. голубые, фиолетовые, блѣлые, въ июль. 2—3 ф. Многол. **К. фрагилисъ** (*C. fragilis*, ломкая). Южн. Италия. Цв. блѣдно-пурпуровые съ блѣлой серединой, въ июль августъ. 4—6 д. Сип. **К. Баррелерии** (*C. Barrelierii*). **К. ценизи** (*C. cenisia*, съ Монъ-Сени). Италия. Цв. темно-голубые, въ июль. 3 д. Многол. **К. цеспитоза** (*C. caespitosa*, кустистая). Ср. Европа. Цв. пониклые, темно-голубые или блѣлые, съ май до августа. 4—6 д. **К. Шейхцери** (*C. Scheuchzeri*, Шейхцера). Юж. европ. Альпы. Цв. темно-голубые, въ июль—августъ. Многол. **К. эринусъ** (*C. Erinus*, Эринусъ). Европа. Цв. розовато-голубые, или блѣлые, съ май до августа. 3—9 д. Однол.

**КАМПАНУМЕЯ** (*Campanulaceae*). Измѣненное *campanula*. С. колокольчиковыхъ. (5). Малайскій арх., Гималаи. Оранж. трав., клубничныя пр. Песчан. дернов. съ малымъ коллч. торф. Съеменами и дѣленіемъ.

**К. яваника** (*C. javanica*, яванская). Гималаи. Цв. желтоватые съ коричневыми жилками.

**КАМПЕНЕВОВОЕ** дерево. См. Хематоксилонъ.

**КАМПСИДИУМЪ** (*Campsidium*). *Campsis*—кривизна. С. биньонійныхъ. Оранж. вьющ. Ухоть какъ за Вильонъ.

**К. хилензе** (*chilense*, чилийскій). Чили. Цв. красно-оранжевые, 30—40 ф.

**КАМПОПУСЪ** (*Camptopus*). *Camptos*—кривой и *pus*—нога; по искривленной цв. пожитъ. С. мареновыхъ. (1) Теплич. куст. р., относимое теперь къ Цефеалисъ. Черенками въ песчан. землѣ, подъ стекломъ, въ теплѣ. Глин. дерн. съ торф. и пескомъ.

**К. Манны** (*C. Mannii*, Манна). Фернандо По. Цв. блѣлые, лѣтомъ, 15 ф.

**КАМФОРА** (*Camphora*). По главному произведенію, — *камфора*, которое даетъ р. С. лавровыхъ. Тепл. деревья. Глин. дерн. съ торф. Черенками.

**К. официналис** (*C. officinalis*). Японія. Цв. зеленоватые, съ марта до июня. 20 ф. Сип. *Циннамому* *Камфора* (*Cinnamomum Camphora*).

**КАМЫШЪ**. Тростникъ, болотное колѣчатое растение. Арундо.

**КАНАВАЛІЯ** (*Canavalia*). Въ Малабарѣ рр. эти зовутъ канавали. С. бобовыхъ. Тепл. вьющіяся и цѣпкія трав. или полукуст. рр. Песчан. дернов. Съеменами и черенками въ песч. з., въ

теплѣ и подъ стекломъ. Темп. лѣтомъ 12—17, зимой 8—10°.

**К. энсиформисъ** (*C. ensiformis*, мечевидная). Индія. Цв. блѣлые съ краснымъ, въ июль. 6 ф. Сип. *К. гладыста* (*C. gladiata*).

**КАНАРИНА** (*Canarina*). По происхожденію съ Канарскихъ о. С. колокольчиковыхъ (1). Оранж. многол. трав. Волокни. глин. дерн. съ торфомъ и пескомъ; дренажъ хорошій. Черенками изъ бокового роста, въ пескѣ, подъ стекломъ (довольно трудно) или дѣленіемъ, весной, какъ только тронется ростъ, перемѣстивъ на теплый грунтъ.

**К. кампанула** (*C. campanula*—колокольчатая). Канарскіе острова. Цв. желтовато-пурпуровые или оранжевые съ красными жилками, съ января до марта. 3—4 ф.

**КАНАРИУМЪ** (*Canarium*). Малайцы зовутъ эти растенія *Канари*. С. мѣшечковидныхъ (40). Тропич. страны. Теплич. древесн. рр. Ухоть какъ за Босвеллия.

**К. коммуне** (*C. commune*, обыкновенный). Индія. Цв. блѣлые. Плоды содержатъ ядро, похожее вкусомъ на кампанъ.

**КАНБИ** (*Canbia*). По англ. ботанику *Канби* (*Canby*). С. маковыхъ. (1). С. Америка.

**К. кандида** (*C. candida*, чисто-бѣлая). Ю. В. Калифорнія. Цв. блѣлые. 1 ф. Земля песчанистая. Съеменами.

**КАНДОЛЬЛЕА** (*Candollea*). Огюсть Пирамъ Де Кандолль, проф. въ Женевѣ, авторъ мн. сочиненій. С. дильленіевыхъ. (15). Ю.-З. Австралія. Оранж. кустарники. Песч. дерн. съ волокни. глин. дерн. Черенками въ песч. торф. подъ стекломъ. Темп. лѣтомъ 10—16, зимой 8—10°.

**К. кунеиформисъ** (*C. cueneiformis*, кленовидная). Цв. желтые, въ июль. 7 ф.

**КАНДЫКЪ**. См. Эритрониумъ.

**КАНЕЛЬЯ** (*Canella*). Уменьш. *canina*—тростникъ, по свертывающейся корѣ. С. коричневыхъ. (2). Антильск. о., Колумбія. Тепл. деревья. Песч. дернов. съ волокни. торф. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ теплѣ, подъ стекломъ, въ апрѣль-май. Темп. лѣтомъ 12—22, зимой 8—10°.

**К. альба** (*C. alba*, бѣлая, *Корица бѣлая*). Вестиндія. Цв. фиолетовые. 15 ф. Все р. благоуханное.

**КАНИСТРУМЪ** (*Canistrum*). *Canos*—корзина, по сходству цвѣторасположенія съ корзиною съ цв. С. бромелиевыхъ. Теплич. эпифиты. Волокни. торф. съ глин. дерн. и дрѣв. углемъ. Отпрысками и дѣленіемъ. Темп. лѣтомъ 15—24, зимой 13—16°.

**К. ауранційкумъ** (*C. aurantiacum*, оранжевый). Бразилія. Цв. желто-оранжевые, въ июль до сентября. **К. эбурнеумъ** (*C. eburneum*, бѣлый какъ слоновая кость). Бразилія. Цв. блѣлые, съ зеленымъ, въ май; цв. головки окружены блѣлыми лл. Сип. *Гузмания фразгранс* и *Нидуларіумъ Линдена* (*Guzmania fragrans*; *Nidularium Lindenii*).

**КАННА** (*Canna*). Происхожденіе названія не опредѣленное, тѣк. производятъ отъ кельтскаго *cane*—тростникъ. С. инбирныхъ. (30). Троп. Америка. Тепл. многол. трав. Съеменами на теплой грядкѣ; дѣленіемъ корня. Глин. дерн. рыхлая, сильная. Темп. лѣтомъ 13—22, зимой 8—10°.

**К. Ахирасъ** (*C. Achiras*, Ахирасъ). О. Мендоза. Цв. темно-красные, въ августъ. 5 ф. Воспитывается преимущ. *A. variegata* (*A. variegata*) съ блѣло-полосатыми лл. **К. Анней** (*C. Annaei*, Анне). Бразилія. Цв. большіе, лососевые, въ июль. 6 ф. Имѣетъ нѣсколько красивыхъ разновидностей. **К. Варшевичи** (*C. Warszewiczii*, Варшевича). Коста-Рика. Цв. ярко-красные внутри, пурпуровые снаружи. 3 ф. Имѣетъ нѣсколько красивыхъ формъ. **К. гигантеа** (*C. gigantea*, великанская). Юж. Америка. Цв. крупные, красно-оранжевые снаружи, темно-пурпуровые внутри, лѣтомъ. 6 ф. **К. дисколоръ** (*C. discolor*, двуцвѣтная). Юж. Америка. Цв. красные. 6 ф. **К. лимбата** (*C. limbata*, каемчатая). Отечество неизвѣстно. Цв. желтовато-красные. 3 ф. **К. нигрикансъ** (*C. nigricans*, черноватая). Лл. красно-бронзовые, стебли красно-пурпуровые. 4 ф. Одно изъ лучшихъ лл. орнам. рр. **К. спеціоза** (*C. speciosa*, отъиная). Непаль. Цв. красные, въ августъ. 3 ф.

Кромѣ поименованныхъ, много гибридныхъ формъ, чрезвычайно изящныхъ какъ по листу, такъ и по цвѣтамъ.

**КАННАВИСЪ** (*Cannabis*). *Cannabis*—встрѣчается у Диоскорида; филологи производятъ это слово отъ санскритскаго *canam* С. крапивныхъ. (1) Ср. Азія. Однол. трав. Съеменами весной, на мѣстѣ.

**К. сатива** (*C. sativa*, питательная). Колонія. Индія. Цв. желтоватые, въ июль. 4—10 ф. Въ саду употребляется какъ орнамент. лл. п.

**КАНСКОРА** (*Canscora*). На Малабарѣ. К. перфоліата зовется *кансканъ-кора*. С. горечавковыхъ. (12). Троп. страны. Теплич. и оранж. однол. рр. Ухоть какъ за бальзамникомъ. Растетъ лучше, когда къ з. примѣшена известь.

**К. Парии** (*C. Parishii*, Парина). Мульмейнъ. Цв. блѣлые. 2 ф. Оранж.

**КАНТАЛУПКА**. Рубчатая, сплюснутая, бородавчатая дыня.

**КАНТУА** (*Canthua*). *Кантуа*—названіе мѣстное перуанское. С. синюшныхъ. (7). Перу, Боливія. Оранж. куст. рр. Черенками въ пескѣ, подъ стекломъ. Глин. дерн. съ торф. Темп. зимой 4—6°.

**К. буксифолия** (*C. buxifolia*, съ лл. буксуса). Перуанскія Анды. Цв. блѣдно-красные, въ апрѣль. 4 ф. Сип. *К. денденсъ* (*C. dependens*). **К. пирилофолія** (*C. pyrrolifolia*, съ лл. грушанки). Перу. Цв. желтоватые, въ мартѣ. 3 ф.

**КАПЕЛЬ**. Паденіе капель съ крыши теплицы или оранжереи вслѣдствіе сгущенія влаги на охлажденной поверхности.

**КАПЕРСОВЫЯ** рр (*Capparidaceae*). Травянистыя, кустарныя, рѣдко древесныя породы. Цвѣтки одиночные или пучками, долей 4—8, лепестковъ 4—8, обычно чередующихся съ долями. Листья очеретные, рѣдко супротивные. Растутъ въ тропическомъ и жаркомъ полсахъ обоихъ полушарій. Въ сем. этомъ болѣе 20 родовъ, изъ коихъ наиболѣе извѣстны Каппарисъ, Клеоме и Кратева. Число видовъ доходитъ до 300.

**КАППАРИСЪ** (*Capparis*). Названіе *Capparis* употреблено Диоскоридомъ; по персидскіи каперы называются *Капар*. С. каперовыхъ. (120). Южн. Европа, Азія, Африка, Южн. Америка, Австралія. Тепл. куст. рр. Песчан. дерн. съ волокни. торф. Черенками изъ вѣршаго роста въ пескѣ, подъ стекломъ, во влажномъ теплѣ.

**К. аминдаліна** (*C. amygdalina*, похожій на миндаль). Вестиндія. Цв. блѣлые, 6 ф. **К. одоратиссима** (*C. odoratissima*, съ хорошимъ запахомъ). Каракасъ. Цв. фиолетовые, душистые. 6 ф. **К. спиноза** (*C. spinosa*, съ иглами). Обыкновенный *капаръ*. Южн. Европа. Цв. блѣлые, съ красноватымъ отгнѣнкомъ снаружи. 3 ф. Оранж.

**КАПРИФОЛІЙ**. См. Лоницера.

**КАПСИКУМЪ** (*Capsicum*). *Капто*—жесть, кусать, по жгучему вкусу сѣмятъ и покрова плода. С. пасленовыхъ. (50). Тропич. страны. Теплич. куст. или полувыносл. однол. рр. Сильная з. Съеменами въ парникѣ.

**К. аннуумъ** (*C. annuum*, однолѣтній). *Стручковый перецъ*. Юж. Америка. Цв. блѣлые, въ июль. 1—2 ф. Имѣетъ весьма много разновидностей, отличающихся формой, величиной и окраской плодовъ. Полувыносл. трав. **К. баккатумъ** (*C. baccatum*, ягодный). Троп. Америка. Цв. зеленоватые, въ июль. 2—4 ф. Оранж. куст. р.

**КАПОУЛЯ**. Мѣшокъ изъ бумаги для храненія сѣмянъ.



**КАПУСТА БРЮССЕЛЬСКАЯ, К. ЗЕЛЕНАЯ, К. КОЧАННАЯ, К. КУДРЯВАЯ, К. КУСТОВАЯ, К. ПАЛЬМОВАЯ, К. СПАРЖЕВАЯ, К. ЦВЕТНАЯ.** См. Брассика.

**КАПУСТНИЦА.** Бѣлая бабочка, гусеница котрой (капустный червь) нападает на капусту.

**КАПУСТНЫЙ ЧЕРВЬ.** Гусеницы трехъ различныхъ бабочекъ, — двухъ-дневныхъ бѣлыхъ (*Pieris brassicae* и *P. rapae*) и одной ночной (*Mamestra brassicae*). Онѣ чрезвычайно прожорливы и наносятъ большой вредъ капустѣ, особенно послѣдняя, которая сильно грязнитъ растение своимъ испражненіемъ. Вѣрныхъ средствъ противу этихъ враговъ нѣтъ. Лучшимъ считается обирание руками и смачиваніе растений мыльною водою.

**КАПУЦИНЪ.** См. Тропѣолумъ.

**КАРАГАНА (Caragana).** Въ Монголіи такъ назыв. К. арборесценсъ. С. бобовыхъ. (15). Ю.-В. Россія, Азія, Гималаи. Песчан. дерн. Сѣменами, весною; черенками корневыми, прививкой.

К. арборесценсъ (С. arborescens, древовидная). Желтая или сибирская акація. Сибирь. Цв. желтые, въ май. 15 — 20 ф. К. спиноза (С. spinosa, иглистая). Алтагана. Сибирь. Цв. желтые, въ май. 4 — 6 ф. К. фрутесценсъ (С. frutescens, кустовая). Дереза. Сибирь. Цв. желтые, въ май. 2 — 3 ф. К. юбата (С. jubata, бородастая). Верблюжий хвостъ. Сибирь. Цв. съ красноватымъ отблескомъ желтые, въ май. 1 — 2 ф. Сип. *Robinia jubata* (*Robinia jubata*).

**КАРАГАНЪ (Май-Караганъ, т. е. жирный караганъ).** См. Калофака.

**КАРАГУАТА (Caraginata).** Мѣстное южно-американское названіе. Сем. бромеліевыхъ. (5). Вестиндія, Сред. Америка. Тепл. эпифиты, сходные съ Тилландзія. Ухожь какъ за Бильбергія.

К. Ванъ-Вольксеміи (С. Van-Volxemii, Ванъ Вольксема). Колумбія. Цв. желтые. 2 — 3 ф. К. Цани (С. Zahni, Цана). Чиршкы. Цв. блѣдно-желтые, въ май. 1 ф.

**КАРАЛЪЛІЯ (Carallia).** Мѣстное названіе. С. корнепусковыхъ. Тепл. деревья съ Мадагаскара, изъ Австраліи и троп. Азіи. По трудности воспитанія, въ садахъ не встрѣчаются.

**КАРАЛЪЛЮМА (Caralluma).** Названіе мѣстное. С. ясенковыхъ. Остиндія тепл. куст. рр. Песч. дерн. съ черенками и штукатуркой. Черенками, которые предварительно просушить. Темп. лѣтомъ 13—24, зимой 7—10°.

К. адценденсъ (С. adscendens, поднимающаяся). Корамандель. Цв. пестрые, жел-

тые съ пурпуровымъ. 1 — 2 ф. К. фимбриата (С. fimbriata, бахромчатая). Бурма. Цв. желтые съ пурпуровыми полосками. 6 д.

**КАРАПА (Cacapa).** Мѣстное названіе (кагайра). С. ясенковыхъ. Тепл. дерн. изъ Вестиндіи, троп. Америки и Гвинеи. Глин. дерн. съ торф. Черенками изъ вырѣзаннаго роста, въ песокъ, подъ стекломъ, на тепломъ грунтѣ. Темп. лѣтомъ 13—24, зимой 7—10°.

К. гвианензисъ (С. gualanensis, гвианская). Гвинея. Цв. желтые; плоды величинаю яблока, съ многими сѣменами. 60 ф.

**КАРАТАСЪ (Caratas).** Мѣстное названіе. С. бромеліевыхъ. (10). Вестиндія, Троп. южн. Америка и Бразилія. Тепл. травн. многол. рр. Ухожь какъ за Бильбергія.

К. Инноцентіи (С. Innocentii, Инноцента). Бразилія. Цв. яркіе красно-оранжевые, дл. зеленые на верхней, красно-пурпуровые на нижней сторонѣ. К. круента (С. cruenta, кроваво-красный). Рио-Жанейро. Цв. голубые съ краснымъ, съ февраля до марта. Дл. съ кроваво-красными кончиками. 1 ф.

К. Лаурентіи (С. Laurentii, Лаурентіи). Юж. Америка. Цв. голубые; дл. съ темно-коричневыми пятнышками. К. Лейрелли (С. Leirellae, Лейрелли). С. Бразилія. Цв. пурпуровые съ розовыми прицветниками; дл. на нижней сторонѣ сизые. К. оленсъ (С. olean, пахнущій гнилью). Цв. пурпуровые, съ зелеными съ бѣлымъ прицветниками; дл. верхніе темно-красные. К. Плюмьери (С. Plumieri, Плюмери). Вестиндія. Цв. малиновые; дл. съ колочными краями. 2 ф. Сип. *Bromelia Karatas*, *B. Scepttrum* (Бромелія Каратасъ, Б. Септрумъ) (Бромелія Каратасъ, Б. Септрумъ). К. Шереметеви (К. Scheremetiewi, Шереметевъ). Бразилія. Цв. бѣлые съ голубымъ. Дл. прицветные ярко-красные. 6—12 д. Сип. *Caraginata serrata* *Индупіумъ Шереметеви* (*Caraginata serrata*, *Nidularium Scheremetiewi*). К. спектабилисъ (С. spectabilis, отъинный). Бразилія. Цв. кроваво-красные, съ бѣлымъ и блѣдно-фіолетовымъ; дл. съ острыми зубцами, по концамъ кроваво-красные. 1 ф. К. хумилисъ (С. humilis, низкій). Вестиндія. Цв. красно-малиновые; дл. зубчатые, нижніе съ мучнистымъ налетомъ. 1 ф.

**КАРДАМИНЕ (Cardamine).** Уменьшит. *Kardamon*, — крессъ, названный такъ Dioscoridemъ. С. крестоцвѣтныхъ. (50). Почти по всей земной поверхности; почти всѣ (за исключ. тамектроидесъ, кот. однол.) — многол. травы. Сѣменами во влажной землѣ. Волотная, торф.

К. азарифолія (С. asarifolia, съ дл. коптыи). Горы южн. Франціи и сѣв. Италіи. Цв. бѣлые, въ май-июнь. 1—1½ ф. К. пра-

тензисъ (С. pratensis, луговое). Ключевой крессъ. Сѣв. полушаріе. Цв. блѣдно-пурпуровые, рано весной. 1—1½ ф. Имѣетъ нѣсколько разновидностей, одну — съ махровыми цв. К. домбоидеа (С. rhomboidea, ромбическое). Соед. Амер. Штаты. Цв. бѣлые, крупные, весной. У разновидности *пурпуреа* (purpurea) цв. пурпуровые. К. трифолія (С. trifolia, трехлиственное). Юж. Европа. Цв. бѣлые, въ апрѣль — май. 6 д.

**КАРДАМОНЪ.** См. Элеттарія.

**КАРДИАНДРА (Cardiandra).** *Kardios* — сердце, *aner* — мужчина, пыльникъ; по формѣ послѣдняго. С. гидрангеевыхъ. (1). Японія. Полушисоливый кустъ. Ухожь какъ за Гидрангеа.

К. альтернифолія (С. alternifolia, съ очередиными дл.). Японія. Цв. бѣлые и лиловые, въ июль. 3 ф.

**КАРДУНЦЕЛЪЮСЪ (Cardunculus).** Уменьшительное *Cardunculus* — Кардонъ. С. сложнопѣстныхъ. (14). Средиземное побережье, Франція, Испанія. Полушисолив. многол. травы. Земля обыкновен. Дѣленіемъ корней.

К. митизиссимусъ (С. mitississimus, наименѣе иглистый). Франція и Испанія. Цв. головки голубые, въ май-июнь. 9 д.

К. монспеліензисъ (С. mospeliensis, изъ Монпелье). Ю.-З. Европа. Цв. головки голубые, въ июль-август. 9 д.

**КАРДУСЪ (Carduus).** Названіе, встрѣчаемое у Виргилія и др. писателей. С. сложнопѣстныхъ. (60). Европа, Азія, Сѣв. Америка. Одно-, дву- и многол. трав. рр. Обыков. Сѣменами и дѣленіемъ. Въ садахъ почти вовсе не воспитываются.

**КАРДЫ.** См. Цинара.

**КАРИКА (Carica).** По ошибочному предположенію, что отечество въ Каріи. С. пассифлоровыхъ. (20). Троп. Америка. Тепл. древ. рр. Сильная глин. дерн. Черенками изъ вырѣзаннаго роста, въ песокъ, подъ стекломъ, на особо нагрѣтомъ грунтѣ. Темп. лѣтомъ 13—23, зимой 8—12°.

К. Папайя (С. Papaya, Папая). Южн. Америка. Цв. зеленоватые. 10—20 ф. Плодь считается туземцами лучшимъ во всемъ свѣтѣ. Европейцы съ этимъ не согласны.

**КАРИССА (Carissa).** Мѣстное индѣйское названіе. С. кутровыхъ. (20). Африка, Троп. Азія, Австралія. Тепл. древ. и куст. рр. Глин. дерн. съ торф. Черенками изъ вырѣзаннаго роста въ песокъ, подъ стекломъ, на тепломъ грунтѣ. Темп. лѣтомъ 13—24, зимой 8—12°.

К. грандифлора (С. grandiflora, крупноцвѣтная). Наталь. Цв. бѣлые, душистые, въ май.

**КАРІЯ (Careya).** Д-ръ *Карей*, лингв-

вистъ индѣйскихъ нарѣчій. С. миртовыхъ. Тепл. древ. и кустарн. рр. Остиндія. Глин. дерн. съ 2 ч. волокн. торф. и древесн. углемъ. Черенками и дѣленіемъ корней. Темп. лѣтомъ 13—24, зимой 10—13°.

К. арбореа (С. arborea, древесная). Индія. Цв. бѣлые. 30—60 ф. Кустарн.

**КАРЕКСЪ (Carex).** *Осока* — *Keiro* — рѣзакъ, по дл. съ острыми краями. С. ситовниковыхъ. (500—800). Почти по всей земной поверхности. Въ садахъ почти никогда не воспитываются.

**КАРИОКАРЪ (Caryocar).** *Karion* — орѣхъ; рр. даютъ съѣдобные орѣхи. С. тернестреминыхъ. (8). Троп. Америка. Тепл. деревья. Глин. дерн. съ торф. Черенками подъ стекломъ въ песокъ, въ теплѣ. Темп. лѣтомъ 13—20, зимой 8—10°.

К. нупиферумъ (С. nuciferum, дающій орѣхи). Гвиана. Цв. пурпуровые. 100 ф. Орѣхи содержатъ бѣлое, маслянистое, очень вкусное ядро.

**КАРИОПТЕРИСЪ (Caryopteris).** *Karyon* — орѣхъ и *pteron* — крыло, крылатый сѣмена. С. вербеиновыхъ. (5). Китай. Трав. многол. или полукуст. рр. Обыкн. Сѣменами, дѣленіемъ и черенками.

К. мастакантусъ (С. mastacantus — усатый). Китай. Цв. ярко-фіолетовые, оселяю. 2 ф.

**КАРИОТА (Caryota).** У Dioscorida такъ названа (*karyotis*) финиковая пальма. С. пальмъ. (12). Троп. Азія, Малайск. архип., Новая Гвинея, Троп. Австралія. Тепл. древ. рр. Песч. дернов. съ торф. Сѣменами. Темп. лѣтомъ 13—24, зимой 8—10°.

К. Кумингіи (С. Cumingii, Куминга). Филиппинскіе о. Дл. большіе, двуперистые. Пен. тонкій. 10 ф. К. Румфіана (С. Rumphiana, Румфа). Инд. архип. Дл. двуперистые, длиною въ 3—8 ф. Весьма красивая пальма. К. соболифера (С. sobolifera, дающая отпрыски). Малакка. Дл. двуперистые, перья свѣтло-зеленые. Даетъ много отпрысковъ. К. уренсъ (С. urens, ягучая). Индія. Дл. двуперистые въ 12 и болѣе ф. длинной. Пен. толстый, въ 50 ф. Одна изъ самыхъ большихъ пальмъ.

**КАРИОФИЛЪЮСЪ (Caryophyllus).** *Karyophyllon* — гвоздичное дерево; по другимъ — *karyon* — орѣхъ и *phyllon* — листъ. С. миртовыхъ. (5). Малайск. арх., Н. Каледонія. Тепл. дер. Глин. дерн. съ торф. Черенками, подъ стекломъ, въ теплѣ. Темп. лѣтомъ 13—24, зимой 10—12°.

Ухожь зимою трудный. К. ароматичесъ (С. aromaticus, ароматическій). Гвоздика. Молуккскіе о. Цв. пурпуровые. 20—40 ф. Цвѣточные почки составляютъ продажную *гвоздику*, употребляемую и въ кухнѣ.



**КАРИЯ** (*Carua*). *Karyon*—орех. С. орешниковых. (10). С. Америка. Древ. рр. Хорошая обыкн. Съедами, высеваемыми на место, отводкой и прививкой к грецкому ореху.

**К. альба** (*C. alba*, белая). Канада и Вост. Соед. Шт. Цв. зеленоватые, в мае. Плоды шаровидные или приплюснутые. 50—70 ф. **К. яма** (*C. amara*, горькая). Канада и Вост. Соед. Шт. Цв. зеленоватые, в апрѣль; плоды шаровидные, шестигранные. 50—60 ф. **К. томентоза** (*C. tomentosa*, пушистая). Вост. часть С. Америки. Цв. короткими сережками, молодые лл. внизу пушистые, пахнут смолой; плоды яйцевидные или шаровидные. 60—70 ф.

**КАРЛИКОВОЕ РАСТЕНИЕ**, пмбющее обычно низкий рост.

**КАРЛИНА** (*Carlina*). *Carlinus*—Карл, —войско Карла V. было будто-бы выслано этим р. С. сложноцвѣтных. (14). Европа, Азия, С. Америка. Вынос. и полувынос. одно-, дву- и многол. травы. Обыкн. Съедами, в апрѣль—май; дѣлением.

**К. акантифолія** (*C. acaanthifolia*, съ лл. аканта). Южн. Европа. Цв. головки белые, в июль. 2 ф. Многол.

**КАРЛУДОВИКА** (*Carludovica*). По Карлу IV испанскому и королевѣ Луизѣ. С. кругоцвѣтных. (30). Вестиндія, Троп. Америка. Телл. рр., похожа на пальмы. Глин. дерн. Отпрысками. Темп. лѣтомъ 13—22, зимой 8—10°.

**К. Вальлизи** (*C. Wallisii*, Вальлиса). Колумбія. Лл. овальные, двулопастные, складчатые. Цв. белые, пахучие. **К. Друдеи** (*C. Drudei*, Друда). Колумбія. Лл. дланевидно-трехраздѣльные, темно-зеленые. Цв. белые. 4 ф. **К. пальмата** (*C. palmata*, дланевидная). Перу. Лл. четырехлопастные, каждая лопасть разсѣчена на нѣсколько частей, темно-зеленые. **К. ротундифолія** (*C. rotundifolia*, кругло-лиственная). Коста-Рика. Лл. вѣерообразные, двулопастные, лопасти раздѣлены въ свою очередь. **К. хумилис** (*C. humilis*, низкая). Нов. Гренада. Лл. ромбональные, двуразсѣченные, темно-зеленые.

**КАРМАЙКЕЛІЯ** (*Carmichaelia*). Капитанъ Дугальдъ *Кармайкелъ* (*Carmichael*)—шотландскій ботаникъ. С. бобовыхъ (10). Нов. Зеландія. Оранж. куст. Песч. торф. съ малымъ колич. волокнистой глин. дерн. Черенками изъ бобового роста, в апрѣль—май, в песокъ, подъ стекломъ. Темп. лѣтомъ 10—15, зимой 4—6°.

**К. аустралис** (*C. australis*, южная). Нов. Зеландія. Цв. лиловые, в май—сентябрь. 2—4 ф.

**КАРМИХЕЛІЯ**. См. Кармайкелия.

**КАРОТѢЛЬ**. См. Даукусъ.

**КАРПЕНТЕРІЯ** (*Carpenteria*). *Карпентеръ* (*Carpenter*)—профессоръ въ Луизианѣ. С. камнеломковыхъ. (1). Оранж. кустарникъ. Глин. дерн.

**К. калифорнія** (*C. californica*). Сьерра-Невада, Калифорнія. Цв. белые. Невдавно лишь введенное въ сады р.

**КАРПИНСЪ** (*Carpinus*). Название, употребленное Плиніемъ. С. плюско-выхъ. (9). Европа, Азия, С. Америка. Древесн. рр., выносящая климатъ сред. Европы. Обыкн. Съедами, какъ сорбуютъ, или весной прослоенными въ песокъ; отпрысками и отводками.

**К. американа** (*C. americana*, американскій). Сѣв. Америка. Лл. овально-удлиненные, остро-зубчатые. 10—50 ф. **К. бѣтулюс** (*C. Betulus*, похожий на березу). *Грабъ*. Белый букъ. Цв. желтоватые, в май; прицѣт. продолговатые, плоскіе, зубчатые. 30—70 ф.

**КАРПОГОНЪ**. Кѣлочка грибовъ, развивающаяся въ плодосную.

**КАРПОДИНСЪ** (*Carpodinus*). *Karpas*—плодь, *dineo*—обвивать; объясненіе недостаточное С. кутровыхъ. Телл. выюц. куст. рр. Глин. дерн. съ пескомъ. Черенками изъ полувызрѣвшаго роста.

**К. дѣльцис** (*C. dulcis*, сладкій). Сьерра-Леоне. Цв. зеленые, в июль. 8 ф. Выюц.

**КАРПОЛІСА** (*Carpolysa*). *Karpas*—плодь, *lyssa*—яръсть; по быстрому разкрыванію плодовъ. С. амарилисовыхъ. (1). Мысъ Д. Н. Луковичное р.

**К. спиральс** (*C. spiralis*, спиральная). Цв. белые, снаружи красноватые, в апрѣль—май. Снп. *Струмарія спиральс* (*Strumaria spiralis*).

**КАРТАМУСЪ** (*Carthamus*). Арабское *qutrom*—окрашивать. С. сложноцвѣтныхъ. (20). Средиземное побережье, Канарскіе о. Однол. травы. Обыкн. Съедами в апрѣль, в парникъ.

**К. тинкторіусъ** (*C. tinctorius*, красильный). *Сафлоръ*. Египетъ. Цв. головки оранжевыя, в июль. 8 ф.

**КАРТОФЕЛИНА**. Клубень картофеля.

**КАРТОФЕЛЬ**. См. Солинуъ.

**КАРУМЪ** (*Carum*). У Dioscorida р. названо *karos*. С. зонтичныхъ. (20). Европа, Востокъ. Двудѣтн. вынос. Обыкн. Съедами весной.

**К. карви** (*C. carvi*, —карви). *Тминъ*. Европа. Цв. белые, в май. 1 1/2 ф.

**КАССАНДРА** (*Cassandra*). Название мифологическаго значенія. С. вересковыхъ. (1). Сѣв. полушаріе. Торф. съ песч. дерн. Съедами и отводкой.

**К. каликулата** (*C. calyculata*, съ ма-

ленькой чашечкой). С. Америка. Цв. сѣжно-бѣлые, в апрѣль. 1—3 ф. **К. августифолія** (*C. angustifolia*, узколистная). Каролина. Съ цв. белыми, есть только форма отъ К. каликулата.

**КАССЕБЕЕРА** (*Cassebeera*). Происхождение названія темно. С. папоротниковъ. Теллич. бразильскія рр. Глин. дерн. съ торф. Размноженіе и уходъ—общіе для телл. папоротниковъ.

**К. пинната** (*C. pinnata*, перистая). Валлин. и шир. в 6 д., перистый.

**КАССИНЕ** (*Cassine*). Мѣстное названіе. С. краснопупырниковыхъ. (1). Оранж. кустъ. Глин. дерн. съ торф. Черенками изъ вызрѣвшаго роста, в песокъ, подъ стекломъ, в теплѣ. Темп. лѣтомъ 12—16, зимой 3—6°.

**К. Мавроцѣни** (*C. Maurocenii*, Мавроцѣни, —венедіанца, сенатора и покровителя ботаники). Юж. Африка. Цв. зеленоватые, потому белые, в июль и августъ. 6 ф.

**КАССИНІЯ** (*Cassinia*). Анри Кассини (*Cassini*)—французскій ботаникъ. С. сложноцвѣтныхъ. (18). Австралія, Южн. Африка, Нов. Зеландія. Оранж. кустарникъ и мног.- и однол. трав. рр. Съедами в мартъ, дѣленіемъ и черенками изъ полувызрѣвшаго роста, весной, в песокъ. Глин. дерн. съ торфяной. Темп. лѣтомъ 10—16, зимой 5—8°.

**К. дентикулата** (*C. denticulata*, зубчатая). Нов. Южн. Валлисъ. Цв. головки желтыя, лѣтомъ. 6—8 ф. Оранж. кустъ.

**КАССИОПЕ** (*Cassiope*). *Kaccione*—эоипская царица. С. вересковыхъ. (10). Сѣв. полушаріе, Гималаи, Японія. Кустарникъ рр. Песчан. торфъ; мѣсто затѣненное. Отводками. Рр. пѣжныя на уходъ.

**К. тетрагона** (*C. tetragona*, четырехугольное). Лапландія. Цв. белые, колокольчатые, в апрѣль. 6—8 д. Снп. *Андромѣда тетрагона* (*Andromeda tetragona*). **К. хипноидесъ** (*C. hypnoides*, похожее на мохъ). С. Америка. Цв. маленькіе, чашечка красная, пѣнычкѣ белый, в июль. Снп. *Андромѣда хипноидесъ* (*Andromeda hypnoides*). 1 ф.

**КАССИЯ** (*Cassia*). Название упоминаемое Dioscorидомъ и производимое съ еврейскаго. С. бобовыхъ. (200—300). Тропич. страны, преим. Америки. Телл. и оранж. одно- и многол. трав. и куст. рр. Одно- и двул.—съедами в апрѣль, в теплѣ; многол.—черенками изъ полувызрѣвшаго роста, в песокъ, в теплѣ. Темп. зимой 8—12°.

**К. алята** (*C. alata*, крылатая). Вестиндія. Цв. большіе, желтые. Телл. кустъ. 6 ф.

**К. коримбоза** (*C. corimbosa*, щитковал). Буеность—Айресъ. Цв. желтые щитками.

Телл. кустъ. 6—7 ф. **К. мариландика** (*C. marilandica*, мариландская). С. Америка. Цв. желтые, съ августа до октября. Полувывосливый кустъ, зимующій хорошо въ умѣр. климатѣ. **К. томентоза** (*C. tomentosa*, пушистая). Цент. Америка, троп. Азия. Цв. желтые, в июль до сентября. Телл. кустъ. 5—7 ф.

**КАСТАНЕА** (*Castanea*). Кастаней—городъ въ Фессалии, откуда будто-бы было вывезено первое каштановое дерево. С. орешниковыхъ. (2). Южн. Европа, Азия, С. Америка. Большія древесныя рр. Съедами, прорѣжанными въ прослойкѣ, весной. Разновидности—прививкой. Глубокая песокъ. дернов.

**К. сатива** (*C. sativa*, употребляемая въ пищу). *Каштанъ*. Малая Азия. Цв. желтоватые, в июль. Плоды созрѣваютъ в октябрь. 50—70 ф. Снп. *К. вѣска* (*C. vesca*). Имѣетъ много разновидностей; изъ нихъ наиболѣе замѣчательны: *foliis aureo-marginatis* (*C. aureo-marginatis*) съ золотисто-каемчатыми лл. и *heterophylla dissecta* (*C. heterophylla dissecta*) съ лл. раздѣленными на три узкіе сегмента.

**КАСТАНОСПЕРМУМЪ** (*Castanospermum*). *Kastanon*—каштанъ и *sperma*—сѣмя, по вкусу сѣмянъ. С. бобовыхъ. (1). Австралія. Уходъ какъ за Цератоніей.

**К. аустрале** (*C. australe*, австралийскій). Цв. красно-шафранные, лл. непарноперистые. 40—50 ф.

**КАСТИЛЬЕЛІЯ** (*Castilleja*). *D. Castillejo*—испанскій ботаникъ. С. поричниковыхъ. Телл. или вынос. многол. трав. или куст. рр. Теллич.—черенками изъ полувызрѣвшаго роста, в песокъ, теплѣ и подъ стекломъ; глин. дерн. съ торфъ; темп. лѣтомъ 13—21, зимой 8—10°. Вынос. —съедами и дѣленіемъ. Песчан. торфъ.

**К. кокцинея** (*C. coccinea*, шарлаховая). С. Америка. Цв. желтые, прицв. шарлаховые, в июль. 1 ф. Вынос. трав. многол. **К. индивиза** (*C. indivisa*, нераздѣльная). Техасъ. Цв. желто-зеленоватые, прицв. красно-карминовые. 6 д.—1 ф. Многол. трав.; лучше выводить съедами ежегодно. **К. пальлида** (*C. pallida*, блѣдная). В. Сибирь и С. З. Америка. Цв. свѣтло-пурпур. съ белыми прицв., в июль. 6 д.—1 ф. Многол. трав. вынос. **К. миниата** (*C. miniata*—суроико-красная). Калифорнія. Цв. желтые, прицв. красные. 1 ф. Вынос. трав. мног.

**КАТАЗЕТУМЪ** (*Catasetum*). *Kata*—внизъ и *seta*—щепинка, по двумъ рокамъ столба. С. орхидей. (40). Троп. Америка. Телл. эпифитъ. Торф. з., мѣлѣ, черепки и древ. уголь. Зимой—прохладно и сухо; во время роста—высокая темпер. и влажн. воздухъ. Темп. лѣтомъ 13—26, зимою 8—1



**К. каллозумъ** (*C. callosum*, мозолистый). Лагвайра. Цв. желто-коричневые, в июнь. 1 ф. **К. макулатумъ** (*C. maculatum*, пятнистый). Мексика. Цв. зеленые с пурпуровыми пятнами, в сентябрь. 3 ф. **К. Росселианумъ** (*C. Russelianum*, Россели). Гватемала. Цв. зеленоватые, в июнь. 3 ф. **К. саккадумъ** (*C. saccatum*, мясчатый). Демерара. Цв. большие с ярко-пурпуровыми пятнами и желтой губой, в мартъ.

**КАТАЛЬПА** (*Catalpa*). Название индийское. С. биньоний. (6). Китай, Япония, С. Америка, Вестиндия. Древесн. оранжев. и темл. пр. Сѣменами, черенками и отводками. Всякая.

**К. биньонийоидесъ** (*C. bignonioides*, похожая на биньонию). С. Америка. Цв. белые с пурпуров. и желт. крапинками, в июль. 20—40 ф. Сип. **К. стрингефолія** (*C. strygnaeifolia*). **К. Кемпфера** (*C. Kaempferi*, Кемпфера). Япония. Цв. мелкие, желтые, пахучие, в июль. **К. лонгиссима** (*C. longissima*, длиннѣйшая). Вестиндия. Цв. белые. 30—40 ф. **К. спеціоза** (*C. speciosa*, отмынная). Соед. Ам. Штаты. Цв. белые, крупные. Р. походитъ на *биньонийоидесъ*.

**КАТАНАНХЕ** (*Catananche*). *Katananghe*—сильно раздражающій. С. сложнопятилистныхъ. (5). Средиземное побережье. Однол. и многол. трав. пр. Обыкновен. Сѣменами и дѣленіемъ весной.

**К. лутеа** (*C. lutea*, желтое). Ю. Европа. Цв. головки желтыя, в июнь. 1 ф. **К. цѣрулеа** (*C. coerulea*, голубое). Южн. Европа. Цв. головки голубыя или белыя, в августъ. 3 ф.

**КАТА** (*Catha*). Название арабское. С. целастровыхъ. (1). Аравія. Уходъ, какъ за Целаструсь.

**К. эдулисъ** (*C. edulis*, съедомая). Йемень. Цв. белые. 10 ф. Лл. употребляются арабами для произведенія того-же свойства, какъ опій. Р. оранжевойное. Сип. *Целаструсь эдулисъ* (*Celastrus edulis*).

**КАТЕЗБЕЯ**. См. Кетсбей.

**КАТКАРТІЯ** (*Cathcartia*). Въ честь англичанина *Каткарта* (*Cathcart*). С. маковыхъ. (1). Гималаи. Оранжев. трав. двул. Легкая, сильная. Сѣменами.

**К. вильдоза** (*C. villosa*, волосатая). Сиккимъ. Цв. ярко-желтые, в июль. 1 ф.

**КАТОБЛАСТУСЪ** (*Catoblastus*). *Като*—внизу и *blastos*—ростъ, по воздушнымъ корнямъ. С. пальмъ. (3). Нов. Гренада, Венецуела, С. Бразилія. Темл. пальмы, схожія съ Ириартеа и требующія того же ухода.

**К. прѣморзусъ** (*C. proemorsus*, отгрызенный). Венецуела. Вап непарно-перистыя. 30—50 ф. Сип. *Ириартеа прѣморза* (*Iriartea proemorsa*).

**КАТОКЪ**. Болѣе или менѣе тяжелый кряжъ, или того же вида каменная, либо чугунная вещь, на оси, для разбивки комьевъ или для укатки дорогъ. Катоки необходимы желѣзные для укатыванія садовыхъ дорожекъ. Вновь сдѣланные дорожки укатываются легкимъ, окрѣпшія же—тяжелымъ. Укатывать должно когда дорожки нѣсколько просохли.

**КАТОПСИСЪ** (*Catopsis*). *Като*—внизу, *opsis*—видъ. С. бромелиевыхъ. (8). Вестиндія, Анды южн. Америки. Темл. многол. трав. пр. Уходъ какъ за Тилландзія.

**К. нѣтида** (*C. nitida*, блестящій). Ямайка. Цв. белые, длиннымъ колосомъ. Сип. *Тилландзія нѣтида* и *Туссидіа нѣтида* (*Tillandsia nitida*, *Tussaudia nitida*).

**КАУЛОФИЛЬДЮМЪ** (*Caulophyllum*). *Kaulon*—стволъ и *phyllon*—листь; стебель кажется черенкомъ большого сложнаго листа. С. барбарисовыхъ. Клауберевыя многол. пр. Легкая песч. земля. Дѣленіемъ весной или послѣ цвѣтенія.

**К. таликтроидесъ** (*C. thalictroides*, похожій на василѣстникъ). С. Америка. Цв. желтые, в апрѣль—май; ягоды синія. 1 ф.

**КАУЛЬФУССІЯ** (*Kaulfussia*). *Kaulfuss* (G. F. Kaulfuss)—проф. ботаники въ Галле † 1830. С. папоротниковыхъ. (1). Ассамъ, ос. Малайскаго архип. Темл. папоротникъ.

**К. эскулифолія** (*aesculifolia*, съ лл. какъ у Эскулуса). Вап дланевидно-разсѣченныя, похожія на лл. дикаго каштана.

**КАУЧУКЪ**. Упругоекамедистое вещество, сгустившійся на воздухъ сокъ различныхъ тропическихъ растений,—Кастильялоа, Фигуса, Гевеа, различныхъ Ландольфіа, Маннотъ и др.

**КАЧАНИТЬСЯ**. Свиваться въ качанъ. **КАЧАНЪ, КОЧАНЪ, КОЧЕНЬ**. Свитые въ комъ листья капусты или салата.

**КАШТАНЪ**. См. Кастанеа.

**КАЯНУСЪ** (*Sajanus*). На родинѣ называется *Satjang*. С. бобовыхъ. (7). Индія. Оранжев. куст. пр. Сѣменами весной. Песчан. дерновая съ торфяной. Темп. лѣтомъ 13—19, зимой 4—6°.

**К. индикусъ** (*C. indicus*, индѣйскій). Индія. Цв. желтые съ пурпуровыми пятнами, в июль. 6—10 ф.

**КВАКВА** (*Quaqua*). Такъ зовутъ р. готтентоты, которые его ѣдятъ сырымъ. С. ласточкинковыхъ. (1) Оранжев. сочное р., нуждающееся въ такомъ же уходѣ, какъ Станелія.

**К. хоттентоторумъ** (*Q. hottentotorum*, готтентотская). Намакваландъ. Цв. блѣдно-

зеленые, собранные пучками; стебли 4-гранные. 4—6 д.

**КВАЛЕА** (*Qualea*). Мѣстное названіе въ Гвианѣ. С. вошпичевыхъ. (25). Бразилія, Гвиана. Темл. деревья. Торф. съ листов. Сѣменами или черенками изъ подзрѣлаго роста, въ песокъ, въ парникъ. Темп. зимой 8—12, лѣтомъ 13—24°.

**К. розеа** (*Q. rosea*, розовая). Гвиана. Цв. белые; лл. эллиптическіе. 30 ф. Сип. **К. violacea** (*Q. violacea*).

**КВАССІЯ** (*Quassia*). Понегру *Квасси* и *Коисси*, который указалъ на употребленіе коры этого дерева въ лихорадкѣ. С. симарубовыхъ. (1). Сильная, песчан. глини. дерн. съ листовой. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ песокъ, въ парникъ. Темп. зимой 10—15, лѣтомъ 15—26°.

**К. амара** (*Q. amara*, горькая). Троп. Америка. Цв. шароховые, большіе; лл. непарно-перистые. 20 ф.

**КВЕКЕТТІЯ** (*Quekettia*). *Кеккетт* (*Quekett*) англійскій батаникъ и растит. апотекъ. С. орхидей (1). Элифитъ. Уходъ какъ за Плевротальнсъ.

**К. микроскопика** (*Q. microscopica*, микроскопическая). Бразилія. Цв. желтые; лл. круглыя, съ темно-зелеными и пурпуровыми пятнами.

**КВЕРКУСЪ** (*Quercus*). *Дубъ*. Название древне-латинское. С. плоскыхъ. (300). По всей земной поверхности. Древесныя, рѣже кустар. пр. Глини. дерн. глубокая. Сѣменами, какъ опадути, или сохраненными въ прослойкѣ, весной. Пестролист. формы—прививкой.

**К. glandulifera** (*Q. glandulifera*, дающій желуди). Японія. Цв. сережки нитевидныя; плоды эллипсоидальныя; лл. эллиптическіе, зубчатые. Сип. **К. аустриака сеперивиренс**, **К. склерофилла** (*Q. austriaca sempervirens*, *Q. sclerophylla*). **К. йлексъ** (*Q. Ilex*). **К. Камений дубъ**. Юж. Европа. Цв. малочисленные; лл. эллиптическіе, зубчатые. Высокій кустъ. Имѣетъ нѣсколько разновидностей. **К. кокинѣа** (*Q. coccinea*, шароховый). С. Америка. Цв. пушистые; лл. перисторазсѣченные, осенью краснотные; плоды полушаровидные. 50 ф. **К. конферта** (*Q. conferta*, скученный). Ю.-В. Европа. Лл. почти сидячіе, внизу пушистые, продолговато-овальные, перисто-лопастные. Сип. **К. раппоника** (*Q. rapponica*). **К. нигра** (*Q. nigra*, черный). С. Америка. Плоды сидячіе, яйцевидные; лл. широко-клиновидные съ двумя лопастями. 8—25 ф. Сип. **К. ферругинеа** (*Q. ferruginea*). **К. педункулята** (*Q. pedunculata*). *Дубъ лѣтній*. Европа. Плоды продолговатые; лл. удлинненные, впереди расширенныя, выемчатые. 50—100 ф. Имѣетъ нѣсколько разновидностей. **К. рубра** (*Q. rubra*, красный). С.

Америка. Плоды съ плоской плоской, эллипсоидальныя, дл. остроколючныя, съ тупымъ основаніемъ. Древесина красноватая. Дерево высокое. **К. сerratа** (*Q. serrata*, пилоиднозубчатый). Японія. Цв. рыльми сережками; плоды полушаровидные; лл. тупые или острые у основанія, ланцетовидныя, пилоидно-зубчатые. 6 ф. **К. сессилифлора** (*Q. sessiliflora*, съ сидящими цв.). *Дубъ зимній*. Европа. Плоды сидячіе, продолговатые; лл. продолговатые съ острыми лопастями. 60 ф. Похожъ на педункулята, но менѣе густой, листь свѣтлѣе, вѣтви менѣе искривленные, древесина темнѣе, тяжелѣе, упруге. **К. тоца** (*Q. Toza*, тоца). Ю. Европа. Цв. сидячіе; плоды эллипсоидальныя; лл. овальныя, перисторазсѣченные. Сип. **К. иренѣика** (*Q. rugosaica*). **К. фельлозъ** (*Q. Phellos*, фельлозъ). *Новый*. С. Америка. Цв. въ тонкихъ сережкахъ; плоды полушаровидные; лл. линейныя, остроколючныя, волнистыя. 50 ф. **К. Церрисъ** (*Q. Cerris*, Церрисъ). *Турецкій дубъ*. Юж. Европа. Сережки пушистыя; плоды цилиндрическіе; лл. овальныя, выемчато-зубчатые или перисторазсѣченные. 40—60 ф.

**КВИВІЗІЯ**. См. Кивизія.

**КВИЛЬЯЯ** (*Quillaja*). Чилийское названіе. С. розоцвѣтныхъ. (4). Ю. Бразилія, Чили, Перу. Оранжев. древесн. пр. съ корою, похожею на мыло. Глини. дерн. съ торф. и пескомъ. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ песокъ, въ парникъ. **К. сапонарія** (*Q. saponaria*, мыльная). Чили. Цв. белые, в апрѣль. 50—60 ф.

**КВИСВАЛИСЪ** (*Quisqualis*). *Квис*—кто и *qualis*—какой; прежде не знали опредѣлительно какое это р. С. мелко-сѣднковыхъ. (2). Троп. Азія и троп. ю. Африка. Темл. вьющ. пр. Торф. съ глини. дерн. Черенками изъ молодого роста, въ песокъ, въ парникъ. Темп. зимой 5—8, лѣтомъ 13—25°.

**К. индика** (*Q. indica*, индѣйскій). Троп. Азія и Африка. Цв. оранжевые до красныхъ, душистые, в май до августа. Сип. **К. глэбра**, **К. рубесценс**, **К. синѣнзисъ** (*Q. glabra*, *Q. rubescens*, *Q. sinensis*).

**КВИТЪ**. См. Цидонія.

**КЕДРЪ**. См. Кедръ. **К. сибирскій**. См. Пихтусъ.

**КЕМПФЕРІЯ** (*Kaempferia*). *Э. Кемпферъ* (*E. Kaempfer*) германскій натуралистъ; † 1716. С. инбирныхъ. (18). Троп. Африка и Азія. Темл. трав. многол. пр. Волокни. глини. дерн. съ торф. Дѣленіемъ при началѣ роста. Темп. лѣтомъ 13—23, зимой 6—10°.

**К. Джильтбертія** (*K. Gilbertii*, Джильтберта). Музейный. Лл. скученныя, продолговато-ланцетовидныя, темно-зеленые съ белыми коймами. **К. орната** (*K. ornata*,



украшенная). Борнео. Цв. желтые съ оранжевым дискомъ, лѣтомъ; лл. съ бѣлою по срединѣ полосаю и пурпуровою нижнею стороною.

**КЕЛЬБИКЕРИЯ** (Koellikeria). *Кельликеръ* (Kölliker)—проф. въ Бюрбургъ, авторъ дикорастущихъ, рр. въ Цюрихѣ и др. С. гернейскихъ. (1). Троп. Америка. Тепл. трав. р. Глин. дерн. съ листов. и небольшою количествомъ песку. Дѣленіемъ клубня.

**К. аргиростігма** (K. argyrostigma, съ серебристыми крапинками). Цв. бѣлые съ красными пятнышками, лѣтомъ; лл. эллиптические, бархатистые, темно-зеленые съ бѣлыми пятнами. 1 ф.

**КЕЛЬРЕЙТЕРИЯ** (Koelreuteria). Иосифъ *Кельрейтеръ* (J. G. Koerleuter)—проф. естеств. исторіи въ Карлсруе. С. мыловниковъ. (1). Сѣв. Китай. Полувыносл. или выносл. красивое дерево. Обыкн. садов. Черенками изъ молодого роста, весной или отводкой осенью.

**К. паникулата** (K. paniculata, метельчатая). Цв. желтые, въ развѣтвленных метелкахъ, въ июль—июль. Лл. непарноперистые. 10—15 ф.

**КЕНИГИЯ** (Koenigia). *К. Кенигъ* (Koenig)—трудившійся съ Р. Броуномъ въ британскомъ музеумѣ. С. крестоцвѣтныхъ. Европа. Одно- и многол. трав. рр. Обыкн. садов. Сѣменами, весной.

**К. маритима** (K. maritima, морская). Европа. Цв. мелкіе, бѣлые, очень пахучіе, весной. 6—9 д. Снн. *Айссумъ маритимумъ* (Alyssum maritimum). Имѣетъ форму съ пестрыми лл. (variegata, variegata). **К. спиноза** (K. spinosa, колючая). Франція. Цв. бѣлые, рано лѣтомъ. Стебель кустарный. 4—8 д. Снн. *Айссумъ спинозумъ* (Alyssum spinosum).

**КЕННЕДИЯ** (Kennedy). *Кеннеди* (Kennedy)—английскій торгующій садовникъ. С. бобовыхъ. (11). Австралія. Оранже. многол. трав. рр. Торф. съ глин. дерн. Сѣменами, весной, или черенками весной же, въ песокъ, торф., въ парникѣ. Темп. зимою 3—7°.

**К. прострата** (K. prostrata, распростертая). Цв. шарлаховые, съ марта до июня. Снн. *Глицина кокцинея* (Glycine coccinea). Разновидность *Марриетты* (Marquatta) съ свѣтло-шарлаховыми цв. считается лучшимъ кеннедией. **К. рубигунда** (K. rubicunda, красноватая). Цв. темно-красные, въ маѣ. Большое цвѣнокъ р. **К. стирлингіи** (K. Stirlingii, Стирлинга). Цв. шарлаховые, въ маѣ. Р. вьющаяся и цвѣнокъ.

**КЕНТИОПСИСЪ** (Kentiopsis). *Кентія* и *орписъ*—подобіе, но похожести на Кентію. С. пальмъ. (3). Тепл. пальмы. Уходъ какъ за Кентію.

**К. дивариката** (K. divaricata, растопыренный). Нов. Каледонія. Вай перистыя, молодыя краснаго цв. 30 ф. **К. макрокarpa** (K. macrocarpa, крупноплодная). Нов. Каледонія. Вай перистыя, овальной формы когда молоды, черешки красные; молодыя вай оливково-малиновыя. Снн. *Кентія Линдені* (Kentia Lindenii).

**КЕНТИЯ** (Kéntia). Английскій капитанъ *Кентъ* (Kent). С. пальмъ (6). Нов. Гвинея и Молуккскіе о. Тепл. рр. Глин. дерн. съ торф. поровну съ добавленіемъ песку. Просторная посуда, обиланая полівка лѣтомъ. Сѣменами въ песков. з., въ парникѣ. Дальнейшій уходъ какъ за Арека.

**К. костата** (K. costata, ребристая). Ару. Вай правильно перисторазсѣченные, съ многочисленными сегментами, старыя въ 10 ф. длинной и въ 3 ф. шир. Стволъ 80—90 ф.

**КЕНТРОФИЛЛУМЪ** (Kentrophyllum). *Контронъ*—игла и *phyllon*—листъ. С. сложнотычковыхъ. Родъ этотъ соединенъ съ Картамусъ.

**К. арборесценсъ** (K. arborescens, древовидный). Испанія. Полудревесное куст. рр., сберегаемое зиму въ защитѣ; размнож. весной черенками изъ молодого роста подъ стекломъ. Цв. гол. желтыя, въ августѣ. 6 ф.

**КЕРАМАНТУСЪ** (Keramanthus). *Keramos*—чашка, *anthos*—цвѣтокъ; по формѣ чашечки. С. пассифлоровыхъ. (1). Занзибаръ. Тепл. многол. трав. р., имѣющее болѣе ботаническое, чѣмъ садовое значеніе. Воспитывается какъ Кактусы.

**К. Керкіи** (K. Kirkii, Керка). Цв. зеленоватые. 2 ф.

**КЕРВЕЛЬ РЫЧЧАТЫЙ**. См. Херофиллюмъ.

**КЕРМЕКЪ**. См. Статице.

**КЕРРИЯ** (Kerria). *Керръ* (Kerr), бывший директоръ дейлонскаго бот. сада. С. розановыхъ. (2). Китай, Японія, Оранж. или полувыносл. куст. рр. Глин. дерн. Черенками изъ молодого роста подъ стекломъ.

**К. японіеа** (K. japonica, японская). Японія. Цв. желто-оранжевые. 3—4 ф. Имѣетъ разовидность съ махровыми цв. и форму съ пестрыми лл.

**КЕСНЕЛИЯ** (Quesnelia). *Кеснелъ* (Quesnel) франц. консулъ въ Кайеннѣ, при посредствѣ котораго рр. этого рода введены въ Европѣ. С. бромелиевыхъ. (4). Бразилія. Тепл. трав. рр., нуждающіеся въ такомъ же уходѣ, какъ Бильбергія.

**К. Ванъ Гуттеи** (Q. Van Houttei, Ванъ Гутта). Цв. бѣлые съ сине-кобальтовыми кончиками и розовыми прицвѣтниками; лл. съ острыми иглами, а иногда съ бѣлыми внизу полосами.

**КЕТСБЕЯ** (Catesbeya). Баронетъ *Кетсбей* (Catesby)—авторъ ест. исторіи Каролины. С. мареновыхъ. (6). Антильскіе о. Тепл. куст. рр. Песч. дерн. съ окопи. торф. Черенками въ апрѣлѣ, подъ стекломъ, въ песокъ и паритомъ грунтъ. Темп. лѣтомъ 13—21, зимой 10—13°.

**К. латифолия** (C. latifolia, широколистная). Ямайка. Цв. желтые, въ июль. 4—5 ф.

**КЕТТЛЕЯ** (Cattleya). *Кеттлей*,—покровитель ботаники. С. орхидей. (20). Бразилія, Мексика. Тепл. эпифиты. Мохъ съ торф. з., черенками и древ. углемъ, въ корзинѣ или горшкѣ на поверхности компоста. Дѣленіемъ. Темп. лѣтомъ 13—26, зимой 13—15°.

**К. Акландіи** (C. Aclandiae, Аккланда). Бразилія. Цв. покладные съ желтыми полосками; губа розовая или пурпуровая, въ июль. **К. аметистоглосса** (C. amethystoglossa, съ аметистовымъ язычкомъ). Бразилія. Цв. розовые съ пурпуровыми крапинками; губа темно-пурпуровая, съ марта до мая. **К. биколоръ** (C. bicolor, двуцвѣтная). Бразилія. Цв. зеленовато-коричневые, губа розовая, въ сентябрѣ. **К. Вагенери** (C. Wageri, Вагенера). Каракасъ. Цв. бѣлые съ желтымъ пятномъ на губѣ, въ июль. **К. Валькеріана** (C. Walkeriana, Уокера). Бразилія. Цв. розовые, сильнопахучіе, губа розовая съ желтымъ оттынкомъ. Снн. *К. тубероза* (C. tuberosa).

**К. Варнери** (C. Warneri, Уарнера). Бразилія. Цв. розовые, губа карминная. **К. Варшевича** (C. Warszewiczii, Варшевича). Нов. Гренада. Цв. бѣдно-пурпуровые, губа ярко-малиноватая, зимой. **К. гватемалензисъ** (C. guatemalensis, гватемальская). Гватемала. Цв. пурпуровые, губа оранжево-пурпуровая съ малиновыми черточками. **К. гигаъ** (C. gigas, великанская). Троп. Америка. Цв. бѣдно-розовые, губа темно-малиноватая, въ апрѣлѣ—маѣ. **К. гранулоза** (C. granulosa, съ зернистою губой). Гватемала. Цв. бѣлые, съ коричневыми пятнами; губа бѣловатая съ малиновыми крапинками; въ августѣ—сентябрѣ. **К. гуттата** (C. guttata, пятнистая). Бразилія. Цв. зеленоватые съ малиновыми пятнышками; губа бѣлая съ лиловымъ оттынкомъ, съ октября до ноября. **К. Даусона** (C. Dawsoni, Даусона). Бразилія. Цв. пѣжно-розовые, губа розоватая, съ верхней желтою частью. **К. Девоніана** (C. Devoniana, Девона). Гибриды. Цв. бѣлые съ розовымъ оттынкомъ, губа розово-пурпуровая, въ сентябрѣ. **К. долоза** (C. dolosa, обманчивая). Бразилія. Цв. малиновые, губа съ желтымъ пятномъ. **К. Доминіана** (C. Dominiana, Домини). Гибриды. Цв. свѣтло-малиновые, губа розово-пурпуровая. **К. Доуіана** (C. Dowiana, Доуа). Коста-Рика. Цв. лиловые, губа ярко-пурпуровая съ зо-

лотистыми черточками, осенью. **К. интермедіа** (C. intermedia, промежуточная). Бразилія. Цв. розовые, губа съ темно-фіолетовымъ пятномъ, съ мая до июля. **К. криспа** (C. crispa, курчавая). Бразилія. Цв. бѣлые, губа малиноватая, бархатистая; въ июль—августѣ. **К. лабіата** (C. labiata, губастая). Бразилія. Цв. темно-розовые, губа широкая, бархатисто-карминная, осенью. **К. маргината** (C. marginata, краеватая). Бразилія. Цв. розовые, пахучіе; губа темно-розовая съ бѣлою каймой, съ сентября до октября. **К. максима** (C. maxima, больша). Колумбія. Цв. розовые, губа бѣлая съ темно-пурпуровыми жилками; зимой. **К. Мендѣлліи** (C. Mendelli, Менделли). Южн. Америка. Цв. свѣтло-малиновые, губа красно-малиноватая, съ апрѣля до мая. **К. Моссіи** (C. Mossii, Мосса). Лагуайра. Цв. розовые, губа того-же цвѣта съ бахромкой, въ маѣ—июнь. Имѣетъ нѣсколько разновидностей. **К. Реньелліи** (C. Reguellii, Реньелли). Бразилія. Цв. бѣдно-зеленые съ оливковымъ оттынкомъ и розово-пурпуровыми пятнышками; губа аметистовая съ розовымъ оттынкомъ, въ июль, а потомъ въ сентябрѣ. **К. Седеніана** (C. Sedeniana, Седена). Гибриды. Цв. свѣтло-розовые съ зеленоватымъ оттынкомъ, губа по срединѣ пурпуровая, по краямъ бѣло-бахромчатая. **К. Скинери** (C. Skinneri, Скинера). Гватемала. Цв. розоватые съ пурпуровымъ оттынкомъ; основаніе губы бѣлое; въ апрѣлѣ—маѣ. **К. специозиссима** (C. speciosissima, отмишная). Венесуела. Цв. тѣлесные, губа аметистовая съ бѣлыми и желтыми пятнами по срединѣ. **К. Трианѣ** (C. Trianae, Триана). Кордильеры въ Квиндиду. Цв. тѣлесно-розовые, губа тѣлесная съ оранжевыми горлышкомъ; зимой. Имѣетъ много красивыхъ разновидностей. **К. Харрисоніи** (C. Harrisonii, Харрисона). Бразилія. Цв. розовые, губа съ легкимъ желтымъ оттынкомъ; съ июля до октября. **К. хокоэнзисъ** (C. chocoensis, изъ Хоко). Хоко, Новая Гренада. Цв. бѣлые, губа желтая съ пурпуровымъ оттынкомъ. **К. цитрина** (C. citrina, лимонная). Мексика. Цв. желто-лимонные, съ запахомъ, съ мая до августа.

**КИЗИЛЬ**. См. Дерентъ и Меспилусть. **К. аака**. См. Арбутусъ.

**КИВИЗИЯ** (Quivisia). На Ильде-Франсѣ называется *киви* (quivi). С. ясенковыхъ. (5). Мадагаскаръ, о. Маврикія. Тепл. куст. или древ. рр. Песков. глин. дерн. съ волокн. торф. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ песокъ, въ парникѣ. Темп. зимой 7—10, лѣтомъ 13—24°.

**К. хетерофилля** (Q. heterophylla, разнолистная). О. Маврикія. Цв. бѣлые; лл. очередные, перисторазсѣченные. 10—15 ф.

**КИДИЯ** (Kydia). Робертъ *Кидъ* (Kyd)



—полковн. англ. службы, основатель бот. сада в Калькутте; † 1794. С. маляво-выхъ. (3). Индия. Теплолюб. древесн. рр. Песков. торф. сь волоки. Глин. дерн. Черенками изъ полужрълого роста въ песокъ, въ парникъ.

**К. калицина** (*K. calycina*, чашечковал.). Цв. бѣлые или малиновые, обертка 4-листная. **К. фратерна** (*K. fraterna*, братственная). Цв. бѣлые, обертка 6-листная.

**КИЛА**. Желвакъ. Наплывъ на корняхъ, преим. капустныхъ растений. Болѣзнь эта долгое время приписывалась личинкѣ *Cureulis pleurostigma*, но изслѣдованіями русскаго миколога М. С. Воронина открыто, что она происходитъ отъ развитія въ корнѣ низшей формы паразита, названнаго имъ *Plasmodiophora brassicae*.

**КИЛЕТЕЙКА**. См. Монезезъ.

**КИЛЬЛИНГА** (*Kyllinga*). Петеръ *Kylling* (Kylling)—датскій ботаникъ XVII ст. С. ситовниковыхъ. (60). Многол., рѣдко однол., тепл. трав. рр. Уходъ какъ за Циперусъ.

**К. моноцефала** (*K. monoserphala*, одноголовая). Индия. Цв. головки бѣловатыя, овальныя. Лл. влагалищныя, остро-ребристыя.

**КИЛЬМЕЙЕРА** (*Kielmeyera*). *Kilmeyera* (Kilmeyer)—нѣм. ботаническій писатель; † 1844. С. тернстрѣйныхъ. (15). Бразилія. Тепл. дрв. или куст. рр. Волоки. Песков. глин. дерн. Черенками изъ молодого роста въ песокъ, въ парникъ.

**К. экцельса** (*K. excelsa*, высокая). Цв. бѣлые, въ июнь. 60 ф. Дерево.

**КИЛЬНАЯ ТРАВА**. См. Адіантумъ.

**КИНГИЯ** (*Kingia*). *King* (P. G. King)—губернаторъ въ Н. Ю. Валлисѣ, С. ситовниковыхъ. (1). 3. Австралія. Оранж. р. сь древеснымъ стволомъ. Уходъ какъ за Ксанторреа.

**К. аустралис** (*K. australis*, австралийская). Цв. шаровидными головками; лл. въ 2—3 ф. длиной и въ 1 лн. шириной; стволъ выш. въ нѣсколько ф.

**КИПАРИСЪ**. См. Кипрессусъ.

**КИПАРОВЫЯ или СИТОВНИКОВЫЯ** рр. (*Cyperaceae*). Обширное сем. растений похожихъ на злаки сь плотнымъ, обычно колѣнчатымъ, часто углстымъ, стеблемъ. Въ садоводствѣ употребляются весьма немногіе виды. Изъ родовъ слѣдуетъ упомянуть Карексъ, Папирусъ, Сципусъ и Циперусъ.

**КИПРЕЙ**. См. Эпиплобійумъ.

**КИРКАЗОНОВЫЯ** рр. (*Aristolochiaceae*). Семейство это содержитъ своеобразно устроенные воздушные дѣтки, со-

стоящіе только изъ тускло окрашенной чашечки. Цѣпкія травы. и кустарн. рр. преимуществ. изъ Ю. Америки. Родовъ 8, видовъ до 180. Главный родъ Аристолохія.

**КИРКА**. Родъ мотыги, въ видѣ кривого заступа, иногда сь клювомъ въ одну сторону.

**КИСЛИЦА**. См. Оксалисъ.

**КИСЛИЧНЫЯ** рр. (*Oxalideae*), составляющія самостоятельное семейство, причислены теперь къ С. гераніевыхъ.

**КИСЛОРОДЪ**. Газъ, необходимый для жизни растений и извлекаемый и отдѣляемый ими изъ углекислоты.

**КИСТЬ**. Расположеніе цвѣтовъ или плодовъ на одной общей ножкѣ, по сь отдѣльными частями для каждого цвѣтка или плода ножками.

**КИТАЙБЕЛІЯ** (*Kitaibelia*). *П. Китаибель* (Paul Kitaibel)—проф. ботаники въ Пестѣ; † 1817. С. малявоыхъ. (1). В. Европа. Орнамент. выносливое, сильное многол. трав. р. Садовая. Дѣленіемъ.

**К. витифолія** (*K. vitifolia*, сь лл. какъ у винограда). Цв. бѣлые или розовые, позднимъ лѣтомъ или осенью. Лл. 5-лопастные, похажіе формою на виноградные. 6—8 ф.

**КИТАЙСКАЯ ГВОЗДИКА**. См. Діантусъ.

**КИШНЕЦЪ**. См. Коріандрумъ.

**КЛЕВСКОЕ ЖЕЛТОЕ ЯБЛОКО**. Похоже на „Черное дерево“, но плоды длиннѣе.

**КЛОСКЪ**. Бесѣдка; павильонъ въ ту-рекомъ вкусѣ.

**КЛЯ**. См. Стина.

**КЛЕЙЕРА** (*Cleyera*). Д-ръ *Клейеръ* (Cleyer)—голландскій врачъ XVII стол., жившій въ Батавіи. С. тернстрѣйныхъ. (6). Японія, Мексика. Оранж. кустарн. рр. Песчан. волоки. торф. Черенками изъ полужрълого роста, въ песокъ, подъ стекломъ. Темп. лѣтомъ 13—17, зимой 6—8°.

**К. теюидесъ** (*C. theioides*, похажіа на чай). Ямайка. Цв. бѣлые, въ сентябрѣ. 4—5 ф. Снн. *Фрейера теюидесъ* (Frejera theioides). **К. японика** (*C. japonica*, японская). Японія. Цв. желтоватыя, пахучіе. 6 ф.

**КЛЕЙКОВИНА** растительная. Бѣловое тѣло, растворимое въ винномъ спиртѣ.

**КЛЕЙНХОФИЯ** (*Kleinhowia*). *Клейнховъ* (Kleinhow)—директоръ ботан. сада въ Батавіи. С. навозниковыхъ. (1). Индия. Тепл. дрв. р. Глин. дерн. сь торф. Черенками изъ молодого взрѣвшаго роста въ песокъ, въ парникъ. Темп. лѣтомъ 13—25, зимой 8—13°.

**К. хоспита** (*K. hospita*, странникова). Цв. малиновые, сь июля до сентября.

**КЛЕЙСОСТОМА** (*Cleisostoma*). *Клейо*—закрѣпить *stoma*—ротъ; устье шпорца закрыто зубчатымъ отросткомъ. С. орхидей. (15). Остиндія, Малайск. архип., Австралія. Тепл. эпифиты. Уходъ, какъ за Аэридесъ.

**К. Даусоніана** (*C. Dawsoniana*, Даусонна). Мульмейнъ. Цв. снаружи свѣтло-желтые, внутри—темные; губа оранжевая сь коричневыми пятнышками и полосками.

**КЛЕКОЧКА**. См. Птелеа.

**КЛЕМАТИСЪ** (*Clematis*). *Клема*—виноградная вѣтвь; большинство видовъ обычно вьющіяся. С. лютиковыхъ. (100). Умѣр. и тропич. страны. Теплолюб., оражн. и воздушн. 3. любятъ сильную, глубокую глин. дерн., хорошо унавоженную, а при посадкѣ на воздухъ—удобренную листов., оческами торф. и др. растит. веществами. Размнож. сѣменами, черенками и прививкой.

**К. ароматика** (*C. aromatica*, ароматическій). Отен. непахучее. Цв. темныя сине-фіолетовыя, лѣтомъ. Полукуст. многол. Снн. *К. перрелеи одората* (*C. coerulea odorata*). **К. Віорна** (*C. Viorna*, Віорна). С. Америка. Цв. пурпуровыя снаружи, желтыя внутри, въ июнь. 10—12 ф. Разновидность *коккинеа* (*coerulea*), изъ Техаса, имѣетъ цв. внутри желтыя, снаружи яркочерно-красныя. 5—6 ф. **К. виргиніана** (*C. virginiana*, виргинскій). С. Америка. Цв. бѣлые, пахучіе, сь іюня до августа. 15—20 ф. Выносл. **К. Витальба** (*C. Vitalba*). *Жигучень*. Сред. Европа. Цв. бѣлые сь знакомъ миндаля, сь іюля до сентября.

Выносл. **К. Витицелля** (*C. Viticella*). *Лилокъ*. Южн. Европа и Зап. Азія. Цв. голубые, пурпуровые или розовые, сь іюня до сентября. Имѣетъ нѣсколько разновидностей, въ томъ числѣ одну сь махровыми цв. Выносл. **К. грандифлора** (*C. grandiflora*, крупноцвѣтнй). Сіера-Леоне. Цв. зеленовато-желтые, колокольчатые, очень крупныя, сь февраля по май. Тепл. р. Снн. **К. хлоранта** (*C. chlorantha*). **К. гравеолесъ** (*C. graveolens*, вонючій). Китайская Монголія. Цв. блѣдно-желтые, лѣтомъ. Выносл. куст. р. **К. индивіза** (*C. indivisa*, нераздѣльный). Новая Зеландія.

Цв. бѣлые, въ апрѣлѣ. Полувыносл. **К. карипензисъ** (*C. caripensis*, карипскій). Кумата, близъ Карипы. Цв. бѣлые, пахучіе, въ августѣ. Теплолюб. **К. крипа** (*C. crispa*, курчавый). С. Америка. Цв. блѣдно-пурпуровые или пурпуровые, сь іюля до сентября. Оранж. Снн. **К. цилиндрика** и **К. Симсъ** (*C. cylindrica*, *C. Simsii*). **К. ланугиноза** (*C. lanuginosa*, пушистый). Китай. Цв. голубые, большіе, въ июнь. Выносл. **К. мон-**

**тана** (*C. montana*, горный). Непаль. Цв. бѣлые, рано несной. 20 ф. Полувыносл. **К. паникулата** (*C. paniculata*, метельчатый). Японія. Цв. бѣлые, душистые, въ июль—августъ. Полувыносл. **К. ректа** (*C. recta*, прямая). Ю. и В. Европа. Цв. бѣлые, душистые, въ іюнь до августа. 2—3 ф. Многол. трав. Снн. **К. эректа** (*C. erecta*). **К. тубулоза** (*C. tubulosa*, трубчатый). Китай. Цв. голубые сь длинной трубкой, осенью. 2—3. Полувын. **К. фламмула** (*C. flammula*, жгучій). Южн. Европа. Цв. бѣлые, душистые. Имѣетъ много формъ. **К. флорида** (*C. florida*, обильно-цвѣтнй). Японія. Цв. бѣлые, сь апрѣля до сентября. Полувын. Имѣетъ разновидность сь махровыми цв. **К. Форчуней** (*C. Fortunei*, Форчуна). Японія. Цв. бѣлые. Имѣетъ нѣсколько разновидностей. **К. пѣррелеа** (*C. perrelea*, лазуревый). Японія. Цв. фіолетовыя, въ іюнь—іюль. Снн. **К. азуреа грандифлора** (*C. azurea grandiflora*). Имѣетъ нѣсколько разновидностей. Полувын. **К. циррроза** (*C. cirrhoza*, сь ухавами). Юж. Европа. Цв. бѣловатые, въ мартѣ—апрѣлѣ. Выносл. въ умѣрен. климатѣ.

Въ послѣднее время различные виды *Clematis* стараніями производителей, преимущественно англійскихъ Андерсона Генри и Жакмена, обогатили сады красивыми гибридами, доходщими до значительнаго числа и представляющими обширный выборъ для любителей.

**КЛЕНОВЫЯ** раст. (*aceraceae*, *acerinae*). Семейство орнаментальныхъ древесныхъ растений, представителями которыхъ можетъ служить Кленъ (*Acer*).

**КЛЕНЪ**. См. Ацеръ.

**КЛЕОМЕ** (*Cleome*). Отъ *kleio*—закрѣпить, по частямъ цв. С. капарисовыхъ. (70). Египетъ, Аравія, Америка, Австралія. Теплолюб. и выносл. кустарн., либо трав. рр. Легкая сильная. Сѣменами и черенками, въ песокъ, подъ стекломъ и въ теплѣ.

**К. гигантеа** (*C. gigantea*, великанское). Ю. Америка. Цв. зеленоватые, въ июнь. Тепл. куст. р. сь неспрѣднымъ запахомъ и жгучимъ вкусомъ. **К. пунгенсъ** (*C. pungens*, жгучее). Вестиндія. Цв. тѣсные или розовые, въ июль. 1—3 ф. Тепл. однол. Снн. **К. спиноза** (*C. spinosa*). **К. розеа** (*C. rosea*, розовое). Рио-Жанейро. Цв. изящно-розовые, въ июль. 1 1/2 ф. Теплолюб.

**КЛЕРОДИНДРОНЪ** (*Clerodendron*). *Клерос*—случай и *dendron*—дерево, по нецѣрности врачебныхъ свойствъ. С. вербеновыхъ. (70). Жаркія страны. Тепл. и оранж. кустар. орнамент. рр. Глин. дерн. пополамъ сь торф. сь добавленіемъ листов. или перегной и древесн. угля. Че-



ренками при началъ роста въ мартъ или апрѣль въ песчанисто-дерн., подъ стекломъ и на тепломъ грунтѣ. Темп. лѣтомъ 13—23°, зимой 5—8°.

**К. сканденсъ** (*C. scandens*, вьющійся). Гвинея. Цв. бѣлые, въ августѣ. Тенлич. **К. спеціозумъ** (*C. speciosum*, отмытый). Гибриды. Цв. темно-розовые. **К. спленденсъ** (*C. splendens*, великолѣпный). Сьерра-Леоне. Цв. шароховые, въ июль—июль. Темп. вьющ. Разновид. *speciosissima* (*speciosissima*) имѣетъ болѣе яркіе цвѣты, появляющіеся лѣтомъ. Темп. вьющ. **К. севаматумъ** (*C. squamatum*, чешуйчатый). Китай. Цв. ярко-сургучные, лѣтомъ. Тенлич. кустар.

**КЛЕТРА** (*Clethra*). *Clethra*—по гречески означаетъ ольху, по сходству л. С. пересохшихъ. (23) Сѣв. и Южн. Америка, Мадера, Японія, Малайск. архип. Оранж. кустар. и древесн. пр. Глин. дерн. съ пескомъ, безъ удобренія. Отводками и черенками въ песч. землѣ подъ стекломъ.

**К. акумината** (*C. acuminata*, съ остро-конеч. л.). Каролина. Цв. бѣлые, пахучіе, съ июля до октября. 10—15 ф. **К. альнифолия** (*C. alnifolia*, съ л. какъ у ольхи). Соед. Шт. Цв. бѣлые, въ июль до сентября. 3—4 ф. Кустар. **К. паникулата** (*C. paniculata*, метельчатая). Каролина. Цв. бѣлые, пахучіе съ июля до октября. Кустарн. 3—4 ф. **К. томентоза** (*C. tomentosa*, пушистая). Виргинія. Цв. бѣлые, съ июля до октября. 3—4 ф. Кустар.

**КЛЕЩЕВИНА**. См. Ридинусъ.

**КЛЕЩИКЪ**. См. Ариварумъ.

**КЛИВІЯ** (*Clivia*). По герцогинѣ португальской изъ семейства Клайвъ (*Clive*). С. амариллисовыхъ. (3) Южн. Африка. Оранж. луковичн. пр. Во время роста держать теплѣе и влажнѣе. Дѣленіемъ и сѣменами. Сип. *Имантофилумъ* (*Imanthophyllum*).

**К. Гардени** (*C. Gardeni*, Гардена). Ю. Африка. Цв. красно-желтые, въ декабрь. **К. нобилис** (*C. nobilis*, благородная). Ю. Африка. Цв. красно-желтые, въ маѣ. 1½ ф. Въ настоящее время въ садахъ получены красивѣйшіе гибриды.

**КЛИДІМІЯ** (*Clidemia*). *Клидеми* (*Clidemia*) древній греческій ботаникъ. С. черноустовыхъ. (40) Мексика, Бразилія. Тенлич. куст. пр. Уходъ какъ за Миконія.

**К. вяттата** (*C. vittata*, полосатая). Перу. Цв. розовые.

**КЛИМАТЪ**. Состояніе воздуха извѣстной мѣстности, относительно жары и стужи, сухости, сырости, продолжительности времени года и пр. Климатъ зависитъ отъ широты мѣстности, отъ горъ, лѣсовъ, водъ,

болотъ и многихъ друг. условій. Знаніе климата свойственнаго растенію составляетъ насущную необходимость для успѣшнаго воспитанія растенія. При уходѣ стараются поставить растенія въ тѣ-же, или по возможности въ близкія условія, при которыхъ онѣ растутъ дико; первую заботу въ этомъ случаѣ является водостокъ, составъ земли, температура и влажность воздуха.

**КЛИНТОНІЯ** (*Clintonia*). *De Buntz* *Клинтонъ* (*De Witt Clinton*)—губернаторъ Нью-Йорка. Однолѣт. воздушн. Сѣменами весной, въ парникѣ, въ рыхлой землѣ, затѣмъ высадить на воздухъ.

**К. Эндрюзиана** (*C. Andrewsiana*, Эндрюсиана). Калифорнія. Цв. темно-розовые, колокольчатые. 2 ф.

**КЛИТОРІЯ** (*Clitoria*). *Clitoris*—анатомическій терминъ, по сходству части цвѣтка. С. бобовыхъ. (27) Азія, Африка, Америка, Австралія. Красивые тенлич. вьющ. пр. Смѣсь торф. съ глин. дерн. и пескомъ. Черенками изъ бокового роста въ песокъ, въ разводч. парникѣ, или сѣменами.

**К. терната** (*C. ternata*, тройчатая). Индія. Цв. свѣтло-лазурные, въ июль. Есть разновидности съ бѣлыми цв. Сип. *Терната вулгарисъ* (*Ternatea vulgaris*). **К. хетерофилля** (*C. heterophylla*, разнолистная). Тропич. страны. Цв. голубые, въ июль.

**КЛИАНТУСЪ** (*Clianthus*). *Kleios*—слава и *anthos*—цвѣтокъ; по красотѣ цв. С. бобовыхъ. (3) Нов. Зеландія, Австралія, Ява. Полувыноск., обычно оранж. кустарн. пр. Глин. дерн. съ торф. или листов. и др. углемъ. Осторожно пересаживать. Черенками, въ песчан. з.

**К. Дампьері** (*C. Dampieri*, Дампьера). Австралія С. и Ю. и Нов. Южн. Валлис. Цв. красные съ чернымъ пятномъ при основаніи флага, весной. 2 ф. Травян. многол. Имѣетъ нѣсколько разновидностей; изъ нихъ *marginata* (*marginata*) съ бѣлыми цв., введенными краснымъ и съ чернымъ вишней у флага пятномъ—лучшая. **К. пунисеусъ** (*C. puniceus*, красно-гранатовый). Новая Зеландія. Цв. шароховые, въ маѣ. 3 ф. Полувыноск. вьющ. пр. Въ дикомъ состояніи не найдено, но возмощивается въ большомъ количествѣ туземными майора. Разновидность *magnificus* (*magnificus*)—болѣе сильное р.

**КЛОПНЕЦЪ**. См. Брица.

**КЛУВЕНЪ**. Подземный стебель въ видѣ шишки.

**КЛУВНИКА**. См. Фрагарія.

**КЛУВЫШЕКЪ**. Сжатый полузонтикъ съ сидячими цвѣтками.

**КЛѢТОЧКА**. Мѣшечекъ разной формы

содержащій въ себѣ образовательное жидкое вещество, развитіе котораго условливаетъ ростъ растенія.

**КЛѢТЧАТКА** или **ЦЕЛЮЛОЗА**. Углеводъ, составляющій существенную часть растительной клѣточки.

**КЛЮГІЯ** (*Klugia*). Д-ръ *Клюгъ* (*Klug*), любитель ботаники. С. геснеріевыхъ. (4) Мексика, Центр. Америка, Остіндія, Цейлонъ, о. Малайского архип. Тенл. трав. пр. Глин. дерн., торф. и песокъ по ровну. Черенками.

**К. Нотониана** (*K. Notoniana*, Нотониана). Индія. Цв. голубые, лѣтомъ. 1 ф.

**КЛЮЕВСКІЕ** или **РУБЕЦЪ**. Поздній сортъ яблока, созревающего въ лежкѣ. Величина средняя, цвѣтъ зеленоватый, вкусъ кисловатый. Лучшее для мармелада и пастылей.

**КЛЮЗІЯ** (*Clusia*). *Шарль де ле Клузъ* или *Клузюсъ* (*Charles de le Cluse* или *Clusius*) изъ Артуа, знаменитый въ свое время ботаникъ. † 1609. Сем. гумигутныхъ. (60). Троп. Америка. Тенличныя, иногда эпифитныя, др. и куст. пр. Легкая песч. Черенками изъ ползучаго роста въ песокъ и развод. парн. Темп. лѣтомъ 13—24°, зимой 8—10°.

**К. розеа** (*C. rosea*, розовая). Каролина. Цв. большіе розовые, въ июль. 7—20 ф., по скаламъ и деревьямъ.

**КЛЮТІЯ** (*Cluytia*). *Оутгерсъ Клуитъ* (*Outgers Cluyt*)—проф. въ Лейденѣ, † 1650. С. молочайныхъ. (20). Южн. и троп. Африка. Оранж. куст. пр., не имѣющій садоваго значенія и потому встрѣчаемый только въ ботаническихъ коллекціяхъ.

**КЛЮКВА**. Ст. Оксикоккусъ.

**КЛЮЧЬ-ТРАВА**. См. Ботрихумъ.

**КЛЯВІЯ** (*Clavija*). *Клавихо-Фахардо* (*Gravijo-Fachardo*)—испанскій ботаникъ, переводчикъ Бюффона. С. мирсиновыхъ. (25). Троп. Америка. Тенл. др. пр. Глин. дерн. съ торф. Черенками въ песокъ, въ развод. парникѣ. Темп. лѣтомъ 13—24°, зимой 8—10°.

**К. орната** (*C. ornata*, украшенная). Каракасъ. Цв. оранжевые, 10—12 ф. Сип. *Теодораста лонгифолия* (*Theophrasta longifolia*). **К. Рейделиана** (*C. Reideliana*, Рейделя). Бразилія. Цв. оранжевые, въ июль. Сип. *К. макрофилля* (*C. macrophylla*). **К. фуггенсъ** (*C. fulgens*, яркая). Перу. Цв. красно-оранжевые.

**КЛЯДРАСТИСЪ** (*Cladrastis*). Происхожденіе названія неясно. С. бобовыхъ. (2). Сѣв. Америка, Манджурія. На землю неприхотливо. Сѣменами, весной.

**К. амурѣнзисъ** (*C. amurensis*, амурскій).

Долина р. Амура. Цв. зеленоватые. 6 ф. Очень орнаментальн. Сип. *Мааскія амурѣнзисъ* (*Maackia amurensis*). **К. тинкторія** (*C. tinctoria*, красильный). С. Америка. Цв. бѣлые, въ маѣ. Сип. *Виргинія лута* (*Virgilia lutea*).

**КЛЯЙТОНІЯ** (*Claytonia*). Джонъ *Клайтонъ* (*Clayton*)—коллекторъ въ Виргиніи. С. портулаковыхъ. (20). Азія, Америка, Австралія, Нов. Зеландія. Однолѣт. или клубневый многол. пр. Торф. съ малымъ количествомъ глин. дерн. Сѣменами или отпрысками. Однол. высѣваются весной на мѣсто.

**К. виргиника** (*C. virginica*, виргинская). С. Америка. Цв. бѣлые, въ мартѣ. 3 д. Многол. клубнев. Сип. *К. грандифлора* (*C. grandiflora*). **К. сибирика** (*C. sibirica*, сибирская). Сибирь. Цв. розовые, въ мартѣ. 3—6 д. Многол. съ веретенообр. корнемъ.

**КЛЯРКІЯ** (*Clarkia*). Кап. *Кларкъ* (*Clarke*) сопутствовалъ кап. Льюису въ путешествіи по Скалистымъ горамъ, въ С. Америкѣ. С. онагриковыхъ. (4). С.-З. Америка. Однолѣтн. воздушн. Сѣменами на мѣстѣ, весной, или въ парникѣ. Въ грунтъ промежуточное развитіе отъ 9 до 12 д.

**К. пульхелля** (*C. pulchella*, красная). С. Америка. Цв. пурпуровые, крупныя, лѣтомъ. 1½ 2 ф. Имѣетъ простыя и махров. цвѣты разныхъ сортовъ. **К. элгансъ** (*C. elegans*, изящная). Калифорнія. Цв. ярко-розовые, лѣтомъ. 2 ф. Имѣетъ много формъ съ различно-окрашенными простыми и махровыми цв.

**КЛЮСЕНА** (*Clausena*). П. *Клаусенъ* (*Clausen*)—датскій ботаникъ. XVII стол. С. рутовыхъ. (14). Троп. Индія, Африка, Австралія. Тенл. др. пр. Глин. дерн. Черенками въ песокъ, въ развод. парникѣ. Темп. лѣтомъ 13—22°, зимой 8—13°.

**К. коримбифлора** (*C. corymbiflora*, съ цв. щиткомъ). Остр. Дружбы. Цв. бѣлые. Плоды съѣдомые.

**КНАЙТІЯ**. См. Найтія.

**КНЕОРУМЪ** (*Sneorum*). Названіе взято у Гиппократа и Теофраста. С. синарбузовыхъ. (2). Средиз. побережье, Канарскіе о. Орнамент. оранжер. или полувыноск. куст. пр. Смѣсь изъ торф. съ глинисто-дерн. и пескомъ. Черенками изъ възрѣвшаго роста, въ апрѣль, подъ стекломъ.

**К. пульверулентумъ** (*C. pulverulentum*, порошистый). Генерифъ, Мадера. Цв. желтые, съ апрѣля до сентября. 1—3 ф. Р. покрыто сѣроватымъ палетомъ. **К. трикоккусъ** (*C. tricosum*, трехплодниковый). Южн. Европа. Цв. желтые. 1—2 ф. Р. гладкое.



**КНЕСТИОСЪ** (*Cnestis*). *Кнео*—зудить: плодинки покрыты колючими волосками. С. кинарадныхъ. (10). Троп. и Ю. Африка, Мадагаскаръ, о. Индйск. архип. Глин. дерн. съ торф. и малымъ колч. песку. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ песокъ, въ развод. парникъ. Темп. лѣтомъ 13—21, зимой 8—12°.

**К. глѣбра** (*C. glabra*, гладкій). О. Маврикія. Цв. бѣлые съ зеленымъ. 10 ф. **К. корникулатумъ** (*C. corniculatum*, рога-тый). Гвинея. Цв. пурпуровые. 10 ф. **К. полифилля** (*C. polyphylla*, многолиственный). О. Маврикія. Цв. пурпуровые. 6 ф.

**КНИКУСЪ** (*Cnicus*) *Cnicus*—наносить вредъ, по колючкамъ, которыми вооружены пр. С. сложнотычковыхъ. (200). Европа, Америка. Одно-, дву- и многол. трав. пр. большинство которыхъ не заслуживаетъ воспитанія. Обыкновен. Съеменами весной.

**К. акаулисъ** (*C. acaulis*, безстебельный). Европа. Цв. головки пурпуровыя, лѣтомъ. 2 ф. Многол. **К. альтиссимусъ** (*C. altissimus*, самый высокій). Соед. ... таты. Цв. головки пурпуровыя, въ августъ. 3—10 ф. Многол. **К. спинозиссимусъ** (*C. spinosissimus*, самый колючій). Европа. Цв. головки блѣдно-желтыя, съ іюня до августа. 3 ф. Многол. **К. ундулатусъ** (*C. undulatus*, волнистый). Калифорнія. Цв. головки пурпуровыя, лѣтомъ. 1 ф. Многол. Спн. **К. Дугласи** (*C. Douglasii*).

**КНИПГОФИЯ** (*Kniphofia*). Иоганъ *Книпгофъ* (*Kniphof*)—проф. медицины въ Эрфуртѣ. † 1763. С. лилейныхъ. (16). Троп. и Южн. Африка и Мадагаскаръ. Травяни. полу-выносл. пр., извѣстныя подъ названіемъ *Тритомы*, болѣе новыми. Легкая-песчан., съ поверхностнымъ удобреніемъ. Дленимъ, рано весной, или съ-семенами.

**К. алоидесъ** (*K. aloides*, похожая на алоэ). Южн. Африка. Цв. кораллово-красные, дѣлающіеся оранжевыми; лл. длинныя, узкіе. 3—4 ф. Спн. **К. Уваріи** или *Тритомы Уваріи* (*K. Uvaria*, *Tritoma Uvaria*). У разновидности *максима* (*maxima*), цв. листы и всѣ части р. больше. **К. Бурчелли** (*K. Burchelli*, Бурчелля). Ю. Африка. Цв. шарлаховые съ желтыми и зелеными кончиками, осенью 1½ ф. **К. Лейхтлин** (*K. Leichtlinii*, Лейхтлина). Абиссинія. Цв. тускло-киноварные свѣтлые съ желтымъ, въ августъ **К. Рупери** (*K. Rooperi*, Рупера). Британская Каптерія. Цв. красно-оранжевые, дѣлающіеся желтыми, въ ноябрь. 2 ф. Спн. *Тритомы Рупери* (*Tritoma Rooperi*).

**КНИФОФИЯ**. См. Клинофифа.

**КНОКСІЯ**. См. Ноксія.

**КОВЕА** (*Cobaea*). *Кобо* (*Cobo*)—испан-

скій натуралистъ. С. синюшковыхъ. (5). Троп. Зап. Америка, Перу, Мексика. Оранже. и полу-выносл. выносл. пр. Рыхлая, дов. сильная. Съеменами и черенками, въ парникъ.

**К. пендулифлора** (*C. penduliflora*, съ пониклыми цв.). Каракасъ. Цв. колокольчикообразные, зеленые, въ декабрь. Оранже. выносл. пр. **К. сканденсъ** (*C. scandens*, лазящая). Мексика. Цв. большіе, колокольчатые, темно-пурпуровые, съ мая до октября. Есть форма съ пестрыми лл.

**КОВАНИЯ** (*Cowania*). Джемсъ *Кованъ*, англичанинъ, неоднократно доставлявшій пр. изъ Мексики и Перу. С. розовыхъ. Мексиканскія орнам. оранже. куст. Песч. торф. съ глин. дер. Размножается чрезвычайно трудно.

**К. мексикана** (*C. mexicana*, мексиканская). Мексика. Цв. желтые. 1—6 ф. **К. пликата** (*C. plicata*, складчатая). Мексика. Цв. темно-красные изъ почекъ, совершенно похожихъ на розановыя, въ июнь—іюль. 1—2 ф.

**КОВЫЛЬ**. См. Стипа.

**КОДКЛУВІЯ** (*Coldcluvia*). Александръ *Калдклевъ* (*Caldclough*), коллекторъ чилийскихъ пр. С. камеломковыхъ. (1). Юж. Чили.

**К. паникулата** (*C. paniculata*, метельчатый). Юж. Чили. Единственный представитель рода. Оранжевое дерево. Цв. бѣлые, въ іюнь. Размнож. черенками изъ полурѣздаго роста, въ песокъ, подъ стекломъ, въ умеренно-теплой грунтъ. Глин. дерн. съ торф. Темп. зимой 4—6°.

**КОДИЕУМЪ** (*Codiaeum*). Одинъ изъ видовъ майяцк. зовутъ *codebo*. С. молотайныхъ. (4). Малайск. арх., ос. Тихаго океана, Австралія. Тепло. куст. пр. съ орнаментальными лл., воспитываемыя подъ неправильнымъ названіемъ *Кротонновъ*. Сильная песчанисто-дерн. съ примѣсью листов. или торф. Съеменами, или черенками въ теплѣ въ 22°. Темп. лѣтомъ 17—24, зимой 14—17°. Большинство воспитываемыхъ въ садахъ—гибриды, преимущественно отъ *К. пиктумъ*.

**К. альбикансъ** (*C. albicans*, бѣловатый). Разновидность. Лл. широко-ланцетов., темно-зеленые съ бѣлыми разводами; нижняя сторона красно-карминоваго цв. **К. ангустиссимумъ** (*C. angustissimum*, самый узко-лиственный). Полинезія. Лл. линейные, узкіе, темно-зеленые съ золотисто-желтыми краями и средней жилкой. Спн. **К. ангиустифоліумъ** (*C. angustifolium*). **К. аукубефоліумъ** (*C. aubenaeifolium*, съ лл. какъ у аукубы). Полинезія. Лл. темно-зеленые съ желтыми и малиновыми пятнами; жилки болѣе свѣтло-зеленыя или слегка малиновыя. **К. Варреніи** (*C. Warreni*, Варре-

на). Полинезія. Лл. спиральные, линейно-ланцетов., темно-зеленые съ оранжевыми и малиновыми крапинками и полосками; съ возрастомъ малиновый цвѣтъ превращается въ ярко-карминный. **К. Вейсмани** (*C. Weismanni*, Вейсмана). Полинезія. Лл. линейно-ланцетовидные, темно-зеленые съ нѣсколькими желтыми крапинками и золотисто-желтыми краями и средн. жилкой. **К. Вейчи** (*C. Veitchii*, Вейча). Полинезія, Лл. продолговато-ланцетовидные, зеленые съ малиновыми краями; нижняя сторона малино-фиолетовая. **К. глоріозумъ** (*C. gloriosum*, славный). Ново-гвибидскіе ос. Лл. узкіе, зеленые, непепреренные бѣлымъ, различнымъ образомъ. **К. Гольдье (*C. Goldie*, Гольдел). Лл. бандурообразные, темно-оливковые съ золотисто-желтыми жилками. **К. Гоукера (*C. Hawkeri*, Гоукера). Полинезія. Лл. широко-ланцетовидные, млечно-бѣлые съ зелеными краями. **К. Дизраэли** (*C. Disraeli*, Дизраэли). Полинезія. Лл. зеленые съ золотистыми жилками. **К. Догсонъ** (*C. Dogsonae*, Догсона). Лл. линейно-ланцетовидные, ярко-зеленые съ золотистою по серединѣ полоской. **К. Джамсои** (*C. Jamesii*, Жемса). Лл. овальные, зеленые съ бѣлыми разводами, мѣняющимися въ желтые. **К. императоръ** (*C. Imperator*, начальствующій). Лл. широкіе, съ бѣлыми крапинками. **К. иррегуляръ** (*C. irregulare*, неправильный). Полинезія. Лл. продолговатые темно-зеленые съ золотисто-желтыми пятнами и средней жилкой; края выемчатые; нижн. сторона грязно-желтая. **К. Иоганнисъ** (*C. Iohannis*, Иогана). Полинезія. Лл. линейно-ланцетовидные, ярко-зеленые съ желтою серединою и краями. **К. корнүтумъ** (*C. cornutum*, рога-тый). Полинезія. Лл. продолговатые, темно-зеленые съ желтыми крапинками и желтою сред. жилкой. **К. маестикумъ** (*C. majesticum*, величественный). Полинезія. Лл. зеленые съ желтыми жилками, перемѣняющіеся въ оливковые, съ малиновыми жилками. **К. мѣдунъ-варіегатумъ** (*C. medium-variegatum*,—средне-пестрый). Индія. Лл. продолговатые, зеленые съ золотистыми краями и сред. жилкой; нижняя сторона блѣдно-зеленая. Воспитывается подъ названіемъ *варіегатумъ* (*variegatum*). **К. миссисъ Дорманъ** (*C. Mrs Dorman*, г-жи Дорманъ). Лл. линейно-ланцетовидные съ желто-оранжевою полоскою по серединѣ. **К. Невилліе** (*C. Nevillae*, леди Невилль). Полинезія. Лл. продолговато-ланцетовидные, оливковые съ желтыми полосами, въ послѣдствіи желтизна превращается въ малиновый цвѣтъ съ оранжевыми отгнкомъ, а зеленый цвѣтъ въ болѣе темный. **К. принцепсъ** (*C. princeps*, княжескій). Ново-Гвибидскіе ос. Лл. широко-линейные, сначала зеленые съ зеленою сред. жилкой и краями и такого-же цвѣта крапинками,****

въ послѣдствіи зеленый цвѣтъ превращается въ темно-бронзовый, а желтый въ малиново-розовый. Спн. *мутабиле* (*mutabile*). **К. спирале** (*C. spirale*, спиральный). Остр. Южн. Океана. Лл. спиральные, темно-зеленые, съ золотисто-желтыми черточками; вполне разившіеся—темно-зеленые, бронзовые съ темно-малиновою главною жилкой. **К. супербиенсъ** (*C. superbiens*, велико-душный). Новая Гвинея. Лл. продолговатые, зеленые съ желтоватыми мѣтками; по мѣрѣ развитія желтыя мѣста увеличиваются, зеленые темнѣютъ. **К. триколоръ** (*C. tricolor*, трехцвѣтный). Полинезія. Лл. удлинненно-лопатчатые, темно-зеленые, съ золотисто-желтою серединою; нижн. сторона красноватая. **К. триумфансъ** (*C. triumphans*, торжествующій). Ново-Гвибидскіе ос. Лл. продолговатые, темно-зеленые съ золотистою полоскою по каждой сторонѣ, сред. жилка ярко-малиновая. **К. ундулатумъ** (*C. undulatum*, волнистый). Полинезія. Лл. продолговатые, ярко-малиновые съ карминовыми пятнами и пурпуровую сред. жилкой; нижняя сторона болѣе блѣдная съ пятнами того-же цвѣта. **К. Чельсои** (*C. Chelsoii*, изъ Чельси). Новая Гвинея. Лл. узкіе, ярко-шарлаховые съ карминовымъ отливомъ. **К. Хукеріанумъ** (*C. Hookerianum*, Гукеровъ). Эрроманго. Лл. широко-ланцетовидные, темно-зеленые съ большимъ желтымъ внизу пятномъ и такого-же цвѣта полосами отъ середины къ краямъ. **К. элегансъ** (*C. elegans*, изящный). Индія. Лл. линейно-ланцетов., темно-зеленые съ малиновою сред. жилкой и розоватыми краями. Спн. *парвифоліумъ* (*C. parvifolium*).

**КОДОНОПСИСЪ** (*Codonopsis*). *Kodon*—колокольчикъ и *opsis*—подобіе, по формѣ цв. С. колокольчиковыхъ. (12). Гималаи, Японія, Манчжурія. Травяни. пр. Торф. съ глин. дернов. Съеменами весной.

**К. ротундифолія** (*C. rotundifolia*, кругло-лиственный). Гималаи. Цв. желтовато-зеленые большіе. Тонкостебельное выносл. однол. р.

**КОЖЕВЕННИКОВЫЯ** пр. (*coriariae*). Малочисленное сем., состоящее только изъ одного рода *Кориарія*.

**КОЖИЦА**. Верхній клѣтчатый слой растенія.

**КОЖУРА**. Скорлупа, кора, верхняя оболочка.

**КОИКСЪ** (*Coix*). Названіе взятое у Теофраста. С. злаковъ. (4). Остиндія, Китай, Мексика. Травяни. обычно теилич. пр. Легкая, но сильная. Съеменами, дленимъ. Темп. лѣтомъ 13—22, зимой 8—10°.

**К. лѣкрима** (*C. lachryma*, слеза). *Богородицыны слезки*. Остиндія. Даетъ сырыя съмена, похожія на жемчужины, которыми въ-



сать на р. пучками и служить на изготовление четок. Воспит. как однолетн. на воздухе, куда разсаживаются пеходы от посева в парник. Цветет в июль. 2—4 ф.

**КОККОЛОВА** (*Coccoloba*). *Kokkos*— плод в *lobos*—стручок; по плоду. С. греческих. (80). Преим. троп. Америка. Тепл. дрв. рр. Глин. дер. Черенками изъ зрѣлого роста, вь песокъ, подь стекломъ.

**К. обовата** (*C. obovata*, обратно-лицевидная). Нов. Гренада. Цв. бѣлые съ зеленымъ. 50 ф. **К. пубесценс** (*C. pubescens*, пушистая). Вестинд. **К. увифера** (*C. uvifera*, похожая на винограду). Вестинд. Цв. бѣлые, душистые. 20 ф.

**КОККОЦИПСЕЛЮМЪ** (*Coccoscyrselum*). *Kokkos*—плодъ и *kypsele*—сосудъ, ваза; по формѣ плода. С. мареновыхъ (16). Троп. Америка. Тепл. ползучія рр. Торф. съ пескомъ. Дѣленіемъ стебля.

**К. репенс** (*C. repens*, ползучій). Вестиндскіе о. Цв. голубые, вь май. Однолетн.

**КОККУЛЮСЪ** (*Cocculus*). *Cocculus*—кошениль, п. ч. большинство видовъ съ красными ягодами. С. луносѣмниковыхъ. (12). Азія, Африка, Америка. Тепл. оранж. или воздушн. вьющ., либо цѣпкія кустар. рр. Глин. дерн. съ торф. Черенками, вь песокъ, весной или лѣтомъ, подь стекломъ, на теплѣ.

**К. каролинусъ** (*C. carolinus*, каролинскій). Соед. Штаты. Цв. зеленые, вь июль. 20 ф. Выносливое. **К. лаурифолиусъ** (*C. laurifolius*, лавровый). Тропич. Гималаи. Цв. бѣлые, вь январь. Оранж., не вьющ. **К. тунбергіи** (*C. Thunbergii*, Тунберга). Японія. Цв. зеленые. Вынос.

**КОКОСЪ** (*Cocos*). *Coco*—португальское названіе марышки; по сходству одного конца орѣха съ мордою марышки. С. пальмъ. (30). Троп. страны, преим. Америки. Тепличныя пальмы. Смѣсь изъ 2 ч. сильной глин. дернов. съ 1 ч. торф. и 1 ч. песку. Во время роста спящая полпка. Сѣменами вь теплич. парникѣ.

**К. Ведделіана** (*C. Weddelliana*, Ведделя). Ю. Америка. Вп. перистыя, длиною вь 1—4 ф. дугообразныя. Одна изъ самыхъ изящныхъ малорослыхъ пальмъ. Сип. *Леополдіна пѣлхара* (*Leopoldina pulchra*) и *Глазіова элегантиссима* (*Glazioviana elegantissima*). **К. плумоза** (*C. plumosa*, перистый). Бразилія. Лл. перистые, длиною вь 3—15 ф. Цвѣты воскообразные, длинными пониклыми кистями, дающие красно-оранжевые орѣхи, окруженные съѣдобною мякотью.

**К. Романцѳіана** (*C. Romanzoffiana*, Руманцова). Бразилія. Лл. перистые, длинные, дугообразные. **К. шизофилля** (*C. schizo-*

*phylla*, съ разрывными лл.). Бразилія. Лл. перистые, дугообразные, длиною вь 6 и болѣе ф.

**КОЛА** (*Cola*). Мѣстное названіе. С. навозниковыхъ (стеркулевыхъ). (6). Троп. Африка. Тепл. кустар. и дрв. рр. Сильная, рыхлая, глин. дерн. Сѣменами и черенками изъ зрѣлого роста вь развод. парникѣ. Темп. зимой 13—17, лѣтомъ 17—24°.

**К. акумината** (*C. acuminata*, острокопечная). Троп. Африка. Цв. желтые, вь январь. Плоды подь названіемъ *кола* или *гура*, величиною вь голубиное яйцо, имѣютъ горькій, вяжущій вкусъ и употребляются неграми вь З. троп. Африкѣ и Вестинд. передъ ѣдой, какъ вкусная закуска.

**КОЛЕА** (*Colea*). *Коля* (*Cole*) былъ губернаторомъ на о. Маврикія. С. биньонныхъ. (10). Маскаренскіе о. Теплич. куст. рр. Смѣсь волоки, торф. съ волок. глин. дерновой, пескомъ и дрв. углемъ. Черенками во влажномъ теплѣ, подь стекломъ, вь песокъ. Темп. лѣтомъ 12—22, зимой 7—10°.

**К. флорибунда** (*C. floribunda*, цвѣтущая обильно). О. Маврикія. Цв. желтоватые, вь августѣ. 10 ф.

**КОЛЕОНЕМА** (*Coleonema*). *Koleos*—влагалище, *нема*—нить; по расположенію тычинокъ. (4). Ю. Африка. Оранж. кустар. рр. Смѣсь изъ 1 ч. торф. и 2 ч. глин. дер. съ добавленіемъ песку. Черенками изъ молодого роста вь песокъ, подь стекломъ. Темп. зимой 3—6°.

**К. альбумъ** (*C. album*). М. Д. Н. Цв. бѣлые, мелкіе, осенью и зимой. 1—2 ф. **К. пѣлхрумъ** (*C. pulchrum*, красивый). М. Д. Н. Цв. большіе, красные, осенью. 2—4 ф.

**КОЛЕУСЪ** (*Coleus*). *Koleos*—влагалище; тычинки срослись основаніями, образуя какъ бы влагалище для пестика. С. губоцвѣтныхъ. (50). Троп. Африка, Остиндія. Тепл. и оранж. куст. рр. Малайск. арх. Смѣсь 1/2 дерн., 1/4 коровьяго перегноя и остальное изъ песку пополамъ съ листовою. Сѣменами и черенками вь песокъ, вь теплѣ и влажности. Темп. для тепличныхъ: лѣтомъ 13—21, зимой 8—10°, для оранжер.—обыкновен. оранжерейная.

**К. барбатузъ** (*C. barbatus*, бородастый). Абиссинія. Цв. коричневатые, вь ноябрь. 2 ф. Все растение сильно пахнетъ. Сип. *Плектрантусъ барбатузъ* (*Plectranthus barbatus*). Многол. тепл. **К. Влумей** (*C. Blumei*, Блюма). Ява. Цв. пурпуровые съ бѣлымъ; лл. желтовато-зеленые съ красно-пурпур. пятнами. 1—1 1/2 ф. Многол. тепл. Родоначальникъ многихъ формъ и между прочимъ *Верскаффеліи* (*Verschaffeltii*), **К.**

**Макрѣи** (*C. Macraei*, Макра). Пейлонъ. Цв. пестрые бѣлые съ темно-пурпуровымъ, лѣтомъ. 2—3 ф. Многол. тепл. **К. скулляріоидесъ** (*C. scutellarioides*, похожій на *Scutellaria*). Остиндія, Сѣв. Австралія. Цв. голубые; лл. свѣтло-зеленые. Высокое р. Сип. *Осимумъ скулляріоидесъ* (*Ocimum scutellarioides*).

Число разновидностей и помѣсей этого рода до безконечности велико, красота ихъ сосредоточена на росписи лл.

**КОЛИРОВАТЬ**. Щепить, прищипывать, прививать очкомъ, или глазкомъ, не пруткомъ. Тоже, что *окулировати*.

**КОЛЛЕТІЯ** (*Colletia*). *Колле* (*Ph. Collet*)—французскій писатель С. крупновыхъ (13) Тропич. Америка. Теплич. куст. рр. Песчанисто-глин. дерн. Черенками изъ зрѣлого роста, вь песокъ, подь стекломъ, весной Темп. зимой 8—10°.

**К. круціата** (*C. cruciata*, крестовидная). Ріо де ла Плата. Цв. блѣдно-желтые. 4 ф. Сип. **К. биктоніенсисъ** (*C. bicktoniensis*). **К. спинноза** (*C. spinosa*, иглистая). Чили, Перу. Цв. безлестные, вь май до июля. 3—10 ф. Сип. **К. арматъа**, **К. вальдивіана**, **К. хоррида**, **К. полиаканта**, **К. фeroxъ** (*C. armata*, *C. valdiviana*, *C. horrida*, *C. polyacantha*, *C. ferox*).

**КОЛОГАНІЯ** (*Cologania*). *Кологанъ* (*Cologan*) оказывалъ гостепріимный пріютъ натуралистамъ на Тенерифѣ. С. бобовыхъ. Тепл. цѣпкіе куст. изъ Мексики. Глин. дерн. съ торф. Черенками изъ зрѣлого роста, вь апрѣль, вь песокъ, подь стекломъ, сѣменами вь парникѣ, вь мартѣ. Темп. лѣтомъ 13—22, зимой 3—6°.

**К. билоба** (*C. biloba*, двулопастная). Мексика. Цв. фиолетовые, лѣтомъ и осенью. 20 ф. Можетъ содержаться и вь оранж. **К. Бруссонетіи** (*C. Broussonetii*, Бруссоне). Мексика. Цв. фиолетовые.

**КОЛОКАЗІЯ** (*Colocasias*). *Kolokasia* греч. названіе корня египетскаго р. С. ароидей. (5). Троп. Азія. Теплич. и оранж. трав. рр. съ клубневымъ корнемъ. Торф. съ глин. дерн. Дѣленіемъ Темп. лѣтомъ 13—22°, зимой 8—10°; виды оранж. не требуютъ такой теплоты.

**К. антикорумъ** (*C. anticorum*, древній). Остиндія. Разводится вь Юни. Европѣ. Цв. чехолъ зеленый, лл. овальные, щитовидные и сердцевидные. 2 ф. **К. индіка** (*C. indica*, индійская). Сандвич. о. Цв. чехлы коричневатые, лл. овальные, двуразрѣнные у основанія. 5 ф. Сип. **Арумъ индікумъ** (*Arum indicum*). **К. одората** (*C. odorata*, душистая). Перу. Цв. чехолъ бѣлый, лл. сердцевидные длинной вь 3 ф. **К. эскулента** (*C. esculenta*, съѣдобная). Сандвич. о. Цв. чехолъ бѣловатый; лл. щитовидно-

сердцевидные. 2 ф. Клубни употребляются вь пищу и потому р. разводится вь тропич. странахъ вь большомъ размѣрѣ. Сип. *Калладіумъ эскулентумъ* (*Caladium esculentum*).

**КОЛОКОЛЬЧИКИ**. См. Кампанула.

**КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЯ** рр. (campanulaceae). Многочисленное семейство травянистыхъ или полукустарныхъ рр. Цвѣтки голубые или бѣлые съ правильнымъ колокольчатымъ, обычно пятилопастнымъ вѣнчикомъ. Листья очерченные, безъ прилистниковъ. Наиболѣе извѣстенъ родъ Кампанула; изъ прочихъ сюда относятся Аденфора, Азіоне и Фитевма.

**КОЛОСОВЪ ПАХУЧІЙ**. См. Антокантумъ.

**КОЛОСЪ**. Цвѣторасположеніе, вь которомъ цвѣты сидятъ и размѣщены вдоль неразвѣтвляющейся оси.

**КОЛПАКИ** стеклянные. Употребляются вь мѣстахъ съ умѣреннымъ климатомъ для охраненія молодыхъ сѣмянныхъ веходовъ и растений отъ холода и непогоды.

**КОЛПАЧЕКЪ**. Шапочка, которая покрываетъ плодоемѣстїище у мховъ.

**КОЛЮБРИНА** (*Colubrina*). *Coluber* змѣя, по свѣтлымъ нитямъ. С. крупновыхъ. (10) Троп. Азія, Америка, Полинезія. Тепл. куст. рр. Глин. дерн. съ торф. Черенками изъ молодого роста, вь песокъ, подь стекломъ. Темп. лѣтомъ 13—22, зимой 8—10°.

**К. азіатикъ** (*C. asiatica*, азіатская). Пейлонъ. Цв. блѣдно-желтые, вь июль. 12 ф. **К. кубенсисъ** (*C. cubensis*, съ о. Кубы) Куба. Цв. малиновые. 5 ф.

**КОЛЮМЕЛЛЕВЫЯ** рр. (*Columellinae*). Кустарныя или низко-древесныя раст. съ остающимися листомъ. Все семейство состоитъ изъ одного рода—Колумеллія. Вѣнчикъ пятилопастный, распростертый, къ короткой трубкѣ его приросла 2 тычинки. Листья супротивные, зубчатые, безприлистниковые.

**КОЛЮМЕЛЛІЯ** (*Columellia*). Вь честь древняго писателя о земледѣліи *Колумеллы* (Junius Moderatus Columella), жившаго вь началѣ христіанской эры. С. колумелловыхъ. Оранж. куст. р. Смѣсь изъ глин. дерн. съ торф., листов. и пескомъ. Черенками изъ полу-зрѣлого роста, вь песокъ, подь стекломъ.

**К. облонга** (*C. oblonga*, продолговатая). Анды вь Перу и Эквадорѣ. Цв. желтые. 20 ф.

**КОЛЮМНЕА** (*Columnea*). *Колумна* (Fabius Columna), правитель Fabio Colonna, итальянскій ботаникъ XVII ст. С. геснеріевыхъ. (60). Троп. Америка. Тепл. кустарныя и цѣпкія рр. Торф. съ глин.



дерн., древ. углемъ и гиплудсками. Черенками въ песокъ и теплѣ, подь стекломъ. Темп. лѣтомъ 13—24, зимой 6—10°.

**К. аурантиака** (*C. aurantiaca*, оранжевая). Нов. Гренада. Цв. темно и ярко-оранжевые, въ июль. **К. аурео-нигенс** (*C. auro-nitens*, блестящая золотистая). Колумбія. Цв. красно-оранжевые, въ сентябрь. **К. Кальбрейеріана** (*C. Kalbreyeriana*, Кальбрейера). Цв. желтые, въ февраль. **К. эритрофея** (*C. erythrophæa*, ярко-красная). Мексика. Цв. крупные, ярко-красные, въ ноябрь.

**КОЛЮРИЯ** (*Coluria*). *Kolouros*—безхвостый, по сѣменамъ. С. розовыхъ (1). Сибирь. Вынос. травяни. многол. Глин. дерн. съ торф. Дѣленіемъ.

**К. потенциаллоидес** (*C. potentilloides*, похожая на Потентиллу). Цв. оранжевые, въ июль. 6 д. до 1 ф.

**КОЛЮТЕА** (*Colutea*). *Koluto*—отрѣзать, р. умираетъ (будто-бы), если отрѣзаны его вѣтви; по другимъ—подь этимъ названіемъ упоминается какое-то р. Теофрастомъ. С. бобовыхъ (3—6) Сред. и юж. Европа. Кустарникъ воздушн. пр. съ быстрымъ развитіемъ. Обыкновенная. Черенками въ песчаной землѣ осенью.

**К. арборесценс** (*C. arborescens*, древесная). *Пузырникъ*. Сред. и Южн. Европа. Цв. желтые, въ июль до августа. 6—10 ф. Растетъ у кратера Везувія, гдѣ не встрѣчается болѣе другихъ пр. **К. круента** (*C. cruenta*, кровавая). южн. Европа. Левантъ. Цв. желто-красные, лѣтомъ. 4—6 ф.

**КОЛЪ**. Короткій шесть, заостренный съ одного конца.

**КОЛЫШЕКЪ**. Небольшой колъ.

**КОЛЪБРЮКІЯ** (*Colebrookia*). *Колъбрукъ* (Н. Т. Colebrooke)—ботаникъ. С. губоцвѣтныхъ. (2). Гималай. Волокн. глин. дерн. съ песчан. торф. Черенками изъ полурѣзлаго роста въ апрѣль—маѣ, въ песокъ, подь стекломъ. Темп. зимой 4—6°.

**К. опозитифолія** (*C. oppositifolia*, съ супротивными лл.). Непаль. Цв. бѣлые. 3 ф. **К. тернифолія** (*C. ternifolia*, съ тройчатыми лл.). Остиндія. Цв. бѣлые. 3 ф.

**КОЛДЕНІЯ** (*Coldenia*). *Колденъ* (Convallades Colden)—сѣверо-американскій ботаникъ. С. бурачниковыхъ. Тепл. однол. пр., изъ стараго и новаго свѣта. Легкая, сильная. Сѣменами въ парникѣ; затѣмъ пр. содержатся въ оранжереѣ.

**К. прокумбенс** (*C. procumbens*, лежачая). Индія. Цв. бѣлые, въ июль.

**КОЛЪКЪНІЯ** (*Colquhounia*). Робертъ *Колъкунъ* (Colquhoun)—былъ резидентомъ въ Кумаонѣ. С. губоцвѣтныхъ. (4). Гималай, Бурма. Цвѣткіи оранж. куст. пр. Легкая, сильная, изъ глинистой, ли-

стовой и песку по ровну. Черенками изъ молодого роста, подь стекломъ, лѣтомъ.

**К. кокцинея** (*C. coccinea*, шарлаховая). Непаль. Цв. шарлаховые, въ сентябрь. **К. томентоза** (*C. tomentosa*, пушистая). Непаль. Цв. яркіе красно-оранжевые. Высокоцвѣтущій кустъ.

**КОЛЪЛИНСІЯ** (*Collinsia*). *Захей Коллинсъ* (Zascheus Collins)—одинъ изъ вице-президентовъ филadelphійской академіи естественныхъ наукъ. С. поричиновыхъ. (12). Сѣв. Америка. Воздушн. однол. Садовая. Сѣменами въ мартѣ—апрѣлѣ.

**К. биколоръ** (*C. bicolor*, двуцвѣтная). Калифорнія. Цв. большіе, верх. губа бѣлая, нижн. розово-пурпуровая, въ августѣ. 1 ф. **К. верна** (*C. verna*, весенняя). Вост. Соед. Шт. Цв. бѣлые, нижн. губа голубая, въ маѣ. 1 ф. **К. грандифлора** (*C. grandiflora*, крупноцвѣтная). Колумбія. Цв. свѣтло-пурпуровые, верх. губа голубая; съ мал до июля. 1 ф.

**КОЛЪЛИНСОНІЯ** (*Collinsonia*). *Петеръ Коллинсонъ* (Peter Collinson)—другъ и сотрудникъ Линнея. С. губоцвѣтныхъ. (6). Сѣв. Америка. Воздушн. многолѣтн. пр. Обыкновен. Дѣленіемъ.

**К. анисата** (*C. anisata*, съ запахомъ аниса). Южн. Соед. Штаты. Цв. блѣдно-желтые, въ августѣ. 2—3 ф. Сохранять зиму въ защитѣ отъ мороза.

**КОЛЪЛОМІЯ** (*Collomia*). *Колла*—клей; сѣмена покрыты липкою слизью. С. синюшныхъ. (12) Западн. часть С. Америки. Возд. однол. Садовая. Сѣменами весной.

**К. грандифлора** (*C. grandiflora*, крупноцвѣтная). С.-З. Америка. Цв. красно-оранжевые, въ июль до октября. 1½—2 ф. **К. кокцинея** (*C. coccinea*, красно-шарлаховая). Чили. Цв. темно-красные, въ июль до октября. 1—1½ ф. Снн. *К. Каваниллезіи* (*C. Cavanillesii*).

**КОЛЪРАВИ**. См. Брассика.

**КОЛЬХИКУМЪ** (*Colchicum*). По *Колхидѣ*—мѣстѣ родины р. С. лилейныхъ. (30). Европа, Азія, Сѣв. Америка. Осенній или ранній весенній луков.—клубнев. пр. Легкая, песчан. глинисто-дерн., добренная перегноемъ, пѣск. влажная. Сѣменами или клубн. луковицами. Не должно вынимать пр. изъ земли, пока не завяли совершенно листья.

**К. аутомнале** (*C. autumnale*, осенній). Европа. Цв. пурпуровые на длинныхъ трубкахъ, осенью. 4 д. Имѣетъ очень много разновидностей съ простыми и махровыми, различно окрашенными цв. **К. бивонѣ** (*C. Bivonae*, Бивона). Южн. Европа. Цв. пестрые, бѣлые съ пурпуровымъ, осенью. **К. би-**

**пантикумъ** (*C. byzanticum*, византийскій). Левантъ. Цв. розовые, осенью. 3—4 д. **К. лютеемъ** (*C. luteum*, желтый). Афганистанъ, Кашмиръ. Цв. желтые, весной. **К. монтанумъ** (*C. montanum*, горный). Средиземное побережье. Цв. лилово-пурпуровые или почти бѣлые, весной рано. 3—4 д. Снн. *К. бульбодододесъ* (*C. bulbocodioides*) **К. Паркинсона** (*C. Parkinsoni*, Паркинсона). Греч. архип. Цв. бѣлые съ пурпуров. черточками, осенью.

**КОЛЬЧАТЫЙ**. Расположенный кольцами; имѣющий видъ кольца.

**КОЛѢНО**. Суставъ. Мѣсто соединенія звеньевъ.

**КОМАРУМЪ** (*Comarum*). *Комаросъ*—Арбутусъ, по сходству плодовъ. С. розовыхъ. Воздушн. многол. трав. Всякая. Дѣленіемъ корня.

**К. палюстре** (*C. palustre*, болотный). *Рябинникъ*. Сѣв. полушаріе. Цв. темно-малиновые, въ июль. 1—1½ ф. Снн. *Потентилла Комарумъ* (*Potentilla Comarum*). Имѣетъ пестролистную разновидность.

**КОМАРОПСИСЪ** (*Comaropsis*). *Комарумъ* (*Comarum*)—рябинникъ и *opsis*—схожесть. С. розовыхъ. Родъ этотъ (изъ 5-ти видовъ) слить теперь съ Вольдштейніей. Сѣв. Америка. Многол. воздушн. Обыкновен. Сѣменами и дѣленіемъ.

**КОМАРОСТАФИЛИСЪ** (*Comarostaphylis*). *Комаросъ*—*Arbutus* и *staphyle*—гроздь, по гроздевиднымъ плодамъ. С. вересковыхъ. Въ настоящее время родъ этотъ слить съ *Arctostaphylos* (Арктостифиліосъ). Оранж. куст. пр. Глин. дерн. съ торф. Сѣменами, черенками подь стекломъ въ началѣ осени и прививкой на *Arbutus*, весной.

**К. арбутодесъ** (*C. arbutoides*, похожій на Арбутусъ). Гватемала. Цв. бѣлые, въ маѣ. 6 ф.

**КОМБРЕТОВЫЯ** или **МЛЕКОСНѢЖИКОВЫЯ** пр. (*Combretaceae*). Довольно многочисленное сем. изъ древесныхъ или кустарниковъ, иногда цвѣтляющихся, рѣдко пѣстистыхъ пр. Цвѣты въ угловыхъ или макушечныхъ кистяхъ или колоскахъ. Листья очередные или супротивные, рѣдко кольчатые, цѣльные, безъ прилистниковъ. Къ сем. этому принадлежатъ болѣе 240 видовъ; наиболѣе извѣстные роды—Квискавильс, Комбретумъ и Терминалія.

**КОМБРЕТУМЪ** (*Combretum*). Название данное Плиніемъ какому-то р. С. комбретовыхъ. (120). Троп. Азія, Африка, Америка, Австралія. Тепл. цвѣткіи пр. и пѣк куст. Пѣск. торф. съ глин. дерн. и небольшимъ колич. древ. угля и черенковъ. Черенками съ частицей коры, въ пѣскѣ,

въ развод. парникѣ. Темп. лѣтомъ 13—26, зимой 8—13°.

**К. грандифлорумъ** (*C. grandiflorum*, крупноцвѣтный). Сиерра-Леоне. Цв. шарлаховые, крупные, въ маѣ—июль. Снн. *К. Афзелии* (*C. Afzelii*). Тринидадъ. Цв. красные или желтые, большіе, въ маѣ. **К. рацемозумъ** (*C. racemosum*, вѣтвистый). З. берегъ Африки. Цв. бѣлые, съ февралю до июля. **К. элеганс** (*C. elegans*, изящный). Бразилія. Цв. желтые, въ маѣ.

**КОМЕЛЬ**. Нижний конецъ растения. Толстый конецъ бревна.

**КОМЕСПЕРМА** (*Comesperma*). *Коме*—волость и *sperma*—сѣмя, по сѣменамъ съ волосками С. листовыхъ. (25). Оранж. полукуст. или куст. пр. изъ Австраліи. Пѣск. торф. съ глин. дерн. Черенками изъ молодого роста, подь стекломъ, въ песокъ и теплѣ. Темп. лѣтомъ 10—21, зимой 3—6°.

**К. волюбилис** (*C. volubilis*, вьющаяся). Цв. многочисленные, крылья голубыя, лоды пурпуровая, въ апрѣлѣ. Снн. *К. грацилис* (*C. gracilis*).

**КОММЕЛИНА** (*Commelina*). Каспаръ и Іоганъ *Коммелинъ* (Commelin)—голландскіе ботаники. С. коммелиновыхъ. (90). Азія, Африка, Америка, Австралія. Тепл. оранж. и полу-вынос. клубневый пр. Легкая и сильная. Черенками, въ песокъ и маломъ теплѣ. Полу-вынос. клубневый высаживаются на зиму и сберегаются какъ георгины, но не просушиваются сильно.

**К. виргиника** (*C. virginica*, виргинская). Юж. Соед. Шт. Цв. голубые, лѣтомъ. Вынос. Разновидность съ узкими лл. назыв. *К. ангустифолія* (*C. angustifolia*). **К. цѣлестисъ** (*C. coelestis*, лазуревая). Цв. голубые, въ июль. Многол. полувып. **К. эллиптика** (*C. elliptica*, эллиптическая). Лима. Цв. бѣлые, въ июль. 1½—2 ф. Оранж. оранж.

**КОММЕЛИНОВЫЯ** пр. (*Commelinaceae*). Многочисленное и широко-распространенное по земной поверхности семейство травянистыхъ раст., встречаемъ преимущ. въ жаркомъ поясѣ. Наружный и внутренній цвѣточ. покровъ изъ 3 сегментовъ каждый. Листья плоскіе, обычно объемлющіе стебель. Сюда принадлежатъ болѣе 300 видовъ, а изъ родовъ, между прочимъ, Коммелина и Традесканція.

**КОМНАТНЫЯ** пр. Содержимыя круглый годъ въ комнатахъ.

**КОМОКЛАДІЯ** (*Comocladia*). *Коме*—волость, *klados*—вѣтка; лл. собраны по концамъ вѣтвей. С. сердечниковыхъ. (9). Троп. Америка, Вестиндія.



Тепличн. древ. рр. Глин. дерн. съ торф. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ песокъ, въ развод. парникъ.

**К. интегрифолия** (*C. integrifolia*, цѣльнолистная). Ямайка, дл. длиной до 2 ф. съ ланцетовидными и гладкими листиками. 10—30 ф.

**КОМПАРЕТТИЯ** (*Comparetia*). Андреасъ *Компаратти* (*Comparetti*) былъ профессоромъ въ падуанскомъ университетѣ. С. орхидей. (2). Южн. Америка на Андскихъ горахъ. Тепличн. эпифиты. Волокн. торф. съ торфяникомъ и черепками. Дѣленіемъ и отпрысками. Темп. лѣтомъ 13—25, зимой 8—10°.

**К. кокцинея** (*C. coccinea*, красно-шарлаховая). Бразилія. Цв. ярко-красные, въ ноябрѣ. 1 ф. **К. микроплектронъ** (*C. microplectron*, съ длинною пипорцей). Новая Гренада. Цв. блѣдно-розовые. **К. розеа** (*C. rosea*, розовая). Бразилія. Цв. мелкіе, розовые, въ маѣ. 3 д. **К. фальката** (*C. falcata*, косообразная). Колумбія. Цв. ярко-пурпуровые, въ маѣ. 6 д.

**КОМПОСТЬ**. Всякая смѣсь различныхъ земель или удобреній для горшечныхъ или воздушныхъ растений. Чистое удобреніе можетъ быть настолько сильно, что въ состояніи повредить растенію; смѣшанное съ землей оказываетъ благотворное вліяніе; раннимъ образомъ одной какой либо родъ земли въ чистомъ состояніи не приносить пользы, въ смѣси же дѣлается соответствующимъ потребности р. Отъ всякого количества требуется, чтобы онъ былъ хорошо смѣшанъ, чтобы не былъ очень сухъ, ни слишкомъ влаженъ, — не сплился-бы. Листовая земля, перегнившая исподволь, напр. изъ лѣсу, входитъ существенно частью въ компосты. Для оранжерейныхъ рр. съ плотной древесной идеть дерновая земля, смѣшанная съ пескомъ и безъ удобрения. Для молодыхъ рр. дается болѣе легкая земля, чѣмъ для взрослыхъ и старыхъ. Соответствующій составъ земли приводится при описаніи растеній.

**КОМПОТОНІЯ** (*Comptonia*). Генри *Комптонъ* (*Compton*), — епископъ лондонскій, любитель и покровитель садоводства. С. восковниковыхъ. (1). Сѣв. Америка. Торф. Отводками осенью.

**К. аспленифолія** (*C. asplenifolia*, съ лл. асплениума). Цв. бѣловатые, въ мартѣ—апрѣлѣ. 3—4 ф.

**КОМЪ**. Въ садоводствѣ имѣетъ совершенно обратное значеніе тому, что подъ этимъ названіемъ разумѣется въ просторѣчій. Тамъ — это крона, здѣсь же масса земли облегающая корни. У растений съ мочковатыми корнями (напр. рододендро-

новъ) комъ особенно осторожно вынимается изъ горшка при пересадкѣ.

**КОНАНДРОНЪ** (*Conandron*). *Конос* — конусъ и *андрон* — мужчина, пыльникъ; придатки пыльниковъ образуютъ вокругъ столбика конусъ. С. геснерійныхъ. (1). Японія. Полувыноса, или оранж. многол. трав. р. Песч. дерновая съ торф. Сѣменами и дѣленіемъ.

**К. рамондидея** (*C. ramondioides*, похожий на Рамондію). Японія. Цв. бѣлые или розовые съ пурпуровымъ глазкомъ, лѣтомъ. 6 д.

**КОНАНТЕРА** (*Conanthera*). *Конос* — конусъ и *антера* — пыльникъ; 6 пыльниковъ въ началѣ развитія цв. образуютъ конусъ. С. лилейныхъ. (4). Чили. Полувыноса. Луковичн. рр. довольно трудно сохраняемая зимою. Песчан. дерн. Отпрысками и сѣменами.

**К. кампанулата** (*C. campanulata*, колокольчатая). Чили. Цв. голубые, въ апрѣлѣ. 1 ф. Сип. *Кунинія кампанулата* (*Cunilingia campanulata*).

**КОНВАЛЬЯРІЯ** (*Convallaria*). *Convallis* — долина и *rica* — покровъ, по сплошному покрову, образуемому лл. С. лилейныхъ. (1). Европа, Азія, Сѣв. Америка. Обыкн. Дѣленіемъ. Затѣненное положеніе.

**К. майялис** (*C. majalis*, майская). Ландышъ. Цв. бѣлые, пахучіе, весной. 6 д.—1 ф. Употребляется для ранней выгонки въ цвѣтѣ.

**КОНВОЛЬВУЛОСЬ** (*Convolvulus*). *Convolv* — обвивать, по характеру роста. С. вьюнковыхъ. (150). Жаркія страны. Однол. или многол., распростертыя, вьющіеся или приморослыя травяни., либо полукуст. рр. Нѣжныя виды въ смѣси торф., листов. и глин. дерн. Сѣменами и черенками, весной; выноса. однолѣтн. сѣменами на хвѣстъ; выноса. многол. — сѣменами весной или дѣленіемъ.

**К. альтеойдея** (*C. althaeoides*, похожий на Алтею). Юж. Евр. Воздуш. многол. трав. Цв. блѣдно-красные или лиловые, въ іюнѣ. 2 ф. **К. италікусъ** (*C. italicus*, италіанскій). Китай. Полувын. Цв. красновато-пурпуровые, въ іюлѣ. 3 ф. Сип. **К. бріоніефоліусъ** (*C. bryoniaefolius*). **К. кантабрикусъ** (*C. cantabricus*, кантабріскій). Юж. Европа. Выноса. многол. Цв. блѣдно-красные, въ авг. Отъ 6 д. до 1 ф. **К. кнеорумъ** (*C. Saeonum*, Кнеорумъ). Ю. Европа. Полувыноса. куст. Цв. свѣтло-малиновые, въ маѣ. 1—3 ф. **К. линейтусъ** (*C. linearis*, полосчатый). Юж. Европа. Выноса. Цв. блѣдные красновато-пурпуровые, въ іюнѣ. 6 д. **К. мауританикусъ** (*C. mauritanicus*, мавританскій). С. Африка. Оранж. Цв. голубые съ желтымъ горлышкомъ, лѣтомъ.

**К. оцеллатусъ** (*C. ocellatus*, съ глазкомъ). Ю. Африка. Тепл. Цв. бѣлые съ темнымъ красно-пурпуровымъ глазкомъ, въ августѣ. 1½ ф. **К. павифоліусъ** (*C. pavifolius*, густо-лиственный). Канарскіе о. Оранж. куст. Цв. свѣтло-фіолетовые, въ августѣ. 15 ф. **К. скаммонія** (*C. Scammonia*, Скаммонія). Левантъ. Полу-выноса. Цв. бѣлые, въ іюлѣ. Р. цѣльное. **К. триколоръ** (*C. tricolor*, трехцвѣтный). Ю.-З. Европа. Выноса. однол. Цв. довольно крупные съ желтымъ горлышкомъ, голубымъ краемъ и остальнымъ бѣлымъ, въ іюлѣ до сентября. Имѣетъ нѣсколько разновидностей, отличающихся окраскою цв. **К. хиненіусъ** (*C. chinensis*, китайскій). Китай. Выноса. многол. Цв. малиново-пурпуровые, съ желтымъ звѣномъ въ видѣ звѣзды, обведенной пурпуровымъ, въ іюлѣ. 2—3 ф. **К. эрубесценсъ** (*C. erubescens*, красноватый). Австралія, Оранж. двулѣт. Цв. красно-малиновые, съ іюля до сентября. 5 ф.

**КОНИДІЙ**. Клыточка на концѣ гифы гриба, служащая для размноженія (безполового) этихъ рр.

**КОНІУМЪ** (*Conium*). *Конао* — кружить, — по головокруженію, которые производятъ лл., если ихъ жевать. С. зонтичныхъ (3). Европа, Азія, Африка. Въ садахъ не употребляются. **К. макулумъ** (*C. maculatum*, пятнистый, Болголовъ) долгое время применялся въ медицинѣ.

**КОННАРАЦОВІЯ** рр. (*Connaraeae*). Древесныя или кустарныя рр., близкія къ бобовымъ, но съ правильными цвѣтами. Цвѣты маленькіе, угловыми или макушечными кистями или метелками. Листья очередные, обычно перистые, съ прилистниками. Наиболѣе извѣстенъ родъ *Коннарусъ*.

**КОННАРУСЪ** (*Connarus*). *Коннаросъ* — какое-то дерево, упоминаемое Атеиемъ. С. коннарацовыхъ. (54). Троп. Азія, Африка, Америка, о. Южн. Океана. Тепл. кустар. Смѣсь глин. дерн. съ торф. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ апрѣлѣ, въ песокъ, въ развод. парникъ. Темп. лѣтомъ 13—21, зимой 8—10°.

**К. губесценсъ** (*C. pubescens*, пушистый). Франц. Гвіана. Цв. бѣлые, душистые. 5 ф. Сип. *Роберія фрутесценсъ* (*Robergia frutescens*).

**КОНОКАРПУСЪ** (*Conocarpus*). *Конос* — шишка и *карпосъ* — плодъ; по плодамъ въ видѣ шишекъ. С. комбретовыхъ. (1). Троп. Америка. Тепл. куст. Уходъ такой же, какъ за *Коннарусъ*.

**К. эрѣтусъ** (*C. erectus*, приморослый). Тропич. Америка. Цв. бѣлые. 6—8 ф.

**КОНОПЛЯ**. См. Копнабистъ.

**КОНОСПЕРМУМЪ** (*Conosper-*

*mum*). *Конос* — конусъ и *sperma* — сѣмя; плодники расположены тѣсно, образуя конусъ. С. протейныхъ. (34). Австралія. Виды этого рода почти никогда не встрѣчаются въ садахъ.

**КОНОСТЕГІЯ** (*Conostegia*). *Конос* — конусъ и *steges* — покрывка; коническая колпачкообразная чашечка опадаетъ цѣлою. С. черноустовыхъ. Тепл. древ. или куст. рр. Глин. дерн. съ торф. Черенками изъ зрѣлаго роста, концы которыхъ просушить. Темп. лѣтомъ 13—22, зимой 8—10°.

**К. Вальбизіана** (*C. Balbisiana*, Вальбиза). Цыпкій куст. съ овальными и тупыми лл. Ямайка. Цв. бѣлые, въ маѣ. 20 ф. **К. процера** (*C. procera*, высокая). Ямайка. Цв. розовые или бѣлые, большіе. 25 ф.

**КОНОСТЕФІУМЪ** (*Conostephium*). *Конос* — конусъ, *stephos* — вѣнчикъ; по расположенію цвѣтовъ. С. энкарписовыхъ. Оранж. оранж. куст. Торф. съ песчан. дерновой. Черенками изъ молодого роста, въ апрѣлѣ, въ песокъ.

**К. пендулюмъ** (*C. pendulum*, повислый). З. Австралія. Цв. красные, въ апрѣлѣ 6—18 д.

**КОНСКІЙ НАВОЗЪ**. Специально употребляется при разведеніи шампиньоновъ; онъ имѣетъ большое значеніе при набивкѣ парниковъ, какъ вещество сильно нагрѣвающееся, въ удобреніи тяжелой почвы, какъ способствующее и нагрѣванію и разрыхленію. Собирая навозъ не должно допускать его ни до засыханія, ни до гортня (сильнаго нагрѣванія), послѣ котораго онъ высыхаетъ и уже теряетъ амонакальные соединенія, дѣлающія его полезнымъ удобреніемъ.

**КОНОТИТУЦІЯ**. Устройство, образованіе строенія растенія, степень его плотности или выносливости.

**КООКІЯ**. См. Кукія.

**КООПЕРІЯ**. См. Куперія.

**КОПАЙФЕРА** (*Copaifera*). *Сорайба* — бразильское названіе бальзама, даваемого этими дер. и *fero* — нести. С. бобовыхъ. (12). Троп. Африка и Америка. Теплич. дер. Песчан. дерн. Черенками изъ созрѣлаго роста, въ песокъ, въ развод. парн. Темп. лѣтомъ 13—21, зимой 8—12°.

**К. официналис** (*C. officinalis*, аптечная). Юж. Америка, Вестиндія. Цв. бѣлые. 20 ф. Сип. *К. Жакви* (*C. Jacquinii*).

**КОПАНЬЕ**. **КОПКА**. При смѣшаніи съ удобреніемъ производится лучше, когда земля суха, но для разрыхленія, — смѣшанія съ воздухомъ, болѣе благоприятна, когда земля нѣсколько влажна, вѣзка. При копаніи слой вскапыванія долженъ быть одной толщины на всемъ пространствѣ: заступъ углубляется весь въ землю,



потомъ комъ съ нимъ переворачивается такъ, чтобы нижняя его часть была наверху. Мѣсто, находившееся подъ растеніемъ лѣтомъ, лучше перекапывать осенью съ прибавленіемъ удобренія; земля при этомъ не разбивается, и кладется пластомъ, чтобы ее разрыхлило морозомъ и она пропиталась бы воздухомъ. Въ тяжелой почвѣ первая копка не должна быть глубже 9 дюймовъ, въ противномъ случаѣ нижняя часть пласта останется безъ измѣненія; въ такой почвѣ копка удобнѣе когда земля просохла, но никогда не должно копаться мерзлую или съ напавшимъ снѣгомъ. Легкую землю или съ песчаную подпочву можно копаться во всякое время. Землекопъ долженъ при копаніи стоять прямо и всаживать заступъ вертикально, выворачивая землю впередъ.

Глубокая перекопка производитъ роленіемъ; сперва вырывается ровной глубины и въ прямомъ направленіи ровъ, земля изъ него выбрасывается въ сторону, рядомъ съ этимъ ровомъ роется такой-же глубины и длины, и земля изъ него кладется въ первый, пустой, ровъ; рядомъ со вторымъ роется третій и т. д., наконецъ въ послѣдній ровъ сваливается земля изъ первого.

**КОПЕРНИЦА** (*Copernicia*). *Copernicia* (*Copernicus*)—знаменитый астрономъ. С. пальмъ. (8). Вестиндія. Новая Гренада. Тепл. пальмы. Сильная песчанисто-глин. дерн. Сѣменами.

**К. церифера** (*C. cerifera*), производящая воскъ). Бразилія. Молодые лл. покрыты воскомъ, который отстаетъ, когда лл. отрываются. Стволъ содержитъ саго.

**КОПОРКА**. Малый качанъ (вылохъ) капусты.

**КОПРОСМА** (*Coprosma*). *Coprosma*—каль и *oste*—запахъ. С. мареновыхъ (35). Нов. Зеландія. Сандвичевы остр., Австралія. Оранж. куст. рр., производящія караллово-красные плоды. Сильныя песчан. Черенками съ вызрѣвшимъ ростомъ или отводкой.

**К. Вауеріана пиктурата** (*C. Bauegiana picturata*, расписная Вауера). Нов. Зеландія. Лл. овальные, тупо-округлые. Спн. *К. Стокки* (*C. Stockii*). **К. В. варіегата** (*C. B. variegata*, К. В. пестрая). Нов. Зеландія. Лл. по краямъ пестрые.

**КОПСІЯ** (*Kopsia*). Явлъ *Kopsa* (Корс)—проф. въ Утрехтѣ. † 1849. С. кутровыхъ (4). Малайскій полуостр. и архип. Тепл. куст. или древесн. рр. Глин. дерн. съ песков. торф. Черенками изъ довольно твердаго роста, въ песокъ, въ парникъ.

**К. фрутикоза** (*K. fruticosa*, кустарная). Перу. Цв. красные, въ маѣ. куст.

**КОПТИСЪ** (*Coptis*). *Coptis*—рѣзать,

по разрѣзаннымъ лл. С. лютиковыхъ (6). Сѣв. умѣрен. страны. Болотн. рр. растущія во влажн. торф. или песчанистой землѣ. Сѣменами или дѣленіемъ корней.

**К. окциденталис** (*C. occidentalis*, западный). Скалистые горы. Цв. бѣлые. 6 д. до 1 ф. **К. ориенталис** (*C. orientalis*, восточный). Японія. Цв. бѣлые. 3 до 9 д. **К. трифолія** (*C. trifolia*, трехлиственный). С. полушаріе. Цв. бѣлые, мелкіе. 3—5 д.

**КОПУЛИРОВАТЬ**. Прививать пасадою, безъ ращена: сучекъ срѣзывается пакося, а пригнанный по нему другой насаживается и обвязывается; если при этомъ заболонь дичка соприкасается заболони пасадки, то она приростае.

**КОПЫТЕНЬ**. См. Азарумъ.

**КОРА**. Наружная оболочка дерева: у липы въ просторѣчьи называется лубомъ, у березы—берестой.

**КОРДИЛИНЕ** (*Cordylina*). *Cordylina*—клубень, по большому числу мѣстнымъ корнямъ нѣкоторыхъ видовъ. С. лилейныхъ. (10). Остиндія, Малайск. арх., Австралія, Нов. Зеландія. Тепл. и оранж. рр., напоминающія пальмы. Сѣмьѣ торф. съ глин. дерн. и растит. перегноемъ. Побѣгами, черенками въ песокъ, въ развод. парн. Въ садахъ многія Кордилины называютъ драценами, но всѣ онѣ произошли отъ К. терминалис, разводимаго подъ тропиками отъ сѣмянъ и произведшаго множество разновидностей.

**К. альбиканс** (*C. albicans*, бѣловатое). Тепл. Лл. длинныя, узкіе, ярко-зеленые съ болѣе свѣтлымъ или бѣловатымъ краемъ. **К. альбо-розеа** (*C. albo-rosea*, бѣло-розовое). Тепл. Лл. темно-зеленые съ розовыми краями, въ первое время бѣлыми. **К. амабиліс** (*C. amabilis*, красивое). Тепл. Лл. ярко-зеленые получающіе съ возрастомъ малиновыя и бѣлыя пятна. **К. амбоинензис** (*amboinensis*, изъ Амбоины). Амбоина. Тепл. Лл. продолговато-ланцетовидныя, темно-бронзовые, въ нижней части розово-пурпуровыя. **К. аустралис** (*C. australis*, южное). Нов. Зеландія. Оранж., а въ умѣр. климатъ выносливое. Цв. бѣлые; лл. ланцетовидныя съ многими параллельными жилками. Стебель 10—40 ф. **К. Баттистіи** (*C. Baptistii*, Баттисти). Тепл. Лл. зеленые съ желтыми и малиновыми краями и полосками. **К. Вейсмани (*C. Weismanni*, Вейсмана). Тепл. Лл. дов. узкіе, свѣтлаго красно-бронзоваго цвѣта съ бѣлымъ превращающимся въ темно-бронзовый, кроющъ краешъ, остающихся красными. **К. глоріоза** (*C. gloriosa*, славное). Тепл. Лл. широко-продолговатые, зеленые съ болѣе бѣлыми полосками, въ послѣдствіи дѣляющимися оранжево-бронзовыми. **К. Гуильфойдеи** (*C. Guilfoylei*, Гуильфойла). Ав-**

стралія. Тепл. Лл. зеленые, съ красными, малиновыми, желтоватыми и зелеными полосками. **К. Дюффи** (*C. Duffii*, Дюффа). Тепл. Лл. съ ярко-карминовыми полосками и краями. **К. индивиза** (*C. indivisa*, нераздѣльная). Пов. Зеландія. Оранж. Лл. широкіе, суженные къ концамъ, темно-зеленые. Имѣетъ формы *атропурпуреа* (*atropurpurea*—черно-пурпуровая) съ болѣе широкими лл. и красноватыми влагалитцами, *Вейчи* (*Veitchii*, Вейча) какъ типическая, но съ влагалитчными основаниями и сред. жилками лл. темно-краснаго цвѣта. **К. каннѣфолія** (*C. cannaefolia*, съ лл. Канн). Тепл. Лл. съ длинными черешками, темно-зеленые, вполне развитые съ темно-малиновыми крапинками и такого-же цвѣта краешъ по одной сторонѣ л. **К. Купери** (*C. Cooperi*, Купера). Тепл. Лл. какъ у К. терминалис, но темнокрасные. **К. Макартюри** (*C. Macarthuri*, Макъ-Артура). Тепл. Лл. оливково-зеленые съ карминовымъ. **К. магнифика** (*C. magnifica*, великолѣпная). Тепл. Лл. малиново-бронзовые, темнѣющіе; черешки пурпуровые. **К. металика** (*C. metallica*, металлическая). Тепл. Лл. молотые мѣдно-пурпуровые, потомъ темно-пурпуровые, бронзовые. **К. Мурейна** (*C. Mooreana*, Мура). Тепл. Лл. волнистыя, темнаго бронзово-пурпуроваго цв., черешки малиновыя. **К. нигро-рубра** (*C. nigro-rubra*, черно-красное). Тепл. Лл. линейно-ланцетовидныя съ розово-малиновою серединою. **К. орната** (*C. ornata*, украшенное). Тепл. Лл. маленькіе, темнаго бронзово-зеленаго цв. съ ровными краями. **К. пудхелля** (*C. pulchella*, красивое). Тепл. Лл. темно-бронзовые, черешки красно-малиновые; тако-же цвѣта и края лл. **К. Рексъ** (*C. Rex*,—Король). Тепл. Лл. продолговато-ланцетовидныя, бронзово-зеленые съ ярко-розовыми черточками; черешки съ пурпуровыми краями. **К. опленденсъ** (*C. splendens*, великолѣпное). Тепл. Лл. овальныя, остроколючныя, темнаго бронзово-зеленаго цвѣта; основания и черешки ярко-карминовыя. **К. терминалис** (*C. terminalis*, конечное). С. Южн. Океана. Тепл. Цв. метелками. Лл. ланцетовидныя, темно-зеленые или бронзовые съ малиновыми. 10—12 ф. Воспитывается въ троп. странахъ и образовало множество тепличныхъ формъ слышущихъ въ садахъ подъ названіемъ драценъ. **К. триумфансъ** (*C. triumphans*, торжествующее). Тепл. Лл. узкіе ланцетовидныя, темно-пурпуровые, молодые—съ розовыми краями. **К. Фразери** (*C. Fraseri*, Фразера). Тепл. Лл. черно-пурпуровые, въ нижней части съ темно-розовою полоской. **К. Чельсона (*C. Chelsoni*, изъ Чельси). Тепл. Лл. темно, почти черно-зеленые съ темно-краснымъ налетомъ, и краями того-же цвѣта. **К. экцельза** (*C. excelsa*, изящ-**

ное). Тепл. Лл. темно-бронзовые, съ краями темно-карминоваго цвѣта. **К. Юнги** (*C. Jungii*, Юнга). Тепл. Лл. молодые ярко-зеленые съ темно-красными полосками, въ послѣдствіи ярко-бронзовые.

**КОРДІА** (*Cordia*). По Эврипиусу *Кордусу* (*Cordus*), настоящее имя котораго Генрикусъ Урбанусъ, и его сына Валерія, жившихъ въ XV и XVI столѣт. С. бурачниковыхъ. (180). Жаркія страны. Тепл. и оранж. деревня и куст. Сѣмьѣ глин. дерн. съ торф. и пескомъ. вообще легкая, сильная з. Черенками въ песокъ, въ развод. парникъ. Темп. лѣтомъ 13—22, зимой 8—12°.

**К. декандра** (*C. decandra*, съ 10 тычинками). Чили. Цв. бѣлые, большіе. 3 ф. Оранж. куст. р. **К. Микса** (*C. Muxa*, Микса). Индія. Цв. бѣлые съ отвороченнымъ краемъ, 10—15. Тепл. дерево. **К. суперба** (*C. superba*, превосходная). Бразилія. Цв. бѣлые, въ сентябрѣ. Тепл. дер.

**КОРЕМА** (*Corema*). *Corema*—дрокъ, по сходству. С. водниковыхъ. (2). Ю.-З. Европа. Сѣв. Америка, Азорскіе остр. Уходъ какъ за Эмпетрумъ.

**К. альба** (*C. alba*, бѣлая). Ю.-З. Европа и Азорскіе о. Цв. бѣлые, весной. 1 ф. **К. Е. Конради** (*C. Conradii*, Конради). С. Америка и Нью-Фаундлендъ. Цв. съ пурпуровыми нитями и темно-пурпуровыми пыльниками, весной. 6—9 д.

**КОРЕНЬ**. Нисходящая ось растенія, развивающаяся изъ сѣменнаго корешка; отличается отъ стебля не только происхожденіемъ и направленіемъ, но также и тѣмъ, что развитіе его располагается безъ симметріи и на нихъ нѣтъ настоящихъ листовыхъ или цвѣточныхъ почекъ.

**КОРЕОПСИСЪ** (*Coreopsis*). *Koris*—клопъ и *opsis*—подобіе, по сѣменамъ. С. сложноцвѣтныхъ (55). С. и Ю. Америка, Троп. Африка, Сандвич. о. Однолѣтніе—сѣменами весной въ грунтъ или въ парникъ, многол.—дѣленіемъ и черенками весной или осенью. Легкая, песчанистая.

**К. аурikulата** (*C. auriculata*, ушастый). Соед. Шт. Многол. Цв. гол. желтыя съ коричнево-пурпуровымъ кольцомъ, лѣтомъ. 1—1½ ф. **К. вертикальята** (*C. verticillata*, кольчатый) Соед. Шт. Многол. Цв. гол. золотисто-желтыя, лѣтомъ. 1—2 ф. Спн. **К. тенцифолія** (*C. tencifolia*). **К. грандифлора** (*C. grandiflora*, крупноцвѣтный). Соед. Шт. Многол. Цв. головки желтыя, лѣтомъ; 3—4 ф. **К. Друмонди** (*C. Drumondii*, Друмонди). Техасъ. Однол. Цв. головки желтыя, лѣтомъ. 1 ф. Спн. **К. диверсифолія** (*C. diversifolia*). **К. ланцеолатая** (*C. lanceolata*, ланцетовидный). С. Америка. Многол. Цв. головки ярко-жел-



тыя, лѣтомъ 1—3 ф. **К. тинкторія** (*C. tinctoria*, красильный). Соед. Штаты. Однол. Цв. головки желтыя, съ коричнево-пурпуровымъ кольцомъ у основанія. 2 ф. Имѣетъ много разновидностей, обильно употребляемыхъ въ садахъ.

**КОРЕТРОСТИЛИСЬ** (*Coretrostylis*). *Coretron*—дрокъ и *stylis*—столбикъ. С. стеркулиевыхъ (8). Австралія. Оранж. куст. рр. Песч. торф. съ дрв. углемъ. Черенками изъ молодого роста, въ песокъ, подъ стекломъ. Темп. лѣтомъ 10—13, зимой 3—8°.

**К. брактѣата** (*C. bracteata*, съ прицвѣтниками). Цв. розовые, въ апрѣлѣ, 3 ф.

**КОРЕШОЕЪ. КОРЕШОЧИЕЪ.** Часть проросшаго зародыша сѣмени, изъ которой впоследствии образуется корень.

**КОРЖА СЛАДКАЯ.** Поздній сортъ яблокъ среднихъ размѣровъ, выносящій продолжительную лежку. Кожица желтоватая, шероховатая (коржавая), вкусъ кисловатый.

**КОРИДАЛИСЬ** (*Corydalis*). *Korydalis*—жаворонокъ; шпорецъ цв. походить на шпору жаворонка. С. дымянокъ. (70). Европа, Азія, Африка. Америка. Выносл. одно-, дву- и многол. трав. рр. Сѣменами и дѣленіемъ.

**К. брактѣата** (*C. bracteata*, съ прицвѣтниками). Сибирь. Цв. сѣрно-желтые, въ маѣ—іюнь. 9 д. Многол. **К. Колпаковскіана** (*C. Kolpakowskiana*, Колпаковскаго). Туркестанъ. Цв. пурпуровые или малиновые, 6 д. Многол. **К. кава** (*C. cava*, съ дуплястымъ корнемъ). *Холаманъ*. Европа. Цв. пурпуровые, въ маѣ. 6 д. Многол. **К. лютеа** (*C. lutea*, желтый). Европа. Цв. желтые, въ маѣ. 1 ф. Многол. **К. нобилис** (*C. nobilis*, благородный). Сибирь. Цв. свѣтло-желтые съ зелеными кончиками, въ маѣ. 9 д. Многол. **К. Семеновіи** (*C. Semenovii*, Семенова). Туркестанъ. Цв. темно-желтые, въ апрѣлѣ—маѣ. 1—1½ ф. Многол. **К. солида** (*C. solida*, плотный). *Кокорикъ*. Европа. Цв. пурпуровые, крупные. 6 д. Многол. Сип. **К. булбоза** (*C. bulbosa*).

**КОРИЗАНТЕСЬ** (*Corysanthes*). *Korys*—шлемъ и *anthos*. цв. С. орхидей. (15). Малайск. архип., Австралія, Нов. Зеландія. Оранж. земная орхидей. Глин. дерн. съ пескомъ. Дѣленіемъ.

**К. пикта** (*C. picta*, расписная). Ява. Цв. желто-пурпуровые съ желтымъ. 3—4 д.

**КОРИДОПСИСЬ** (*Corylopsis*). *Korylos*—лѣщина и *opsis*—похожесть. С. двоелистниковыхъ. (4). Китай, Японія, Гималай. Оранж. кустар. рр. очень похожія на нашу лѣщину. Уходъ какъ за Гамамелисъ.

**К. спиката** (*C. spicata*, колосчатый). Японія. Цв. блѣдно-желтые, пахучіе, въ февралѣ. 3—4 ф.)

**КОРИЛЮСЬ** (*Corylus*). *Korys*—шлемъ, покровъ; по чашечкѣ покрывающей плодъ. Низкія деревья или высокія кустарн. рр. Сем. орѣшниковыхъ. (7). Европа, Азія, С. Америка. Легкая глин. дерновая. Сѣменами, отводками, черенками, а сортовые—прививкой.

**К. Авелляна** (*C. Avellana*, изъ Авеллино). *Лещина. Лесной орѣхъ*. Европа, С. Америка. Цв. мужскіе—сѣровато-зеленые, женскіе—красно-малиновые, въ апрѣлѣ. Плодъ свѣтло-коричневый, въ октябрѣ. Обертка плода колокольчатая, съ разорванными краями. **К. Колурна** (*C. Colurna*). *Константиннопольская лѣщина*. Малайя Азія. Цв. какъ у обыкновенной лѣщины; орѣхъ мелкій, обертка двойная, наружная—много-раздѣльная, внутр.—трехраздѣльная. 60 ф. **К. тубулоза** (*C. tubulosa*, трубчатый). *Фундукъ*. Южн. Европа. Орѣхъ большой, удлиненный, скорлупа толстая, твердая; зернышко съ красною кожичей; обертка длинная съ зубчатымъ краемъ. Отъ *К. авелляна* и *тубулоза* произведены многочисленные разновидности, воспитываемыя въ садахъ.

**КОРИНКА.** Черный мелкій виноградъ, безъ сѣмечекъ.

**КОРИНОКАРПУСЪ** (*Corynocarpus*). *Koryne*—клубень и *carpos*—плодъ, по формѣ послѣдняго. С. сердечниковыхъ. (1). Новая Зеландія. Оранж. кустъ. Легкая, сильная Отводкой. Въ общемъ, уходъ, какъ за Ардизіа.

**К. левигата** (*C. laevigata*, гладкій). Цв. бѣлые, плоды похожие на сливы; плоды съдобные, косточка ядовита, но это свойство пропадаетъ отъ вымачиванія. 20 ф.

**КОРИНОСТИЛИСЬ** (*Corynostylis*). *Koryne*—клубень и *stylis*—пестикъ. С. фиалковыхъ. (2). Троп. Америка. Тепл. дѣбкія многол. рр. Черенками изъ молодого роста, въ развод. парничкѣ. Темп. лѣтомъ 17—24, зимой 13—17°.

**К. Облетія** (*C. Aubletii*, Обле). Гвиана. Цв. большіе, крупные. Сип. **К. Хубантусъ** (*C. Hybanthus*).

**КОРИНОФАЛЬЮСЬ** (*Corynophallus*). *Koryne*—клубень, *phallus*—булава. По початку. С. ароидей. Уходъ какъ за Каладіумъ.

**К. Афцелии** (*C. Afzelii*, Афцелиуса). Троп. Африка. Чехолъ внизу трубчатый, въ верху распростертый съ широкимъ остроконечнымъ краемъ. Лл. 2—3 раздѣльные. Замѣчательныя разновидности: *латифolia* (латифolia, широколистная) съ болѣе широкими сегментами лл.; *спектабилис* (*spectabilis*, красивая), нижняя часть стебля красного темно-малиноваго цвѣта, *элеганс*

(*elegans*, изящный), лл. съ очень узкими сегментами и зелеными черенками.

**КОРИСЬ** (*Coris*). Название взятое у Diosкорида. С. первоцвѣтовыхъ (1). Средизем. побережье. Оранж. или полувыносл. многол. р. Сухая, песчанистая, торфянистая. Сѣменами, въ парничкѣ.

**К. монспелиансис** (*C. monspeliensis*, изъ Монпелье). Средиз. побережье. Цв. яркочерные съ оранжев. пыльниками, лѣтомъ. 6 д.

**КОРИФА** (*Corypha*). *Koryphe*—вершина, ван вырастаютъ на макушкѣ стволовъ. С. пальмъ. (6). Троп. Азія, Малайск. архип. Тепл. пальмы съ вѣерообразными лл. Песчан. удобренная глин. дерн. Сѣменами.

**К. умбракуліфера** (*C. umbraculifera*, зонтичная). Ю. Индія, Цейлонъ. Лл. большіе, вѣерообразные, складчатые; изъ нихъ дѣлаются вѣера, и самая пальма называется *Талипотъ*.

**КОРИЧНЕВОЕ.** Яблоко средней поры поснѣванія и среднихъ размѣровъ, желтаго цвѣта съ красными полосками; мякоть съ запахомъ корицы. **КОРИЧНЕВОЕ СКОРОСПѢЛОВ.** Ранній сортъ яблока, вкусомъ, формою и размѣромъ похожее на коричневое.

**КОРИЧНЕВЫЯ** рр. (*Canellaceae*). Небольшое семейство вестиндскихъ и тропическихъ американскихъ ароматическихъ кустарниковъ, близкихъ съ биссими, отъ которыхъ различаются весьма немногими. Роды—Канелля и Циннамондрантъ.

**КОРИАНДРУМЪ** (*Coriandrum*). *Koris*—клопъ, по непріятному запаху лл. С. зонтичныхъ. (2). Средизем. побережье. Кавказъ. Обыкновен. Сѣменами, весной.

**К. сативумъ** (*C. sativum*, съдобный). *Киндиль*. Юж. Евр. Цв. бѣлые. 1½ ф. Молодые лл. употребляются какъ кухонная приправа, сѣмена—въ кондитерскихъ; онѣ высѣваются въ августъ. Если нужны только лл., то сѣвъ дѣлается малыми количествами периодически.

**КОРИАНТЕСЬ** (*Coryanthes*). *Korys*—шлемъ и *anthos*—цв., по формѣ губы. С. орхидей. (4). Троп. юж. Америка. Теплич. этифиты. Волокнист. торф. съ рубленными мохомъ и черенками. Дѣленіемъ Темп. во время развитія 19—24, въ состояніи покоя 8—13.

**К. макранта** (*C. macranta*, крупноцвѣтный). Каракасъ. Цв. коричнев. съ желтымъ, въ іюнь, отцвѣтаютъ въ 3—4 дня.

**КОРИАРИЯ** (*Coriaria*). *Corium*—покровъ, по твердой оболочкѣ плода. С. кожевниковыхъ. (5). Средизем. побережье. С. Африка, Гималай. Нов. Зе-

ландія. Полукустарная оранж. или выносл. рр. Обыкновен. Отводкой и отпрысками. Темп. зимой 4—6°.

**К. миртифолія** (*C. myrtifolia*, съ лл. какъ у Мирты). Ю. Европа. Цв. зеленоватые, въ маѣ до августа. 4—6 ф.

**КОРМОВЫЯ РАСТЕНІЯ.** Разводимыя для корма скота травы или листовныя и корнеплодные породы.

**КОРНЕВИЩЕ.** Подземный, распростертый стебель, выпускающій корешки; съ конца даетъ травянистый стебель и цвѣточные почки, а часто также листья.

**КОРНЕПЛОДНЫЙ,** Давущій плодъ въ корнѣ—рѣпа, морковь, картофель и пр.

**КОРНЕПУСКОВЫЯ** рр. (*Rhizophoraceae*). Деревья и кустарники съ круглыми вѣточками, имѣющими въ колѣнахъ вздутия. Почти всѣ тропическаго мѣстонахожденія. Видовъ 50, родовъ 17. Гаплонеталомъ, Риндифора.

**КОРНУСЪ** (*Cornus*). *Corn*—рогъ, по твердости дерева. С. дереновыхъ. (25). Европа, Азія, Америка. Древ., куст. и травин. рр. Обыкновен. Сѣменами, отводками, черенками и дѣленіемъ.

**К. канадѣнзисъ** (*C. canadensis*, канадскій). С. Америка. Цв. пурпуровые съ бѣлымъ, въ маѣ. 6 д. Малоросл. трав. р. **К. маъ** (*C. mas*, мужской). *Дерево, Кизиль*. Европа. Цв. желтые, весной. 10—15 ф. Сип. **К. маскула** (*C. mascula*). Имѣетъ пестролистную форму—съ бѣлыми разводами (*variegata*, *variegata*) и съ бѣлыми-же и красноватыми (*elegantissima*, *elegantissima*). **К. паникулата** (*C. paniculata*, метельчатый). Соедин. Штаты. Цв. бѣлые, лѣтомъ. 4—8 ф. **К. сангвинеа** (*C. sanguinea*, кроваво-красный). *Глигъ*. Европа, С. и З. Азія, Гималай. Цв. зеленоватые, непріятнаго запаха, въ іюнь. Вѣтви красного цвѣта. 6—8 ф. **К. серицеа** (*C. sericea*, шелковистый). Соед. Шт. Цв. бѣлые, въ іюнь—іюль. 5—8 ф. **К. стрикта** (*C. stricta*, прямой). Соед. Шт. Цв. бѣлые, въ маѣ. 8—15 ф. Имѣетъ пестролистную форму. **К. суэцка** (*C. suetica*, шведскій). С. и Арктич. Европа, Азія и С. Америка. Цв. темно-пурпуровые, въ іюнь. 6 ф.

**КОРНУТІЯ** (*Cornutia*). Какъ *Корнутусъ* (*Cornutus*)—французскій врачъ, путешествовавшій въ Канадѣ. Сем. вербеновыхъ. (6). Троп. Америка. Оранж. оранж. куст., близкіе къ Кальканарія. Глин. дерн. съ торф. Черенками въ песокъ, подъ стекломъ, въ развод. парничкѣ, весной.

**К. пирамидата** (*C. pyramidata*, пирамидальная). Вестиндія. Цв. голубые, въ іюль. 4 ф. Сип. **К. пунктина** (*C. punctata*).

**КОРОВОВСКОЕ** яблоко или *Корововка*. Ранній сортъ мелкаго, сладкаго



яблока, съ грубой зеленоватой кожицей и твердою мякотью.

**КОРОВОЧКА. МАКОВКА.** Сухой раскрывающийся плодикъ.

**КОРОВИЙ НАВОЗЪ** или **ПОЗЕМЪ** Имѣетъ большое значеніе въ содержаніи раст. въ горшкахъ. Его должно складывать въ кучу, которую чаще переваливать и держать сухо до употребленія. Изъ свѣжаго коровьяго навоза съ чистой водой готовится жидкое удобреніе.

**КОРОКІЯ (Corokia).** Мѣстное названіе. С. деревныхъ. (2). Нов. Зеландія. Оранже. или полувыносл. куст. Хорошая садовая. Черенками въ песокъ, подъ стекломъ или отводкой осенью.

**К. Котонестеръ (C. Cotonaster,** кильный). Цв. желтые, пахучіе. Низкій, стелющийся, сильно вѣтвистый кустъ.

**КОРОНА. КОРОНКА,** или манжетка. Часть цвѣтка въ нарциссѣ и нѣк. друг. луковичныхъ.

**КОРОНИЛЬЯ (Coronilla).** *Corona* —вѣнецъ, корона, по расположенію цвѣтовъ. С. бобовыхъ. (20). Европа, С. Африка, Азія, Канар. о. Оранже. в воздушн. кустар., много- и однол. рр. Для оранже.  $\frac{1}{2}$  глини. дерн. и  $\frac{1}{2}$  волок. торф.; черенками въ холод. парникъ или оранже. подъ стекломъ, весной. Многол. выносл.—дѣленіемъ весной или черенками изъ молодого роста, а также сѣменами, въ парникъ. Однол. — сѣменами, въ парникъ или на воздухъ.

**К. varia (C. varia,** разнообразная). *Vierge.* Европа. Цв. малиновые или бѣлые, съ весны до осени. Трав. выносл. р. **К. глѣзка (C. glauca,** сизая). Южн. Европа. Цв. желтые, пахучіе днемъ, безъ запаха ночью, съ мая до сентября. Оранже. красивый куст. **К. иберика (C. iberica,** испанская). Испанія. Цв. желтые, крупные, въ июль. Травн. стелющаяся р. **К. короната (C. coronata—увѣчанная).** Южн. Европа. Цв. желтые, въ июль—августъ. Полукуст. оранже. р. 1—2 ф. **К. минима (C. minima,** самая маленькая). Ю.-З. Европа. Цв. желтые, пахучіе, въ июнь—июль. Полувыносл. полукуст. стелющаяся р.

**КОРРЕА (Correa).** Хозе Франческо Корреа (Correa) — португальскій ботаникъ. С. рутовыхъ. (15). Ю.-В. Австралія. Оранже. куст. рр. 3 ч. песчанист. торф. и 1 ч. волокуистой глини. дерн. Черенками изъ полузрѣлаго роста весной, въ разводочн. парникъ. Темп. лѣтомъ 10—19, зимой 4—8°.

**К. кардиналис (C. cardinalis,** кардинальская). Цв. ярко-шарлаховые съ зелеными кончиками, въ мартъ. 3 ф. Спн. **К. спеціоза (C. speciosa).** Имѣетъ нѣсколько

формъ. **К. Харрисіа (C. Harrisii,** Харриса). Гибриды отъ К. кардиналис; цв. ярко-шарлаховые.

**КОРТАЛЬСІЯ (Korthalsia).** *Korthalsia* (Korthals) — голландскій путешественникъ. С. пальмъ. (16). Малайскій архипелагъ и Новая Гвинія. Тепл. пальмы. Уходъ какъ за Кадмусъ.

**К. скафигера (K. scaphigera,** имѣющая стрѣлку). Андоманскіе о., Малакка. Вал перистый, окаймляющийся длиннымъ ухватомъ; молодыя бѣло-пухлятыя. Большая цвѣлющаяся пальма. **К. Юнгхунія (K. Jungkhunii,** Юнгхуна). Ява. Вал съ длинными черенками, окаймляющимися длиннымъ тонкимъ хвостомъ (ухватомъ); нижняя сторона бѣлаго цв.

**КОРТУЗА (Cortusa).** Джакомо Антонио Кортусо (Cortuso) былъ въ XVI столѣт. директоромъ падуанскаго ботан. сада. С. первоцвѣтвыхъ. (1). Сред. Европа, С. Азія, Гималаи. Вынослив. многол. Влаж. глини. дерн. съ пескомъ. Сѣменами въ парникъ и дѣленіемъ.

**К. Маттіоли (C. Matthioli,** Маттіоли). Швейц. Альпы. Цв. пурпур. выше, весной.

**КОРХОРУСЪ (Corchorus)** *Koreo* — послаблять и *Kore* — зрачекъ, по предполагаемымъ враческимъ свойствамъ. С. линовыхъ (35). Тропич. страны. Низкій куст. или трав. рр. не имѣющія садоваго значенія, по **К. капсулярис (C. capsularis,** плодниковый) производятъ юту, а **К. оліторис (C. olitorius,** кухонный), даетъ овощъ. Оба однол. тепл. изъ Индіи, достигая выш. 6 ф.

**КОРЧЕВАТЬ.** Выворачивать деревья съ корнями, выкапывать корни.

**КОСА.** Узкій, долгий и кривой ножъ для срѣзки травы. Она имѣетъ: *лезвие, обузъ, палку и носокъ.* Посредствомъ кольца насаживается пяткою на *косовище.* Лезвие отбиваютъ особымъ молоткомъ на *бабкѣ,* а точатъ брускомъ или лопаткою (дощечкой съ пескомъ). Со введеніемъ косильныхъ машинокъ сдѣлалась менѣе употребительною въ садахъ, но и теперь необходима для срѣзки травы въ мѣстахъ, гдѣ машинка не можетъ быть примѣнена. Хорошій косецъ долженъ рѣзать чисто, не оставляя вихровъ, что очень портитъ газонъ.

**КОСАТИКОВЫЯ рр. (Irideae)** Многолѣт. трав. рр., встречаемыя въ жаркихъ и умеренныхъ странахъ и въ изобиліи находящіяся на Мысѣ Доброй Надежды. Примѣрами могутъ служить: Гладиолусъ, Ирисъ и Иксія.

**КОСАТИКЪ.** См. Ирисъ.

**КОСМАНТУСЪ (Cosmanthus).** *Kosmos* — красивый и *anthos* — цв. С. водолюб.

ствыхъ. Однол. трав. рр. въ настоящее время причисляемы къ Фацелія. Песчаннстая. Сѣменами.

**К. фимбриата (C. fimbriata,** съ бахромчатыми лепестками). Цв. блѣдно-тѣлесные, въ июнь.  $\frac{3}{4}$  ф.

**КОСМЕЛИЯ (Cosmelia).** *Kosmeo* — украшать; по цвѣтамъ. С. эпакрисовыхъ. Оранже. куст. рр. Песчан. торфян. съ пескомъ. Черенками лѣтомъ.

**К. рѣбра (C. rubra,** красная). Ю.-З. Австралія. Цв. красные, въ апрѣль—май. 3—6 ф.

**КОСМИБУЕНА (Cosmibuena).** Испанецъ *Косими Буена (Cosimi Buena)* написалъ естеств. исторію Перу. С. мареновыхъ. Красивыя древесныя (въ садахъ—кустар.) рр. Глини. дерн. съ песч. торф. Сѣменами, черенками изъ зрѣлаго роста въ разводоч. парникъ. Темп. лѣтомъ 17—24, зимой 15—17.

**К. обтужиофілія латиофілія (C. obtusifolia latifolia,** туполистная широколистная). Колумбія. Цв. бѣлые, очень душистые. 20 ф. Спн. *Каскарілла грандифолия (Cascarilla grandifolia).*

**КОСМОСЪ (Cosmos).** *Kosmos* — красивый; по цвѣтамъ. С. сложноцвѣтныхъ. (10). Троп. Америка. Одно- или многолѣт. трав. рр. Сѣменами, порашыте весной, какъ однолѣтнія; на лѣто — на воздухъ. Многол. вынимаютъ на зиму и сохраняютъ какъ георгины.

**К. бипиннаты (C. bipinnatus,** двуперистый). Мексика. Цв. головки розовыя или пурпуровыя съ желтымъ дискомъ. 2 ф. Однол. **К. скабіозоидес (C. scabiosoides,** похожій на скабіозу). Мексика. Цв. шарлаховые, въ октябрь. 3—4 ф. Многол. съ клубневыми корнями. Полувыносл. **К. тенуифолиус (C. tenuifolius,** мелколистный). Мексика. Цв. головки ярко-пурпуровыя, осенью. 1—2 ф. Однол.

**КОССИНІЯ (Cossignia).** *Cossigny* (Cossigny) — франц. ботаникъ С. мыловниковыхъ (2). О. Маврикія. Тепл. куст. рр. 2 ч. глини. дерн. и по 1 ч. торф. и песку. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ разводч. парникъ.

**К. пинната (C. pinnata,** перистая). О. Маврикія. Цв. бѣлые. 10—20 ф. Спн. **К. борбоника (C. borbonica).**

**КОСТЕРЪ. КОСТРИКА.** Жесткая кора растеній, негодная для пряжи: льна, конопли.

**КОСТОЧКА.** Твердая часть плода, — внутрелюдинокъ костяной твердостью, содержащій сѣмя, — вишня, слива, персикъ.

**КОСТОЧКОВЫЕ ПЛОДЫ.** Сѣмя

которыхъ заключено въ костяную оболочку, — косточку.

**КОСТУСЪ (Costus).** Названіе взятое у Плинія. С. либирныхъ. (25). Троп. Америка, Африка, Азія, Австралія. Тепл. многол. трав. Песчан. глини. дерн. съ торф. дѣленіемъ корней.

**К. игнеус (C. igneus,** огненный). Багря. Цв. яркіе шарлахово-оранжевые. 1—3 ф. **К. Малортіанус (C. Malortianus,** Малортія). Коста-Рика. Цв. золотисто-желтые. 1—3 ф.

**КОСТЯНКА.** Сочный или мясистый плодъ, въ которомъ находится косточка съ сѣменемъ, напр. оливковъ, слива, вишня.

**КОСТЯНОЕ УДОБРЕНІЕ** Различнымъ образомъ измельченныя кости.

**КОСЦИНИУМЪ (Cosciniun).** *Koskinon* — ситечко; по дырчатымъ сѣменамъ. С. лунобѣмянниковыхъ (1). Цейлонъ. Тепл. выносл. кустъ. Глини. дерн. съ торф. и пескомъ. Черенками изъ молодого роста, лѣтомъ, подъ стекломъ.

**К. фенестратумъ (C. fenestratum,** окончатый). Цейлонъ. Цв. зеленоватые, въ ноябрь. Спн. *Перейра лѣдика (Pereira medica).*

**КОТИЛЕДОНЪ (Cotyledon).** *Kotyle* — напина, ямка, по выгнутымъ лл. нѣк. видовъ. С. толстянковыхъ. (32). Мысѣ Д. Над. Въ настоящее время въ этомъ родѣ заключаются также прежніе *Пазифитумъ, Писторнія, Улибикумъ и Эчеверія.* Песчан. глинисто-дерн. Сѣменами, отрывками, черенками, листьями, кот. должно отрывать, а не отрѣзывать, осенью, и положить на сухой песокъ въ развод. парникъ или теналцъ и не поливать; вскорѣ на концахъ лл. образуются рр., кот. должно поливать, а потомъ разсадить въ песчаннстую землю.

**К. агавоидес (C. agavoides,** похожій на Агаве). Мексика. Цв. тускло-оранжевые, лл. овальные, сизоватые, остроконечные. Спн. *Эчеверія агавоидес (Echeveria agavoides).* **К. велютина (C. velutina,** бархатистый). Южн. Африка. Цв. желтые, низку зеленые, съ красными краями. Лл. большіе, овальные, молодые бархатистые 2—3 ф. **К. гиббифлора метальлика (C. gibbiflora metallica,** съ горбатыми цв. металлическій). Мексика. Цв. желтоватые; лл. широкіе, овально-лопчатые, сизо-пурпуроваго металлическаго цвѣта. Спн. **К. метальлика (C. metallica).** Существуетъ нѣсколько формъ. **К. грандифлора (C. grandiflora,** крупноцвѣтнй). Мексика. Цв. красновато-оранжевые съ пурпуров. отгиномъ. Лл. округло-клиновидные, бѣлые или сизые. 1—2 ф. **К. калифорника (C. californica,** калифорнскій). Калифорнія. Цв. блѣдно-желтые; лл. ланцетовидные, остроконечные,



мучнисто-сизые. 9 д. Сил. *Эчеверия калифорника* (*Echeveria californica*). **К. кокцинея** (*C. coccinea*, шарлаховый). Мексика. Цв. шарлаховые; лл. ланцетовидно-лопастчатые. 1—2 ф. Сил. *Эчеверия кокцинея* (*Echeveria coccinea*). **К. корусанс** (*C. coruscans*, блестящая). М. Д. Н. Цв. оранжевые, лл. клиновидно-продолговатые, бороздчатые с толстыми краями, бледно-мучнистые. **К. Песталоцци** (*C. Pestalozzi*, Песталоцци). Киликия. Цв. бледно-розовые; лл. лопастчато-густые с зубчатыми краями. Сил. *Умбиликус Песталоцци* (*Umbilicus Pestalozzi*). **К. Пикокки** (*C. Peacockii*, Пикокки). Мексика. Цв. ярко-красные, лл. обратно-яйцевидные, лопастчатые. 1 ф. Сил. *Эчеверия Пикокки* (*Echeveria Peacockii*). **К. рацемоза** (*C. racemosa*, вѣтвистый). Мексика. Цв. шарлаховые. Лл. эллиптические, остроколючие, волнистые. 2 ф. Сил. *Эчеверия рацемоза* (*Echeveria racemosa*). **К. ретуса** (*C. retusa*, тупой). Мексика. Цв. желтоватые; лл. овально-лопастчатые. 1½ ф. Имѣетъ разновидности *гладкая* и *флорибунда силлендеса* (*glauca et floribunda splendens*)—лучшей изъ многихъ другихъ. **К. семпервивумъ** (*C. sempervivum*, постоянно живой). Кавказъ. Цв. темно-красные. Лл. овальные, тускло-зеленые, съ коричневымъ оттенкомъ. 4—6 ф. Сил. *Умбиликус семпервивумъ* (*Umbilicus sempervivum*). **К. спиноза** (*C. spinosa*, колючий). Китай. В. Сибирь. Цв. желтые; лл. продолговатые, оканчивающиеся шиломъ. 1 ф. Въ садахъ зовется *Семпервивумъ стиндлумъ* (*Sempervivum spinosum*). **К. Умбиликусъ** (*C. Umbilicus*). Европа. Цв. желтые; лл. цитовидные, кругло-зубчатые. 6 д. **К. Фюльгенс** (*C. fulgens*, отъбланный). Мексика. Цв. кораллово-красные.

**КОТОНЕАСТЕРЪ** (*Cotoneaster*). *Kotonea* у Плинія означаетъ айву и *aster* — *ad instar*. т. е. похожий на айву. С. розовыхъ. (15). Европа, С. Африка, Азия, Гималаи. Обыкн. садовый. Сѣменами, весной, черенками осенью, отводкою—тоже осенью и наконецъ прививкой къ *К. вульгарис* или къ айвѣ.

**К. бухифолия** (*C. buxifolia*, съ лл. самшита). Нейдгер. Цв. блѣлые, въ апрѣль—маѣ. 3—4 ф. **К. вульгарисъ** (*C. vulgaris*, обыкновенный). Ирга. Европа, С. и В. Азия, Гималаи. Цв. красноватые, въ маѣ—июнѣ. 3—5 ф. Сил. *Меспилусъ Котонеастеръ* (*Mespilus Cotoneaster*). Плоды красные, а у другой формы черные. **К. микрофилла** (*C. microphylla*, съ мелкими лл.). Непаль. Цв. блѣлые, въ апрѣль—маѣ. 3—4 ф. **К. нуммулярія** (*C. nummularia*, похожий на Нуммулярію). Кашмиръ, З. Тибетъ. Цв. блѣлые, въ апрѣль—маѣ. 10—15 ф. **К. Симонсия** (*C. Simonsii*, Симонса). Отечество неизвѣстно. Цв. одиночные или двойчатые,

въ апрѣль. **К. тимифолия** (*C. thymifolia*, съ лл. какъ у Тимуса). Гималаи. Цв. мелкіе, малиновые, въ апрѣль. **К. фригида** (*C. frigida*, холодный). Непаль. Цв. блѣлые, въ апрѣль—маѣ. 10 ф.

**КОУЛЬТЕРІЯ** (*Coulteria*). Томасъ *Коултеръ* (*Coulter*) авторъ монографіи ворсянковыхъ. С. бобовыхъ. (2). Чили, Мексика. Теплолюб. куст. рр. Торф. съ глинисто-дери. Сѣменами.

**К. тинкторія** (*C. tinctoria*, красильная). Картагена. Цв. оранжевые. 12 ф. **К. хоррида** (*C. horrida*, грубая). Картагена. Цв. оранжевые. 15 ф.

**КОУРОУРИЯ** (*Courouria*). Название мѣстное. С. мареновыхъ. Троп. Америка. Ни одного вида въ садахъ не встрѣчается.

**КОУТАРЕЯ** (*Coutarea*). Въ Гвианѣ р. это называютъ „куотари“. С. мареновыхъ. Тепло. древ. рр. изъ троп. Америки. Глин. дерн. съ пескомъ и торф. Черенками въ такой же землѣ, подъ стекломъ, въ теплѣ.

**К. специоза** (*C. speciosa*, отъблнная). Гвиана. Цв. пурпуровые. 25 ф.

**КОУТОУБЕЯ** (*Coutoubea*). Въ Гвианѣ эти рр. называютъ „куотуби“. С. молочайныхъ. Малоисчисленный родъ теплолюб. рр. Ухождъ какъ и за другими ибжными однолѣтними.

**К. рамоза** (*C. ramosa*, вѣтвистая). Гвиана. Цв. блѣлые, въ июнѣ. 1—2 ф. **К. спиката** (*C. spicata*, колосоватая). Гвиана. Цв. блѣлые съ розоватымъ горлышкомъ, въ июлѣ, 2—3 ф.

**КОФЕА** (*Coffea*). *Coffee*, — произпущія въ Нареѣ, въ Африкѣ, гдѣ обыкновен. кофе растетъ въ изобилии дико. С. мареновыхъ. (20). Азия, троп. Африка, Макаронскіе о. Теплолюб. древ. или куст. р. Глинисто-дери. съ торф. Сѣменами. черенками изъ зрѣлаго роста, подъ стекломъ, въ пескѣ, во влажномъ и тепломъ воздухѣ. Тепло. лѣтомъ 13—24, зимой 10—13°.

**К. арабика** (*C. arabica*, арабійская). Ю.-З. Абиссинія. Цв. блѣлые, пахучіе, въ сентябрѣ. 5—15 ф. **К. либерика** (*C. liberica*, либерійская). Либерія. Цв. блѣлые пахучіе; все р. крупнее.

**КОХЛЕАРИЯ** (*Cochlearia*). *Cochlear* — ложка, по волнующимъ листьямъ. С. крестоцѣтныхъ. (25). Европа, Азия, Сѣв. Америка. Одно-или многол. трав. рр. Обыкновен. садов. Сѣменами на воздухѣ, весной.

**К. арморатія** (*C. armoracia*, горькая). Хртыль. Умѣр. и В. Европа. Цв. блѣлые, въ июнѣ. 2 ф. Корень большой, мясистый. Земля глубокая, сильная. Корнев. черенками съ осени. **К. официнальс** (*C. officinalis*, аптечная). Холодные страны сѣв. полушарія. Цв. блѣлые,

весной. 2—12 д. Красиво цвѣтущее рано двулѣт. р.

**КОХЛОСТЕМА** (*Cochliostema*). *Cochlion*—спираль и *stema*—тычинка. С. коммелиновыхъ. (2). Экуадоръ на Андахъ. Теплолюб. рр., схожія съ Традесканціи. Сильн. глин. дерн. съ ибж. количествомъ торф. Дѣленіемъ весной и сѣменами. Тепло. лѣтомъ 17—23, зимой 14—17°.

**К. одоратиссимумъ** (*C. odoratissimum*, самый душистый). Экуадоръ. Цв. снаружи и внизу желтовато-зеленые, на верхней части — красноватые, внутри — темно-голубые. **К. Якобианумъ** (*C. Jacobianum*, Якоби). Экуадоръ. Цв. голубые, душистые, въ сентябрѣ. Одно изъ лучшихъ садовыхъ приобретений послѣдняго времени.

**КОХЛОСПЕРМУМЪ** (*Cochlospermum*). *Cochlo*—крутить и *sperma*—сѣмя, по изогнутому сѣмени. С. биксинныхъ. Теплолюб. куст. и древ. рр. Глин. дерн. и троф. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ апрѣль, въ пескѣ, въ разводч. парникѣ, по сѣменамъ лучше.

**К. госсипиумъ** (*C. gossypium*, хлопчатобумажный). Индія. Цв. желтые, крупныя, въ маѣ. 50 ф. Сил. *Вомбакъ Госсипиумъ* (*Bombax Gossypium*).

**КОЧАНЪ**. Тоже что качанъ.

**КОЧКОРЪЗЪ. КОЧКОДЕРЪ**. Снарядъ для раскопки луговыхъ кочекъ.

**КОЧАРЫЖКА**. Хрицеватый кочанный стебель. Хряпка.

**КОЧКА**. Затвердѣлая кучка земли.

**КРАМБЕ** (*Krambe*). Название взято съ греческаго. С. крестоцѣтныхъ. (16). Европа, Азия, Канар. ос. Многол. трав. рр. Садовая. Сѣменами и дѣленіемъ корней. Въ запад. государствахъ употребляютъ, какъ овощи, Кр. Маритима. (*C. maritima*), — морскую капусту, которая у насъ не имѣетъ примѣненія.

**К. кордифолия** (*C. cordifolia*, съ сердцевидными лл.). Кавказъ. Цв. блѣлые, въ июлѣ; лл. нижніе сердцевидные, верхніе овальные. 6 ф.

**КРАМЕРІЯ** (*Krameria*). Иоганъ и Вильгельмъ *Крамери* (*Kramer*), — отецъ и сынъ, австрійскіе ботаники. С. истодовыхъ. (12). Жаркія страны Америки. Тепло. древесн. и куст. рр. Песков. глин. дерн. съ волокн. торф. Черенками въ пескѣ, въ теплѣ. Тепло. лѣтомъ 13—26, зимой 7—13°.

**К. пауцифлора** (*K. pauciflora*, малоцвѣтная). Мексика. Цв. красные. 4 ф. **К. триандра** (*K. triandra*, съ тремя тычинками). Перу. Цв. ярко-шарлаховые. Низкій кустъ. Даетъ ратановый корень.

**КРАПИВНЫЯ** рр. (*urticaceae*). Древ., куст. или трав. рр., распространенныя

по умѣр. и жаркимъ поясамъ земной поверхности. Содержатъ многіе полезные для человѣка роды. Всѣхъ видовъ до 1500, а родовъ 110, между прочимъ Артокарпусъ, Каннабисъ, Морусъ, Ульмусъ, Уртика, Фикусъ и Хумулюсъ.

**КРАСАВИЦА**. См. Атропа.

**КРАСАВОЧКА**. См. Диантусъ.

**КРАСНОДЕРЕВНЫЯ** рр. (*cedrelaeae*). Теперь причислены къ сем. ясеновыхъ.

**КРАСНОЕ ДЕРЕВО**. См. Свистенія

**КРАСНОПУЗЫРЬНИКОВЫЯ** рр. (*celastrineae*). Кустарники или деревья. Цвѣты мелкіе, зеленые, блѣлые или пурпуровые полузонтиками; долей и лепестковъ по 4; плодъ 2—5 гнѣздный, коробочкой или ягодой. Листья очередные, рѣдко супротивные, простые, съ прицѣпными. Наиболее извѣстные роды Целяструсъ, Элеодендронъ и Эвонимусъ.

**КРАСНОГЛАЗОВСКОЕ ЯБЛОКО**. См. Антоновское.

**КРАССУЛЯ** (*Crassula*). Уменьшительное *Crassus* — толстый, по мясистымъ лл. и стеблямъ. С. толстянковыхъ. (120). Мысль Д. Н., Абиссинія, Гималаи. Слѣбъ песчан. глин. дерн. съ черенками. Черенками, предарительно обусушенными. Всѣ упоминаемые ниже виды изъ юж. Африки.

**К. арборесценсъ** (*C. arborescens*, древовидная). Цв. розовые, въ маѣ. 2—3 ф. Сил. *К. Котиледонъ* (*C. Cotyledon*). **К. Боллюзия** (*C. Bolusii*, Боллюса). Цв. блѣдно-зелесные, лѣтомъ. 3—5 ф. Многол. трав.

**К. верзиколяръ** (*C. versicolor*, разноцвѣтная). Цв. красные, пахучіе вечеромъ, лѣтомъ. Сил. *Розеа верзиколяръ* и *Калозантесъ верзиколяръ* (*Roehea versicolor* et *Kalosanthes versicolor*).

**К. кокцинея** (*C. coccinea*, шарлаховая). Цв. шарлаховые, въ июлѣ. Куст. р. Сил. *Калозантесъ кокцинея* (*Kalosanthes coccinea*).

**К. Купери** (*C. Cooperi*, Купера). Цв. блѣлые, зимой. **К. лактеа** (*C. lactea*, млечно-блѣлая). Цв. сѣбно-блѣлые, зимой. 1—2 ф. Полукуст. Имѣетъ нестролостную форму.

**К. маргиналисъ** (*C. marginalis*, каемчатая). Цв. блѣлые, въ июлѣ; лл. съ хрицеватыми краями. Травяни. Сил. *К. профуза* (*C. profusa*). **К. розулярисъ** (*C. rosularis*, розончатая). Цв. блѣлые, въ июлѣ. Лл. розеткой. 6 д. Травяни.

**К. фальската** (*C. falcata*, серповидная). Цв. ярко-карминные, иногда блѣлые, съ іюня до сентябрю. 3 8 ф. Сил. *Розеа фальката* (*Roehea falcata*).

Куст. р. **К. цилиата** (*C. ciliata*, рѣсничатая). Цв. блѣлые, въ июлѣ. 6 д. Полукуст. **К. эрикоидесъ** (*C. ericoides*, похожая на Эрику). Цв. блѣлые, мелкіе, въ сентябрѣ. 6 д. **К. ясенина** (*C. jasminae*, жасминовая). Цв. сна-



чала бѣлые, а потомъ, передъ зацвѣтаніемъ, красноватые, похожіе на обыкновенный жасминъ, въ апрѣлѣ—маѣ. Кустар. Сип. *Roclea jasminae* и *Kalosanthos jasminae* (Roclea jasminae, Kalosanthos jasminae).

**КРАТЁВА (Crataeva).** *Crataeva*—въ древней Греціи ботаникъ. С. каперсовыхъ. (6) Троп. страны. Теплолюб. кустар. или деревесн. рр. Смѣсь изъ глины, дерн. съ торф. и перегноемъ. Черенками, въ песокъ и теплѣ.

**К. тапія (C. tapia, тапія).** Троп. Америка. Цв. бѣловатые; плоды пахнутъ чеснокомъ. 30—40 ф.

**КРАТЁГУСЪ (Crataegus).** *Crataegus*—крѣпость, по твердости и крѣпости деревесины. С. розановыхъ. (65). Европа, Азія, Японія, С. и Ю. Америка. Кустар. или низкія деревесн. рр., часто съ шипами. Обыкновен. садовая. Съеменами, а сортовыми формами—прививкой.

**К. Дугласіа (C. Douglasii, Дугласа).** С.-З. Америка. Цв. бѣлые, въ маѣ. 10—15 ф. **К. Крусъ-галія (C. Crus-galli).** *Пытунья ланка*. С. Америка. Цв. бѣлые съ розоватымъ отгиномъ, въ маѣ. 10—30 ф. Сип. **К. лусида (C. lucida).** Изъ разновидностей заслуживаютъ особеннаго вниманія *овалифолія (ovalifolia)* и *пругифолія (prunifolia)*. **К. нигра (C. nigra, черный).** В. Европа. Цв. бѣлые, въ маѣ—июнѣ. 10—20 ф. Сип. **К. карпатика (C. carpatica).** **К. одоратиссима (C. odoratissima, самый пахучій).** Крымъ. Цв. бѣлые, очень душистые, въ маѣ—июнѣ. 10—20 ф. **К. ориенталисъ (C. orientalis, восточный).** *Сибирскій боярышникъ.* Левантъ. Цв. бѣлые, въ маѣ и июнѣ. 12—20 ф. Сип. **К. сангвинеа (C. sanguinea).** **К. оксиканта (C. oxycantha, съ острыми шипами).** *Боярышникъ.* З. Европа. Цв. бѣлые, иногда розоватые, съ хорошимъ запахомъ. 10—20 ф. Имѣетъ очень много разновидностей, изъ которыхъ наиболѣе замѣчательны: *аурантиака (aurantiaca)*, *ауреа (aurea)*, *лациниата (laciniata)*, *прѣкоксъ (praecox)*, *птеридифолія (pteridifolia)* и *эриокарпа (erioscapra)*. **К. пираканта (C. pyracantha, съ красными ягодами).** *Мушмула.* Ю. Европа. Цв. бѣлые, въ маѣ. 10—20 ф. Есть нѣсколько разновидностей. **К. танасетифолія (C. tanacetifolia, съ л. пижмы).** Левантъ. Цв. бѣлые, въ маѣ 12—20 ф. **К. флѣва (C. flava, желтый).** Соед. Амер. Штаты. Цв. бѣлые; плоды желтые, съдымые. 12—20 ф. Сип. **К. каролинская и К. гландулоза (C. caroliniana, C. glandulosa).** **К. хетерофилля (C. heterophylla, разнолиственный).** Востокъ. Цв. бѣлые, въ маѣ. 10—20 ф.

**КРАХМАЛЬ.** Углеводъ, встрѣчаемый, за весьма рѣдкими исключеніями, во всѣхъ растенияхъ, особенно же въ клуб-

няхъ, корневищахъ и съеменахъ въ видѣ запаснаго матеріала, который потребляется растеніемъ при его развитіи.

**КРЕЙЗИГІЯ (Kreysigia).** *Kreysigia* (Kreysig)—германскій ботаникъ. † 1839. С. лилейныхъ. (1). Австралія. Многол. полувысокія. трав. р. Обыкн. сад. Длениемъ, весной.

**К. мультифлора (C. multiflora, многоцвѣтная).** Куинслендъ и Н. Ю. Вальетъ. Цв. малиновые, въ июлѣ. 9—18 д.

**КРЕПИСЪ (Crepis).** *Crepis*—туфля; по съеменамъ. С. сложноцвѣтнымъ (130). Европа, Азія, Африка, Америка. Однол. или многол. трав. рр. Обыкн. садовая. Съеменами весной.

**К. ауреа (C. aurea, золотистый).** Ю. Европа, Альпы. Цв. головки оранжевыя, осенью. 4—12 д. Многол. **К. рубра (C. rubra, красная).** Южн. Европа. Цв. головки красныя, осенью. 6—12 д. Сип. *Баркхандзія рубра (Barckhansia rubra).*

**КРЕССЪ КЛЮЧЕВОЙ.** См. Кардамине *К. саладъ*. См. Лепидиумъ.

**КРЕСТОЦВѢТНЫЯ рр. (cruciferae).** Многочисленное и важное семейство, дву- и многолѣтнихъ травянистыхъ рр., рѣдко полукустарниковъ. Цвѣты кистью; четыре доли, изъ нихъ двѣ боковыя большія и съ мѣшечатымъ основаниемъ; лепестковъ четыре, расположенныхъ крестообразно; тычинокъ 6 (рѣдко 2 или 4), подпестичныхъ, изъ нихъ 2 наружныя лежатъ противъ боковыхъ долей, а четыре болѣе длинныхъ, по парно, противъ другихъ долей. Плодъ длинный или короткій двугубчатый или двусторчатый стручокъ (коробочка), рѣдко нераскрывающійся. Листья прикоренные или очередные, безъ прилистниковъ. Сем. состоитъ изъ 170 родовъ и почти изъ 1200 видовъ, распространенныхъ по всѣмъ умѣреннымъ и холоднымъ поясамъ земли. Шара. Всѣ имѣютъ острия, возбуждающія, иногда жгучія, противуцѣлительныя свойства. Многія составляютъ необходимую или вкусную пищу. Къ такимъ принадлежатъ: капуста, рѣдька, рѣпа, брюква и пр. Наиболѣе извѣстные роды: Арабисъ, Brassica, Хесперисъ, Хейрантусъ.

**КРЕЩЕНЦІЯ (Crescentia).** Пьетро Кресцензи (Crescenzi), написавшій о землѣхъ въ XIII ст. „Opus ruralium commodorum“, С. биологическихъ. (15). Троп. Америка. Теплолюб. деревья. Смѣсь изъ глины, дерн. съ торф. и пескомъ. Черенками изъ вызрѣваго роста въ разводочномъ парникѣ.

**К. акумината (C. acuminata, съ остро-конечными л.).** Куба. Цв. зеленовато-бѣлые. **К. кукурбитина (C. cucurbitina, съ плодами, какъ тыквы).** Вестиндія. Цв. бѣ-

лые. 10 ф. **К. Куэте (C. Cuete, Cuete).** Ямайка. Цв. бѣлые. 20 ф.

**КРИВОСПИЦЕ.** Яблоко средней поры посѣва, широкой кнзу формой, съ кривымъ стебелькомъ (плодовой вѣткой), зеленоватаго цвѣта кожицей съ сильнымъ румянцемъ, вкусомъ кисло-ватомъ.

**КРИНУМЪ (Crinum).** *Crinum*—греч. названіе лиліи С. амариллисовыхъ. (60). Троп. страны. Оранже. и тепл. луковичныя рр. Сильная глины. дерн. съ торф. и пескомъ. Отпрысками и съеменами.

**К. азіатикумъ (C. asiaticum, азіатскій).** Троп. Азія. Цв. бѣлые, около 20 въ зонтикѣ, въ июлѣ. Оранже. Сип. *К. аноматумъ, деклинатумъ, иликатумъ, процерумъ и синукумъ (C. anomatum, declinatum, plicatum, procerum et sinicum).* **К. Вальфурія (C. Balfourii, Вальфура).** Сокотра. Цв. бѣлые, до 10 въ зонтикѣ, очень душистые, въ октябрѣ. Тепл. **К. капензе (C. capense, съ Миса Д. Н.).** М. Д. Н. Цв. снизу розоватые, по 6—12 въ зонтикѣ, осенью. Оранже. Имѣетъ много разновидностей и гибридныхъ формъ. **К. Карейнумъ (C. Saeguanum, Карей).** О. Магрикия и Сейшельскіе. Цв. по срединѣ розоватые, 4—6 въ зонтикѣ, осенью. Тепл. **К. Керкіи (C. Kirkii, Керка).** Занзибаръ. Цв. зеленоватые, съ красноватой полоской на задней сторонѣ; по 12—15 въ зонтикѣ, въ сентябрѣ. Тепл. **К. Маковани (C. Macowanii, Макъ-Оуана).** Наталь. Цв. бѣлые, по 10—15 въ зонтикѣ, въ ноябрѣ. Оранже. **К. Мурейи (C. Moorei, Мура).** Наталь. Цв. розоватые, по 6—10 въ зонтикѣ, весной или осенью. Оранже. Сип. **К. орнатумъ и Макуанумъ (C. ornatum, C. Macouanum).** **К. пурпурасценсъ (C. purpurascens, пурпуроватый).** Стар. Калабаръ и Фернандо-По. Цв. внутри свѣтло-красные, по 5—9 въ зонтикѣ. Тепл.

**КРИПТАНТУСЪ (Cryptanthus).** *Krypto*—скрывать и *anthos*—цвѣтокъ. (1). Бразилія. С. бромелиевыхъ. Тепл. эпифит. многол. рр.; ухаж. какъ за Вилбергія.

**К. акаулисъ (C. acaulis, безстебельный).** Бразилія. Цв. бѣлые. Сип. *Тилландсія акаулисъ (Tillandsia acaulis).* **К. бивитатусъ (C. bivitatus, съ двойной полоской).** Троп. Америка. Цв. бѣлые; л. съ широкими желтоватыми полосками. Сип. *Вилбергія бивитата (Billbergia bivitata).*

**КРИПТОГРАММЕ (Cryptogramme).** *Kryptos*—скрытый и *gramme*—пшеница; по скрытымъ спорамъ кучкамъ С. папоротниковыхъ. (12). Европа, Африка, Остиндія, Японія, Китай, Остр. Южн.

Океана, С. Америка, Мексика, Антильскіе о.

**К. криспа (C. crispa, курчавое).** Арктич. и сѣв. умѣр. страны. Валъ въ 2 до 4 д. длинной и въ 1½ до 2 д. шириной, тройчато и четверно-перистый. Сип. *Альсозуръ криспенсъ (Allosurus crispus).* Имѣетъ разновидности, заслуживающія вниманія: *акростихоидесъ и Вруниана (acrostichoides et Brunonia).*

**КРИПТОКОРИНЕ (Cryptocoryne).** *Kryptos*—скрытый и *coryne*—клубень, клубневидный початокъ скрытъ въ чешлѣ. С. ароидей (25). Троп. Азія, Малайск. архип. Тепл. трав. многол. Глины. дерн. съ торф. Длениемъ и съеменами. Темп. лѣтомъ 13—21°, зимой 6—10°.

**К. циліата (C. ciliata, рѣснчатая).** Остиндія. Цв. пурпурово-зеленые, пахучіе, въ маѣ—июнѣ. 1 ф.

**КРИПТОМЕРІЯ (Cryptomeria).** *Kryptos*—скрытый и *meris*—часть; по скрытымъ частямъ цв. С. хвойныхъ. (1). Японія, С. Китай. Оранже., а въ умѣр. климатѣ выносливыя деревья. Чистая глины. дерн. Съеменами и черенками въ песокъ, подъ стекломъ.

**К. японика (C. japonica, японская).** Японія. Лл. спиральнораспол., скривленные; стволъ прямой, вѣтви распростертыя. 50—100 ф. Имѣетъ разновидности: *Лобби (Lobbi), нана (nana), пилеа (pyramis)* и *спиральисъ (spiralis).* **К. элегансъ (C. elegans, изящная).** Японія. Лл. линейные, серповидные; стволъ прямой, вѣтви горизонтальныя, короткія. 20 ф. и выше.

**КРИПОСТЕГІЯ (Cryptostegia).** *Kryptos*—скрытый и *stego*—покрывать; па чешуйкамъ, покрывающимъ въ устьѣхъ пыльники. С. ласточниковыхъ. Вьющаяся тепл. рр. Глины. дерн. съ торф. Черенками въ песокъ, въ развод. парникахъ.

**К. грандифлора (C. grandiflora, крупноцвѣтная).** Остиндія. Цв. красно-пурпуровые, въ июлѣ. 6 ф.

**КРИПОСТЕММА (Cryptostemma).** *Kryptos*—скрытый и *stemma*—вѣнецъ; по скрытымъ вѣточкамъ. С. сложноцвѣтныхъ. (3). М. Д. Н. Трав. полувысокія. рр. Съеменами весной, въ парникѣ, затѣмъ въ грунтѣ.

**К. календуляцеумъ (C. calendulaceum, поготовая).** М. Д. Н. Цв. головки съ блѣдно-желт. лучами, нижняя сторона которыхъ пурпуровая, въ маѣ—июнѣ. Нижнее однол. **К. нивеумъ (C. niveum, снѣжнобѣлая).** М. Д. Н. Цв. головки желтыя, стебель и листья мѣстами блѣдно-пуншые. Трав. р. Сип. *Микростефиумъ нивеумъ (Microstephium niveum).* **К. Фрѣзіанумъ (C. Forbesianum, Фрѣса).** М. Д. Н. Цв. головки желтыя, дискъ темный, лѣтомъ. Безстебельное р.



**КРИТОХИЛЮСЪ** (*Cryptochilus*). *Kryptos* — скрытый и *cheilos* — губа, по губѣ скрытой долями. С. орхидей. (2). Индія. Тепл. эпифитн. орхидей. Волокни. торф. съ гнилушками. Дѣленіемъ.

**К. сангвинейя** (*C. sanguinea*, кроваво-красный). Непаль. Цв. ярко-шарлаховые, лѣтомъ.

**КРИСТАРИЯ** (*Cristaria*). *Crista* — гребешокъ. С. мальвовыхъ. (20). Юж. Америка. Тропическія травы. рр., въ садахъ не встрѣчаемыя.

**КРИТМУМЪ** (*Critmum*). *Krithe* — ячмень, по сходству съмени. С. зонтичныхъ (1). 3. Европа. Средиземное побережье, Канарскіе о. Полукуст. трав. р. Дѣленіемъ. Съменами, какъ только созрѣютъ. Обычны.

**К. маритимумъ** (*C. maritimum*, морской). Критъ. Европа. Цв. бѣлые, въ августѣ. 1 ф.

**КРОВАЯ** (*Crowea*). Джемъ *Крова* (*Crowe*) англійскій ботаникъ, занимавшійся специально изслѣдованіемъ ив. С. рутовыхъ. (3). Австралія. Оранже. куст. рр. Глин. дерн. съ торф. Черенками въ разводч. парничкѣ.

**К. аугустифолия** (*C. angustifolia*, узколистная). 3. Австралія. Цв. красные. 1—3 ф. **К. салigna** (*C. saligna*, похотная на иву). Нов. Ю. Вальс. Цв. свѣтло-малиновые. 1—2 ф. Спн. **К. латифолия** (*C. latifolia*).

**КРОВЯНИКОВЫЯ** рр. (*haemodogaseae* или *haemodogaeae*). Многолѣтнія травянистыя рр., встрѣчаемыя на Мысѣ Д. Над., въ Сѣв. и Юж. Америкѣ, центральной и восточной Азіи и Ю.-З. Австраліи. Нѣкоторыя имѣютъ корни, въ кот. содержится кроваво-краснаго цвѣта краска, что и дало поводъ къ ихъ наименованію. Родовъ 26, видовъ 120. Главнѣйшіе роды: *Ангиозантусъ*, *Вахендорфія* и *Хемодорумъ*.

**КРОКОЗМІЯ** (*Crocasmia*). *Crocus* — шафранъ и *oste* — запахъ, по запаху сухихъ цвѣтовъ, когда ихъ положить въ теплую воду. С. косатиковыхъ. (1). Юж. Африка. Одинъ только полувыносл. видъ многол. лукович. р., цвѣтнато въ садахъ подъ именемъ Тритонія.

**К. aurea** (*C. aurea*, золотистая). Юж. Африка. Цв. ярко-оранжевые, лѣтомъ и осенью. Воспит. въ горшкахъ, въ оранж. Земля легкая, сытная, песчанистая. Размнож. отпрысками и съменами въ оранж. 2 ф. Спн. *Tritonia aurea* (*Tritonia aurea*).

**КРОКУСЪ** (*Crocus*). Названіе, употребленное Теофрастомъ, С. косатиковыхъ (70). Европа, Восточн. и Средн. Азія. Выносл. клубневые рр. Песч. дернов. Съменами, молодыми клубышками.

**К. aureus** (*C. aureus*, золотистый). Ю.-В. Европа. Цв. ярко-оранжевые, весной. Первый крокусъ вошедшій въ сады и образовавшій много формъ. Спн. **К. менсфелдъ** (*C. mensfeldii*), **К. лагенаселлусъ** (*C. lagenasellus*), **К. бифлорусъ** (*C. biflorus*, двуцвѣтн.). Италия до Кавказа. Цв. отъ бѣлыхъ до бѣдно-лиловыхъ. Спн. **К. Аддами**, **К. Велденіи**, **К. минимусъ**, **К. пубигенусъ**, **К. эстриатусъ** (*C. Adami*, *C. Weldenii*, *C. minimus*, *C. pubigenus*, *C. estriatus*). **К. Борн** (*C. Boryi*, Борн). Греческ. о. Цв. бѣлые, съ желто-оранжев. горлышкомъ, а у основанія съ темно-пурп. черточками, поздно осенью. 3—4 д. **К. верзиколоръ** (*C. versicolor*, разноцвѣтн.). Приморскія Алены. Цв. отъ пурпуровыхъ до бѣлыхъ, или съ пурпуровыми черточками на наруж. сторонѣ, весной. Спн. **К. фрэгранс** (*C. fragrans*), **К. вернаусъ** (*C. vernus*, весенний). Европа. Цв. лиловые, фіолетовые, бѣлые (но никогда не б. желтые) или полосатые бѣлые съ фіолетовымъ, весной. Замѣчательн. разнообразіемъ окраски цв. **К. Императи** (*C. Imperati*, имперскій). Италия. Цв. пурпурово-лиловые внутри, пахучіе, рано весной. 3—6 д. **К. иридисфлорусъ** (*C. iridiflorus*, съ цв. косатика). Бакаръ и Трансильванія. Цв. ярко-пурпуровые съ бѣдно-лиловыми внутр. сегментами, въ сентябрѣ. Спн. **К. бизантинусъ** (*C. bysantinus*), **К. нудифлорусъ** (*C. nudiflorus*, съ голыми цв.). Ю.-З. Европа. Цв. ярко-пурпуровые или фіолетовые, осенью. Спн. **К. мултифидусъ**, **К. пурпурусъ** и **К. фимбриатусъ** (*C. multifidus*, *purpureus* et *fimbriatus*). **К. специозусъ** (*C. speciosus*, отъбѣнный). В. Европа и 3. Азія. Цв. ярко-лиловые съ темно-пурпуровыми полосками, осенью. **К. сузіанусъ** (*C. Susianus*, сузіанскій). Кавказъ, Крымъ. Цв. темно-оранжевые, снаружи съ коричневыми черточками, въ февралѣ 3 д. Одинъ изъ самыхъ раннихъ крокусовъ. Спн. **К. револотусъ** (*C. revolutus*).

**КРОНА**. Вершина дерева съ листвою.

**КРОПЪ**. См. Критмумъ.

**КРОССАНДРА** (*Crossandra*). *Krossos* — бахрама и *aner*, *andros* — пыльникъ, по бахромчатымъ пыльникамъ. С. акантовыхъ. (5). Остиндія, троп. Африка и Мадагаскаръ. Тепл. куст. рр. Торф. съ глин. дерн. Черенками въ разводч. парничкѣ.

**К. гвинеезисъ** (*C. guineensis*, гвинейская). Запад. часть троп. Африки. Цв. бѣдно-лиловые, въ октябрѣ. Стебель въ 2—3 д.

**КРОТАЛЯРИЯ** (*Crotalaria*). *Krotalon* — кастанетъ; стручки вздутые, при трясеніи издаютъ трескъ отъ сѣмянъ. С. бобовыхъ. (200). Жаркія страны. Теплич. или оранж. полукуст. и трав. рр. Глин.

дерн. съ торф. Съменами и черенками. Не охотно воспитываются въ садахъ, и что трудно защитить отъ краснаго паучка.

**К. каянифолия** (*C. cajanifolia*, съ лл. Кайнуса). Мексика. Цв. желтые, въ июль. 4—6 ф. Оранже. куст. **К. Куннигаміи** (*C. Cunninghamii*, Куннигама). С.-З. и Центр. Австралія. Цв. зеленовато-желтые, лѣтомъ. Оранже. куст. р. **К. юнсеа** (*C. juncea*, тростниковая). Индія. Цв. желтые, въ июль. 4—8 ф. Тепл. однол.

**КРОТОНЪ** (*Croton*). *Kroton* — клещъ, по сходству сѣмянъ. С. молочайныхъ. (500). Троп. страны. Дрв. и кустар., рѣдко травяни. рр. Имѣютъ экономическое, но не садовое значеніе. Въ садахъ подъ этимъ названіемъ воспитываютъ рр. принадлежащія къ Кодіеумъ (см. это слово).

**КРОТЪ**. Подземный звѣрокъ, питающійся червями и личинками, но не корнями растений.

**КРОФОРДІЯ** (*Crawfordia*). Дж. *Крофордъ* (*Crawford*) былъ губернаторомъ въ Сингапорѣ и написалъ изслѣдованіе индійскаго архипелага. С. горечавковыхъ. Полувыносл. цѣлкія трав. рр., встрѣчающіяся на о. Малайскаго архипелага, въ Остиндіи, Японіи и Манчжуріи. Сѣмь изъ глин. дерн. съ пескомъ и торф. Съменами и черенками.

**К. специоза** (*C. speciosa*, отъбѣнная). Гималаи. Цв. пурпуровые; лл. овальные. **К. фасцикулата** (*C. fasciculata*, пучечная). Гималаи. Цв. пурпуровые. Лл. ланцетовидные.

**КРЪЖКА**. Мѣра жидкостей, десятая часть ведра, двѣ бутылки.

**КРУПЯНКА**. Груша средней величины, порядочнаго вкуса, зеленого цвѣта съ красными крапинками (крупяниками).

**КРУЦАНЕЛЬДЯ** (*Crucianella*). Уменьшительное *crus* — крестъ, по крестообразному положенію лл. С. мареновыхъ. (26). Средизем. побережье, 3 Азія. Одно- и многол. трав. рр., большую часть выносливы. Обыкновен. садовая. Съменами или дѣленіемъ весной и осенью.

**К. маритима** (*C. maritima*, приморская). Средиз. побережье. Цв. бѣлые, въ июль—августъ. Полукуст. Многол. **К. суавеоленс** (*C. suaveolens*, съ пріятнымъ запахомъ). 3. Азія. Цв. желтые, въ июль. Многол.

**КРУШІНА**. См. Рамнусъ.

**КРУШИНОВЫЯ** рр. (*rhamnaceae*) Приморскія или цѣлкія, часто колючія древесныя, кустарныя, либо — рѣдко, травянистыя породы, встрѣчаемыя преимущественно въ жаркихъ и тропическихъ поясахъ. Въ этомъ сем. 37 ро-

довъ и около 430 видовъ. Говенія, Паліурусъ, Помадеррисъ и Рамнусъ.

**КРЫЛАТКА**. Плодъ имѣющій крылья.

**КРЫЛО**. Боковой лепестокъ мотыльковыхъ цвѣтковъ.

**КРЫЛАТЫЙ**. Имѣющій перепончатое или тонкое крыло, либо растяженіе.

**КРЫЖОВНИКЪ**. См. Рябесъ.

**КРЮЧЕКЪ**. Небольшой крюкъ для прищипливанія отводковъ. Родъ мотыги или кирки. Коса небольшой величины.

**КСАНТИСМА** (*Xanthisma*). *Xanthisma* — желтизна; по окраскѣ цв. С. сложноцвѣтныхъ. (1). Однол. или двул. трав. р. Съменами въ апрѣлѣ.

**К. тексанумъ** (*X. texanum*, тексаская). Техасъ. Цв. головки желтыя, хохолокъ красноватый, лѣтомъ. 1½—2½ ф.

**КСАНТОЗИЯ** (*Xanthosia*). *Xanthos* — желтый, по желтому пуху у птк. видовъ. С. зонтичныхъ. (17). Австралія. Оранже. трав. или низкія кустарн. рр. Ухождъ какъ за Трахимене.

**К. рогундифолия** (*X. rotundifolia*, круглолистная). Цв. бѣлые, въ июль. 1—2 ф.

**КСАНТОРЕА** (*Xanthorrhoea*). *Xanthos* — желтый и *theo* — течъ; по смолистому соку р. С. ситовниковыхъ. (11). Австралія. Оранже. многол. трав. съ бѣлыми цв. Торф. съ глин. дерн. Отпрысками.

**К. Прейссии** (*X. Preissii*, Прейса). Цв. колосьями, въ апрѣлѣ. 6—15 ф.

**КСАНТОРИЦА** (*Xanthorhiza*). *Xanthos* — желтый и *rhiza* — корень; по желтымъ корнямъ и корневищу. С. лютиковыхъ. (1). Выносл. низкій кустарн. Обыкн. садовая. Отпрысками.

**К. апифолия** (*X. apiifolia*, съ лл. какъ у Апиумъ). С. Америка. Цв. темно-пурпуровые, въ мартъ и апрѣлѣ. 2—3 ф.

**КСАНТОСОМА** (*Xanthosoma*). *Xanthos* — желтый и *soma* — тѣло; по большому рыльцу. С. ароидныхъ. (25) Троп. Америка. Тепл. многол. трав. рр. содержащія млечный сокъ. Сильная легкая. Черенками изъ стебля и корневища въ легкой а., въ парникѣ.

**К. Бариллери** (*X. Barilleri*, Барилле). Бразилія. Лл. на длинныхъ черешкахъ, ланцетные съ перстовидными раздѣлами; средній длин. отъ 1 до 1½ ф. **К. виоласеумъ** (*X. violaceum*, фиолетовая). Вестиндія. Чехолъ снаружи свѣтло-фиолетовый, внутри — желтоватый; лл. стрѣловидно-овальные, вытянутые. **К. Линденіи** (*X. Lindenii*, Линдена). Новая Гренада. Лл. продолговатоконечные, длиною въ 1 ф., съ бѣлыми жилками. Спн. *Phyllotaenium Lindenii* (*Phyllotaenium Lindenii*).

**КСАНТОХИМУСЪ** (*Xanthochymus*)



mus). *Xanthos*—желтый и *chymos*—сокъ; по содержащемуся въ р. желтому соку. С. гуммигутовых. (4). Троп. Азия и Африка, Мадагаскаръ. Тепл. древ. пр. Глин. дерн. съ торф. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ песокъ, въ парникъ.

**К. пикторіусъ** (*X. pictorius*, живописцевъ). Индія. Цв. бѣлые, лѣтомъ; плоды шаровидные, величиною въ яблоко. 40 ф. Изъ р. вытекаетъ сокъ, превращающійся въ гуммигутъ. Сип. *Garcinia xanthochymus* (*Garcinia xanthochymus*).

**КСАНТОЦЕРАСЪ** (*Xanthoceras*). *Xanthos*—желтый и *keras*—рогъ; между лепестками два железковыхъ рожекъ. С. мыловинковыхъ. (1). Оранж. древ. р. Глин. дерн. съ пескомъ. Съеменами.

**К. сорбиболія** (*X. sorbitolia*, съ л. какъ у Сорбуся). Китай. Цв. бѣлые; плоды величиною въ яблоко, трехгубные. 5—15 ф.

**КСАНТОЦЕФАЛУМЪ** (*Xanthoccephalum*). *Xanthos*—желтый и *kephale*—голова, по желтымъ цв. головкамъ. С. сложнотѣпныхъ. (8). Экваторъ и Мексика. Оранж. трав. или полукуст. пр. Гл. дерн. съ листов. Черенками и дѣленіемъ.

**К. гимноспермидесъ** (*X. gymnospermoides*, похожий на Гимноспермумъ). Новая Мексика. Цв. головки желто-оранжевые, въ сентябрь. 2—4 ф. Многол. Сип. *Gutierrezia gymnospermoides* (*Gutierrezia gymnospermoides*).

**КСЕРАНТЕМУМЪ** (*Xeranthemum*). *Xeros*—сухой и *anthemon*—цв.; цв. сохраняютъ форму и запахъ въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ. С. сложнотѣпныхъ. (5). Востокъ, Средиземное побережье. Однол. травы. Уходъ какъ за Хелихризумъ и Хелинтерумъ.

**К. аннуумъ** (*X. annuum*, однолѣтний). Ю. Европа. Цв. головки пурпуровыя, въ июль. 2 ф.

**КСЕРОНЕМА** (*Xeronema*). *Xeros*—сухой и *nema*—нить, по сухимъ тычинкамъ и пестикамъ. С. лилейныхъ. (1). Тепл. многол. трав. р. Песков. глин. дерн. съ листов. Съеменами или дѣленіемъ.

**К. Муреи** (*K. Moorei*, Мура). Нов. Каледонія. Цв. ярко-малиновые. 20 ф.

**КСЕРОФИЛЛЮМЪ** (*Xerophyllum*). *Xeros*—сухой и *phyllo*—листь, по сухимъ лл., какъ у злаковъ. С. лилейныхъ. (1). Многол. полувыносл. трав. р. Торф. Дѣленіемъ.

**К. асфоделойдесъ** (*X. asphodeloides*, похожий на Асфоделюсъ). С. Америка. Цв. бѣлые, въ маѣ. 1—2 ф.

**КСЕРОТЕСЪ** (*Xerotes*). *Xerotes*—сухость, по сухой листь. С. ситовниковыхъ. (30). Австралія. Оранж. многол., рѣдко однол. трав. пр. Легкая, сильная. Дѣленіемъ корня.

**К. лонгифолія** (*X. longifolia*, длиннолиственный). Цв. зеленовато-бѣлые, въ июнь. 3 ф. **К. ригида** (*X. rigida*, жесткій). Цв. зеленоватые, въ июнь. Стебель едва вырастающий, толстый.

**КСИЛОБИУМЪ** (*Xylobium*). *Xylon*—дерево и *bios*—жизнь; по веществамъ, на кот. живутъ эти пр. С. орхидей. (16). Американскіе эпифиты, близкіе къ *Максилляріи*, подобно которымъ и воспитываются.

**К. конкавумъ** (*X. concavum*, съ вогнутою губой). Гватемала. Цв. блѣдно-желтые, губа съ розовыми жилками. 9 д. Сип. *Максиллярія конкава* (*Maxillaria concava*). **К. скваленсъ** (*X. squalens*, грязный). Бразилія. Цв. грязно-тѣлесные, губа съ пурпуровыми черточками. Сип. *Максиллярія скваленсъ*, *Дендробиумъ скваленсъ* (*Maxillaria squalens*, *Dendrobium squalens*).

**КСИЛОПІЯ** (*Xyloria*). Сокращеніе *xyloricron*, которое составлено изъ *xylon*—дерево и *pigeros*—горькій; древесн. пѣк. видовъ имѣетъ чрезвычайно горькій вкусъ. С. аноновыхъ. (30). Тепл. куст. и древ. пр. Индія, Африка и Америка. Песков. глин. дерн. съ волоки. торф. и съ добавкой черенковъ, древ. угля и сухого коровьяго навоза. Черенками изъ вырѣзаннаго роста въ песокъ и теплѣ. Темп. зимой 8—10, лѣтомъ 13—24°.

**К. глѣбра** (*X. glabra*, гладкая). Вестиндія, Венецуела и Гвѣана. Цв. шелковистые. 20 ф.

**КСИЛОМЕЛУМЪ** (*Xylomelum*). *Xylon*—дерево и *melon*—яблоко, по твердому плоду. С. протейныхъ. (4). Австралія. Оранж. древ. или высокая куст. пр. Песков. торф. съ волоки. глин. дерн. Черенками изъ молодого роста, по довольно крѣпкого, или съеменами въ теплѣ.

**К. пириформе** (*X. pyriforme*, грушевидный). Цв. плотными колосьями; плоды длиною до 3 д. грушевидные. Дерево средней величины.

**КСИМЕНІЯ**. См. Хименія.

**КСИРИДОВЫЯ** пр. (*xurideae*). Малочисленное сем. пр., похожихъ на тростникъ или осоку, широко распространенныя по жаркимъ странамъ, часто въ водѣ. Состоятъ изъ 50-ти видовъ, принадлежащихъ къ родамъ *Абобода* и *Ксирисъ*.

**КСИРИСЪ** (*Xyris*). Такъ называлъ Dioscorides Ирисъ фѣтидиссима. С. ксиридовыхъ. (40). Тепл., оранж. или полувыносл. многол., рѣже однол. пр., похожія на тростникъ или осоку. Австралія, С. Америка. Легкая, сильная. Дѣленіемъ корня.

**К. оперкулата** (*X. operculata*, съ крышечкой). Австралія. Цв. головки шаровид-

ные съ черными чешуйками, въ июнь. Тепл. многол. р.

**КСИСМАЛОВІУМЪ** (*Xysmalobium*). *Xysma*—частича и *lobos*—раздѣлъ, по мелкимъ раздѣламъ коронки. С. ластовичныхъ. (8). Тепл. или оранж. многол. трав. пр. изъ Ю. Африки.

**К. радиоліумъ** (*X. radifolium*, съ лл. какъ у черемухи). Такъ называется теперь *Гомфокарпусъ радиоліусъ* (*Gomphocarpus radifolius*). Ю. Африка. Цв. зеленовато-пурпуровые. 3 ф. Тепл. трав. р.

**КСИФИДИУМЪ** (*Xiphidium*). *Xiphos*—мечъ и *eidōs*—сходство, по лл. С. кровяниковыхъ. (2). Тепл. многол. пр. изъ Троп. Америки. Глин. дерн. пополамъ съ торф. и пескомъ. Дѣленіемъ корня. Темп. лѣтомъ 13—24, зимой 10—13°.

**К. флорибундумъ** (*X. floribundum*, обильно цвѣтущій). Вестиндія. Цв. бѣлые или голубые, въ маѣ—июнь. 1—2 ф. Сип. *К. албидумъ* (*X. albidum*).

**КУВЫШКА ЖЕЛТАЯ**. См. Пуфаръ.

**КУВЫШКОВЫЯ** пр. (*perenthaeae*). Семейство это имѣетъ только одинъ родъ, — *Нелентесъ* и до 30 видовъ кустарныхъ и полукустарныхъ породъ, встречаемыхъ въ тропической Азій, на Мадагаскарѣ, Сейшельскихъ ос., въ тропич. Австраліи, Малой Каледоніи и особенно на ос. Малайского архипелага. Замѣчательны листьями, кот. оканчиваются пучкомъ въ видѣ кувшина, прикрытаго крышечкой, въ которомъ часто содержится вода.

**КУВЫШКОВЫЯ** пр. (*nymphaeaeae*). Малочисленное семейство прѣсноводныхъ травянистыхъ пр., распространенныхъ по всей земной поверхности. Родовъ 8, видовъ 35. Кабомба, *Нелюмбумъ*, *Нимфеа* и *Викторія*.

**КУЗИНІЯ** (*Cousinia*). *Кузенъ* (*Cousin*)—французскій ботаникъ. С. сложнотѣпныхъ. (126). За исключеніемъ одного вида (*волгензисъ*, *wolgensis*, т.-е. поволжскій) всѣ остальные азіатскіе. Изъ нихъ только упоминаемый ниже встрѣчается въ садахъ. Обыкновенная. Съеменами и дѣленіемъ.

**К. хистриксъ** (*C. hystrix*, колючая). Востокъ. Цв. головки пурпуровыя, въ июнь. 2 ф. Выносливое двул. травяни. р.

**КУКІЯ** (*Cookia*). Канит. Джемсъ *Кука* (Cook), знаменитый мореплаватель. С. рутовыхъ. (1). Тепл. дерево, входящее теперь въ родъ *Клаусени*. Торф. съ глин. дерн. Черенками изъ зрѣлаго роста въ маргъ, въ разводоч. парникѣ. Темп. зимой 8—10, лѣтомъ 13—21°.

**К. пунктата** (*C. punctata*, точечная). Китай. Разводится въ многія тропич. стра-

нахъ, даетъ плодъ, высоко цѣнимый въ Китаѣ и на о. Индѣйскаго архипелага. Цв. бѣлые, въ июнь—июль. 20 ф.

**КУКОЛЕКЪ**. См. Агроктема.

**КУКОЛКА**. Насѣкомое въ предпоследней степени своего развитія, также см. Діантусъ.

**КУКОЛЬ**. Часть цвѣтка, имѣющая видъ колпачка или башлыка.

**КУКУМИСЪ** (*Cucumis*). Происхожденіе названіе неопредѣленное. С. тыквенныхъ. (20). Троп. Азия, Африка, Америка, Австралія. Полувыносл. одно- и многол. цѣпкія пр. Съеменами въ парникѣ, содержатся тамъ-же или лѣтомъ на воздухѣ.

**К. ангурія** (*C. Anguria*, ангурія). Ямайка. Цв. одиночные, въ июнь до августа; плоды бѣлые, шаровидные, съ сосочками.

**К. Мело** (*C. Melo*). *Дыня*. Азія. Цв. въ июль; плоды овальные, почти шаровидные, мякоть сахаристая, желтая, красная, бѣлая или зеленая. Имѣетъ много разновидностей. **К. сативусъ** (*C. sativus*, съдомый). *Огурецъ*. Отечество неизвѣстно. Цв. съ июля до октября. Плоды удлиненные, гладкіе или съ колючками, обычно глянцевитые. Число разновидныхъ сортовъ значительное. Парниковые, или ранние,—въ теплицѣ или парникѣ, градовые—на воздухѣ.

**КУКУРВИТА** (*Cucurbita*). *Cucumis*—огурецъ и *orbis*—шаръ, по формѣ плодовъ. С. тыквенныхъ. (10). Азія, Африка, Америка. Полувыносл. цѣпкіе трав. пр., требующія такого-же ухода, какъ *Кукумисъ*.

**К. максима** (*C. maxima*, большая). *Кусонная тыква*. Отечество неизвѣстно. Цв. въ июль. Плоды желтые, красные или зеленые, шаровидные, иногда приплюснутые. Разводится въ обширномъ размѣрѣ во всѣхъ теплыхъ и умеренныхъ климатахъ. **К. мошата** (*C. moschata*, мускусовая). *Египетская тыква*. Цв. въ июль. Плоды приплюснутые. Отечество неизвѣстно. **К. пепео** (*C. Pepo*). *Тыква настоящая*. Левантъ. Цв. въ июль—августъ. Плоды округлые или продолговатые, гладкіе. Имѣетъ много разновидностей, изъ которыхъ наиболѣе разводится *аурантия* (*aurea*, оранжевая), *веррукса* (*verrucosa*, бородавчатая) и *овифера* (*ovifera*, яйцевидная). **К. переннисъ** (*C. perennis*, многолѣтняя). Происхожденіе не опредѣлено. Плоды сидячіе, округлые, гладкіе.

**КУКУРЪЗА**. См. Цea.

**КУКУШКИНЫ СЛЕЗКИ**. См. Орхисъ.

**КУКУШНИЦА**. См. Мускари.

**КУЛЬБАЗІЯ** (*Culcasia*). *Kulcas*—арабское названіе *Калоказіи* антикворумъ.



С. арондей. (7). Троп. Африка. Тепл. вьющ. рр., сходный съ Филодендронъ. Уходъ какъ за Калоказія или Филодендронъ.

**К. сканденсъ** (C. scandens, лазящая). Вестиндія. Цв. чехлы коричневатые, въ іюль. Стебли вьющіеся.

**КУМКВАТЬ**. См. Цитрусь.

**КУНЖУТЬ**. См. Сезамумъ.

**КУНИЛЯ** (Cunila). Старинное латинское названіе неизвѣстно какого-то растенія. С. губоцвѣтныхъ. (12). С. Америка, Мексика, Бразилія. Трав. или полукуст. выноса. многол. рр. Глин. дерн. съ торф. Дѣленіемъ.

**К. маріана** (C. mariana, изъ Мариланды). Отъ Нью-Йорка до Огайо, Иллинойса и южнѣе. Цв. пурпуровые, въ іюль до сентября. 1 ф.

**КУНІЯ** (Kuhnia). Адамъ Кунъ (Kuhn), американскій ботаникъ. С. сложноцвѣтныхъ. (1). С. Америка. Многол. трав. р. Песков. глин. дерн. Дѣленіемъ весной.

**К. эвпаторіойдесъ** (K. eupatorioides, похожая на Эвпаторіумъ). Цв. головки млечно-бѣлыя, въ сентябрѣ.

**КУННИНГЪАМІЯ** (Cunninghamia). Д-ръ и А. Куннингамъ (J. и A. Cunningham) два англійскихъ ботаника. С. хвойныхъ. (1). Японія, Китай. Оранж. древ. р. Легкая. Сѣменами и черенками.

**К. синензисъ** (C. sinensis, китайская). Китай. Стволъ прямой, цилиндр. въ 40—50 ф.; лл. сидячіе, обращенные по всѣмъ сторонамъ, жесткіе, остроконечные; шишки величинаю въ грецкій орѣхъ.

**КУНОНІЯ** (Cunonia). Иоганъ-Христіанъ Кунно (Cunno), голландецъ, описавшій свой садъ въ стихахъ (1750). С. камнеломковыхъ. (1). Ю. Африка. Нов. Каледонія. Оранж. дер. Глин. дер. съ торф. Черенками въ песокъ, въ разв. парничкѣ.

**К. капензисъ** (C. capensis, съ Мыса Д. Н.). М. Д. Н. Цв. бѣлые, въ августѣ. 10—50 ф. Высокій кустъ.

**КУНЦЕА** (Kunzea). Густавъ Кунце — (Kunze) врачъ и ботаникъ въ Лейпцигѣ. † 1851. С. миртовыхъ. (15). Австралія. Оранж. кустарн. р. Уходъ какъ за Кальлистемонъ.

**К. Бакстеріи** (K. Baxterii, Бакстера). Цв. большіе, какъ у Кальлистемонъ, съ ярко-красными лепестками. **К. кориболия** (K. coriifolia, съ лл. какъ у Корисъ). Цв. бѣлые. Высокій кустъ.

**КУПАНІЯ** (Cupania). Патеръ Францискъ Купани (Cupani), италіанскій монахъ, написавшій „Hortus Catholicus“. † 1710. С. мыловинковыхъ. (30). Троп. страны. Теплич. дер. Глин. дерн. съ торф. Черенками изъ полурѣзлаго роста въ

разводочн. парничкѣ. Темп. лѣтомъ 13 до 24°, зимой 10—13°.

**К. американъ** (C. americana, американская). Ю. Америка. Цв. желтоватые. 30 ф. Сип. **К. томентоза** (C. tomentosa).

**КУПАЛЬНИЦА**. См. Трельзіусъ.

**КУПЕРІЯ** (Cooperia). Д-ръ Куперъ (Cooper)—искусный садоводъ въ Іокнайрѣ. С. амариллисовыхъ. (2). Мексика, Техасъ. Оранж. или полувывонослив. луков. рр. Песчанисто-дернов. Сѣменами и отпрысками. Рр. пахнутъ какъ примула.

**К. Друммонди** (C. Drummondii, Друммонда). Техасъ. Цв. бѣлые, въ августѣ. 6—9 д. **К. педункулата** (C. pedunculata, на ножкахъ). Техасъ. Цв. бѣлые, въ августѣ.

**КУПРЕССУСЪ** (Cupressus) **Кно**—производитъ и *parisios*—равный, по симметрическому росту. С. хвойныхъ (12). ЮЗ. Европа, умѣр. Азія, С. Америка, Мексика. Оранж. или въ умѣр. климатѣ воздушн. древ. рр. Сильная, глин. дерн. Сѣменами и черенками.

**К. Говеніана** (C. Goveniana, Гоуена). Калифорнія. Лл. чешуйчатые, ярко-зеленые; вѣтви тонкія, неправильно разбросанныя. 15—20 ф. Сип. **К. Хартовегги** и **калifornика** (C. Hartwegii et californica).

**К. луситаніка** (C. lusitanica, португальскій). Гоа. Лл. черепчатые, четырьмя рядами; вѣтви гибкія. 40—50 ф. Сип. **К. глянца** (C. glauca).

**К. Макнабиана** (C. Mac-Nabiana, Мак-Наба). С. Каролина. Лл. мелкіе, чешуйчатые, въ четыре ряда. Вѣтви короткія. Сип. **К. glandulоза** и **К. нивалис** (C. glandulosa et C. nivalis).

**К. макркарпа** (C. macrocarpa, крупноплодный). Ю. Калифорнія. Лл. темно-зеленые, плотно-налегающіе. **К. семпервиренсъ** (C. sempervirens, всегда зеленый). Кипарисъ. Ю.-З. Европа, Малая Азія. Растъ пирамидальный; лл. гладкіе, желтовато-зеленые; до 100 ф. Сип. **К. горизонтальисъ**, **К. индика** (C. horizontalis, C. indica).

**К. тортулоза** (C. tortulosa, скрученный). Гималаи. Лл. спяые, прижатые, мелкіе, тонкіе; вѣтви скрученные. 50—70 ф. Сип. **К. пенсильваніс** (C. pensilvanica). **К. фунебрисъ** (C. funebris, могильный). С.-В. Китай. Лл. желтоватые, чешуйчатые, прижатые; вѣтви горизонтальныя, потомъ пониклыя Сип. **К. пендула** (C. pendula).

**КУРАЙ**. См. Дорема.

**КУРАТЕЛЬЯ** (Curatella). **Куратос**—работный; лл. жесткіе, употребляютъ въ Гвѣяѣ для полировки металла. С. дилленіевыхъ. (2). Юж. Америка. Тепл. куст. рр. Песчанист. глин. дерн. съ торф. Черенками въ песокъ, въ развод. парничкахъ.

**К. американъ** (C. americana, американ-

ская). Ю. Америка. Цв. бѣлые. 10 ф. Кора опадаетъ лоскутами.

**КУРКУЛИГО** (Curculigo), **Куркуліо**—долгоносикъ, насекомое: сѣмена имѣютъ отростокъ, похожій на хоботокъ этого животнаго. С. амариллисовыхъ. (12). Троп. страны. Сѣмѣ изъ глин. дерн. съ торф. по ровну. Отпрысками.

**К. рекурвата** (C. recurvata, согнутое). Остиндія. Цв. желтые, головками, лл. согнутые, ланцетовидные, складчатые. Имѣетъ разнов. *striata* (striata) съ одной бѣлой по срединѣ полосой и *variegata* (variegata) съ нѣсколькими бѣлыми полосками.

**КУРКУМА** (Curcuma). **Куркум**—арабское названіе. С. цибриновыхъ. (30). Троп. Африка, Австралія, ост. Тихаго Океана. Тепл. трав. многол. Сильная песчанисто-глин. дерн. Дѣленіемъ.

**К. альбифлора** (C. albiflora, бѣлоцвѣтная). Цейлонъ. Цв. бѣлые и желтые, въ іюль. 2 ф. **К. австралязика** (C. australasica, австралийская). Австралія. Цв. желтые. **К. кордата** (C. cordata, сердцевидная). Остиндія. Цв. красновато-желтые, въ іюль. 1 ф. **К. петиолата** (C. petiolata, черешковая). Перу. Цв. бѣдно-желтые. 1½ ф. **К. Роскоеана** (C. Roscoeana, Роскоа). Остиндія. Цв. шарлаховые, въ августѣ. 1 ф.

**К. рубрикаудисъ** (C. rubricaulis, съ красными стеблями). Остиндія. Цв. красные, въ маѣ. 1 ф.

**КУРОПАТКИ**. См. Циприпедіумъ.

**КУРСЕТІЯ** (Courssetia). **Дюмонъ де Курсе** (Dumont de Courset)—авторъ „Le botaniste cultivateur“ и сотрудникъ „Le bon-jardinier“, книгъ пользующихся авторитетомъ. Теплич. куст. рр. изъ жаркихъ странъ Новаго Свѣта. Глин. дер. съ торф. Черенками изъ новаго роста весной, въ песокъ, въ разводочн. парничкахъ. Темп. лѣтомъ 12—22, зимой 6—10°.

**К. виргата** (C. virgata, вѣтчатая). Тринидадъ. Цв. желтые, въ іюнѣ. **К. томентоза** (C. tomentosa, пушистая). Тринидадъ. Цв. желтые, въ іюнѣ.

**КУРТИЗІЯ** (Curtisia). Уильямъ Куртисъ (Curtis)—англійскій ботаникъ, основавшій „Botanical Magazine“. С. деревовыхъ. (1). Ю. Африка. Оранж. дерево. Песчан. глин. дерн. съ торф. Черенками изъ полурѣзлаго роста, въ песокъ. з., въ развод. парничкѣ.

**К. фагинеа** (C. faginea, похожая на букъ). М. Д. Н. Цв. бѣдныя, мелкіе, въ іюнѣ—іюль. 20—40 ф. Древесина отличается крѣпостью и плотностью.

**КУРИТЬ** Производитъ дымъ отъ сжиганія табака въ помѣщеніи съ растеніями, для уничтоженія тли и трипса.

**КУРЧАВОЛІСТНИКОВЫЯ** рр.

(curtuxideae) присоединены теперь къ сем. амприллисовыхъ.

**КУСКУТА** (Cuscuta). По арабски называется *Keshoud*; по происхожденію это—сомнительно. С. вьюнковыхъ. (30). Умѣр. и жаркія страны. Безлистные, вьющіеся, травянистыя, чужеродныя рр., по имѣнію примѣняе въ садоводствѣ, не смотря на то, что у нѣк. цвѣты красивые и даже хорошо пахнутъ.

**КУСКУТОВЫЯ** рр. (cuscutaceae), безлистные чужеродныя рр., входящіи нынѣ въ составъ сем. вьюнковыхъ.

**КУССОНІЯ** (Cussonia). Пьеръ Кюссонъ (Cusson)—франц. ботаникъ и проф. въ Монпелье. С. арабическихъ. (11). Троп. В. Африка, Юж. Африка, Маскаренскіе о. Глин. дер. съ торф. и пескомъ. Черенками, въ песокъ, подъ стекломъ, на легкомъ теплѣ.

**К. спиката** (C. spicata, колосчатая). М. Д. Н. Цв. расположены спиральнымъ колосомъ. 6—10 ф. **К. тирзифлора** (C. thyrsoflora, тирсовая). М. Д. Н. Цв. кистью. 6—12 ф.

**КУСТАРНИКЪ. КУСТЪ**. Низменное, многостебельное, вѣтвистое растеніе съ деревянистыми стеблями. **КУСТАРНЫЯ НАСАЖДЕНІЯ**. Вываютъ двухъ различныхъ родовъ: изъ рр. съ опадающими и изъ рр. съ остающимися на зиму листьями. При составленіи отдѣльныхъ клумбъ на переднюю сторону сажаютъ низкія, но густовѣтвистыя породы. Въ общемъ кусты не должны сидѣть близко одинъ отъ другого; въ отстраненіи этого-же должно ежегодно осматривать и предупреждать заглушеніе. Самое мѣсто для насажденія должно быть хорошо дренировано и глубоко перекопано, или для каждаго куста вырыта соответственная яма и вынутая земля разрыхлена и удобрена. Лучшая пора для посадки—осень, хотя сажаютъ и весной.

**КУСТИТЬСЯ**. Развѣтвляться, дѣлаться гуще.

**КУТРОВЫЯ** рр. (arocynaceae, аросунаеae). Многочисленное семейство изъ древесныхъ, кустарниковъ, рѣдко травянистыхъ породъ, содержащихъ ядовитый млечный сокъ. Цвѣты правильные, одиночные или цитками; вѣтчикъ колокольчатый или блюдчатый. Листья простые, сунротивные, иногда очередные и даже кольчатые. Къ этому сем. принадлежатъ извѣстные въ садахъ Алыаманда, Вилка, Неріумъ, Табернемонтана.

**КУФЕА** (Cuphea). **Курфос**—искривленный, по формѣ плодики. С. плакуновъ. (90). Троп. Америка. Однол. или теплич. и оранж. травяни. либо куст. рр.



Сильная, глян. дерн. рыхлая. Многол. черенками весною. въ сильномъ теплѣ. На лѣто оранж. виды высаживаются въ грунтъ на воздухъ.

**К. ланцеолатъ** (*C. lanceolata*, ланцетовидная). Мексика. Цв. голубоватые, въ июлѣ. Однол. Син. **К. силеноидесъ** (*C. silenoides*). 1½ ф. **К. пинеторумъ** (*C. pinetorum*, любящая хвойные лѣса). Мексика. Цв. темно-пурпуровые или красно-малиновые, съ июня до сентября. 1½ ф. Син. **К. циннабарина** (*C. cinnabarina*). **К. прокумбенсъ** (*C. procumbens*, приземная). Мексика. Цв. розовые, въ июлѣ. Тепл. однол. **К. Хукера** (*C. Hookeriana*, Хукера). Мексика. Цв. киноварные съ оранжевыми. 2—3 ф. Полукуст. Син. **К. Рёзлии** (*C. Roezlii*).

**КУЧИТЬ**. Сгребать, складывать въ кучу. Приваливать землю къ основанію растенія.

**ЛАВАЗЪ**. Сарай. Амбаръ. Помѣщеніе для сохраненія растеній и овощей.

**ЛАВРОВОЕ ДЕРЕВО**. См. Ляурусъ.

**ЛАВРОВЫЯ** рр. (*Laurineae*). Ароматическія, иногда съ неприятнымъ запахомъ древ. или куст. рр. (Кассита—выходящая трав. р.) преимущ. изъ троп. странъ. Родовъ считается 34, видовъ 900. Главнѣйшіе роды: Камфора, Ляурусъ, Персеа, Сассафрасъ и Циннамомумъ.

**ЛАДАННИКОВЫЯ** рр. (*cistineae*). Куст. и травянистыя, часто липкія рр. съ красивыми цвѣтами о 3 или 5 весьма скоро опадающихъ лепесткахъ. Листья простые, цѣльные. Лучше другихъ извѣстны роды Цистусъ и Хеллантеумъ.

**ЛАЗЯЩЕЕ** или **ЦѢПКОЕ** растеніе. Подымающееся цѣпляясь стеблемъ, черешками листьевъ, не обвивая предмета.

**ЛАКОНОСНЫЯ** рр. (*phytolaccaeae*) Древесныя, кустарныя или травянистыя породы изъ тропическихъ и жаркихъ поясовъ. Видовъ 60, родовъ 19, въ томъ числѣ: Петиверія, Ривина и Фитолакка.

**ЛАКОНОСЪ**. См. Фитолакка.

**ЛАКЪ-ФІОЛЬ**. См. Хейрантусъ.

**ЛАНДШАФТНОЕ САДОВОДСТВО** требуетъ отъ исполнителя вкуса и знанія породъ растеній. При трудности и почти невозможности указаній для каждаго отдѣльнаго случая, можно однако припомнить, что главныя условія заключаются въ слѣд.: выборъ растеній долженъ быть ограниченъ вполне выносливыми породами; высокорослыя помѣщать на задній планъ, низкорослыя—впередъ; устраивать возможно пространныя

лужайки. Значительную красоту ландшафту придаетъ водоемъ, — стоячій или текуцій.

**ЛАНДЫШЪ**. См. Конваллярія. **Л. боровой**. См. Майянтемумъ.

**ЛАПА**. Дерево выпуклое съ корнемъ. Кора.

**ЛАПАЧАТЫЙ**. Похожій на лапу. Ландышвидный.

**ЛАСТОВНЕВЫЯ** или **ЛАСТОЧНИКОВЫЯ** рр. (*asclepiadeae*). Обширное семейство болѣею частью млечныхъ, цѣпкихъ кустарныхъ породъ. Цвѣты ползунтиками, пучками или кистями; цвѣтъ собранъ въ высокообразными массами, прилипами къ кѣсточкамъ пыльниковъ. Листья цѣльные, обычно супротивные.

**ЛАТАТНЫЙ ГОРОШЕКЪ**. См. Лотусъ.

**ЛЕВЕДЪ**. См. Атриплексъ.

**ЛЕВЕДОВЫЯ** рр. (*chenopodiaceae*). Травы или полукустарники съ мелкими цв., у которыхъ покровъ глубоко раздѣленъ. Листья очередные, иногда супротивные, безъ прилистниковъ. Къ семейству этому относятся роды: Атриплексъ, Бета, Спинация, Хеноподіумъ.

**ЛЕВБЕКІЯ** (*Lebeckia*). Полагаютъ, что это—мѣстное названіе. С. бобовыхъ. (24). Ю. Африка. Оранж. куст. рр. Ухоть какъ за Аспалантусъ.

**Л. цитисовидесъ** (*L. cytoides*, похожая на Цитизусъ). Цв. ярко-желтые, большіе, въ маѣ. 2—4 ф.

**ЛЕВИЗІЯ**. См. Льюизія.

**ЛѢВИНСКАЯ ВИШНЯ**. Одинъ изъ сортовъ владимірской вишни.

**ЛѢВИСТИКУМЪ** (*Levisticum*). Измѣненное названіе Діоскорида *Ligustikon*, данное имъ другому р. С. зонтичныхъ. (1). Ю. Европа. Вынос. многол. трав. р., не имѣющее садоваго значенія, не смотря на пестролистную форму.

**ЛЕВКОЯ**. См. Маттіоля.

**ЛЕВУЛОЗЪ** или **ПЛОДОВЫЙ САХАРЪ**. Углеводъ, встрѣчаемый въ растеніяхъ и происходящій, вѣроятно, изъ тростниковаго сахара.

**ЛЕГУМИНЪ**. Одинъ изъ растительныхъ казенновъ.

**ЛЕДЕНБЕРГИЯ** (*Ledenbergia*). *Леденбергъ* (*Ledenberg*),—пріятель ботаника Карстена. С. лаконосовыхъ. (2). Колумбія, Венецуела, Мартиника. Тепл. вынощ. куст. рр. Сильная глян. дерн. съ торф. Черенками въ глин. дерн. въ теплѣ.

**Л. розео-енеа** (*L. roseo-enea*, розово-бронзовая). Центр. Америка. Цв. блѣлые, лл. большіе, ланцетовидно-обратно-

яйцевидные, темно-бронзоваго цв. на верхней, розоваго—на нижней сторонѣ. Стебель и вѣтви красновато-пурпуровые.

**ЛЕДЕНЕЦЪ**. Поздній сортъ яблока рѣчатой формы съ плотною кожкою мякотью, среднихъ размѣровъ. Вкусъ со слабымъ кваскомъ.

**ЛЕДУМЪ** (*Ledum*). Такъ называлъ Діоскоридъ Цистусъ. С. вересковыхъ. (5). Холодный поясъ Сѣв. полушарія. Оранж. низкія куст. рр. Торф. съ листовой Сѣмонами, преимущественно же отводкой, а также дѣленіемъ. Къ пересадкѣ чувствительны.

**Л. латифолиумъ** (*L. latifolium*, широколистный). Канада, Соед. Шт. Цв. бѣлые, въ апрѣлѣ—маѣ. Лл. съ завернутыми краями съ ржавымъ пухомъ на нижней поверхности. 3 ф. **Л. палюстре** (*L. palustre*, болотный). *Ваулиникъ*. *Ваулиъ* Сѣв. полушаріе. Цв. бѣлые, въ апрѣлѣ—маѣ. Лл. какъ у перваго, но уже. 2 ф.

**ЛЕЕА**. См. Лія.

**ЛЕЖАНКА** или **ЛЕЖАНЪ**, а также **СУЛТАНЪ**. Сортъ яблока средней поры поспѣванія, крупный, похожій на титовку и формой и росписью, но вкусомъ грубѣе.

**ЛЕСЕЛІЯ** (*Leselia*). *Лезель* (*L. Loesel*)—авторъ „Flora prussica“. С. синюшныхъ. (7). Мексика, Центр. Америка, Нов. Гренада. Оранж. полукуст. или трав. рр. Волокн. торф. съ неск. глян. дерн. Черенками изъ полурѣлаго роста, въ пескѣ, въ парникѣ.

**Л. glandulоза** (*L. glandulosa*, железкован). Мексика. Цв. красные, въ июлѣ. 2 ф. **Л. кокцинеа** *L. coccinea*, шарлаховая). Мексика. Цв. шарлаховые, въ июлѣ. 3—4 ф.

**ЛЕЙКА**. Жесткой сосудъ съ двумя ручками (сверху и сбоку) или съ одной, идущей снизу вверхъ, и долгимъ носкомъ, на который надѣвается ситко или ситечко.

**ЛЕЙКАДЕНДРОНЪ** (*Leucadendron*). *Leukos*—бѣлый и *dendron*—дерево. С. протейныхъ. (70). Ю. Африка. Оранж. кустарн. или древесн. рр. Волокн. глян. дерн. и неск. торф. съ древесн. углемъ. Черенками изъ зрѣлаго роста, лѣтомъ, въ пескѣ, подъ колпакомъ; держать до наплыва холодно. Тепл. зимой 3—6°.

**Л. аргентеумъ** (*L. argenteum*, серебристый). Цв. желтые, въ августѣ; лл. ланцетовидные, серебристые; ихъ вывозятъ съ родины въ сухомъ видѣ для приготовленія выжовъ и т. п.

**ЛЕЙКОІУМЪ** (*Leucojum*). Названіе употребленное Теофрастомъ, отъ *leukos*—бѣлый и *ion*—фіалка, но цвѣту и запаху цв. С. амариллисовыхъ. (9). Центр. Европа и Средиземн. побережье. Рыхлая

сильная, если тяжела—съ пескомъ и листовою. Отирысками.

**Л. вернумъ** (*L. vernum*, весенній). *Виллика*. Центр. Европа. Цв. бѣлые съ зелеными пятнышками на концахъ сегментовъ, душистые, весной. 4—6 д. Син. *Эриносма вернумъ* (*Eriosma vernum*). Имѣетъ разнородность *бифлорумъ* (*biflorum*). **Л. эстивумъ** (*L. aestivum*, лѣтній). Центр. и Юж. Европа. Цв. бѣлые съ зелеными пятнышками на концахъ сегментовъ, весной и рано лѣтомъ. 1½ ф. **Л. Хернандесіи** (*L. Hernandezii*, Хернандеса). Майорка. Цв. бѣлые съ зелеными по концамъ пятнышками, лѣтомъ. Въ садахъ извѣстенъ подъ назв. *пучеллоумъ* (*pulehellum*). 1—1½ ф.

**ЛЕЙКОКАРПУСЪ** (*Leucoscarpus*). *Leukos*—бѣлый и *karpos*—плодъ, по бѣлымъ ягодамъ. С. поричниковыхъ. (1). Мексика. Оранж. трав. р. Ухоть какъ за Мимулюсъ.

**Л. алягусъ** (*L. alatus*, крылатый). Цв. желтые, въ сентябрѣ. 2—2½ ф. Син. *Мимулюсъ перфоліатусъ* (*Mimulus perfoliatus*).

**ЛЕЙКОКОРИНЕ** (*Leucocoryne*). *Leukos*—бѣлый и *korine*—комочъ, по безплоднымъ пыльникамъ. С. лилейныхъ. (4). Чили. Полувынос. луковичн. рр. Ухоть какъ за Иксіей.

**Л. альяіацеа** (*L. alliacea*, похожее на лукъ). Цв. блѣдно-лиловые. 6—12 д. **Л. иксіоидесъ** (*L. ixioideis*, похожее на Иксію). Цв. бѣлые или голубые, въ августѣ. 1 ф. Син. *Л. одората* (*L. odorata*).

**ЛЕЙКОПОГОНЪ** (*Leucopogon*). *Leukos*—бѣлый и *pogon*—борода, край вѣнчика съ бѣлыми волосками. С. энкризовыхъ. (130). Австралія, о. Тихаго океана, Нов. Зеландія, Малайскій архип. Оранж. куст. рр. Ухоть, какъ за Эпакрисъ. Упоминаемые виды—австралійскіе.

**Л. аустралис** (*L. australis*, австралійскій). Цв. бѣлые, зимой и рано весной. 2—4 ф. **Л. вертициллягусъ** (*L. verticillatus*, мутовчатый). Цв. бѣлые или малиновые, лѣтомъ. 3—6 ф. **Л. Ричи** (*L. Richei*, Рича). Цв. бѣлые, зимой и весной. 3—4 ф.

**ЛЕЙКОСПЕРМУМЪ** (*Leucospermum*). *Leukos*—бѣлый и *sperma*—сѣмя, по пушистымъ сѣменамъ. С. протейныхъ. (24). Оранж. кустарныя или низкія древ. рр. изъ южн. Африки Ухоть какъ за Протеа.

**Л. грандифлорумъ** *L. grandiflorum*, крупноцвѣтнй). Цв. желтые, съ мая до іюля; вѣтви съ густыми волосками. 4 ф. **Л. линейаре** (*L. lineare*, съ линейными лл.). Цв. желтые, въ августѣ и сентябрѣ. 4 ф. **Л. медіумъ** (*L. medium*, средний). Цв. оранжевые, въ маѣ—июлѣ. 3 ф. Син. *Протеа формоза* (*Protea formosa*).



**ЛЕЙКОТОЕ (Leucothoe).** Название богини морей мифологии греков, — Андромеды. С. нересковых. (8). С. Америка. Япония. Оранжев. куст. рр. Торф. или торф. съ листов. Сѣменами, отводкой и дѣленіемъ осенью.

**Л. аксиллярисъ (L. axillaris,** угло-вое). С. Америка. Цв. бѣлые, въ маѣ. 2—3 ф. **Л. Дэвисіи (L. Daviesiae,** г-жи Дэвисъ). Калифорнія. Цв. бѣлые, пониклые. 3—5 ф. **Л. рацемоза (L. racemosa,** кисте-вое). С. Америка. Цв. бѣлые, въ маѣ и июлѣ. 4—10 ф.

**ЛЕЙСЕСТЕРІЯ (Leycesteria).** У *Leycesteria* (Leycester) — бывш. главн. судья въ ботанико-президентствѣ. С. жимолостныхъ. (1). Умѣр. Гималаи. Полувьюсел. куст. р. Садовая хорошая. Черенками изъ короткого молодого роста, весной, или сѣменами, весной.

**Л. формоза (L. formosa,** красивая). Цв. бѣлые съ пурпуровымъ оттѣнкомъ, лѣтомъ. 4—6 ф.

**ЛЕЙССЕРА (Leyssera).** *Лейссеръ* (T. W. Leysser) — германскій ботаникъ; † 1815 С. сложноцвѣтныхъ. (4). Оранжев. трав. или полукуст. рр. Ю. Африка, Ю. Испанія, С. Африка до З. Азіи. Торф. съ глин. дерн. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ пескѣ, лѣтомъ, или сѣменами.

**Л. гнафаліодесъ (L. gnaphalioides,** похожая на Гнафаліумъ). М. Д. Н. Цв. головки оранжевыя, съ іюля до сентибря; лл. шиловидные. 2 ф. **Л. капиллярнолистный (L. capillifolius,** съ волосинистыми лл.). С. Африка. Цв. головки желтыя, въ іюлѣ. Лл. нитевидные. 6 д.

**ЛЕЙХТЕНБЕРГІЯ (Leuchtenbergia).** Герцогъ М. Лейхтенбергскій (Leuchtenberg). С. кактусовыхъ. (1). Мексика. Оранжев. сочное р. Уходъ какъ за Макеильеріей.

**Л. принциписъ (L. principis,** княжеская). Цв. яркіе, свѣтло-желтые; стебель твердый, толщиною въ руку.

**ЛЕЙЦЕА (Leuzea).** Д-ръ *Лейце* (Leuze), другъ Декандоліа. С. сложноцвѣтныхъ. (3). Средиз. побережье, Испанія, Португалія. Вьюсел. трав. мног. рр. Обыкн. садов. Сѣменами, или дѣленіемъ весной.

**Л. конифера (L. conifera,** производящая шишки). Ю. Европа. Цв. головки пурпуровыя, въ іюлѣ. 9 д.

**ЛЕЦИТИСЪ (Lecythis).** *Lecythis* — масляная плошка, по формѣ плодинокъ. С. миртовыхъ. (64). Троп. страны, преим. В. Америки. Тепл. древ. рр. Глин. дерн. съ торф. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ пескѣ, въ парникѣ.

**Л. грандифлора (L. grandiflora,** крупноцвѣтн. Кайенна. Цв. темнокрасные,

большіе (2 д. въ ширину), твердые, въ апрѣлѣ. Плоды почти шаровидные. 4—5 д. въ діаметрѣ; сѣмена съѣдомыя. 60—80 ф.

**ЛЕІАНТУСЪ (Leianthus).** *Leios* — гладкій и *anthos* — цвѣтокъ; по отсутствію волосковъ у цв. С. горечавковыхъ. (10). Вестиндія, Мексика и центр. Америка. Тепл. трав. и куст. рр. Песков. торф. съ глин. дерн. Сѣменами въ парникѣ, въ горшкахъ, или черенками изъ молодого роста, въ пескѣ, въ парникѣ. Общая темп. между 10 и 22°.

**Л. лонгифолиусъ (L. longifolius,** длиннолистный). Вестиндія. Цв. желто-лимонные, въ августѣ. 1—2 ф. Спп. *Лизіантусъ лонгифолиусъ (Lisianthus longifolius).* Однол. **Л. нигресценсъ (L. nigrescens,** черноватый). Мексика. Цв. черноватые, пониклые, въ іюлѣ—августѣ. 1½ ф. Однол. Спп. *Лизіантусъ нигресценсъ (Lisianthus nigrescens).* **Л. умбеллятусъ (L. umbellatus,** зонтичный). Ямайка. Цв. зеленые, зонтиками, съ мая до іюля. 10 ф. Кустъ.

**ЛЕОФИЛЛЮМЪ (Leophyllum).** *Leios* — гладкій и *phyllon* — листъ. С. нересковыхъ. (1). Нов. Джерсей, горы Виргиніи. Многол. куст. р. Торф. или очень песков. глин. дерн. Отводкой осенью, или сѣменами, въ парникѣ.

**Л. буксифолиумъ (L. buxifolium,** съ лл. какъ у Буксуса). Цв. бѣлые съ малиновыми кончиками, въ маѣ—іюлѣ. Спп. *Аммуриное буксифолиа (Ammyrsine buxifolia)* и *Ледумъ буксифолиумъ (Ledum buxifolium).*

**ЛЕОХИЛЮСЪ (Leioschilus).** *Leios* — гладкій и *cheilos* — губа, по гладкой губѣ. С. орхидей. (5). Вестиндія, Мексика и центр. Америка. Тепл. эпифиты. Уходъ какъ за Онцидіумъ.

**Л. каринатусъ (L. carinatus,** съ килемъ). Мексика. Цв. свѣтло-бронзовые, губа желтая съ каштановыми пятнами. **Л. кохлеарисъ (L. cochlearis,** ложечный). Вестиндія. Цв. желтые съ пурпуровымъ. **Л. онцидіодесъ (L. oncidoides,** похожий на Онцидіумъ). Мексика. Цв. желто-зеленые, въ апрѣлѣ.

**ЛЕЛИЯ (Laelia).** *Lelin* — одна изъ восталокъ. С. орхидей. (20). Жаркія страны Америки отъ Бразиліи до Мексики. Тепл. рр. Уходъ какъ за Кеттлея.

**Л. альбиди (L. albidia,** бѣловатая). Гватемала. Цв. бѣлые, пахучіе, губа бѣлая или розовая, съ декабри и января. Имѣетъ нѣсколько разновидностей. **Л. анцереъ (L. anceps,** обоюдная). Мексика. Цв. душистые розовые, губа темно-пурпуровая, въ декабрь и январь. Много разновидностей. **Л. аутомналисъ (L. autumnalis,** осенняя). Мексика. Цв. душистые, розовые, въ декабрь и январь. Имѣетъ разновидность

*атроурубенс (atro-rubens)* съ темно-розовыми цв. **Л. Вейчiana (L. Veitchiana,** Вейчева). Цв. пѣжно-лиловые. Прекрасный гибридъ. **Л. Вальдизии (L. Wallisii,** Вальдеса). Рио-Негро. Цв. розоватые. Замѣчательно красный эпифитъ. **Л. Дайяна (L. Dayana,** Деева). Бразилія. Цв. пурпурово-розовые, губа пурпуровая съ лиловымъ и бѣлымъ краемъ. **Л. Доминіана (L. Dominiiana,** Доминіева). Цв. крупныя, свѣтло-пурпуровыя, губа черно-пурпуровая, осенью. Превосходный гибридъ. **Л. Дорманіана (L. Dormaniana,** Дорманова). Бразилія. Цв. оливковые съ малиновыми разводами съ наружной стороны, въ февралѣ. **Л. Йонгеана (P. Jongheana,** Йонгова). Бразилія. Цв. аметистового цв., губа съ бѣдно-пурпуровыми боками, желтая. **Л. калоглосса (L. caloglossa,** съ красивою губой). Цв. свѣтло-пурпуровые, губа темно-пурпуровая съ бѣлымъ ободкомъ. Гибридъ. **Л. Линдлеяна (L. Lindleyana,** Линдлеева). Бразилія. Цв. бѣлые или бѣдно-розовые, губа розово-лиловая, въ разное время года и продолжительно. **Л. майялисъ (L. majalis,** майская). Мексика. Цв. сареневые, губа съ кармино-пурпуровыми пятнами. **Л. Перрини (L. Perrinii,** Перрини). Бразилія. Цв. розово-пурпуровые, губа темно-малиновая, въ октябрь—ноябрь. **Л. престаансъ (L. prestans,** превосходная). Бразилія. Цв. темно-розовые, губа пурпурово-малиновая, въ апрѣлѣ—маѣ. **Л. пурпурата (L. purpurata,** пурпуроватая). Бразилія. Цв. очень крупныя, чисто-бѣлые, губа кармино-пурпуровая, съ мая до іюля. Имѣетъ нѣсколько красивыхъ разновидностей. **Л. супербиенсъ (L. superbiens,** превосходная). Гватемала. Цв. розовые съ красными черточками, губа темно-малиновая съ желтыми черточками, зимой. **Л. Фильбрикиана (L. Philbrickiana,** Фильбрикова). Цв. свѣтло-коричневые съ пурпуровыми пятнышками; губа темно-пурпуровая. Гибридъ между *Л. элегансъ* и *Кеттлея акландіи (L. elegans et Cattleya Aclandiae).* **Л. фламмеа (L. flammeea,** огненно-красная). Цв. красно-оранжевые, губа малиново-красная, въ мартѣ—апрѣлѣ. Гибридъ. Спп. *Л. Вейчии (L. Veitchii).* **Л. харпофилла (L. harporhyla,** съ серповидными лл.). Бразилія. Цв. ярко-оранжевые, на губѣ бѣлое пятно; въ февралѣ — мартѣ. **Л. циннабаріана (L. cinnaabarina,** киноварная). Бразилія. Цв. шарлахово-оранжевые, въ мартѣ. **Л. элегансъ (L. elegans,** изящная). Бразилія. Цв. бѣлые или розовые, губа темно-пурпуровая. Имѣетъ нѣсколько разновидностей.

**ЛЕЛЮПСИСЪ (Laeliopsis).** *Laelia* и *opsis* — сходство. С. орхидей. (4). Вестиндія. Теплич. эпифиты. Уходъ какъ за Кеттлея.

**Л. домингензисъ (L. domingensis,** съ

о. св. Доминга). Цв. лиловые съ желтыми жилками по срединѣ губы.

**ЛЕМЕХЪ.** Сошникъ у плуга, сохи, косули; онъ подрѣзываетъ и вздымаетъ пластъ, *отрѣзъ* кроитъ его, а *полица* — оборачиваетъ. Передній уголъ лемежа — *посадъ*, а верхній — *терд*.

**ЛЕМНА (Lemna).** Происхождение названія не объяснено. С. раскоч. (7). Европа, С. Азія и С. Америка. Тѣ плавающие въ стоячихъ водахъ чечевички, которыя такъ часто бываютъ въ прудахъ и водоемахъ.

**ЛЕНОВЫЯ рр. (lineae).** Малочисленное сем. травянистыхъ, кустарниковъ, рѣдко древесныхъ рр., въ числѣ 14 родовъ и 135 видовъ. Изъ родовъ болѣе извѣстны Иксонантесъ, Линумъ и Эритроксилонъ.

**ЛЕНСЪ (Lens).** Название классическое. С. бобовыхъ. (3). Средиземное побережье, воспитывается въ Южн. Европѣ, С. Африкѣ и теплыхъ мѣстахъ Азіи. Легкая. Сѣменами.

**Л. эскулента (L. esculenta,** съѣдомая). *Чечевичка.* Отечество неизвѣстно. Воспитывалось древними Египтянами и Персами, а въ Европѣ со временъ Римской Имперіи. Цв. бѣдно-голубые, мелкіе, лѣтомъ. 6—18 д.

**ЛЕНЪ НОВОЗЕЛАНДСКІЙ.** См. Форміумъ.

**ЛЕОНОТИСЪ (Leonotis).** *Leon* — левъ, *otis*, *otos* — ухо, по воображаемому сходству вѣтчика съ львинымъ ухомъ. С. губоцвѣтныхъ. (12). Троп. и юж. Африка, Маскаренскіе о., Остиндія и троп. Америка. Сильная глин. дерн. Черенками, весной, въ умѣренномъ теплѣ.

**Л. леонурусъ (L. leonurus,** львиный хвостъ). М. Д. Н. Цв. шарлаховые. 3—6 ф. Кустар. Спп. *Фломисъ леонурусъ (Phlomis leonurus).*

**ЛЕОНТИЦЕ (Leontice).** *Leon*, *leontos* — левъ, по сходству лл. съ слѣдами льва. С. барбарисовыхъ. (4). Центр. Азія и Ю. Европа. Трав. рр. съ клубневыми корневищами. Обыкн. садовая. Отпрысками и сѣменами.

**Л. алтайка (L. altaica,** алтайское). Алтайскія горы. Цв. кистями, макушечные, желтые, въ апрѣлѣ. 3—6 д.

**ЛЕОНТОДОНЪ (Leontodon).** *Leon*, *leontos* — левъ и *odon* — зубъ. С. сложноцвѣтныхъ. (40). Сѣв. Америка и преим. Европа, Центр. и З. Азія и С. Африка. Вьюсел. трав. рр. къ которымъ принадлежитъ нашъ одуванчикъ (*L. тараксакумъ*, *L. taraxacum*), ради котораго упоминается здѣсь этотъ родъ, потому что ни одинъ видъ не пользуется пріютомъ въ садахъ.



**ЛЕОНТОПОДУМЪ** (*Leontopodium*). *Leon*, *leontos* — лев и *pous* — пога, по цвѣт. головкамъ (?). Название это упоминается Dioscorидомъ. С. сложноцвѣтныхъ. (5). Европ. Альпы, въ троп. Азия и Анды Ю. Америки. Многол. трав. пр. Песков. Дѣленіемъ весной; сѣменами.

**Л. альпинумъ** (*L. alpinum*, альпійскій. *Edelweiss*). Евр. Альпы. Цв. головки макушечныя, окружены пушистыми прицветниками, въ июль — июль, 6 д.

**ЛЕПАНТЕСЪ** (*Lepanthes*). *Lepis* — чешуя, *anthos* — цвѣтокъ. С. орхидей. (40). Анды Ю. и Центр. Америки, Вестиндія, Мексика. Эпифиты тепл. Ухоть какъ за Плевроталью.

**Л. калодиктионъ** (*L. calodictyon*, красн. свѣтчатый). Нов. Гренада. Цв. желтые съ краснымъ, маленькіе. 2 д. **Л. сангвиней** (*L. sanguinea*, кроваво-красный). Ямайка. Цв. кроваво-красные, въ январь.

**ЛЕПЕСТОКЪ**. Часть вѣнчика, когда она свободна, не срослась краями.

**ЛЕПЕХЕНІЯ** (*Lepchenia*). И. Лепешинъ, русскій ботаникъ и путешественникъ, † 1802. С. губоцвѣтныхъ. (3). Мексика. Полувыносл. трав. пр. Глин. дерн. Дѣленіемъ весной и черенками изъ молодого роста, подъ стекломъ.

**Л. спиката** (*L. spicata*, колосовая). Мексика. Цв. желтые, мелкіе, лѣтомъ. 1—1½ ф.

**ЛЕПИДАГАТИСЪ** (*Lepidagathis*). *Lepis* — *lepidos* — чешуйка и *agathis* — шаръ, комокъ: искривленное цвѣтрасположеніе, въ которомъ цвѣты находятся между чешуйками. С. акантовыхъ. (50). Остиндія, Малайскій архип., троп. Африка и троп. Америка. Тепл. куст. р. Легкая, сильная. Черенками изъ молодого роста, въ песокъ, въ маѣ, въ парникѣ.

**Л. кристата** (*L. cristata*, гребенчатый). Индія. Цв. пурпуровые, въ июль, 2 ф.

**ЛЕПИДИУМЪ** (*Lepidium*). Название взято у Dioscorida. С. крестоцвѣтныхъ. (80). Въ обоихъ полушаріяхъ. Одно-, многол. и куст. пр. Въ орнаментальномъ отношеніи безъ значенія.

**Л. сативумъ** (*L. sativum*, съдомый). *Крессъ-салата*. Полагаютъ отечество въ Персіи. Цв. бѣлые, въ июль. Однолѣт. выносл. Сѣменами круглый годъ; съ весны — на воздухъ. Есть нѣсколько разновидностей, кот. можно раздѣлить на имѣющія простые и кудрявые лл., притомъ мелкіе и широкіе.

**ЛЕПТИНЕЛЛЯ** (*Leptinella*). *Leptos* — изъжнй, маленькій, по размѣру пр. С. сложноцвѣтныхъ. (18). Австралія, Нов. Зеландія и Антарктическая область. Выносл. многол. трав. пр. Ухоть какъ за Паронихію.

**Л. діонка** (*L. dioica*, двудомная). Нов. Зеландія. Цв. головки бѣдно-желтыя, мелкія, на тонкихъ ножкахъ, лѣтомъ. 2—3 д.

**ЛЕПТОДЕРМИСЪ** (*Leptodermis*). *Leptos* — изъжнй и *derma* — кожа; по тонкой кожнѣ. С. мареновыхъ. (4). Гималайскія горы, В. Бенгалъ, С. Китай. Оранж. куст. пр. Ухоть какъ за Хамилтонию.

**Л. ланцеолатъ** (*L. lanceolata*, ланцетовидная). Непаль. Цв. бѣлые, въ июль, 6 ф.

**ЛЕПТОМЕРІЯ** (*Leptomeria*). *Leptos* — изъжнй и *meris* — часть, по тонкимъ и почти безлистнымъ вѣтвямъ. С. сандаловыхъ. (14). Австралія. Оранж. куст. пр. Песков. торф. съ волоки. Глин. дерн. и съ добавленіемъ дрв. угля. Черенками изъ вызрѣвшаго роста, въ песокъ, подъ стекломъ.

**Л. Бильярдиери** (*L. Billardieri*, Ля-биллардиера). Цв. бѣлые, очень маленькіе; плоды красно-зеленоватыя, мясистые, съдомые. 6 ф.

**ЛЕПТОСИНЕ** (*Leptosyne*). *Leptosyne* — изъжнй, тонкость. С. сложноцвѣтныхъ. (7). Нов. Свѣтъ. Одно- и многол. травяни. либо кустарн. пр., похожія на Кореопсисъ, подобно которому и воспитываются въ садахъ.

**Л. каллиописидеа** (*L. calliopsidea*, похожее на Каллиописисъ). Калифорнія. Цв. головки большія, осенью. 1 — 2 ф. Однол. **Л. маритима** (*L. maritima*, морская). Калифорнія. Цв. головки большія съ длинными лучевыми цв., осенью. 1 ф. Многол.

**ЛЕПТОСПЕРМУМЪ** (*Leptospermum*). *Leptos* — изъжнй, тонкій и *sperma* — сѣмя. С. миртовыхъ. (25). Австралія. Оранж. куст. пр. Глин. дерн. съ торф. и съ добавленіемъ песку и дрв. угля. Черенками изъ молодого роста, въ песокъ, подъ стекломъ, въ маѣ, или сѣменами, въ мартѣ, въ теплѣ.

**Л. аттенуатумъ** (*L. attenuatum*, тонкій). Цв. бѣлые, лѣтомъ. 3—6 ф. **Л. лангитерумъ** (*L. lanigerum*, шерстистый). Цв. бѣлые съ чашечкой пушистой, лѣтомъ. 3 ф. **Л. миртифолиумъ** (*L. mirtifolium*, съ лл. какъ у мирты). Цв. мелкіе, бѣлые. 8—10 ф. **Л. флавесценсъ** (*L. flavescens*, желтоватый). Цв. бѣлые, лѣтомъ. 4—6 ф. Имѣетъ нѣсколько разновидностей.

**ЛЕСПЕДЕСА** (*Lespedeza*). *Lespedeza* (Lespedez) — быв. во Флоридѣ губернаторомъ. С. бобовыхъ. (25). Сѣв. Америка, умѣр. Азія, горы Остиндіи, Архипелагъ, Австрія. Волоки. торф. съ пескомъ. Одно-, многол. и куст. оранж., полу-выносл. пр. Однол. и многол. сѣменами, куст., — черенками изъ молодого роста.

**Л. биколоръ** (*L. bicolor*, двуцвѣтная). С. Китай, Японія. Цв. розово-пурпуровые.

4—6 ф. Сии. *Десмодиумъ пендулифлорумъ* (*Desmodium penduliflorum*). **Л. ретикулатъ** (*L. reticulata*, сѣтчатый). С. Америка. Цв. фиолетовые. Имѣетъ нѣсколько разновидностей.

**ЛЕССЕРТИЯ** (*Lessertia*). *Делессеръ* (Benjamin de Lessert) — франц. ботаникъ, авторъ *Icones plantarum*, † 1847. С. бобовыхъ. (30). Мысъ Д. Н. Оранж. трав. или полу-куст. пр. Глин. дер. съ торф. Сѣменами и дѣленіемъ весной.

**Л. переннансъ** (*L. perennans*, выносливая). Цв. въ нижней части бѣдыя, въ верхней — красные или пурпуровые, въ августѣ. 1 ф. Трав. многол. р.

**ЛЕТУЧКА**. Опушка, оторочка цвѣточной чашечки. Сѣмя съ хохолкомъ.

**ЛЕШЕНОТІЯ** (*Leschenaultia*). *Лешино* (Leschenault), французскій ботаникъ и путешественникъ, † 1826. С. чуденовѣныхъ. (16). Австралія. Оранж. оранжер. трав. полу-куст. и куст. пр. Волоки. торф. съ пескомъ. Черенками весной или лѣтомъ изъ концовъ довольно вызрѣвшихъ побѣговъ, въ песокъ, подъ стекломъ.

**Л. билоба** (*L. biloba*, двулопастная). Цв. голубые, съ іюня до августа. 1 ф. Куст. Сии. **Л. Друммонди**, **Л. грандифлора** (*L. Drummondii*, *L. grandiflora*). **Л. формоза** (*L. formosa*, красивая). Цв. шарлаховые, съ іюля до сентября. 1 ф. Куст. Сии. **Л. Бакстери**, **Л. мультифлора** (*L. Baxteri*, *L. multiflora*).

**ЛИВЕРТИЯ** (*Liberia*). Мари *Либери* (Marie Libert) — бельгійка, писавшая о ботаникѣ. С. косатиковыхъ. (8). Чили, Австралія и Нов. Зеландія. Полувын. многол. трав. пр. Легкая, рыхлая, сѣменами и дѣленіемъ.

**Л. грандифлора** (*L. grandiflora*, крупноцвѣтная). Нов. Зеландія. Цв. бѣлые, лѣтомъ. **Л. иксіоидесъ** (*L. ixioideus*, похожая на Иксию). Нов. Зеландія. Цв. бѣлые, лѣтомъ. 2—4 ф. **Л. формоза** (*L. formosa*, красивая). Чили. Цв. бѣлые, въ маѣ.

**ЛИВОНІЯ** (*Libonia*). *Либонъ* (Libon), бельгійск. путешествовавшій по Бразиліи. С. акантовыхъ. Троп. Америка. Тепл. куст. пр. Волоки. Глин. дерн. съ листовой или перегноемъ. Черенками, весной или рано лѣтомъ въ парникѣ.

**Л. флорибунда** (*L. floribunda*, густоцвѣтная). Бразилія. Цв. шарлаховые съ желтыми кончиками. Весьма орнамент. р.

**ЛИВОЦЕДРУСЪ** (*Libocedrus*). *Либаносъ* — ладанъ и *Cedrus* — кедръ; но благоуханной древесинѣ. С. хвойныхъ. (8). Оранж. или полувыносл. пр., похожія на Туи. Чили, Нов. Зеландія, Нов. Каледонія, Японія, Китай и Калифорнія. Ухоть какъ за Туи.

**Л. дежурренсъ** (*L. degenrens*, сѣбноцвѣтнй). Сьерра Невада въ Калифорніи. Лл. мелкіе, гладкіе, чешуйчатые; шишки прямые. 40—140 ф.

**ЛИВЕНВОРТИЯ** (*Leavenworthia*). *Ливенвортъ* (Leavenworth), американскій ботаникъ. С. крестоцвѣтныхъ. (3). С. Америка. Однол. пр. Сѣменами въ парникѣ весной.

**Л. ауреа** (*L. aurea*, золотистая), признается формою съ желтыми цв. **Л. Мишюксіи** (*L. Michauxii*, Мишо). Сосѣд. Штаты. Цв. лилово-розовые съ желтымъ глазкомъ, въ июль. 3 д.

**ЛИВИСТОНА** (*Livistona*). По П. *Моррею* (Murray), бывшему въ Ливингстонѣ, близъ Единбурга. С. пальмъ (14). В. троп. Азія, Малайскій архипелагъ, Нов. Гвиней, В. Австралія. Теплич. пальмы съ гладкимъ стволомъ 2 ч. Глин. дерн. и 1 ч. торф. съ добавленіемъ песку. Сѣменами, въ тепломъ песковатомъ грунтѣ. Лл. вѣерообразные.

**Л. аустралис** (*L. australis*, южная). В. Австралія. Лл. темно-зеленые, почти округлые, складчатые. 80 ф. Сии. **Корифа аустралис** (*Corypha australis*). **Л. Иенкенсіана** (*L. Jenkensiana*, Иенкенса). Ассамъ и Сиккимъ. Лл. темнозеленые, складчатые вѣеромъ, съ краями, раздѣленными на дов. широкіе сегменты. 10 ф. Оранж. р. **Л. хинензисъ** (*L. chinensis*, китайская). Ю. Китай. Лл. большіе, шир. болѣе 5 ф., съ пониклыми сегментами. 50 ф. Сии. **Л. мауритіана** и **Л. латанія борбоника** (*L. mauritiana*, *L. latania borbonica*). **Л. хумилис** (*L. humilis*, низкая). Троп. Австралія. Лл. большіе, округло-сердцевидные, глубоко-разсѣченные, складчатые. 6—30 ф.

**ЛИГЕУМЪ** (*Lygeum*). *Лигео* — гнуть, по гибкости р. С. злаковъ. (1). Средиземн. побережье. Выносл. мног. р. Легкая Глин. дерн. Дѣленіемъ корня.

**Л. спартумъ** (*L. Spartum*, Спартумъ). Колосы большіе, прямые или пониклые, въ маѣ; лл. какъ у тростника. 1½ ф. Составляетъ *альбардингъ*, изъ котораго получается писчая бумага.

**ЛИГОДИУМЪ** (*Lygodium*). *Лигодесъ* — гибкій. С. паноретниковыхъ. (18). Цѣпкія преим. тепл. пр., широко распрост. по земной поверхности. Глин. дерн., съ торф. и пескомъ по ровну.

**Л. волюбиле** (*L. volubile*, вьющійся). Вестиндія, Мексика, Бразилія, Перу. Ван перистораздѣльные, сегменты клиновидные. Сии. **Л. сканденсъ**, **Л. гаспартумъ** (*L. scandens*, *L. hastatum*). Тепл. **Л. дихотомумъ** (*L. dichotomum*, виллообразный). Чусинъ, Гонконгъ. Ван какъ-бы виллообразно-вѣтвящійся. Тепл. Сии. **Л. педатумъ**, **Л. цирциплатумъ** (*L. pedatum*, *L. circinatum*). Л.



**ретикулэтумъ** (*L. reticulatum*, съѣтчатый). О. Полинезія. Вторичныя перья сердцевидно-стрѣловидныя. Сип. *Л. Форстера*, *Л. Шкури*, *Хидроглоссумъ ретикулэтумъ* и *Лидодиктионъ Форстера* (*L. Forsteri*, *L. Schkuhri*; *Hydroglossum reticulatum*, *Lygodiction Forsteri*). Тепл. **Л. сканденсъ** (*L. scandens*, лазящій). Юж. Китай до Цейлона. Вторич. сегменты овальные или удлинённые. Сип. *Офиоглоссумъ сканденсъ* (*Orthoglossum scandens*). Тепл. **Л. японикумъ** (*L. japonicum*, японскій). Японія до Австраліи. Вторичные сегменты дельтовидные, перисторазсѣченные. Сип. *Офиоглонъ японикумъ* (*Orthiropogon japonicum*). Оранж.

**ЛИГУЛЯРИЯ** (*Ligularia*). *Ligula*—язычекъ, по цвѣткамъ. С. сложнорѣзчатыхъ. (20). Зап. Европа, Азія, Японія. Выносл. трав. пр. Песков, глин. дерн. съ малымъ колич. листов. Сѣменами, дѣленіемъ и черенками изъ молодого роста, подъ стекломъ.

**Л. Кемпфера аурео-макулата** (*L. Kaempferi aureo-maculata*; *Л. Кемпфера* съ золотыми пятнами). Японія. Лл. большіе, округлосердцевидные съ неправильными желтыми, иногда бѣлыми и розоватыми пятнами. Цв. желтые. 1—2 ф. Сип. *Фарфугіумъ гранде* и *Сенеціо аурео-макулата* (*Farfugium grande*; *Senecio aureo-maculatum*).

**ЛИГУСТИКУМЪ** (*Ligusticum*). Отъ страны *Liguria*, гдѣ растетъ въ обилии *L. Levisticum*. С. зонтичныхъ. (20). Выносл. многол. трав. пр., распространенныя по сѣв. полушарію. Садового значенія не имѣютъ.

**ЛИГУСТРУМЪ** (*Ligustrum*). Занятное у Плинія названіе, произведенное отъ *ligare*—вязать. С. маслиновыя. (25). Европа, умѣр. и троп. Азія и Австралія. Оранж. и выносл. куст. и низкодвѣ. пр. Глин. дерн. Черенками изъ молодого роста, или сѣменами, какъ Кратегусъ.

**Л. люцидумъ** (*L. lucidum*, глянцевиный). Китай. Цв. бѣлые, осенью; лл. овальные, почти круглые. 8—12 ф. Сип. *Л. магнолиифолиумъ*, *Л. стриктумъ* (*L. magnoliifolium*, *L. strictum*). **Л. Массалонгіанумъ** (*L. Massalongianum*, Массалонгія). Горы Казин. Цв. бѣлые, лѣтомъ; лл. линейно-ланцетов. 6 ф. Въ садахъ называется *Л. аугустифолиумъ*, *Л. миртифолиумъ*, *Л. розмаринофолиумъ* и *Л. сиккэтумъ* (*L. myrtifolium*, *L. rosmarinifolium*, *L. spicatum*). **Л. овалифолиумъ** (*L. ovalifolium*, съ овальными лл.). Японія. Цв. бѣлые, лѣтомъ; лл. овально-эллиптическіе. Им. между прочимъ пестролистную разновидность (*variegatum*). **Л. японикумъ** (*L. japonicum*, японскій). Японія. Цв. бѣлые, немного

пахучіе, въ июль; лл. продолговато-овальные. 6—8 ф. Сип. *Л. глянбрумъ*, *Л. Келлерманни*, *Л. Зибольди*, *Л. сирингифолиумъ* (*L. glabrum*, *L. Kellermanii*, *L. Sieboldii*, *L. syringiflorum*). **Л. Ибота** (*L. Ibota*, Ибота). Японія. Цв. бѣлые, лѣтомъ; лл. овальные, ягоды черныя, круглыя.

**ЛИЗИМАХІЯ** (*Lysimachia*). *Lysis*—раствореніе, разрыхленіе и *mache*—сопротивленіе, по предполагавшимся успокоительнымъ свойствамъ р. С. первоцвѣтвыхъ. (60). Умѣр. и вѣсн. тропич. страны С. полушарія, Ю. Африка, Австралія, о. Тихаго Океана и Ю. Америка. Оранж. или выносл. трав. пр. Предпочитаютъ влажную з.—по берегамъ рѣкъ и водоемовъ. Дѣленіемъ поздно осенью или рано весной.

**Л. атропурпуреа** (*L. atropurpurea*, черно-пурпуровая). Ю. Европа. Цв. очень темно-пурпуровые, лѣтомъ. 2 ф. Сип. *Любинія атропурпуреа* (*Lubinia atropurpurea*). **Л. вулгарисъ** (*L. vulgaris*, обыкновенная). *Вервейникъ*. Европа. Цв. желтые, лѣтомъ. 2—3 ф. **Л. клетроидесъ** (*L. clethroides*, похожая на Клетру). Японія. Цв. бѣлые, въ июль до сентября. 3 ф. **Л. нуммулярія** (*L. nummularia*, денежная). *Получечникъ*. *Луговой чай*. Европа. Цв. желтые, крупные, лѣтомъ и осенью; лл. округлые, супротивные. Р. ползучее. **Л. пунктата** (*L. punctata*, точечная). Европа и З. Азія. Цв. желтые, въ июль—августъ. 1 ф. **Л. цилиата** (*L. ciliata*, рѣсничная). С. Америка. Цв. свѣтло-желтые, въ июль. 2—3 ф.

**ЛИЗИНЕМА** (*Lysinema*). *Lysis*—освобожденіе и *nema*—нитъ, по свободнымъ нитямъ. С. эякрисовыхъ. (5). Австралія. Оранж. куст. пр. Уходъ какъ за Эякрисъ.

**Л. пунгенсъ** (*L. pungens*, острый). Нов. Юж. Валлис. Цв. бѣлые, рѣже красные, въ мартѣ. 2—3 ф.

**ЛИЗИАНТУСЪ** (*Lisianthus*). *Lysis*—раствореніе и *anthos*, цвѣтокъ; по врачебнымъ свойствамъ. С. горечавковыхъ. (50). Троп. Америка. Оранж. трав. или куст. пр. Глин. дерн. съ пескомъ и торф. Черенками, въ песокъ подъ стекломъ.

**Л. принцепсъ** (*L. princeps*, главный). Нов. Гренада. Цв. ярко-шарлаховые съ изумруднымъ краемъ, въ июль. 2 ф. **Л. пультхеръ** (*L. pulcher*, изящный). Нов. Гренада. Цв. шарлаховые, въ августѣ. 3 ф.

**ЛИЗИОНОТУСЪ** (*Lysionotus*). *Lysis*—освобожденіе *notos*—задь; по открыванію коробочки спящимъ нитомъ. С. геснерійныхъ. (3). Гималай, Китай. Тепл. трав. пр. Торф. съ глин. дерн. Дѣленіемъ весной или сѣменами въ песчаной землѣ съ парникъ.

**Л. сerratа** (*L. serrata*, съ зубчатыми

лл.). Тропич. Гималай. Цв. бѣдно-лиловые, зимой. 1 ф. *С. Л. тенуифолиа* (*tenuifolia*).

**ЛИКАСТЕ** (*Lycaste*). *Ликаста*—дочь Пріама. С. орхидей. (25). Троп. Америка отъ Перу до Мексики и Вестиндіи. Тепл. или оранж. эпифиты или земныя пр. Грубая волокнист. торф. съ мохомъ. Дѣленіемъ послѣ цвѣтенія.

**Л. ароматика** (*L. aromatica*, ароматическое). Мексика. Цв. желтые, колосьями, зимой и весной. **Л. Денпей** (*L. Derrei*, Делпе). Мексика. Цв. зеленовато-желтые съ коричневыми пятнами, зимой и весной. Сип. *Максиллярія Денпей* (*Maxillaria Derrei*). **Л. кристата** (*L. cristata*, гребенчатая). Тринидадъ. Цв. снаружи бѣлые, съ пурпуровыми полосками внутри, лепестки пурпуровые съ бѣлымъ внизу, въ июль—августъ. **Л. круента** (*L. cruenta*, кровавая). Гватемала. Доли зеленоватыя, лепестки темно-оранжевые съ малиновыми пятнами, съ марта до апрѣля. **Л. лэзиоглосса** (*L. lasioglossa*, съ волосистою губою). Гватемала. Доли тускло-коричневые, лепестки золотисто-желтые, губа такая-же. **Л. скиннері** (*L. Skinneri*, Скиппера). Гватемала. Цв. бѣлые съ розоватымъ оттенкомъ, губа розово-лиловая, съ ноября до марта. Имѣетъ весьма много разновидностей. **Л. югова** (*L. jugosa*, съ горъ). Бразилія. Цв. бѣлые, на лепесткахъ темно-пурпуровыя черточки, губа бѣлая съ пурпуровыми жилками, въ апрѣль—май. Сип. *Коляксъ юговусъ* (*Colax jugosus*).

**ЛИКВИДАМВАРЪ** (*Liquidambar*). *Liquidus*—жидкій и *amber*—амбра, по истекающей изъ р. стираксѣ. С. двоестниковыхъ. (4). С. Америка, Левантъ, Китай. Полувыносл. и выносл. деревья. Глин. дерн. Отводкой и сѣменами.

**Л. стирацифлюа** (*L. styraciflua*, источающій стираксу). С. Америка. Цв. зеленоватые, весной. Лл. лопастные. 30—50 ф. Р. похожее на кленъ.

**ЛИКОПЕРСИКУМЪ** (*Lycopersicon*). *Lykos*—волкъ и *persicon*—персикъ. С. пасленовыхъ. (4). Ю. Америка. Травян. приземистыя пр. съ мясистымъ, обычно краснымъ или желтымъ плодомъ. Глин. дерн. съ пескомъ и перегноемъ. Сѣменами весной, въ парникъ, потомъ на воздухъ.

**Л. эскулентумъ** (*L. esculentum*, съѣдомый). *Помъ д'амуръ*. *Помидоръ*. Юж. Америка. Цв. зеленоватые, лѣтомъ. 2—3 ф. Имѣетъ много разновидностей.

**ЛИКОПОДИУМЪ** (*Lycopodium*). *Lykos*—волкъ и *podis*—нога. С. плауновыхъ. (100). Широкораспрост. по всей земной поверхности. Тепл., оранж. и выносл. многол. трав. пр. Грубая, скважистая торф. Побѣгами.

**Л. дендройдеумъ** (*L. dendroideum*, древовидный). С. Америка. Стебель 6—9 д. выши., лл. мелкіе, колоски цилиндрическіе. Походить на маленькую елку. **Л. таксифолиумъ** (*L. taxifolium*, съ лл. какъ у тиса). Ямайка. Лл. остроколючные, густые; 9—12 д. **Л. флегмарія** (*L. phlegmaria*, флегмарія). Тропики. Плодовые колоски мелкіе; стебли очень развѣтвленные. Лл. ярко-зеленые.

**ЛИКОРИСЪ** (*Lycoris*). *Ликориса*—римская липедѣйка, любовница Марка Антонія. С. амараллисовыхъ. (3). Китай, Японія и центр. Азія. Оранж. лукович. пр. Уходъ какъ за Амарилліасъ.

**Л. ауреа** (*L. aurea*, золотистый). Китай. Цв. золотисто-желтые, въ августѣ и сентябрѣ. 1 ф. **Л. Северцова** (*L. Sewerzovi*, Северцова). Туркестанъ. Цв. красно-коричневые, пахучіе, лѣтомъ. 1 ф.

**ЛИКУАЛЯ** (*Licuala*). Мѣстное молукское названіе. С. пальмъ. (30). Вост. троп. Азія, Малайскій архип., Нов. Гвиней и С. Австралія. Теплич. Торф. 2 ч., песков. глин. дерн. 1 ч. Сѣменами въ сильномъ теплѣ.

**Л. грандисъ** (*L. grandis*, большая). Нов. Англія. Лл. вѣерообразные на колочѣмъ черешкѣ, ширина пластинки 3 ф., она полукруглая, складчатая. Стволъ 6 ф. **Л. элегансъ** (*L. elegans*, изящная). Суматра. Лл. вѣерообразные, разсѣченные до черешка, складчатые, длиною въ 1½ ф. Черешки длин 2—3 ф.

**ЛИЛЕЙНЫЯ** пр. (*Liliaceae*). Многочисленное сем. обычно травянистыхъ многолѣтнихъ, рѣдко однолѣтнихъ, иногда кустарныхъ пр., разселенныхъ по всей поверхности земнаго шара, въ тропическихъ и умѣренныхъ климатахъ. Въ немъ 180 родовъ и 2500 видовъ. Болѣе употребительные въ садахъ роды: Агалаптусъ, Лилиумъ, Метоника, Сцилла, Тулипа, Ургинеа, Фритиллярія, Функия, Хемерокаллисъ и Хиацинтусъ.

**ЛИЛИУМЪ** (*Lilium*). Древне-латинское названіе, взятое съ греческаго *Leipon*. С. лилейныхъ. (45). Умѣр. страны Сѣв. полушарія. Выносл., полувыносл. и оранж. лукович. пр. Торф. съ глин. дерн. и листов. Сѣменами, отпрысками и лукович. почками. Всѣ любятъ ползатѣвненіе. При общности признаковъ Лилин, облегченіемъ для ихъ опредѣленія можетъ служить классификація, составленная англійскимъ ботаникомъ Вокеромъ.

**Л. ауратумъ** (*L. auratum*, золотая). Японія. Цв. бѣлые съ золотисто-желтою полоскою по срединѣ сегментовъ и многочисленными красно-пурпуровыми крапинками, а внизу съ сосочками, лѣтомъ. 2—4



ф. Произвела много разновидностей. **Л. бульбиферумъ** (*L. bulbiferum*, произвождающая луковичные почки). Европа. Цв. красные, снаружи пушистые, лѣтомъ. Стебель 2—4 ф. **Л. Вашингтоніанумъ** (*L. Washingtonianum*, Вашингтонова). Калифорнія. Цв. бѣлые, съ пурпуровымъ или лиловымъ оттѣнкомъ, лѣтомъ. Стебли 3—4 ф. Полувыи. **Л. гигантеумъ** (*L. giganteum*, гигантская). Гималаи. Цв. бѣлые, съ зеленоватымъ отливомъ снаружи и пурпуровымъ устьемъ, лѣтомъ. Стебель 4—10 ф. Оранж. **Л. даврикумъ** (*L. davuricum*, Даурская). *Льсная Сарана*. Даурия. Цв. шарлаховые, зонтикомъ, въ іюль. Стебель 2—3 ф. Сип. *Л. пенсильванікумъ* и *Л. спектабилис* (*L. pensylvanicum*, *L. spectabile*). **Л. канадэнзе** (*L. canadense*, канадская). С. Америка. Цв. отъ ярко-желтыхъ до свѣтло-красныхъ, съ многочисл. черно-пурпуров. крапинками; лѣтомъ. Стебель  $1\frac{1}{2}$ —3 ф. Сип. *Л. пендулофлорумъ* (*L. penduliflorum*). **Л. кандидумъ** (*L. candidum*, бѣлая). Ю. Европа. Цв. чисто-бѣлые, рѣдко съ пурпуровымъ оттѣнкомъ, душистые, въ іюнь—іюль. Стебли 2—3 ф. Имѣетъ нѣсколько разновидностей. **Л. Кетсбей** (*L. Catesbeii*, Кетсбей). С. Америка. Цв. яркіе красно-оранжевые съ многочисл. пурпуровыми пятнышками. Стебель 1—2 ф. **Л. кордицоліумъ** (*L. cordifolium*, сердцелистная). Японія. Цв. бѣлые, желтые, пурпуровые, въ августъ. Стебель 3—4 ф. Сип. *Хемерокаліс кордата* (*Hemerocallis cordata*). **Л. Крамери** (*L. Kramerii*, Крамера). Японія. Цв. бѣлые, слегка красноватые, душистые, въ іюль. Стебель 3—4 д. **Л. кроцеумъ** (*L. croceum*, желтая). Ю. Европа. Цв. желтые, съ легкимъ шарлаховымъ оттѣнкомъ, въ іюль. Стебель 3—4 ф. Сип. **Л. бульбиферумъ** (*L. bulbiferum*). **Л. Лейхтлинія** (*L. Leichtlinii*, Лейхтлина). Японія. Цв. желтые съ красно-пурпуровыми пятнышками, въ іюль—августъ. Стебель 2—3 ф. **Л. лонгифлорумъ** (*L. longiflorum*, длиннолистная). Китай, Японія. Цв. бѣлые, душистые, въ іюнь. Стебель 1—2 ф. **Л. Мартагонъ** (*L. Martagon*, *Царскія кудри*). Европа, Азія. Цв. тусклые красно-пурпуровые съ темно-пурпуровыми крапинками, лѣтомъ. Стебель 2—3 ф. **Л. монадельфумъ** (*L. monadelphum*, однобратственная). Кавказъ и С. Персія. Цв. свѣтло-желтые, яркіе, съ красноватымъ основаніемъ, осенью. Стебель 3—5 ф. Сип. *Л. Лоддигезіанумъ* (*L. Loddigesianum*). Лилія называемая *Шовитціанумъ* (*Szovitsianum*) есть разновидность Л. Монадельфумъ, отличающаяся несросшимися основаніями нитей и болѣе открытымъ цв. Сип. *Л. кильжикумъ* (*L. colchicum*). **Л. нейлгеррензе** (*L. neilgherrense*, нейлгеррейская). Нейлгерри. Цв. бѣлые, душистые, стебель 2—3 ф. Оранж,

**Л. оксипеталюмъ** (*L. oxypetalum*, узколепестная). Кумаонъ, Пиндари. Цв. пурпурово-лиловые, въ іюнь. Стебель 1— $1\frac{1}{2}$  ф. Оранж. **Л. пардалінумъ** (*L. pardalinum*, леопардовая). Калифорнія. Цв. ярко-оранжевые съ болѣе свѣтлою серединой и большими пурпур. пятнами въ нижней части, лѣтомъ. Стебель 3—7 ф. Имѣетъ нѣсколько разновидностей. **Л. Парри** (*L. Parryi*, Парри). Калифорнія. Цв. блѣдно-желтые съ шоколадными пятнышками, пахучіе, лѣтомъ. Стебель 2—6 ф. **Л. пиренаикумъ** (*L. pyrenaicum*, пиренейская). Пиренеи. Цв. ярко-желтые, лѣтомъ. Стебель 2—4 ф. **Л. помпониумъ** (*L. pomponium*). *Бѣлая Сарана*. С. Италия, Юж. Франція, В. Сибирь. Цв. ярко-красные или оранжевые; лѣтомъ. Стебель  $1\frac{1}{2}$ —3 ф. **Л. псевдо-тигринумъ** (*L. pseudo-tigrinum*, ложно-тигровая). Китай. Цв. шарлаховые, въ іюль. Стебель 3—4 ф. **Л. розеумъ** (*L. roseum*, розовая). Индія. Цв. лиловые, крупныя, въ апрѣль. Стебель  $1\frac{1}{2}$  ф. Оранж. **Л. специозумъ** (*L. speciosum*, отбѣнная). Японія. Цв. бѣлые съ красно-малиновымъ отливомъ и крапинками, лѣтомъ. Стебель 1—3 ф. Имѣетъ нѣсколько разновидностей, слышетъ подъ названіемъ *Л. ланцифоліумъ* (*L. lancifolium*). Оранж. и полувынос. **Л. супербумъ** (*L. superbum*, превосходная). Георгія. Цв. красно-оранжевые, густо-искрапанные, въ августъ. Стебель 4—6 ф. **Л. тенуифоліумъ** (*L. tenuifolium*, узколистная). *Алая* или *Красная Сарана*. Сибирь. Цв. ярко-шарлаховые, лѣтомъ. Стебель 6—12 д. Сип. *Л. лицифоліумъ* и *Л. пумиломъ* (*L. linifolium*, *L. pumilum*). **Л. тигринумъ** (*L. tigrinum*, тигровая). Китай. Цв. красно-оранжевые съ черно-пурпуровыми пятнышками, въ іюль—августъ. Стебли въ 2—4 ф. Имѣетъ нѣсколько разновидностей, между прочимъ, съ махровыми цв. **Л. филадельфумъ** (*L. philadelphum*, филадельфійская). С. Америка. Цв. красно-оранжевые, съ пурпуровыми пятнами въ нижней части, лѣтомъ. **Л. Хансона** (*L. Hansonii*, Хансона). Японія. Цв. красно-оранжевые, съ пурпуровыми крапинками. Стебель 3—4 ф. **Л. японікумъ** (*L. japonicum*, японская). Цв. на внутр. сторонѣ бѣлые, на наружной—болѣе или менѣе съ пурпуровымъ отливомъ, лѣтомъ. Оранж. Стебель 1—2 ф. Сип. *Л. одорумъ* (*L. odorum*).

**ЛИЛОКЪ**. См. Клематисъ.

**ЛИМНАНТЕМУМЪ** (*Limnanthemum*). *Лимне*—болото, топь и *anthemon*—цвѣтокъ, по мѣсту нахождения р. С. горечавковыхъ. (24). Умѣр. и жаркія страны. Оранж. водяныя рр. Уходъ какъ за Вильярсія.

**Л. нимфеойдесъ** (*L. nymphaeoides*, похожий на Нимфеа). Европа. Цв. желтые, лѣ-

томъ; лл. сердцевидные или почковидные. Сип. *Вильярсія нимфеойдесъ* (*Villarsia nymphaeoides*).

**ЛИМОНИАСТРУМЪ** (*Limoniastrum*). *Лимон*—лугъ и *astes*—звѣзда, по мѣсту произрастанія и формѣ цвѣтовъ С. свинчатковыхъ. (2). Зап. Средиземное побережье. Оранж. куст. или полукуст. рр. Уходъ какъ за Статице.

**Л. монопетала** (*L. monopetala*, однолепестный). Сицилія. Цв. голубые, съ іюля до сентября. 3 ф. Сип. *Статисе монопетала* (*Statice monopetala*).

**ЛИМОНИЯ** (*Limonia*). *Лимона*—персидское названіе лимона. С. рутовыхъ. (3). Троп. Азія. Тепл. деревья, или кустарники. Торф. съ глини. дерн. и сухимъ коровинымъ пометомъ съ добавленіемъ нѣсколькихъ кусковъ дрв. угля. Черенками, весной или осенью, въ песокъ, на слабо-нагрѣтомъ грунтѣ, или сѣменами весной, въ парникѣ.

**Л. ацидиссіма** (*L. acidissima*, кислѣйшая). Индія. Цв. бѣлые, пахучіе; плоды желтоватые, потомъ краснѣющіе и дѣлающіеся пурпуровыми. 8—10 ф. Сокъ плодовъ явайцы употребляютъ взамѣнъ мыла.

**ЛИМОНЪ**. См. Цитрусъ.

**ЛИМНОХАРИСЪ** (*Limnocharis*). *Лимне*—болото и *charis*—преlestь, по мѣсту произрастанія. С. частушковыхъ. (4). Троп. Америка. Тепл. или оранж. многол. водяныя рр. Дѣленіемъ, отпрысками или сѣменами. Въ кадкахъ съ водой или въ аквариумѣ. Темп. лѣтомъ 13—26, зимой 10—12°.

**Л. Плюмьери** (*L. Plumieri*, Плюмье). Бразилія. Цв. желтые, зонтикомъ, въ іюнь до ноября.  $1\frac{1}{2}$  ф.

**ЛИМОННАЯ ГРУППА**. Величина средних размѣровъ, форма къ обоимъ концамъ приостренная, пріятнаго, нѣсколько прѣснаго, вкуса. *Л. трава*. См. Молокцеделя. *Л. яблоко*. Сортъ средней породы посѣванія, средних размѣровъ, красноватое; нѣсколько кислотоватаго вкуса.

**ЛИНАРІЯ** (*Linaria*). *Линон*—ленъ, по сходству лл. С. норичниковыхъ. (150). Вѣт-троп. страны Старого и Н. свѣта. Трав. или полукуст., преим. выносливыя и полувынос. одно- и многол. рр. Садовая. Дѣленіемъ или сѣменами.

**Л. альпіна** (*L. alpina*, альпійская). Европ. Альпы. Цв. голубовато-фіолетовые съ ярко-желтою сред. частью. 6 д. Трав. многол. **Л. бипартита** (*L. bipartita*, дважды разсѣченная). Португалія. Цв. фіолетово-пурпуровые, съ іюня до сентября. 1 ф. Однол. **Л. далматика** (*L. dalmatica*, далматская). Ю.-В. Европа. Цв. желтые, крупныя, лѣтомъ. 3—4 ф. Многол. **Л. крас-**

**сифолія** (*L. crassifolia*, сочно-листая). Ю.-З. Европа. Цв. блѣдые, но ярко-голубые съ желтымъ горлышкомъ и красно-пурпуровымъ зѣвомъ. 3—6 д. **Л. макроура** (*L. macroura*, длиннохвостая). Востокъ. Цв. желтые, лѣтомъ и осенью.  $1\frac{1}{2}$  ф. Многол. **Л. ориганифолія** (*L. origanifolia*, съ лл. какъ у Душицы). Ю.-З. Европа. Цв. сине-фіолетовые съ желтымъ устьемъ. Однол. **Л. пурпуреа** (*L. purpurea*, пурпуровая). Ю. Европа. Цв. сине-пурпуровые, съ іюля до сентября. Многол. **Л. ретикулата** (*L. reticulata*, сѣтчатая). Португалія. Цв. темно-пурпуровые съ болѣе темными жилками, съ мая до іюля. 2—4 ф. Однол. **Л. Спартеа** (*L. Spartea*, похожая на Спартиумъ). Испанія. Цв. темно-желтые, лѣтомъ и осенью. Однол. **Л. триорнитифора** (*L. triornithophora*, несущая трехъ птичекъ). Испанія и Португалія. Цв. пурпуровые съ желтымъ горлышкомъ, въ іюль до сентября. Многол. **Л. цимбаларія** (*L. cymbalaria*, цимбаларія). З. Европа. Цв. блѣдно-голубые или лиловые, мелкіе, съ весны до поздней осени. Многол.

**ЛИНДГЕЙМЕРА** (*Lindheimera*). *Линдгеймеръ* (*Lindheimer*)—нашедшій это р. С. сложноцвѣтныхъ. (1). Техасъ. Оранж. или полувынос. однол. р. Уходъ какъ за Циннія.

**Л. тексана** (*L. texana*, изъ Техаса). Цв. головчатъ желтые, въ августъ и сентябрь. 1—2 ф.

**ЛИНДЕЛОФИЯ** (*Lindelia*). Фридрихъ фонъ *Линделофъ* (*Lindelof*)—покровитель ботаники. С. бурачниковыхъ. (1). Индія. Многол. трав. р. Добрая садов. Сѣменами и дѣленіемъ корней.

**Л. спектабилис** (*L. spectabilis*, красивый). Цв. пурпуровые съ краснымъ, въ май до августа.  $1\frac{1}{2}$  ф.

**ЛИНДЕНІЯ** (*Lindenia*). Ж. *Линденъ* (*Linden*)—бельгійскій садоводъ. С. мареновыхъ. (3). Мексика. Центр. Америка, Новая Каледонія и Фиджи. Тепл. куст. рр. Глин. дерн. съ торф. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ песокъ, въ парникѣ. Темп. лѣтомъ 13—24, зимой 8—13.

**Л. ривалис** (*L. rivalis*, побрежная). Мексика. Цв. бѣлые съ красной трубкой, въ августъ. 3 ф.

**ЛИНДЕРА** (*Lindera*). *Линдеръ* (*Linder*)—шведскій ботаникъ. С. лавровыхъ. (50). Троп. и вост. Азія (до Японіи) и С. Америка. Оранж. древесн. и куст. рр. Уходъ какъ за Лаурустъ.

**Л. бензойнъ** (*L. benzoin*, бензойнъ). С. Америка. Цв. желтые какъ медъ, въ мартъ и апрѣль. 6—15 ф. **Л. мелиссифолія** (*L. melissifolia*, съ лл. какъ у Мелиссы). С. Америка. Цв. бѣлые, въ апрѣль. 6 ф. Сип.



*Лаурус Диоспирусъ*, *Л. мелиссифолия* (*L. Diospyrus, L. melissifolia*).

**ЛИНДСЕЯ** (*Lindsaya*). Арчибальдъ *Линдсей* (*Lindsay*) — англ. ботаникъ прошлаго столѣтія. С. папоротниковыхъ. (50). Тропич. страны, Полинезія. Тепл. папоротники.

**Л. адіантоидея** (*L. adiantoides*, похожая на Адіантумъ). Малайскій архипелагъ. Вел. перистый, длиной въ 4—6 д., шир. въ 1 д. **Л. гвианензисъ** (*L. guianensis, gviensis*). Троп. Америка. Вел. 1—2 ф. длиной, съ 1—6 парами боковыхъ развѣтвленій. **Л. култрага** (*L. cultrata*, пожеванная). С. Индія. Вел. 6—12 д. длиной и въ 1 д. шир., перистый. Пахнеть тонкой. **Л. стрикта** (*L. stricta*, приморская). Троп. Америка. Вел. 1—2 ф. длиной, 1/2 д. шириной, перистый, измѣчившійся. Сил. *Л. элегансъ* (*L. elegans*). **Л. трапециформисъ** (*L. trapeziformis*, формую какъ трапеція). Вел. 6—15 д. длиной съ 1—4 парами развѣтвленій. Сил. *Л. горизонтальисъ* (*L. horizontalis*).

**ЛИНКОНІЯ** (*Linconia*). Южно-американское мѣстное названіе. С. буніиныхъ. (3). Мысъ Д. Н. Оранж. полукуст. рр. Уходъ какъ за Диосма.

**Л. алопекуroidея** (*L. alopecuroides*, похожая на Алопекурусъ). Цв. бѣлые или тѣлесные, въ маѣ. 2 ф. Лл. линейные. **Л. кустидата** (*L. cuspidata*, съ остроконечными лл.). Цв. бѣлые, въ маѣ—іюнь. 2 ф. Лл. продолговатые, остроконечные. **Л. тимифолия** (*L. thymifolia*, съ лл. какъ у Тимуса). Цв. бѣлые, въ маѣ—іюнь. Лл. овальные, тупые. 2 ф.

**ЛИНУМЪ** (*Linum*). Греч. названіе *Linon* — было употреблено Теофрастомъ. С. леновыхъ. (80). Умѣр. климатъ всей поверхности земнаго шара, но рѣдко въ тропическихъ. Одно-, дву- и многол. трав. рр. Сѣменами или дѣленіемъ весной. Песков. глин. дерн. съ небольшимъ количествомъ листовой или торф. Все поименованные ниже виды — многол. трав., исключенія означены.

**Л. альпинумъ** (*L. alpinum*, альпійскій). Европа. Цв. голубые, большіе, въ іюль—августъ. 6 д. **Л. арбореумъ** (*L. arboreum*, древесный). Критъ. Цв. желтые, крупныя, въ маѣ—іюнь. 1 ф. Полувыносл. куст. **Л. грандифлорумъ** (*L. grandiflorum*, крупноцвѣтный). С. Африка. Цв. розовые, большіе, въ іюль—іюль. 6—12 д. Однолѣт. **Л. Макрѣи** (*L. Mackrui*, Макрѣи). Чили. Цв. оранжевые, лѣтомъ. 1 ф. Сил. *Л. Шамиссонизъ* (*L. Chamissonis*). **Л. парбонензисъ** (*L. parbonense*, изъ Парбонны). Европа. Цв. голубые, иногда бѣлые, въ маѣ—іюнь. 2 ф. **Л. таурикумъ** (*L. tauricum*, тавричскій). Кавказъ. Цв. жел-

тые, въ іюнь — августъ. 1 1/2 ф. Полувын. куст. **Л. флавумъ** (*L. flavum*, желтый). Австрія. Цв. желтые, съ іюня до августа. 1—1 1/2 ф.

**ЛИПА. См. Тилія.**

**ЛИПАРІОСЪ** (*Liparis*). *Liparos* — глинистый, по лл. С. орхидей. (100). Умѣр. и жаркія страны. Тейлч. или выносливыя земныя и эпифитныя орхидей, изъ которыхъ немногія заслуживаютъ вниманія. Тепл. — въ волокни. торф., съ мохомъ, углемъ и черенками, въ корзинкахъ; выносл. — въ обыкновен. садовой, покрытой мохомъ.

**Л. лилифолия** (*L. liliifolia*, съ лл. какъ у Лилия). С. Америка. Цв. коричнево-пурпуровые, въ іюль. Выносл.

**ЛИПАРІЯ** (*Liparia*). *Liparos* — блестящій, по поверхности лл. С. бобовыхъ. (4). М. Д. Н. Оранж. куст. рр. Волоки. глин. дерн. съ торф. и небольшо. колч. песку. Черенками изъ молодого роста, въ песокъ, въ парники. Поливать осторожно.

**Л. парва** (*L. parva*, маленькая). Цв. мелкіе, желтые, въ мартъ — апрѣль. У разновидности *ангустифолия* (*angustifolia*) лл. уже.

**ЛИПЕРІЯ** (*Lyperia*). *Lyperos*, грустный, по тусклымъ цв. С. юричниковыхъ. (30). Южн. Африка. Оранж. травин. или полукуст. рр. Глин. дерн. съ пескомъ. Черенками, въ песокъ, подъ стекломъ. Не имѣютъ садоваго значенія.

**Л. педункулята** (*L. pedunculata*, съ длинными ножками). Цв. бѣлые, съ іюня до ноября. 1 1/2 ф.

**ЛИПИНСКОЕ** яблоко. Ранній сортъ крупнаго яблока, похожаго формуою на грушовку, но зеленоватаго цвѣта, сочное, съ расплывчатою мягкостью.

**ЛИППІЯ** (*Lippia*). Огюстъ *Липпи* (*Lippi*) — франц. врачъ и путешественникъ по Абиссиніи. С. вербеновыхъ. (90). Америка, Африка. Сильная легкая. Черенками изъ молодого роста, въ песокъ, въ тепл. парники.

**Л. цитриодора** (*L. citriodora*, съ запахомъ цедры). Чили. Цв. почти бѣлые. 3 ф. Лл. при треніи падаютъ превосходный запахи. Сил. *Алоэзія цитриодора*, *Вербена трифилла* (*Aloysia citriodora, Verbena triphylla*).

**ЛИПОВЫЯ** рр. (*tiliaceae*). Древесныя, кустарныя, рѣдко травяныя. рр., широко разбросанныя, частью подъ тропиками. Семейство состоитъ изъ 330 видовъ, заключающихся въ 46 родахъ, изъ которыхъ главнѣйшіе: Аристотелія, Корхорусъ, Прокія, Тилія, Триумфетта.

**ЛИРТОДЕНДРОНЪ** (*Liriodend-*

*ron*). *Leirion* — лилія и *dendron* — дерево. С. магноліиныхъ. (1). С. Америка. Выносл. въ умѣр. климатѣ. Глубокая глин. дерн. Сѣменами.

**Л. тулипифера** (*L. tulipifera*, производящій цв. тюльпанами). *Тюльпанное дерево*. С. Америка. Цв. желтые съ оранжевыми и съ зелеными разводами, крупныя, душистые, лѣтомъ. 75—100 ф.

**ЛИРИОНЕ** (*Liriope*). *Luriona* — одна изъ мнооогическихъ лимфъ. С. кровяниковыхъ. (1). Китай, Японія. Оранжевое многол. р. съ ползучимъ корневищемъ. Уходъ какъ за Офиогонъ.

**Л. граминифолия** (*L. graminifolia*, съ лл. какъ у злаковъ). Цв. довольно мелкіе, сине-фиолетовые, на темно-пурпуровой стрѣлкѣ, въ октябрѣ. Сил. *Офиогонъ спикатусъ* (*Ophiogon spicatus*).

**ЛИССАНТЕ** (*Lissanthe*). *Lissas* — гладкій и *anthos* — цв. С. энакрисовыхъ. (3). З. Австралія, Тасманія. Оранж. куст. рр. Уходъ какъ за Энакрисъ.

**Л. сапида** (*L. sapida*, вкусное). Нов. Южн. Валлисъ. Цв. бѣлые съ зелеными кончиками. 4 ф.

**ЛИССОХИЛЮСЪ** (*Lissochilus*). *Lissos* — гладкій и *cheilos* — губа. С. орхидей. (30). Троп. и южн. Америка. Тепл. земныя орхидей. Волоки. глин. дерн. Уходъ какъ за Влетія.

**Л. Кребсѣи** (*L. Krebsii*, Кребса). Наталь. У цв. доли зеленныя съ пурпуровыми пятнышками, лепестки золотисто-желтые. **Л. Хорсфалліи** (*L. Horsfallii*, Хорсфаллія). Калобаръ. У цв. доли ярко-коричневые, лепестки бѣлые.

**ЛИСТВЕННИЦА. См. Ляриксъ.**

**ЛИСТВЕННОЕ**. Замѣчательное преимущественно листьями, также противуположное хвойному.

**ЛИСТОВАЯ ЗЕМЛЯ**. Перепрѣвшіе листья, превратившіеся въ землю составляютъ превосходное удобрение для тяжелой почвы и необходимую часть при содержаніи болышинства горшечныхъ рр. Достоинство листовой земли зависитъ отъ тѣхъ листьевъ, изъ кот. она образовалась. — Лучшее считаютъ изъ буковыхъ и дубовыхъ, собранныхъ въ лѣсу. Ее дѣлаютъ сгребая листь въ небольшія кучи, чтобы не сильно нагрѣваясь, и перепрѣвываютъ нѣсколько разъ.

**ЛИСТОВѢРТКИ**. Ночныя бабочки, гусеницы которыхъ свертываютъ и окутываютъ паутиною одинъ или нѣсколько лл. Насѣкомыя весьма вредныя преимущественно для плодовыхъ рр.

**ЛИСТОБѢДЫ** (*tentredinidae*). Пленчатокрылыя насѣкомыя, личинки кото-

рыхъ объѣдаютъ листья, начиная съ края или съѣдая ихъ сумеже.

**ЛИСТОЦ. ЛИСТОЧЕРЕШОКЪ. ФИЛЬЛОДІЙ**. Сплюснутый листообразный черешокъ листа, замѣняющій настоящій листь.

**ЛИСТЬЕ**. Назначеніе л.: проводить отъ самаго мѣста выходенія черешка до самыхъ отдаленныхъ частей пластинки жидкость поглощенную корнемъ изъ почвы и прошедшую чрезъ стебель; измѣнять эту жидкость сперва выпареніемъ значительнаго количества содержащейся въ ней воды, потомъ усвоеніемъ углерода для образованія углеводовъ и превращеніемъ, вслѣдствіе этого, въ образовательный переработанный сокъ; разнести такимъ образомъ измѣненный сокъ отъ паренхимы, гдѣ это измѣненіе совершилось, по всемъ частямъ стебля и съ которымъ онъ распределяется по мѣстамъ въ немъ пугающимся и по тѣмъ складамъ, въ которыхъ накопляются образовательныя вещества, потребныя для будущаго развитія различныхъ частей р.

**ЛИСТЯКОВЫЯ** рр. (*Acrobrya, Acrogenei*). Развивающіеся преимущественно съ вершины, наружно, а не внутренними образованіями; напр. папоротники и др. тайноцвѣтныя.

**ЛИТАНТУСЪ** (*Litanthus*). *Litos* — маленькій и *anthos* — цв. С. лилейныхъ. (1). Южн. Африка. Оранж. луков. р.; луковица съ горошину. Уходъ какъ за Сциллія.

**Л. пузыльлюсъ** (*L. pusillus*, очень маленький). Цв. бѣлые, мелкіе, въ августъ. 2 д.

**ЛИТОСПЕРМУМЪ** (*Lithospermum*). *Lithos* — камень и *sperma* — сѣмя, по твердымъ сѣменамъ; названіе заимствованное у Диоскорида. С. бурачниковыхъ. (40). Большинство по Средиземному побережью, въ Европѣ и С. Африкѣ. Выносл. дву- или многол. трав. рр., либо полукуст. и куст. Песков. или сильная глин. дерн. Черенками, дѣленіемъ и сѣменами.

**Л. Гастони** (*L. Gastoni*, Гастона). З. Пиреней. Цв. лазуревые, лѣтомъ. 1 ф. Многол. трав. **Л. простратумъ** (*L. prostratum*, распростертый). Ю.-З. Европа. Цв. темно-голубые, лѣтомъ. Полукуст. **Л. пурпурео-цѣрѣдеумъ** (*L. purpureo-coeruleum*, пурпурово-синій). З. Европа. Цв. вначалѣ красные, потомъ пурпуровые, рано весной. Многол. трав.

**ЛИТРУМЪ** (*Lythrum*). *Lythron* — темная кровь. По окраскѣ цв. С. плакуновыхъ. (12). Выносл. и полувын. травин. или куст. рр. Обыкновен. садовая. Дѣленіемъ, сѣменами и черенками.



**Л. Грэффери** (*L. Graeferi*, Грэффера). Ю. Европа. Цв. одиночные, ярко-малиновые, летом и осенью. 1—3 ф. **Л. саликария** (*L. salicaria*, похожий на иву). **Цахунь**. Европа. Цв. красно-пурпуровые, кистями, в июль. 2—5 ф. Имѣть разновидности *roseum* и *superbum* (*roseum* et *superbum*).

**ЛИТРЕ**. Франц. мѣра емкости  $\frac{2}{3}$  русскаго ведра.

**ЛИТСЕА** (*Litsea*). Название мѣстное японское. С. лавровыхъ. (140). Троп. и вост. Азія, отъ Малайскаго архипелага до Японіи, троп. и вѣв-троп. Австралія, Нов. Зеландія, Нов. Каледонія и С. Америка. Оранж. деревья, рѣдко кусты. Ухождъ какъ за Ляурусъ.

**Л. геникулята** (*L. geniculata*, колѣнчатая). Ю. Амер., Соед. Шт. Цв. желтые, вѣт. маб. 6 ф. Сип. **Ляурусъ геникулята** (*Laurus geniculata*). **Л. глаука** (*L. glauca*, сная). Японія. Цв. бѣлые, летомъ; лл. снизу серебристые. **Л. японика** (*L. japonica*, японская). Японія. Цв. бѣлые; лл. снизу жваво-пушистые. 3 ф.

**ЛИТТОНІЯ** (*Littonia*). Д-ръ **Литтонъ** (*Litton*) — быв. проф. ботаники въ Дублинѣ. С. лилейныхъ. (2). Наталь и Ангола. Телл. и оранж. трав. рр. Ухождъ какъ за Глозиола.

**Л. модѣста** (*L. modesta*, скромная). Ю. Африка. Цв. ярко-оранжевые, колокольчатые, рано летомъ. 2—6 ф.

**ЛИХНИСЪ** (*Lychnis*). Название дано Теофрастомъ: *lychnos* — свѣточъ, по яркости цв. С. гвоздичныхъ. (30). Сѣв. полушаріе, исключая тропиковъ. Выносл. однол. и многол. трав. рр. Предпочтительно рыхлая, сильная глин. дерн. Сѣменами и дѣленіемъ. Всѣ ниже упомянутые виды — рр. многолѣтнія.

**Л. альпіна** (*L. alpina*, альпійскій). Европ. Альпы. Цв. малиновые, весной и летомъ. 6 д. **Л. вискарія** (*L. viscaria*, липкій). **Смола. Дрема.** Европа, Сибирь. Цв. розовые, летомъ. 1 ф. Имѣть нѣсколько разновидностей, между прочимъ съ махровыми цв. **Л. веспертина** (*L. vespertina*, цвѣтущій вечеромъ). Европа, Азія. Цв. бѣлые, пахнущіе вечеромъ, летомъ. 1—3 ф. **Л. діурна** (*L. diurna*, цвѣтущая днемъ). С. полушаріе. Цв. розово-пурпуровые, весной и осенью. 1—3 ф. **Л. коронарія** (*L. coronaria*, увѣнчанная). Ю. Европа. Цв. красные, вѣт. июль. 3 ф. **Л. Лягаскѣ** (*L. Lagascae*, Лагаска). Пиреней. Цв. ярко-розовые, съ бѣлой серединой, весной и летомъ. 3 д. **Л. пиренейка** (*L. pyrenaica*, пиренейскій). Пиреней. Цв. бѣдно-тѣлесные, летомъ. 8—4 д. **Л. фўльгенсъ** (*L. fulgens*, блестящій). Сибирь. Цв. ярко-красные, большіе, весной и летомъ. 6—12 д. Имѣть нѣсколько разновидностей, между

прочимъ **Хаагеина** (*Haageana*) съ шарлаховыми цв. **Л. хальцедоникумъ** (*L. chalcidionum*, халкидонскій). **Варская степь.** Россія. Цв. шарлаховые, летомъ. 1½—3 ф. Имѣть нѣсколько разновидностей, съ бѣлыми, лососевыми и др. цвѣтами, притомъ простыми и махровыми.

**ЛИЧИНКА**. Состояніе насѣкомаго, преимущественно жесткокрылаго, по выплупленію изъ личка. Въ этомъ состояніи насѣкомыя наиболѣе вредятъ рр.

**ЛИЦІУМЪ** (*Lycium*). У Dioscorida подъ названіемъ *Lycium* значится Рамнусъ, какъ р. встрѣчаемое въ Лиціи. С. пасленовыхъ. (70). Полувыносл. и выносл. вьющіяся или цвѣлющіяся куст. рр. Всякая скважистая. Черенками, отводкой и отпрысками.

**Л. афрумъ** (*L. afrum*, африканскій). С. Африка. Цв. фиолетовые, вѣт. июль—июль. 6—10 ф. **Л. барбарумъ** (*L. barbarum*, варварійскій). С. Африка. Цв. пурпуровые съ желтоватою нижнею частью, вѣт. маб до августа.

**ЛИШАЙ, ЛИШАЙНИКЪ**. Р. низшаго разряда, близкое ко мхамъ. Ягель.

**ЛІАВУМЪ** (*Liabum*). Происхожденіе названія неизвѣстно. С. сложноцвѣтныхъ. (40). Троп. и вѣв-троп. Америка. Телл. трав. или куст. рр. Песков. глин. дерн. съ листовою и небольшою колич. торф. Дѣленіемъ весной.

**Л. унифлорумъ** (*L. uniflorum*, одноцвѣтнй). Перуанскія Анды. Цв. головки яркія золотисто-желтыя. Лл. жесткіе, почти перисторазсѣченные.

**ЛІАНА**. Деревянистая цѣпкая растенія жаркнхъ странъ.

**ЛІАТРИСЪ** (*Liatris*). Происхожденіе названія неизвѣстно. С. сложноцвѣтныхъ. (16). С. Америка. Выносл. многол. трав. рр. Легкая, хорошая. Дѣленіемъ, весной, или сѣменами, съ осени.

**Л. граминифолія** (*L. graminifolia*, съ лл. какъ у злаковъ). Цв. головки пурпуровыя, вѣт. сентябрь; корень клубневой. 2 ф. Имѣть нѣсколько разновидностей. **Л. пикностахія** (*L. pycnostachya*, съ плотными колосыми). Цв. головки свѣтло-пурпуровыя, летомъ и осенью. 3—5 ф. **Л. спиката** (*L. spicata*, колосчатая). Цв. головки пурпуровыя, вѣт. сентябрь. 1—2 ф.

**ЛІЕТСІЯ** (*Lietzia*). **Летсе** (*Lietze*), торгующій садовникъ въ Рио-Жанейро. С. гесперійныхъ. (1). Телл. клубнев. р. Легкая волок. глин. дерн. съ листов. и пескомъ. Сѣменами, весной вѣт. тѣлѣ, или клубнями, прорѣжанными зимою сухо.

**Л. бразиліензисъ** (*L. brasiliensis*, бразильская). Бразилія. Цв. зеленые, съ коричневыми пятнами. 1—1½ ф.

**ЛІОНЗІЯ**. См. Ляпонсія.

**ЛІОНІЯ**. См. Ляпонія.

**ЛІЯ** (*Leea*). Джемъ **Ли** (*Lee*), въ свое время извѣстный садоводъ, послѣдователь системы Линнея. † 1795. С. виноградныхъ. (20). Троп. Азія и Африка. Маскаренскіе о., Австралія. Телл. кустар. или низкія деревья. рр. Сильная глин. дерн.

**Л. амабилисъ** (*L. amabilis*, милая). Борнео. Лл. парно-перистые съ большими прилистниками, верх. сторона бархатистая, темно-бронзовая съ широкую бѣлую полосою по срединѣ; нижняя сторона красная, съ зеленою по срединѣ полоскою.

**ЛОАЗА** (*Loasa*). Мѣстное южно-американское названіе. С. лоазовыхъ. (50). Троп. Америка, исключая С. Бразилію и Гвинею. Оранж. и выносл. одно- и двул. рр. пониклыя или вьющіяся, со жгучими волосками. Легкая глин. дерн. Сѣменами весной, а потомъ на воздухъ.

**Л. вулканика** (*L. vulcanica*, вулканическая). Эквадоръ. Цв. бѣлые съ 5 красными медовиками, летомъ. 2 ф. Однол. Сип. **Л. Валлиси** (*L. Wallisii*). **Л. латеріція** (*L. laterisia*, красно-кирпичная). Чили. Цв. красно-кирпичные, вѣт. маб. Распростертое, одно- или двул. р. Сип. **Л. аурантиака**, **Л. триколоръ** (*L. aurantiaca*, *L. tricolor*). **Л. Пентландія** (*L. Pentlandii*, Пентландя). Перу. Цв. оранжевые, вѣт. маб—июль. 4 ф. Однол. **Л. простратъ** (*L. prostrata*, распростертая). Чили. Цв. желтые, летомъ. Р. распростертое. Однол.

**ЛОАЗОВЫЯ** рр. (*loaseae*). Прямоослѣя, или вьющіяся травян., рѣдко кустар. рр. изъ тропик. Америки, Фиссенія-же—изъ Африки. Въ сем. 10 родовъ, обнимающихъ 100 видовъ. Сюда принадлежатъ Гроновія и Лоаза.

**ЛОВЕЛІЙНЫЯ** рр. (*lobeliaceae*). Включаются въ сем. колокольчиковыхъ.

**ЛОВЕЛІЯ** (*Lobelia*). **Маммиасъ де Л'Обель** (*M. de l'Obel*) — врачъ и ботаникъ, † 1616. С. колокольчиковыхъ. (200). Преимун. Америка, затѣмъ С. Европа и Азія. Оранж., полувыносл. и выносл. одно или многол. травян., либо полукуст., рѣже куст. рр. Легкая, листовая. Сѣменами, черенками и дѣленіемъ.

**Л. кардиналистъ** (*L. cardinalis*, кардинальская). С. Америка. Цв. шарлаховые; съ июля до августа. 1—2 ф. Полувыносл., многол., глин. дерн. **Л. сифилитика** (*L. syphilitica*, сифилитическая). С. Америка. Цв. голубые, осенью 1—2 ф. Полувыносл., многол. Имѣть много разновидностей, частію вынослывыхъ. **Л. спленденсъ** (*L. splendens*, великолѣпная). Мексика. Цв. шарлаховые, вѣт. маб до сентября. Оранж. или полувыносл., многол. трав. Имѣть

**красноокрасную** (атросангвинная, *atrosanguinea*) разновидность. **Л. фўльгенсъ** (*L. fulgens*, блестящая). Мексика. Цв. яркіе, шарлаховые, съ мая до сентября. 1—2 ф. Оранж. или полувын. многол. трав. Сип. **Л. рамоза** (*L. ramosa*). **Л. Эрнунсъ** (*L. Erinus*, Эрнунсъ). М. Д. Н. Цв. голубые съ бѣлымъ горлышкомъ, летомъ. 6 д. Оранж. трав. многол. Имѣть очень много разновидностей съ голубыми разнаго оттенка, бѣлыми и розовыми простыми и махровыми цв.

**ЛОВОСТѢМОНЪ** (*Lobostemon*). **Lobos**—доля и **stemon**—тычинка, по выходѣ тычинокъ противу лопастей вѣтчика. С. бурачниковыхъ. (50). Ю. Африка. Оранж. многол. трав., либо куст. и полукуст. рр. Ухождъ какъ за Эхіумъ.

**Л. аргентеусъ** (*L. argenteus*, серебрястый). Цв. голубые, вѣт. июль. 3 ф. **Л. формозусъ** (*L. formosus*, красивый). Цв. малиновые, вѣт. июль. 3 ф.

**ЛОГАНІЯ** (*Logania*). Джемъ **Логанъ** (*Logan*) — губернаторъ въ Пенсильваніи, писавшій о ботаникѣ, † 1751. С. логаніевыхъ. (21). Нов. Зеландія, Австралія. Оранж. травян. или полукуст. рр. Песков. глин. дерн. съ волок. торф. Черенками изъ зрѣлаго роста, вѣт. маб, подъ стекломъ.

**Л. латифолія** (*L. latifolia*, широколистная). Австралія. Цв. бѣлые, летомъ. 3—4 ф. **Л. флорибунда** (*L. floribunda*, многоцвѣтная). Австралія. Цв. бѣлые, вѣт. апрѣль—маб. 2—3 ф.

**ЛОГАНІЕВЫЯ** рр. (*loganiaceae*). Травы, кустарники или деревья преимущественно изъ жаркихъ и тропическихъ поясовъ. Многія содержатъ горькій, ядовитый сокъ. Родовъ 30, видовъ 350. Къ родамъ относятся: Гертнера, Логанія, Сингелія и Стрихносъ.

**ЛОДДИЖЕСІЯ** (*Loddigesia*). Конрадъ **Лоддигесъ** (*Loddiges*) — основатель знаменитой въ свое время садовой англійской фирмы. С. бобовыхъ. (1). М. Д. Н. Оранж. куст. р. Песков. торф. съ небольшимъ колич. глин. дерн. Черенками вѣт. апрѣль, вѣт. маб, подъ стекломъ.

**Л. оксалидифолія** (*L. oxalidifolia*, съ лл. какъ у Оксалиса). Цв. малиновые, вѣт. июль. 1—3 ф.

**ЛОДОЙЦЕА** (*Lodoicea*). Полагаютъ, что это — названіе измѣненное: **Лаодицеа** — дочь царя Пріама. С. пальмовыхъ. (1). Сейшельскіе о. Телл., рѣдко встрѣчаемая въ садахъ. Сильная глин. дерн. съ листов. поровну. Сѣменами.

**Л. сешеллярумъ** (*L. sechellarum*, сейшельская). Валъ вѣрообразная, большія, длиной до 20 ф., шир. въ 6 ф. Плоды очень



большие, двойчатые и тройчатые, въсящие больше пуда. Это—*Socos de mer*.

**ЛОДОЧКА. ЧЕЛНОЧЕКЪ.** Нижній лепесток мотыльковаго цвѣтка.

**ЛОЖЕ. ТОРЪ.** Часть оси, на которой помещаются органы; у цв. ложка—доли, лепестки, тычинки и плодники; у цвѣторасположенія—ось или главный стержень головки, колоса и др.

**ЛОЖЕЦВѢТНЫЙ.** Отдѣлъ растений, у которыхъ цвѣт. части вырастаютъ изъ ложка.

**ЛОЖЕЧНАЯ ТРАВА.** См. Кохлеарія.

**ЛОЗА.** Стебель кустарнаго раст., особенно винограда. Ветла. Ива.

**ЛОЗЕННИКЪ. ЛОЗНЯКЪ.** Мелкій вьюнъ.

**ЛОКХАРТІЯ (Lokhartia).** *Локхартъ* (Lokhart)—путешественникъ, нашедшій одинъ изъ видовъ (элегантъ) этихъ рр. С. орхидей. (10). Троп. Америка отъ Бразиліи до Мексики. Тепл. эпифитъ. Воспитываются на чуркахъ, въ теплѣ.

**Л. ахута** (L. acuta, съ острокопечными л.). Тринидадъ. Цв. желтые съ краснымъ, въ іюнь. 6 д. **Л. элегансъ** (L. elegans, пазиллал). Тринидадъ. Цв. свѣтло-желтые. 3—5 д.

**ЛОКОТЬ.** Длина около 14 верш.

**ЛОКСОКОККУСЪ (Loxococcus).** *Лохос*—кособокий и *kokkos*—ягода, по кособокому плоду. С. пальмъ. (1). Цейлонъ. Теплич. пальма. Ухождъ какъ за Арека.

**Л. руйколя** (L. ruscicola, любящая каменности мѣста). Цв. и чехолъ кроваво-красные; лл. перистые, длиною въ 5—6 ф., шир. въ 3—4 ф. Стволъ 30—40 ф. Сип. *Птихохотерма руйколя* (Ptychosperma ruscicola).

**ЛОКСОМА (Loxsuma).** *Лохос*—кособокий и *soma*—тѣло, споровый кучки опоясаны не полнымъ кольцомъ. С. папоротниковыхъ. (1). Нов. Зеландія. Оранже. раст.

**Л. Коннингхэми** (L. Cunninghami, Коннингхэма). Ван. премноголожный, длиною въ 1—1½ ф.

**ЛОМАРІЯ (Lomaria).** *Лома*—край, по расположенію споровыхъ кучекъ. С. папоротниковыхъ. (50). Умѣр. страны южн. полушарія, Тепл., оранже. и воздуш. рр. Глин. дерн. съ торф., а мелкіе виды въ одной торф.

**Л. альпина** (L. alpina, альпійская). Бразилія. Ван. линейно-ланцетов. съ тупокопечными перьями. Оранже. **Л. аттенуата** (L. attenuata, суженная). Троп. Америка. Ван. широко-овальной, постепенно суживающейся книзу. Тепл. Сип. **Л. гигантеа** (L. gigantea). **Л. блехнойдесъ** (L. blechnoides), похожая на Блехнумъ). Чили. Ван. ланцетовидный; верхнія перья съ разширенными основаниями. Оранже. **Л. Боріана** (L. Boriana, Борн). Вестиндія, Фалклендскіе о., Ю. Америка. Ван. овальной, перья частыя, ланцетовидныя, суживающіяся къ концамъ постепенно. Оранже. **Л. гибба** (L. gibba, горбатая). Нов. Каледонія. Ван. длинныя, съ перьями пониклыми, широкими. Тепл. и оранже. **Л. дисколоръ** (L. discolor, разноцвѣтная). Австралія. Ван. широкія, книзу суженныя, разбѣзанныя почти до сред. черенка. Оранже. **Л. нигра** (L. nigra, черная). Нов. Зеландія. Ван. въ 4—6 д. длинной, широкія, разбѣзанныя до самаго почти сред. черенка. Оранже. **Л. процера** (L. procera, высокая). Мексика. Ван. съ перьями линейными, изгибающимися округло или сердцевидное основаніе. Сип. **Л. Джиллиса** (L. Gilliesii). **Л. пумила** (L. pumila, маленькая). Нов. Зеландія. Ван. въ 3—4 д. длинной съ линейными перьями. Полувыносл. **Л. спикантъ** (L. spicatus, колосчатый). С. полушаріе. Ван. въ 1—2 ф. длинной, перья линейныя, широко-разставленныя, съ разширенными основаниями. Сип. **Л. Блэнуи** **спикантъ** (Blechnum spicatus). Выносл. или полувыносл. Имѣетъ много разновидностей. **Л. Фразери** (L. Fraseri, Фразера). Нов. Зеландія. Ван. овальной, острокопечныя, двуперистыя. Оранже. **Л. циліата** (L. ciliata, рѣсничатая). Новая Каледонія. Ван. перистыя съ линейными перьями. Теплич.

**ЛОМАТІЯ (Lomatia).** *Лома*, *lomatos*—край, по крыловиднымъ краямъ сѣмянъ. С. протейныхъ. (9). Австралія Чили. Оранже. куст. или дрв. рр. Глин. дерн. съ торф. и пескомъ по ровну. Черенками изъ вызрѣвшихъ побѣговъ, въ умѣренномъ парникѣ.

**Л. силлаифолія** (L. silaifolia, съ лл. какъ у Силлауся). Н. Ю. Валлеса. Цв. бѣлые, длинными вѣтвями. 2 ф. **Л. ферругінеа** (L. ferruginea, ржавая). Чили. Лл. очень темно-зеленыя, двуперисторазсѣченные. 10 ф.

**ЛОМАТОФІЛЬДІОМЪ (Lomatophyllum)** *Лома*, *lomatos*—край, и *phyllon*—листь. С. лилейныхъ. (3). Оранже. сочныя рр.: близкія къ Алоэ и содержимыя такъ-же.

**Л. алоифлорумъ** (L. aloiflorum, съ цв. какъ у Алоэ). О. Бурбонъ. Цв. желтые съ красно-коричневымъ отливомъ, въ іюнь. 8 ф.

**ЛОМОТНАЯ ТРАВА.** См. Кампанула.

**ЛОНАСЪ (Lonas).** Значеніе названія неизвѣстно. С. сложноцвѣтныхъ. (1). С. Америка. Выносливое однол. трав. р. Садовая обикн. Сѣменами, весной, на воздухѣ.

**Л. инодора** (L. inodora, не имѣющая запаха). Цв. головки желтыя, въ іюль до октября. 1 ф.

**ЛОНИЦЕРА (Lonicer).** Адамъ *Лонитеръ* (Lonicer или Lonidzer)—германскій ботаникъ, † 1586. С. жимолостныхъ. (80). Умѣр. и около троп. страны Сѣв. полушарія, рѣдко подъ тропиками. Оранже. полувыносл. и выносл. приморскія или вьющіяся куст. рр. Хорошая садовая. Черенками, отводкой и сѣменами.

**Л. каприфоліумъ** (L. caprifolium, съ лл. какъ козья ступня). *Каприфолій*. *Шеверфейль*. 3. Европа. Цв. желтоватые, съ синеватой трубкой, въ маѣ—іюнь, пахучіе. Стебель вьется съ лѣва на право. **Л. периклименумъ** (L. periclymenum, немецкая). Европа. Цв. снаружи темно-красные, съ весны до осени. Вѣтви вьющіяся. Имѣетъ нѣсколько разновидностей. **Л. семпервиренсъ** (L. sempervirens, вѣчнозеленая). С. Америка. Цв. снаружи шарлаховые, внутри желтые, весной и лѣтомъ. Вѣтви обвивающія. Оранже. Имѣетъ разновидность *миморъ* (mimor). **Л. татарика** (L. tatarica, татарская). *Жимолость*. Европа. Сибирь. Цв. розовые, въ маѣ. 4—6 ф. Нѣсколько разновидностей. **Л. флава** (L. flava, желтая). С. Америка. Цв. желтые, душистые, въ іюнь. Р. вьющеся. **Л. флексуоза** (L. flexuosa, съ гибкимъ стеблемъ). Японія. Цв. желтые, очень душистые, въ іюнь—іюль. 4—5 ф. Вьющеся р. Сип. **Л. брахипода** (L. brachypoda). Оранже. Имѣетъ разновидность съ неперенными лл.,—*ауреа ретикулата* (aurea reticulata). **Л. фрагрантиссима** (L. fragrantissima, самая душистая). Китай. Цв. бѣлые, очень душистые, въ февралѣ. 6 ф. Оранже.

**ЛОНХИТИСЪ (Lonchitis).** *Лонче*—копье, по лл.,—названіе заимствованное у Діоскорида. С. папоротниковыхъ. (2). Теплич. рр.

**Л. пубесценсъ** (L. pubescens, пушистый). О. Маврикія. Ван. длиною въ 2 до 4 ф., дельтовидныя, трехперисторазсѣченныя.

**ЛОНХОКАРПУСЪ (Lonchocarpus).** *Лонче*—копье и *carpos*—плодъ, по формѣ стручка. С. бобовыхъ. (50). Троп. Америка и Африка, одинъ видъ—въ Австраліи. Высоко вьющ. куст. или дрв. рр. Волокн. глин. дерн. съ волокн. торф. и небольшимъ колч. песку. Черенками, въ маѣ—іюнь, изъ полузрѣлаго роста, въ умѣр. парникѣ, въ пескѣ.

**Л. розеусъ** (L. roseus, розовый). Юж. Америка. Цв. большіе, розовые. 20 ф.

**ЛОПАСТЬ.** Широкий и плоскій копець. Раздѣлъ листа, лепестка.

**ЛОПАТА.** Лопастное орудіе для коп-

ки, выгребу, навалки и пересышки сыпучихъ тѣлъ. Желѣзная лопата есть *заступъ*. Деревянная бываетъ различная по назначенію. *Огородная* съ оковкою.

**ЛОПЕСІЯ (Lopezia).** *Лопесъ* (Lopez)—испанскій ботаникъ. С. онагриковыхъ. (20). Мексика, Гватемала. Тепл., оранже. и воздуш. однол. рр. Легкая. Сѣменами весной, въ парникѣ.

**Л. короната** (L. coronata, увѣнчанная). Мексика. Цв. розово-пурпуровые, съ іюля до сентября. 1½ ф. **Л. макрофилля** (L. macrophylla, большелистная). Мексика. Цв. ярко-красные. Полукуст. оранже.

**ЛОРЕЙЯ (Loreya).** *Лорей* (Lorey)—французск. ботаникъ. С. черноустыхъ. (8). С. Бразилія и Гвіана. Тепл. дрв. орнамент. рр. Ухождъ какъ за Мелистома.

**Л. арборесценсъ** (L. arborescens, древесная). Гвіана. Цв. бѣлые, въ іюль. 30 ф.

**ЛОРОПЕТАЛОМЪ (Loropetalum).** *Лорон*—языкъ и *petalon*—лепестокъ, по язычковымъ удлинненнымъ лепесткамъ. С. двохлѣстниковыхъ. (1). Китай. Полувыносливый кустъ. Легкая сильная. Сѣменами или черенками.

**Л. хинензе** (L. chinense, китайскій). Цв. бѣлые, мелкіе, осенью. 4 ф.

**ЛОТУСЪ (Lotus).** У Діоскорида и Теофраста такъ названо какое-то бобовое р. С. бобовыхъ. (100). Умѣр. страны С. полушарія, гористыя въ тропич. Азіи и вѣв-троп. Южн. Африкѣ. Оранже. трав. или полукуст. рр. На землю не прихотливы. Сѣменами и черенками.

**Л. аустралисъ** (L. australis, южный). Австралія. Цв. малиновые, но бываютъ и бѣлые и красно-пурпуровые, въ іюль. 2 ф. Оранже. многол. трав. **Л. корникулатусъ** (L. corniculatus, съ малыми роженками). *Латинный горошекъ*. Сѣв. полушаріе. Цв. ярко-желтые, при завяданіи оранжевые; у основанія флагъ красный, лѣтомъ и осенью. Выносл. **Л. пеліоринхусъ** (L. peliorynchus, голубинный носокъ). Тенерифъ. Цв. шарлаховые, въ маѣ. 2 ф. Оранже. **Л. якобѣусъ** (L. jacobaeus, св. Іакова). О. Зеленаго Мыса. Цв. темно-пурпуровые, почти черные, съ желтымъ флагомъ, лѣтомъ и осенью. 1—3 ф. Оранже.

**ЛОТУСЪ.** См. Діоспирозъ.

**ЛОТЦКІЯ (Lhotzky).** Д-ръ *Лотцкій* (Lhotzky)—австрійскій ботаникъ, путешествовавшій по Австраліи. С. митровыхъ. (8). Австралія. Верескообразные кустарники. Глин. дерн. съ небольшимъ количествомъ торф. и песку. Черенками изъ молодого роста, въ пескѣ, подъ стекломъ.

**Л. акутифолія** (L. acutifolia, остролистная). Цв. бѣлые или желтоватые, въ



июнь. 1½ ф. **Л. violacea** (L. violacea, фиолетовая). Цв. пурпуровые, въ июнь. 1½ ф.

**ЛОФАНТУСЪ** (Lophanthus). *Lophos*—гребешокъ и *anthos*—цвѣтокъ, по гребенчатой срединѣ губы. С. губоцвѣтныхъ. (6). С. Америка. Вѣт.-троп. Вост. Азія. Полувыносл. трав. рр. Обыкновенная. Дѣленіемъ.

**Л. анисатусъ** (L. anisatus, съ запахомъ аниса). С. Америка. Цв. голубые, въ июль; лд. съ запахомъ аниса. 3 ф. **Л. скрофуляріефоліусъ** (L. scorophulariaefolius, съ лд. какъ у Скрофулярія). С. Америка. Цв. пурпуровые, въ июль. 5 ф.

**ЛОФІРА** (Lophira). *Lophos*—гребень и *eiro*—размѣщать, по долямъ вытянутымъ въ язычки или гребешки. С. двукрылоплодныхъ. (1). Троп. З. Африка. Тепл. пирамидальное дерево. Песков. глин. дерн. и волокнист. торф. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ песокъ, въ умѣр. парникъ.

**Л. африкана** (L. africana, африканская). Цв. желтые, въ февраль. 10 ф.

**ЛОФИОЛЯ** (Lophiola). *Lophos*—гребень, по гребенчатымъ плодикамъ. С. кровяниковыхъ. (1). С. Америка. Выносл. многол. р. Торф. земля, затѣненное положеніе. Дѣленіемъ весной или осенью.

**Л. aurea** (L. aurea, золотистая). Цв. желтые, густо-пушистые снаружи, въ июнь. 1½ ф.

**ЛОХОВЫЯ** (elaegnaceae). Малочисленное семейство древесныхъ или кустарныхъ рр. съ болѣе или менѣе густыми серебристыми или буроватыми чешуйками. Родовъ 3.—Гиннофое, Шефердія и Элеагнусъ.

**ЛУБЪ**. Подкорье, исподняя кора, покрывающая болонъ. Липовый лубъ даетъ мочало.

**ЛУГОВИКЪ**. См. Аира.

**ЛУГЪ**. Газонъ, мѣсто покрытое травой.

**ЛУЖАЙКА**. Небольшой лугъ. Луговая площадка.

**ЛУКОВИЦА**. Зачаточный, вадувшійся стебель, вырастающій надъ или подъ землей. Состоитъ: 1. изъ болѣе или менѣе мясистаго *донца*, которое выпускаетъ изъ себя корни; 2. болѣе или менѣе сочныхъ чешуекъ или покрововъ, вырастающихъ изъ донца и 3. болѣе или менѣе центрального побѣга,—стебля, тоже выходящаго изъ донца и защищеннаго чешуйками или покровомъ. Въ луковицѣ скопляется питательное вещество, которое должно потребиться въ слѣдующемъ году. Луковицы бываютъ чешуйчатыя (напр. у лиліи) и покровныя (напр. хіацинтъ, тюль-

панъ). Оставаясь долго на воздухѣ луковицы высыхаютъ и теряютъ производительность.

**ЛУКОВИЧНЫЯ** рр. Травянистыя многолѣтнія рр. съ луковицами.

**ЛУКЪ ЕГИПЕТСКИЙ, ПЕСЧАНЫЙ, ПЕПЛОВЫЙ и РЫПЧАТЫЙ**. См. Алыиомъ. **ЛУКЪ РЫПЧАТЫЙ**. Корень, луковица; *зеленый*—стрѣльчатый, стебли; *спянецъ*—луковички полученные отъ сѣмянъ, *саженецъ*—тѣ же луковицы сажаемыя послѣ перезимовки.

**ЛУНКА**. Ямка, въ которую сѣютъ или сажаютъ.

**ЛУНОСЪМЕННОКОВЫЯ** рр. (menispermaceae). Вьющіяся, рѣдко прямыя, кустарныя и полукустарныя рр., раскинутыя почти по всему тропическому поясу. Родовъ 31, видовъ 300. Комкулосъ, Мениспермумъ, Циссамелосъ.

**ЛЫКО**. Молодой дубъ. Молодая кора.

**ЛЪЛОЙДІЯ** (Lloydia). Эд. *Ллойдъ* (Lloyd) нашедшій это р. С. лилейныхъ. (2). Европа, Центр. и С. Азія и С. Америка. Лукович. выносл. и полувыносл. рр. Сухая песков. глин. дерн. Отпрысками или луков. почками.

**Л. серотина** (L. serotina, цвѣтущая поздно). Возвышенности ариич. пояса сѣв. полушарія. Цв. бѣлые съ зелеными жилками, въ июнь. 5—6 д. Спн. *Антерикумъ серотинумъ* (Anthericum serotinum).

**ЛЪЮИЗІЯ** (Lewisia). Кап. англ. службы *Льюисъ* (Lewis), сопровождавшій кап. Клерка въ Каменистыя горы въ С. Америкѣ. С. портулаковыхъ. (1). С.-З. Америка. Песков. глин. дерн. Сѣменами или дѣленіемъ, весной. Хорошее р. для каменистаго участка.

**Л. редивива** (L. rediviva, оживающая). Цв. въ 3—4 д. шир., малиновые съ почти бѣлою серединою, лѣтомъ. Корень съдо-мый, мясистый. 3—4 д.

**ЛЪЯВЕА** (Llavea). *Ла Лявеа* (La Llave) нашелъ это р. С. папоротниковыхъ. (1). Мексика. Тепл. папорот. Торф. съ пескомъ.

**Л. кордифолия** (L. cordifolia, сердцевидная). Вап. длиною 1—2 ф., шир. 6—12 д., трехперистая. Спн. *Цератодактилусъ осмундидесъ* (Ceratodactylis osmundioides).

**ЛЪСАТИКОВЫЯ** рр. (memecyleae), составлявшія прежде отдѣльное сем., присоединены теперь къ чернушнымъ.

**ЛЪСЪ**. Пространство покрытое ростущими и рослыми деревьями.

**ЛЪТНИКИ**. Цвѣтущія травянистыя растенія, употребляемая для лѣтнаго цвѣтѣнія. Лѣтники—не всѣ однолѣтнія растенія, хотя значительная часть ихъ и

живетъ только отъ весны до осени; но всѣ они высѣваются въ садахъ ежегодно и не сберегаются зимою въ помѣщеніи. Лѣтники бываютъ *выносимые*, не требующіе искусственной теплоты для развитія, но растутъ и цвѣтутъ вполне хорошо на воздухѣ, а потому сѣются на тѣ мѣста, гдѣ должны быть и цвѣсти. Сѣвъ ихъ дѣлается, смотря по климату, въ мартѣ—апрѣлѣ. Дальнѣйшее попеченіе за ними состоитъ въ содержаніи всходовъ въ чистотѣ отъ сорныхъ травъ и въ прорѣженіи слишкомъ густо вошедшихъ, чтобы растенія могли имѣть достаточный просторъ для развитія и цвѣсти обильно.

Для продолженія цвѣтѣнія дѣлаются нѣсколько посѣвовъ того же растенія въ горшкахъ, чтобы изъ нихъ высадить на мѣста отцвѣтшихъ или попортившихся. Въ горшки сѣять удобнѣе, чѣмъ на грядку, потому что высадка изъ горшковъ надежнѣе; но многія растенія не любятъ пересадки. Растенія цвѣтущія весной рано можно сѣять въ грунтъ съ осени или въ концѣ іюля, либо началѣ августа, а въ предупрежденіе ихъ вызябки или вымочки, часть посѣять въ горшки и ихъ поддерживать до весны въ защищенномъ отъ мороза мѣстѣ.

Второго рода лѣтники можно назвать *полувыносимыми*. Это такіе, которымъ мѣстный климатъ не достаточно тепелъ, т. е. лѣто или не достаточно тепло, или не достаточно продолжительно для совершенія ими познанаго роста. Такіе лѣтники высѣваются въ теплое помѣщеніи,—парники или оранжереи и послѣ приученія къ наружному воздуху высаживаются въ открытый грунтъ послѣ весеннихъ морозовъ (около половины мая); такимъ растеніямъ необходимы, какъ только появятся всходы, свѣтъ и воздухъ, иначе они цвѣтутъ дурно и скудно.

Наконецъ послѣдняго рода лѣтники составляютъ растенія, которыя выводятся такъ-же, какъ полу-выносимыя, но на открытый воздухъ не высаживаются, а все время остаются подъ стекломъ въ оранжереѣ или теплицѣ.

Всѣ, или почти всѣ, лѣтники любятъ открытое солнечное освѣщеніе и свободный доступъ воздуха. Эти условія достигаются вполне при воспитаніи въ открытомъ грунтѣ, но часто нарушаются при содержаніи лѣтниковъ въ оранжереѣ, гдѣ ихъ ставятъ или слишкомъ тѣсно, или лишаютъ необходимаго воздуха и свѣта, отставляя слишкомъ далеко отъ рамы или затѣняя.

**ЛѢТО**. Самое теплое изъ четырехъ временъ года; отъ вступленія солнца въ знакъ рака до вступленія въ знакъ вѣсовъ, отъ 9-го іюня до 11 сентября. Для

каждой мѣстности—свое лѣто; въ средней полосѣ Россіи считаютъ за лѣто іюнь, іюль и августъ.

**ЛѢТОРОСТЬ. ЛѢТОРОСЛЬ**. Годовой побѣтъ, прибыль роста въ одно лѣто.

**ЛЪЩІНА**. Она же—лѣща (лещ).

**ЛЮАЗЕЛЕРЕЯ** (Loiseleuria). *Луазелеръ* *Делоншанъ* (Loiseleur Delongchamps),—франц. ботаникъ, † 1849. С. перескоковыхъ. (1). Арктич. и альпійскіе пояса Сѣв. полушарія. Выносл. низкоросл. куст. Влажная песков. Отводкою.

**Л. прокумбенсъ** (L. procumbens, приземная). Цв. розовые, мелкіе, въ іюль. Спн. *Азалеа прокумбенсъ* (Azalea procumbens).

**ЛЮБИТЕЛЬ**. Кто возвращаетъ, воспитываетъ и разводитъ растенія для удовлетворенія исключительно любви своей къ нимъ.

**ЛЮБНИКЪ**. См. Эрактисъ.

**ЛЮБОВНЫЯ ВЪЩНИ**. См. Солянумъ.

**ЛЮДИЯ** (Ludia). *Лудисъ*—игра, прихоть, по разнообразію очертанія лл. С. биксовыхъ. (1). О. Маврикія. Теплич. куст. р. Глин. дер. съ торф. и пескомъ. Черенками изъ полужрѣлой древесины въ песокъ, въ парникъ.

**Л. сессилифлора** (L. sessiliflora, съ сидячими цв.). Цв. бѣловатые, въ іюль и августъ. 8—12 ф.

**ЛЮИЗІА** (Luisia). *Донъ Льюисъ де Торресъ* (Don Luis de Torres)—испанскій ботаникъ. С. орхидей. (10). Остиндія и В. Азія отъ Малайскаго архипелага до Японіи. Тепл. эпифиты. На чуркахъ съ торф. мхомъ. Дѣленіемъ.

**Л. платиглосса** (L. platyglossa, съ широкою губой). Казія. Цв. тускло-пурпуровые или съ бѣлыми лепестками и долями.

**ЛЮКСЕМБУРГІЯ** (Luxemburgia). Герцогъ Люксембургскій содѣйствовалъ путешествію Огюста С. Илера въ Бразилію. С. охновыхъ. (7). Бразилія. Тепл. древ. и куст. рр. Глин. дерн. съ торф. Черенками изъ полужрѣлаго роста, въ песокъ, въ парникъ.

**Л. коримбоза** (L. corimbosa, щитковая). Цв. желтые, большіе, лѣтомъ. Дерево.

**ЛЮКУЛЯ** (Luculia). На родинѣ называется *Люкули эва*. С. мареновыхъ. (2). Гималаи и горы Казин. Орнам. оранж. куст. рр. Волокнист. глин. дерн. съ торф. и пескомъ. Сѣменами и черенками изъ молодого роста, лѣтомъ, подъ стекломъ.

**Л. гратиссима** (L. gratissima, очень изящная). Умѣр. Гималаи. Цв. розовые, пахучіе, осенью. 9—16 ф. **Л. Пинцеана** (L. Pinceana, Пянсона). Горы Казин. Цв.



блѣдые, крупные и душистые, чѣмъ у первой, съ мая до сентября.

**ЛЮКУМА (Lucuma).** Название мѣстное перуанское. С. сапотовыхъ. (60). Ю. Америка отъ Чили и Перу до Мексики и Вестиндіи, Австралія. Тепл. деревья и кусты. Уходъ какъ за Хризифиллумъ.

**Л. маммоза (L. mammosa, сосковатая).** Ю. Америка. Цв. мелкіе, бѣловатые; плоды овальные, съ грубою кожицею, подъ которою сочная, вкусная мякоть, употребляемая въ пищу. 50—100 ф.

**ЛЮНАРІЯ (Lunaria).** *Luna*—луна, по плодникамъ. С. крестоцвѣтныхъ. (2). Европа, З. Азія. Одно- или многол. трав. выносл. прр. Песковатая. Съеменами или дѣленіемъ.

**Л. аннуа (L. annua, однолѣтняя).** Швеція. Цв. фіолетово-лиловые, съ мая до іюля. Двул. Сип. *L. бѣннисъ (L. biennis).*

**ЛЮПИСУСЪ (Lupinus).** Название это взято у Виргилія и происходитъ отъ *lupis*—волкъ, п. ч. сильно источаетъ змлю, на которой растетъ. С. бобовыхъ. (80). Америка, преим. Запад. Европа по Средиземн. побережью. Выносл. или полувыносл. одно или многол., либо полукуст. прр. Хорошая садовая. Съеменами весной. Поименованные ниже виды—выносливые прр., за исключеніемъ тѣхъ, о кот. оговорено.

**Л. арбореусъ (L. arboreus, древесный).** Цв. желтые, душистые, лѣтомъ. Многол. **Л. лейкофиллюсъ (L. leucorhynchus, съ бѣлыми лл.).** С. Америка Цв. малиновые, съ іюня до осени. Прилистники пушистые. 2—3 ф. Многол. **Л. леридусъ (L. leredus, изящный).** С. Америка. Цв. съ синне-пурпуровымъ флагомъ, у котораго при основаніи бѣлое пятно, крылья пурпуровыя, ладья темно-пурпуровая, въ августѣ. 6 д. Многол. **Л. литеусъ (L. luteus, желтый).** Ю. Европа. Цв. желтые, пахучіе, въ іюль до августа. Однол. Сип. *L. одоратусъ (L. odoratus).* **Л. мутабилисъ (L. mutabilis, измѣнчивый).** Ю. Америка. Цв. крупные, флагъ бѣлый, дѣлающийся голубымъ, съ желтою серединою; крылья бѣлые съ черточками, ладья бѣлая, въ іюль до августа. 5 ф. Полукуст. **Л. нанусъ (L. nanus, низкій).** Калифорнія. Цв. лиловые и голубые, лѣтомъ. 1 ф. Однол. **Л. нуткаэнзисъ (L. nootkaensis, изъ Нутки).** Нутка. Цв. голубые съ пурпуровымъ, бѣлымъ или желтымъ, въ май до іюля. 1—1½ ф. Многол. **Л. орнатусъ (L. ornatus, украшенный).** С. Америка. Цв. съ бѣднымъ флагомъ, голубыми крыльями и бѣдною ладьей, съ мая до октяб. 1—2 ф. Многол. **Л. переннисъ (L. peregrinus, многолѣтний).** С. Америка. Цв. голубые, съ мая до іюля. 2 ф. Многол. **Л. полифиллюсъ (L. polyphyllus, многолиственный).** Колумбія.

Цв. темносиніе, весной до осени. 4 ф. Многол. Сип. *L. грандифоліусъ, L. макрофиллюсъ (L. grandifolius, L. macrophyllus).*

**ЛЮСУРИАГО (Luzuriago).** Игнаціо де-Лусуриаго (De-Luzuriago)—испанскій ботаникъ. С. лилейныхъ. (3). Чили, Магеллановъ проливъ, Нов. Зеландія. Полувыносл. или оранж. полукуст. прр. Волокнист. торф. Влажность и затѣненіе. Черенками.

**Л. эректа (L. erecta, пряморослая).** Чили. Цв. съ красно-коричневыми крапинками. 1½ ф. Сип. *Калликсене полифилля Callixene polyphylla).*

**ЛЮТИКОВЫЯ прр. (ranunculaceae).** Семейство изъ травянистыхъ, рѣдко кустарниковъ въющихся породъ, распространенныхъ по всей земной поверхности. Видовъ болѣе 1200, родовъ же 30, между прочими, Акониитумъ, Анемоне, Дельфиніумъ, Клематисъ, Пеонія и Раникулусъ.

**ЛЮФФА (Luffa).** Арабское мѣстное названіе. С. тыквенныхъ. (10). Жаркія страны и Америка. Тепл. однол. трав. прр. Уходъ какъ за Кукурбита.

**Л. асугангула (L. asutanguila, съ острыми углами).** Тропич. Африка. Цв. ярко-желтые, въ сентябрѣ. Лл. сердцевидные, 5—7 угольные, углы острые.

**ЛЮХЕА (Luhea).** Ванъ де Люхе (Luhe), писавшій о капскихъ прр. С. липовыхъ. (16). Троп. страны Нового Свѣта. Тепл. древ. прр. Волокн. торф. съ песков. глинисто-дерн. Черенками изъ полурѣзлаго роста, въ песокъ, въ парникъ.

**Л. паникулата (L. paniculata, метельчатая).** Бразилія. Цв. ровные съ бѣлымъ, въ мартъ и апрѣлѣ. 10—20 ф.

**ЛЯВИСІЯ (Labisia).** *Labis*—ложка, по формѣ раздѣловъ вѣтвочки. С. прищепочныхъ. (4) Малайскій архипелагъ. Теплич. кустарники. Песков. глин. дерн. съ добавленіемъ небольшого количества волокн. торф. Съеменами.

**Л. потойна (L. rotunda, похожая на Потось).** Цв. бѣлые, мелкіе, въ іюнь. 1 ф. или нѣсколько выше.

**ЛЯВИШЕА (Labichea).** *Лябишъ (Labiche)*—морской офицеръ франц., корабля «Уранія», сопровождавшій Фрейсине въ его кругосвѣтное путешествіе. С. бобовыхъ. (5). Австралія. Оранж. куст. или полукуст. прр. Торф. съ глин. дерн. Черенками изъ полурѣзлаго роста, лѣтомъ, въ песокъ, подъ стекломъ.

**Л. ланцеолата (L. lanceolata, ланцетовидная).** З. Австралія. Цв. золотисто-желтые, съ краснымъ основаніемъ верхняго лепестка, въ апрѣлѣ до іюня. 6 ф. Сип. *L. дисперсифолія (L. diversifolia).*

**ЛЯВЛЯБЪ (Lablab).** Арабское названіе вьюнка. С. бобовыхъ. (1). Индія. Однол. трав. р., разводимое въ тропич. странахъ ради плодовъ, — стручьевъ и сѣмянъ, употребляемыхъ въ пищу какъ фасоль. Уходъ какъ за Долхосъ.

**Л. вулгарисъ (L. vulgaris, обыкновенный).** Цв. фіолетовые, въ іюнь. Сип. *Лаблавія вулгарисъ (Lablavia vulgaris).*

**ЛЯВУРНУМЪ (Laburnum).** Названіе заимствованное у Плиннія. С. бобовыхъ. (3). Европа, Малая Азія. Куст. или деревесн. прр. Садовая, всякая. Съеменами, а разновидности прививкой. Пр. этого рода прежде значились въ числѣ Цитизусъ.

**Л. Адама (L. Adami, Адама).** Цв. тускло-пурпуровые. Гибридъ, полученный Жанъ Луи Адамомъ, въ 1825 г., прививкою глазкомъ Цитизусъ пурпуреа къ *L. вулгаре*. Въ немъ замѣчается необычный возвратъ нѣк. частей къ тому или другому изъ произведенныхъ прр. Сип. *Цитизусъ Адама (Cytisus Adami)* **Л. альпинумъ (L. alpinum, альпійскій).** Европа. Цв. желтые въ іюнь, 15—20 ф. Сип. *Цитизусъ альпійскій, Ц. пендулумъ, Ц. фразгрансъ, Ц. хирсutumъ (Cytisus alpinus, C. pendulum, C. fragrans, C. hirsutum).* **Л. вулгаре (L. vulgare, обыкновенный).** Волкозвѣтъ. Красная акація. Южн. Европа. Цв. желтые съ апрѣля до іюня. 20 ф. Сип. *Цитизусъ Лавурумъ (Cytisus Laburnum).* Имѣетъ нѣсколько разновидностей.

**ЛЯВАНДУЛЯ (Lavandula).** *Lavo*—мыть, по употребленію приготовляемой изъ р. воды С. губоцвѣтныхъ. (20). Средиз. побережья, Канарскіе о., Остиндія. Оранж. или полувыносл. травяни. кустарн. или полукуст. прр. Рыхлая. Черенками изъ молодого роста, подъ стекломъ.

**Л. вѣра (L. vera, настоящая).** Ю. Европа. Цв. голубые, иногда бѣлые, лѣтомъ, пахучіе. 1—2 ф.

**ЛЯВРАДІЯ (Lavrada).** Маркизъ *Лаврадіо (Lavradio)*—бразильскій видекороль, покровитель ботаники. С. фіалковыхъ. (6). Бразилія. Тепл. куст. прр. Песков. торф. съ волокн. глин. дерн. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ песокъ, въ парникъ.

**Л. монтана (L. montana, горная).** Цв. темно розовые. 2—3 ф.

**ЛЯГАСЦЕА или ЛЯГАСКА (Lagascia, Lagasca).** *Ляаска (Lagasca)*—испанскій ботаникъ, проф. въ Мадридѣ. + 1839 г. С. сложноцвѣтныхъ. (7). Мексика и Центр. Америка. Тепл. трав. или кустарн. прр. Уходъ какъ за Дисодія.

**Л. латифолія (L. latifolia, широколистная).** Мексика. Цв. головки бѣлыя, пахучія, въ іюнь. 10—12 ф. Кустъ. **Л. моль-**

**лисъ (L. mollis, мягкая).** Куба. Цв. головки бѣлыя, въ августѣ—сентябрѣ. Однол.

**ЛЯГЕНАРИЯ (Lagenaria).** *Lagena*—фляга, по формѣ плода. С. тыквенныхъ. (1). Азія и троп. Африка. Полувыносливое либо воздушное прр. Уходъ какъ за Кукумисъ.

**Л. вулгарисъ (L. vulgaris, обыкновенная).** Горлики. *Тыква травянка.* Цв. бѣлые, большіе, въ августѣ; плоды бутылчатые съ вытянутой шейкой. Имѣетъ много разновидностей. Воздѣлывается какъ тыква.

**ЛЯГЕНОФОРА (Lagenophora).** *Lagena*—фляга и *pherein*—нести, по бутылчатымъ оберткамъ. С. сложноцвѣтныхъ. (12). Нов. Зеландія и Австралія. Оранж. трав. прр., похожая на маргаритки (Бельнсъ). Легкая. Дѣленіемъ.

**Л. Бильярдиери (L. Billardieri, Бильярдиери).** Австралія. Цв. головки съ лучевыми цв. голубыми, лѣтомъ. **Л. Форстера (L. Forsteri, Форстера).** Нов. Зеландія. Цв. головки желтыя съ пурпуровымъ.

**ЛЯГЕРСТРЕМІЯ (Lagerströmia).** Магнусъ *Лягерстрёмъ (Lagerström)* другъ Линнея, + 1759. С. плакуновыхъ. (14). Тропич. и вѣт-троп. В. Азія. Теплич. или оранж. куст. а древ. прр. Торф. пополамъ съ глин. дерн. Черенками изъ вырѣзанныхъ боковыхъ побѣговъ, весной, въ парникъ. Темп. лѣтомъ 13—26, зимой 10—13°.

**Л. индика (L. indica, индійская).** Отъ Малая до Китая. Цв. ярко-малиновые, крупные, красивые. 6—10 ф. Имѣетъ бѣлую разновидность (альба, alba) изъ Китая.

**ЛЯГЕТТА (Lagetta).** Мѣстное индійское названіе. С. ягодковыхъ. (2). Остиндія. Тепл. древ. прр. Торф. съ глин. дерн. Черенками изъ полурѣзлаго роста, весной, въ песокъ, въ парникъ.

**Л. литеарія (L. lintearia, полотняная).** Ямайка. Цв. бѣлые. 6 ф.

**ЛЯГУРУСЪ (Lagurus).** *Lagos*—заяцъ и *oura*—хвостъ. С. злаковъ. (1). Средиземное побережье, З. берегъ Европы. Однолѣт выносл. р. Лучше сѣять съ осени и зиму сохранить въ оранжереѣ, а весной высадить на воздухъ.

**Л. оватусъ (L. ovatus, съ яйцевиднымъ колосомъ).** Колосъ овальные, пушистые, въ іюнь до сентября. Соломина выш. 1 ф.

**ЛЯГУНАРІЯ (Lagunaria).** *Андресъ де Лагуна (Laguna)*—испанскій ботаникъ, + 1560. С. мальвовыхъ. В. Австралія, о. Норфолкъ. Оранж. древ. прр. Торф. съ глин. дерн. Черенками изъ полурѣзлаго роста, въ легкомъ теплѣ.

**Л. Патерсонія (L. Patersonii, Патерсо-не).** О. Норфолкъ. Цв. свѣтло-красные, почти бѣлые, крупные, лѣтомъ. 20 ф.



**ЛЯГУШНИКОВЫЯ** pp. (hydrocharideae). Малочисленное сем. водяных травянистых раст., широко распространённых по земной поверхности. Число родов простирается до 14, видов—до 40. Из родов наиболее известны: Вальснерия, Гидрохарис, Оттеля, Стратея.

**ЛЯГУШНИКЪ**. См. Хидрохарисъ.

**ЛАЗИОПЕТАЛУМЪ** (Lasiorpetalum). *Lasios*—шерстистый и *petalon*—лепестокъ. С. навозниковыхъ. (25). Вѣтроп. Австралія. Оранж. куст. рр. Песков. торф. и волокн. глин. дерн. Черенками изъ полурѣзлаго роста, въ песокъ, въ апрѣлѣ, подъ стекломъ.

**Л. Вауэри** (L. Baueri, Вауэра). Цв. бѣлые, весной. **Л. макрофилъюмъ** (L. macrophyllum, крупнолистный). Цв. бѣдно-зеленые, въ маѣ, 5 ф. **Л. ферругинеумъ** (L. ferrugineum, ржавый). Цв. темно-пурпуровые, мелкіе, въ іюлѣ. Высокій кустъ.

**ЛЯЙОНИЯ** (Lyonia). Дж. Лайонъ (Lyons)—коллекторъ с.-амер. рр. С. вересковыхъ. (8). С. Америка, Мексика, Ямайка, Куба. Оранж. древ. или куст. рр. Торф. или песков. глин. дерн. Отводкой или сѣменами въ песокъ. торф.

**Л. ямаикѣнскъ** (L. jamaicensis, ямайская). Ямайка. Цв. бѣлые, въ іюлѣ. Куст.

**ЛЯЙОНСИЯ** (Lyonsia) Израель Лайонсъ (Lyons)—проф. ботан. въ Оксфордѣ, † 1775. С. кутровыхъ (13). Австралія, Нов. Каледонія, о. Фиджи. Оранж. и тепл. вьющ. кустар. или полукуст. рр. Песч. торф. съ небольшою кол. волоки. глин. дерн. Черенками изъ молодого роста въ апрѣлѣ, въ песокъ, подъ стекломъ.

**Л. страминѣя** (L. straminea, палева). Н. Ю. Валисъ. Цв. полосатые, палевые, въ іюлѣ.

**ЛЯЙТФУТІЯ** (Lightfootia). Пасторъ Лайтфутъ (Rev. J. Lightfoot)—авторъ Флоры Шотландіи, † 1788. С. колокольчиковыхъ. (40). М. Д. Н. Оранж. куст. рр. Смѣсь изъ глин. дерн. съ торф. и пескомъ. Черенками изъ молодого роста въ песокъ съ торф. подъ стекломъ, или сѣменами въ парникѣ, весной.

**Л. циліата** (L. ciliata, рѣсничатая). Цв. голубоватые, въ іюлѣ. 9 д. Син. **Л. Лоддиджесіи** (L. Loddigesii).

**ЛЯЙЯ** (Lauia) Томасъ Лай (Lau)—натуралистъ, сопровождавшій Бичен. С. сложноцвѣтныхъ. (12). С. Америка. Обычно однол. трав. рр. Садовая обыкн. Сѣменами въ парникѣ.

**Л. платиглосса** (L. platyglossa, съ плоскими язычками). Это *Каллихтисъ платиглосса* (Callichtha platyglossa). **Л. каллиглосса** (L. calliglossa, съ гольми язычками). Калифорнія. Цв. головки съ желто-

ватыми лучами, хохолокъ изъ шиловидныхъ щетиннокъ. Син. *Оксиура хризантемойдесъ* (Oxiura chrysanthemoides). **Л. хризантемойдесъ** (L. chrysanthemoides, похожая на Хризантемъ). Калифорнія. Цв. головки желтыя, у основанія язычковъ цвѣтъ темнѣе; хохолокъ нѣтъ. 1½ ф.

**ЛЯЕСМАННІЯ** (Lachmannia). Ляксманнъ (E. Lachmann), путешествовавшій по Сибирю, † 1796. С. лилейныхъ. (8). Австралія. Оранж. куст. рр. съ волокнистыми корнями. Глин. дерн. съ торф. Дѣленіемъ.

**Л. грандифлора** (L. grandiflora, крупноцвѣтная). Цв. бѣлые въ пленчатыхъ прицвѣтникахъ, въ іюлѣ. Стебли у старыхъ экз. дернистые. **Л. грацилисъ** (L. gracilis, изящная). Цв. малиновые, въ іюлѣ. Стебли тонкіе, дерниной.

**ЛЯЕТУКА** (Lactuca). Отъ *lac*—молоко, по млечному соку. С. сложноцвѣтныхъ. (60). Умѣр. страны С. полушарія и Юж. Африки. Одно-, многол. трав. рр. Глубокая песков. глин. дерн. Дѣленіемъ или сѣменами.

**Л. альпійка** (L. alpina, альпійская). Арктич. и альпійская Европа, Зап. Сибирь. Цв. головки сине-пурпуровыя, въ іюлѣ. Многол. 3 ф. **Л. макрориза** (L. macrorhiza, съ большими корнями). Гималаи. Цв. головки фиолетовыя, осенью. Многол. 2 ф. **Л. сатива** (L. sativa, съдомал, Саладная). *Латукъ-саладъ*. Цв. головки бѣдно-желтыя, въ іюлѣ, 4 ф. Однол. Садовыхъ разновидностей очень много; ихъ можно раздѣлить на кочанные и листовыя. Латукъ нуждается въ глубокой, легкой, но сильно удобренной землѣ. Высѣвается въ парникъ, потомъ рассаживается въ промежуточномъ разстояніи около фута. Полагаютъ, что воспитываемый латукъ произошелъ отъ *Л. скариола* (L. scariola). **Л. тубероза** (L. tuberosa, клубневая). Таврскія горы. Цв. головки голубыя, осенью. 1—1½ ф. Многол. трав.

**ЛЯЛЬЛЕМАНТІЯ** (Lallemantia). Лальлеманнъ (J. E. Lallemant)—ботаникъ Спб. ботан. сада. С. губоцвѣтныхъ. (4). Мал. Азія. Одно- и двул. трав. р. Ухожь и условно развитія, какъ для Дракоцефалюмъ.

**Л. канѣсценсъ** (L. canescens, сѣровая). Востокъ. Двулѣт. Цв. голубые, въ іюлѣ—августъ. 1½ ф. Син. *Дракоцефалюмъ канѣсценсъ* (Dracosephalum canescens).

**ЛЯМАРКІЯ** (Lamarckia). Ламаркъ (J. B. Lamarck)—знаменитый французскій натуралистъ, † 1829. С. злаковыхъ. (1). Ю. Европа, С. Африка. Однол. орнамент. злакъ. Ухожь какъ за Лягурусъ.

**Л. aurea** (L. aurea, золотистая). Цв. метелками.

**ЛЯМБЕРТІЯ** (Lambertia). Ламбертъ (Lambert) покровительствовалъ ботаникѣ, † 4825. С. протейныхъ. (8). Австралія. Оранж. куст. рр. Песков. торф. съ волоки. глин. дерн. Черенками изъ молодого роста, или сѣменами въ умѣренномъ теплѣ. Зим. темп. 3—6°.

**Л. формоза** (L. formosa, красивая). Цвѣторасп. макушечное, пушистое, въ іюлѣ до августа. Высокій кустъ.

**ЛЯМИУМЪ** (Lamium). Название заимствованное у Плинія и происходящее, вѣроятно, отъ *laimos*—устье, по формѣ вѣтвочки. С. губоцвѣтныхъ. (40). Европа, С. Африка и вѣтроп. Азія. Одно- и многол. трав. рр. Садоваго значенія не имѣютъ.

**Л. Галеобдолонъ** (L. Galeobdolon). *Стриакъ*. Европа. Цв. большіе, желтые, въ маѣ и іюлѣ. Многол. Въ садахъ употреб. разновидность съ желтыми лл. **Л. макулатумъ** (L. maculatum, лятинскій). *Лужая крапива*. Европа, С. Африка, С. и З. Азія. Цв. обычно пурпуровые, большіе, съ разширеннымъ вверху устьемъ, въ іюлѣ до сентября. Многол. Въ садахъ воспитываютъ форму *ауреумъ* (aureum) съ золотисто-желтыми лл.

**ЛЯМУРЪЗИЯ** (Lamourouzia). Ламуру (Lamouroux)—натуралистъ и проф. въ Канѣ, † 1825. С. норичниковыхъ. (18). Мексика, Центр. и гористая южн. Америка. Оранж. многол. трав. рр. Въ садахъ не встрѣчается по трудности ухода, т. к. рр. эни—чужезадная.

**ЛЯНАРІЯ** (Lanaria). Лана—шерсть, цв. покровъ спаружи пушистый. С. кровяниковыхъ. (1). М. Д. Н. Оранж. многол. трав. р. Песков. глин. дерн. съ торф. Дѣленіемъ корней.

**Л. плюмбоза** (L. plumosa, перистая). Цв. бѣлые, пушистые, въ маѣ. 1½ ф.

**ЛЯНДӨЛЬФИЯ** (Landolphia). Ландольфъ (Landolphe)—начальникъ экспедиціи, которую сопровождалъ въ качества ботаника Палисо де Бове. С. кутровыхъ. (16). Троп. и вѣтроп. южн. Африка, Мадагаскаръ. Тепл. лазящія кустари. рр. Волок. глин. дерн. Черенками въ теплѣ.

**Л. оваріѣнскъ** (L. ovariensis, изъ Овары). Цв. съ чашечкой обѣ овально-округлыхъ лопастихъ. Плодъ величиною въ апельсинъ, съ мохнатою красно-коричневою скорлупой и приятно кисло-сладкою мякотью.

**ЛАНКЕСТЕРІЯ** (Lankesteria). Д-ръ Ланкестеръ (Lankester)—англійскій ботаникъ. С. акаентовыхъ. (3). Тепл. трав. рр. Ухожь какъ за Эрантемумъ.

**Л. Вартери** (L. Bartersi). З. Африка. Цв. желтоватые съ оранжевымъ глазкомъ. **Л. хиспида** (L. hispida, щетинистая). Сьерра-Леоне. Цв. желтые, въ сентябрѣ до ноября. 1 ф. Син. **Л. лонгифлора**, **Л. парвифлора** (L. longiflora, L. parviflora).

**ЛЯНТАНА** (Lantana). Итальянское название Гордовины (Viburnum Lantana). С. вербеновыхъ. (50). Жаркія страны Нов. Свѣта, частію Африки и Азіи. Теплич. трав. и кустари. рр. Глин. дерн. 2 ч., листовой или перегной 1 ч. Черенками въ августѣ, въ мал. горшкахъ, продолжавъ зиму въ оранжереѣ.

**Л. Камара** (L. Samaga, Камара). Ямайка. Цв. красные и нѣые, полушаровидными колосками, въ іюлѣ, 6—10 ф. **Л. кропеа** (L. coccinea, шафранная). Ямайка. Цв. ярко-красные съ желтою серединой, въ іюлѣ. **Л. нивеа** (L. nivea, сѣжная). Остіндія. Цв. бѣлые, съ іюля до октябрі. У формы *мутабиліс* (mutabilis), цв. сначала желтые, потомъ дѣлающіеся розовыми, въ маѣ—іюлѣ. **Л. Селловіана** (L. Sellowiana, Селлова). Монте-Видео. Цв. красно-пурпуровые, плоскими головками; въ декабрѣ и январѣ. **Л. трифольіа** (L. trifolia, трехлистная). Вестиндія. Цв. красноватые или пурпуровые, въ августѣ. Р. кустарное.

Въ садахъ воспитывается множество разновидностей и помѣсей лантанъ, имѣющихъ неоспоренное свойство цвѣсти продолжительное время.

**ЛЯПАЖЕРІЯ** (Lapageria). Жозефина Ляпажеріи, впоследствии императрица французская, страстная любительница ботаники. С. лилейныхъ. (1). Чили. Оранж. и полувьющ., а въ умѣренномъ климатѣ вьющ. цѣлокъ куст. р. Волокн. торф. 3 ч., глин. дерн. 1 ч. съ добавленіемъ песку или древ. угля. Сѣменами и отводкой.

**Л. розеа** (L. rosea, розовая). Цв. ярко-карминные, крупныя, пониклыя, остающіеся долгое время. Имѣетъ разновидности: *альба* (alba) съ бѣлыми и *супербъ* (superba) съ болѣе крупными цв.

**ЛЯПЕИРУЗИЯ** (Lapeyrouziana). Лапейрузъ (La Peyrouse)—французскій кругосвѣтный мореплаватель, † 1788. С. косятиковыхъ. (18). Юж. и Троп. Африка. Оранж. луков. рр. Ухожь какъ за Анамотека.

**Л. анцепсъ** (L. anceps, обоюдная). М. Д. Н. Цв. синеваго-пурпуровые, въ сентябрѣ. 9 д. **Л. коримбоза** (L. corymbosa, щитковая). М. Д. Н. Цв. голубые съ бѣлыми полосками, въ маѣ. 6—12 д. **Л. фиссифольіа** (L. fissifolia, съ разсѣченными лл.). М. Д. Н. Цв. розовые или малиновые, въ августѣ 6 д.

**ЛЯПЛАСЕА** (Laplacea). Де ля Пласъ



(De la Plase) — знаменитый французский математик, † 1827. С. гернстрёмийных. (12). О. Индийского архипелага и троп. Америки. Тел. вьющ. рр. Песков. торф. сь волоки. глин. дерн. Черенками из полурзлого роста, вь песок, вь парникъ. Темп. лѣтомъ 13—24, зимой 8—12°.

**Л. семисеррата** (*L. semiserata*, полузапиленная). Бразилія. Цв. бѣлые, вь сентябрь; лл. ланцетовидные, зубчато-запиленные. 30 ф.

**ЛЯПОРТЕА** (*Laportea*). *Ляпортэ* (*Laportea*) — другъ Годино, назвавшего этотъ родъ. С. крапивныхъ. (25). Вѣтроп. С. Америка, Индія. Тел. травян., кустарн. и древесн. рр. Сильная глин. дерн. сь волоки. торф. или листов. Съеменами или черенками, вь песок, вь теплѣ.

**Л. гига** (*L. gigas*, великанская). Индія до Австраліи. Цв. зеленые. Лл. выемчатые. 80 ф. Дерево. **Л. кренулата** (*L. crenulata*, кругло-зубчатая). Индія. Цв. двудомные, лл. эллиптически-сердцевидные. Дерево. **Л. Шомбургіи вериколоръ** (*L. Schomburgkii-versicolor*, Шомбурга разноцвѣтная). Полинезія. Лл. темнозеленые сь сѣроватыми и бѣлыми пятнами, черешки красно-пурпуровые, мясистые.

**ЛЯРДИСАБАЛА** (*Lardizabala*). *Лардисабала* и *Урибе* (*Lardizabala* у *Urbe*) — испанскій ботаникъ. С. барбарисовыхъ. (2). Чили. Полувын. или оранж. цѣпка кустар. рр. Песков. глин. дерн. сь торф. Черенками изъ полурзлого роста вь песок, подь стекломъ.

**Л. битерната** (*L. biternata*, двутройчатая). Цв. пурпуровые, вь декабрь. Красное оранж. р.

**ЛЯРИКСЪ** (*Larix*). *Лиственница*. Название взято у Диоскорида. С. хвойныхъ. (8). Умѣр. страны сѣв. полушарія. Деревья сь опадающею хвоей. Ухоть какъ за Пинусъ.

**Л. американа** (*L. americana*, американскій). С. Америка, вь болотахъ. Лл. короче и тоньше чѣмъ у обьчныхъ. 70 ф. Сил. *Пинусъ микрокарпа*, *П. пендула* (*Pinus microcarpa*, *P. pendula*). Л. лентолеписъ (*L. lenticularis*, сь мелкими чешуйками). Японія. Лл. линейные, тупоконечные, мягкіе; шишки яйцевидныя. Рост. на возвышенностяхъ вь 9,000 ф. кустомъ. Сил. *Л. японика* (*L. japonica*). Л. окциденталисъ (*L. occidentalis*, западный). С.-З. Америка. Лл. пучками по 15—20, линейные; шишки маленькія, шаровидныя. Ростъ пирамидальный. Сил. *Л. американа бревифolia*, *Пинусъ Нутталліи* (*L. brevifolia*, *Pinus Nuttallii*). Л. дажурика (*L. dahurica*, даурскій). Сибирская *Лиственница*. В. Сибирь. Лл. одиночные или пучками, мягкіе, согнутые; шишки продолговатыя. Ростетъ на предѣлѣ раститель-

постп. **Л. европѣа** (*L. europaea*, европейскій). *Лиственница обыкновенная*. Европа, большія возвышенія. Лл. линейныя, мягкіе, тупые; шишки продолговато-яйцевидныя. 80—100 ф. Имѣетъ нѣсколько разнообразно стей и формъ.

**ЛЯРРЕА** (*Larrea*). Антоній *Ларреа* (*Larrea*) — испанскій менецъ. С. парнолистныхъ. (4). Анды, Техасъ, Мексика, Бразилія. Оранж. куст. рр. Глин. дерн. сь торф., пескомъ и кусками древесн. угля. Черенками изъ полурзлого роста вь песок, подь стекломъ, лѣтомъ. Темп. зимой 4—7°, лѣтомъ — вь затѣненіи.

**Л. мексикана** (*L. mexicana*, мексиканская). С.-З. Америка. Цв. ярко-желтые, лѣтомъ. Р. это на родикъ называется «креозотовымъ» п. ч. издаетъ такой сильный и неприяг. запахъ, что къ нему не подходитъ никакое животное. 4—10 ф. **Л. нитида** (*L. nitida*, глянцовитая). Буеносъ-Айресъ. Цв. желтые, вь июль—июль. 8 ф.

**ЛЯСТЕНІЯ** (*Lastenia*). *Ластенія* — греческая дѣвушка, слушавшая Платона вь мужскомъ одѣяніи. С. сложнотѣльныхъ. (3). Калифорнія, Чили. Однол. полувын. трав. рр. Садовая обьчнов. Съеменами сь осени; всходы прорастаютъ зиму вь оранжереѣ.

**Л. гляндрата** (*L. glabrata*, гладкая). Калифорнія. Цв. головки ярко-желтыя, вь май—июль. 9—18 д. Сил. *Л. калифорника* (*L. californica*).

**ЛЯТАНІЯ** (*Latania*). По названію (*Latanier*) на о. Маврикія С. пальмъ. (3). О. Маврикія. Тел. пальмы. Силн. глин. дерн. 2 ч., торф. 1 ч. сь небольшимъ колич. песку. Съеменами вь теплѣ.

**Л. Верскаффельти** (*L. Verschaffeltii*, Верскаффельтъ) О. Родригесъ. Лл. вѣрные, округлые, глубоко-разсѣченные. Стволъ толстый. 7 ф. Сил. *Л. aurea* (*L. aurea*). **Л. Коммерсоніи** (*L. Commersonii*, Коммерсона). О. Маврикія и Бурбонъ. Лл. вѣрообразно-клиновидные, глубоко-разсѣченные, обьчно-согнутые. 7 ф. Сил. *Л. рубра* (*L. rubra*). Л. Лоддигесіи (*L. Loddigesii*, Лоддигеси). Круглый о. Лл. ярко зеленые сь сининой, ланцевидные, складчатые, разсѣченные на широкіе сегменты; черешки у молодыхъ красноватые. Сил. *Л. глянцопфилла* (*L. glaucophylla*).

**ЛЯТИРУСЪ** (*Lathyrus*). У Теофраста *lathyrus* обозначалъ горохъ. С. бобовыхъ. (170). По всѣмъ умѣреннымъ странамъ свѣта. Вынос. цѣпки трав. рр. Хорошая садовая. Многол. — дѣленіемъ весной, однол. — съеменами.

**Л. грандифлорусъ** (*L. grandiflorus*, крупноцвѣтный). Южн. Европа. Цв. розовые, большіе, вь июль—августъ. Однол. цѣпное. **Л. магелланикусъ** (*L. magel-*

*anicus*, магелланскій). Прол. Магеланскій. Цв. розово-пурпуровые, сь іюля до сентября. Многол. Сил. *Л. армитажанусъ* (*L. armitageanus*). Л. одоратусъ (*L. odoratus*, душистый). *Душистый горошекъ*. Сицилія. Цв. разной окраски, пахучіе, лѣтомъ. Однол. цѣпное. Имѣетъ очень много сортовъ. **Л. розеусъ** (*L. roseus*, розовый). Испанія. Цв. розовые, лѣтомъ. Многол. трав. цѣпное. **Л. ротундифолиусъ** (*L. rotundifolius*, круглолистный). Таврскія горы. Цв. розовые, вь май—июль. Многол. цѣпное. **Л. сильвестрисъ** (*L. sylvestris*, лѣсной). Европа. Цв. красные сь розовымъ, фіолетовымъ и зеленоватымъ, сь іюля до сентября. Многол. цѣпное. Разновидности *платифиллусъ* (*platyphyllus*) имѣетъ цв. розовые, большіе, вь августъ и называется также *Л. латифолиусъ* (*L. latifolius*).

**ЛЯТУА** (*Latua*). Называется мѣстно *Латуѣ*. С. пасленовыхъ. (1). Чили. Полувынос. и оранж. куст. р. Ухоть какъ за Кантуа.

**Л. венеоза** (*L. venenosa*, ядовитая). Цв. ярко-фіолетовые, вь февраль. 4 ф.

**ЛЮРЕЛІЯ** (*Laurelia*). По *Laurus*, на основаніи сходства запаха лл. С. остроосѣмянныхъ. (2). Чили. Нов. Зеландія. Вынос. оранж. дер. Ухоть какъ за Атеросперма.

**Л. новѣ-целандіи** (*L. nova-zelandiae*). Нов. Зеландія. Цв. шелковистые. Лл. овальные, зубчатые. 150 ф.

**ЛЮРЕНТІЯ** (*Laurentia*). *Ляуренти* (*Laurenti*) — итальянск. ботаникъ XVII стол. С. колокольчиковыхъ. (10). Среди-земное побережье, Сѣв. Африка, С.-З. Америка. Маленькія оранж. трав. рр. Ухоть какъ за Лобелія.

**Л. минута** (*L. minuta*, маленькая). М. Д. Н. Цв. свѣтло-пурпуровые, сь іюня до сентября; р. безстебельное. **Л. эринойдесъ** (*L. erinoides*, похожая на Эринусъ). М. Д. Н. Цв. бѣло-пурпуровые сь двумя желтыми и однимъ пурпуровымъ пятнами, вь августъ. Безъ стебля.

**ЛЯУРУСЪ** (*Laurus*). Древне-латинское названіе. С. лавровыхъ. (2). Среди-земное побережье, Канарскіе о. Полувынос. дрв. рр. На землю не прихотливы. Черенками вь песок. з. подь стекломъ. Отпрысками. Съеменами.

**Л. нобилисъ** (*L. nobilis*, благородный). *Лавровое дерево*. Юж. Европа. Цв. желтые; плоды темно-пурпуровые, вь октябрь. 30—60 ф.

**ЛЯФАТЕРА** (*Lavatera*). Два брата *Лафатеровъ* (*Lavater*) — врачъ вь Цюрихѣ и натуралистъ, жившіе вь XVIII ст. С. махловыхъ. (18). З. Европа, Среди-зем. побережье, З. Азія, Австралія. Вынос. или полувын. одно-, дву- и многол. трав.,

либо кустарн. рр. Песков. глин. дерн. Съеменами — однол., дѣленіемъ и черенками, весной, многол. и черенками подь стекломъ — куст.

**Л. триместрисъ** (*L. trimestris*, трехмѣсячная). Европа, Малая Азія. Цв. розовые, лѣтомъ. 3—6 ф. Однол. красное, хотя и сам. обыкновенное р.

**ЛЯХНАНТЕСЪ** (*Lachnanthes*). *Lachne* — пушокъ и *anthos* — цвѣтокъ; по пушистымъ цв. С. кровяниковыхъ. (1). Ю. Соед. Шт. Многол. трав. оранж. р. Торф. сь глин. дерн. Дѣленіемъ корня, весной. Темп. зимой 4°.

**Л. тинкторія** (*L. tinctoria*, красильный). Цв. гризно-желтые, внутри пушистые, вь июль. 1½ ф. Вь корнѣ содержится красное вещество.

**ЛЯХНЕА** (*Lachnaea*). *Lachnocos* — пушистый, по цв. головкамъ. С. ягодковыхъ. (18). Мысъ Д. Н. Оранж. куст. рр. Песков. торф. Черенками весной изъ короткихъ боковыхъ ростковъ, вь песок, вь парникѣ. Темп. зимой 2—5°.

**Л. буксифоли** (*L. buxifolia*, сь лл. какъ у Буксуса). Цв. головки бѣлыя, вь май до іюля. 2 ф. **Л. пурпуреа** (*L. purpurea*, пурпуровая). Цв. головки пурпуровыя, вь июль—июль. 2 ф.

**ЛЯХНОСТОМА** (*Lachnostoma*). *Lachne* — пушокъ и *stoma* — устье; по бородоу устья вѣнчика. С. ласточниковыхъ (16). Троп. и жаркія страны С. Америки. Телнч. или оранж. вьющаяся или распростертая рр. Ухоть, какъ за Гонолобусъ.

**Л. маритимусъ** (*L. maritimus*, приморскій). Каракасъ и др. Цв. внизу и по краіе зеленыя, по срединѣ пурпуровые, вь июль—июль. Вьющ.

**ЛЯЦЕНА** (*Lacena*). По гречески названіе это означаетъ „лакедемонскій“, прилагательное, примѣнявшееся къ Еленѣ Троянской. С. орхидей. (2). Центр. Америка. Телнч. эпифиты. Ухоть, какъ за Аднцета.

**Л. бѣлоръ** (*L. bicolor*, двуцвѣтная). Гватемала. Цв. зеленовато-желтые сь фіолетовыми и темно-пурпуровыми крапинками и черточками, вь май. 1 ф. **Л. спектабилисъ** (*L. spectabilis*, изилная). Мексика. Цв. малиновые сь маленькими болѣе темными крапинками, вь май. 6 д.

**ЛЯШЕНАЛІЯ** (*Lachenalia*). *Де Лашеналь* (*De Lachenal*) — проф. ботаники вь Базелѣ. † 1800. С. лилейныхъ. Южн. Африка. Оранж. луков. рр. Песков. торф. сь небольшимъ колич. волоки. глин. дерн. Отпрысками и съеменами. Темп. зимой 2—6°.

**Л. лиляціна** (*L. lilacina*, лиловая). Цв. лиловые сь голубымъ внизу. **Л. пендула** (*L. pendula*, пониклая). Цв. темно-пурпуро-



вые, красные и желтые, в апрѣлѣ. 4—9 д. Самый большой и красивый видъ. **Л. пурпурео-цѣрулеа** (*L. purpureo-savulea*). Цв. сине-пурпуровые, колокольчатые, в апрѣлѣ. 6—9 д. **Л. триколоръ** (*L. tricolor*, трехцвѣтная). Цв. ярко-зеленые, съ краснымъ и желтымъ, весной. 1 ф. Сип. **Л. квадриколоръ** (*L. quadricolor*). Имѣетъ желтую сплошь разновидность *lutea* (*lutea*).

**МАБА** (*Maiba*)—мѣстное названіе. С. гебеновыхъ. (59). Жаркія страны. Теплолюб. дерев. и куст. пр. Глин. дерн. съ торф. Черенками изъ полуживаго роста, въ маѣ, въ пескѣ, въ парникѣ.

**М. буксифолия** (*M. buxifolia*, съ лл. какъ у Буксуса). Троп. Азія и Африка. Цв. желтоватые. 1½ ф.

**МАГАЗИНЪ**. Помѣщеніе для склада, хранения или продажи сѣмянъ, растеній, снарядовъ, орудія и пр.

**МАГНОЛИЙНЫЯ** пр. (*magnoliaeae*). Древесныя или кустарныя породы тропической и восточной Азіи, Сѣверной Америки и частью тропической и жаркой полосы Америки; въ Африкѣ нѣтъ ни одного вида, въ Австраліи и Новой Зеландіи очень рѣдки. Къ этому с. принадлежатъ 9 родовъ и 70 видовъ, имѣющихъ горькія, тоническія и ароматическія свойства. Дримисъ, Иллидиумъ, Лиродендронъ и Магнолія.

**МАГНОЛІЯ** (*Magnolia*). Пьеръ Маньоль (*Magnol*)—профессоръ медицины и префектъ бот. сада въ Монпелье, † 1715. С. магнолиевыхъ. Японія, Китай, Гималаи, С. Америка. Оранж. декорат. дерев. или куст. пр. Рыхлая глин. дерн. Отводками, сѣменами, и прививкой.

**М. акумината** (*M. acuminata*, остроколючая). С. Америка. Цв. сизоватые съ желтымъ отливомъ, въ маѣ—июнѣ, немного пахучіе. 30—60 ф. **М. глѣука** (*M. glauca*, сизая). С. Америка. Цв. бѣлые, очень душистые, въ маѣ до июли. Лл. на нижней поверхности сизаго цвѣта. 15 ф. **М. грандифлора** (*M. grandiflora*, крупноцвѣтная). С. Америка. Цв. бѣлые, большіе, душистые, лѣтомъ. 70—80 ф. Имѣетъ много разновидностей, отличающихся формою листьевъ и окраскою цв. **М. конспікуа** (*M. conspicua*, замѣчательная). Китай. Цв. бѣлые, иногда съ розовымъ отливомъ, очень душистые, съ февраля до мая. 20—50 ф. (Имѣетъ 2 разновидности. Сип. **М. Юланъ** (*M. Yulan*). **М. макрофилля** (*M. macrophylla*, крупнолистная). С. Америка. Цв. бѣлые съ пурпуровою нижнею частью, въ июнѣ; лл. очень большіе продолговато-овальные съ сердцевиднымъ основаніемъ. 30 ф. **М. парвифлора** (*M. parviflora*, мелкоцвѣт-

ная). Японія. Цв. бѣлые съ розовымъ отливомъ, почти шаровидные, весной. Р. кустарное. **М. стеллата** (*M. stellata*, звѣздчатая). Японія. Цв. бѣлые, душистые, въ мартѣ до мая. Цвѣтетъ до распускания листьевъ. Сип. **М. Халлеана** (*M. Halleana*). **М. умбрелля** (*M. umbrellata*, зонтичная). С. Америка. Цв. бѣлые со слабымъ, не вполнѣ приятнымъ запахомъ, весной. Сип. **М. трипетала** (*M. tripetala*). **М. фуската** (*M. fuscata*, съ коричневыми цв. ножками). Китай. Цв. грязно-пурпуровые, очень душистые, маленькіе, въ апрѣлѣ. 2—4 ф.

**МАДИЯ** (*Madia*). Мѣстное чилийское названіе. С. сложноцвѣтныхъ. (8). С.-З. Америка и Чили. Полувыс. однол. трав. пр. Обыки садов. Сѣменами, весной.

**М. элгансъ** (*M. elegans*, изящная). С.-З. Америка. Цв. головки желтыя, въ августѣ 1½ ф.

**МАЙ**. Весенній мѣсяцъ. Съ 15 мая признается прекращеніе позднихъ морозовъ и начинается высадка на воздухъ тѣхъ же растений. 21 мая дѣлается посѣвъ рядовыхъ огурцовъ; послѣ 9—посадка картофеля.

**МАЙКА**. Майскіе жуки *Melobontha* и *Cetonia*, вредные для растеній, первая—въ состояніи личинки, вторая—совершеннаго наѣдомаго.

**МАЙОРАНА**. См. Ориганумъ.

**МАЙРИЯ**. См. Мэрия.

**МАЙТЕНУСЪ** (*Maytenus*). *Mayten*—мѣстное чилийское названіе. С. краснопузырьниковыхъ. (50). Тропич., около тропич. и умѣр. страны Южн. Америки. Оранж. или полувыс. кустарн. пр. Уходъ, какъ за Целеструсъ.

**М. боарія** (*M. boaria*, боарія). Чили. Цв. бѣлые. 10 ф. Оранж. **М. хилѣнзисъ** (*M. chilensis*, чилийскій). Цв. желтовато-зеленые, въ маѣ. Полувыс. куст. р.

**МАЙНТѢМУМЪ** (*Maianthemum*). *Maïos*—май и *anthemon*—цв., по времени цвѣтенія. С. лилейныхъ. (1). Вынос. луковичн. пр., распространенныя по сѣв. полушарію. Уходъ какъ за Смилацина.

**М. бифолиумъ** (*M. bifolium*, двуцвѣтный). *Боровой ландышъ*. Цв. бѣлые, мелкіе, душистые, въ маѣ. 4—8 д. Сип. *Конваллярія бифолия*, *Смилацина бифолия*, *С. канадѣнзисъ* (*Convallaria bifolia*, *Smilacina bifolia*, *S. canadensis*).

**МАКАДАМИЯ** (*Macadamia*). Дж. Макадамъ (*Macadam*)—секретарь философскаго института въ Викторіи. С. протейныхъ. (2). В. Австралія. Уходъ какъ за Хакеа.

**М. тернифолия** (*M. ternifolia*, съ тройчатыми лл.) Цв. не красивы; плоды, по-

хожіе на грецкіе орѣхи, содержащіе ядро, вкусомъ въ родѣ лѣсного орѣха, но гораздо лучшаго. 30 ф. Дерево.

**МАКА́Я** (*Macaya*). Д-ръ Макай (*Macay*)—авторъ „*Flora hibernica*“. С. акантоновыхъ. (1). Наталь. Оранж. пр. Глин. дер. съ коровьимъ перегноемъ. Черенками лѣтомъ, въ пескѣ, въ парникѣ.

**М. бѣлля** (*M. bella*, красивая). Цв. блѣдно-лиловые, въ маѣ. 6 ф.

**МАКЛЕАНІЯ**. См. Маклинія.

**МАКЛІНІЯ** (*Macleania*). *Маклинъ* (*Maclean*)—покровитель ботаники. С. брусничныхъ. (12). Андскія горы отъ Перу до Мексики. Оранж. куст. Уходъ какъ за Тибодія.

**М. пѣлхра** (*M. pulchra*, прекрасная). Нов. Гренада. Цв. желтые съ ярко-шарлаховыми трубками, въ апрѣлѣ. **М. спеціозиссима** (*M. speciosissima*, отъинѣйшая). Колумбія. Цв. ярко-шарлаховые съ желтыми крапинками, рано весной.

**МАКЛЮРА** (*MacLura*). *Маклюръ* (*MacLure*)—американскій натуралистъ, † 1840. С. крапивныхъ. (1). С. Америка. Вынос. дерево съ млечнымъ сокомъ. Уходъ какъ за Морусъ.

**М. ауранціака** (*M. aurantiaca*, золотистая). Цв. желто-зеленоватые, плоды золотисто-оранжевые. 20 ф. Превосходное р. для живыхъ изгородей, имѣетъ крѣпкія иглы.

**МАКОВКА**. **МАКУШКА**. Самая верхняя часть растеній. Маковая головка,—плодь.

**МАКОДЕСЪ** (*Macodes*). *Макос*—длина, по длинной губѣ. С. орхидей. (1). Ява. Теплолюб. р., требующее тѣхъ же условій, что и Авѣктохиліа.

**М. пѣтоля** (*M. Petola*, Петоля). Цв. зеленоватые; лл. съ золотистыми жилками, чрезвыч. красивые. Имѣетъ двѣ формы.

**МАКРАДЕНІЯ** (*Macradenia*). *Макрос*—большой и *aden*—железка. С. орхидей. (3). Вестиндія. Тепло. эпифиты, болѣе любопытные, тѣмъ красивые. Уходъ какъ за Онцидиумъ.

**М. Брассаволѣ** (*M. Brassavola*, Брассаволы). Колумбія. Цв. коричневыя съ тускло-желтыми краями.

**МАКРОКНѢМУМЪ** (*Macrocne-mum*). *Макрос*—большой, *kneme*—нога, по длиннымъ цв. ножкамъ. С. мареновыхъ. (9). Троп. Америка и Вестиндія. Тепло. дерев. и куст. пр. Уходъ какъ за Кетесбѣа.

**М. ямаицѣнзе** (*M. jamaicense*, ямайскій). Ямайка. Цв. зеленовато-бѣлые на длинныхъ ножкахъ. Дерево въ 10—15, иногда 30 ф.

**МАКРОМЕРІЯ** (*Macromeria*). *Мак-*

*ros*—большой и *meris*—часть; по цв., которые изъ всего семейства сам. крупныя. С. бурачниковыхъ. (8). Мексика, Колумбія, Перу. Оранж. или полувыс. многол. трав. пр. Уходъ какъ за Липоспермумъ.

**М. экссертъ** (*M. exserta*, высунувшаяся). Мексика. Цв. желтые съ сильно высунувшимися тычинками и столбикомъ. 3 ф.

**МАКРОЦА́МИЯ** (*Macrozamia*). *Макрос*—большой и *Zamia*. С. цикадоевыхъ. (7). Троп. и умѣр. Австралія. Оранж. многол. пр. 2 ч. песков. глинисто-дерн. и 1 ч. торф. Уходъ въ остальномъ какъ за Памія.

**М. кораллипесъ** (*M. corallipes*, съ красивыми черенками). Лл. перистые плотной кроной, черенки у нижней части красно-коричневаго цвѣта. Стволъ полшаровидной формы. **М. Перовскіана** (*M. Perowskiana*, Перовскаго). Лл. темно-зеленые, эвальные, горизонтальные, на длинныхъ черенкахъ; стволъ короткій, чешуйчатый. Сип. **М. Денисоніи**, **М. Маклѣи**, **Катакозіамія Маклѣи**, **Лепидозамія Перовскіана** (*M. Macleanyi*, *M. Denisonii*, *Catakozamia Macleanyi*, *Lepidozamia Perowskiana*). **М. плюмоза** (*M. plumosa*, перистая). Лл. спирально завитые, съ узкими листочками; черешокъ сплюснутый. Стволъ низкій, овальный, съ пушистыми чешуйками. **М. Фразери** (*M. Fraseri*, Фразера). Лл. перистые, тонкія, перья узкія, у основанія расширенныя. Стволъ толстый.

**МАКРОСТИЛИСЪ** (*Macrostylis*). *Макрос*—большой и *stylos*—столбикъ. С. рутовыхъ. (8). Ю. Африка. Оранж. куст. Уходъ какъ за Агатосма.

**М. барбигера** (*M. barbiger*, борода-тый). Цв. красноватые съ бѣлой бахромкой, въ апрѣлѣ. 1—2 ф.

**МАКСИМИЛИАНА** (*Maximiliana*). *Максимиліанъ I*, баварскій король. С. пальмъ. (3). Амазонская р., Маранонъ, о. С. Киттса и Тринидадъ. Тепло. пальмы. Сильная песков. глин. дерн. Сѣменами. Темп. зимой 10—13, лѣтомъ 12—24°.

**М. карибѣа** (*M. caribaea*, карибейская). О. св. Киттса. Лл. большіе, перистые, сегменты блѣдно-зеленые, загнутые наружи. **М. Марціана** (*M. Martiana*, Марціуса). Южн. Америка. Лл. перистые, перья линейныя, остроколючія, висцїя, темнозеленыя. Сип. *М. регія* (*M. regia*).

**МАКСИМУМЪ**. Высшая степень:—предѣлъ высшій, тогда какъ *минимумъ*—предѣлъ низшій.

**МАКСИЛЬЯ́РИЯ** (*Maxillaria*). *Максилла*—челюсть; по сходству столбика и губы съ челюстями наѣдомаго. С. орхидей. (100). Троп. Америка отъ Бразиліи до Вестиндіи и Мексики. Тепло. земныя орхидеи. Волокн. торф. съ рубленнымъ



торф. мохотъ, почти по ровну. Дѣленіемъ луковичъ, весной. Темп. во время развитія отъ 13 до 17°.

**М. варъабиліс** (*M. variabilis*, нзмѣнчивая). Мексика. Цв. пурпуровые, губа продолговатая. **М. венуста** (*M. venusta*, красивая). Нов. Гренада. Цв. бѣлые, какъ бы изъ воску, съ ноября до февраля, остающіеся продолжительное время. **М. грандифлора** (*M. grandiflora*, крупноцвѣтная). Парагвайскія Анды и Перу. Цв. снѣжно-бѣлые, большіе; губа съ желтыми черточками и красно-малиновыми крапинками. **М. лѣтео-альба** (*M. luteo-alba*, желто-бѣлая). Мериди. Цв. крупныя, бѣлые. **М. спленденс** (*M. splendens*, великолѣпная). Колумбія. Цв. бѣлые съ оранжевой губой, отороченной розовыми.

**МАКЪ САДОВЫЙ, М. САМОСѢЙКА, М. СЛѢПОЙ.** См. Папаверъ.

**МАЛЕПИНОКАЯ ГРУША.** См. Гданская груша.

**МАЛИНА.** См. Рубусъ.

**МАЛИННИКЪ.** Отдѣленіе, засаженное кустами малины.

**МАЛОПЕ** (*Malope*). У Плинія такъ названа одна изъ мальвъ. С. мальвовыхъ. (3). Средиземныя побережья. Однолѣт. орнам. полувыш. прр. Песчан. дерновал, солнечное положеніе. Сѣменами, весной, въ парникѣ.

**М. трифидъ** (*M. trifida*, трехраздѣченое). Ю. Испанія. Цв. крупныя пурпуровыя или бѣлые, съ іюля до сентября. 1 ф. Растеніе, известное въ садахъ подъ названіемъ *М. грандифлора* (*M. grandiflora*), есть разновидность этого.

**МАЛЯБАЙЛА** (*Malabaila*). Графъ *Малаяйла фонъ Каналъ* (*Malabaila von Canal*)—директоръ бот. сада въ Прагѣ. С. зонтичныхъ. (10). Ю.-В. Европа, В. Африка и З. Азія. Вынос. или полувыш. многол. трав. прр. Обыкн. садов. Сѣменами, весной.

**М. опопоначесъ** (*M. oropanax*, опопоначесъ). Ю. Европа. Цв. желтоватыя, въ іюль и іюль. 6 ф. Слн. *Опопоначесъ сироніумъ*, *Пастинака опопоначесъ* (*Ороронахъ chironium*, *Pastinaca oropanax*). **М. пимпнеллѣфолія** (*M. pimpinellifolia*, съ лл. пимпнеллы). Кавказъ. Цв. желтоватыя, въ іюль—августъ. 2 ф.

**МАЛЯКОКАРПУСЪ** (*Malacocarpus*). *Malakos*—мягкій и *karpos*—плодъ. Въ настоящее время этотъ родъ включенъ въ Эхиокарпусъ.

**МАЛЯКСИСЪ** (*Malaxis*). *Malaxis*—пѣшность, мягкость, по пѣшности р. С. орхидей. (1). Европа. Вынос. земная орхидея, встречаемая въ природѣ въ болотистомъ грунтѣ. Дѣленіемъ корней.

**М. палюдоза** (*M. paludosa*, болотная). Цв. желто-зеленоватыя, мелкія, въ іюль. 3—4 д.

**МАЛЯХРА** (*Malachra*). У Плинія, такъ названо какое-то персидское древесное р. С. мальвовыхъ. (6). Жаркія страны Америки. Теплолюб. травы. Глян. дерн. съ торф. Сѣменами. Вообще не имѣютъ садоваго значенія.

**М. фасціата** (*M. fasciata*, полосатая). Каракасъ. Цв. розовые, въ августъ—сентябрь. 1 ф.

**МАЛЬВА** (*Malva*). Название, употребленное Плиніемъ и Виргиліемъ, измѣненное греческое *malachia*. С. мальвовыхъ. (16). Южн. Европа, умѣр. Азія и С. Африка. Однол. дву- и многол. трав., преимущ. вынос. прр. Добрая садовая. Сѣменами однол., сѣменами и черенками—многол.

**М. альцеа** (*M. Alcea*). *Провсирнякъ*. Европа. Цв. блѣдно-розовые, лѣтомъ; 4 ф. Многол. Въ садахъ воспринимается разновидность *фастигіата* (*fastigiata*) съ цв. красными, съ іюля до осени, родомъ изъ Италіи. 2—3 ф. Слн. *М. Мореніи* (*M. Morenii*). **М. мошата** (*M. moschata*, мускусная). Европа. Цв. розовые, крупныя, лѣтомъ. Многол. Имѣетъ форму съ бѣлыми цв.

**МАЛЬВА ВИСКУСЪ** (*Malva viscus*). *Мальва* и *viscus*—липкій; по слизистымъ свойствамъ. С. мальвовыхъ. (6). Троп. Америка, Мексика. Волокн. торф. съ глини. дерн. Черенками изъ боковыхъ побѣговъ, въ парникѣ. Оранж. кустарн. или низкія дрв. прр.

**М. арбореусъ** (*M. arboreus*, древовидный). Вестиндія. Цв. шароховые, крупныя, лѣтомъ. 12 ф. Кустъ. **М. моллисъ** (*M. mollis*, мягкій). Мексика. Цв. шароховые, осенью. 12 ф. Кустъ.

**МАЛЬВАСТРУМЪ** (*Malvastrum*). Название измѣненное Мальва. С. мальвовыхъ. (60). Америка. Уходъ какъ за Мальва, но большая часть ораж.

**М. кампанулѣтумъ** (*M. campanulatum*, колокольчатый). Чили. Цв. яркія, розово-пурпуровыя, поздно лѣтомъ. Лл. и стебель пушистые. 1—1½ ф. Оранж. многол.

**МАЛЬВОВЫЯ прр. (Malvaceae).** Травянистыя, кустарныя или древесныя растенія, разбросанныя по всей земной поверхности, за исключеніемъ арктическаго пояса. Около 59 родовъ и 700 видовъ. Большая часть содержитъ слизистыя, обволакивающія части, а нѣк. кислоты. Абутилонъ, Алтея, Бомбакъ, Госспіумъ, Лагуларія, Мальва и Хибискусъ.

**МАЛЬКОЛМІЯ** (*Malcolmia*). У *Мальколма* (*Malcolm*)—лондонскій садовладѣлецъ, издавшій въ 1771 г. списъ

оранжерейныхъ прр. С. крестоцвѣтныхъ. (20). Средиземное побережье, около Каспійскаго м., Персія, С. Африка и С. З. Индія. Прем. однолѣтнія прр. Сѣменами.

**М. маритима** (*M. maritima*, морская). Европа. Цв. лиловые, розовые, красныя или бѣлые, весной до осени. 6—12 д.

**МАЛОРТІЕА** (*Malortiea*). *Фонъ Малортіе* (*von Malortie*)—ботаникъ въ Ганноверѣ. С. пальмъ. (5). Центр. Америка. Тепло. низкорослыя пальмы. Торф. съ пескомъ и съ добав. песковатой гл. дерн.

**М. грацилис** (*M. gracilis*, нѣжная). Гватемала. Лл. на тонкихъ черешкахъ, раздѣленные на зубчатые сегменты, по серединѣ складчатые. 2—4. Слн. *Геонима фенестрата* (*Geonoma fenestrata*). **М. интермедія** (*M. intermedia*, промежуточная). Коста-Рика. Лл. раздѣленные на два сегмента, подраздѣленные на двое или на четверо. 2 ф. **М. сѣмплекс** (*M. simplex*, простая). Коста-Рика. Лл. продолговатыя, глянныя или двураздѣльныя.

**МАЛЬПИГІЙНЫЯ прр. (Malpighiaceae).** Древесныя и кустарныя, часто цѣпкія прр., обитающія преимущественно въ Бразиліи и Гвианѣ. Родовъ 49, видовъ 600. Баннистерія, Бунхозія, Гальфимія, Годинодія и Мальпигія.

**МАЛЬПИГІЯ** (*Malpighia*). *Марчелло Мальпиги* (*Marcello Malpighi*)—итальянскій натуралистъ, проф. въ Болоньѣ—† 1694. С. мальпигійныхъ. (20). Премн. троп. Америка. Тепло. деревья или куст. Песков. торф. съ волокн. глини. дерн. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ песокъ, не обрѣзая лл., въ парникѣ.

**М. ангустифолія** (*M. angustifolia*, узколистная). Юж. Америка. Цв. свѣтло-пурпуровыя или малиновыя, въ іюль—августъ. 7 ф. Кустъ. **М. глѣбра** (*M. glabra*, гладкая). Цв. розовые или ярко-пурпуровые, съ марта до сентября; плоды красныя съѣдомые, но гораздо хуже нашихъ вишенъ. 16 ф. Дерево. **М. уренсъ** (*M. urens*, жгучая). Юж. Америка. Цв. малиновыя или блѣдно-пурпуровыя, съ іюня до октября. Плоды съѣдомые. Лл. съ жгучими волосками на нижней сторонѣ. 3—6 ф. Кустъ.

**МАММЕА** (*Mammea*). Мѣстное въ Южной Америкѣ. С. гуммигутовыхъ. (5). Троп. Америка, Азія, Африка и Мадагаскаръ. Тепло. дрв. плодовыхъ прр. Песков. волокн. глини. дерн. съ небольшимъ количествомъ. Черенками изъ полузрѣл. роста, не отрѣзая лл., въ песокъ, въ парникѣ. Темп. зимой 8—10, лѣтомъ 13—22°.

**М. американа** (*M. americana*, американская). Троп. Америка. Цв. бѣлые, пахучіе, въ іюль. Плоды большіе, круглыя, съ

двумя кожицами, — верхнюю плотную, толстою бурого цвѣта и нижнюю — тонкою, желтою, прилегающую къ крѣпкой, ярко-желтой мякоти пріятнаго вкуса и хорошаго запаха. 60 ф.

**МАММИЛЛЯРІЯ** (*Mammillaria*). *Mammilla*—сосочекъ, по сосочкамъ, расположеннымъ спирально по всей поверхности р. С. кактусовъ (30). Мексика, жаркія страны С. Америки, Бразилія, Вестиндія и Боливія. Оранж. сочныя многол. прр. Песков. глини. дерн. съ торф., битыми черенками и коровьимъ перегноемъ. Отпрысками или сосочками. Темп. зимой 6—8°, лѣтомъ 19—26°.

**М. бѣколоръ** (*M. bicolor*, двуцвѣтная). Мексика. Цв. пурпуровые, мелкія; стебель цилиндрическій выш. 10, шири. 2—3 д. **М. Вильдіана** (*M. Wildiana*, Вильда). Мексика. Цв. розовые. Стебли выш. 3—4 д. **М. грацилис** (*M. gracilis*, нѣжная). Мексика. Цв. блѣдно-желтые, стебель цилиндр., выш. 1—20, шир. ½ д. Одинъ изъ красивѣйшихъ видовъ. **М. долихоцѣнтра** (*M. dolichocentra*, длинногольчатая). Мексика. Цв. блѣдно-розовые или красно-малиновые; стебли толстые, выш. 6—8, шири. 3 д. **М. клѣва** (*M. clava*, булавастая). Мексика. Цв. съ чашечкой изъ зеленыхъ чешуекъ съ красными кончиками и съ палевыми лепестками вѣнчика, въ іюль. Стебель столбчатый, выш. въ 1 ф. **М. пектината** (*M. pectinata*, гребенчатая). Мексика. Цв. желтые, остающіеся въ продолженіи часовъ двухъ вполне раскрытыми. Стебель коническій или почти шаровидный. **М. Пикокіи** (*M. Peacockii*, Пикокя). Мексика. Полушаровидная маленькая масса, покрытая волосками и иглами. **М. пувилья** (*M. pusilla*, маленькая). Вестиндія. Цв. желтоватыя съ розовою посреднѣй полоскою. Стебель въ 1—2 д. выш., цилиндрическій или шаровидный. **М. сангвинеа** (*M. sanguinea*, кровавая). Мексика. Цв. темно-красныя; стебель короткій, столбовидный.

**МАНГИФЕРА** (*Mangifera*). *Mango*—мѣстное названіе плода и *fero*—нести; С. сердечниковыхъ. (14). Троп. Азія. Тепло. дрв. прр. Торф. съ глини. дерн. Черенками, изъ почти зрѣлаго роста, въ песокъ и парникѣ.

**М. индіка** (*M. indica*, индійская). Остиндія. Цв. бѣловатыя съ желтыми черточками, въ іюль. Плоды почковидныя, желтоватыя или красноватыя, искрапанные чернымъ зрѣлым, содержащимъ пріятнаго вкуса сокъ. 60 ф.

**МАНГОЛЬДЪ.** См. Бета.

**МАНДАРИНЪ.** См. Цитронъ.

**МАНДЕВИЛЛЯ** (*Mandevilla*). *Мандевилл* (*Mandeville*)—британскій по-



сланный в Буенос-Айрес. С. кутровых. (45). Троп. Америка. Оранж. выюц. кустарн. рр. Торф. с глин. дерн. Черенками из короткого бокового роста, в песок, в умфр. парник. Темп. зимой 4—7°.

**М. suaveolens** (M. suaveolens, с приятным запахом). Буенос-Айрес. Цв. белые, большие, очень душистые, летом.

**МАНДРАГОРА (Mandragora)**. Название встречаемое у Хипократ. С. пасленовых. (4). Средиземное побережье. Полувысокл. многол. трав. рр. ботанического значения. Глубокая легкая. Семенами и делением корня.

**М. vernalis** (M. vernalis, весенняя). Ю. Европа. Цв. белые или голубоватые, в май. 1 ф.

**МАНЕТТИЯ (Manettia)**. *Manetti* (Manetti)—префект бот. сада во Флоренции, в половине XVIII стол. С. мареновых. (30). Троп. Америка, около-троп. Австралия. Тепл. оранж. травяни. или полукуст. выюц. рр. Торф. с глин. дерн. и песком по ровну. Черенками из молодого роста, в песок, в парник.

**М. micanis** (M. micanis, блестящая). Перу. Цв. ярко-оранж. с желтоватыми лепестками, ранней зимой.

**МАНЖЕТКА**, то-же что *Корона*. См. это слово.

**МАНИКАРИЯ (Manicaria)**. *Manica*—перчатка; по чехлу окружающему цв. почку. С. пальм. (3). Троп. Америка, С. Бразилия до Нов. Гренады. Тепл. пальм. Сильная нескв. глин. дерн. Семенами, в сильном тепле и влажности. Темп. зимой 10—15, летом 15—26°.

**М. saccifera** (M. saccifera, мшечная). Ю. Америка. Лл. простые, длинно до 30 ф. и шир. в 4—5 ф. с зубчатыми краями, ствол прямой, с глубокими бороздами, в 15—20 ф. вышиной.

**МАНИХОТЪ (Manihot)**. Местное бразильское название. С. молочайных. (80). Америка, преим. Бразилия. Оранжер. высокоросл. многол. травы или куст. Глин. дерн. с торф. и песком. Черенками из довольно твердого молодого роста, в песок и парник.

**М. utilisissima** (M. utilisissima, полезнейший). Ю. Америка. Цв. желтоватые, в июль. 3 ф. Из корня этого и близкого **М. айпи** (M. Aipi) извлекается крахмальное съедомое вещество «мандиока» или «бразильская тапиока». Корень М. айпи употребляется на мзвть произрастания как овощи, корень-же М. utilisissima очень ядовит и мандиока получается после вымачивания корня, при чем ядовитый сок извлекается.

**МАНТИСИЯ (Mantisia)**. *Mantis*—

пасхкомое „богомоль“, с которым на-ходить сходство. С. инбирных. (2). Ост-индия. Тепл. трав. рр. Песков. торф. и волок. глин. дерн. Делением при на-чале роста. Темп. зимой 7—10, летом 13—24°.

**М. saltatoria** (M. saltatoria, прыгущая). Ост-индия. Лепестки желтые, остальное в цв. пурпуровое, в июль. 1 ф.

**МАНУЛЕА (Manulea)**. *Manis*—рука; по выпуклу. С. поричниковых. (25). Южн. Америка. Оранж. трав. или полукуст. рр. Ухожд. как за Целесия.

**М. rubra** (M. rubra, простая). Цв. золотисто-желтые, с апреля до сентября. 1 ф. Многол. трав.

**МАРАНТА (Maranta)**. Бартольд *Marantia* (Maranti)—венедиканский ботаник, † 1754. С. инбирных. (10, безъ разновидностей). Троп. Америка, Ост- и Вест-индия, Сиера Леоне и др. Теплич. многол. трав. с клубневыми корнями, из которых получается „аррурут“. 2/3 хорошей глин. дерн. и 1/3 листов. с песком. Ухожд. как за Калатеа.

**М. bicolor** (M. bicolor, двуцветная). Бразилия. Лл. округлые, по бледно-сизому неправильным пятнам темно-оливкового цвета между средней жилкой и краем, нижн. сторуна пурпурово-розовая. 1 ф. **М. кончинна** (M. concinna, красивая). Ю. Америка. Цв. желтые, лл. косо-овальные, бледно-зеленые, основания глав. жилки с темно-зеленым продолговатым пятном. Низкая кустистая роста. **М. портеана** (M. Porteana, Порта). Баия. Лл. продолговато-остроконечные, с желто-зеленым по сторунам полосками; нижняя сторона ярко-пурпуровая. 3 ф. **М. сагорiana** (M. sagoriana, сагорийская). Юж. Америка. Лл. продолговатые, очень бледно-зеленые, с темно-зелеными полосками между среднею жилкою и краем. **М. смарагдина** (M. smaragdina, изумрудная). Эквадор. Лл. изумрудно-зеленые с темною по средине продольною полоскою. Сил. *Калатеа смарагдина* (Calathea smaragdina).

**МАРАНТОВЫЯ рр. (Marantaceae)**, составляющая отдельное сем., слиты с инбирными.

**МАРАТТИЯ (Marattia)**. *Maratti*—итальянский ботаник, написавший в 1760 г. сочинение „De floribus filices“. С. папоротниковых. (8). Троп. породы разных стран. Тепл. или оранж. рр. Глин. дерн., торф. и рвчн. песок по ровну. Делением весной или спорами. Темп. зимой 10—12, летом 13—24°.

**М. alata** (M. alata, крылатая). Вест-индия. Ван трехперисторазвч. 3—4 ф. длинной с больше или меньше пленчатой низкою поверхностью. Оранж. Сил. *Гимнотека*

*алата* (Gymnothesa alata). **М. ланка**, (рыхлая). Мексика. Ван двуперистый, длиною в палец, футон, нижняя перья в 1 1/2—2 ф. длинной и 1 ф. шириной. Теплич. Сил. *Гимнотека ланка* (Gymnothesa laxa).

**МАРГИРИКАРПУСЪ (Margyricarpus)**. *Margaron*—жемчужина и *sarpas*—плод, по сходству плода. С. розовых. (3). Умфр. страны Южн. Америки и Андских горы Патагонии, Бразилии и Нов. Гренады, также Чили и Перу. Тепл. куст. рр. Глин. дерн. с торф. и песком. Черенками, летом во влажн. торф. з. под стеклом или отводкой.

**М. setosus** (M. setosus, щетинистый). Анды. Цв. мелкие, зеленые, все лето; плоды белые, остающиеся на растении продолжительное время. 2—4 ф.

**МАРГАЙТКА**. См. Бельлинь.

**МАРЕНОВЫЯ рр. (rubiacae)**. Обширный отделе дрв., куст. или трав. рр. преимущественно из тропич. стран; многие из представителей имеют важное экономическое значение (кофе, хинин). Число родов простирается до 340, а видов—до 4100. Наиболее замечательные роды: Бувардия, Геттарда, Гардения, Ронделетия, Цинхона.

**МАРИКА (Marica)**. *Maricao*—увидать, по кратковременному цветению. С. косятых. (9). З. троп. Африка. Тепл. или оранж. трав. многол. рр. Глин. дерн. с перегноем и песком. Делением корневища, в парник.

**М. lutea** (M. lutea, желтая). Бразилия. Цв. с вышн. сегментами желтыми о 5 красных полосок и с внутр., на концы которых полосы зеленые, в апрѣль. 6 д. Оранж. **М. Нортиана** (M. Northiana, Порта). Бразилия. Наруж. сегменты цв. желтоватые с темно-красными крапинками внизу, внутренние—с голубыми полосками у концов, в июль. 4 ф.

**МАРИЛЯ (Marila)**. Местное название на Антильских о. С. тернестемных. (4). Вест-индия и Ю. Америка. Тепл. дрв. или куст. рр. Ухожд. как за Махура.

**М. racemosa** (M. racemosa, ветвистая). Вест-индия. Цв. зеленые, в август. Дерево или куст в 15 ф.

**МАРИАНТУСЪ (Marianthus)**. *Maria*—Мария и *anthos*—цветок; цветок Пресв. Двѣ Марии. С. смольнобѣмни-ковых. (14). Австралия. Оранж. куст. рр. Песков. гл. дерн. с волоки. торф. Черенками из ползучаго роста в песок, в парник. Темп. зимой 4—6°.

**М. Drummondianus** (M. Drummondianus, Друммондов). Цв. лилые, лл. обратно-лицевидные, молодые пушистые.

**МАРКЕРЪ**. Бороздник, орудие для посева и посадки.

**МАРКИЗА**. Наружная занавѣска, для затѣнения растений.

**МАРЛЕЯ (Marlea)**. Мѣстное название в Ассамѣ. С. деревных. (5). Троп. Азия, Австралия, о. Тихаго океана. Оранж. дрв. или куст. рр. Песков. глин. дерн. с торф. Черенками из бокового роста с частью древесным, в песок, под стеклом.

**М. begoniaefolia** (M. begoniaefolia, с лл. как у бегонии). С. Индия, Китай и Япония. Цв. желтоватые, летом. Лл. сердцевидные с угловатыми лопастями. 60 ф.

**МАРОДЕНІЯ (Marsdenia)**. Уильям *Marsden* (Marsden)—автор исторіи Су-матры, † 1836. С. ласточниковых. (60). Тропич. страны обоих полушарий и Средиземн. побережье. Тепл., оранж. и полувышн., большею частью выюц. куст. и полукуст. рр. Песков. глин. дерн. с небольшою колич. листов. или торф. Черенками весной, в песок, в парник.

**М. suaveolens** (M. suaveolens, с хорошим запахом). Нов. Юж. Валлис. Цв. белые, пахучие, в июль. 2—3 ф. Оранж. куст. **М. флавесценс** (M. flavescens, желтоватая). Нов. Ю. Валлис. Цв. желтоватые, в июль—июль. Теплич. выюц. куст. р.

**МАРТИНИЯ (Martynia)**. Джон *Martyn* (Martyn), проф. ботаники в Кембриджѣ, † 1768. С. руляковых. (10). Жаркая страна Америки. Оранж. трав. одно- и многол. рр. с клубневыми корнями. Рыхлая. Семенами в парник.

**М. proboscidea** (M. proboscidea, с жалом). Мексика. Цв. пестрые, зеленоватые с желтыми и фиолетовыми крапинками и широким краем, в июль. 1—3 ф. Сил. **М. анна** (M. anna). Однол. **М. фразанс** (M. fragrans, душистый). Мексика. Цв. карминно-пурпуровые с желтым горлышком, душистые, летом и осенью; плоды с двумя кривыми, острыми рогами. 2 ф. Однол. Молодые плоды очень вкусны маринованные в уксус.

**МАРТИНЕСІЯ (Martinezia)**. Бальтасар *Martinez* (Martinez)—испанский ботаник. С. пальм. (7). Троп. Америка. Оранж. тепл. рр. Песков. глин. дерн. с торф. по ровну. Семенами. Ухожд. как за Каріота или Кокос.

**М. granatensis** (M. granatensis, новогренадская). Колумбия. Лл. продолговато-круглые, внизу цельные, на концѣ двурядные, с зубчатыми краями, черешки с черными колочками. **М. каріотетифолия** (M. cariotetifolia, с лл. как у Каріоты). Нов. Гренада. Лл. темноселеные, перистые, перья клиновидны. Ствол тонкий, усажен-



ный, какъ и черешки, длинными черными пглами. Мартинесіи — высокія деревья.

**МАРТЪ.** Самое оживленное время садовой дѣятельности: въ теплицахъ и оранжереяхъ — растенія въ полномъ развитіи и цвѣту, наступаетъ забота о подготовкѣ посѣвовъ, наиважнейшая парники, производится пересадка, разводка черенками, прививка и пр.

**МАРШАЛЛІЯ (Marshallia).** *Хамфрей Маршалл* (Humphrey Marshall) — сѣв.-америк. ботаникъ. С. сложноцвѣтныхъ. (4). С. Америка. Выноса. многол. трав. пр. Сѣменами, съ осени, въ обыкн. садовой з.

**М. пѣспитова (M. caespitosa)** (кустистая). Техасъ. Цв. головки голубоватыя, въ июнѣ. 1 ф.

**МАСДЕВАЛЛІЯ (Masdevallia).** *Масдевалъ* (Masdevall) — испанскій врачъ и ботаникъ. С. орхидей. (150). Съ горъ троп. Америки отъ Перу до Мексики. Холодно-оранж. эпифиты. Доли цв. основаніями соединены въ трубку, а концами вытянуты въ длинные, узкіе концы. Торф. съ торф. мохомъ. Дѣленіемъ.

**М. амабиліс (M. amabilis)** (пріятная). Перу. Цв. оранжево-карминные. 6 д. **М. Бакгоузіана (M. Backhousiana)** (Бакгоузова). Колумбія. Цв. какъ у *М. химера*, но больше яркіе и крупныя. **М. бѣлая (M. bella)** (красивая). Колумбія. Цв. темно-пурпуровые, внутри желтые, крупныя. **М. Вальліси (M. Wallisii)** (Валлиса). Нов. Гренада. Цв. желтые съ красн. пятн. въ декабрѣ. Въ садахъ воспитывается подъ именемъ *М. химера*. **М. Вейчiana (M. Veitchiana)** (Вейчева). Перу. Цв. грязно-желтые снаружи, ярко-оранжевые внутри, осенью и зимой. Имѣетъ разновидность *грандифлора (grandiflora)*, съ болѣе крупными цв. **М. Гаскелліана (M. Gaskelliana)** (Гаскеліева). Цв. пурпуровые, внутри желтоватые съ красноватыми пятнами. **М. геммата (M. gemmata)** (двойчатая). Цв. тускло-желтые, съ оранжевыми жилками, губа пурпуровая. **М. Девиси (M. Davisii)** (Девиса). Перу. Цв. ярко-оранжевые; очень изящное растеніе. **М. игнеа (M. ignea)** (огненно-красная). Колумбія. Цв. ярко-красные, верхняя доля убкая, согнутая на цв. 6 д. Имѣетъ разновидности *Маршалліана (Marshalliana)* съ желтоватыми и *Стокбартіана (Stobartiana)* съ пурпуровыми жилками. **М. іонохарис (M. ionocharis)** (фіолетовая красивая). Перу. Цв. желтоватые съ крупными пурпуровыми пятномъ и такими-же мелкими, въ сентябрѣ. 4 д. **М. кокцинеа (M. coccinea)** (шарлаховая). Памплоона, Нов. Гренада. Цв. снаружи желтые, внутри красные, зимой. **М. Линдени (M. Lindeni)** (Линдена). Нов. Гренада. Цв. ярко-фіолетовые, розовые или малиново-

розовые съ бѣлымъ глазкомъ, зимой и ранней весной. Имѣетъ нѣсколько разновидностей. **М. лата (M. lata)** (широкая). Центр. Америка. Цв. темно-бурые, хвосты желтые. **М. меланопус (M. melanopus)** (съ черными ножками). Перу. Цв. бѣлые съ пурпуровыми крапинками и желтыми хвостами. **М. полистикта (M. polysticta)** (многоточечная). Перу. Цв. бѣлые съ многочисленными темно-карминными крапинками. 6 д. **М. Рейхенбахіана (M. Reichenbachiana)** (Рейхенбахова). Коста-Рика. Цв. желтоватые, задняя ихъ часть кроваво-красная. **М. Реддлі (M. Roessleri)** (Реддлева). Колумбія. Цв. темно-пурпуровые съ болѣе темными сосочками, лепестки розово-желтые, съ болѣе темными глазками, губа того-же цвѣта. **М. splendida (M. splendida)** (великолепная). Анды. Цв. трубка шарлаховая съ фіолетовымъ оттыкомъ, лепестки и губа бѣлые съ фіолетовымъ пятномъ и клубышкомъ на концѣ. **М. товаренсис (M. tovarensis)** (изъ Товара). Товаръ, Колумбія. Цв. бѣлые, обычно-парные, осенью и зимой. **М. триаристелла (M. triaristella)** (съ тремя щетинками). Коста-Рика. Цв. коричневые съ желтымъ; лепестки бѣлые. **М. тригложинъ (M. triglochin)** (съ тремя рожками). Эквадоръ. Цв. мелкіе, но красные, доли красныя съ желтыми хвостами, лепестки бѣдно желтые съ красными крапинками. **М. флорибунда (M. floribunda)** (многоцвѣтная). Бразилія. Цв. зонтикомъ или полу-зонтикомъ. Хвосты желтые, губа бѣловатая съ многочисленными буро-пурпуровыми пятнышками. **М. Химера (M. Chimera)** (Химера). Колумбія. Отличается отъ *М. Вальліси*, съ которою смѣшивается, темными, длинными, треугольными долями, искривленными и волосистыми, и губой, неимѣющей внизу угла. **М. Чельсоні (M. Chelsoni)** (изъ Чельси). Гибридъ между *М. Вейчiana* и *М. амабиліс*. Цв. бѣлые, губа съ розоватымъ краемъ, коричневою вершиной и бѣлою серединой съ розоватою линіею. **М. эфиппиумъ (M. ephippium)** (сѣловидная). Антиокія. Цв. темно-пурпуровые съ длинными желтыми хвостами. Слн. *М. трохилусъ (M. Trochilus)*. **М. эринацеа (M. erinacea)** (ежевидная). Цв. грязно-желтые, съ пурпуровымъ кольцомъ и мелкими крапинками. **М. эритрохета (M. erythrochaete)** (съ красными щетинками). Центр. Америка. Цв. бѣлые со свѣтло-желтымъ, хвосты красновато-пурпуровые. **М. эстрадѣ (M. Estradae)** (Эстрады). Нов. Гренада. Цв. розово-желтые, въ апрѣлѣ; доли длинныя, желтыя.

**МАСКАРЕНХАЗІЯ (Mascarenhasia).** По находженію на Маскаренскихъ ос. С. кутровыхъ. (4). Мадагаскаръ. Тепл. куст. пр. Уходъ какъ за *Диплденіа*.

**М. Курновіана (M. Curnowiana)** (Курнова). Цв. шарлаховые, въ августѣ. Куст. р.

**МАСЛИНОВЫЕ (Oleaceae).** Пряморослыя или цѣпкія кустарники и древесныя породы изъ умеренныхъ и жаркихъ поясовъ. Видовъ 280, родовъ 18. Олеа, Сиринга, Фраксинусъ, Ясминумъ.

**МАСЛИЧНОЕ ДЕРЕВО.** См. Олеа.

**МАСЛЯНИКЪ.** См. Болетусъ.

**МАСАНЖЕА (Massangea).** *Масанжъ* (Massange de Louvrex) — извѣстный бельгійскій садоводъ. С. бромелиевыхъ. Въ настоящее время родъ этотъ причисленъ къ *Карагуата*. Представители его подчиняются тѣмъ же условіямъ воспитанія, что и *Бильбергія*.

**М. музайка (M. musaica)** (мозаичная). Колумбія. Цв. плотными головками съ шарлаховыми прицв. и свѣтло-бѣлымъ вѣнчикомъ, весной. Лл. желтовато-зеленые съ темнозеленою мозаичною пестротой. 1 ф. Слн. *Тилландсія музайка* и *Вризія музайка* (Tillandsia musaica, Vriesia musaica). **М. хіероглифика (M. hieroglyphica)** (іероглифная). Бразилія. Лл. темно-зеленые съ темно-фіолетовыми полосами и іероглифическими рисунками.

**МАССОНІЯ (Massonia)** *Массонъ* (Masson) — извѣстный путешественникъ по Ю. Африкѣ, † 1805. С. лилейныхъ. (25). Ю. Африка. Маленькія оранж. лукович. пр. Песков. торф. Отпрысками.

**М. ангиустифолія (M. angustifolia)** (узколистная). Цв. бѣлые, цитками по 6—20 цв., въ апрѣлѣ. **М. сангвинѣа (M. sanguinea)** (кровавая). Цв. бѣлые съ красными нитями, цитками въ 15—20 цв., въ мартѣ.

**МАСТИКА.** Замазка, составленная изъ масла, воску, смолы и другихъ веществъ для замазыванія и залѣпленія въ различныхъ случаяхъ.

**МАСТИЧНОЕ ДЕРЕВО.** См. Пипіація.

**МАТОНІЯ (Matonia).** Д-ръ *Матонъ* (Maton) — б. вице-президентъ линнеевскаго общества въ Лондонѣ. С. напоротниковыхъ. (1) Борнео. Тепл. папор.

**М. пектината (M. pectinata)** (гребенчатая). Вап большія, вѣтвистыя, шир. отъ 1 1/2 до 2 ф., кожистыя, каждая часть скорпівовидно-перистая, перья въ свою очередь перисто-разсѣченныя.

**МАТРЕНКА.** См. Таликтрумъ.

**МАТРИКАРІЯ (Matricaria).** По прежнему употребленію настоя р. въ маточныхъ страданіяхъ. С. сложноцвѣтныхъ. (70) Европа, С. и Ю. Африка и З. Азія. Однол., рѣдко многол. трав. пр., изъ которыхъ весьма немногія имѣютъ садовое значеніе. Однол. — сѣменами, многол. — черенками и дѣленіемъ.

**М. инодора флоре плѣно (M. inodora flore pleno)** (безъ запаха съ махровыми цв.)

Европа. Махровая форма дикорастущей ромашки (Дикая ромашка), весьма обильно и красиво цвѣтущая. Въ нѣк. садахъ называется *Антисъ шамилла флоре плѣно* (Anthemis Chamomilla flore pleno).

**МАТТИОЛІА (Matthiola).** Пьетро Андреа *Маттиоли* (Matthioli) — итальянскій врачъ и знаменитый ботаникъ, † 1577. С. крестоцвѣтныхъ. (30). Выноса, полувыноса. или оранж., одно-, дву- или многол. трав., либо полукуст. пр. распространены по З. и Ю. Европѣ, З. Азіи и Ю. Африкѣ. Цв. болѣею частью пурпуровые, крупныя, кистями, душистые; лепестки у нихъ съ длинными ноготками; сѣмена плоскія, мелкія, многочисленныя, лл. продолговатые, цѣльные или выемчатые. Маттиоли весьма распространены въ садахъ подъ общимъ названіемъ *Левкоевъ*; они имѣютъ нѣсколько отдѣловъ и большое число сортовъ; цвѣты имѣютъ чрезвычайно разнообразную окраску, пріятный сильный запахъ. Размножаются обыкновен. сѣменами съ февраля до мая, въ парникахъ; земля имъ дается глини. дерн. съ перегн. и пескомъ. На лѣто высаживаются на воздухъ, частію-же содержатся въ горшкахъ.

**М. аннуа (M. annua)** (однолѣтняя). *Литній левкой*. Ю. Европа. Цв. различной окраски, сплошной или пестрой, простыя или махровые, съ мая до октябрия. 1—2 ф. Однол. полувын. **М. бикорнисъ (M. bicornis)** (двурогая). Критъ. Цв. шарлаховые или свѣтло-пурпуровые, съ іюня до августа. 1 ф. Полувын. полукуст. **М. инкана (M. incana)** (пушистая). *Зимній левкой*. Ю. Европа. Цв. обычно пурпуровые, лѣтомъ ц. осенью. 1—2 ф. Полувын. полукуст. дуол. Имѣетъ два типическихъ отдѣла разновидностей: въ одномъ лл. на нижней сторонѣ пушистые, въ другомъ — гладкіе. Окраска цв., простыхъ и махровыхъ, чрезвычайно различна.

**МАУНОВЫЕ (valerianeae).** Одно или многол. трав. пр., либо полукуст. или куст., встрѣчаемыя въ умеренн. и холодныхъ поясахъ сѣв. полушарія, въ З. Америкѣ, тропич. Азіи, Бразиліи, Гіанѣ и Вестиндіи. Врачебныя свойства этихъ пр. извѣстны съ глубокой древности. Въ сем. насчитываютъ 9 родовъ съ 300 видами. Главнѣйшіе роды Валеріана, Нардостаксисъ, Патринія, Центрантусъ.

**МАУРАНДІЯ (Maurandia).** *Мауранди* (Maurandy) — бывш. профессоръ ботаники въ Картагенѣ. С. норичниковыхъ. (6). Мексика. Оранж. трав. пр. Песков. глини. дерн. Сѣменами весной, въ парникѣ, также черенками изъ молодого роста, осенью.

**М. Барклайяна (M. Barklayana)** (Барк-



лаева). Цв. съ пушистой, длинной, кривой и зеленой трубкой и фиолетовыми лопастными краями, лѣтомъ. **М. сканденс** (*M. scandens*, цѣпляющаеся). Цв. фиолетово-пурпуровые, лѣтомъ. Сип. *Lophospermum scandens*, *Usteria scandens* (*Lophospermum scandens*, *Usteria scandens*).

**МАУРИЦИЯ (Mauritia).** *Примѣч.* **Мауриций Нассаукскій**—покровитель естественныхъ наукъ, † 1665 С. пальмъ. (7). С. Бразилія, Гвѣана, Вестиндія. Тепл. пальмъ. Глин. дерн. съ торф. Сѣменами въ парникѣ, весной. Горшки съ рр. держать въ водѣ.

**М. акулеата** (*M. aculeata*, колючая). Троп. Америка. Лл. вѣерообразные перисторазсѣченные, перья линейно-ланцетовидныя, снизу сизыя. Стволъ колючій. **М. флексуоза** (*M. flexuosa*, гибкая). Троп. Америка. Лл. вѣерообразные перисторазсѣченные, темно-зеленые на обѣихъ сторонахъ. Стволъ безъ колючекъ.

**МАХАОНЪ (Papilio Machaon).** Одна изъ самыхъ крупныхъ нашихъ дневныхъ бабочекъ желтаго цвѣта съ черными пятнами. Ея гусеница желто-зеленаго цвѣта объѣдаетъ цв. зонтичныхъ огородныхъ рр.—моркови, петрушки, укропа, пастернака и пр.

**МАХЕРІУМЪ (Machaerium).** *Ма-chaïra* сабля; по стручку, оканчивающемуся саблевиднымъ крыломъ. С. бобовыхъ. (60). Троп. Америка. Тепл. древ. или выросшія кустар. рр. Глин. дерн. съ торф. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ песокъ, въ парникѣ.

**М. акулеата** (*M. aculeata*, колючій). Рио-Жанейро. Цв. бѣлые, въ августѣ, 10 ф. **М. робиніефоліумъ** (*M. robiniaefolium*, съ лл. какъ у Робиніи). С. Винцентъ. Цв. бѣлые, въ іюль. 6 ф.

**МАХЕРНІЯ (Mahernia).** Анаграммъ *Hernania* съ которою имѣетъ много сходнаго. С. навозниковыхъ. (33). Около троп. и южн. Америка. Оранж. трав. или полукуст. рр. Глин. дерн., торф. и листов. по ровну съ добавленіемъ песку. Черенками, лѣтомъ, въ песокъ, подъ стекломъ.

**М. инциза** (*M. incisa*, съ разрыванными лл.). Мысъ Д. Н. Цв. темно-малиновые въ бутонахъ, темно-оранжевые когда распустились, въ іюль и августѣ, 1—2 ф. Полукуст.

**МАХРОВОСТЬ.** Превращеніе другихъ частей цвѣтка въ лепестки или умноженіе тѣхъ же частей. Имѣетъ значеніе въ томъ отношеніи, что чашечка и вѣнчикъ послѣ оплодотворенія обыкновенныхъ, не махровыхъ, цвѣтовъ быстро закладываютъ, махровые же цвѣтки, у которыхъ тычинки и пестики переродились въ лепестки, цвѣтутъ продолжительно.

Махровость у однихъ рр. происходитъ отъ избытка, у другихъ—отъ недостатка питанія; нѣкоторые рр. безъ особыхъ ясныхъ причинъ дѣлаются махровыми при ихъ воспитаніи.

**МАХРОВЫЙ. МОХРОВЫЙ.** Цвѣтокъ съ умноженнымъ числомъ лепестковыхъ частей.

**МАХУРЕА (Mahurea).** Название мѣстное. С. теристрейныхъ. (4). Южн. Америка. Тепл. древ. рр. Песков. торф. съ волокн глин. дерн. Черенками, лѣтомъ, въ песокъ, въ умѣренно-нагрѣтомъ грунтѣ.

**М. палюстрис** (*M. palustris*, болотная). Тринидадъ. Цв. пурпуровые, въ маѣ, 15 ф.

**МАЦУСЪ (Mazus).** *Magos*—сосокъ: по сосочкамъ закрывающимъ устье вѣнчика. С. норичниковыхъ. (4). Индія, Вост. Азія, Малайскій архип. и Австралія. Оранж. трав. или куст. рр. Волок. глин. дерн. съ песков. торф. Черенками изъ полурѣзлаго роста, въ песокъ, въ парникѣ. Темп. зимой 2—6°.

**М. пумиліо** (*M. pumilio*, низкорослый). Австралія. Цв. блѣдно-фиолетовые, ранней весной.

**МЕГАКАРПЕА (Megacarpaea).** *Megas*—большой и *karpos*—плодъ; по большому стручку. С. крестоцвѣтныхъ. (3). Сибирь, Гималаи, Тибетъ. Многол. трав. рр. Песч. легкая. Сѣменами.

**М. лациниата** (*M. laciniata*, лоскутная). Каспійскій побережья. Цв. желтые, мелкіе, въ іюнь—іюль. 6—12 д.

**МЕГАКЛИНИУМЪ (Megaclinium).** *Megas*—большой и *kline*—ложе, по осн на которой сидятъ цв. С. орхидей. (9). Тропич. и около-троп. Южн. Африка. Теплич. эпифиты. Уходъ какъ за Бульбофиллумъ.

**М. бѣфо** (*M. bufo*, жадный). Сьерра-Леоне. Цв. коричневыя, съ пурпуровымъ, усѣженные волосками. **М. максимумъ** (*M. maximum*, большой). Сьерра-Леоне. Цв. желтые съ кроваво-красными крапинками, въ іюнь—іюль. **М. фальклатумъ** (*M. falsatum*, серповидный). Сьерра-Леоне. Цв. желтые съ краснымъ.

**МЕГАРРИЦА (Megarrhiza).** *Megas*—большой и *rhiza*—корень, по большому клубневидному корневищу. С. тыквенныхъ. (1). Многол. полувыносл. клубневое р. Легкая, сильная. Сѣменами въ парникѣ. Сѣмена прорастаютъ подъ землей.

**М. калифорника** (*M. californica*, калифорнская). Калифорнія. Цв. мужскіе, мелкіе, кистями; женскіе одиночные подъ мужскими на особыхъ ножкахъ; плодъ круглый съ нгами, очень похожій на плодъ конекштана.

**МЕДАЛЬОНЪ.** Одна изъ наиболѣе крупныхъ частей въ узорѣ, составленномъ изъ дѣлущихъ или листовыхъ растений.

**МЕДВѢДКА (Gryllotalpa).** Прямокрылое насекомое, живущее въ землѣ и питающееся преимущественно червями и личинками, но также и корнями, особенно молодыхъ рр. Вредитъ какъ этимъ, такъ и разрыхленіемъ и вскапываніемъ земли.

**МЕДВѢЖЬЯ ЛАПА.** См. Стахисъ. **М. ТРАВА.** См. Пульмонарія. **М. УШКО.** См. Примула.

**МЕДВЯНАЯ РОСА.** Сладкое, липкое вещество, появляющееся на верхней сторонѣ листьевъ, между жилками, преимущественно древесныхъ породъ. Настоящая причина этого до сихъ поръ съ точностью неизвѣстна. Прежде полагали, что это вещество отдѣляется изъ воздуха, потомъ приписывали его появленіе травянымъ вышамъ, наконецъ въ послѣднее время стали склоняться въ пользу появленія микроскопическихъ грибовъ.

**МЕДВОЛЯ (Medeola).** По мнѣнію гической волшебницѣ Медевъ; полагали, что р. обладаетъ различными врачующими свойствами. С. лилейныхъ. (1). Виргинія. Выносл. трав. р. съ корневищемъ, имѣющимъ огуречный вкусъ. Сильная песчанистая. Дѣленіемъ весной.

**М. виргиніана** (*M. virginiana*, виргинская). Цв. желтые или зеленовато-желтые, въ іюнь. 9 д.

**МЕДИКАГО (Medicago).** Название, заимствованное у Dioscorida. С. бобовыхъ. (40). Европа, Азія, С. Африка. Выносл. трав., рѣдко куст. рр., не имѣющія садоваго значенія.

**МЕДИНИЛЛЯ (Madinilla).** *De Medinilla*—губернаторъ Маріанскихъ о. С. черноустовыхъ. (50). Остиндія, Цейлонъ, о. Малайскаго и Тихаго ок., Зап. Африка и Маскаренскіе о. Тепл. куст. рр. Торф. съ глинисто-дерн. и пескомъ. Черенками изъ бокового или молодого роста въ песокъ, въ парникѣ. Темп. зимой 7—10, лѣтомъ 13—24°.

**М. амабиліс** (*M. amabilis*, пріятная). Индія. Цв. малиново-розовые большими кистями, весной. **М. Куртисіи** (*M. Curtisii*, Куртиса). Суматра. Цв. бѣлые съ кораллово-красными ножками. **М. магнафика** (*M. magnifica*, великолѣпная). Манилья. Цв. розово-малиновые большими пониклыми кистями, остающимися продолжительное время, въ маѣ, 3 ф.

**МЕДОВИКЪ.** Железка, отдѣляющая сладковатую жидкость—нектаръ, собираемую пчелами и превращаемую ими въ медъ.

**МЕДОНОСНОЕ РАСТЕНІЕ.** Разводимое для взятка пчелъ.

**МЕДУНИЦА.** См. Пульмонарія. **МЕДУНИШНИКЪ.** См. Спирей. **МЕЖИГРЯДКА. МЕЖИГРЯДБЕ.** Промежутокъ двухъ грядъ, для прохода; борозда.

**МЕЗА (Maesa).** Одинъ изъ видовъ на мѣстѣ въ Аравіи называется *Maesa*. С. прищипченныхъ. (35). Троп. и около троп. страны Ст. свѣта. Тепл. куст. рр. Уходъ какъ за Ардизіа.

**М. индики** (*M. indica*, индійская). Индія. Цв. многочисленные, бѣлые, въ ноябрѣ. 5—6 ф.

**МЕЗГА.** Мякоть, остающаяся отъ выжимки картофеля при выдѣлкѣ крахмальной муки, терено свекловицы при выдѣлкѣ сахара. Заболонъ, внутренняя сочная оболочка дерева,—молодая еще не отвердѣвшая исподняя кора.

**МЕЗЕМБРИАНТЕМУМЪ (Mesembryanthemum).** *Mesembria*—полдень, *anthemon*—цвѣтокъ, по полному цвѣтенію только въ солнечную погоду. С. денниковыхъ. (300). Африка, преим. южная, Австралія, Нов. Зеландія, Канарскіе о., Средиземное побережье. Оранж. и полувыносл. сочныя травы, рѣдко полукуст. рр. Главныя условія ухода—давать всегда болѣе солнца и не сажать въ сильную з. Желтая глина съ пескомъ, толченой штукатуркой и перегной—лучшій компостъ. Размнож. партзанными частями, положенными на влажный песокъ на солнцѣ. Ниже поименованные—оранж. виды.

**М. блѣднумъ** (*M. blandum*, прелестный). Цв. сначала бѣлые, потомъ розовые, подъ конецъ красные. 1 ф. **М. виоліцеумъ** (*M. violaceum*, фиолетовый). Цв. тѣсные переходящіе въ фиолетовые, распускающіеся въ солнечные жаркіе дни, въ іюнь до осени. 1—2 ф. Сип. **М. полифиллумъ** (*M. polyphyllum*). **М. денсумъ** (*M. densum*, плотный). Цв. малиновые, въ іюнь. 3 д. **М. инкляуденс** (*M. inculdens*, никогда не свертывающій цв.). Цв. красно-пурпуровые, всегда открытые. 1½ ф. **М. канденс** (*M. candens*, блестящій). Цв. бѣлые, съ іюня до августа; р. цѣпляющаеся. **М. кокиннеумъ** (*M. coccineum*, шарлаховый). Цв. шарлаховые, съ мая до сентября. Стебель кустарный. **М. конепікуумъ** (*M. conopseum*, поразительно-красный). Цв. превосходно-красные, осенью. 1 ф. **М. корди-фоліумъ** (*M. cordifolium*, съ сердцевидными лл.). Цв. красные, въ маѣ до сентября. Одно- и двул. У разновидности *variegatum* (variegatum) цв. розово-пурпуровые; она—многол. **М. кристаллинумъ** (*M. crystallinum*, хрустальный). *Хрустальная*



**травка.** Цв. белые, с мая до августа. Все р. покрыто большими блестящими сопочками. Сбываема в парник, весной, а потом—на воздух. **М. Купери** (M. Cooperi, Купера). Цв. пурпуровые, большие. З. д. Р. покрыто сопочками, весьма впитывающее. **М. минутум** (M. minutum, маленький). Цв. длинные, трубчатые, бледно-желтые, с сентября до ноября. **М. мультифлорум** (M. multiflorum, многоцветный). Цв. белые, многочисленные, в июль. 2—3 ф. Сил. **М. имбрикатум** (M. imbricatum). **М. пурпурео-альбум** (M. purpureo-album, бело-пурпуровый). Цв. белые с пурпуровой полоской, в августе. Куст. р. **М. спектабилис** (M. spectabilis, красивый). Цв. красные, на нижней стороне больше бледные, в мае. **М. триколорум** (M. tricolorum, трехцветный). Цв. большие, неестественно паленые с кроваво-красным внизу, в апреле. Куст. р. **М. флорибундум** (M. floribundum, многоцветный). Цв. бледно-красные, нижняя часть лепестков белая; с мая до октября. **М. формозум** (M. formosum, красивый). Цв. пурпуровые, тычинки белые, в августе. 1 ф. **М. эдуле** (M. edule, съедомый). Цв. желтые, большие, в июль. Наиболее выносливый вид.

**МЕЗУА (Mesua).** *Mesue* были два знаменитых арабских врача и ботаника в VIII и IX стол. С. гуммигутовых. (6). Троп. Азия. Тепл. куст. и древ. рр. Глин. дер. с торф. Черенками из полузрелого роста в песок, в умб. парник, весной, или сбываема тогда же.

**М. ферреа** (M. ferrea, желванал). Цв. белые, очень душистые, величиною в цв. шиповника, с июля до августа. 40 ф. Древесина весьма крепкая.

**МЕЙРАЦИЛУМ (Meiracyllium).** *Meiracyllium*—маленький мальчик, быть может по малой величине рр. С. орхидей (3). Мексика, Ср. Америка. Тепл. эпифит. Уход как за Плевроталис.

**М. гемма** (M. gemma, драгоценный). Мексика. Цв. аметистовые; стебель очень низкий из ползучего корневища.

**МЕКОНОПСИС (Meconopsis).** *Mecon*—мак и *opsis*—подобие. С. маковых. (8). З. Европа, С. З. Америка и Гималай. Полувыносл. и выносл. много- или двул. трав, редко однол. рр. Хорошая садовая. Сбываема в парник, для высадки потом на воздух.

**М. Вальлихи** (M. Wallichii, Валиха). Силки Гималай. Цв. бледно-голубые, в июль. Многол. **М. камбриа** (M. cambria, валисский). З. Европа. Цв. бледно-желтые, с мая до августа. 1 ф. Многол. **М. непалензис** (M. nepalensis, из Непала). Гималай. Цв. золотисто-желтые, бледные, пониклые. Красное двудл. р.

**МЕЛИКОККА (Melicococa).** *Meli*—медь и *kokkos*—ягода, по сладким плодам. С. мыловниковых. (3). Вестиндия, Бразилия и Венесуэла. Тепл. древ. рр. Глин. дер. с торф. Черенками из зрелого роста, в парник.

**М. бига** (M. biga, двупарная). Вестиндия. Цв. желтые; плоды черные, очень сладкие. 40—50 ф.

**МЕЛИКОПЕ (Melicope).** *Meli*—медь, *cope*—двделение: по четырем медовикам при основании яичников, как бы их двделениях. С. рутовых. (15). Нов. Зеландия, о. Тихого Океана. Оранж. куст. рр. Песков. глин. дер. с малым количеством торф. и листовой. Черенками из бокового роста, в мае, в песок, под стеклом.

**М. терната** (M. ternata, с тройчатыми л.). Нов. Зеландия. Цв. зеленоватые, в июль. 12—15 ф.

**МЕЛИТТИС (Melittis).** *Melitta*—пчела, потому что р. это будто бы наиболее пригодно для пчел. С. губоцветных. (1). Европа. Выносливое многол. р. Сильная глин. дер. Двделением после цветения.

**М. мелиссофиллум** (M. melisso-phyllum, с л. как у Мелиссы). *Пахучее кадио*. Европа. Цв. белые с малиновыми или пурпуровыми крапинками, в мае. 1—1½ ф.

**МЕЛИХРУС (Melichrus).** *Melichros*—медового цвета. С. эпакрисовых. (2). Вост. Австралия. Оранж. куст. или полуст. рр. Песков. торф. Черенками в песок.

**М. ротатус** (M. rotatus, колесовидный). Цв. шароховые, в июль. Распростертый куст. **М. урцеолатус** (M. urceolatus, кубышчатый). Цв. шароховые, вичник кубышкой, в апреле. 2 ф. Прихотливый куст.

**МЕЛИАНТУС (Melianthus).** *Meli*—медь и *anthos*—цв. С. мыловниковых. (4). М. Д. Н. и Гималай. Оранж. куст. рр. Песков. удобренная. Сбываема или черенками под стеклом.

**М. майор** (M. major, большой). М. Д. Н. Цв. бурые, летом. 4—6 ф. Оранж.

**МЕЛИЯ (Melia).** *Melia*—греческое название ясени, по сходству. С. ясенковых. (5). Троп. Азия и Австралия. Тепл. или оранж. древ. рр. Песков. гл. дер. Черенками в песок, в умбренном парник.

**М. Ацадирахта** (M. Azadirachta, Ацадирахта). Остиндия. Цв. синеватые, летом. Тепл. 20 ф. **М. Ацедаракх** (M. Azedarach, Ацедаракх). Троп. Азия. Цв. лиловые, душистые, летом. Оранж. 40 ф. М.

**семпервиренс** (M. sempervirens, постоянно зеленая). Ямайка. Цв. синеватые, летом. Тепл. 25 ф. **М. японика** (M. japonica, японская). Цв. лиловые, душистые, летом. Оранж. 20—40 ф.

**МЕЛОДИНУС (Melodinus).** *Melon*—яблоко и *dineo*—вертеть кругом; по круглым плодам. С. кутровых. (15). Остиндия, Южн. Китай, Малайский арх., ост. Тихого Океана и троп. Австралия. Тепл. куст. рр. Уход как за Дипладения.

**М. моногинус** (M. monogynus, с одним столбиком). Индия. Цв. белые, душистые, в июль; плоды желтые, четырехгранные, величиною в апельсин, съедомые.

**МЕЛОКАКТУС (Melocactus).** *Melon*—дыня и *kaktos*—название, данное Теофрастом колотому растению и перенесенное на кактусы формою, напоминающею дыню. С. кактусовых. (30). Мексика, Бразилия, Вестиндия и Нов. Гренада. Существенны условия воспитания: высокая температура, скважистая земля, хороший дренаж и малая поливка.

**М. депрессум** (M. depressum, сплюснутый). Пернамбуко. Цв. розовые, в июль. Стебель сплюсненно-конический, не шире 6 д. **М. коммунис** (M. communis, обыкновенный). Цв. красно-розовые, трубчатые, стебель выш. 1—1½ ф. и шир. 1 ф. **М. Шлюмбергеріанус** (M. Schlumbergerianus, Шлюмбергера). О. св. Оомы. Стебель шаровидный, сизого цвета, в 6 д. в поперечник и такой же вышины.

**МЕЛЬХАНИЯ (Melhania).** Гора Мельхана, в Счастливой Аравии, где в первый раз найдено было растение. С. навозниковых. (16). Африка, жаркая страна Азии, троп. Австралия. Тепл. или оранж. куст., или полуст. рр. Песков. торф. с небольшим количеством глинисто-дери. Черенками из полузрелого роста в песок, торф., в парник. Темп. зимой 8—12, летом 13—24°.

**М. эритроксилох** (M. erythroxyloх, красно-древесинная). О. св. Елены. Цв. сначала белые, потом малиновые, наконец бурокрасные, в июль. 15 ф. Древесина красного цвета, твердая. Р. это почти исчезло на своей родине.

**МЕЛЯЛЕЙКА (Melaleuca).** *Melas*—черный и *leukos*—белый,—стебель черный, ветви белые. С. миртовых. (100). Австралия, Малайск. архип. Торф. с песков. гл. дер. Черенками в мае из роста окрешного внизу. Тепл. и оранж. дер. и куст. Темп. для оранж. зимой 3—6°.

**М. армиллярис** (M. armillaris, браслетная). Цв. белые, цилиндрическими ко-

лосьями, в июль. Куст 6—8 ф. **М. декуссата** (M. decussata, крестообразная). Цв. лиловые, довольно мелкие, продолговатыми или удлинными головками, в августе. 20 ф. Куст. **М. лейкадендрон** (M. leicadendron, с белым стеблем). Цв. белые колосками. Тепл. дерево в 15—20 ф. Из него получается *каеитовое масло*; из отваливающейся коры австралийские аборигены делают щиты, челноки, покрыва жилища и пр. **М. пучкелля** (M. pulchella, красивая). Цв. красноватые, в июль—сентябрь. 2—3 ф. Куст. **М. тимифолия** (M. thymifolia, с л. как у тимуса). Цв. пурпуровые, в июль до сентября. Куст в 2 ф. **М. фульгенс** (M. fulgens, блестящая). Цв. шароховые, в самых длинных, овальных кистях, с июля до сентября. Куст в 6—20 ф. **М. хиперифолия** (M. hypericifolia, с л. как у зверобоя). Цв. великолупно-шароховые, цилиндрич. колосками, с июля до августа. 10—20 ф.

**МЕЛЯМПИРУМ (Melampyrum).** *Melas*—черный и *pyros*—пшено, по цвету сбыва в пшеничных зернах, в которых попадаются семена этого р., растущего между пшеницей. С. норичниковых. (6). Европа, Азия и С. Америка. Выносл. однол., больше или меньше чужеродная, поэтому трудно воспитываемая. Сбываема весной на воздух, по трав.

**М. арвенс** (M. arvense, полевой). *Желтоголовник*. Европа, З. Азия. Цв. розовые с желтым звонком, колосом, в июль—август. 1—2 ф. **М. кристатум** (M. cristatum, гребенчатый). *Пытушки*. Европа. Сибирь. Цв. густым колосом, трубка желтая с красными кончиками, в сентябре до октября. 6—12 д.

**МЕЛЯНОРРЕА (Melanorrhoea).** *Melas*—черный и *rheo*—течь; при поранении из дерева вытекает черный сок. С. сердечниковых. (2). Бирма, Малайский полу. Большие тепл. дер. Торф. с гл. дер. Черенками из зрелого роста, не отрезая л., в парник.

**М. узитатиссима** (M. usitatissima, самая полезная). Индостан. Цв. красные. 100 ф. Из р. получается черный лак.

**МЕЛАНТЕРА (Melanthera).** *Melas*—черный и *anthera*—пыльник. С. сложнопетельных. (8). Троп. Америка и Африка. Тепл. и оранж. трав. или полуст. рр. Обыкновенная садовая. Сбываема или двделением.

**М. дельтоидея** (M. deltoidea, дельтовидная). Вестиндия. Цв. головки желтые, в июль—август. 3 ф. Тепл. Сил. *Calcea aspera* (Calcea aspera). **М. хастата** (M. hastata, копьевидная). С. Америка. Цв. головки белые, в июль—июль. Оранж. трав.



**МЕЛАНТИУМЪ** (*Melanthium*). *Mel-las*—черный и *anthos*—цв. С. лилейныхъ. (3). С. Америка. Выносив. лукович. р. Уходъ какъ за Вератрумъ.

**М. виргиникумъ** (*M. virginicum*, виргинский). Цв. млечно-бѣлые, дѣлающіеся коричневыми, въ июль. 3—5 ф.

**МЕЛѢСТОМА** (*Melastoma*). *Melas*—черный и *stoma*—уста; черныя ягоды, оставляютъ черныя слѣды на рту. С. черноустовыхъ. (40). Троп. Азія, Африка, С. Австралія, Океанія, Сейшельскіе о. Тенл. куст. рр. Глин. дерн. съ торф. по ровну. Черенками весной, въ песокъ, въ парникъ. Темп. зимой 6—13, лѣтомъ 13—24°.

**М. дентикулятумъ** (*M. denticulatum*, зубчатый). Нов. Каледонія. Цв. бѣлые, въ июль. 3—4 ф. **М. малябэтрика** (*M. malabathrica*, малабарская). Остиндія. Цв. пурпуровые крупныя, въ июль. 6—8 ф. **М. сангвинейумъ** (*M. sanguineum*, кроваво-красная). Зонтскій пр. Цв. пурпуровые, большіе, съ сентября. 4—6 ф.

**МЕЛАСФЭРУЛЯ** (*Melaspheerula*). *Melas*—черный и *sphaerula*—маленькій шарикъ, по мелкимъ чернымъ луковичкамъ. С. косатиковыхъ. (1). Ю. Африка. Оранж. луков. р., требующее того-же ухода какъ Иксія.

**М. граминая** (*M. graminea*, похожая на злакъ). Цв. бѣловатые съ пурпуровыми черточками, въ апрѣль.

**МЕНИСПЕРМУМЪ** (*Menispermum*). *Mene*—луна и *sperma*—сѣмя, по формѣ сѣмянъ. С. луносѣмянныхъ. (2). С. Америка и В. Азія. Тепл. и выносив. вьющ. куст. рр. Обыкновен. сад. Дѣленіемъ и сѣменами.

**М. канадѣнзе** (*M. canadense*, канадскій). С. Америка. Цв. желтоватые, лѣтомъ; лл. щитовидно-почковидные. Выносив.

**МЕНИСЦИУМЪ** (*Meniscium*). *Meniscus*—полумѣсяцъ, по формѣ споръ. С. папоротниковыхъ. (10). Троп. Америка. Теплич. папоротники. Глин. дерн. Держать влажно.

**М. ангиустифоліумъ** (*M. angustifolium*, узколистный). Отъ Вестиндіи до Перу. Ван до 2 ф. длин., перистыя, перья 4—6 д. длин. и  $\frac{1}{4}$  до  $\frac{3}{4}$  шир. **М. ретикулятумъ** (*M. reticulatum*, сѣтчатый). Мексика до Перу. Ван до 4 ф. длин. и 1 ф. шир., перистыя; перья 6—12 д. длин. и 4 шир.

**МЕНИАНТЕСЪ** (*Menyanthes*). Старинное названіе отъ *men*—мѣсяцъ и *anthos*—цв., по цвѣтенію въ продолженіе мѣсяца. С. горечавковыхъ. (2). Аркт. Европа, С. Азія, С.-З. Индія и С. Америка. Многол. водяныя трав. выносив. рр. Въ мелкихъ водоемахъ, дѣленіемъ корней.

**М. криста-галли** (*M. crista galli*, пѣтушій гребешокъ). С. Америка. Цв. бѣлые, весной. Лл. почковидныя, шир. до 4 д. Сн. *Вильяроел Криста-галли* (*Villarsia Crista-galli*). **М. трифоліата** (*M. trifoliata*, трехлистная). *Тредфол. Вахта*. Сѣв. полушаріе. Цв. бѣлые, снаружи съ красной, весной. Лл. трехлистные, листочки овальные, тупые; стебли покрыты листов. влагалищами.

**МѢНТА** (*Mentha*). Старинное латинское названіе. С. губоцвѣтныхъ. (25). Во всѣхъ странахъ свѣта. Выносив. многол. трав. рр. Дѣленіемъ корней весной и осенью, первую лучше. Плотная, глянчатая.

**М. виридисъ** (*M. viridis*, зеленая). *Кошная мята*. Европа. Цв. пурпуровые, колосыми, въ августъ. Лл. овально-ланцетов., почти сидячіе, гладкіе. 2 ф. **М. пиперита** (*M. piperita*, перечневая). *Английская мята* или *холодника*. Европа. Цв. пурпуровые, колосыми, осенью. Лл. овально-продолгов. на черешкахъ; стебель красноватый. 1—2 ф. **М. пулгериумъ** (*M. pulegium*). *Полюй трава*. Европа, С. и З. Азія, С. Африка. Цв. блѣдно-пурпуровые, колчатыя, осенью. Лл. овальные на черешкахъ. 8 д. Разновидность *гибралтарика* (*gibraltarica*) употребляется въ узорчатыхъ насажденіяхъ, какъ очень низкая и густорастущая. **М. ротундифолія** (*M. rotundifolia*, круглолистная). Европа, С. и З. Азія, С. Африка. Цв. бѣловатые, коническими колосами. Лл. сидячіе, округло-овальные, сверху съ волосками, снизу пушистые. 1—2 ф.

**МЕНТЦЕЛІЯ** (*Mentzelia*). Христіанъ *Ментцель* (*Mentzel*)—нѣмецкій ботаникъ, † 1701 г. С. лавровыхъ. (30). Жаркія и троп. страны Америки. Трав. одно-, дву- и многол. рр. Уходъ какъ за Бартопія.

**М. бартоніойдесъ** (*M. bartonioides*, похожая на Бартопію). З. Соедин. Амер. Штаты. Цв. желтые, почти бѣлые, лѣтомъ. 1 ф. Однол. **М. орната** (*M. ornata*, украшенная). Миссури. Цв. бѣлые, распускающіеся послѣ заката солнца, а днемъ свертывающіеся. 2 ф. Однол.

**МЕНЦИЗІЯ** (*Menziesia*). *Менциесъ* (*Menzies*)—хирургъ и натуралистъ экспедиціи Ванкувера, † 1824 г. С. вересковыхъ. (7). С. Америка и Японія. Полувыносив. или выносив. куст. рр. Песчан. торф. съ небольшими колч. глин. дерн. Преимущ. отводкой, осенью, то-же черенками подъ стекломъ.

**М. ферругинеа** (*M. ferruginea*, ржавая). С. Америка. Цв. коричневыя, въ маѣ. 6 д. Разнов. *глобулярія* (*globularia*) имѣетъ цв. малиновые и вышиною въ 2—5 ф.

**МЕРЕНДЭРА** (*Merendera*). Такъ

называютъ испанцы Кольхикумъ. С. лилейныхъ. (10). Средиземн. побережье, Абиссинія, Афганистанъ. Выносив. луков. рр. Уходъ какъ за Кольхикумъ.

**М. бульбокодіумъ** (*M. bulbocodium*, Бульбокодіумъ). Пиреней и Сьерра-Невада. Цв. лилово-розовые, осенью. 3—4 д.

**МЕРИПГИЯ** (*Moeringia*). *Мерингъ* (*Möhrling*)—нѣмецкій ученый, авторъ *Nortus proprius*, † 1736. С. гвоздичныхъ. Европа. Выносив. трав. многол. рр. Уходъ какъ за Аренарія, съ которою родъ этотъ слѣтъ.

**М. мускоза** (*M. muscosa*, мушкетая). Цв. бѣлые, мелкіе, лѣтомъ. 3—4 д.

**МЕРИТА** (*Meryta*). *Merygo*—навертываться, мужские цв. представляютъ какъ бы смотанные клубки. С. аралиевыхъ. (6). О. Норфолькъ, Нов. Зеландія и Южно-Тихаго океана. Тепл. или оранж. древ. рр. Уходъ какъ за Аралия.

**М. латифолія** (*M. latifolia*, широколистная). О. Норфолькъ. Цв. желто-зеленоватые, въ мартъ. 50—60 ф. Оранж. **М. сонхифолія** (*M. sonchifolia*, съ лл. какъ у Сонхуса). Нов. Каледонія. Лл. перисторазсѣя., лпровидные, зубчатые, темно-зеленыя съ бѣлыми пятнышками. Тепл.

**МЕРІАНІЯ** (*Meriania*). *Сибилла Де Меріанъ* (*De Merian*)—голландка, авторъ *De metamorphosis insectorum surinamensis*, † 1717. С. черноустовыхъ. (26). Троп. Америка и Вестиндія. Тепл. древ. или куст. рр. Уходъ какъ за Меластома.

**М. розеа** (*M. rosea*, розовая). Вестиндія. Цв. разнообразныя, отъ бѣлыхъ съ карминовымъ основаніемъ до розовыхъ или пурпуровыхъ. 30 ф.

**МЕРТЕНСІЯ** (*Mertensia*). Францъ Карлъ *Мертенсъ* (*Mertens*)—нѣмецкій ботаникъ, † 1831. С. бурачниковыхъ. (15). В. Европа, въ тропич. Азія и С. Америка. Выносив. многол. трав. рр. Обыкновен. сѣменами какъ посѣютъ и дѣленіемъ осенью.

**М. альпіна** (*M. alpina*, альпійская). Скалистыя горы. Цв. голубые, весной и лѣтомъ. 6—10 д. **М. виргиника** (*M. virginica*, виргинская). Виргинія. Цв. сине-пурпуровые, весной и лѣтомъ. 1—2 ф. **М. ланцеолатъ** (*M. lanceolata*, ланцетовидная). Скалистыя горы. Цв. голубые, въ маѣ. 6—12 д. **М. сибиріка** (*M. sibirica*, сибирская). В. Азія, С. Америка. Цв. сине-пурпуровые, въ маѣ до июля. 6—18 д. Сн. *Пульмонарія сибиріка* (*Pulmonaria sibirica*).

**МЕРУА** (*Maeria*). Отъ арабскаго названія *меру*. С. каперовыхъ. (10). Троп. Африка, Аравія и Вестиндія. Тепл. и оранж. куст. рр. Глин. дерн. съ торфъ

Черенками изъ почти зрѣлаго роста, въ песокъ и парникъ.

**М. облонгифолія** (*M. oblongifolia*, съ продолговатыми лл.). Абиссинія. Цв. бѣлые, въ июль. 4 ф. Сн. *Каппарисъ хетероклитъ* и *Нибурія облонгифолія* (*Capparis heteroclita*, *Nieburia oblongifolia*).

**МЕСПИЛУСЪ** (*Mespilus*). Теофрастомъ упоминается *Mespilos*. С. розовыхъ. Въ настоящее время родъ соединенъ съ *Пирусъ*; здѣсь удержанъ по привычкѣ къ прежней классификаціи. Въ умеренномъ климатѣ—выносливые древ. рр. съ бѣлыми цв. Хорошая, сильная глин. дерн. Сѣменами, кот. всходятъ на другой годъ послѣ посѣва; отводкой; черенками и прививкой.

**М. германіка** (*M. germanica*, германскій). *Кизилъ. Мушмула. Чинки*. Европа, Малая Азія, Персія. Цв. бѣлые, въ маѣ; лл. ланцетовидныя. 10—20 ф. Имѣетъ много разновидностей.

**МѢТЛА**. Лучшая для подметанія дорожекъ дѣлается изъ стеблей вереска (*Calluna vulgaris*). Изъ чего бы ни была сдѣлана—должна держаться въ водѣ, чтобы не ломалась и дольше служила. См. также Агrostисъ и Калимагросистъ.

**МѢТЛИЦА**. См. Поа.

**МЕТРОДОРЭА** (*Metrodorea*). *Метродорусъ* (*Metrodorus*)—первый живописецъ растений, жившій при Плиніи. С. рутовыхъ. (1). Тепл. куст. р. Глин. дерн. съ торф. Черенками, въ парникъ. Темп. зимой 8—12, лѣтомъ 13—24°.

**М. атропурпуреа** (*M. atropurpurea*, темно-пурпуровая). Бразилія. Цв. пурпуровые, маленькіе; лл. цѣльные, супротивные. 5 ф. Сн. *Эсенбекія атропурпуреа* (*Esenbeckia atropurpurea*).

**МЕТРОКСИЛОНЪ** (*Metroxylon*). *Метра*—сердцевина и *xylon*—древесина, по значительной части, занимаемой сердцевинной. С. пальмъ. (6). Малайскій архипел., Нов. Гвинія, о. Фиджи. Песков. глин. дерн. Сѣменами и отростками.

**М. витинѣнзе** (*M. vitinense*, съ Фиджи). Лл. перистые; черешокъ, особенно въ нижней части, усаженъ колочками.

**МЕТРОСИДЕРОСЬ** (*Metrosydoros*). *Метра*—сердцевина и *sideros*—жѣлѣзо, по крѣпости древесныя. С. миртовыхъ. (18). О. Тихаго о., Новой Зеландіи, Сандвичевы, Индѣйскаго архипелага; троп. Австралія и Юж. Африка. Оранж. древ. или куст. рр. Уходъ какъ за Мелалейка.

**М. сканденсъ** (*M. scandens*, цѣлинощійся). Цв. бѣлые, въ августъ. 5 ф. На родинѣ—цѣльное р. **М. томентоза** (*M. tomentosa*, пушистый). Цв. ярко-карминово-



красные, большіе, въ іюль. 30—40 ф. Дерево.

**МЕТРЪ.** Липейная мѣра: десятиллионная часть четверти земной окружности, 3,2809 русс. фута или  $1\frac{1}{8}$  аршина.

**МЕТТЕРНИХІЯ** (Metternichia). Князь *Меттернихъ Виннебургъ* — известный австрийский дипломатъ, † 1859. С. населенныхъ. (2). Бразилія, Колумбія. Тепл. древ. рр. Ухождъ какъ за Лизіантусъ.

**М. принципіс** (M. principis, княжеская). Бразилія. Цв. бѣлые, въ августъ. 3 ф.

**МЕУМЪ** (Meum). У Диоскорида упоминается р. *Meon*; названіе это примѣнено къ настоящему роду. С. зонтичныхъ. (1). Ароматич. трав. многол. выноса. р. Садовый обикъ. Дѣленіемъ.

**М. атамантикумъ** (M. athamanticum) *Прорывная трава*. Гористыя мѣстности Европы. Цв. бѣлые, въ маѣ. Лл. многообразныя на нитевидные сегменты. 1—2 ф.

**МИГІНДА** (Myginda) *фонъ Мигиндъ* (von Mygind) — нѣм. ботаникъ, † 1789. С. краснопузырьниковыхъ. (8). Троп. Америка, за исклю. Бразилію, Чили. Тепл. куст. рр. Всякая легкая хорошая. Черенками изъ зрѣлаго роста, осенью, въ песокъ и парникъ.

**М. латифолия** (M. latifolia, широколистная). Вестиндія. Цв. мелкіе бѣлые, въ апрѣль и маѣ. 3 ф.

**МИКЕЛІЯ** (Michelia). Пьетро Антонио *Микеле* (Michele) — знаменитый въ свое время флорентинскій ботаникъ, † 1737. С. магноліевыхъ. (12). Индія и о. Вост. архипелага. Тепл. деревья. Песков. глини. дерн. съ листовой. Черенками лѣтомъ изъ полузрѣлаго роста въ песокъ, въ парникъ.

**М. ланугиноза** (M. lanuginosa, мохнатая). Гималаи. Цв. бѣдно-желтые, весной; лл. пониклые, эллиптически-ланцетовидные. **М. Чампака** (M. Champaka, Чампака). Индія и Ява. Цв. желтые, большіе, похожіе нѣсколько на париссоовые, душистые днемъ, но непріятно пахнущіе ночью. Лл. овально-продолговатые. 30—40 ф.

**МИКОНІЯ** (Miconia). *Миконъ* (Micon) — испанскій ботаникъ. С. черноствольныхъ. (300). Троп. Америка и Азія. Тепл. куст. и древ. рр. Ухождъ какъ за Меластома.

**М. флѣмеа** (M. flamea, огненно-красная). Лл. очень большіе, съ неровной поверхностью отъ углубленныхъ жилокъ, эллиптическіе, остроконечные. Очень красивое листв. р. **М. Хукеріана** (M. Hookeriana, Хукерова). Перу. Лл. темно-оливковые, съ широкою серебристою среднею жилкою, эллиптическіе, съ неровною поверхностью. Орнаментальный листв. кустъ.

**МИКРОГЛОССА** (Microglossa). *Mikros* — малый и *glossa* — языкъ, по короткимъ язычкамъ дужевыхъ цв. С. сложнопѣстныхъ. (6). Жаркія страны Азіи и Африки. Тепл. куст. рр. Глин. дерн. съ песков. листов. Съеменами и дѣленіемъ корней.

**М. альбесценс** (M. albescens, бѣловатая). Гималаи. Цв. гол. бѣдно-голубыя или бѣловатыя. Спн. *Астеръ альбесценс* (Aster albescens).

**МИКРОКАХРИСЪ** (Microcachrys). *Mikros* — малый и *kachrys* — шишка, по очень маленькимъ шишкамъ. С. хвойныхъ. (1). Распростертый вѣтвистый, оранжерейный кустарникъ изъ Тасманіи. Ухождъ какъ за Дакридумъ.

**М. тетрагона** (M. tetragona, четырехсторонній). Лл. темно-зеленые, овальные, чрезвычайно мелкіе, расположенные четырьмя рядами, плотно настельные. Спн. *Дакридумъ тетрагонумъ* (Dacrydium tetragonum).

**МИКРОЛОМА** (Microloma). *Mikros* — малый и *loma* — бахрома, по волоскамъ въ трубкѣ вѣнчика. С. ласточниковыхъ. (5). Мысъ Д. Н. Оранже. вьющ. полукусты. Ухождъ какъ за Церопегія.

**М. линейаре** (M. lineare, линейная). Цв. кроваво-красные, въ іюль. **М. сагиттатумъ** (M. sagittatum, стрѣловидная). Цв. шарлаховые, въ іюль.

**МИКОМЕРІЯ** (Micromeria). *Mikros* — маленький и *meris* — часть; по мелкимъ цв. С. губоцвѣтныхъ. (60). Жаркія страны, по преим. Средиземное побережье. Полувыноса. полукуст. или трав. рр. За исключеніемъ поименованнаго, ни одно не имѣетъ садового значенія.

**М. пиперелля** (M. piperella, пиперелля). Ю.-З. Европа. Полукуст. р. довольноющееся обикъ сад. з. и размножаемое черенками. Полувыносливо. Цв. пурпуровые, съ августа до октября. 3 д.

**МИКОМІРТУСЪ** (Micromyrtus). *Mikros* — малый и *Myrtos* — мирта, маленькая мирта. С. миртовыхъ. (6). Австралія. Оранже. верескообразн. куст. рр. Ухождъ какъ за Миртусъ.

**М. микрофилля** (M. microphylla, мелколистная). Цв. бѣлые, мелкіе; р. очень вѣтвистое.

**МИКРОСТИЛИСЪ** (Microstylis). *Mikros* — малый и *stylis* — столбикъ. С. орхидей. (40). Европа, Азія, С. и Ю. Америка. Тепл. земныя. Ухождъ какъ за Липарисъ.

**М. дисколоръ** (M. discolor, двуцвѣтный). Цейлонъ. Цв. желтые, переходящіе въ оранжевые, мелкіе. **М. калофилля** (M. calophylla, съ красивыми лл.). Индійскій Архипелагъ. Цв. желтые; лл. овальные, жел-

товатые съ коричневыми полосками и краемъ. **М. метальлика** (M. metallica, металлическій). Борнео. Цв. съ желтыми и розовыми долями и съ желтыми и розовыми лепестками; лл. черно-пурпуровые на верхней, свѣтло-розовые на нижней сторонѣ, съ металлическимъ отсѣвтомъ.

**МИЛОКАРИУМЪ** (Myllocaryum). *Myle* — мельница и *karyon* — орѣхъ; у сѣмянъ четыре крыла, какъ и у вѣтр. мельницы. С. цирилловыхъ. (1). Оранже. или полувын. кустъ. Песков. глин. дерн. съ листовой. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ песокъ, подъ стекломъ.

**М. лигустринумъ** (M. ligustrinum, похожий на Лигуструмъ). Ю. Соед. Ам. Штаты. Цв. бѣлые душистые, въ маѣ, 8 ф. Теперь это растение названо *Клифтонія лигустринъ* (Cliftonia ligustrina).

**МИЛЬЛЕТІЯ** (Milletia). *Милле* (Millet) — франц. ботаникъ XVIII ст. С. бобовыхъ. (40). Австралія, Азія и Африка. Оранже. высокія куст. или древесныя вьющ. рр. Ухождъ какъ за Долихосъ.

**М. мегасперма** (M. megasperma, съ крупными сѣменами). Куинслендъ. Цв. пурпуровые; лл. перистые, темнозеленые. Р. вьющееся.

**МИЛЬЛИНГТОНІЯ** (Millingtonia). *Томасъ Миллингтонъ* (Millington) — англійскій ботаникъ и физиологъ. С. биньоніевыхъ. (1). Теплич. дерево. Ухождъ какъ за Жакаранда.

**М. хортензисъ** (M. hortensis, садовая). Барма. Цв. чисто-бѣлые, съ превосходнымъ запахомъ, крупныя. Лл. попарно-перистые. 80 ф.

**МИЛЛЯ** (Milla). *Милля* (Milla) — придвор. садовникъ въ Мадридѣ. С. лилейныхъ. (1). Полувыноса. луков. р. Глин. дерн. Съеменами и отпрысками.

**М. бифлора** (M. biflora, двуцвѣтная). Мексика. Цв. зонтикомъ, бѣлые, въ августъ, не свертывающіеся на ночь. 6 д.

**МИЛЬТОНІЯ** (Miltonia). Виконтъ *Милтонъ* (Milton), вполнѣдствіи графъ Фицвильямъ. С. орхидей. (20). Бразилія, Перу. Тепл. эпифиты. Въ плоскихъ корзинахъ или на чуркахъ съ подстилкой торф. моха. Дѣленіемъ весной. Темп. лѣтомъ 13—26°.

**М. Варшевичи** (M. Warszewiczii, Варшевича). Перу. Цв. ярко-коричневые съ желтыми пятнами, губа фиолетовая съ бѣлою переднею частью, по которой разбросаны желтыя и коричневые крапинки. **М. кандида** (M. candida, бѣлая). Бразилія. Цв. желтоватые съ ярко-коричневыми пятнышками, губа бѣлая съ розовымъ оттыкомъ, волнистая; осенью. **М. Клоуэвиз** (M. Clowesii, Клоуса). Бразилія. Цв. желтые съ коричневыми полосками, губа плоская, пур-

пуровая внизу, бѣлая на концѣ. Розовидность *майоръ* (major) имѣетъ цв. болѣе крупныя. **М. кунеата** (M. cuneata, съ клиновидной губой). Бразилія. Цв. шоколаднаго цвѣта, съ желто-зеленоватыми кончиками и полосками; губа бѣлая, съ розоватымъ основаніемъ, рано весной. **М. Регнеллія** (M. Regnelli, Регнеллія). Бразилія. Цв. вѣчно-розовые съ бѣлыми краями; губа розово-лиловая, осенью. 1 ф. У розовидности *пурпуреа* (purpurea) губа розово-пурпуровая. **М. спектабилис** (M. spectabilis, красивая). Бразилія. Цв. бѣлые, книзу розовые, губа большая, розово-фиолетовая съ бѣлымъ ободкомъ, осенью. Считается лучшею Милтоніей. **М. флавесценс** (M. flavescens, желтоватая). Цв. желтые, губа тоже желтая съ кроваво-красными пятнами, въ іюль. Имѣетъ ползучее корневище.

**МИМЕТЕСЪ** (Mimetes). *Mimos* — мимика, по сходству съ другими близкими родами. С. протейныхъ. (14). Юж. Африка. Оранже. куст. рр. Глин. дерн. съ торф., сильная поливка; черенками изъ зрѣлаго роста осенью, въ песокъ, безъ нагрѣва грунта, пока не образуется наливъ.

**М. Цейхери** (N. Zeyheri, Цейхера). Цв. головки красно-розовыя, въ іюль. Лл. эллиптическіе съ пурпуровыми краями. 6—8 ф.

**МИМИЧНЫЙ**. Инородное тѣло, принимающее цвѣтъ и подобіе другого, въ цѣляхъ самосохраненія.

**МИМОЗА** (Mimosa). *Mimos* — мимика; лл. многихъ видовъ подражаютъ чувствительности животныхъ. С. бобовыхъ. (230). Жаркія страны Америки, троп. Африка, Остиндія. Глин. дер. пополамъ съ торф. и съ добавленіемъ немного песка. Съеменами весной, въ парникъ или черенками изъ молодого роста въ песокъ и парникъ. Темп. зимой 8—10, лѣтомъ 13—23°.

**М. маргината** (M. marginata, окаймленная). Около-троп. юж. Америка. Цв. головки пурпуровыя, лѣтомъ; лл. съ рѣсничатыми краями. **М. пудика** (M. pudica, стыдливая). Троп. Америка (освоилась въ троп. Африкѣ и Азіи). Цв. красные, лѣтомъ. Лл. дланевидно-перистые; стебель колючій. Чувствительность лл. сильнѣе, чѣмъ у называемъ й «чувствительной». **М. сенситива** (M. sensitiva).

**МИМУЗОПСЪ** (Mimusops). *Mimo* — обезьяна и *opsis* подобіе, по вѣнчику. С. мыловниковыхъ. (30). Тропич. страны. Тепл. дер. содержащая млечный сокъ. Ухождъ какъ за Хризифильюмъ.

**М. Кауки** (M. Kauli, Кауки). Бирма, Малайскіе о., троп. Австралія. Цв. бѣлые, лл. обратно-яйцевидные, внизу пушистые. 30 ф. **М. Эленги** (M. Elengi, Эленги).



Малайск. полуостр. Цв. бѣлые, душистые лл. ланцетовидные, остроколючные. 50 ф.

**МИМУЛЮСЪ** (*Mimulus*). *Мито*—обезьяна, по выщипку. С. поричниковыхъ. (40). Внѣ троп. или гористыя страны Америки, Азіи, Австраліи и Африки; по пѣтъ въ Европѣ и по Средиземн. побережью. Выносл. или полувын. (оранж.) травян., либо полукуст. рр. Для горшечныхъ экз. 2 ч. глин. дерн., 1 ч. листовой и 1 ч. коровьяго перегноя, для одиолѣт. глин. дерн. съ пескомъ и перегноемъ. Сѣменами, черенками и дѣленіемъ.

**М. глютинозусъ** (*M. glutinosus*, липкій). Калифорнія. Цв. лососевые, почти круглый годъ. Оранж. куст. въ 5 ф. Сип. *Диплакусъ глютинозусъ* (*Diplacus glutinosus*). У разновидности его *руписеусъ* (*rupeus*,—красный) цв. отъ красно-оранжевыхъ до шарлаховыхъ. **М. кардиналисъ** (*M. cardinalis*, кардинальскій). Орегонъ до Калифорніи и Мексики. Цв. крупные красные, въ іюнѣ до августа. 1—3 ф. Многол. **М. Льюиса** (*M. Lewisii*, Льюиса). Калифорнія. Цв. розовые, въ августѣ. 1 ф. Сип. **М. розеусъ** (*M. roseus*), трав. выносл. **М. лутеусъ** (*M. luteus*, обыкновенный, желтый). Чили. Цв. желтые съ двумя темными мѣтками въ зѣвъ; лѣтомъ. 9—12 ф. Хотя считается одиол., но при благоприят. условіяхъ—многол. Имѣетъ очень много разновидностей, одна изъ нихъ—*купреусъ* (*cupreus*), бываетъ чрезвычайно разнообразныхъ формъ. **М. мошатузъ** (*M. moschatum*, мускусный). Мекс. З.-С. Америка. Цв. желтые, мелкіе, съ іюня до сентября. Лл. нѣсколько линкіе. Многол. полувыносл., съ сильнымъ запахомъ мускуса. **М. примулоидеусъ** (*M. primuloides*, похожій на Примула). Калифорнія. Цв. желтые; лл. ланцетовидные. Полувын. многол.

**МИНДАЛЬ**. Миндальное дерево. См. Амингалюст.

**МИРАВИЛИСЪ** (*Mirabilis*). *Мирабиліс*—удивительный. С. почечковидныхъ. (10). Жаркія страны Америки. Оранж. или полувыносл. орнамент. многол. трав. рр. Лучшая з.—рыхлая глин. дерн. Сѣменами, весной, въ парникѣ.

**М. мультифлора** (*M. multiflora*, многоцвѣтнй). Мексика и Калифорнія. Цв. ярко-пурпуровые, лл. овальные. **М. яяпа** (*M. jalapa*, ялапа). *Ночная красавица*. Мексика и Центр. Америка. Цв. чрезвычайно разнообразны, — бѣлые, желтые, розовые, сплошные или съ черточками и крапинками, душистые. лѣтомъ; лл. большіе, цѣльные, гладкіе. 2 ф. Воспитывается обычно какъ полувыносл. одиолѣтнее, но имѣетъ многол. клубень.

**МИРБЕЛІЯ** (*Mirbelia*). *Мирбелъ* (С. F. Mirbel)—замѣчательный франц. бота-

никъ, † 1854. С. бобовыхъ. (16). Австралія. Оранж. куст. рр. Уходъ какъ за Хоридеа.

**М. грандифлора** (*M. grandiflora*, крупноцвѣтнй). Цв. желтые съ красными пятнами на верхней части флага и на крыльяхъ, въ маѣ. 1—2 ф. **М. специоза** (*M. speciosa*, отъинная). Цв. пурпуровые, въ маѣ до іюля. 1—2 ф.

**МИРИКА** (*Myrica*). *Муріо*—протекать, по мѣсту произрастанія у ручьевъ. С. восковниковыхъ. (36). Европа, Азія, Африка, Америка. Оранж. и выносл. полукуст. и куст. рр. Торф. съ пескомъ, влажное содержаніе. Сѣменами и черенками.

**М. гале** (*M. gale*). *Восковникъ*. Европа, С. Азія и С. Америка. Цв. коричнево-зеленые, рано весной. 2—4 ф. Пахучій кустъ. **М. калифорника** (*M. californica*, калифорнская). Калифорнія. Цв. зеленые, въ іюль. 4 ф.

**МИРИКАРІЯ** (*Myricaria*). *Муріке*—древне-греч. названіе Тамаринда. С. тамариндовыхъ. (4). Европа и Сред. Азія. Выносл. куст. или полукуст. рр. Песков. Сѣменами, весной, или черенками изъ молодого роста.

**М. германика** (*M. germanica*, нѣмецкая). *Лидовникъ*. Европа, Азія. Цв. бѣлые или розовые, лѣтомъ; лл. линейные, сизые. 3—6 ф.

**МИРИСТИКА** (*Myristica*). *Мурістикос*—пахнущій мирроу. Единств. родъ с. мушкатниковыхъ. Упоминаемый ниже видъ есть тепл. дерево, нуждающееся въ песков. глин. дерн. и волокн. торф. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ пескѣ, въ парникѣ. Темп. зимой 10—13, лѣтомъ 13—24°.

**М. фрагранс** (*M. fragrans*, душистая). *Мушкатный ортаникъ*. Индійскій Архипелагъ. Цв. блѣдно-желтые, въ іюнѣ; плодъ похожъ на персикъ, содержитъ мушкатный орѣхъ.

**МИРИОФІЛЬЮМЪ** (*Myriophyllum*). Названіе заимствовано у Діоскорида: *myrios*—мириада и *phyllon*—листъ, по большому числу разлѣловъ л. С. слано-годишниковыхъ. (15). По всей земной поверхности. Оранж., полувыносл. и выносл. травян. водяныя рр. Дѣленіемъ.

**М. прозерпинакоидеусъ** (*M. proserpinacoides*, похожій на Прозерника). Бразилія, Чили. Цв. мелкіе; лл. колючіе, мелко-ребенчатые. Оранж. красивое водяное р. Сип. *Хернестесъ рефлексъ* (*Herpestes reflexa*).

**МИРИКОВЫЯ** рр. (*myricaceae*). Семейство это состоитъ изъ одного только рода,—Мирика, виды (числомъ 35) котораго распространены по Европѣ, умѣ-

ренной и тропической Азіи, Южной Африки и Сѣвер. Америки.

**МИРОВАЛЯНЪ**. См. Прунусъ.

**МИРОДІЯ** (*Myrodia*). *Мурон*—мирра и *одме*—запахъ. С. навозниковыхъ. (7). Троп. Америка. Тепл. куст. рр. имѣющія ароматич. запахъ. Песков. глин. дерн. Черенками изъ ползучаго роста, въ пескѣ, въ парникѣ.

**М. турбината** (*M. turbinata*, кубаревидная). Цв. бѣлые, очень душистые, въ маѣ. Лл. эллиптическіе, цѣльные. 8 ф.

**МИРОНЧИКЪ**. **МИРОНЪ**. Яблоко ранней поры посѣванія, продолговатой формы съ полосатымъ румянцемъ и кисло-сладкимъ вкусомъ.

**МИРОКСИЛОНЪ** (*Myroxylon*). *Мурон*—мирра и *хylon*—дерево; древесина смолистая, благовонная. С. бобовыхъ. (6). Троп. Америка. Тепл. деревья. Глин. дерн. съ торф. и съ прихвѣстью песку и листов. Черенками изъ ползучаго роста, въ пескѣ, въ парникѣ.

**М. перуиферумъ** (*M. peruiferum*, дающій перуанскій темный бальзамъ). Перу. Цв. бѣлые, кистями. Лл. кожистые, двупарные. 40 ф. **М. рубесценс** (*M. rubescens*, пушистый). Юж. Америка. Цв. бѣлые, кистями, въ августѣ; лл. перепончатые, овально-ланцетовидные, внизу пушистые. 40 ф. Въ корѣ бѣлый перуанскій бальзамъ. **М. толуиферумъ** (*M. toluiferum*, производящій толуанскій бальзамъ). Юж. Америка. Цв. желтоватые, въ угловыхъ кистяхъ; лл. продолговато-овальные. 40 ф.

**МИРОСПЕРМУМЪ** (*Myrospermum*). *Мурон*—мирра и *sperma*—сѣмя; въ сѣменахъ содержится крѣпко пахучая смола. С. бобовыхъ. (1). Троп. Америка. Тепл. дерево. Уходъ какъ за Мироксилонъ.

**М. фрутесценс** (*M. frutescens*, кустарный). Цв. розовые, кистями, въ маѣ; лл. перистые. 10 ф.

**МИРРИСЪ** (*Myrrhis*). Названіе, заимствованное у Діоскорида и данное по *myrrha* (мирра), вследствие запаха р. С. зонтичныхъ. (2). Горы Европы, Кавказа и С. Америки. Многол. трав. рр. Упоминаемый ниже видъ довольствуется всякой з. и размножается сѣменами и дѣленіемъ.

**М. одората** (*M. odorata*, душистый). *Кутень*. Кавказъ, Англія, Франція. Цв. бѣлые, сложными зонтиками, въ маѣ. 2—3 ф.

**МИРСИНЕ** (*Myrsine*). Названіе данное Діоскоридомъ миртѣ. С. прыщечков. (80). Азія, Африка, вѣтроп. Австралія, троп. Америка, о. Атлант. океана, Нов. Зеландія. Тепл. и оранж. дрв. или кустарн. рр. Уходъ какъ за Ардзія.

**М. африкана** (*M. africana*, африканское). М. Д. Н. Цв. коричневыя, по трое;

въ мартѣ до мая. Оранж. куст. р. 3—4 ф. **М. капителья** (*M. capitella*, съ маленькими головчатыми цв.). Пепаль. Цв. желтовато-зеленые, мелкіе, головками, въ январѣ. 4 ф. Тепл. куст.

**МИРСИФІЛЬЮМЪ** (*Myrsiphyllum*). *Мурсине*—мирра и *phyllon*—листъ; лл. ароматическіе. С. лилейныхъ. М. Д. Н. Оранж. вьющіяся рр. Глин. дерн. съ листов. При ростѣ обильно поливать. Сѣменами, черенками и дѣленіемъ корней.

**М. аспарагоидеусъ** (*M. asparagoides*, похожій на спаржу). Цв. зеленоватые или бѣлые, въ іюнѣ; лл. маленькіе, глянцевитые. Сип. *Медеола аспарагоидеусъ* (*Medeola asparagoides*).

**МИРТОВЫЯ** рр. (*myrtaceae*). Обширное семейство изъ древесныхъ, кустарныхъ и иногда полукустарныхъ растений, преимущ. изъ тропического пояса земной поверхности. Родовъ 76, видовъ 1,800. Дарвинія, Лентоспермумъ, Мелалеука, Муртусъ и Хипокалимина.

**МИРТУСЪ** (*Myrtus*). *Муртос*—древне-греческое названіе. С. миртовыхъ. (100). Тропич. и вѣтроп. и Запад. Америка, Австралія, Нов. Зеландія, Нов. Зеландія, Европа и З. Азія. Тепл., оранж. и въ умѣр. странахъ почти выносл. рр. Песков. глин. дерн. съ листовой. Черенками изъ почти зрѣлаго роста, въ парникѣ. Лѣтомъ—обильно поливать и опрыскивать; никогда не засушивать.

**М. булльята** (*M. bullata*, пузырчатая). Нов. Зеландія. Цв. блѣдно-розовые, ягоды черныя, лл. широко-эллиптическіе. 10—15 ф. Оранж. куст. р. **М. коммунисъ** (*M. communis*, обыкновенный). *Мурт*. Ю. Европа. Цв. бѣлые, въ іюль; лл. овальные или ланцетовидные. 3—10 ф. Оранж. Имѣетъ нѣсколько разновидностей, различающихся очертаніемъ лл., есть тоже пестролистная форма. **М. Люма** (*M. Luma*, Люма). Чили. Цв. бѣлые, по 3 или 4, лѣтомъ; лл. широко-овальные, остроколючные. 2 ф. и выше. Оранж. куст. Сип. *Эугения апикулата*, *Э. Люма* (*Eugenia apiculata*, *E. Luma*). **М. Угни** (*M. Ugni*, Угни). Валлинія. Цв. бѣлые, въ маѣ, плоды красные или черные съ хорошимъ запахомъ и вкусомъ; лл. овальные, остроколючные. 4 ф. Оранж. куст. Сип. *Эугения Угни* (*Eugenia Ugni*).

**МИРЦІЯ** (*Myrcia*). Одно изъ именъ Венеры. С. миртовыхъ. (500). Троп. Америка. Тепл. куст. и дрв. рр. Песков. торф. съ волокн. глин. дерн. Черенками изъ молодого окрѣшаго внизу роста, въ пескѣ, въ умѣр. парникѣ.

**М. амplexикаулисъ** (*M. amplexicaulis*, съ лл. охватывающими стебель). Рио де Жанейро. Цв. бѣлые, пучками. 5 ф. Очень красивый кустъ.



**МИТЕЛЯ (Mitella).** Уменьшенное *mitra*, — колпачек, по молодым плодикам. С. камнеломковых. (5). С. Америка и С.-В. Азия. Выносл. многол. трав. пр. Легкая, торф. Длениемъ.

**М. пентадра (M. pentandra,** съ пятью тычинками). Цв. желтоватые, въ маѣ. 6 д. Спн. *Drummondia mitellioides* (Drummondia mitellioides).

**МИТРАРИЯ (Mitraria).** *Mitra* — шапка, по плодику. С. геснериальных. (1). Хилос. Оранже. куст. р. Волоки. торф. съ пескомъ. Длениемъ корной весной, или черенками весной и лѣтомъ въ песокъ, подъ стекломъ.

**М. кокцинея (M. coccinea,** шарлаховая). Цв. ярко-шарлаховые, въ маѣ до іюля. Р. цѣльное, лазящее.

**МИТРИОСТИГМА (Mitriostigma).** *Mitra* — шапка и *stigma* — рыльце, по формѣ послѣдняго. С. мареновыхъ. (2). М. Д. Н. и Фернандо По. Тепл. куст. пр. Уходъ какъ за Гарденіей, съ кот. сходны.

**М. аксиллярная (M. axillaris,** съ цв. изъ угловъ лл.). Наталь. Цв. бѣлые, душистые, весной. 5 ф.

**МИТЧЕЛЛЯ (Mitchella).** *Mitchell* (Mitchell) — виргинскій ботаникъ, кор. Линнея, † 1768. С. мареновыхъ. (2). С. Америка, Японія. Ползучія трав. пр. Длениемъ корней. Глин. дер. съ пескомъ и листвою.

**М. репенсъ (M. repens,** ползучая). С. Америка. Цв. бѣлые съ пурпуровымъ отливомъ, душистые, лѣтомъ; лл. мелкіе, округлые, иногда пестрые.

**МИХЕЛИЯ. См. Микелия.**

**МИХОКСИЯ. См. Мишоксия.**

**МИШОКСИЯ (Michauxia).** Андре Мишо (Michaux) — франц. ботаникъ. † 1802. С. колокольчиковыхъ. (4) Выносл. или полз. древ. пр. съ Востока. Обыкн. сад. Пр. эти не вымерзаютъ, а вымокаютъ, поэтому водосток — главное условіе успѣха.

**М. левигата (M. laevigata,** гладкая). С. Персія. Цв. бѣлые по всему стеблю, въ августъ. Лл. по обѣмъ поверхностямъ съ жесткими полосками. 11 ф. При самомъ легкомъ пораненіи р. выпускаетъ много млечнаго сока.

**МИОЗОТИДИУМЪ (Myosotidium).** *Myosotis* и *eidos* — схожий, цвѣты похожи на цв. Миозотисъ. С. буравчиковыхъ. (1) Полувыш. многол. трав. р., трудно воспитуемое, п. ч. не терпитъ тревоженія корня; лучше держать постоянно въ оранжереѣ.

**М. нобиле (M. nobile,** благородный). Чатамскіе о. Цв. бѣлые съ голубою серединою, шир. въ 1/2 д., густыми кистями, весной. 1 1/2 ф.

**МИОЗОТИСЪ (Myosotis).** Название заимствованное у Diosкорида и произведенное отъ *mys*, *mys* — мышъ и *ous*, *otos* — ухо; по сходству вѣроятно лл. С. буравчиковыхъ. (40). Умѣр. страны С. и Ю. полушарій и Австралія. Важная. Съменами, длениемъ корней весной или черенками, лѣтомъ, подъ стекломъ.

**М. альпестрисъ (M. alpestris,** альпійскій). Европейскія горы. Цв. голубые съ маленькимъ желтымъ глазомъ, лѣтомъ; многол., 2—4 д. **М. азорика (azorica,** азорская). Азорскіе о. Цв. пурпуровые, иногда голубые, съ желтымъ глазомъ, лѣтомъ 6—10 д. Походитъ на альпестрисъ, но цв. крупнѣе. **М. диссидиформъ (M. dissitiflora)** (M. palustris, болотный). *Незабудка настольная*. Европа. Цв. голубые съ желтымъ глазомъ, весной. 6—12 д. Многол. **М. силвѣтика (M. sylvatica,** лѣсной). Европа. Цв. голубые съ желтымъ глазомъ, весной. 1—2. Дву- и многол. Имѣетъ много разновидностей.

**МИОПОРУМЪ (Myoporum).** *Myo* — закрывать и *poros* — скважина, по прозрачнымъ точкамъ у лл. С. мышелѣбниковыхъ. (20). Австралія, Нов. Зеландія, о. Маскаренскіе, Малайскаго архипелага и Тихаго океана, Китай, Японія. Глин. дер. съ торф. и пескомъ. Черенками изъ молодого роста, въ апрѣлѣ, въ песокъ, подъ стекломъ.

**М. сerratумъ (M. serratum,** пилообразно-зубчатый). Австралія. Цв. бѣлые и пурпуровые, въ маѣ. 2 ф. И цвѣты и лл. очень измѣнчивы.

**МЛЕКОСЛѢДНИКОВЫЯ** пр. (combretacea). Довольно многочисл. сем. древ. и кустарн., часто выходящихъ породъ, распространенныхъ по 240 видамъ. Наибольше извѣстные роды: Квинсквантъ, Комбрегумъ и Терминалія.

**МЛЕЧНЫЯ** пр. **МЛЕЧНЫЕ СОСУДЫ.** Содержащіе млечный сокъ, молочко.

**МОНОБРАЧІЕ.** Классъ пр. имѣющихъ и союзыне (съ плодиками и тычинками), и розничные цвѣты.

**МОНОЛѢТНЕЕ** р. Живущее нѣсколько лѣтъ сразу.

**МОГИЛЬНАЯ ТРАВА.** См. Вилка.

**МОЖЖЕВѢЛНИКЪ ОБЫКНОВЕННЫЙ И КАЗАЧІЙ.** См. Юнперусъ.

**МОЗОЛЬ. ПЯТКА.** Напльвъ, калюсъ у черенка передъ выростаніемъ корней.

**МОЗАИЧНОЕ САДОВОДСТВО (mosaiculture).** Узорчатое насажденіе.

**МОКРИЦА (Oniscus).** Ракообразное животное овальной, сверху выпуклой формы, избирающее для житія сырпы и темныя мѣста. Онѣ уничтожаютъ молодые всходы и молодые или цѣльные корни пр.

**МОЛИНИЯ (Molinia).** *Моллина* (Molinia) — писавшій о чилийскихъ пр. С. злаковъ. (1). Выносл. многол. р. способное расти въ такихъ влажныхъ мѣстахъ, на кот. другого злака посадить нельзя.

**М. пѣрулея (M. coccinea,** сизая). Европа. Колоски красноватые, фіолетово-пурпуровые или зеленые, въ іюль—августъ. 1—3 ф. Есть пестролистная разновидность.

**МОЛОДІЛЬ. См. Седумъ.**

**МОЛОПОСПЕРМУМЪ (Molopospermum).** *Molops* — полоса и *sperma* — сѣмя; по полосатымъ плодамъ С. зонтичныхъ. (1). Горы Ю. и Ср. Европы. Выносл. трав. мол. пр., напоминающія папоротники. Глубокая глин. дерн. съ пескомъ. Съменами и длениемъ.

**М. цикутаріумъ (M. cicutarium,** похожий на Цикуту). Цв. желтоватые, большимъ зонтикомъ, въ маѣ; лл. многосложные; стебли пустые, въ 3—5 ф. вышиной.

**МОЛОТІТЬ.** Выбивать, отдѣлять сѣмена.

**МОЛОТОЧНИКЪ. См. Аира.**

**МОЛОЧАЙ. МОЛОЧКА. См. Эвфорбія.**

**МОЛОЧАЙНЫЯ** пр. (euphorbiaeae). Очень обширное семейство древесныхъ, кустарныхъ или травянистыхъ растений, обычно содержащихъ млечный сокъ. Распространены повсюду за исключеніемъ арктическихъ климатовъ. Изъ родовъ наиболее извѣстны: Ридицусъ, Филлянтусъ, Эвфорбія и Ятрофа. Всѣхъ родовъ около 200, а видовъ 3,000.

**МОЛОЧКО.** Цвѣтной, густоватый сокъ въ корню, стеблѣ и листьяхъ нѣкоторыхъ растений.

**МОЛУЩЕЦЕЛЛЯ (Moluccella).** Уменьшительное *Molucca*, на одномъ изъ остр. этого имени полагали дико растеть одинъ изъ видовъ. С. губоцвѣтныхъ. (2). Средиземн. побережье. Полувыш. однол. пр. Песков. глин. дерн. Съменами въ парникѣ.

**М. лѣвисъ (M. laevis,** гладкая). *Лимонная трава*. Ю. Россія. Цв. бѣлые, въ августѣ. 1 ф.

**МОЛЬТКІЯ (Moltkia).** Графъ Гадке *Мольтке* (Moltke) — основатель музея естественной исторіи въ Копенгагенѣ, † 1818. С. буравчиковыхъ. (7). Ю. Европа, В. и З. Азія. Оранжер. или полувыносл. многол. трав. пр. Уходъ какъ за Оносма.

**М. пѣтрѣя (M. petraea,** каменитая). Далмація. Цв. вначалѣ малиновато-пурпуровые, потомъ сине-фіолетовые, въ іюнѣ. Оранже. 6—8 д.

**МОМОРДИКА (Momordica).** Отъ *mordeo* — кусать; сѣмена какъ бы нагрызенныя. С. тыквенныхъ. (26). Африка. Однол. или многол. выходящая тепл. трав. пр. Сильная. Съменами, весной.

**М. Харанція (M. Charantia,** Папаріи. Индія. Малайск. полуо., Китай, Троп. Азія. Цв. желтые, въ іюнѣ. Плоды продолговатые, угловатые, красно-мѣдные или красные, раскрывающіеся по созрѣваніи вверху.

**МОНАНТЕСЪ (Monanthes).** *Monos* — одинъ и *anthos* — цвѣтокъ. С. толстянковыхъ. (3). Канарскіе о., Марокко. Оранже. многол. трав. пр. Уходъ какъ за Крассули.

**М. атлантика (M. atlantica,** съ горъ Атласа). Атласъ. Цв. золотисто-желтые, въ апрѣлѣ.

**МОНАРДА (Monarda).** *Н. Монарда* или *Монардесъ* (Monarda, Monardes) — врачъ и ботаникъ въ Севильѣ, † 1588. С. губоцвѣтныхъ. (7). С. Америка. Выносл. орнам. травяни. мног. пр. Глин. дер. съ торф. Длениемъ корней осенью. Въ мас-сѣ — красивѣе, чѣмъ одиночно.

**М. дидима (M. didyma,** двойная). Цв. красно-шарлаховые, съ іюля до сентяб. 1 1/2 ф. Спн. *М. Кальмиана* (M. Kalmiana). **М. фистулоза (M. fistulosa,** свищевая). Цв. пурпуровые, не столь многочисленные, какъ у М. дидима, лѣтомъ. Стебли пустые. 2 ф.

**МОНАРДѢЛЛЯ (Monardella).** Уменьшительное Monarda. С. губоцвѣтныхъ. (11). С.-З. Америка. Выносл. одно и многол. ароматическія трав. пр., воспитуемая такъ же, какъ Монарда, съ которою они имѣютъ большое сходство.

**М. кандикансъ (M. candicans,** бѣловатая). Цв. бѣлые. 1 ф. Однол. **М. макранта (M. macrantha,** крупноцвѣтная). Цв. шарлаховые, осенью. Многол.

**МОНЕЗЕСЪ (Moneses).** *Monos* — одинъ и *esis* — прелестъ; по красивымъ одиночнымъ цв. С. вересковыхъ. (1). С. и сред. Европа, С. Америка, Японія. Выносл. безстеб. трав. р. Уходъ какъ за Пиролой.

**М. унифлора (M. uniflora,** одноцвѣтный). *Клистѣйка*. Цв. бѣлые или малиновы, въ іюнѣ. Спн. *Пиролья унифлора* (Pyrola uniflora).

**МОННИНА (Monnina).** *Моннина графъ де Флора Бланка* (Monina de Flora Blanca) испанскій покровитель ботаники. С. истоковыхъ. (50). З. Америка. Оранже. трав. или куст. пр. Воспитуаются какъ Полигала.



**М. obtusifolia** (М. obtusifolia, туполистная). Перу. Цв. красно-пурпуровые, въ июнь 12 ф. Куст. р.

**МОНОДОРА (Monodora).** *Monos*—одинъ и *dora*—кожа, — плодъ одногнѣздный. С. аионовыхъ. (3). Троп. Африка. Тепл. древ. рр. Легкая песчанистая. Черенками изъ зрѣлаго роста въ песокъ, въ парникъ.

**М. миристика** (М. miristica, мушкатная). Цв. со вѣтхими лепестками ярко-желтыми съ пурпуровыми пятнами, внутренними бѣловатыми съ красно-малиновыми крапинками; плоды похожие на мушкатный орѣхъ.

**МОНОЛЕНА (Monolena).** *Monos*—одинъ и *olene*—рука, по отrostку отъ основанія пыльника. С. черноустовыхъ. (5). Перу, Нов. Гренада. Тепл. трав. рр. Песков. глин. дерн. съ торф. или листов. Влажный воздухъ. Дѣленіемъ или черенками изъ корневища въ парникъ.

**М. примулефлора** (М. primuleiflora, съ цв. какъ у Примулы). Колумбія. Цв. темно-малиновые, яркіе съ бѣлымъ глазкомъ, въ ноябрь. 6 д. Сил. *Bertolonia primuleiflora* (Bertolonia primuleiflora).

**МОНОЛОПИЯ (Monolopia).** *Monos*—одинъ и *loros*—покрывъ, по оберткѣ. С. сложногнѣздныхъ. (2). Калифорнія. Однолѣтн. трав. рр. Рыхлая, легкая. Сѣменами, весной.

**М. майоръ** (М. major, большая). Цв. желтые, въ июль. 2 ф.

**МОНОПАНАКСЪ (Monopanax).** *Monos*—одинъ и *Panax*; р. похожее на Панаксъ съ одногнѣзднымъ плодиномъ. (1). Мексика. Тепл. кустарникъ. Уходъ какъ за Аралія.

**М. Гизбрехтіи** (М. Ghiesbreghtii, Гизбрехта). Цв. зеленые, лл. ланцевидные, ярко-зеленые съ 4—7 листочками на отдѣльныхъ черешкахъ. Сил. *Aralia Ghiesbreghtii* (Aralia Ghiesbreghtii).

**МОНОТОКА (Monotoca).** *Monos*—одинъ и *tokos*—рожденіе. Плодъ содержитъ только одно сѣмя. С. эпакрисовыхъ. (6). В. и Ю. Австралія. Оранж. куст. рр. Уходъ какъ за Эпакрист.

**М. линейта** (М. lineata, полосатая). Высокій кустъ, лл. эллиптические, цв. бѣлые, мелкіе. 6 ф. **М. скопăriа** (М. scoparia, дроковая). Цв. бѣлые, съ мая до августа; лл. линейные. 5 ф. **М. эллиптика** (М. elliptica, эллиптическая). Цв. бѣлые, колосы стоячіе, съ мая до августа; лл. эллиптические. 8 ф.

**МОНОХЕТУМЪ (Monochaetum).** *Monos*—одинъ и *chaite*—щетинка; по связнику тычинокъ. С. черноустовыхъ. (23). Перу, Нов. Гренада, Венецула,

Мексика и Гватемала. Оранж. куст. или полукуст. рр. 2 ч. волокн. торф. и по одной части песков. глин. дерн. и листов.

**М. альеэтре** (М. alpestre, горный). Мексика. Цв. ярко-красные; плотное, вѣтвистое куст. р. **М. Хартвегіанумъ** (М. Hartwegianum, Хартвегия). Анды. Цв. ярко розовые, зимой. Ниакій кустъ. **М. Хумбольдтіанумъ** (М. Humboldtianum, Гумбольдовъ). Каракасъ. Цв. яркіе красно-пурпуровые, съ октября до декабря.

**МОНОХИЛЮСЪ (Monochilus).** *Monos*—одинъ и *cheilos*—губа, по устройству цвѣтка. С. вербеновыхъ. (1). Бразилія. Тепл. трав. р. Глин. дерн. съ торф. и пескомъ. Черенками, въ парникъ.

**М. глоксиниофилусъ** (М. gloxinifolius, съ лл. какъ у Глоксиніи). Цв. бѣлые, у вѣтчика трубка на верху скошенная, край очень косой.

**МОНОХОРИЯ (Monochoria).** *Monos*—одинъ и *chorizo*—раздѣлять; передняя тычинка отличная отъ остальныхъ пяти. С. понтедеріиныхъ. (6). Остиндія, Китай, Японія, Малайскій архипелагъ, тропич. Австралія и Африка. Теплич. водянныя трав. рр. Уходъ какъ за Понтедерія.

**М. вагиналисъ** (М. vaginalis, влагалищная). В. Азія. Цв. голубые, снаружи розовые, лѣтомъ. 2 ф. У разновидности *Korsakowii* (Korsakowii) цв. фиолетовые, крупные.

**МОНСОНІЯ (Monsonia).** Лэди Анна Монсонъ—корреспондентъ Линнея. С. гераниевыхъ. (12). С.-В. и Ю. Африка, троп. зап. Азія. Оранж. куст. рр. Песков. глин. дерн. съ небольшимъ количествомъ торф. и лист. Сѣменами въ парникъ, весной или черенками въ песокъ, подъ стекломъ, весной и осенью.

**М. спеціоза** (М. speciosa, отъиная). М. Д. Н. Цв. розовые съ пурпуровымъ глазкомъ, большіе, весной; лл. пятираздѣльные, раздѣлы двуперистые. 6 д. Полукуст.

**МОНСТЕРА (Monstera).** Происхожденіе названія Адалсономъ, его давнимъ, не объяснено. С. ароидеиныхъ. (12). Вестиндскіе о. и троп. Америка. Тепл. оранж. цѣпляющіяся рр. Сильная волокн. глин. дерн. съ волокн. торф. Темп. зимой 10—13, лѣтомъ 13—24°.

**М. делиціоза** (М. deliciosa, съ превосходными плодами). Мексика. Цв. желтоватые, лѣтомъ. Плоды сочные съ ананаснымъ вкусомъ. Лл. большіе, продырявленные. Сил. *Philodendron pertusum*, *Tornelia fragrans*.

**МОНТАНОА (Montanoa).** *Montano* (Montano)—мексиканскій политическій дѣятель. С. сложногнѣздныхъ. (14). С. Аме-

рика, Мексика, Колумбія. Оранж. кустарн. рр. Волокн. глин. дерн. Сѣменами въ умѣренномъ парникъ, весной, или черенками изъ корней осенью и изъ стеблей весной, въ парникъ.

**М. бипиннатифида** (М. bipinnatifida, двуперисторазсѣченная). Мексика Цв. голочки желтыя, лл. двуперисторазсѣченные. 6—8 ф. Сил. *М. хераклеифолия*, *Полиминія грандисъ*, *П. хераклеифолия* (М. heracleifolia, *Polymnia grandis*, *P. heracleifolia*).

**МОНТЕСУМА (Montezuma).** *Montezuma* (Montezuma)—мексиканскій императоръ въ XV стол. С. мальвовыхъ. (1). Мексика. Тепл. орнамент дерево. Песков. глин. дерн. съ торф. Черенками изъ довольно окрѣпшаго роста, въ песокъ и парникъ.

**М. спеціозиссима** (М. speciosissima, отъиная). Цв. шарлахово-пурпуровые, крупныя; лл. сердцевидные, остроколючные, 30 ф.

**МОНТРИХАРДІЯ.** См. Монришарія.

**МОНРИШАРІЯ (Montrichardia).** Габриэль Монришаръ (Montrichard)—ботаникъ на Тринидадѣ. С. ароидеиныхъ. (4). Тропич. Америка. Тепл. водянныя или болотныя рр. Сильная глин. дер. подъ водой или въ насыщенной парами атмосферѣ. Сѣменами или дѣленіемъ корневища.

**М. линифера** (М. linifera, дающая волокно). Багія. Цв. желто-зеленоватые, лл. стрѣловидно-сердцевидные. 3—18 ф.

**МОРАЛЬКИ.** См. Хеноподіумъ.

**МОРЕА (Mora).** *Р. Муръ* (Moore)—англійскій ботаникъ. С. косатиковыхъ. (40). М. Д. Н. Оранж. или полувыносл. луковичн. рр., схожія съ Ирисъ и пугающіяся въ такомъ же уходѣ.

**М. трикусписъ** (М. tricuspis, съ трехзубчатыми лепестками). Цв. бѣдно-зеленоватые съ пурпуровыми пятнами у основанія сегментовъ, въ маѣ. Сил. *Виусеузія трикусписъ* (Vieusseuxia tricuspis). **М. унгукулата** (М. unguiculata, ноготковая). Цв. бѣловатые съ красно-пурпуровыми пятнышками, въ июнь. 1 ф. Сил. *Виусеузія унгукулата* (Vieusseuxia unguiculata). **М. эдулисъ** (М. edulis, съѣдомая). Цв. фиолетовые, на наружныхъ сегментахъ у основанія желтое пятно, въ маѣ. 4 ф.

**МОРИКАНДІЯ (Moricandia).** *Морикандъ* (Moricaud)—италійскій ботаникъ, авторъ „Flora Veneta“, † 1854. С. крестоцвѣтныхъ. (5). Оранж. или полувыносл. одно- или двул. трав. рр. изъ Ю. Европы, С. Африки и З. Азіи. Всякая легкая. Сѣменами весной, въ парникъ.

**М. сонхифолия** (М. sonchifolia, съ лл. какъ у Сонхуса). Китай. Цв. сине-фиолетовые, очень красивые, въ апрѣль. Лл. ли-

ровидные, перисторазсѣченные, зубчатые, вѣтчатые. 1—2 ф. Однол.

**МОРИНА (Morina).** Луи Моренъ (Morin) французскій ботаникъ. С. ворсянковыхъ. (8). Сред. и З. Азія. Оранж. или полувыносл. многол. трав. рр., напоминающія Кардуусъ. Песков. глин. дерн. Дѣленіемъ корней тотчасъ послѣ дѣвленія.

**М. Коультеріана** (М. Coulteriana, Коультерова). Зап. Гималаи. Цв. головки бѣдно-желтыя; лл. узкіе, съ иглами по краямъ. 6—18 д. Полув. **М. лонгифолия** (М. longifolia, длиннолистная). Непаль. Цв. головки бѣлыя, потомъ малиновыя, въ июнь—июль; лл. въ 1 ф. длиной, перисто-разсѣченные, съ полными краями, усуженными иглами. 2 ф. Полувыносл.

**МОРИНГА (Moringa).** Малабарское мѣстное названіе. С. моринговыхъ. (3). С. Африка, З. Азія, Остиндія, Австралія. Тепл. деревья. Песков. глин. дерн. съ торф. Черенками изъ полузрѣлаго роста, въ песокъ, въ парникъ.

**М. алтера** (М. altera, безкрылая). Верх. Египеть, Сирія, Аравія. Цв. бѣдно-желтые; лл. длиною въ 1 ф. **М. птеригосперма** (М. pterigosperma, съ крылатыми сѣменами). Индія. Цв. бѣдно-желтые, лл. почти перистые. 20 ф. Молодые корни употребляются въ Индіи взаимно хрына.

**МОРИНДА (Morinda).** *Morus*—шелковица и *indica*—индійская. С. мареновыхъ. (40). Троп. страны. Тепл. куст. и древ. рр. Уходъ какъ за Хамелія.

**М. ясминойдесъ** (М. jasminoides, похожая на Жасминъ). Австралія. Цв. тускло-оранжевые, въ апрѣль; лл. ланцетовидные или эллиптические.

**МОРИСОНІЯ (Morisonia).** *Р. Морисонъ* (R. Morison)—проф. ботаники въ Оксфордѣ, † 1683. С. канперсовыхъ. (4). Вестиндія, троп. Ю. Америка. Тепл. деревья. Глин. дерн. съ торф. и пескомъ. Черенками весной изъ зрѣлаго роста, въ песокъ, въ парникъ.

**М. американа** (М. americana, американская). Вестиндія. Цв. бѣлые. Вѣтви съ наростами. 15 ф.

**МОРИЯ (Moria).** Даниель Моръ (Mohr)—нѣмецкій ботаникъ, † 1808. С. папоротниковыхъ. (1). Оранж. папоротникъ съ пріятнымъ запахомъ. Полезное р. для вардовскихъ яшниковъ (террариумовъ). Торф. съ пескомъ и кусками известняковаго камня.

**М. кафеорорумъ** (М. saffrorum, кафровъ). М. Д. Н. Валъ въ 6 до 18 д. длиной и въ 2—4 д. шир., трехперистыя. Сил. *М. турифрага* (М. thurifraga).

**МОРКОВЬ.** См. Даукусъ.

**МОРМОДЕСЪ (Mormodes).** *Мор-*



то—домовой бѣсъ; по странному образованію цв. С. орхидей. (14). Колумбія и сред. Америка до Мексики. Тепл. орхидей. Уходъ какъ за Катасетумъ.

**М. атропурпуреумъ** (M. atropurpureum, черно-красный). Панама. Цв. темно-пурпуровые, въ октябрь 1 ф. **М. Оканѣ** (M. Osanae, Окана). Колумбія. Цв. оранжевые, съ красно-коричневыми крапинками, въ октябрь. **М. пардинумъ** (M. paradinum, леопардовый). Мексика. Цв. ярко-желтые съ коричневыми пятнышками, въ июль.

**МОРОЗЪ.** Охлажденіе воздуха начинающій съ той степени, когда замерзаетъ стоячая вода. Онъ дѣйствуетъ на растеніе сверху внизъ, къ землѣ, отсюда польза защиты чѣмъ-нибудь худо проводящимъ теплоту и уменьшающимъ лучистое ея отдѣленіе. Вліяніе мороза не всегда соответствуетъ степени холода: при возбужденіи растенія къ росту теплой погодой, весной, внезапный морозъ въ нѣсколько градусоу дѣйствуетъ несравненно губительнѣе, чѣмъ сильный холодъ при состояніи растенія въ покоѣ. Морозъ вліяетъ сильнѣе на влажное; быстрый переходъ отъ мороза къ теплу отъ солнца или искусственному, приноситъ также чувствительный вредъ. Совѣтуемое опрыскиваніе водою тронутыхъ морозомъ растеній, такъ наз. отливаніе, для иѣжнихъ растеній положительно вредно, п. ч. вода, которою опрыскивается, теплѣе и потому производитъ тоже дѣйствіе, что и быстрый переходъ отъ холода. Морозъ благотворно вліяетъ на открытую для его дѣйствія землю, — разрушая и дѣлая ее годною для растеній.

**МОРОНОБЕА** (Moronobea). *Moronobea* или *Coronoba*—мѣстное названіе въ Гватѣ. С. гуммигутахъ. (1). Тепл. дерев. р. Песк. глин. дерн. и небольшое кол. лиственной. Черенками изъ взрѣваго роста, не обрѣзавъ листьевъ, въ песокъ, въ парникъ.

**М. кокцинеа** (M. coccinea, шарлаховая). Гватѣ. Цв. шарлаховые, крупнее, въ маѣ. 40 ф. Сокъ, твердый на воздухъ, даетъ смолу, употребляемую въ медицинѣ.

**МОРОШКА.** См. Рубусъ.

**МОРУСЪ** (Morus). Старинное латинское названіе: С. крапивныхъ. (12). Умѣр. страны сѣв. полушарія и возвышенности въ тропическихъ. Древ. и куст. р. выносливы въ умѣр. климатѣ. Глубокая песчан. или мѣловая. Сѣменами и черенками.

**М. альба** (M. alba, бѣлый). *Шелковица бѣлая. Тутовникъ бѣлый.* Азія. Натурализованъ въ разн. странахъ. Цв. зеленоватые, въ маѣ; плоды бѣлые или свѣтло-розовые, взрѣвающие въ августъ—сентябрь;

л. сердцевидные, зубчатые. 20—30 ф. Имѣетъ много разновидностей. Листъ употребляется для кормленія шелкоичного червя. **М. нѣгра** (M. nigra, черный). *Шелковица черная. Тутовникъ черный.* Востокъ. Цв. зеленоватые, въ июль; плоды продолговатые, черные, созрѣвающие въ августъ; л. сердцевидные, съ началомъ раздѣленія на лопасти, зубчатые. 20—30 ф. Разводится преимущественно для плода. **М. рубра** (M. rubra, красный). С.-Ам. Соед. Шт. Цв. зеленоватые въ июль; плоды красные, поспѣвающие въ сентябрь; л. сердцевидно-удлиненные, трехлопастные, зубчатые, нижняя сторона нѣсколько пушистая. 40—70 ф.

**МОРИЦИННИКОВЫЯ** (olacineae). Куст. или дерев., рѣдко полукуст. рр. тропическихъ странъ. Въ сем. 36 родовъ изъ 170 видовъ. Наибольше извѣстны роды: Иканина, Оляксъ и Хейстерія.

**МОТЫЛЬКОМЫЯ** pp. (papilionaceae). Отдѣлъ сем. бобовыхъ, содержащій до 4700 видовъ, принадлежащихъ къ 295 родамъ и распространенныхъ преим. по умѣренному климату сѣв. полушарія.

**МОХЪ.** Безцвѣтковое растеніе, близкое къ Ягелямъ. См. Мхи.

**МОЧАЛА.** Липовый лубъ, размоченный и разорванный на волокна.

**МОЧКА.** Нить, волокно. Мелкіе корни. **МОЧКОВАТЫЙ КОРЕНЬ.** Состоящій изъ мелкихъ волокистыхъ корней.

**МОХНОНОГЪ.** См. Стахисъ.

**МОШАРІА** (Moscharia). *Moschos*—мускусъ, по запаху. С. сложноцвѣтныхъ. (1). Чили. Однол. обикнов. Сѣменами весной, въ парникъ, потомъ высадить на воздухъ, въ маѣ—июль.

**М. пиннатифида** (M. pinnatifida, перисто-разсѣченная). Чили. Цв. головки бѣлыя, въ июль. 6 д.

**МУЖСКОЙ ЦВѢТОКЪ.** Содержащій только тычинки.

**МУЗА** (Musa). Антоній *Муза* (Musa)—врачъ Августа. С. иббирныхъ. (18). Троп. страны. Тепл. трав. рр. Глин. дерн. съ перегноемъ. Сѣменами, весной, въ теплицѣ и отпрысками. Темп. зимой 10—13, лѣтомъ 13—26°.

**М. Кавендишии** (M. Cavendishii, Кавендиша). Китай. Л. темно-зеленые, продолговатые, длиною въ 2—3 ф., шир. въ 1—2 ф. Выш. р. 5—6 ф. Нуждается въ меньшемъ противу другихъ теплѣ. **М. кокцинеа** (M. coccinea, шарлаховая). Коккинина. У цвѣтрасположенія шарлаховые чехлы съ желтыми кончиками. Л. продолговатые, длин. 3 ф., шир. 6 д., темнозеленые. 4 ф. Очень орнаментальное р. **М. сапентумъ** (M. sapientum, древо позна-

нія добра и зла). *Бананъ.* Л. темно-зеленые, продолговатые, 8—10 ф. длиною, 1 ф. шир. Выш. 20 ф. Растетъ подъ тропиками, имѣетъ много разновидностей, которые отличаются и плодами, составляющими громадное значеніе въ пищу мѣстныхъ жителей. У разновидности *vittata* (vittata) л. съ бѣлыми полосками и пятнами. **М. суматрана** (M. sumatrana, съ о. Суматры). Суматра. Л. продолговато-ланцетовидные, остроконечные, сизоватые, съ поперечными, продолговатыми каштановыми пятнами. **М. суперба** (M. superba, превосходная). Индія. Стволъ у основанія раздутый. 14 ф. Р. очень красивое, похожее на **М. Энсете**, но болѣе плотное. **М. Энсете** (M. Ensete, Энсете). Абиссинія. Л. продолговатые, почти прямостоящие, длин. 16, шир. 4 ф. съ широкою, толстою, красно-карминовою среднею жилкой. Стволъ иногда толще 3 ф. въ поперечникѣ, а вышиной отъ 13 до 20 ф. Наибольше выносливый видъ.

**МУКІЯ** (Mukia). Названіе индѣйское мѣстное. С. тыквенныхъ. (2). Азія, Африка и троп. Австралія. Тепл. вьющ. трав. рр. Уходъ какъ за Момордикой.

**М. скабрелля** (M. scabrella, жестковатая). Индія. Цв. желтые, мелкіе; л. съ ухватками.

**МУКУНА** (Mucuna). Названіе мѣстное бразильское. С. бобовыхъ. (22). Троп. Азія, Америка и Африка. О. Фиджи. Тепл. вьющіяся или прямо-рослые кустарники. Глин. дерн. Черенками изъ полузрѣлаго роста, въ парникъ, или сѣменами.

**М. имбриката** (M. imbricata, настельная). Индія. Цв. большіе: флагъ отъ бѣлаго до пурпуроваго, крылья темно-пурпуровые.

**МУНДІЯ** (Mundtia). Генрихъ *Мундтъ* (Mundt)—нѣм. ботаникъ XVII ст. С. истоковыхъ. (1). М. Д. Н. Оранж. колочій куст. Песк. торф. Черенками изъ молодого роста въ маѣ, въ песокъ, въ холод. парникъ.

**М. спинова** (M. spinosa, колочая). М. Д. Н. Цв. бѣлые съ красной лядей, маленькіе, съ января по май. 2 ф.

**МУНТИНГІЯ** (Muntingia). Абраамъ *Мунтингъ*—бывш. проф. въ Гренингенѣ, † 1683. С. липовыхъ. (1). Троп. Америка. Теплич. куст. р. Песк. глин. дерн. съ листов. Черенками изъ полузрѣлаго роста, въ песокъ, въ парникъ.

**М. Калабѣра** (M. Calabura, Калабѣра). Цв. бѣлые, въ июль. 12—25 ф.

**МУРАЛЬТІЯ** (Muraltia). Фонтъ *Муральтъ* (Muralt)—швейцарскій ботаникъ, † 1733. С. истоковыхъ. (50). Ю. Африка. Оранж. куст. или полукуст. рр. Торф. съ большимъ колич. песку. Черенками изъ

короткаго молодого роста, въ песокъ, торф., подъ стекломъ.

**М. Хейстерія** (M. Heisteria, Хейстера). Цв. пурпуровые, мелкіе, въ январѣ. 2—3 ф.

**МУРАВѢЙ. МУРАШЪ.** Насѣкомое часто приносящее вредъ растеніямъ.

**МУРАВЛЕННЫЙ.** Поливной, покрытый стекловатою глазурью. Муравленные горшки не полезны, потому что не имѣютъ свѣжести.

**МУРРАЙЯ** (Murraya). *Муррай* (Murray)—шведскій ботаникъ, † 1791. С. рутовыхъ. (4). Троп. Азія, троп. и Запад. Австралія. Тепл. дерев. или куст. рр. Глин. дерн. съ торф. Черенками изъ зрѣлаго роста не отрѣзая л., въ песокъ, въ парникъ.

**М. экзотика** (M. exotica, чужеземная). Индія. Цв. бѣлые, душистые, въ августъ. 10 ф.

**МУСАТЬ.** Стальная полоса, округлая или граненая для точенія ножей, пожницъ и т. п.

**МУСКАРИ** (Muscari). *Moschus*—мускусъ, по запаху цв. С. лилейныхъ. (40). Европа, С. Африка, 3. Азія. Выносливы, рр. Довольствуются всякою землею, но любятъ сильную. Сѣменами и отпрысками, для полученія кот. нужно вынимать луковицы осенью черезъ годъ, если отпрысковъ не нужно—луковицы остаются не трогая болѣе продолжительное время. Полезно въ этомъ случаѣ поверхностное удобреніе.

**М. ботриоидесъ** (M. botryoides, скученный). Европа. Цв. темно-синіе съ 6 зубчиками, весной. 6—12 д. Имѣетъ нѣсколько разновидностей, по окраскѣ цв., между прочимъ **М. монстрозумъ** (M. monstrosus) съ цв. сине-фіолетовыми, расположенными на развѣтвленной стрѣлкѣ, ранней весной. 1 ф. **М. мошатумъ** (M. moschatum, мускусный). Малая Азія. Цв. сначала пурпуровые, потомъ желто-зеленоватые съ фіолетовымъ оттыкомъ, душистые, весной. 8—10 д. **М. неглектумъ** (M. neglectum, пренебреженный). Франція, Італія. Цв. темно-синіе, душистые, густою кистью. 6—9 д. **М. парадоксумъ** (M. paradoxum, необычный). Кавказъ. Цв. черно-синіе, внутри зеленые, съ запахомъ, въ апрѣль—маѣ. **М. рацемозумъ** (M. racemosum, вѣтвистый). *Кукушинна.* Европа, Азія. Цв. темно-голубые, мелкіе, мѣняющіеся въ красно-пурпуровые, иногда съ бѣлыми кончиками, пахнущъ сливами; весной. 4—8 д. **М. Хельдрейхи** (M. Heldreichii, Хельдрейха). Греція. Цв. голубые, похожіе на цв. М. ботриоидесъ, но вдвое крупнѣе, длинной кистью, весной. 8 д. **М. Шовицианумъ** (M. Szovitzianum, Шовица). Персія, Кавказъ. Цв.



голубые, пахучие, въ апрѣлѣ. Луковица дов. большая. **М. Эльвесіи** (*M. Elwesii*, Эльвеса). Карія. Цв. голубые, густой кистью, въ апрѣлѣ. Стрѣлка внизу красная. 3—4 д.

**МУССЕНДА** (*Mussenda*). Мѣстное названіе на о. Цейлонѣ. *S. мареновхъ*. (40). Троп. Африка, Азія и о. Тихаго океана. Тепл. или оранж. куст. и полукуст. рр. Глин. дерн. пополамъ съ листов. и съ добавленіемъ песку. Черенками въ маѣ или іюнѣ, въ пескѣ, въ парникѣ.

**М. лутеола** (*M. luteola*, желтая). Троп. Африка. Цв. ярко-желтые съ оранжевою серединой, осенью и зимой. 5—6 ф. Оранж. куст.

**МУСЧИЯ** (*Muschia*). *Мусис* (*Musche*)—быв. директоръ бот. сада въ Гентѣ. *S. колокольчиковыхъ*. (2). Мадера. Оранж. многол. трав. рр. Волокн. глин. дерн. Сѣменами въ умѣр. парникѣ.

**М. aurea** (*M. aurea*, золотистая). Цв. золотисто-желтые, лѣтомъ. 1—2 ф. Сип. *Кампанула aurea* (*Campanula aurea*).

**МУТИЗИЯ** (*Mutisia*). *Мутисъ* (*Mutis*)—ю.-американскій ботаникъ. *S. сложноцвѣтныхъ*. (36). Анды и вѣтроп. Ю. Америка. Тепл. и оранж. вьющаяся кустар. рр. Сильная плотная глин. дерн. Черенками, въ маѣ, изъ полурѣзлаго роста въ пескѣ, въ умѣр. парникѣ.

**М. декурренсъ** (*M. decurrens*, съ свѣгающими лл.). Чилийскія Анды. Цв. гол. темно-оранжевые, въ іюнѣ до августа; лл. имѣютъ ухватки.

**МУТОВКА**. Кольцеобразное и лучистое расположеніе побѣговъ на стеблѣ, въ видѣ мутовки. Развѣтвленіе на нѣсколько вѣтвочекъ.

**МУХОЛОВКА**. См. Діонеа.

**МУШКАТНИКОВЫЯ** рр. (*myrtaceae*). Сем. древ. и куст. рр. изъ троп. Азіи и Америки, частію изъ Африки, Австраліи и съ Мадагаскара. Состоятъ только изъ одного рода *Миристика*, въ которомъ числится до 18 видовъ.

**МУШКАТНЫЙ ОРЪШНИКЪ**. См. *Миристика*.

**МУШМУЛА**. См. Амеланшье, Кратегусъ и Мениплюсъ.

**МХИ** (*musci*). Тайноцвѣтныя раст. съ листьями и стеблями, дающими корневыя волоски; сѣмечки-споры находятся въ урочкахъ, обычно подпертыхъ и покрытыхъ крышечкой и колпачкомъ; по краю устья различаютъ роды и виды. Въ садахъ мохъ употребляется для сохраненія влажности вокругъ рр.; для этого служатъ мохъ торфяной, — *торфяникъ* (*Sphagnum*), замѣчательный способностью вбирать влажность. Мохъ растущій на деревьяхъ,

дорожкахъ, на газонѣ и вреденъ и непріятенъ. На дорожкахъ уничтожается поливкою растворомъ мѣднаго купороса на газонѣ—известью; во всякомъ случаѣ появленіе его доказываетъ дурной водосточный слой. На деревьяхъ мохъ уничтожается счищеніемъ его послѣ дождя и обмывкою жидкимъ мыломъ и известью, жесткою щеткою.

**МЦЕНСКОЕ** яблоко. Ранній сортъ среднихъ размѣровъ, продолговатой формы, съ красною росписью и весьма сладкою мякотью.

**МЫЛО**. Соединеніе жира со щелочью. Жидкое или зеленое мыло, одно или въ смѣси съ табачнымъ настоемъ и щелокомъ, составляютъ средство отъ животныхъ паразитовъ на растеніяхъ.

**МЫЛОДЕННИКОВЫЯ** рр. (*sapindaceae*). Деревья, кустарники, полукустарники, рѣдко травы, встрѣчаемые по всей поверхности земного шара, но преимущественно въ тропическихъ поясахъ. Въ этомъ семействѣ 74 рода и до 700 видовъ. Аперъ, Додонеа, Меліантусъ, Сипиндусъ и Стафилея.

**МЫЛЬНЯНКА**. См. Сапонарія.

**МЫШЕХЛѢВНИКОВЫЯ** рр. (*muroripinae*). Состоятъ изъ кустар., рѣдко древ. рр., преимущ. изъ Австраліи и съ остр. Южнаго океана, нѣсколько видовъ встрѣчается въ Китаѣ, Японіи и въ В. Индіи. Родовъ 5, видовъ 80. Примѣры родовъ *Міонорумъ* и *Офтія*.

**МЫШИ**. Порода мелкихъ грушъ.

**МЫЛОВЫЯ** рр. Пронзающаяся на мѣловой, известковой почвѣ. *Мыловія земля*—содержащая въ большомъ количествѣ известъ.

**МѢСТНОЕ** р. То, которое встрѣчается въ определенной мѣстности,—эндемическое.

**МѢСТО**. Пространство требуемое для растенія, квадратная площадь, необходимая для успѣшнаго развитія. Чѣмъ растенія больше и шире, тѣмъ разстояніе между ними должно быть больше. Вообще необходимо, чтобы вѣтви вполне развитыхъ растеній не касались между собою, не отнимали бы свѣта и воздуха, необходимыхъ для роста и созрѣванія плодовъ.

**МѢСЯЦЪ**. Дѣнадцатая часть года. При расчетѣ продовольствія считается состоящимъ изъ 30 дней.

**МѢСЯЧНЫЙ**. Возобновляющійся ежемесячно,—мѣсячные розы.

**МЪШЕЧКОВЫЯ** рр. (*burseraceae*). Деревья и кустарники съ обильнымъ смолистымъ сокомъ, супротивными сложными листьями съ бѣловатыми точками, и съ

угловыми или макушечными цвѣточными пучками. Плодъ иногда похожій на ягоду, не раскрывающійся. Сюда причисляются роды *Амристъ*, *Бальзамодендронъ*, *Босвеллія*, *Бурсера* и *Канаріумъ*.

**МЭРИЯ** (*Mairia*) Гентскій проф. *Лемэръ* (*Le Maire*)—собранный это р. на М. Д. Н. С. сложноцвѣтныхъ. (10). Оранж. и полувыв. трав., либо полукуст. рр. изъ Ю. Африки. Глин. дерн. съ торф. Дѣленіемъ весной, или сѣменами въ парникѣ.

**М крената** (*M. crenata*, круглозубчатая). Цв. головки съ ярко-пурпуровыми лучами и желтымъ дискомъ, въ апрѣлѣ. Р. бѣсстебельное, оранжер.

**МЮЛЕНБЕКІЯ** (*Muehlenbeckia*). *Мюленбекъ* (*Muehlenbeck*)—швейцарскій врачъ, † 1845. С. гречисныхъ (15). Австралія, Нов. Зеландія, о. Тихаго ок., вѣт.-троп. Юж. Америка или Анды. Оранж., часто вьющаяся кустарная или полукуст. рр. Песков. гл. дер. Черенками, весной, въ пескѣ, въ парникѣ.

**М. адресса** (*M. addressa*, прижатая). Австралія. Цв. малиновые, мелкіе; большой вьющейся, листовитной оранж. кустъ. Сип. *Полигонумъ адрессумъ* (*Polygonum addressum*). **М. комплексъ** (*M. complexa*, объемлющая). Нов. Зеландія. Цв. зеленые, не замѣчат., въ августѣ. Плодъ прозрачный, какъ-бы изъ воску, зубчики блестятъ какъ льдинки. Выпослившій изъ всѣхъ видовъ. **М. платиклада** (*M. platyclada*, съ плоскими вѣтвями). Соломоновы о. Цв. бѣлые, почти круглый годъ. Ягоды красныя, почти черно-пурпуровыя. Вѣтви почти безъ лл. Сип. *Кокколба платиклада* (*Coccoloba platyclada*).

**МЮЛЛЕРА** (*Muelleria*). Отто Фридрихъ *Мюллеръ* (*Mueller*)—датскій ботаникъ, одинъ изъ издателей "Flora danica", † 1784. С. бобовыхъ. (2). Троп. Ю. Америка, жаркія части Мексики. Тепл. куст. рр. Уходъ какъ за Лонхокарпусъ.

**М. мониліформисъ** (*M. moniliformis*, съ четчатыми стручками). Троп. Америка. Цв. бѣловатые, лл. непарно-перистые.

**МЮСКЪ**. См. Мнимуль.

**МЯКИНА**. Пелена, остатокъ сѣменныхъ покрововъ послѣ вымоченія сѣмянъ.

**МЯКОТЬ**. Мясо плода,—все кромѣ кожи и сѣмянъ.

**МЯТА**. См. Мента.

**НОВАКЪ**. См. Цицифусъ.

**НАВИВКА**. Наполненіе парниковъ навозомъ начинается съ марта для ранней овощи.

**НАВИВЕНЪ**. Повойный побѣгъ, успикъ, ухватъ, задѣтъ вьющихся растеній.

**НАВОЗНИКОВЫЯ** рр. (*sterculiaceae*). Трав., кустарн. и древ. рр. изъ тропиковъ, имѣющія много красивыхъ садовыхъ и экономическихъ представителей. Въ этомъ сем. 46 родовъ изъ 520 видовъ, которые распределены по 5 отдѣламъ; изъ родовъ болѣе замѣчательны: *Бютнерія*, *Кола*, *Коммерсонія*, *Лянопеталиумъ*, *Стеркулія* и *Хеликтерисъ*.

**НАВОЗЪ. НАЗЕМЪ. ПОЗЕМЪ**. Пометъ скотскій въ смѣси съ объѣдами и подстилкой, удобреніе. Бываетъ *соголистый*—съ длинною не перегнившею соломой, и *короткій*—перегнойный.

**НАВѢТРЕННЫЙ**. Та часть, которая обращена къ сѣверу, та—откуда вѣтеръ.

**НАГИВАТЬ**. Наклонять сгибая, пригибать, приклонять. Стебли и побѣги пригибаютъ для привлеченія сока, или приклоняютъ къ землѣ для защиты на зиму.

**НАДЗЕМНЫЙ**. Находящійся выше поверхности земли, противоп. *подземному*.

**НАДЗЕМОКЪ**. Верхній слой почвы, против. *подземокъ*, *подпочва*.

**НАДЛАМЫВАТЬ**. Согнуть вѣтвь на столько, чтобы она треснула на сгибѣ, не отваливаясь.

**НАДМОГИЛЬНЫЯ, НАМОГИЛЬНЫЯ** рр. Сажаемая на могилѣ или кругомъ ей.

**НАЗЕМЪ**. Навозъ. Удобреніе.

**НАЗОНІЯ** (*Nasonia*). *Насо*—нось: столбикъ съ пыльниковомъ образуютъ вѣтвь, похожее на носъ. С. орхидей. Малочисленный родъ, теперь включенный въ *Центропеталумъ*. Холодно-оранж. рр.

**Н. пунктата** (*N. punctata*, точечная). Перу. Цв. оранжевые, въ апрѣлѣ. Сип. *Н. циннабарина* (*N. cinnabarina*).

**НАЙТИЯ** (*Knightia*). *Найтъ* (*T. A. Knight*)—помологъ и президентъ лондонскаго общ. садоводства, † 1838. С. протейныхъ. (3). Нов. Зеландія, Нов. Каледонія. Оранж. куст. или древ. рр. Торф. съ песков. глин. дерн. Черенками изъ зрѣлаго роста съ оставленными лл., кромѣ низа, въ пескѣ, въ парникѣ.

**Н. экцельза** (*K. excelsa*, высокая). Нов. Зеландія. Цв. тѣлесные; лл. жесткіе, съ тупыми зубчиками. Древесина съ красными и коричневыми крапинками. Цѣнится въ столярномъ мастерствѣ.

**НАЛЕГАЮЩІЙ**. Лежащій на чемъ нибудь, не прилегающій.

**НАЛЕТЪ**. Мелкое порошкообразное вещество, различнаго цвѣта, бываемое на виноградѣ, огурцахъ, сливахъ и пр. На-



леть этотъ появляется при созрѣваніи плода и отнюдь стираемъ быть не долженъ.

**НАЛИВЪ ВЪЛЫЙ**, или **ПУДОВИЗЪ**. Ранній, нѣсколько наливающейся сортъ яблока бѣлаго цвѣта съ гранями, средняго размѣра. *Н. желтый*. Тоже ранній, нѣсколько наливающейся сортъ, желтаго цвѣта съ румянцемъ, вкусомъ кисловатый. *Н. сквозной*. См. Сквозница круглая.

**НАЛИВЪ** плода. Прибыль сока, увеличение объема плода.

**НАМА** (*Nama*). *Nama* — водяная струя, по мѣсту произрастанія. С. водолитниковыхъ. (15). Сандвичевы о., С.-З. Америка и Мексика, Ю. Америка и Бразилія. Тепл. или оранж., однол. или многол. трав. рр. Песков. глин. дерн. Дѣленіемъ или черенками весной, въ парникѣ.

**Н. Парри** (*N. Parryi*, Parry). Калифорнія. Цв. пурпурово-лиловые. 4—5 ф. Оранж. трав. многол.

**НАНДИНА** (*Nandina*). Японское название (*Nandina*). С. барбарисовыхъ. (1). Оранж. куст. Глин. дерн. съ песчан. торф. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ песокъ, подъ стекломъ.

**Н. домашняя** (*N. domestica*, домашняя). Китай и Японія. Цв. бѣлые, въ июль. Ягоды въ горшину. Лл. многосложные съ охватывающими черешками.

**НАННОРОПСЪ** (*Nannorrhops*). *Nannos* — низкій и *rhops* — кустъ; по низкому росту. С. пальмъ. (1). Индія. Тепл. пальма. Песков. глин. дерн. съ лист. и др. углемъ. Сѣменами и отпрысками.

**Н. Риччелана** (*N. Ritchiana*, Риччи). Лл. кожистые, сѣровато-зеленые, сегменты линейные, двураздѣленные; употребляютъ на вѣра и др. приспособленія. 3—4 ф.

**НАНОДЕСЪ** (*Nanodes*). *Nanodes* — пигмей. С. орхидей. Родъ соединенный съ Эпидендропъ. Холодно-оранж. орхидей съ гористыхъ мѣстъ Ю. Америки. Въ корзинахъ съ торфян. з. и торф. мхомъ.

**Н. Медузѣ** (*N. Medusae*, Медузы). Анды. Цв. зеленоватые съ коричневымъ отблескомъ, крупные.

**НАОКОННЫЯ** растенія. Компатныя растенія.

**НАПѢРСТОЧНАЯ ТРАВА**. См. Дигиталисъ.

**НАПЛАНИРОВАТЬ** Разбить на плант.; начертить.

**НАПОЛЕОНА** (*Napoleona*). По Наполеону Бонапарту. С. миртовыхъ. (2). Троп. Африка. Тепл. др. рр. Песков. глин. дерн. съ золоки. торф. Черенками изъ полузрѣлаго роста въ песокъ, въ умѣр. парникѣ.

**Н. имперіалисъ** (*N. imperialis*, императорская). Цв. абрикосовые или красно-малиновые, въ маѣ. Лл. остроконечные, овальные, темно-зеленые. 6 ф.

**НАРАВЕЛІЯ** (*Naravelia*). *Нарава* — мѣстное названіе на Цейлонѣ. С. лютиковыхъ. (2). Ю. Азія и Инд. архипелагъ. Тепл. выш. рр. съ деревн. стеблемъ. Песков. торф. съ глин. дерн. Черенками изъ полузрѣлаго роста, въ песокъ, въ парникѣ.

**Н. цейланика** (*N. zeylanica*, цейлонская). Цейлонъ. Цв. желтые; лл. съ двумя остроконеч. листочками съ трехраздѣльными ухватками.

**НАРОСЛЬ**. Чужеродное растеніе.

**НАРОСТЬ**. Пинжа, болота, все что составляетъ болѣзненное возвышеніе на растеніи.

**НАРТЕЦИУМЪ** (*Narthecium*). *Narthekion* — жердь; по цв. стеблямъ. С. лилейныхъ. (4). Умѣр. поясъ сѣв. полушарія. Болотныя рр. похожія на тростникъ. Иловатая, болотистая. Дѣленіемъ или сѣменами.

**Н. осифрагумъ** (*N. ossifragum*, костеломный). Европа, С. Азія, С. Америка. Цв. кистями, желтые. 6—12 д.

**НАРЦИССУСЪ** (*Narcissus*). Названіе данное Хиократомъ и связанное съ мифологическимъ сказаньемъ. С. амариллисовыхъ. (20). Европа, С. Африка, С. и З. Азія. Вынос. или полувыв. лукович. рр. Сильная, песков. глин. дерн. съ небольшимъ колич. листовъ. Сѣменами, но обычно отпрысками. Употребляемыя въ приставку выкапываются съ осени и сохраняются въ прохлад. и сухомъ мѣстѣ до посадки.

**Н. бифлорусъ** (*N. biflorus*, двувѣтнй). Европа. Полагаютъ, что это гибридъ между *Н. поэтикусъ* и *Н. Тацетта*. Цв. млечно-бѣлые, въ маѣ. **Н. бульбокодѣумъ** (*N. bulbocodium*, бульбокодѣй). Ю.-З. Европа. С. Африка. Цв. ярко-желтые, въ апрѣль—маѣ. Имѣетъ нѣсколько разновидностей.

**Н. грацилисъ** (*N. gracilis*, изящный). Отчество неизвестно. Считается гибридной формой. Цв. блѣдно-желтые, въ апрѣль. Сип. *Н. тенуиоръ* (*N. tenuior*). **Н. инкомпарабиліс** (*N. incomparabilis*, несравненный). Цв. желтоватые, въ мартъ—апрѣль. Европа. **Н. Жонквилля** (*N. Jonquilla*).

*Жонкиа*. Испанія. Цв. ярко-желтые, душистые, въ маѣ. Лл. полуцилиндрическіе. Вываеъ махровый. **Н. калатинусъ** (*N. calathinus*, кузовкомъ). Англія. Цв. бѣлые или свѣтло-желтые. **Н. поэтикусъ** (*N. poeticus*, поэтъ). *Садовый нарциссъ*. Ю. Европа. Цв. сѣбно-бѣлые, дернистые, въ маѣ. Имѣетъ много разновидностей. **Н. псевдо-нарциссусъ** (*N. pseudo-narcissus*,

ложный нарциссъ). *Желтый нарциссъ*. Европа. Цв. одиночные, сѣрно желтые, рано весной. Имѣетъ много разновидностей съ простыми и махровыми цв. **Н. Тацетта** (*N. Tazetta*). *Тацетъ*. Европа. Цв. бѣлые, душистые; лл. плоскіе. Сип. *Н. Ципри* (*N. Supri*). Много разновидностей.

**НАСАЖДЕНІЕ**. Посадка растеній. Пространство, усаженное растеніями одного или нѣсколькихъ родовъ.

**НАСЛѢДОВАНИЕ**. Унаслѣдованіе признаковъ составляетъ одну изъ особенностей, имѣющихъ вліяніе на сохраненіе видовой формы.

**НАСТОЛЬНЫЯ** растенія. Поставленія для украшенія стола по разнымъ случаямъ, — за обѣдомъ, ужинкомъ и т. п.

**НАСТУРЦИУМЪ** (*Nasturtium*). Плиній далъ это названіе, произведя его отъ *nasus* — носъ и *tortus* — искривленный, по крѣпкому запаху. С. крестоцвѣтныхъ. (80). Умѣр. и теплые пояса С. полушарія.

**Н. официнале** (*N. officinale*, аптечный). *Рыжуха*. *Брункрессъ*. Европа, З. Азія. Многол. вынос. р., встрѣчаемое по рѣкамъ и болотамъ. Цв. бѣлые, въ июнь. 2 ф.

**НАСѢДКА**. Яблоко средней поры поспѣванія, среднихъ размѣровъ, плоско-ватое, съ ребрами, зеленоватаго цвѣта, пріятнаго, нѣсколько вяжущаго вкуса.

**НАТУРАЛИЗАЦІЯ** раст. Искусственное распространеніе растенія въ новой мѣстности до состоянія одичалости.

**НАУТОЛЬНИКЪ**. Снарядъ для назначенія прямыхъ угловъ, — двѣ линейки скрѣпленные подъ прямымъ угломъ.

**НАУКЛЕА** (*Nuclea*). *Naus* — корабль и *kleio* — заключать, по плодникамъ. С. мареновыхъ. Тепл. куст. или др. рр. изъ тропич. Азія и Океанія. Глин. дерн., торф. и песокъ. Черенками изъ полузрѣлаго роста, въ песокъ, въ парникѣ.

**Н. пурпуреа** (*N. purpurea*, пурпуровая). Индія. Цв. пурпуровые, въ маѣ. 15 ф. Маленькое дерево.

**НАѢЗДНИКИ** (ихневмоны и др.). Пленчато-крылья наѣжкомы, складывающія свои ячйки въ ячйки, личинки или куколки другихъ наѣжкомыхъ и поэтому содѣйствующіе истребленію послѣднихъ.

**НАЯДОВЫЯ** рр. (*najadaceae*). Семейство морскихъ и прѣсноводныхъ одно- и многолѣтнихъ рр., широко распространенныхъ по земной поверхности. Родовъ 16, видовъ 120. Апоногетонъ, Найасъ и Тригложинъ.

**НЕВРОЛЕНА** (*Neurolaena*). *Неугол* — нервъ и *лаена* — покровъ, по трех-первымъ сегментамъ обертки. С. слож-

ноцвѣтныхъ. (2). Колумбія, Вестиндія, Мексика. Тепл. или оранж. высокія полукустарники. Глин. дерн., листов. и пестикъ.

**Н. лобата** (*N. lobata*, лопастная). Вестиндія. Цв. головки желтыя, въ июнь и июль; лл. разнообразные, — продолговато-ланцетовидные, овально-ланцетовидные, клиновидные. 2 ф.

**НЕВБОУЛДІЯ**. См. Ньюболдія.

**НѢГЕЛІЯ** (*Naegelia*) Карль *Негел* (*Naegeli*) — знаменитый ботаникъ, проф. въ Мюнхенѣ. С. геснеріевыхъ. (6). Мексика и Центр. Америка. Тепл. многол. трав. рр. Торф. съ листов. и небольш. колич. глин. дерн. При посадкѣ крѣпче осаживать р. Отпрысками и черенками изъ молодыхъ стеблей или вызрѣвшихъ лл., въ парникѣ.

**Н. Герольтіана** (*N. Geroltiana*, Герольта). Мексика. Цв. красно-шарлаховые, почти круглый годъ; лл. сердцевидные, зубчатые, темно-зеленые. 1½—2 ф. **Н. мультифлора** (*N. multiflora*, многоцвѣтная). В. Кордильеры Оахаки. Цв. бѣлые, осенью; лл. сердцевидные, на длинныхъ ножкахъ, зубчатые.

**Н. фульгида** (*N. fulgida*, блестящая). Вера-Круцъ. Цв. киноварные, лл. широко-эллиптическіе, глубоко-зубчатые, съ волосками.

**Н. зебрина** (*N. zebrina*, зебровая). Бразилія. Цв. ярко-оранжевые, длинными метелками, въ сентябрь; лл. пестрые. 2 ф. Сип. *Геснера зебрина* (*Gesnera zebrina*).

**Н. циннабарина** (*N. cinnabarina*, киноварная). Мексика. Цв. шарлаховые; лл. сердцевидные, или широко-яйцевидные съ красными волосками. 2 ф. Сип. *Геснера циннабарина* (*Gesnera cinnabarina*).

**НЕГНИЮЧКА**. См. Туія.

**НЕГУНДО** (*Negundo*). Мѣстное названіе. С. мыловниковыхъ. (4). Вынос. др. рр. близкія къ Ацеръ изъ С. Америки и Японіи. Уходятъ какъ въ Ацеръ.

**Н. ацероидесъ** (*N. aceroides*, похожій на Ацеръ). С. Америка. Цв. зеленоватые, однодомные, весной. Лл. перистые. 40 ф. Сип. *Н. франкисифолиумъ* (*N. fraxinifolium*). Имѣетъ нѣсколько разновидностей, между прочимъ, пестролистную (*variegatum*, *variegatum*).

**НЕДОШЛЫЙ**. Недошедшій до сѣлости, до обычнаго размѣра, до цвѣта.

**НЕДѢЛИМОЕ**. Индивидуумъ, составляющій собою и по себѣ нѣчто цѣлое; теряющій значеніе, сущность свою при раздробленіи. Изъ индивидуумовъ образуется видъ.

**НЕЗАБУДКА ВЪЛАЯ**. См. Омфалодесъ. *Н. настоящая*. См. Міозотисъ.

**НЕЗЕА** (*Nesaea*). *Nesos* — островъ. Первое растеніе этого рода было найдено



на о. Маврикия. С. плакуновы. (12). Жаркая страна Америки и Африки. Тепло-многол. трав. или полукуст. пр. Песков. гли. дерн. с листов. Длением весной при началъ роста; черенками изъ зрѣлаго роста, въ парникъ. Темп. зимой 6—10, лѣтомъ 13—21°.

**Н. салицифолія** (*N. salicifolia*, съ лл. какъ у Ивы). Мексика. Цв. желтые, въ августѣ; лл. узкіе, ланцетовидные. Полукуст. р. Спн. *Хеймія салицифолія* (*Heimia salicifolia*). **Н. трифлора** (*N. triflora*, трех-цвѣтная). О. Маврикия. Цв. голубые, по три на ножкѣ, въ августѣ. Лл. острые или тупые, 2—3 ф. Однолѣт.

**НЕЙЛЛЯ** (*Neillia*). Патрикъ *Нейлъ* (*Neil*)—быв. секретарь каледонскаго общ. садоводства въ Единбургѣ. С. розановыхъ. (5). С. Индія, Ява, Манджурія и С. Америка. Оранж. или полувыносл. куст. пр. Глин. дерн. съ пескомъ. Черенками изъ почти зрѣлаго роста въ песокъ, въ холод. парникъ, или сѣменами.

**Н. опушифолія** (*N. opulifolia*, съ лл. какъ у Калины). С. Америка. Цв. бѣлые, въ июль. Лл. трехлопастные. 5 ф. Спн. *Спирея опушифолія* (*Spiraea opulifolia*). Имѣетъ разновидность *ауреа* (*aurea*) съ волотисто-желтыми лл.

**НЕКЛЕНЪ**. См. Ацеръ.

**НЕКТАРИКЪ. НЕКТАРНИКЪ.** Медовикъ. Придаточная часть цвѣтка, железа, отдѣляющая нерѣдко медовую жидкость.

**НЕКТАРЪ.** Сладкое отдѣленіе различныхъ частей цвѣтка, составляющее главную пищу многихъ насѣкомыхъ, преимуществъ пчелъ и бабочекъ. Нектаръ не есть пчелиный медъ, п. ч. онъ содержитъ тростниковый, тогда какъ въ пчелиномъ меду заключается виноградный сахаръ.

**НЕЛИТРИСЪ** (*Nelitis*). *Ne*—част. отрицанія и *elytron*—плодникъ, по ягодѣ, не имѣющей раздѣленій. С. миртовыхъ, (20). Тропич. Азія и Австралія. Тепло. куст. или низкія дерев. пр. Волокн. гли. дерн. съ добавленіемъ 1/3 сухого коровьяго перегноя и малаго колич. песку. Черенками изъ полузрѣлаго роста, въ песокъ, въ парникъ.

**Н. паникулата** (*N. paniculata*, метельчатый). Молуккѣ о. Цв. бѣлые, въ маѣ. Лл. продолговатые, остроконечные. 10 ф. Кустъ.

**НЕЛЮМБИУМЪ** (*Nelumbium*). Цейлонцы называютъ *nelumbo* видъ *N. speciosum*. С. кувшинковыхъ. (2). Ю. Россія, Америка, Азія, Австралія. Оранж. водяныя пр.

**Н. лутеумъ** (*N. luteum*, желтый). Вест-индія и Ю.-Америк. Соед. Шт. Цв. желтые,

душистые, похожіе на махровые тюльпаны, въ июль; лл. сизаго пѣвта, шир. до 15 д. **Н. специозумъ** (*N. speciosum*, отъинный). *Патма. Астрпаванская водяная роза.* Азія, Каспійское м., Египетъ. Цв. бѣлые съ розовыми кончиками, очень душистые, лѣтомъ; лл. большіе, до 2 ф. въ диаметрѣ, круглые; корни горизонтальный. Имѣетъ нѣсколько разновидностей.

**НЕМАТАНТУСЪ** (*Nematanthus*). *Nema, nematos*—нить и *anthos*—цвѣтокъ; цв. растутъ на длинныхъ нитевидныхъ ножкахъ. С. геснеріевыхъ. (4). Бразилія. Тепло. или оранж. куст. пр. Песков. торф. съ гли. дерн. и съ добавленіемъ дрѣв. угля и сухого коровьяго помета. Черенками, въ песокъ, довольно сухо.

**Н. кортицикола** (*N. corticicola*, эпифитный). Цв. шарлаховые съ мелкими волосками, въ июль. **Н. лонгипесъ** (*N. longipes*, длинно-ногий). Цв. красные, въ декабрь. 1 1/2 ф.

**НЕМАСТИЛИСЪ** (*Nemastylis*). *Nema*—нить и *stylos*—столбикъ, по нитевидному столбику. С. косатиковыхъ. (6). Мексика, С. и троп. Америка. Оранж. лукович. пр. Песков. гли. дерн. Холодно-оранж. или холод. парникъ. Сѣменами или отростками.

**Н. акута** (*N. acuta*, скороспѣлая). Ю.-З. Соед. Штаты. Цв. голубые съ желтымъ и чернымъ, отцвѣтающіе очень скоро. 6 д. Спн. **Н. геминифлора** (*N. geminiflora*).

**НЕМАТОДЫ.** Мелкіе, почти микроскопическіе червячки, производящіе болѣзни дикорастущихъ и воспитываемыхъ растений.

**НЕМЕЗИЯ** (*Nemesia*). Название, взятое у Діоскорида. С. поричниковыхъ. (20). Ю. Африка. Оранж. одно- или многол. трав. пр. Сѣменами въ обыкновен. з.

**Н. флорибунда** (*N. floribunda*, обильно-цвѣтная). Цв. бѣлые, душистые, лѣтомъ. 1 ф. **Н. цинанцифолія** (*N. cunanchifolia*, съ лл. какъ у Цинанхумъ). Цв. яркіе синевато-лиловые, лѣтомъ. 1 1/2—2 ф.

**НЕМОПАНТЕСЪ** (*Nemopanthus*). *Nema*—нить и *anthos*—цвѣтокъ. по нитевидной ножкѣ. С. падубовыхъ. (1). С. Америка. Выносл. куст. р. Влажн. холод. Сѣменами.

**Н. канадѣнзе** (*N. canadense*, канадскій). Цв. мелкіе, двухдольные, въ маѣ; плоды—красныя ягоды, съ 4—5 орешками. Спн. *Илексъ канадѣнзисъ* и *Приносъ интегріфоліусъ* (*Plex canadensis; Prinos integrifolius*).

**НЕМОФИЛА** (*Nemophila*). *Nemos*—лѣтъ и *phileo*—любить; по мѣсту обычнаго произрастанія. С. водолитовыхъ. (8). С. Америка. Однол. трав. пр. Сред. качество садов. Сѣменами съ осени и весной.

**Н. инсигнисъ** (*N. insignis*, замѣчательная). Цв. лазуревые съ бѣлымъ глазкомъ, несной и лѣтомъ; лл. 3—4 лопастные. 1 1/2 ф. Имѣетъ нѣсколько разновидностей. **Н. макулата** (*N. maculata*, съ пятнышками). Цв. бѣлые съ фиолетово-пурпуровыми пятнами на каждой лопасти, лѣтомъ; лл. пушистые, перисторазсѣченные, съ округлыми лопастями. 6 д. **Н. Менцезіи** (*N. Menziesii*, Менцеса). Цв. бѣлые или голубоватые обычно съ черными точками, лѣтомъ. Лл. перисторазсѣченные, о 5—9 лопастей. 4 д. Имѣетъ нѣсколько разновидностей.

**НЕНГА** (*Nenga*). Малайское названіе. С. пальмъ. (1). Малайскій архип. Тепло. р. Волокн. торф. съ небольшимъ количествомъ листовой и песку. Сѣменами. Не дается просторной посудѣ.

**Н. пумила** (*N. pumila*, низкорослая). Цв. бѣловатые; плоды красноватые, мелкіе. Лл. перисторазсѣченные съ 2 или 3 разсѣченными сегментами; стволъ тонкій, высокій, кольчатый.

**НЕНГЕЛЛЯ** (*Nengella*). Уменьшительное *Nenga*. С. пальмъ. (3). Малайск. архип. и Нов. Гвинея. Тепло. пальмы съ тростниковымъ, кольчатымъ стволомъ. Сѣмь гли. дерн. съ торф. и съ добавленіемъ дрѣв. угля или рѣчнаго песку. Сѣменами.

**Н. парадокса** (*N. paradoxa*, необычная). Лл. перистые, перья неровныя; стволъ тонкій, въ 5—7 ф. выш.; крона изъ 6—8 лл.

**НЕОПРЕДѢЛЕННОЕ** цвѣторасположеніе. Когда образованіе цвѣтовъ продолжается во все время существованія цвѣточной вѣтки.

**НЕОТТИЯ** (*Neottia*). *Neottia*—птичье гнѣздо; по переплетеніямъ корнямъ. С. орхидей. Европа, С. Азія. Выносл. зеленая, не имѣющая большого садоваго значенія пр.

**Н. нидусъ-ависъ** (*N. nidus-avis*, птичье гнѣздо). *Гайникъ*. Цв. коричневатые, весной и рано лѣтомъ. 1 ф.

**НЕРИНЕ** (*Nerine*). *Нерина*—одна изъ нимфъ. С. амприльсовыхъ. (10). Юж. Африка. Оранж. луков. пр. Глин. дерн. съ листов. и дрѣв. углемъ или рѣчнымъ пескомъ. Отпрысками.

**Н. курвифолія** (*N. curvifolia*, криволостное). Цв. ярко-шарлаховые, зонтикомъ, въ разное время года. **Н. сарниѣнзисъ** (*N. sarniensis*, изъ Гвернеса). Цв. бѣдно-лососевые; стрѣлка многоцвѣтная, осенью. Имѣетъ разновидности: *коруска* (*corusca*) съ оранжевыми, *венуста* (*venusta*) огненно-шарлаховыми цв. и п. др. **Н. флексуоза** (*N. flexuosa*, гибкая). Цв. ярко-малиново-красные съ оранжевымъ отгиномъ, зонтиками. У разновидности *пугаллалла* (*pul-*

*chella*) цв. карминово-шарлаховые, у *эксельленсъ* (*excellens*) малиново-розовые.

**НЕРИУМЪ** (*Nerium*). Названіе, заимствованное у Діоскорида и произведенное отъ *neros*—влажный, по мѣсту произрастанія. С. кутровыхъ. (3). Средиземное побережье и троп. Азія до Японіи. Оранжер. куст. пр. Глин. дерн. пополамъ съ перегноемъ. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ парникъ.

**Н. Олеандеръ** (*N. Oleander*). *Олеандръ*. Средиземное побережье. Цв. ярко-красные, довольно большіе, съ іюля до сентября. Лл. ланцетовидные, по три въ кольцѣ. 6—14 ф. Имѣетъ нѣсколько разновидностей съ бѣлыми простыми и махровыми и красными махровыми, притомъ различныхъ тѣней.

**НЕРТЕРА** (*Nertera*). *Nerteres*—любозный, милый. С. мареновыхъ. (6). Горы о. Явы, Филиппинскіе и Сандвичевы о., Анды южн. Америки, Австралія, Нов. Зеландія и Антарктич. страны. Оранж. многол. трав. пр. съ красными ягодами. Песков. гли. дерн. съ листовой. Сѣменами, но обычно длениемъ корней. Поливка обильная.

**Н. депресса** (*N. depressa*, прижатая). Горы антарктическихъ странъ. Цв. зеленоватые, невзрачные, мелкіе. Ягоды ярко-оранжевыя, шаровидныя, въ мелкія горошины; лл. маленькіе, овальные.

**НЕПЕНТЕСЪ** (*Nepenthes*). Названіе встречаемое у Гомера и буквально обозначающее «разгоняющій грусть». С. кувшинныхъ. (32). Троп. Азія, Мадагаскаръ, Сейшельскіе о., Австралія, Нов. Каледонія. Тепло. цвѣткія многол. пр. Волокн. торф. со старымъ торф. мхомъ и битыми черепками. Черенками изъ старыхъ побѣтовъ въ сильномъ теплѣ, или сѣменами. Темп. 13—15 зимой, при грунтовой въ 20 (не ниже) и 15—26° лѣтомъ.

**Н. бикалькарата** (*N. bicalcarata*, съ двумя шпорами). Борнео. Лл. темнаго цвѣта, овально-ланцетовидные, кувшинныя внизу ржаваго цв. съ 2 острозубатыми крыльями, шейка складчатая съ 2 отростками сади. **Н. Вейтчи** (*N. Veitchii*, Вейча). Борнео. Лл. кожныя, овально-ланцетов.; кувшинныя почти цилиндрич., съ 2 крыльями; устье съ широкимъ складчатымъ валикомъ; крышечка маленькая. **Н. Вильямса** (*N. Williamsii*, Вильямса). Гибридъ между *Н. Седени* и *Н. Хуеріана*, съ кувшинными промежуточной формы. **Н. Дорманниана** (*N. Dormaniana*, Дорманновъ). Гибридъ американскаго происхожденія. Лл. широко-ланцетов. Кувшинныя зеленые, съ красными пятнами; крылья бахромчатые; крышечка овальная со шпорцей. **Н. Казіана** (*N. Khasiana*, изъ Казіи). Китай. Лл. цѣльные;



кувшинки зеленые съ пурпуровыми разводами. 6 ф. **Н. кокцинея** (N. coccinea, шарлаховый). Гибридъ американскаго происхождения. Лл. остроконечные. Кувшинки красные съ желтоватыми крапинками; крылья бахромчатые; край устья широкій съ красными и черными складками; крышечка продолговато-овальная. **Н. Коурти** (N. Courtii, Коурт). Гибридъ полученный Коуртомъ въ заведеніи Вийча. Кувшинки тусклаго сѣро-зеленаго цвѣта съ красными пятнами и широкими крыльями; устье овальное, рубчатое; крышечка меньше устья съ шпорой на задней части. **Н. Лауренціана** (N. Laurenciana, Лауренціевъ). Гибридъ между **Н. фильямфора** и **Н. Хукериана**. Кувшинки свѣтло-зеленые съ темно-карминовыми пятнами. Лл. слегка зубчатые. **Н. мадагаскаріензис** (N. madagascariensis, мадагаскарскій). Мадагаскаръ. Кувшинки красно-малиновые, съ двумя бахромчатыми крыльями; устье почти круглое съ узкимъ выноскомъ, бѣлое; крышечка вытянутая поперекъ, съ маленькой шпорцей. **Н. Мастерсіана** (N. Mastersiana, Мастерсовъ). Гибридъ между **Н. казіана** и **Н. сангвинеей**. Кувшинки темно-малиновые съ пурпуровыми пятнами, съ крыльями зубчатыми; устье круглое, розоватое съ рубчатымъ краемъ; крышечка полукруглая, выпуклая. **Н. Морганея** (N. Morganae, Морганея). Гибридная форма. Кувшинки кроваво-красные съ двумя рѣсничатыми крыльями; крышечка свѣтло-зеленая. **Н. Норсіана** (N. Northiana, миссъ-Норс). Борнео. Кувшинки съ пурпуровыми пятнами и двумя бахромчатыми крыльями; устье эллиптическое съ широкимъ рубчатымъ краемъ; крышечка продолговато-овальная, на нижней сторонѣ съ черными крапинками. **Н. Раджа** (N. Rajah, Раджа). Борнео. Кувшинки тускло-пурпуровые, длиннѣе фута, нѣсколько волосистые; устье очень отверстие, пурпуровое, съ глубокими бороздками; крышечка овальная со шпорцей. **Н. Ратклиффиана** (N. Ratcliffiana, Ратклиффа). Гибридъ между **Н. фильямфора** и **Н. Хукериана**. Кувшинки зеленые съ красными пятнами; крылья рѣсничные; устье косое; крышечка овальная со шпорцей. **Н. Раффлезіана** (N. Rafflesiana, Раффлезіевъ). Сингапуръ. Кувшинки зеленоватые съ коричневыми разводами. Отростокъ къ которому прикрѣпляется крышечка очень длинный. **Н. сангвинеей** (N. sanguinea, кроваво-красный). Остиндія. Кувшинки темнаго кроваво-краснаго цвѣта. Чрезвычайно рѣдкое р. **Н. Седени** (N. Sedeni, Седена). Гибридъ полученный отъ сѣмянъ **Н. дистилляторіи**; кувшинки свѣтло-зеленые, съ бурокрасными пятнами. **Н. Хукериана** (N. Hookeriana, Хукеровъ). Саравакъ. Кувшинки почти шаровидные, съ красными пятнами, съ плоскимъ устьемъ; крылья съ

округлыми краями; крышечка обратно-яйцевидная, плоская.

**НЕПЛОДА**. Бесплодный. (Неплода яблока).

**НЕПЛОДНЫЙ**. Бесплодный, тощій (о почвѣ). **НЕПЛОДЛИВЫЙ**. Бесплодный, плохо или мало приносящій плоды—сортъ растенія.

**НЕПОЛНЫЯ** рр. составляютъ одинъ изъ отдѣловъ двусѣменодольныхъ, у которыхъ цвѣтки не имѣютъ вѣнчика или чашечки. Къ такимъ р. принадлежатъ семейства крапивныхъ, ивовыхъ, плюсковыхъ и хвойныхъ.

**НЕПРАВИЛЬНЫЙ** цвѣтокъ, части котораго не одинаковой величины или очертанія.

**НЕПТУНІЯ** (Neptunia). *Нептунъ*—мифологич. богъ морей; по произрастанію въ водѣ. С. бобовыхъ. (8). С. и Ю. Америка, Троп. Азія, Австралія. Водяныя многол. трав. или полукуст. рр. содержащія въ тѣлѣ и имѣющія чувствительныя, какъ у Мимозы, лл. Темп. зимой 8—13, лѣтомъ 15—26°.

**Н. плѣна** (N. plena, изобилующая). Тропики. Цв. блѣдно-желтые, съ июля до сентября; лл. съ 2 или 4 парами перьевъ, каждое перо изъ 12 паръ листочковъ. Полукуст. р.

**НЕРВЪ**. Жилка листа изъ сосудисто-волокнистыхъ пучковъ. Направленіе нервовъ бываетъ различное, но у однодольныхъ растений оно параллельно оси листа. Жилки бываютъ главныя, составляющія непосредственное продолженіе листового черешка и боковыя.

**НЕУВѢДА. НЕУВѢДАЛКА**. Имортель. Живучка. У которой цвѣты сохраняютъ свой видъ и цвѣтъ послѣ того, какъ сняты съ растенія.

**НЕФЕЛИУМЪ** (Nepheleum). Старинное названіе лопухника, по колючимъ плодамъ. С. мыловниковыхъ. (20). Вестиндія, Индѣйскій архипелагъ, Австралія. Тепл. др. рр. Глин. дерн. Сѣменами или черенками изъ зрѣлаго роста.

**Н. Ли-чи** (N. Li-tchi, Ли-чи). Ю. Китай. Цв. бѣлые, въ маѣ. Плоды—сердцевидная ягода, содержащая бѣлую, сладкую, кислотоватую мякоть. Въ большинствѣ распространены подъ тропиками. **Н. Лонгана** (N. Longana, Лонгана). Индія. Цв. бѣлые, въ маѣ. Ягоды шаровидныя съ бѣлою и сочною мякотью. Разводится подъ тропиками. 20 ф.

**НЕФЕЛІАФИЛЛЮМЪ** (Nephelaphyllum). *Nephela*—облоко и *phyllon*—листъ; по пятнамъ на лл. С. орхидей. (4). Остиндія, Ю. Китай, Малайскій архип.

Тепл. земныя орхидеи. Уходъ какъ за *Алектохиломъ*.

**Н. пульхрумъ** (N. pulchrum, прелестный). Ява. Цв. мелкіе зеленые съ бѣлой губой. Лл. съ темно-зелеными крапинками, очень красивые. 3 д. **Н. скаптерумъ** (N. scapigerum, производящій цв. стрѣлку). Борнео. Цв. очень красивые: губа бѣлая внизу, съ пурпуровою серединой и желтымъ кончикомъ. 4 д.

**НЕФРОДИУМЪ** (Nephrodium). *Nephros*—почка, по формѣ споровыхъ кулекъ. С. папоротниковыхъ. (300). Тепл. рр., имѣющія широкое распространеніе.

**Н. арбускула** (N. arbuscula, деревцо). Маскаренскіе о., Цейлонъ и пр. Ваи перистые, въ 1—1½ ф. Спн. **Н. Хукери** (N. Hookeri). **Н. веститумъ** (N. vestitum, одѣтый). Ю. Бразилія. Ваи 1—2 ф. длинной; перья разрываны на серповидныя лопасти. Спн. **Н. Раддианумъ** и **Ластрея вестита** (N. Raddianum; Lastrea vestita). **Н. вильозумъ** (N. villosum, волосатый). Вестиндія до Перу и Чили. Ваи 4—6 ф., перья въ 2 ф. длинной и въ 1 ф. шир., ланцет. видныя. **Н. glandulosum** (N. glandulosum, железковатый). Индія. Ваи 2—3 ф. длинной, перья рѣдкія, овально-ланцетовидныя. **Н. Гольдманумъ** (N. Goldmanum, Гольдман). С. Америка. Ваи въ 2—3 ф. длинной, яйцевидно-дельтовидныя, нижніе перья широкія, разрываемыя почти до черешка. **Н. декомпозиумъ** (N. decompositum, преложный). Австралія. Ваи въ 1—2 ф. длинной, почти дельтовидныя; имѣетъ перья дельтовидныя съ ланцетовидными раздѣленіями. Оранже. **Н. дельтоидеумъ** (N. deltoideum, дельтовидный). Вестиндія. Ваи въ 1—2 ф. длинной и въ 4—8 д. шириной; перья нижней трети короткія. **Н. инекуале** (N. inaequale, не равносѣдный). М. Д. Н. и Наталь. Ваи 1—2 ф. длинной, 8—12 д. шир., нижніе перья короче и шире, разрываемы до черешка на меньшіе зубчатые сегменты. **Н. катоптеронъ** (N. catopteron, съ крыльями внизъ обращенными). М. Д. Н. Ваи въ 4—6 ф. длинной и въ 2—3 ф. шириной; нижніе перья продолговато-ланцетовидныя, съ продолговатыми сегментами, болѣе или менѣе перисто-разсѣченными. **Н. куспидатумъ** (N. cuspidatum, остроконечный). С. Индія, Цейлонъ. Ваи длин. въ 2—3 ф., шир. въ 8—12 д., перья съ зубцами. **Н. Лейцанумъ** (N. Leuzaeum, Лейца). С. Индія до О. Фиджи. Ваи 4—6 ф. длинной, 6—8 д. шир., простые или съ 2—3 пушистыми перьями въ 1—1½ ф. длинной. **Н. моляе** (N. molle, мягкій). Тропики. Ваи 1—2 ф. длинной, 8—12 шир., перья до половины разрываемы на серповидные сегменты, имѣетъ очень много разновидностей. **Н. патенсъ** (N. patens, пониклый). Тро-

пики. Ваи 2—3 ф. длин., 8—12 д. шир.; перья широкія, разсѣченныя почти до черешка на нѣсколько серповидныхъ сегментовъ. **Н. птеройдесъ** (N. pteroides, похожій на Птерисъ). Тропич. Азія. Ваи въ 2—4 ф. длинной, въ 1 и болѣе ф. шириной, перья разсѣчены на почти трехугольныя лопасти. **Н. ригидумъ** (N. rigidum, жесткій). Европа. Малая Азія, Сѣв. Америка. Ваи въ 1—1½ ф. длинной, въ 4—6 д. шир., продолговато-ланцетов.; перья нижней половины овально-ромбональные, разрываемыя почти до низу. Выноск. р. **Н. спинулозумъ** (N. spinulosum, довольно колючій). Европа, Африка, С.-В. Азія, С. Америка. Ваи въ 1—1½ ф. дл., 8—12 д. шир., овально-ланцетовидныя; нижніе перья почти дельтовидныя, остальныя овально-ланцетовидныя. Выноск. р. Имѣетъ много разновидностей. **Н. Филікс-масъ** (N. Filix-mas, мужской). *Панерма*. Космополитный видъ. Ваи въ 2—3 ф. длинной, въ 8—12 д. шир., перья ланцетовидныя, разрываемыя почти до черешка. Спн. *Ластрея Филікс-масъ* (Lastrea Filix-mas). Имѣетъ много разновидностей. **Н. флориданумъ** (N. floridanum, флоридскій). Ю. Соед. Шт. Ваи въ 1½—2 ф. длинной и въ 6—8 д. шир., удлинено-ланцетовидныя; перья разрываемы на зубчатые сегменты. Р. выносливое. **Н. фрагрансъ** (N. fragrans, душистый). Кавказъ, Арктика, Америка. Ваи 6—9 д. длинной и 1½—2 д. шир., продолговато-ланцетовидныя, перья лопастныя. **Н. циатеойдесъ** (N. cyatheoides, похожій на Циатея). Суматра, Сандвичевы о. Ваи 2—3 ф. длинной и въ 1 ф. шир. Перья плотныя съ неодинаковыми краями, съ зубчиками, обращенными впередъ. Оранже. р. **Н. цукутаріумъ** (N. cicutarium, похожій на Цикута). Тропики обоихъ полушарій. Ваи 1—2 ф. длинной, дельтовидныя съ перистыми вершинами и ланцетовидными лопастями; нижнія глубоко перисто-разсѣченныя или перисто-раздѣльныя. **Н. эммулумъ** (N. aemulum, соперничающій). Мадера, Азорскіе о. Ваи ланцетовидно-дельтовидныя, въ 1—1½ ф. длинной; нижнія перья длиннѣе, овально-ланцетовидныя. Спн. **Н. феніксій** и **Ластрея рекурва** (N. foeniculii; Lastrea recurva). Полувыноск. видъ, имѣющій запахъ скошенной травы.

**НЕФРОЛЕПСИЪ** (Nephrolepis). *Nephros*—почка, по покрывалу споръ. С. папоротниковыхъ. (10). Тропич. страны. Тепл. папоротники, съ перистыми ваиями.

**Н. кордифолия** (N. cordifolia, сердцевидный). Троп. Америка. Ваи 1—2 ф. длинной, 1½—2 д. шир.; перья частыя; иногда настельныя; корневище иногда имѣетъ клубни. Спн. **Н. тубероза** (N. tuberosa). **Н. давальдойдесъ** (N. davallioides, по-



хожий на Даваляля. Малайскій архип. Вай пониклыя, въ 2—3 ф. длинной, въ 1 или болѣе ф. шириной. Едва-ли не самый красивый видъ. **Н. Дюффий** (*N. Duffii*, Дюффа). Ос. герцога юркскаго. Вай 2 ф. длин., узкая съ верхушками развѣтвленными дважды или трижды; перья мелкія, настельныя. **Н. плума** (*N. pluma*, похожий на перо). Мадагаскаръ. Вай длиною въ 4—5 ф., шир. въ 4 д., пониклыя, перья внизу цѣлыя, въ верхнихъ концахъ съ выемками въ видѣ косыхъ зазубринъ. Р. оранжев.

**НЕФРОСПЕРМА** (*Nephrosperma*). *Nephros* — почка и *sperma* — сѣмя; по формѣ сѣмянъ. С. пальмъ. (1). Сейшельскіе о. Тепл. пальма, нуждающаяся въ волокнутой глин. дерн., въ смѣси съ листов. и пескомъ. Сѣменами. Не дается просторной посудѣ; поливка обильная.

**Н. ван-Хуттеанумъ** (*N. van-Houtteanum*, Вангуттова). Лл. перистые, раздѣлен. на дов. широкіе и длинныя, пониклыя сегменты. 20 ф. Син. *Арѣка нобилис* и *Опкосперма Вангуттейнумъ* (*Arecas nobilis*, *Oncosperma Van-Houtteanum*).

**НЕФТИТИСЪ** (*Nephthytis*). *Нефтис* — въ мѣстности египтянъ имя Венеры. С. ароидныхъ. (3). З. Африка. Высокорослыя тепл. травян. рр., не имѣющія садоваго значенія.

**НИВЕЛИРОВАТЬ**. Опредѣлять относительную наклонность, возвышеніе и пониженіе мѣстности.

**НИВЕНІЯ** (*Nivenia*). *Нивенъ* (*Niven*) — коллекторъ африканскихъ рр. С. протейныхъ. (12). Ю. Африка. Оранжев. куст. рр. Уходъ какъ за Протеа.

**Н. критмифолія** (*N. crithmifolia*, съ лл. какъ у Критмуъ). Цв. пурпуровые, цилиндрич. колосками, въ іюль 4 ф. **Н. медія** (*N. media*, средняя). Цв. пурпуровые, овальными колосками, въ іюль 2 1/2 ф.

**НИГЕЛЛЯ** (*Nigella*). Уменьшительное *Niges* — черный, по цвѣту сѣмянъ. С. лютиковыхъ. (10). Средиземн. побережье и З. Азія. Однол. трав. рр. Хорошая садовая. Сѣменами, весной.

**Н. дамасская** (*N. damascena*, дамасская). *Дюница оз. зелени*. Юж. Европа. Цв. бѣлые или голубые, окруженные мелко-разрѣзанной оберткой, лѣтомъ. 1—2 ф. Есть махровая форма. **Н. ориенталис** (*N. orientalis*, восточная). Малай Азія. Цв. желтые съ красными пятнами, лѣтомъ. 1 1/2 ф. **Н. испанска (*N. hispanica*, испанская). Испанія и южн. Франція. Цв. темно-голубые съ кроваво-красными тычинками, безъ обертки, лѣтомъ. 1—2 ф.**

**НИЗКОСТВОЛЬНЫЙ**. Против. высокоствольный. Имѣющій низкій стволъ, низкую штамбу, съ которыхъ начинаются развѣтвленія.

**НИКАНДРА** (*Nicandra*). *Никандра* колофонскій (150 до Р. Х.), писавшій о медицинѣ и ботаникѣ. С. пасленовыхъ. (1). Перу. Однол. трав. р. Сѣменами въ парникѣ, потомъ на воздухъ въ обыкн. садовую з.

**Н. физалойдесъ** (*N. physaloides*, похожая на Физалис). Цв. голубые, довольно крупныя, въ іюль до сентября. Ягода мясистая, 2—4 ф.

**НИКОТИАНА** (*Nicotiana*). Жанъ Нико (*Nicot*) — агентъ французскаго короля въ Португаліи; ввелъ употребленіе табака во Франціи, † 1600. С. пасленовыхъ. (50). Америка, о. Тихаго океана, Австралія. Оранжев. или голубоват. трав., рѣдко полукуст. рр. Глубокая, сильная, нѣсколько влажная. Сѣменами рано весной въ теплицѣ или парникѣ, а затѣмъ высаживаются на воздухъ.

**Н. акутифолія** (*N. acutifolia*, остролистная). Бразилія. Цв. бѣлые, съ іюня до морозовъ; лл. корневые продолговатыя, стеблевые — рѣдкіе съ ушками. 1—2 ф. **Н. аффиинисъ** (*N. affinis*, сродный). Цв. бѣлые внутри, зеленоватые снаружи, съ превосходнымъ запахомъ ночью. Лл. нижніе большіе, верхніе — мелкіе съ ушками. 2—3 ф. **Н. вигандіойдесъ** (*N. wigandoides*, похожая на Виганду). Колумбія. Цв. желтоватые; лл. большіе, остроконечные, яйцевидные, пушистые. Оранжев. кустар. р. высаживаемое на лѣто. **Н. глаука** (*N. glauca*, синяя). Буеносъ-Айресъ. Цв. желтые, съ мелкимъ пушкомъ, съ августа до октябрия. Лл. сердцевидные, кособокие. 10—20 ф. Кустарное р. **Н. лонгифлора** (*longiflora*, длинноцвѣтковая). Буеносъ-Айресъ. Цв. сначала бѣлые, потомъ желтые или пурпуровые, въ августъ. Лл. корневые овально-ланцетов., стеблевые сердцевидные. 3 ф. **Н. суавеоленс** (*N. suaveolens*, душистая). Австралія. Цв. бѣлые, пахучіе, лѣтомъ. Лл. овально-ланцетовидные, волнистые. 1 ф. **Н. табакумъ** (*N. tabacum*). *Виргинскій табакъ*. Америка. Цв. розовые, снаружи пушистые, лѣтомъ. 4 ф. Р. пушистое, липкое. Имѣетъ много разновидностей.

**НИКТАНТЕСЪ** (*Nyctanthos*). *Нукъ, нукто* — ночь и *anthos* — цвѣтокъ, по распусканію цв. ночью. С. маслиновыхъ. (1). Индія. Тепл. куст. или низкое дрв. р. Песков. глин. дерн. съ волокон. торф. и небольшимъ количествомъ дрв. угля и песку. Черенками изъ полузрѣлаго роста, въ маѣ, въ пескѣ и парникѣ.

**Н. арборъ-трисписъ** (*N. arbor-tristis*, печальное дерево). Цв. бѣлые, очень душистые, въ іюль. 10 ф.

**НИКТОКАЛОСЪ** (*Nyctocalos*). *Нукъ, нукто* — ночь и *kalos* — красивый, по красивымъ цв. распускающимся ночью

С. биньонійныхъ. (3). Ассамъ и Малайскій архип. Тепл. цѣлыя куст. высокія рр. Глин. дерн. съ пескомъ.

**Н. Томсона** (*N. Thomsoni*, Томсона). Ассамъ. Цв. бѣлые, распускающіеся ночью и свѣчающіеся утромъ. Лл. тройчатые.

**НИМФЕА** (*Nymphaea*). Отъ *Нимфа*. С. кувшинковыхъ. (20). Большинство — въ сѣв. полушаріи и троп. странахъ; не много въ Ю. Африкѣ и Австраліи. Тепл., оранж. и вынос. водяныя рр. Выносиныя — на бугоркѣ перегнойной земли съ пескомъ; тепл. въ кадкахъ съ такой-же землей.

**Н. альба** (*N. alba*, бѣлая). *Одаленъ*. Европа. Цв. бѣлые, плавающие, лѣтомъ; лл. глубоко-сердцевидные. Вынос. **Н. гигантеа** (*N. gigantea*, великанская). Австралія. Цв. голубые, шир. въ 7 д., лѣтомъ, лл. столовидные. Оранжев. **Н. Лотусъ** (*N. Lotus*, Лотусъ). Тропич. страны Старога Свѣта. Цв. красные или бѣлые, лѣтомъ. Лл. столовидные, зубчатые. Тепл. **Н. одората** (*N. odorata*, душистая). С. Америка. Цв. бѣлые съ краснымъ отгѣнкомъ, распускающіеся утромъ и свѣрчивающіеся къ вечеру, лѣтомъ. Лл. сердцевидные. Оранжев. **Н. пигмеа** (*N. pygmaea*, маленькая). Средн. и С. Азія. Цв. бѣлые, пахучіе, съ іюля до сентября; лл. сердцевидные. Вынос. **Н. скутифолія** (*N. scutifolia*, щитовидная). М. Д. Н. Цв. ярко-голубые, душистые, лѣтомъ. Лл. щитовидные. Оранжев. или тепл. **Н. стеллята** (*N. stellata*, звѣздчатая). Троп. Африка. Цв. голубые, съ нижнимъ запахомъ, лѣтомъ. Лл. щитовидные съ двуплоднатымъ основаніемъ. Тепл. У разнородности *нанцибарѣнзисъ* (*zanzibarensis*) цв. ярко-голубые; доли внутри пурпуровыя. Тоже тепл. **Н. термалис** (*N. thermalis*, теплой воды). Венгрія, въ горячей водѣ р. Пече. Цв. чисто-бѣлые, съ запахомъ вина, лѣтомъ. Лл. щитовидные съ острыми зубчиками. Тепл.

**НИПА** (*Nipa*). Мѣстное названіе. С. пальмъ. (1). Троп. Азія и Австралія. Тепл. пальма.

**Н. фрүтиканс** (*N. fruticans*, плодоносная). Лл. перисторазсѣченные, длиною иногда болѣе 20 ф., съ ланцетовидными, остроконечными сегментами; стволъ горизонтальный. Посуда, въ кот. посажена эта пальма, должна быть вся, или отчасти погружена въ воду. Темп. зимой 13—15, лѣтомъ 15—26°.

**НИРЕМБЕРГІЯ** (*Nierembergia*). *Нирембергъ* (*Nierenberg*) — испанскій іезуитъ, авторъ книги „Чудеса природы“, † 1658. С. пасленовыхъ. (20). Троп. Америка. Полувынос. или оранж. многол. рр. Песковой глин. дер. 3 ч., перегной съ пескомъ 1 ч. Черенками въ августъ, также сѣменами въ теплицѣ.

**Н. грацилис** (*N. gracilis*, изящная). Буеносъ-Айресъ. Цв. бѣлые съ пурпуровыми крапинками и желтымъ глазкомъ, лѣтомъ. 6—12 д. **Н. калицина** (*N. calycina*, съ большой чашечкой). Буеносъ-Айресъ. Цв. желтые съ бѣлымъ отворотомъ, въ сентябрѣ. **Н. филикаулис** (*N. filicaulis*, съ нитевиднымъ стеблемъ). Буеносъ-Айресъ. Цв. лиловые съ бѣлыми краями, въ маѣ. **Н. фрүтесценс** (*N. frutescens*, кустарная). Чили. Цв. нѣжно-голубые, раннимъ лѣтомъ. 1—1 1/2 ф. **Н. ривулярис** (*N. rivularis*, поручейная). Лл. Пята. Цв. бѣлые, съ желтымъ или розоватымъ отгѣнкомъ, въ іюль. Стебель вѣтвляющійся, ползучій, пускающій корни.

**НИССА** (*Nyssa*). *Нисса* — водяная нимфа, по мѣсту произрастанія нѣкот. видовъ. С. дубовыхъ. (6). С.-В. и жаркія страны Америки, В. Гималаи, горы Казии и Малайскіе о. Оранжев. деревья или кустарники. Влажн. торф. Сѣменами и отводками.

**Н. капitata** (*N. capitata*, головчатая). Болота Соед. Шт. Цв. безплодные — головками, плодоносные — одиночные. Плоды — красная продолговатая ягода. **Н. мультифлора** (*N. multiflora*, многоцвѣтная). Сѣв. Америка. Цв. зеленоватые, въ маѣ; плоды темносиніе. 30—50 ф. Син. *Н. виллоза* (*N. villosa*).

**НИФЕА** (*Niphaea*). *Niphos* — снѣгъ, по бѣлымъ цв. С. геснерійныхъ. (2). Куба, Мексика. Тепл. трав. рр. Уходъ какъ за Ахименесъ.

**Н. облонга** (*N. oblonga*, продолговатая). Гватемала. Цв. бѣлые, пониклые, зимой. 1 ф.

**НОВИНА**. Первый плодъ. Первый урожай въ году.

**НОВО-ЗЕЛАНДСКІЙ ПИПАТЪ**. См. Тетрагонія.

**НОГОТКІЙ**. См. Календуля.

**НОГОТЫЧКОВЫЯ** рр. (*podostemaceae*). Сем. одно- и многолѣтнихъ водяныхъ, обычно небольшихъ растений, живущихъ въ горныхъ ручьяхъ подъ тропиками. Видовъ 120, не имѣющихъ садоваго значенія; родовъ 21. Аппагелъ, Гидростихисъ, Подостемонтъ.

**НОЖѢВКА**. Пила изъ толстаго стальнаго листа или узкая остроконечная.

**НОЖНИЦЫ**. Орудіе изъ двухъ ножевыхъ полосъ на общей оси съ рукоятками. Въ садоводствѣ употребляются обыкновенныя или приспособленныя для обрѣзки твердыхъ вѣтвей. Последнія называются *секаторами*. Обыкновенныя служатъ преимущ. для выстриганія ягодъ и цвѣтовъ. Въ первомъ случаѣ кончики ихъ не должны быть остры, чтобы не колоти оставшіеся ягоды.



**НОЖЬ.** Стальная полоса в черенѣ, для рѣзанія. Въ ножѣ различаютъ: *лезвіе, плашку* (полосу), *обухъ, кончикъ* (остріе) и *черенъ* или *колоту*. Ножъ садовый бываетъ различный по назначенію. Отъ хорошаго требуется доброкачественное лезвіе и удобный черенъ; для отрѣзанія большихъ вѣтокъ лезвіе дѣлается кривое, для отрѣзки малыхъ вѣтокъ — прямое. Ножъ для окулировки имѣетъ на концѣ черена придатокъ для отодвиганія коры.

**НОКСІЯ** (Knoxia). *Ноксѣ* (Knos) — путешественникъ по Цейлону. С. мареновыхъ. (3). Индія, Ява, Китай, Филиппинскіе о., троп. Австралія. Тепл. трав. или полукуст. рр. Торф. съ глини. дерн. Черенками изъ молодого роста, въ песокъ, въ апрѣль—май, въ парникъ.

**Н. коримбоза** (N. corymbosa, щитковая). Индія. Цв. бѣлые или пурпуровые, лѣтомъ. 2—3 ф. Однол. р.

**НОЛИНА** (Nolina). *Нолемъ* (Nolin) — франц. ботаникъ прошлаго столѣтія. С. лилейныхъ. (12). Мексика, Техасъ. Оранжев. или полувисносливыя лукович. рр. Песков. торф. Отпрысками и черенками.

**Н. георгіана** (N. Georgiana, изъ Георгіи). Георгія. Цв. бѣловатые, маленькіе, въ май до іюля. Лл. узкіе, жесткіе. 2½ ф.

**НОЛІНА** (Nolana). *Нолъ* — колокольчикъ, по формѣ вѣничка. С. колокольчиковыхъ. (8). Чили и Перу. Однол. трав. рр. Обыкн. сад. Съеменами на мѣстѣ или въ парникъ, весной.

**Н. ланцетифолія** (N. lancetifolia, ланцетолістная). Чили. Цв. голубые, въ іюль. 6 д. **Н. парадокса** (N. paradoxa, необычная). Чили. Цв. свѣтло-голубые, лѣтомъ. 1½ ф. **Н. тенелія** (N. tenella, тонкая). Чили. Цв. голубые съ бѣлымъ глазкомъ, лѣтомъ. Р. лиственное.

**НОННЕА** (Nonnea). *Нонне* (Nonne) — пѣмекій авторъ ботанич. сочиненій, † 1772. С. бурачниковыхъ. (30). Европа, С. Африка, З. Азія. Полувисносл. однол. многол. трав. рр. Уходъ какъ за Алхуза.

**Н. розеа** (N. rosea, розовая). Малая Азія. Цв. розовые съ желтоватымъ устьемъ, лѣтомъ. 6—12 д. Спн. *Анхуза латифолія* (Anchusa latifolia).

**НОПАЛЕА** (Nopalea). Мексиканское названіе кактуса. С. кактусовыхъ. (3). Вестиндія, Мексика, троп. юж. Америка. Тепл. куст. рр., близкія къ Опундіи. Воспитаніе и содержаніе общія для кактусовыхъ.

**Н. кокцинеллифера** (N. coccinellifera, имѣющая на себѣ кошениль). Вестиндія Цв. шарлаховые, въ августъ. Лл. скоропадающіе. Стебли и вѣтви сѣро-зеленые, цилиндрическіе, молодые—зеленые и плоскіе.

Р. разводится въ Вестиндіи для кошениль въ большихъ развѣткахъ. Спн. *Опундія кокцинеллифера* (Opuntia coccinellifera).

**НОРАНТЕА** (Norantea). Измѣненное мѣстное названіе Gonora-antegri. С. тернестреминыхъ. (8). Троп. Америка. Тепл. эпифит. или вьющ. куст. рр. Глини. дерн. съ торф. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ песокъ, въ парникъ.

**Н. бразиліензисъ** (N. braziliensis, бразильская). Бразилія. Цв. зеленые съ бѣлыми краями. 6 ф. Вьющееся. **Н. гвианензисъ** (N. guianensis, изъ Гвианы). Гвиана. Цв. фиолетовые съ шарлаховыми прилив.; вѣтви красныя, дающія корни, которыми р. держится.

**НОРИЧНИКОМЫЯ** рр. (Scrophularineae). Весьма важное въ садовомъ отношеніи семейство изъ трав, полукуст., куст. и низко-древ. рр., встречаемыхъ преимущественно въ умеренныхъ климатахъ. Въ немъ насчитываютъ 157 родовъ и около 1,900 видовъ. Главнѣйшіе роды: Антирринумъ, Вербаскумъ, Дигиталисъ, Кальцеоларія, Мимулусъ, Пентстемонъ и Хелоне.

**НОСИЛА. НОСИЛКИ.** Снарядъ для носки тяжести самъ-другъ. Двѣ жерди (ручки), связанныя поперечниками, иногда съ настилкою, или съ рогожею. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ носилки дѣлаются съ пожками.

**НОТЕЛѢА** (Notelaea). *Нотос* — югъ и *елая* — маслина. С. маслиновыхъ. (8). Австралія. Оранжев. древ. и кустарн. рр. Торф. съ глини. дер., пескомъ и дрв. углемъ. Черенками изъ крѣпкаго бокового роста, въ апрѣль, въ песокъ, въ холодномъ парникъ.

**Н. лонгифолія** (N. longifolia, длиннолистая). Цв. мелкіе, бѣлые, съ марта до іюня. Плоды яйцевидные, черно-синіе; лл. ланцетовидные. Высокій кустъ. Спн. *Олеа апетала* (Olea apetala).

**НОТІЛІА** (Notylia). *Нотос*—задъ и *тылос*—горбъ; по горбинѣ на столбикъ. С. орхидей. (18). Троп. Америка. Тепличн. Волокн. торф. съ черенками и мхомъ, въ корзинѣ, или на чуркѣ съ мохомъ.

**Н. биколоръ** (N. bicolor, двуцвѣтная). Гватемала. Цв. и доли лепестки лиловые съ голубыми пятнами, губа тоже лиловая.

**НОТОХЛЕНА** (Nothochlœna). *Nothos* — ложный и *chlœna* — покровъ; по отсутствію обертокъ. С. папоротниковыхъ. (34). Центр. Америка, Сѣв. и Юж. Африка, Австралія, Юж. Европа. Тепл. и оранж. рр., которыя сажаютъ выше края горшка въ волокн. торф. съ пескомъ и кусками песчаника.

**Н. ланугиноза** (N. lanuginosa, пуши-

стая). Ю. Европа, Австралія. Ван двуперистыя, длин. 6—9 д., шир. 1—1½ д. Оранжев. **Н. марантѣ** (N. marantæ, марантовая). Ю. Европа, С. Африка. Ван двуперистыя, длин. 4—12 д., шир. до 3½ д. Оранжев. **Н. нивеа** (N. nivea, снѣжная). Анды отъ Перу до Менсина. Ван трехперистыя, длин. 3—6 д., шир. 1½ до 2 д.; нижняя сторона съ бѣлымъ палетнымъ порошкомъ. Оранжев. **Н. трихоманойдесъ** (N. trichomanoides, похожая на Трихоманесъ). Ямайка, Куба. Ван просто-перистыя, длин. въ 6—12 д., шир. въ ¾ до 1½ д. Оранжев. **Н. флавенсисъ** (N. flavens, желтый). Центр. Америка. Ван трехперистыя, длин. 4—9 д., шир. 2—4 д. Тепл. **Н. хиполейка** (N. hypoleuca, съ бѣлою нижнею стороною). Ван двуперистыя, длин. 4—6 д., шир. 1 д.; нижняя сторона бѣлопушистая. Оранжев. **Н. эклоніана** (N. Eckloniana, Эклонова). М. Д. Н. Ван дву-трехперистыя; черешокъ внизу чешуйчатый. Оранжев. рѣдкій видъ.

**НОТОСКОРДУМЪ** (Nothoscor-dum). *Nothos*—ложный и *scordon*—чеснокъ. С. лилейныхъ. (10). Америка, Китай. Оранжев. или полувисносл. луков. рр. Воспитаніе и уходъ какъ за Аліиумъ.

**Н. фрагрансъ** (N. fragrans, душистый). С. Америка. Цв. бѣлые, съ бѣдно-лиловою позолотой на наружной сторонѣ сегментовъ, лѣтомъ. 1½—2 ф. Спн. *Аліиумъ фрагрансъ* (Allium fragrans).

**НОТОСПАТИУМЪ** (Notospartium). *Нотос*—южный и *spartium*—Дрокъ. С. бобовыхъ. (1). Нов. Зеландія, гдѣ это р. составляетъ единственнаго представителя всего обширнаго семейства бобовыхъ. Оранжев. куст. р. Торф., но можетъ расти и въ глини. дерн.

**Н. Кармичеліи** (N. Carmichaelii, Кармичелія). Цв. малиновые, довольно мелкіе. 20 ф.

**НОТТОЛІА** (Nuttallia). Томасъ Ноттоль (Nuttall) — американскій ботаникъ, † 1859. С. розановыхъ. (1). Калифорнія. Оранжев. орнамент. кустарникъ. Садовая обык. Корневыми отпрысками.

**Н. церазиформисъ** (N. cerasiformis, похожая на Церазусъ). Цв. бѣлые, мелкіе, ранней весной. Плоды похожіе на сливы, пурпуроваго цвѣта. 5 ф.

**НОЧЕЦВѢТНЫЯ** рр. (nyctagineae). Травянистыя, рѣдко кустарныя или древесныя растенія тропическихъ и жаркихъ странъ, преимущественно Америки и рѣдко Африки. Родовъ 23, видовъ 215. Аборія, Бугенвилля, Мирабилисъ, Никтагина.

**НОЧНАЯ КРАСАВИЦА.** См. Мирабилисъ.

**НУАЗЭТТІА** (Noisetia). *Нуазеттъ* (Louis Claude Noisetie) — знаменитый французскій помологъ, † 1849. Авторъ „Le jardinier fruitier“. С. фиалковыхъ. (2). Сѣв. троп. Америка. Тепл. полукуст. рр. Песков. глини. дерн. съ листов. Черенками, въ песокъ, въ парникъ.

**Н. лонгифолія** (N. longifolia, длиннолистая). Кайенна. Цв. бѣлые. 1—1½ ф.

**НУТТАЛІЯ.** См. Нотталія.

**НУФАРЪ** (Nuphar). *Naufar* или *Nyloufar* — арабское названіе Nymphaea. С. кувшиниковыхъ. (4). Вѣв. тропич. страны сѣв. полушарія. Многол. трав. водяная рр. Сажаютъ въ корзину съ сильной землей и опускаютъ въ воду.

**Н. адвѣна** (N. advena, иноземный). С. Америка. Цв. желтые съ красными пыльниками, большіе, лѣтомъ. Лл. сердцевидные. Цв. и лл. высоко надъ водой. **Н. лютеумъ** (N. luteum, желтый). *Желтая кубышка*. Дико растетъ у насъ. Цв. желтые съ запахомъ водки, лѣтомъ; цв. немного подняты надъ водой. Лл. округлые, съ глубоко-двулопастнымъ основаніемъ.

**НЬЮБОЛДІА** (Newbouldia). Пасторъ Ньюболдъ (Newbould) — одинъ изъ гениальнѣйшихъ англійскихъ ботаниковъ. С. биншійныхъ. (3). Троп. Африка. Тепл. древ. рр. Уходъ какъ за Текома.

**Н. левіс** (N. levis, гладкая). Цв. розоватые или пурпуровые; лл. очередные или тройчато-колючатые, непарноперистые.

**НѢТНИКЪ.** См. Хеліантемумъ.

**НЮЙТСІА** (Nyctisia). Петеръ Нюйтс (Nyuts) — знаменитый голландскій мореплавателъ, открывшій часть Австраліи. С. ремнецвѣтниковыхъ. (1). Ю.-З. Австралія. Оранжев. дерево. Песков. торф. съ волокн. глини. дерн.

**Н. флорибунда** (N. floribunda, многоцвѣтная). Цв. оранжевые; лл. очередные, линейные, тупые. 15—25 ф.

**ОВЯЗКА.** Укутываніе, закрываніе растенія, главнымъ образомъ, его стебля, соломой, хвоей и пр. Также то — тѣмъ обвязывается, — рогожа, солома и пр.

**ОБЕРОНІА** (Oberonia). *Оберонъ* — мифологическій царь-волшебникъ, по разнобразной фантастической формѣ цв. С. орхидей. (50). Троп. Азія, Австралія, Маскаренскіе о. и о. Тихаго Океана. Тепл. эпифиты. На чуркахъ. Избытокъ влажности вреденъ, особенно зимой. Дѣленіемъ.

**О. акаулисъ** (O. acaulis, безстебельная). В. Бенгалъ. Цв. оранжевые, весной; лл. безстебельные. **О. тахитензисъ** (O. tahitensis, таитскій). О. Тихаго ок. Цв. желтые, въ іюнѣ; лл. мечевидные.



**ОВЕРТКА.** Кольцо или кольца из прицветниковъ вокругъ цвѣтовъ.

**О(б)КАПЫВАТЬ. О(б)КАПЫВАНИЕ.** Копать землю около чего, взрыхляя ее. Окучивать. Прикрывать растение землей на зиму.

**ОВЛЕПІХА.** См. Хиппофае.

**ОВМІНАТЬ.** Мять вокругъ; обминаютъ снѣгъ вокругъ яблонь и др. раст. отъ подсыжной мыши.

**ОВОЕПОДЫЙ.** Производящій на томъ-же соцветіи и мужскіе и женскіе цвѣтки.

**ОВРОСТИТЬ.** Проростить сѣмена, вызвать искусственно ихъ ростки.

**ОВОЛОНЫ. ОВЛОНЫ.** Наружные молодые слои древеснаго стебля.

**ОВРІЕТІЯ (Aaubrietia).** *Обріе* — былъ знаменитый французскій рисовальщикъ. С. крестоцвѣтныхъ. (5). Юж. Европа, Востокъ. Многол. трав. стелящіяся рр. Хорошая глин. дерн. Размн. сѣменами или черенками и дѣленіемъ.

**О. дельтоидеа (A. deltoidea,** дельтовидная). Неаполь и вообще юж. Италия. Цв. пурпуровые, рано весной. 2—4 д. Имѣть разновидности: *Бугенвиллеи* (Bougainvillei) съ свѣтло-пурпуровыми, *виоласеа* (violacea) фиолетовыми, *грека* (graca) блѣдно-пурпуровыми, *камбелли* (campbelli) синевато-фиолетовыми и *Эрдеи* (Eugeli) фиолетово-пурпуровыми цв.

**ОВРОМЕТРЪ.** Дождемеръ. Снарядъ для измѣренія количества дождевой воды.

**ОВРѢЗКА.** Дѣлается съ цѣлью остановить ростъ въ одномъ направленіи, чтобы направить сокъ въ другое, для образованія въ немъ роста. Составляетъ одно изъ важнѣйшихъ садовыхъ производствъ, требующее знанія и близкаго знакомства съ растеніемъ. Молодыя деревья расположены къ произведенію большаго числа вѣтвей и потому обрѣзка ихъ дѣлается болѣе плотная, чтобы оставить только крѣпкія и сильныя вѣтки. Время, когда должно дѣлать рѣзку, зависитъ и отъ свойства растенія и отъ мѣстныхъ условій; вообще говоря, она производится до полного вызрѣванія древеснаго роста и въ то время, когда можно ожидать, что растеніе въ томъ-же году дастъ здоровую почку. Кромѣ вѣтвей обрѣзку подлежатъ и корни, размѣръ и степень развитія которыхъ имѣетъ близкое соотношеніе къ воздушнымъ частямъ растенія. Эту обрѣзку лучше дѣлать осенью, причѣмъ вдоль обрѣзываемыхъ корней вырывается канавка, наполняемая хорошою землею.

**ОВСѢМЕНЯТЬ.** Опылять, оплодотворять искусственно, нанесеніемъ цвѣтени.

**О(б)ТАПТЫВАТЬ. О(б)ТОПТАТЬ.** Обмять, топтать вокругъ растенія землю, снѣгъ, навозъ.

**ОВУХЪ.** Тылъ всякаго остраго орудія, тупецъ.

**ОВШЛЕПЫВАТЬ.** Прибивать землю тыломъ лопаты или доской, что дѣлается обыкновенно послѣ посѣва.

**ОВѢДЪ.** Пора, время, когда обдѣляютъ, — полдень: поливка до или послѣ обдѣла, — до полудня или послѣ, когда спадетъ жаръ.

**ОВСЯНЫЙ КОРЕНЬ.** См. Скорцонера.

**ОВОЩЬ (Ъ).** Огородныя растенія, огородинъ, съѣдомая ботва и корни: лукъ, капуста, морковь, рѣпа, свекла, огурцы, арбузы и пр.

**ОГНЕВИКЪ. ОГНЕВИЦА.** Ракъ, болѣзнь стебля, вслѣдствіе которой отмираетъ древесина.

**ОГОРОДНИКЪ.** Ухаживающій за огородомъ. Содержатель и хозяинъ огорода.

**ОГОРОДЪ.** Овощникъ. Отдѣльное и обычно огороженное мѣсто, обработанное подъ разведеніе огородныхъ растеній.

**ОГУРЕЦЪ.** См. Кукумисъ. Плодъ огурца, пущенный на сѣмена — *сѣмянникъ* или *стѣмникъ*.

**ОГУРЕЧИНА.** Огуречная ботва. Огудина.

**ОГУРЕЧНАЯ ТРАВА.** См. Вораго.

**ОДНОДОЛЬНЫЯ** или **ОДНОСѢМНОДОЛЬНЫЯ, ВНУТРЕРОСЛЫЯ.** Одинъ изъ обширныхъ отдѣловъ явнотвѣтныхъ растеній, къ которому принадлежатъ породы: со стеблемъ утолщающимся не концентрическими слоями съ сердцевинною въ серединѣ, а продольными пучками, располагающимися въ неправильномъ порядкѣ; съ листьями имѣющими обычно параллельныя жилки (исключеніе составляютъ Ароиды, Dioscoridaceae и лилейныя); съ цвѣтками, части которыхъ не бываютъ латерными; съ зародышемъ обѣ одной сѣменодолью; съ первыми листьями очередными; наконецъ съ неразвѣтвляющимися корешкомъ.

**ОДОЛЕНЪ.** См. Нимфеа.

**ОДОНТАДЕНІЯ (Odontadenia).** *Odons, odontos* — зубъ и *aden* — железа: по пятизубчатымъ железкамъ. С. кутровыхъ. (18). Троп. Америка, преим. Бразилія и Гвиана. Тел. куст. рр. Глин. дерн. съ древ. углемъ, кустистой мукой и пескомъ. Черенками изъ молодого роста, въ парникѣ.

**О. спеціоза (O. speciosa,** отъѣнная). Тринидадъ. Цв. ярко-желтые съ оранже-

вымъ отбѣскомъ, крупныя, съ пріятнымъ иѣжнымъ запахомъ. Лл. большіе. Сип. *Дипладенія Харриса* (Dipladenia Harris).

**ОДОНТОГЛОССУМЪ (Odontoglossum).** *Odons* — зубъ и *glossa* — языкъ; по зубообразному острокъ на губѣ. С. орхидей. (100). Анды троп. Америки, — отъ Боливии до Мексики. Тел. рр. на чуркѣ, вставленной въ горшокъ съ волокн. торф., торф. мхомъ и черепками вокругъ. Дѣленіемъ луковицы. Тел. зимой 10—13, лѣтомъ 13—26°.

**О. биктонензе (bicktonense,** биктонскій). Гватемала. Цв. болѣею частью желтовато-зеленые съ буро-пурпуровыми черточками; губа лиловая съ фиолетовымъ отбѣскомъ, иногда блѣлая, въ апрѣлѣ. Имѣть много разновидностей. **О. бландумъ (O. blandum,** красивый). Колумбія. Цв. желто-зеленые съ малиново-карминными пятнышками; губа волнистая. **О. Вилькеанумъ (O. Willekeanum,** Вилька). Гибридъ между *O. crispum* и *O. lateo-purpureum*. Цв. свѣтло-желтые съ бурными пятнышками; губа желтая съ оранжевымъ основаніемъ. **О. гранде (O. grande,** великолѣпный). Гватемала. Цв. желто-оранжевые съ коричневыми полосками; губа блѣлая съ коричневыми пятнышками; осенью и зимой. Имѣть нѣсколько разновидностей. **О. Инслея (O. Insleayi,** Инслея). Мексика. Цв. желтые съ поперечными красно-бурными полосками; губа свѣтло-желтая съ коричневыми крапинками у края, зимой. Сип. **О. Лавренсееанумъ (O. Lawrenceanum).** Имѣть нѣсколько разновидностей. **О. Сервантеса (O. Servantesii,** Сервантес). Оахака. Цв. розовые съ карминово-коричневыми полосками при основаніи, губа блѣлая или лиловая, въ мартѣ—апрѣлѣ. Сип. **О. мембранасеумъ (O. membranaceum).** Имѣть нѣсколько разновидностей. **О. кордатумъ (O. cordatum,** съ сердцевидною губой). Гватемала и Мексика. Цв. желтые съ шоколадными полосками и пятнышками; губа блѣлая съ лиловыми и розово-пурпуровыми крапинками; поздней весной. **О. коронаріумъ (O. coronarium,** съ вѣнкомъ). Перу. Цв. красно-коричневые съ желтыми краями; губа волнисто желтая. **О. криспумъ (O. crispum,** курчавый). Нов. Гренада. Цв. блѣлые; губа желтая съ красно-оранжевыми крапинками. Р. это чрезвычайно разнообразно своими цв., сколько по величинѣ, столько и окраской, поэтому имѣетъ очень много разновидностей. **О. кристатумъ (O. cristatum,** гребенчатый). Перу. Цв. блѣлые съ темно-коричневыми или пурпуровыми полосками и пятнами; губа блѣлая съ грязно-пурпуровыми пятнами и лучистымъ блѣлымъ гребешкомъ. Имѣть много разновидностей. **О. леве (O. leve,** гладкій). Гватемала. Цв. коричневые, съ желтыми полосками, души-

стые; губа блѣлая съ фиолетовымъ. Сип. **О. Карвайскии, О. Рейхенгеймий (O. Karwinskii, O. Reichenheimii).** **О. Линденіи (O. Lindenii).** Нов. Гренада. Цв. желтые. Сип. **О. платидонъ (O. platydon).** **О. латео-пурпуреумъ (O. lateo-purpureum,** желто-пурпуровый). Нов. Гренада. Цв. ярко-коричневые или пурпуровые съ блѣлыми или свѣтло-желтыми полосками; губа блѣлая съ коричневыми пазомъ, зимой и весной. Имѣть нѣсколько разновидностей. **О. макулатумъ (O. maculatum,** пятнистый). Мексика. Цв. темно-желтые съ коричнево-малиновыми черточками и пятнышками по срединѣ; губа желтая съ коричневыми пятнышками, весной. **О. одоратумъ (O. odoratum,** душистый). Сиера-Невада. Цв. желтые съ шоколадно-коричневыми пятнышками и крапинками, очень душистые; губа блѣлая съ пурпуровымъ основаніемъ, зимой и весной. Рѣдкое р. Сип. **О. глоріозумъ (O. gloriosum).** Имѣть много разновидностей. **О. Пескатореи (O. Pescatorei,** Пескатори). Нов. Гренада. Цв. блѣлые, губа съ желтыми и красно-коричневыми крапинками, весной. Сип. **О. нobile (O. nobile).** Имѣть нѣсколько разновидностей. **О. пульхеллумъ (O. pulchellum,** красивый). Мексика. Цв. блѣлые, очень душистые, на губѣ гребешокъ желтаго цвѣта, въ видѣ буквы W, весной. **О. Россіи (O. Rossi,** Росса). Мексика. Цв. блѣлые съ поперечными коричневыми полосками; губа съ лимоннаго цв. гребешкомъ, зимой. Сип. **О. аскупинатумъ (O. acuminatum).** Имѣть нѣсколько разновидностей. **О. циррозумъ (O. cirrhosum,** съ ушками). Эквадоръ. Цв. блѣлые съ темно-фиолетовыми пятнами и черточками. Имѣть нѣсколько разновидностей. **О. Шиллеріанумъ (O. Schillerianum,** Шиллера). Цв. желтые съ коричневыми или сплошь коричневыми; губа желтая съ пурпуровымъ пятномъ. **О. трипудіансъ (O. tripudians,** пляшущій). Колумбія. Цв. коричневые, съ желто-зелеными краями и нѣсколькими пятнышками; губа съ блѣлымъ основаніемъ. Имѣть нѣсколько разновидностей. **О. триумфавсъ (O. triumphans,** торжествующій). Троп. Америка. Цв. золотисто-желтые съ красно-коричневыми пятнами, губа съ розовою переднею и блѣлою заднею частью, весной. **О. Уро-Скиннери (O. Uro-Skinneri,** Уро Скиннера). Цв. свѣтло-зеленые или желтовато-зеленые съ красно-бурными пятнами; губа съ голубыми пятнами.

**ОДОНТОСПЕРМУМЪ (Odontospermum).** *Odons, odontos* — зубъ и *sperma* — сѣмя; по рубчатому хохолку на сѣменахъ. С. сложноцвѣтныхъ. (8). Средиземн. побережье и Канарскіе о. Оранже. многол. и воздушн. однол. трав. рр. Уходъ какъ за однолѣтними, сѣменами. Многол.



волоки, глины, дерн. съ листов., черенками изъ полувзрѣлаго роста.

**О. серицеумъ** (*O. sericeum*, шелковистый). Канарскіе о. Цв. головки желтыя, въ июнь. 4 ф. Оранже. куст.

**ОДУИНИЯ (Audouinia).** *Одуи* — знаменитый эвтомолъ. С. бруннйныхъ. Оранже. куст. р.; смѣсь торф. съ песч. дерн.; черенками изъ полувзрѣл. роста, въ песокъ, подъ стекломъ, въ умѣренномъ теплѣ.

**А. капitata** (*A. capitata*, головчатая). М. Д. Н. Цв. пурпуровые, въ маѣ. 1—2 ф.

**ОЗИМАЯ ГРУППА.** Зеленаго цвѣта средней величины, пріятнаго вкуса.

**ОЗИРИСЪ (Osyris).** Название взято у Diosкорида. С. сандаловыхъ. (6). Ю. Европа, Африка, Остиндія. Оранже. куст. рр. Песков. глины. дерн. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ парникъ, весной.

**О. альба** (*O. alba*, бѣлый). Средиземн. побережье. Цв. бѣлые, въ июль. 3—4 ф.

**ОИДИУМЪ.** Микроскопическій грибокъ, поражающій виноградное растеніе и уступающій обсыпанію сѣрнымъ цвѣтомъ.

**ОКЛУВИТЬ.** Обрѣзать дерево или кустъ такъ, чтобы кроша была круглая.

**ОКОЛОПЛОДНИКЪ. ОКОЛОПРѢТНИКЪ.** Находящійся возлѣ, близко плода или цвѣтка.

**ОКОЛОПРѢТЪ. ПОКРѢВЪ.** Наружныя части, охраняющія тычинки и пестики, т. е. то что обычно называется цвѣткомъ, тогда какъ въ ботанич. смыслѣ подъ цвѣткомъ разумѣются собственно производительные органы (тычинки и пестики). Въ большинствѣ случаевъ околопрѣтъ бываетъ двойной, — чашечка и вѣнчикъ, притомъ каждая изъ этихъ частей отдѣльная, но въ другихъ случаяхъ (напр. у лиліи) онѣ обѣ бывають лепестковья, а у иныхъ (ситовникъ) — въ видѣ долей. Иногда одной изъ этихъ частей не бываетъ. притомъ отсутствуютъ — или лепестки, или доли.

**ОКОРЕНОКЪ.** Комлевая часть стебля съ корнями.

**ОКОТЕА (Ocotea).** Мѣстное названіе въ Гвианѣ. С. лавровыхъ. (200). Тропич. Америка, Канарскіе о., Юж. Африка и Маскаренскіе о. Тепл. или оранже. древ. рр. Глин. дерн. Черенками изъ молодого взрѣвшаго роста, лѣтомъ, въ песокъ, землѣ, подъ стекломъ.

**О. булльята** (*O. bullata*, съ волдырями). М. Д. Н. Цв. зеленые, замѣчательно мелкіе; лл. буро-зеленые, на жилкѣ на нижней сторонѣ лл. ямочки, которыми на верхней соответствуютъ возвышенія, — волдыри.

**ОКСАЛИСЪ (Oxalis).** *Oxys* — кисло-

та, по вкусу лл. С. гераниевыхъ. (220). Оранже., полувывосл. и выносл. трав. рр. иногда съ клубневымъ корневищемъ, встрѣчаемыя въ троп. Америкѣ и умѣр. климатахъ всей пов. земли. Песков. Упомянутыя рр., гдѣ не обозначено, принадлежатъ къ оранже. Сѣменами, черенками и дѣленіемъ корней.

**О. ацетовелля** (*O. acetosella*). *Кислица*. Сѣв. полушаріе. Цв. бѣлые съ красиво расположенными пурпуровыми жилками, весной. Лл. обратно-сердцевидные. 3 д. Выносл.

**О. аренація** (*O. arenaria*, песчаный). Чили. Цв. яркіе фиолетово-пурпуровые. 4 д.

**О. артикулата** (*O. articulata*, членистый). Ю. Бразилія. Цв. малиновые; лл. тройчатые. 2—3 д. **О. Бареліери** (*O. Barelieri*, Бареллера). Бразилія. Цв. желтые, въ мартѣ — апрѣлѣ; лл. тройчатые. 8—12 д. Однол.

**О. вальдивіензис** (*O. valdiviensis*, вальдивійскій). Чили. Цв. темно-желтые съ красивыми черточками, лѣтомъ. 6—8 д. Выносл. однол. **О. вариабиліс** (*O. variabilis*, измѣнчивый). М. Д. Н. Цв. бѣлые или красные, въ октябрь до декабря. 3 д.

**О. верзиколоръ** (*O. versicolor*, разноцвѣтный). М. Д. Н. Цв. снаружи бѣлые, внутри красноватые, рано весной. 3 д. **О. корникулята** (*O. corniculata*, съ рожами). За исключеніемъ холодныхъ климатовъ. Цв. желтые, весной и осенью; стебель прижатый. Однол. У разновидности *rubra* (красная) темно-пурпуровые. **О. лязіандра** (*O. lasiantha*, съ пушистыми лепестками). Мексика. Цв. красно-малиновые, снаружи пушистые, лѣтомъ. 9—18 д. **О. лобата** (*O. lobata*, лопастной). Чили. Цв. желтые съ красными пятнышками, въ октябрь и ноябрь. 3 д.

**О. Марціана** (*O. Martiana*, Марціуса). Аргентинская республика. Цв. темно-пурпуровые, полувосл. **О. розеа** (*O. rosea*, розовый). Чили. Цв. розовые, весной. 6—12 д. **О. стрикта** (*O. stricta*, приморский). С. Америка. Цв. желтые, съ весны до осени. 1 1/2 ф. Выносл. **О. тетрафилля** (*O. tetraphylla*, четырелестный). Мексика. Цв. тускло-красные или фиолетово-пурпуровые, въ июль. Корневище луковичное. **О. хирта** (*O. hirta*, волосистый). М. Д. Н. Цв. отъ блѣдно-фиолетовыхъ до темно-красныхъ. 3 д.

**О. элегансъ** (*O. elegans*, изящный). Перу. Цв. пурпуровые, въ июль. 6 д. **О. эннеафилля** (*O. enneaphylla*, девяти-лестный). Цв. бѣлые или розоватые съ пурпуровыми жилками, въ июнь. 4 д. Изъ Огненной земли. Выносл. многол.

**ОКСИВАФУСЪ (Oxybarhus).** *Oxybarhus* — плоскій сосудъ для укуса, по оберткѣ. С. ночевѣтныхъ. (20). 3. Америка, Вост. Шт. С. Америки, Гималаи. Оранже. или выносл. одно- или многол. трав. рр. Песков. глины. дерн. Сѣменами или дѣленіемъ, весной.

**О. вискозусъ** (*O. viscosus*, липкий). Перу. Цв. малиновые, въ июнь до октября. Однол.

**ОКСИДЕНДРОНЪ (Oxydendron).** *Oxys* — кислый и *dendron* — дерево, по кислымъ на вкусъ лл. С. вересковыхъ. (1). Выносл. дерево въ умѣр. климатѣ. Торф. Сѣменами.

**О. арбореумъ** (*O. arboreum*, древесный). В. Соед. амер. штаты. Цв. бѣлые, въ июнь — июль. 15—40 ф.

**ОКСИКОККУСЪ (Oxycoccus).** *Oxys* — кислый и *kokkos* — ягода. С. брусничныхъ. (2). Европа, С. Азія, С. Америка. Низкія выносл. куст. рр. Торф. Черенками или побѣгами.

**О. макрокάρпусъ** (*O. macrocarpus*, крупноплодный). С. Америка. Цв. малиновые, весной. Лл. продолговато-длинные. **О. палюстрисъ** (*O. palustris*, болотный). *Клюква*. Сѣв. полушаріе. Цв. малиновые съ отогнутыми сегментами, въ маѣ. Лл. мелкіе, овальные, остроколючные.

**ОКСИЛОБИУМЪ (Oxylobium).** *Oxys* — острый и *lobos* — стручокъ, по остроколючнымъ стручкамъ. С. бобовыхъ. (27). Австралія. Оранже. куст. рр. Торф. съ глины. дерн. и пескомъ. Черенками изъ достаточно окрѣпшаго молодого роста, въ песокъ, подъ прикрытіемъ.

**О. obtusifoliumъ** (*O. obtusifolium*, туполестный). Цв. малиновые съ темно-оранжевымъ флагомъ, въ апрѣлѣ. 1—3 ф. **О. трилобату** (*O. trilobatum*, трехлопастный). Цв. желтые, въ апрѣлѣ. 2 ф. **О. эллиптикумъ** (*O. ellipticum*, эллиптический). Цв. желтые, въ маѣ до сентября. 2—3 ф. Сил. **О. Пултеней** (*O. Pultenaei*).

**ОКСИПЕТАЛИУМЪ (Oxypetalum).** *Oxys* — острый и *petalum* — лепестокъ. С. ласточниковыхъ. (50). Ю. Америка, Бразилія, Мексика, Вестиндія. Тепл. или оранже. многол. трав. или полукуст. рр. Глин. дер. сильная. Черенками изъ молодого роста, въ парникъ.

**О. цѣрѣлеумъ** (*O. coeruleum*, голубой). Буеность-Айресъ. Цв. голубые, въ июль. Тепл. или оранже. выходящій полу-кустарникъ.

**ОКСИСПОРА (Oxyspora).** *Oxys* — острый и *spora* — сѣмя, по сѣменамъ съ остями на обоихъ концахъ. С. черноустовыхъ. (4). В. Бенгалъ и Малайск. архип. Тепл. куст. рр. Песков. глины. дерн. съ волокни. торф. и древ. углемъ. Черенками изъ молодого роста, въ парникъ.

**О. паникулата** (*O. paniculata*, метельчатая). Индія. Цв. малиновые, осенью. 3—5 д.

**ОКСИСТЕЛЬМА (Oxystelma).** *Oxys* — острый и *stelma* — поясокъ, по ост-

рымъ кончикамъ коронки. С. ласточниковыхъ. (4). Троп. Азія и Африка. Тепл. выш. трав. рр. Глин. дерн., съ листовою и пескомъ, при хорошемъ водостокѣ.

**О. эскулентумъ** (*O. esculentum*, съ-доман). Ява. Индія. Цв. бѣлые съ розовымъ отбѣнкомъ, лл. линейно-ланцетовидныя.

**ОКСИТРОПИСЪ (Oxytropis).** *Oxys* — острый и *tropis* — киль; ладья остроколючная. С. бобовыхъ. (100). Азія, С. Америка и Европа. Выносл. трав. или куст. рр. Песков. глины. дерн. Сѣменами или дѣленіемъ весной.

**О. Ламбертіи** (*O. Lambertii*, Ламберта). С. Америка. Цв. розово-карминные, въ августѣ. 6—12 д. **О. монтана** (*O. montana*, горный). Европа. Цв. голубоватые съ пурпуровой чашечкой, въ июль. 6 д. **О. пиренаика** (*O. pyrenaica*, пиренейскій). Пиреней. Цв. лазуревые, лѣтомъ. 4—6 д.

**ОКСІАНТУСЪ (Oxyanthus).** *Oxys* — острый и *anthos* — цвѣтокъ. С. мареновыхъ. (12). Троп. и Ю.-В. Африка. Тепл. оранже. древ. рр. Торф. Черенками, въ парникъ.

**О. тубифлорусъ** (*O. tubiflorus*, съ трубчатыми цв.). Сьерра-Леоне. Цв. бѣлые, въ июль. Сил. **О. специозусъ** (*O. speciosus*), *Гарденія тубифлора* (*Gardenia tubiflora*).

**ОКТАДЕСМІЯ (Octadesmia).** *Okto* — восемь и *desme* — пучекъ, по 8 пыльцевымъ массамъ. С. орхидей. (3). Ямайка и Сант Доминго. Тепл. эпифиты. Въ корнѣ съ торф. волокнами, торфяникомъ и древ. углемъ.

**О. монтана** (*O. montana*, горная). Рио-Жанейро. Цв. бѣлые съ желтоватымъ отбѣнкомъ, въ октябрь. 6 д.

**ОКТОМЕРІЯ (Octomeria).** *Okto* — восемь и *meris* — часть, по пыльцевымъ массамъ. С. орхидей. Бразилія, Гвиана, Вестиндія. Оранже. эпифиты. Въ горшкѣ съ торф. и торф. мохомъ. Обильная поллилка.

**О. граминифолия** (*O. graminifolia*, съ лл. какъ у злака). Вестиндія. Цв. блѣдно-желтые съ двумя красными пятнышками, въ маѣ. 6 д. **О. Саундерсіана** (*O. Saundersiana*, Саундерсова). Бразилія. Цв. блѣдно-желтые съ тремя пурпуровыми полосками на доляхъ и лепесткахъ; губа желто-охристая, зимой.

**ОКУЛИРОВАТЬ.** Прививать глазокъ одного дерева къ другому. Производить *окулировку*, или окулированіе.

**ОКУРИВАНІЕ.** Наполненіе помѣщенія съ растеніями табачнымъ дымомъ для уничтоженія насекомыхъ, главнымъ образомъ тли (вши) и трипса. Кромѣ табаку для той же цѣли существуютъ болѣе дешевые составы, приготовляемые изъ густого табачнаго соуса. Окуриваніе успѣш-



нѣе производить въ тихую погоду, вечеромъ. Листья должны быть сухи. Степень густоты дыма зависитъ отъ степени крепости растений: вообще лучше два раза окурить умѣренно, чѣмъ разъ чрезвычайно сильно. Окуриваніе можетъ служить для предупрежденія появленія наѣдомыхъ. При солнечномъ свѣтѣ окуриваніе вредно, особенно для нѣжныхъ растений. Для окуриванія существуютъ особыя приспособленія къ этому жаровни.

**ОКУТЫВАТЬ.** Обертывать. Закрывать для защиты отъ морозовъ.

**ОКУЧИВАНІЕ.** Пригребаніе земли къ стеблямъ, дѣлаемое или для увеличенія массы, въ которой развиваются подземныя части (напр. картофеля), или для защиты отъ свѣта и выѣлки стебля (напр. сельдерея).

**ОКУЧНИКЪ.** Орудіе для окучиванія—кирка.

**ОЛАКОВЫЯ** pp. (olacineae). Цѣпкіе или вьющіеся кустарники, либо деревья, распространенные по тропической Южн. Африкѣ и въ тропической Австраліи. Видовъ 170, родовъ 36. Гейстерія, Геккаина, Оляксъ.

**ОЛЕА** (Olea). Латинское названіе, тождественное съ греческимъ *Elata*—маслина. С. масличныхъ (35). Троп. и центр. Азія, Маскаренскіе о. и Нов. Зеландія. Оранжев. дрв. pp. Глин. дерн. Черенками изъ зрѣвшаго роста и сѣменами.

**О. веррукоса** (O. verrucosa, бородавчатая). М. Д. Н. Цв. угловыми метелками, въ апрѣлѣ. Лл. линейно-ланцетовидные, на ниж. сторонѣ чешуйчаты; плоды почти шаровидные. **О. капензисъ** (O. capensis, наскан). М. Д. Н. Цв. макушечными кистями, въ іюлѣ. Лл. кожистые, на нижней сторонѣ болѣе свѣтлые; пл. величиной въ горошину. 5 ф. **О. лаурифолія** (O. laurifolia, лавролистная). М. Д. Н. Цв. макушечными, трехразвѣтвленными кистями, лѣтомъ. Лл. продолговатые, болѣе или менѣе волосистые; пл. почти шаровидные. **О. европѣя** (O. europaea, европейская). Масличное или оливковое дерево. Ю. Европа. Цв. метелками, съ іюля до августа. Лл. цѣльные, продолговатые, острокопечные; пл. мелкіе Син. *O. oleaster* (O. oleaster). Разноименно различныя сатива (sativa),—сѣвдомал, цвѣтеть въ апрѣлѣ; лл. нѣтъ ланцетовидные, снизу пушистые; плоды гораздо крупнѣе. Син. *O. sativa* (O. sativa). **О. фрагранс** есть *Osmaitus fragrans*.

**ОЛЕАНДРЪ.** См. Неріумъ.

**ОЛЕАНДРА** (Oleandra). *Oleandra*, съ которымъ имѣютъ сходство. С. папоротниковыхъ. (6). Троп. страны. Теплич.

pp., употребляемыя для обвитія колоннъ по проволокамъ.

**О. артикулата** (O. articulata, членистая). Наталь. Маскаренскіе о. Стволы твердые, вьющіеся. Вап 6—12 д. длиной и 1½—2 д. шир. **О. неріиформисъ** (O. neriiiformis, похожая на Неріумъ). Тропикки. Стволы деревнистые, чешуйчатые, почти прямые. Вап 6—17 д. длин. ½—1¾ д. шириной, супротивными парами. **О. подоза** (O. podosa, узловатая). Вестиндія. Стволы горизонтальные, чешуйчатые. Вап 6—12 д. длиной и 1½—2½ д. шир.; острокопечные.

**ОЛЕАРИЯ** (Olearia). *Olea*—по отдаленному сходству. С. сложноцвѣтныхъ. (85). Австралія, Нов. Зеландія и близъ лежащіе о. Оранжев. куст. pp. Обыкн. садовая. Черенками изъ полузрѣлаго роста, въ песокъ, подъ стекломъ.

**О. Гунниана** (O. Gunniana, Гунна). Тасманія. Цв. головки бѣлыя, въ сентябрѣ. 3 ф. Син. *Eurybia Gunniana* (Eurybia Gunniana). **О. дентата** (O. dentata, зубчатая). Австралія. Цв. головки розовыя съ бѣлымъ, весной. Почти выноса. кусты. **О. Хаастіи** (O. Haastii, Хааста). Нов. Зел. Цв. головки бѣлыя, въ августѣ. Наиболее выносливый кустарный видъ.

**ОЛЕНДОРФІЯ** (Olendorffia). Д-ръ *Олендорфъ* (Olendorff)—извѣстный голландскій ученый. С. норичниковыхъ. (9). Троп. Африка, Нубія. Оранжев. кустар. или трав. pp. Песков. торф. Черенками изъ полузрѣлаго роста, въ умѣренномъ теплѣ, или сѣменами.

**О. прокумбенсъ** (O. procumbens, распростертая). Ю. Африка. Цв. голубые, въ августѣ. 2½ ф. Низкій кустарникъ.

**ОЛЕНІЙ ЯЗЫКЪ.** См. Сколопендріумъ.

**ОЛИВКОВОЕ ДЕРЕВО.** См. Олеа.

**ОЛЬСТОНІЯ** (Alstonia). *Ольстонъ* (Alston)—былъ проф. въ Единбургѣ. С. кутровыхъ. (30). Троп. Азія, Австралія, ос. Южн. Океана. Теплич. дрв. или куст. pp. Торфяная съ глин. дерн. и пескомъ. Размн. черенками, въ песокъ и теплѣ. **О. сколарисъ** (O. scolaris, школьная). Индія. Цв. бѣлые, въ мартѣ—маѣ. 8 ф. Син. *Echites scolaris* (Echites scolaris).

**ОЛЬДФЕЛДІЯ** (Oldfieldia). *Ольфельдъ* (Oldfield)—торговецъ въ Сьерра-Леоне. С. молочайныхъ. (1). Троп. Зап. Африка. Тепл. дерево. Глин. дерн. листов. и песокъ. Черенками.

**О. африканъ** (O. africana, африканская). Извѣстны только мужскіе цв., собранные въ малые полузонтики. Лл. дланевидные съ 5—7 долями. Древесина считается африканскимъ дубомъ или текомъ.

**ОЛХА.** См. Альнусъ.

**ОЛЯКСЪ** (Olaх). *Olaх*—борода. Цв. борозчатые, настельные. С. молаксныхъ. (22). Австралія. Троп. Азія и Африка и Мадагаскаръ. Тепл., часто вьющіеся, куст. или полукуст. pp. Песков. торф съ листов. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ песокъ, въ парникъ.

**О. имбриката** (O. imbricata, настельный). Остиндія. Цв. бѣлые, настельные, въ декабрь. Вьющ. куст. раст.

**ОМФАЛЕА** (Omphalea). *Omphalos*—челнокъ, по пылинкамъ. С. молочайныхъ. (8). Мадагаскаръ, Троп. Америка. Тепл. вьющ. куст., рѣдко дрв. pp. Торф. съ глин. дерн. Черенками въ песокъ, въ парникъ.

**О. триандра** (O. triandra, трехтычинковая). Ямайка. Цв. однодомные, безлестные; лл. овальные или сердцевидные; плоды желтые, шаровидные. Сокъ, превращающійся въ черныя, употребляется какъ чернила. Плоды, по извлеченіи ядовитаго зародыша, съѣдомые.

**ОМФАЛОДЕСЪ** (Omphalodes). *Omphalos*—челнокъ и *eidōs*—сходство; по сѣменамъ. С. бурачниковыхъ. (10). Европа, С. Африка, З. и Центр. Азія и Японія. Одно- и многол. выноса. трав. pp. Садовая обыкн. Дланиемъ весной, или сѣменами тогда же.

**О. верна** (O. verna, весенняя). Ю. Европа. Цв. голубые съ бѣлымъ горлышкомъ, весной до мая. Многолѣтнее, размножающееся усамъ, какъ земляника. **О. линифолія** (O. linifolia, съ лл. какъ у льна). *Бѣлая незабудка*. Ю. Европа. Цв. бѣлые, рѣдко голубоватые, съ іюня до августа. 6—12 д. **О. Люциллѣ** (O. Lucillae, Люциллин). Горы Греціи и Малой Азіи. Цв. лилово-голубые, лѣтомъ. 4—6 д.

**ОМБРОМІТРЪ.** Дождемеръ. Снарядъ для измѣренія количества дождя выпадающаго на данную площадь.

**ОМЕЛА.** См. Вискумъ.

**ОНАГРИКОВЫЯ** pp. (onagraceae). Одно или многол. трав., рѣдко кустар. или дрв. pp. изъ умѣренныхъ и изъ рѣдка троп. странъ. Въ сем. около 300 видовъ, распространенныхъ по 22 родамъ. Въ числѣ послѣднихъ Гаура, Трапа, Фухсія и Энотера.

**ОНИХІУМЪ** (Onychium). *Onyx*, *onych*—коготь, по вырѣзкамъ вап. С. папоротниковыхъ. (4). Аравія, Индія, Куба, Японія. Теплич. или оранжев. Торф съ глин. дерн. и пескомъ.

**О. ауратумъ** (O. auratum, золотистый). Гималаи. Вап четвероперистыя, длин. 1 ф., шир. 6 д., дельтовидныя. Тепл. **О. японикумъ** (O. japonicum, японскій). Японія, Китай. Вап четвероперистыя, длиною болѣе фута, шир. 6 д., дельтовидно-ланцетовидныя.

Оранжев. Син. *O. capense*, *O. lucidum* (O. capense, O. lucidum).

**ОНКОСПЕРМА** (Oncosperma). *Onkos*—опухоль и *sperma*—сѣмя, по вздутой формѣ сѣмянъ. С. пальмъ. (6). Троп. Азія. Теплич. pp. 2 ч. глин. дерн., 1 ч. торфян. и 1 ч. песку. Сѣменами и опрыскиваніемъ. Обычная ползучка.

**О. фасцикулатумъ** (O. fasciculatum, пучковатый). Цейлонъ. Вап перистыя, перья длинныя, пониклыя. **О. филиментозумъ** (O. filamentosum, нитчатый). Малакка. Вап перистыя, длиною въ 10—12 ф., перья узкія, пониклыя. 40—50 ф. Син. *Arca Nibung* и *A. tigrillaria*.

**ОНОБРИХИСЪ** (Onobrychis). *Onos*—осель и *brycho*—рѣвѣть. С. бобовыхъ. (70). Оранжев. или выноса. трав. либо полукуст. pp. изъ Европы, С. Африки и З. Азіи. Песков. глин. дерн. Сѣменами, весной, на мѣсто.

**О. капутъ-гальи** (O. caput-galli, пѣтушья голова). Ю. Европа. Цв. тѣсные, въ іюлѣ, 1½ ф. **О. сатива** (O. sativa). *Зеленая Вика*. З. и Ю. Европа, С. Азія. Цв. пестрые, лѣтомъ. 2—3 ф.

**ОНОКЛЕА** (Onoclea). *Onos*—сосудъ *kleio*—закрывать, по свернутому плодоносію. С. папоротниковыхъ. (3). С. Европа, С. Америка. Оранжев. и вынослия pp. Плотная глин. дерн.

**О. германіка** (O. germanica, нѣмецкая). Сѣв. полушаріе. Вап широко-ланцетовидныя, перистыя; плодоносныя перья короткія. **О. сенсбилисъ** (O. sensibilis, чувствительная). С. Америка, С. Азія. Плодон. вап двуперистыя, безплодныя—перистыя.

**ОНОНИСЪ** (Ononis). Названіе заимствованное у Теофраста. С. бобовыхъ. (60). Европа, З. Азія, С. Африка. Оранжев. или выноса. одно-, дву- и многол. трав. pp. Обыкн. садовая. Сѣменами и дѣленіемъ.

**О. арагонензисъ** (O. arragonensis, арагонскій). Испанія. Цв. желтые, съ мая до іюля. 1—2 ф. Полувыноса. куст. р. **О. Натриксъ** (O. Natrix). *Козій корень*. Ю. Европа. Цв. желтые, съ красными жилками, лѣтомъ. 1½—2 ф. Выносливое многол. р. **О. ротундифолія** (O. rotundifolia, круглолистный). Ю. Европа. Цв. желтые, флагъ съ пурпуровыми черточками. Кустарное, полувыноса. р.

**ОНОПОРДОНЪ** (Onopordon). *Onos*—осель и *pordon*—трещащій. С. сложноцвѣтныхъ. (12). Европа, С. Африка, З. Азія. Выноса. одно-, дву- и многол. трав. pp. Обыкн. садовая. Сѣменами, весной.

**О. акантіумъ** (O. Acanthium, акантовый). Европа, Азія. Цв. го-



ловки крупные пурпуровые, въ июль. Л. съ обѣихъ сторонъ пушистые. 4—5 ф.

**ОНОСЕРИСЬ (Onoseris).** *Onos* — осель и *seris* — эндивий. С. сложноцвѣтн. (12). Ю. Америка, Бразилія. Тепл., оранже. или вынос. трав. или кустарн. рр. Легкая листовая съ глин. дерн. Съменами.

**О. дракеана (O. Drakeana, Дракова).** Нов. Гренада. Цв. головки ярко-пурпуровыя. Оранже. многол.

**ОНОСМА (Onosma).** *Onos* — осель и *osma* — запахъ, — пріятнаго запаха для осл. С. бурачникковыхъ. (70). Ю. Европа, С. Африка и З. и Сред. Азія. Вынос. трав. рр. Песков. глин. дерн. Съменами и черенками.

**О. стеллюлатумъ (O. stellulatum, звездчатая).** Румайка. Ю. Россія, Балканскій полуостр. Цв. бѣлые, желтые или лимонные, въ апрѣль. 6 д. Разновидность *таурикумъ* (*tauricum*) — крымск. и кавказск., имѣетъ цв. желтые, лѣтомъ. 6—8 д. Многол.

**ОНОСМОДИУМЪ (Onosmodium).** По сходству съ Оносма. С. бурачникковыхъ. (6). С. Америка и Мексика. Полувынос. многол. травяни. рр. Уходятъ какъ за Оносма.

**О. каролиніанумъ (O. carolinianum, изъ Каролины).** Соед. Амер. Шт. Цв. желтоватые, лѣтомъ. 1 ф.

**ОНЦИДИУМЪ (Oncidium).** *Oncos* — опухоль, по бородавчатому грешку у губы. С. орхидей. (250). Тропич. Америка и Вестиндія. Тепл. и оранже. Гилушники, торф. мохъ и волокн. торф. з. не закрывая лл. Дѣленіемъ передъ началомъ роста.

**О. амплиатумъ (O. ampliatum, съ широкой губой).** Центр. Америка и Вестиндія. Цв. свѣтло-желтые, весной и раннимъ лѣтомъ. Тепл. **О. аннуляре (O. annulare, кольчатый).** Цв. яркіе каштановые, доли съ желтыми краями, лепестки съ темно-зелеными краями, губа съ желтымъ кончикомъ, лѣтомъ. **О. барбатумъ (O. barbatum, бородастый).** Гватемала до троп. Америки. Цв. желтые, доли съ каштановыми краями, а лепестки съ красными черточками; губа съ коричневыми черточками, лѣтомъ. Тепл. **О. бикальлюмъ (O. bicallousum, съ двумя бородавками).** Гватемала. Цв. темно-коричневые, губа желтая, зимой. Тепл. **О. бифолиумъ (O. bifolium, двулистный).** Монтевидео. Цв. зеленовато-коричневые, губа золотисто-желтая, зимой. Тепл. **О. Бронлизіанумъ (O. Brunleesianum, Бронлиса).** Цв. зеленоватые съ коричневыми черточками; губа желтая съ коричневыми. **О. варикозумъ (O. varicosum, съ растянутыми нервами).** Бразилія. Цв. блѣдно-зеленые, губа ярко-желтая. У.

разновидности *Роджерси (Rogersii)* цв. золотисто-желтые съ очень большой губой. Зимой. **О. Варшэвичи (O. Warszewiczii, Варшэвича).** Коста-Рика. Цв. золотисто-желтые, губа съ четырьмя коричневыми пятнами. Сил. **О. бифронс (O. bifrons).** **О. диадема (O. diadema, диадема).** Экват. Америка, холодныя части. Цв. шоколадной окраски, губа желтая. Оранже. **О. диварикатумъ (O. divaricatum, растопыранный).** Бразилія. Цв. желтые съ коричневыми полосками и крапинками, лѣтомъ. **О. Жонесіанумъ (O. Jonesianum, Жонеса).** Цв. блѣло-охристые, губа съ желтыми ушками и блѣлой пластинкой, на которой пурпуровыя и коричневыя крапинки. **О. Кардери (O. Carderi, Кардера).** Колумбія. Цв. свѣтло-кофейные, лепестки на половину бѣлые; верхняя сторона губы желтая, а передняя — малиновая. Оранже. **О. Кавендишанумъ (O. Cavendishianum, Кавендиша).** Гватемала. Цв. желтые, Зимой. Тепл. **О. конколоръ (O. consolor, одноцвѣтный).** Оранже. горы. Цв. золотисто-желтые, рано весной. Оранже. **О. корнгерумъ (O. cornigerum, съ рогами).** Бразилія. Цв. желтые съ красными пятнами, лѣтомъ. Оранже. **О. криспумъ (O. crispum, курчавый).** Оранже. горы, Бразилія. Цв. ярко-бронзовые; губа желтая, зимой. Имѣетъ много разновидностей. **О. кукулятумъ (O. cucullatum, съ колпачкомъ).** Перу. Нов. Гренада. Цв. коричнево-пурпуровые, съ лилово-розовой губой, имѣющей темно-пурпуровыя крапинки. Оранже. Имѣетъ нѣсколько разновидностей. **О. Лансеанумъ (O. Lanceanum, Лансеанъ).** Демерара и Суринамъ. Цв. желтые съ шоколадной или розоваго цв. полосками; губа фиолетовая внизу, розовая — наверху; цв. душистые. Тепл. **О. леукохилумъ (O. leucoschilum, съ бѣлой губой).** Мексика и Гватемала. Цв. зеленоватые съ коричневыми полосками; губа сначала бѣлая, потомъ дѣлающаяся желтоватою, зимой. **О. макрантумъ (O. macranthum, крупноцвѣтный).** Центр. Америка до Перу. Цв. золотисто-желтые, съ пурпуровымъ отгиномъ, губа съ бѣлымъ грешкомъ и карминово-пурпуровыми краями, весной и рано лѣтомъ. **О. Маршалляанумъ (O. Marshallianum, Маршалльанъ).** Ю. Америка. Цв. золотисто-желтые съ коричневыми пятнышками. **О. облонгатумъ (O. oblongatum, съ продолговатыми лл.).** Гватемала. Цв. ярко-желтые, зимой. **О. орниторинхумъ (O. ornithorhynchum, птичій клювъ).** Мексика. Цв. розово-пурпуровые, издающіе запахъ какъ Хелиотропи, осенью и весной. **О. папилио (O. Papilio, мотылекъ).** Тринидадъ. Цв. блѣдно-золотисто-желтые съ каштановыми полосками; доли длинныя, напоминающія уши и хоботокъ мотылька. Теплич. Имѣетъ нѣсколько

разновидностей. **О. прѣтекстумъ (O. praetextum, окаймленный).** Бразилія. Цв. коричневатые съ желтыми краями и полосками; губа желтая съ коричневымъ краемъ, по которому разбросаны желтыя пятна и черточки. Цв. душистые. **О. рупестре (O. rupestre, со скалъ).** Перу. Цв. яркіе золотисто-желтые съ коричневыми пятнами. **О. саркодесъ (O. sarcodes, похожий на мясо).** Бразилія. Цв. оранжевые съ малиновыми крапинками и пятнами, весной. **О. сплендидумъ (O. splendidum, великолѣпный).** Гватемала. Цв. зеленые съ коричневыми полосками, губа золотисто-желтая. **О. тигринумъ (O. tigrinum, тигровый).** Мексика. Цв. бѣлые съ запахомъ фиалки; доли и лепестки свѣтло-коричневые съ темно-желтыми полосками; губа вся желтая. **О. фаленопсисъ (O. phalaenopsis, похожий на ночную бабочку).** Перу. Цв. бѣлые съ малиновыми и фиолетовыми пятнышками и крапинками; губа бѣлая съ желтымъ грешкомъ и съ такими-же какъ на доляхъ и лепесткахъ пятнами. **О. флексуозумъ (O. flexuosum, искривленный).** Бразилія. Цв. желтые съ коричневыми пятнами. У разновидности *майоус (majus)* цв. крупнѣе. **О. хризотиреусъ (O. chrysotyrus, съ желтыми кистями).** Ю. Бразилія. Цв. зеленые съ красными черточками; губа желтая. **О. Цеболлѣта (O. Ceболлѣта, Цеболлѣта).** Картагена. Цв. оранжевые съ пятнышками; лѣтомъ. **О. эксантинумъ (O. euxanthinum, красно-желтый).** Бразилія. Цв. зеленоватые съ коричневыми полосками; губа большая, желтая. **О. экскаватумъ (O. excavatum, выдолбленный).** Цв. золотисто-желтые съ свѣтло-коричневыми пятнами; губа очень выпуклая. **О. амбулумъ (O. ambulum, соперничающий).** Перу. Цв. ярко-коричневые, губа съ фиолетово-пурпуровыми пятнами и желтымъ низомъ съ красно-коричневыми черточками.

**ООГОНИЙ.** Развившаяся клѣточка низшихъ рр., составляющая женскій органъ размноженія.

**ОПАДЪ. ОПАДЕНЬ. ОПАДЫШЪ.** Плодъ опавшій самъ съ дерева. Опаденіе незрѣлаго плода не всегда происходитъ отъ вѣтра; оно случается отъ недостатка влаги въ плодѣ или вслѣдствіе сухости почвы и воздуха, либо отъ чрезмѣрнаго развитія зеленыхъ частей. Предупреждается удобреніемъ и поливкой, надлежащею обрѣзкою, а также кольцеваніемъ, смотря по причинѣ, отъ которой происходитъ опаденіе.

**ОПЕРКУЛЯРІЯ (Opercularia).** *Operculum* — крышечка, по формѣ чашечки. С. мареновыхъ. (14). Австралія. Оранже. трав. или полукуст. рр. Песков. глин.

дерн. съ небольшимъ колич. торф. и др. угл. Съменами весной или черенками, либо дѣленіемъ.

**О. аспера (O. aspera, жесткая).** Цв. голочки бѣлыя, въ июль 1 ф. Полукуст. р. Сил. **О. оцимифолия (O. ocyimifolia).** **О. хиспида (O. hispida, щетинистая).** Цв. головки бѣлыя, меньше, чѣмъ у Аспера, въ июль. 1 ф. Полукуст.

**ОПІЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ.** Употребляются какъ удобреніе, но гниваютъ медленно. Лучше ихъ смѣшивать съ навозомъ, землей и др. какимъ-либо удобрениемъ, особенно жидкимъ.

**ОПОЛИНА.** Выпалотки. Сорная выдерганная трава.

**ОПЛИСМЕНУСЪ (Oplismenus).** *Hoplismenus* — остистый. С. злаковъ. (3). Тропич. страны. Тепл. или оранже. злаки, похожие на Паникумъ. Глин. дерн. съ листов. и пескомъ. Дѣленіемъ или съменами.

**О. лоліацеусъ (O. loliaceus, похожий на Лоліумъ).** Тринидадъ. Колоски продолговатые, пучками, у нижнихъ цв. остъ второе или четвертое длиннѣе пленки; въ июль и августъ. Сил. **О. Ортопोगон лоліацеусъ (Orthopogon loliaceus).** **О. хиртеллюсъ (O. hirtellus, волосатый).** Вестиндія. Колоски широко разставленные; нижніе цв. съ остями второе и пятое длиннѣе пленки; въ июль и июль Сил. **О. Ортопогон хиртеллюсъ (Orthopogon hirtellus).**

**ОПЛОДОТВОРЯТЬ** искусственно. Наносить цвѣтъ на пестикъ, чтобы вызвать образованіе зародка. **Оплодотвореніе при участіи наскомы** было признано имѣющимъ важное значеніе въ размноженіи растений въ недавнее отпослѣднее время. Опытъ убѣдилъ, что тамъ, гдѣ прегражденъ доступъ наскомы къ цвѣтамъ, всхожихъ съмянъ растенія не даютъ. Нѣкоторые цвѣты устроены такъ, что, кажется, нарочито приспособлены для содѣйствія наскомы въ оплодотвореніи.

**ОПУНЦІЯ (Opuntia).** Название заимствованное у Плинія. С. кактусовыхъ (150). Тропич. и жаркія страны Америки. Оранже. сочныя др. или куст. рр. Глин. дерн., дренажъ и возможно больше свѣта. Мелкіе любятъ добавку толченаго кирпича. Поливка зимой — самая умеренная. Черенками, предварительно обсушенными и съменами.

**О. арборесценс (O. arborescens, древесная).** Мексика. Цв. пурпуровые, лѣтомъ. Стебли въ 5 ф. выш. **О. бразиліензисъ (O. brasiliensis, бразильская).** Бразилія. Цв. свѣтло-лимонные, въ май — июнь. Плоды желтые, шаровидные, прозрачные. Вътви горизонтальныя. 10—30 ф. **О. вулгарисъ (O. vulgaris, обыкновенная).** Мексика. Цв.



блѣдно-желтые, въ июнь. Плоды почти гладкіе, мясистые, съѣдомые. Р. распростертое съ широкими овальными сочленениями. 2 ф. О. Девизии (O. Devisia, Девиса). Нов. Мексика. Цв. бронзова-зеленоватого оттѣнка; стволъ круглый, бугорчатый. О. миссурийскій (O. missouriensis, миссурийскій). С. Америка. Цв. свѣтло-желтые, въ маѣ до июня; плоды колючіе, сухіе. Р. распростертое, сочленения плоскія, широко-овальныя, бугорчатые. О. мультифлора (O. multiflora, многоцвѣтная). Цв. желтые, лѣтомъ. Р. прямое. О. Рафинесквіи (O. Raffinesquii, Рафинеска). С. Америка. Цв. какъ у Вульгариса, но часто съ красной серединой и болѣе махровые, въ июнь. Сочленения темно-зеленыя. Наиболее выносливый видъ. О. Сальмиана (O. Salmiana, кн. Сальмъ-Дика). Бразилія. Цв. желтые съ краснымъ, въ сентябрь; р. прямое, вѣтвистое, сѣро-зеленое. 2 ф. О. Туна (Tuna, Туна). Вестиндія. Цв. красно-оранжевые, въ июль; плоды ярко-карминнаго цв. Старые стебли часто 20 ф. О. Фигусъ-индика (O. Ficus-indica, индѣйская смоква). Мексика. Цв. желтые, въ маѣ. Цв. внутри красные, овальные, съѣдомые. Стебель прямой. 2 ф. Также выносливый видъ. О. цилиндрика (O. cylindrica, цилиндрическая). Перу. Цв. желтые, въ июнь. Плоды блѣдно-зеленоватые. Стебли цилиндрическіе. 6 ф. и выше. О. эхинокарпа (O. echinocarpa, съ колючими плодами). Колорадо. Цв. блѣдно-зеленоватые, лѣтомъ. Плоды сплюснутые, очень колючіе. О. Энгельманны (O. Engelmanni, Энгельманна). Чихуахуа. Цв. желтые, съ красной серединой, въ маѣ и июль. Р. прямое въ 4—6 ф. Сравнительно съ др. выносливое.

**ОРАНЖЕРЕЙ.** Помѣщеніе для растений не выносящихъ наружнаго содержанія. Оранжерея бываетъ *холодная*, въ которой сохраняютъ рр. приостанавливающіяся въ развитіи на зиму, поэтому до-вольствующіяся малымъ свѣтомъ, незначительною поливкой и температурой, которая не доходила бы до ихъ заморозенія, и *теплая*, или собственно оранжерея—предназначаемая для такихъ породъ, кот. хотя и не боятся низкой температуры, — на нѣсколько градусовъ теплѣе 0°, но продолжаютъ рости зимою, сохраняютъ свой листъ и зацвѣтаютъ болѣею частью до того времени, какъ можно бываетъ ихъ выставить на воздухъ.

**ОРАНІЯ (Orania).** Принцъ Оранскій. С. пальмъ. (4). Малайск. арх. и Папуа. Тепл. пальмы. Песков. глин. Съ-менами.

О. макрокладусъ (O. macrocladus, съ большими вѣтвями). Малакка. Лл. перистые; плоды — односемянная ягода. 40 ф. О. регалисъ (O. regalis, королевскій).

Ява. Лл. лирообразные, выемчатые; плоды красные, въ маслину. Стволъ низкій.

**ОРВАЛІА (Orvala).** По французскому названію (oryvale) Сальвіа хорминіумъ. С. губоцвѣтныхъ. (1). Юж. Европа. Выносл. многол. трав. Земля обыкн. садовая. Съ-менами или дѣленіемъ корней осенью.

О. ляміодесъ (O. lamioides, похочая на Ляміу). Цв. красно-пурпуровые или фіолетовые и бѣлые, въ апрѣль. 1½ ф.

**ОРГАНІЗМЪ** Стройное цѣлое оруднаго устройства.

**ОРГАНІЧЕСКІЙ.** Который имѣетъ части для питанія и претворенія пищи.

**ОРГАНОГЕНЪ.** Четыре начальныхъ вещества (углеродъ, кислородъ, водородъ и азотъ) живой кѣточки рр.

**ОРГАНЪ.** Часть растенія.

**ОРЕОДОКСА (Oreodoxa).** Oreos — гора и doxa — слава. С. пальмъ. (5). Тепл. пальмы изъ троп. Америки. Глин. дерн. съ небольшимъ колнч. торф. и песку. Общій уходъ какъ за Фениксы.

О. regia (O. regia, королевская). Куба. Лл. перистые, сегменты длиной отъ 6 до 12 д., шириной въ 1 д., ярко-зеленые.

**ОРЕОПАНАКСЪ (Oreopanax).** Oreos — гора и Panax — С. аралиевыхъ. (64). Тепл. куст. или древ. рр. изъ тропич. Америки, преимущ. съ Андскихъ горъ. Глин. дерн. Черенками изъ молодого роста.

О. Андреанумъ (O. Andreanum, Андрѣ). Анды Эквадора. Цв. головками, лл. эллиптич., цѣльные. О. пельтатумъ (O. peltatum, щитовидный) Мексика. Цв. зеленоватые, шаровидными головками; лл. кожистые, округло-сердцевидные, щитовидные или 3—5 лопастные. О. ксалапензенъ (O. xalapense, яланпый). Мексика. Цв. зеленоватые, головками, въ апрѣль. Лл. перистовидные съ 5—7 листочками. 6 ф. Кустъ. Сил. *Аралія ксалапензенсис* и *Хедера ксалапензенсис* (Aralia xalapensis, Hedera xalapensis).

**ОРИГАНУМЪ (Origanum).** Древне-греческое названіе. С. губоцвѣтныхъ. (25). Средиземн. побережье, Европа, вѣв. троп. Азія. Выносл. или полувыносл. трав. многол. или полукуст. рр. На землю не разборчивы. Съ-менами и черенками изъ молодого роста.

О. вульгаре (O. vulgare, обыкновенный). Душица. Европа. Цв. пурпуровые, лѣтомъ. 1—2 ф. О. майорана (O. majorana, Майорана). С. Африка. Цв. пурпуровые или бѣлые, въ июль. Лл. овальные. 1—2 ф. Сил. О. майораноидесъ, *Майорана хорменсис* (O. majoranoides, Majorana hortensis).

**ОРЛЯНКА.** См. Бикса.

**ОРМОЗИЯ (Ormestia).** Hormos — оже-ралье, по употребленію сѣмянъ. С. бобо-

выхъ. (18). Троп. Азія и Америка. Тепл. деревья. Глин. дерн. съ листовой. Съ-менами или черенками изъ полурѣзлаго роста въ песокъ и парникъ. Темп. зимой 7—10, лѣтомъ 13—24°.

О. кокцінеа (O. coccinea, шарлаховая). Гвіана. Цв. голубые, въ июнь. Съмена шарлаховые съ чернымъ пятномъ на одномъ концѣ, вродѣ бусины. Ихъ называютъ для ожеребля. 10—20 ф.

**ОРМОКАРПУМЪ (Ormocarpum).** Ormos — цѣпь и karpas — плодъ, по стручку, имѣющему видъ цѣпи. С. бобовыхъ. (6). Тепл. или оранж. куст. рр., широко распростр. въ между-троп. Азіи и Африкѣ; нѣкот. растутъ въ троп. Африкѣ и Мексикѣ. Торф. съ глин. дерн. Черенками изъ полурѣзлаго роста.

О. корониллоидесъ (O. coronilloides, похочій на Корониллю). Троп. Африка. Цв. блѣдно-желтые, въ маѣ; лл. непарно-перистые.

**ОРНАМЕНТАЛЬНОЕ** садоводство. Разведеніе и воспитаніе особенно красивыхъ, преим. лиственныхъ растений.

**ОРНАМЕНТАЛЬНЫЕ ЗЛАКИ** употребляютъ въ садоводствѣ съ двойною цѣлью: дать красоту насажденію и воспользоваться цвѣточными частями для букетовъ изъ сухихъ цвѣтовъ. Такіе злаки — преимущественно однолѣтніе, но тѣмъ-же цѣлямъ удовлетворяютъ и многолѣтніе, глав. образомъ Арундо коненикуа, Гиперіумъ аргентеумъ и Стипа пенната. Однолѣтніе можно сѣять на воздухъ, рано весной; если желаютъ собрать ихъ цвѣточные части, то должно ихъ срѣзать за нѣсколько дней до созрѣванія сѣмянъ и сушить исподволь въ прохладномъ мѣстѣ. Полезно однолѣтніе злаки выводить какъ двулѣтніе, т. е. сѣять съ начала осени. Они, правда, въ тотъ-же годъ не зацвѣтутъ, но въ слѣдующемъ разрастутся кустами и дадутъ болѣе крупныя соцветія.

**ОРНИТИДИУМЪ (Ornithidium).** Ornithos, ornithos — птица и eidos — похочій; верх. часть рыльца какъ птичій клювъ. С. орхидей. (20). Троп. Америка, отъ Бразиліи до Вестиндіи. Тепл. эпифиты. Волокн. торф., съ торф. мохомъ и древ. углемъ.

О. дѣноумъ (O. densum, плотный). Мексика. Цв. бѣлые или пурпуровые. О. кокцінеумъ (O. coccineum, шарлаховый). Ямайка. Цв. красные, въ июнь.

**ОРНИТОГАЛИУМЪ (Ornithogalum).** Названіе заимствованное у Діоскорида, отъ ornithos, ornithos — птица и gala — молоко: цвѣты бѣлы какъ молоко или какъ скорлупа куриного яйца. С. лилейныхъ. (70) Европа, Востокъ, Африка. Выносл., полувывосл. и оранж. луков. рр. Земля

обыкн. садов. Отпрысками. Упоминаемые ниже — почти выносливы.

О. арабікумъ (O. arabicum, арабскій). Египетъ. Греція. Цв. бѣлые съ черною серединой, пахучіе, лѣтомъ; 1—1½ ф. (полу-выносл.). О. нарбоненъ (O. narbonense, изъ Нарбоны). Ю. Европа. Цв. млечно-бѣлые, весной или рано лѣтомъ. 1½—2 ф. О. нутансъ (O. nutans, пониклый). Ю. Европа. Цв. бѣлые на верхней, зеленоватые на нижней сторонѣ, въ маѣ. О. пирамидале (O. pyramidale, пирамидальный). Испанія. Цв. бѣлые съ зелеными черточками, лѣтомъ. 1½—2 ф. О. тирсоидесъ (O. thyrsoides, тирсовый). М. Д. Н. Цв. желтые, въ июнь. Оранж. О. умбелля-тумъ (O. umbellatum, зонтичный). Брондушки. Европа. Цв. бѣлые, въ маѣ.

**ОРНИТОГЛОССУМЪ (Ornithoglossum).** Ornithos, ornithos — птица и glossa — языкъ, по лепесткамъ. С. лилейныхъ. (2). Южн. Африка. Оранж. луков. рр. Песк. глин. дерн. Отпрысками.

О. глянцумъ (O. glaucum, сизый). Цв. зеленые съ пурпуровымъ, въ декабрь. 6 д. О. ундулятумъ (O. undulatum, волнистый). Цв. зеленые съ пурпуровыми черточками, въ сентябрь. 6 д.

**ОРНИТОХИЛЮСЪ (Ornithochilus).** Ornithos, ornithos — птица и cheilos — губа, по формѣ губы. С. орхидей. (2). Бурма и Гималаи. Тепл. эпифиты. Уходъ какъ за Азридесъ.

О. фюкусъ (O. fuscus, буроватый). Патаг. Цв. желто-бурые съ пурпуровыми полосками, съ запахомъ. Сил. *Азридесъ дифформе* (Aerides difforme).

**ОРНИТОЦЕФАЛУСЪ (Ornithocephalus).** Ornithos, ornithos — птица и kephale — голова; по рыльцу и пылыку. С. орхидей. (20). Троп. Америка отъ Бразиліи до Мексики. Тепл. эпифиты. На чуркѣ. Общій уходъ какъ за Эпидендумъ.

О. грандифлорусъ (O. grandiflorus, крупноцвѣтный). Цв. желтые.

**ОРОВУСЪ (Orobus).** Названіе взятое у Теофраста. С. бобовыхъ. Обширный родъ общино выносливыхъ многол. трав. рр.; распространенныхъ по сѣв. полушарію. На землю не разборчивы; размнож. дѣленіемъ корня весной.

О. аурантиусъ (O. aurantius, оранжевый). Кавказъ. Цв. темно-желтые, въ июнь. 1½ ф. О. вернусъ (O. veranus, весенній). Горлянка. Европа. Цв. пурпуровые и голубые, съ красными жилками, весной. 1 ф. О. панноникусъ (O. pannonicus, венгерскій). Ю. Европа. Цв. отъ розоватыхъ до пурпуровыхъ и желтыхъ, въ маѣ 1 ф. О. фляксидусъ (O. flaccidus, вилый). Кроація. Цв. пурпуровые, въ маѣ. 6 ф.

**ОРОКСИЛЮМЪ (Oroxylum).**



*Oros* — гора и *xylon* — лѣсъ, по мѣсту произрастанія. С. биньонійныхъ. (1). Тепл. дерево. Глн. дерн. съ лист. и пескомъ. Съеменами или черенками въ парникѣ.

**О. индикумъ** (*O. indicum*, индйскій). Индія и Малайскій архип. Цв. бѣловатые съ пурпуровыми черточками; лл. 2 или 3-перистые. 40 ф.

**ОРОНТИУМЪ** (*Orontium*). Древне-греческое названіе, потому что будто бы растетъ по р. Оронту. С. орхидей. (1). С. Америка. Водное р. Сажать въ воду глыбиною въ 6—12 д. Размн. дѣленіемъ.

**О. аввадикумъ** (*O. aquaticum*, водяной). Цв. на узкомъ початкѣ, въ маѣ; лл. продолговатые, на длинныхъ ножкахъ.

**ОРТРОЗАНТУСЪ** (*Orthrosanthus*). *Orthros* — утро и *anthos* — цв.; цв. распускаются рано утромъ. С. косатиковыхъ. (7). Анди и вѣтроп. страны Ю. Америки и 3. Австраліи. Глн. дерн. съ листовою. Дѣленіемъ корневища.

**О. мультифлорусъ** (*O. multiflorus*, многоцвѣтный). Австралія. Цв. лазуревые, въ маѣ до іюля. 1 ф. **О. шимборацѣнзисъ** (*O. chimboracensis*, шимборазскій). Перу. Цв. голубые, 1 ф.

**ОРТОСИФОНЪ** (*Orthosiphon*). *Orthos* — прямой и *siphon* — кривая трубка; по цв. трубкѣ. С. губоцвѣтныхъ. (16). Тепл. или оранж. многол. трав., полукуст. или куст. рр. изъ Остивдіи, троп. Африки, Малайскаго архип. до Австраліи. Песков. глн. дерн. съ волокнист. торф. Черенками изъ полузрѣлаго роста.

**О. инкурвусъ** (*O. incurvus*, искривленный). В. Индія. Цв. бѣдно-шарлаховые, въ маѣ. 1 ф. **О. стаминѣусъ** (*O. stamineus*, съ длинными тычинками). Троп. Азія. Цв. бѣдно-лиловые, въ іюль 2 ф. Тепл.

**ОРТОЦѢРАСЪ** (*Orthoceras*). *Orthos* — прямой и *keras* — рогъ; по вѣтшней долѣ. С. орхидей. (1). Оранж. земная орхидея, пуждающаяся въ такомъ же уходѣ какъ Діза.

**О. соландри** (*O. Solandri*, Солиндра). Австралія и Нов. Зеландія. Цв. зеленоватые. 1—2 ф.

**ОРУДІЕ**. Инструментъ или снарядъ для произведенія извѣстнаго дѣйствія. (У иѣмца на все струментъ есть).

**ОРФИУМЪ** (*Orphium*). По мифологическому Орфею. С. горечавковыхъ. (1). Оранж. куст. р. Уходъ какъ за Хироніи.

**О. фрутесценсъ** (*O. frutescens*, кустовой). М. Д. Н. Цв. красные; лл. линейные, сидячіе. 1—2 ф.

**ОРХИДЕИ**. Чрезвычайно многочисленное сем. односѣменодольныхъ рр.; одно изъ самыхъ естественныхъ. Состоитъ изъ

травянистыхъ земныхъ многолѣтнихъ породъ съ клубневыми корнями, изъ эпифитовъ (съ луковичками или безъ нихъ), растущихъ обычно на стволахъ деревьевъ, на которыхъ укрѣпляются длинными своими случайными корнями, либо изъ породъ развивающихся на гніющихъ тѣлахъ (сапрофитовъ). Родовъ 334, видовъ до 5,000, распределяемыхъ на пять отдѣловъ (*Epidendreae*, *Vandaeae*, *Neottiaeae*, *Ophrydreae*, *Cypripedieae*). Распространены по всей поверхности земного шара.

**ОРХИСЬ** (*Orchis*). Старинное названіе, по клубнямъ. С. орхидей. (80). Европа, умѣр. Азія, Сѣв. Африка, С. Америка, Маскаренскіе о. Земп. болѣею частью выноса. орхидей. Глубокая сильная. Дѣленіемъ. Не терпятъ пересадки; если она необходима, то дѣлается осенью.

**О. латифолия** (*O. latifolia*, широколистный). *Кукушкины слезки*. Европа, Азія. Цв. пурпуровые или красные, въ іюнь. Лл. ланцетовидные съ темно-пурпуровыми пятнами. 1 ф. **О. макулата** (*O. maculata*, пятнистый). *Змѣевикъ*. Европа, Азія. Цв. свѣтло-пурпуровые или бѣлые, въ маѣ. Лл. ланцетовидные съ буро-пурпуровыми пятнами. 1 ф. **О. пурпуреа** (*O. purpurea*, пурпуровый). Европа. Цв. снаружи зелено-пурпуровые, внутри свѣтлѣе съ крапинками, въ маѣ. Лл. продолговато-тупые. Сип. **О. фуска** (*O. fusa*). **О. фоліоза** (*O. foliosa*, листовая). Мадера. Цв. пурпуровые, въ маѣ лл. безъ пятенъ, продолговатые. 1 1/2—2 ф.

**ОРЪХОВЫЯ** рр. (*Juglandaceae*). Дрв. и куст. рр., преим. изъ Сѣв. Америки. Въ сем. этомъ 5 родовъ и 30 видовъ. Главнѣйшіе роды Карія и Юглансъ.

**ОРЪХЪ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКІЙ**. См. Кориліусъ.

**ОРЪХНИКОВЫЯ** или **ЛѢЩИКОВЫЯ** рр. (*Corylaceae*), заключающія роды Кариниусъ, Кастанея, Кориліусъ и Фагусъ, присоединены теперь къ сем. плюсковыхъ.

**ОСБЕКІЯ** (*Osbeckia*). Шведскій пасторъ *Озбекъ* (*Peter Osbeck*) — писатель-ботаникъ XVIII стол. С. черноустовыхъ. (36). Остивдія, Китай, Японія, Малайскій арх. и Австралія. Тепл. трав., полукуст. и куст. рр. Уходъ какъ за Меластомомъ.

**О. глянца** (*O. glauca*, сизал). Индія. Цв. красные или пурпуровые, въ іюль. 2 ф. **О. рострата** (*O. rostrata*, съ носкомъ). Бенгалъ. Цв. малиново-розовые. Кустъ.

**ОСЕННИКОВЫЯ** рр. (*colchicaceae*). Отдѣлъ сем. линейныхъ; къ этому отдѣлу относятся Буббокодѣмъ, Кольхикумъ, Мерендера и Синсифонъ.

**ОСЕНЬ**. Время года межъ лѣта и зимы; три мѣсяца, въ кои солнце проходить

знаки вѣсовъ, скорпіона и стрѣльца, — сентябрь, октябрь и далѣе до снѣжнаго пути и рѣкостава.

**ОСИНА**. См. Популюсъ.

**ОСМАНТУСЪ** (*Osmanthus*). *Osmе* — приятный запахъ и *anthos* — цв. С. масличныхъ. (7). С. Америка, В. Азія, о. Тихаго океана. Уходъ какъ за Олею.

**О. аквифолиумъ** (*O. aquifolium*, съ лл. какъ у Илекса). Японія. Цв. бѣлые, очень душистые; лл. напоминающіе илековые. Имѣть разновидности: *илицифоліусъ* (*ilicifolius*) съ болѣе мелкими лл. и *муртифоліусъ* (*myrtifolius*) съ болѣе плотными ростомъ и лл. безъ колючекъ. **О. фрагрансъ** (*O. fragrans*, душистый). Японія, Китай. Цв. желтоватые, душистые, съ іюля до августа; лл. эллиптически-ланцетовидные, зубчатые. Сип. *Олеа фрагрансъ* (*Olea fragrans*), извѣстное комнатное р. слышущее подъ названіемъ *Чайнаго дерева*.

**ОСМУНДА** (*Osmunda*). *Осмундербъ* — скандинавское божество. С. папоротниковыхъ. (6). Повсемѣстно. Оранж. или выносливыя рр.

**О. Клейтоніана** (*O. Claytoniana*, Клейтонова). С. Америка и Гималаи. Вап 1—2 ф. длиной, 6—12 д. шир.; перья ланцетовидныя. Сип. **О. интегритта** (*O. integrifolia*). **О. регалисъ** (*O. regalis*, королевская). *Чистоусъ*. Европа. Вап 2—6 ф. длиной, 1 и болѣе шир., двуперистыя; безплодны. перья 6—12 д. длин.; плодоносныя — въ видѣ метелки. Имѣть вѣсколку формъ. **О. циннамомеа** (*O. cinnamomea*, коричневая). Отъ Канады до Орегона, Японія. Вап безплодный перистый, 2—3 ф. длиной и 6—8 д. шир., плодоносныя меньше, ланцетовидныя. **О. яваніка** (*O. javanica*, яванская). Отъ Камчатки до Явы и Цейлона. Вап въ 1 до 3 ф. длиной, въ 8—12 д. шириной, перистыя; нижнія перья плодоносныя.

**ОСНОВНОЙ**. Нижній, находящійся при основаніи, — зародившій бывасть основнымъ, когда находится въ нижнемъ концѣ стѣмни.

**ОСОВЪ**. Недѣлимое; индивиду; всякое отдѣльное растеніе.

**ОСОКОРЪ**. См. Популюсъ.

**ОСОЧИТЬ** дерево. Подсѣчь или снять всю кору кольцомъ, приготовляя его къ срубкѣ, или выцѣживая сокъ, — березовицу, смолу и пр.

**ОССЕА** (*Ossaea*). *Донъ Антонио Де ла Осса* (*Don Antonio de la Ossa*) — директоръ бот. сада въ Хаваннѣ. С. черноустовыхъ. (40). Троп. Америка. Тепл. или оранж. куст., либо полукуст. рр. Уходъ какъ за Меластомомъ.

**О. фасцикулярісъ** (*O. fascicularis*,

пучковая). Ямайка. Цв. бѣлые; лл. эллиптически. 6—10 ф.

**ОСТРІА** (*Ostrya*). Названіе, взятое у Теофраста. С. лѣщичиныхъ. (2). Умѣр. страны сѣв. полушарія. Америка. Выноса. въ умѣр. климатѣ дрв. рр., близкія къ Кариниусу. Обыки. садовая. Съеменами.

**О. виргиніка** (*O. virginica*, виргинская). В. Соед. Амер. Штаты. Цв. зеленоватые, въ маѣ. 15—40 ф.

**ОСТРОСѢМЯННЫЯ** рр. (*athrospermaceae* s. *monimiaceae*). Дрв. или куст. иногда выходящая рр. жаркихъ странъ Азіи и Америки, съ Маскаренскихъ о., изъ Австраліи и юж. о. Тихаго океана. Видовъ 150, родовъ 22, въ томъ числѣ Лаурелія, Монимія и Поймусъ.

**ОСТЬ**. Щетинистый усикъ на плевелѣ зерна колосовыхъ растеній.

**ОСЪ**. Стержень. Линія проходящая чрезъ середину тѣла. Осъ растенія входящая — стебель, нисходящая — корень.

**ОТАКАНТУСЪ** (*Otacanthus*). *Ous*, *otos* — ухо и *acanthos* — колючка, по колючимъ лл. С. акантовыхъ. (2). Ю. Америка. Тепл. куст. или полукуст. рр. Уходъ какъ за Руелія.

**О. цѣрѣлеусъ** (*O. coerulescens*, лазуревый). Бразилія. Цв. сине-пурпуровые; лл. супротивные съ большими зубчиками.

**ОТБИВАТЬ**. Отбить дорожки для сада, означая черты по колышкамъ. Отбивать косу, оттигивая холодной ковкой на бабкѣ жало лезвия.

**ОТВОДИТЬ**. Размножать отводкой, — пригнуть вѣтвь и засыпать ее землею, чтобы пустила корни, а потомъ отрезать и пересадить ее. При отводкѣ отдѣляемыя части пускаютъ корни, питаются еще произведшимъ ихъ растеніемъ. Употребляется отводка преимущественно въ тѣхъ случаяхъ, когда черенки прирастаютъ туго. Она основана на привлеченіи образоват. сока къ части, кот. способна пустить корень, и производится наклоненіемъ отводной части и закрытіемъ ея землей, а чтобы она держалась — припиливаніемъ костылькомъ, или пропускаемъ этой части сквозъ землю или влажный мохъ. Въ тѣхъ случаяхъ, когда необходимо отчасти прервать прохожденіе сока, отводимая часть надрубывается различнымъ образомъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ закрывается землей. Для укорененія отводка необходимо содержать землю, въ которую онъ проведенъ, постоянно и равномерно влажною. Отдѣлять отводокъ можно только тогда, когда онъ дастъ надежашіе корни.

**ОТВОДОКЪ**. Сучекъ, вѣтка пустившая корень.



**ОТВОДЧИВОЕ** дерево или кустарное растение. Легко дающее отводки.

**ОТЕРА** (Othera). Японское мѣстное название. С. пядубовыхъ. (1). Соединить съ Илексъ, подобно которому и воспитывается.

**О. японика** (O. japonica, японская). Япония. Цв. белые; лл. овальные, тупые.

**ОТЗЫМЪЕ. ОТЗЫМОКЪ.** Последнее весеннее морозы. Поздняя весна.

**ОТКЪТЫВАТЬ. ОТКЪТАТЬ.** Раскutatъ, раскрыть закутанное растение.

**ОТЛУЧАТЬ.** Отдѣлять. Отдалять. Отлучить приросшіи отводки. Отлучить вѣтви отъ листьевъ, чтобы были шире.

**ОТНОГА. ОТНОЖИНА.** Сучья, воздушные корни, достигающие земли и укореняющіеся въ ней, какъ у Фикуса, Филодронда и др.

**ОТОННА** (Othonna). Древне-греческое название, отъ *othone* — полотно, по ровной и мягкой поверхности лл. С. сложноподвѣтныхъ. (80). Юж. Африка. Оранжевый куст. или полукуст., либо трав. рр. Рыхлая скважистая. Черенками.

**О. краассифолия** (O. crassifolia, съ сочными лл.). Цв. желтые, головками. Хороша для подвѣсныхъ вазъ. **О. пектината** (O. pectinata, гребенчатая). Цв. головки желтыя, въ маѣ и июнѣ. 2—3 ф.

**ОТОННОПСИСЪ** (Othonnopsis). *Othonna* и *opsis* — похожий на Отонна. С. сложноподвѣтныхъ. Персія, Юж. Африка, С. Америка. Оранжевый куст. рр. Легкая глин. дерн. Дѣленіемъ или черенками.

**О. хейрифолия** (O. cheirifolia, съ лл. какъ у Желтофіолы). С. Америка. Цв. головки ярко-желтыя, рано лѣтомъ. 8—12 д.

**ОТОХИЛЮСЪ** (Otochilus). *Ous*, *otos* — ухо и *cheilos* — губа; по ушку у губы. С. орхидей. (4). Гималаи и Бурма. Тепл. эпифитъ. Торф. съ торф. мхомъ и др. углемъ.

**О. фразгансъ** (O. fragrans, душистый). Наталь. Цв. белые, въ июнѣ. Сил. *Tetrapeltis fragrans* (Tetrapeltis fragrans).

**ОТПЛОДЪ.** Побѣгъ. Отростокъ. Отпрыскъ.

**ОТРАСЛЬ.** Отпрыскъ, побѣгъ, новый сучокъ, погонъ, отростокъ отъ корня.

**ОТПРЫСКЪ.** Молодой лѣтний побѣгъ изъ стебля или отъ корня.

**ОТРОДОКЪ** Огросль. Побѣгъ отъ корня. Молодая луковица, которую можно отдѣлить, — дѣтко.

**ОТСАДОКЪ.** Часть отсаженная отъ растения. **ОТСАДЧИВОЕ** растение. Приживчивое.

**ОТСАЧИВАТЬ.** Говорятъ дерево от-

сочило, когда совершилось нисхождение сока и листья стали блекнуть.

**ОТТЕЛІЯ** (Ottelia). Мѣстное на Малабарѣ название этихъ рр. — *Ottelia*. С. лягушниковыхъ. (7). Троп. Азія, Японія, Австралія, Маскаренскіе о., троп. Африка и Бразилія. Тепл. или оранж. водяныя трав. рр. — Сѣменами.

**О. индика** (O. indica, индійская). Ост-индія. Цв. белые, въ августѣ; лл. широко-овальные. **О. овалифолия** (O. ovalifolia, съ овальными лл.). Австралія. Цв. зеленые снаружи, желтые внутри. Лл. овальные.

**ОУРИЗИЯ** (Ourisia). *Ouyris* (Ouris) — губернаторъ Фалландскихъ о., доставившій р. Коммерсону. С. норичниковыхъ. (18). Нов. Зеландія, Тасманія, Антарктическая Америка. Выпосл. или полувыв. многол. трав. рр. Глин. дерн. песк. Дѣленіемъ корней.

**О. кокинеа** (O. coccinea, шарлаховая). Анды въ Чили. Цв. шарлаховые, въ маѣ до сентябри. 6—12 д. **О. Пирсеи** (O. Pearcei, Пирса). Чили. Цв. малиновые; лл. овальные, на нижней сторонѣ пурпуровые.

**ОФИЦИНАЛЬНОЕ** растение. Употребительное во врачеваніи.

**ОФИОГЛОССУМЪ** (Ophioglossum). *Ophios* — змѣя и *glossa* — языкъ, по плодосной ваѣ. С. папоротниковыхъ. (10). Космополитныя рр. Тепл., оранж. и выпосланыя.

**О. бульбозумъ** (O. bulbosum, луковичный). С. Америка. Ванъ въ 2—4 д. длиной, безплодный равнѣствленіи не доходя до половины. Полувын. **О. пальматумъ** (O. palmatum, дланевидный). Куба. Ванъ похожій по формѣ на букву V, разраставшійся на глубокія, тупыя лопасти; плодосныхъ колосовъ въ 2—12. Тепл. **О. вульгатуръ** (O. vulgatum, обыкновенный). Ужовникъ. Европа. Ванъ длиной въ 6—9 д., безплодные раздѣлы обычно посрединѣ, овальные или продолговато-овальные; плодосный колосъ длиной въ 1 д. или болѣе на длинной ножкѣ. Имѣетъ нѣсколько разновидностей.

**ОФИОКАУЛОНЪ** (Ophioscaulon). *Ophis* — змѣя и *caulon* — стебель, по вьющемуся росту. С. кавалерниковыхъ. (4). Троп. Африка, Наталь и Мадагаскаръ. Тепл. вьющ. травяни. рр. Песков. глин. дерн. съ листовой, при посадкѣ въ грунтъ и развѣзкѣ вдоль шпаль. Остерегаться излишней влажности. Размножается какъ Пассифлора.

**О. циссампелойдесъ** (O. cissampeloides, похожая на Циссампелосъ). З. троп. Африка. Цв. полувонючими; лл. темно-зеленые съ белыми разводами. Сил. *Пассифлора мрамората* (Passiflora marmorata).

**ОФРИСЪ** (Ophrys). Греч. название, употребленное Плиніемъ, быть можетъ по *ophrys* — брови, въ намекъ на бахромчатые внутр. доли, хотя Плиній объясняетъ употребленіемъ р. для крашенія бровей. С. орхидей. (30). Европа, З. Азія, С. Африка. Землиныя оранж. или выпосл. рр. Песков. или мѣловая глин. дерн. Дѣленіемъ корней.

**О. апифера** (O. apifera, пчелиный). Европа. Цв. съ зеленоватыми долями и розовыми лепестками, въ апрѣлѣ. 1 ф. **О. лютеа** (O. lutea, желтый). Ю. Европа. Цв. съ зелеными долями и желтыми лепестками, губа золотисто-желтая. 4—7 д. Сил. *О. веспифера* (O. vespifera). О. спекулюмъ (O. speculum, зеркальце). Ю. Европа. Цв. зеленые, губа голубая съ желтыми краями, обвѣданными коричневыми. 4—12 д.

**ОФТИА** (Oftia). Происхожденіе названія не объяснено. С. мышечниковыхъ. (2). Юж. Африка. Оранжевый куст. рр. Легкая, сильная. Черенками въ песокъ и въ парникъ.

**О. африкана** (O. africana, африканская). Цв. белые, съ февраля до полярна. 3 ф.

**ОХВОСТЬЕ.** Легкое зерно, сѣмя. Вѣтхій ворохъ состоитъ изъ *оульи*, *оульки*, или *головизны*, изъ *середи* и *охвосты*.

**ОХНА** (Ochna). Древне-греческое названіе груши, на лл. которой рр. этого рода похожи. С. охновыхъ. (25). Троп. Азія и троп. юж. Африка. Теплич. куст. Песков. торф. и волоки. глин. дерн. Черенками изъ полувзрѣлаго роста. Темп. зимой 7—12, лѣтомъ 13—24°.

**О. атропурпуреа** (O. atropurpurea, черно-пурпуровая). М. Д. Н. Цв. съ желтыми лепестками и темно-пурпуровой чашечкой. 4 ф. **О. мультифлора** (O. multiflora, многоцвѣтная). (Терра-Леоне. Цв. желтые, скороотвѣтвляющіе, весной. Плоды красно-малиновые. 4—5 ф.

**ОХНОВЫЯ** рр. (ochnaceae). Древесныя или кустарныя рр., встречаемыя по всей земной поверхности, но предпочтительно въ Америкѣ. Всѣхъ видовъ 140, а родовъ 12, изъ которыхъ главнѣйшій Гомфія.

**ОХРОКАРПУСЪ** (Ochrocarpus). *Ochros* — желтый и *karpos* — плодъ. С. гумикутовыхъ. (6). Азія, троп. Африка, Маскаренскіе о. Тепл. деревья. Песков. глин. дерн. Черенками изъ зрѣлаго роста, не отнимая лл., въ песокъ, въ парникъ.

**О. африканусъ** (O. africanus, африканскій). Троп. Африка. Цв. многодомные; плоды большіе, въ два кулака, съ желтою мякотью. Лл. продолговатые, содержащіе желтогуб. смолистое вещество. 60 ф. Сил. *Маммеа африкана* (Mammea africana).

**ОХРОМА** (Ochroma). *Ochros* — желтый, блѣдный. По окраскѣ цв. С. маляво-выхъ. (1). Вестиндія. Тепл. древ. р. Сильная песков. глин. дерн. Черенками изъ полувзрѣлаго роста въ песокъ, въ парникъ.

**О. лягопусъ** (O. lagopus, заячья лапка). Цв. блѣдно-коричневые или желтоватые, крупныя. Лл. сердцевидныя. 40 ф.

**ОХРОЗИЯ** (Ochrosia). *Ochros* — желтый, по цв. С. кутровыхъ. (12). Маскаренскіе о., троп. Австралія, о. Малайского архип. и Тихого океана. Тепл. древ. рр. Уходъ какъ за Табернэмонтой.

**О. борбоника** (O. borbonica, съ о. Бурбона). Цв. белые, довольно большіе, въ июнѣ. 20—40 ф. Сил. *О. макулата* (O. maculata). О. эллиптика (O. elliptica, эллиптическая). Куинслендъ. Цв. желтые; лл. эллиптическіе.

**ОХРОПТЕРИСЪ** (Ochropteris). *Ochros* — желтый и *pteris* — папоротникъ; по цвѣту р. С. папоротниковыхъ. (1). О. Маврикія. Тепл. рѣдкій папоротникъ. Торф. съ пескомъ и малымъ колич. глин. дерн.

**О. палленсъ** (O. pallens, блѣдный). Ванъ четырех-перистый, длиною до 2 ф. и шириною въ 1½ ф.

**ОЦИМУМЪ** (Ocimum). *Okimon* у Теофраста означаетъ Базилікъ. С. губоцвѣтныхъ. (40). Жаркія страны. Полувынос. полукуст. рр., неимѣющая садового значенія, кромѣ *О. базиликъ* (O. basilicum, Базилікъ), однолѣтняго кухоннаго р. изъ жаркихъ мѣстъ Азіи и Африки. Цв. белые, въ августѣ; лл. овальные, зубчатые. 1 ф.

**ОПОТАМНУСЪ** (Ozothamnus). *Ozein* — пахнуть и *thamnus* — кустъ. С. сложноподвѣтныхъ. Многочисленный родъ австралійскихъ кустар. и полукуст., либо трав. рр., соединенныхъ теперь съ Хеллхризумъ. Песков. глин. дерн. Черенками изъ полувзрѣлаго роста, лѣтомъ.

**О. розмаринофолюсъ** (O. rosmarinifolius, съ лл. Розмарина). Цв. головки, въ июлѣ. 8—9 д.

**ОЧЕРЕДНОЙ.** Не супротивный и не круговой или кольчатый, не противъ и не совершенно подъ другимъ.

**ОЧКО.** Глазокъ. Почка. Завязь будущего листа, но не цвѣтка. Очкомъ *прививаютъ* — окулируютъ.

**ПАВЕТТА** (Pavetta). Мѣстное малабарское названіе. С. мареновыхъ. (60). Тропич. Южн. Африка. Тепл. или оранж. куст. рр. Уходъ какъ за Иксора.

**П. борбоника** (P. borbonica, съ о. Бурбона). О. Бурбонъ. Лл. темно-оливковые съ белыми пятнами. **П. каффра** (P. caffra,



кафрарская). М. Д. Н. Цв. бѣлые, съ іюня до августа. Лл. овальные. 3—4 ф. Сил. *П. коринѳска* (*P. corinthia*). *П. индига* (*P. indica*, индѣйская). Индія. Цв. бѣлые, съ августа до октября; лл. овальные, къ обоимъ концамъ заостренные. Тепл. кустъ.

**ПАВИЛОНЪ** (*Pavilion*). Бесѣдка, лѣтнее строеніе, украшенное въ разномъ вкусѣ. Пристройка къ дому. Придомокъ.

**ПАВІЯ** (*Pavia*). Петеръ *Павъ* (*Paw*)—голландскій ботаникъ, проф. лейденскаго ун-ва. въ XVII стол. С. мыловниковыхъ. Малочисленный родъ, соединенный съ *Эскулюсъ*. Уходъ какъ за *Эскулюсъ*.

*П. альба* (*P. alba*, бѣлая). С. Америка. Цв. бѣлые длинной кистью, въ апрѣлѣ и маѣ; лл. изъ 5—7 овальныхъ листочковъ. 3—9 ф. *П. калифорника* (*P. californica*, калифорнская). Калифорнія. Цв. бѣлые или блѣдно-розовые, очень душистые, въ маѣ. 40 ф. *П. флѣва* (*P. flava*, желтая). С. Америка. Цв. блѣдно-желтые, въ маѣ. 20 ф.

**ПАВЛИНЫ ОЧИ**. См. Адонисъ.

**ПАВЛОВНІЯ** (*Paulownia*). По королю нидерландской Аннѣ Павловнѣ. С. поручиковыхъ. (1). Японія. Въ умѣр. климатѣ выносливое высокое дерево. Земля сильная. Сѣменами и черенками.

*П. имперіалисъ* (*P. imperialis*, императорская). Цв. блѣдно-фіолетовые съ темными внутри пятнами, красивые, рано лѣтомъ. Лл. цѣльные, трехлопастные. 30 ф.

**ПАВЛОВСКОЕ ЯБЛОКО**. См. Ромненское.

**ПАВОНІЯ** (*Pavonia*). *Донъ Хосе Павонъ* (*Don Jose Pavon*)—испанскій ботаникъ, путешествовавшій въ Перу, † 1844. С. мальвовыхъ. (11). Африка, троп. Азія, о. Тихаго ок., Ю. Америка, жаркія страны С. Америки и Австралія. Тепл. трав. и куст. рр. Легкая, сильная. Черенками въ песокъ, подъ стекломъ и сѣменами.

*П. мультифлора* (*P. multiflora*, многоцвѣтная). Бразилія. Цв. съ красными прицвѣтниками, собранными въ кольца, доли пурпуровыя, лепестки темно-пурпуровые, въ сентябрѣ. Сильное куст. р.

**ПАГЛИНОКЪ**. Суглинистая почва.

**ПАДАЛЬ. ПАДАЛИЦА**. Опавшій плодъ, обитый вѣтромъ.

**ПАДУВОВЫЯ** рр. (*ilicinea*). Небольшое семейство древесныхъ и кустарниковъ растений, живущихъ въ умѣренныхъ и тропическихъ странахъ за исключеніемъ сѣверо-западной Америки. Содержатъ особое горькое вещество *илицинъ*. Видовъ 150; изъ родовъ замѣчательны: *Врионія*, *Илексъ* и *Немофантесъ*. Называется тоже *aquifoliaceae*.

**ПАДУВЪ**. См. Илексъ.

**ПАЖИТНИКЪ**. См. Тригелелія.

**ПАЗУХА**. Уголъ образуемый вѣткой, черешкомъ или стебелькомъ со стеблемъ.

**ПАКЛЕНОКЪ**. См. Аперъ.

**ПАКЛЯВЫЙ, ПАЕЛИСТЫЙ**. Волонистый, на паклю похожій, всклокоченный.

**ПАЛЬМІЯ** (*Palmia*). *Пальмъ* (*L. H. Palm*)—бот. писатель. С. бьюнковыхъ. (1). Тропич. Азія и Африка. Тепл. или оранж. вьющееся р. Сѣменами, весной.

*П. биколоръ* (*P. bicolor*, двуцвѣтная). Цв. бѣлые или желтоватые съ темно-пурпуровой серединой, въ августѣ. Лл. сердцевидные, трехлопастные.

**ПАЛЬМОВОЕ ДЕРЕВО**. См. Буксусъ.

**ПАЛЬМЫ** (*palme*, *palmasae*). Обширное преобладающее семейство рр. не только между однодольными, но и всѣми на землѣ существующими породами, по величю и изящной красотѣ большинства представителей, которые распространены преимущественно въ тропическихъ странахъ. Родовъ 132, видовъ до 1,200. Главнѣйшіе роды: *Астрокаріумъ*, *Атталея*, *Бактрисъ*, *Геонма*, *Гифѣя*, *Десмонкусъ*, *Каламусъ*, *Каріота*, *Кортальсія*, *Лангуаля*, *Ливистона*, *Фениксъ* и *Хамедорея*.

**ПАЛАТИ**. Чердакъ. Подволока. На нихъ сохраняютъ зимою пѣкот. растенія, глав. обр. лукъ.

**ПАЛАТКА**. Постройка для лѣтняго помѣщенія растеній.

**ПАЛИКУРЕА** (*Palicourea*). *Ле Паликуръ* (*Le Palicour*) консулъ, въ Гіанѣ. С. мареновыхъ. (100) Троп. Америка. Тепл. куст. рр. Песков. глин. дерн. съ торф. Черенками, въ песокъ, въ парникъ.

*П. гарденіойдесъ* (*P. gardenioides*, похожая на *Гарденію*). Юж. Америка. Цв. бѣлые, зимой и лѣтомъ. 2 ф. Сил. *Родостома гарденіойдесъ* (*Rhodostoma gardenioides*).

**ПАЛИСАДНИКЪ**. Садикъ вдоль дома, обнесенный частоколомъ.

**ПАЛИСАДЪ**. Заборъ, тынъ, ограда изъ тычинокъ, изъ жердей тычкомъ, стойми.

**ПАЛИСОТА** (*Palisota*). *Палисо де Бове* (*Palisot de Beauvois*)—французскій ботаникъ и путешественникъ, † 1820. С. коммелиновыхъ. (8). Троп. Африка. Тепл. многол. трав. рр. Уходъ какъ за *Коммелина*.

*П. Вартери* (*P. Barteri*, Бартера). Цв. блѣдно-пурпуровые, осенью. 1—3 ф. *П. биколоръ* (*P. bicolor*, двуцвѣтная). Фернандо По. Лл. продолговатые, на верхней сторонѣ ярко-зеленые съ широкою желтоватою срединною полоскою и съ волосистыми краями. 1—2 ф. Нарядное орнамент. р.

*П. брактеоза* (*P. bracteosa*, съ прилистниками). Цв. бѣлые, осенью. Р. безстебельная.

**ПАЛИСТЬ. ПАЛИСТЫЕ**. Мелкіе листочки въ перистыхъ, сложныхъ листьяхъ. Перо.

**ПАЛІУРУСЪ** (*Paliurus*). Древнегреческое названіе, употребленное Теофрастомъ. С. крушиновыхъ. (2). Ю. Европа, 3. Азія, Ю. Китай. Полувыносл. куст. рр. Глин. дерн. песков. Сѣменами, отводками и черенками.

*П. акулеатусъ* (*P. aculeatus*, колючій). *Христовъ шолка*. Средиземн. побережье. Цв. желтовато-зеленые, въ іюнь—іюль; лл. овальдые; плоды похожіе на голушу, на которой надѣта шляпа съ широкими полями. Стебли и вѣтви съ иглами. Полагаютъ, что изъ этого р. былъ сдѣланъ терновый вѣнецъ Спасителя.

**ПАЛОЧНИКОВЫЯ** или **РОГОЗОВЫЯ** рр. (*typhaceae*). Малочисленное семейство водяныхъ или болотныхъ трав. рр., встрѣчаемыхъ въ умѣр. и тропич. странахъ Азіи, Австраліи, въ Европѣ и умѣр. С. Америки. Къ этому с. принадлежатъ только два рода: *Спарганіумъ* и *Тифа*; въ обоихъ родахъ 16 видовъ.

**ПАЛЬЕНИСЪ** (*Pallenis*). *Палеа*—мякина, пленка; по пленчатому цв. ложу. С. сложнотвѣстныхъ. (1). Однол. трав. р. Уходъ какъ за *Буфальмумъ*.

*П. спиноза* (*P. spinosa*, колючій). Востокъ, Ю. Европа, С. Африка. Цв. головки желтыя, въ іюль. 2½ ф.

**ПАЛІЯВАНА** (*Paliavana*). *Паліява*—мѣсто пребыванія принца Брагаскаго, покровителя ботаники. С. геснеріевыхъ. (2). Бразилія. Тепл. куст. рр. Уходъ какъ за *Геснера*.

*П. празината* (*P. prasinata*, зеленоватая). Цв. зеленоватые, въ маѣ до іюня. 1½—2 ф.

**ПАЛОЧНИКЪ**. См. Тифа.

**ПАЛѢВА** (*Palava*). *Палау и Вердера* (*Palau y Verdera*)—проф. ботаники въ Мадридѣ, въ прошломъ столѣтіи. С. мальвовыхъ. (4). Перу и Чили. Полувыносл. однол. рр. Обыкн. садов. Сѣменами въ парникъ, чтобы потомъ высадить на воздухъ.

*П. ромбифолія* (*P. rombifolia*, съ ромбическими лл.). Перу. Цв. розовые, лѣтомъ. Стебли лежачіе. *П. флексуоза* (*P. flexuosa*, изгибистая). Перу. Цв. свѣтло-лососевые, въ іюнь. 8—10 д.

**ПАЛѢФОКСІЯ** (*Palafoxia*). *Хосе ПалѢфоксъ* (*Jose Palafox*)—испанскій генералъ, † 1847. С. сложнотвѣстныхъ. (6). Полувыносл. травяни. рр. изъ Мексики и Флориды. Песков. Сѣменами, въ парникъ; потомъ высадить на воздухъ.

*П. линейарисъ* (*P. linearis*, линейная). Техасъ. Цв. головки тѣлсною окраски, въ іюнь. 2 ф. *П. Хукеріана* (*P. Hookeriana*, Хукерова). Скалистые горы. Цв. гол. малиново-розовые, лѣтомъ. 2 ф.

**ПАМОРОЗЪ. ПАМОРОЗОКЪ**. Поздній вѣшній морозъ. Утренникъ.

**ПАНАКОЪ** (*Panaka*). Названіе заимствованное у Теофраста и произведенное отъ *panakes*—панacea, лекарство отъ всѣхъ болѣзней. С. аралиевыхъ. (25). Троп. и Вост. Азія, до Манджури, троп. Африка, о. Тихаго ок., Нов. Зеландія, Австралія. Тепл. оранж. или полувыносл. деревья и куст. Песк. глин. дерн. съ торф. и небольш. колич. листовой и песку. Черенками изъ корней.

*П. Викторіи* (*P. Victoriae*, Викторія). Ю. ос. Тих. ок. Лл. пестрые, почти перистые, съ бѣлыми краями. Тепл. *П. диффузумъ* (*P. diffusum*, разбросанный). О. Южн. океана. Лл. ярко-зеленые, двуперистые, курчавые. 2 ф. Тепл. *П. думозумъ* (*P. dimosum*, кустовой). Лл. овальные, перисто-раздѣльные. 6—18 д. Тепл. *П. лациниатумъ* (*P. laciniatum*, съ раздѣянными лл.). О. Юж. ок. Лл. съ блѣдными оливково-коричневыми крапинками, двуперистые. Тепл. *П. плюматумъ* (*P. plumatum*, перистый). О. Юж. океана. Лл. раздѣльные, листочки глубоко-лопастные. Тепл. *П. элегансъ* (*P. elegans*, изящный). Куинслендъ. Лл. различно-раздѣльные, перистые; цв. металками. Оранж.

**ПАНДАНОВЫЯ** рр. (*pandanaeae*). Приморскія или цѣпкія древесныя, либо кустарныя дву- или трихотомически развѣтвляющіяся; изъ колючихъ стеблей вырастаютъ воздушные корни. Встрѣчаются только въ тропическихъ странахъ, болѣею частью на остр. Индѣйскаго и Тихаго океана и восточно-африканскихъ; не многіе растутъ въ Африкѣ и Азіи. Одинъ видъ находится въ Вост.-Индіи, другой—въ Новой Зеландіи. Видовъ 80, родовъ только два: *Панданусъ* и *Фрейсиннея*.

**ПАНДАНУСЪ** (*Pandanus*). У малайцевъ называются рр. этого рода *панданъ*. С. панданусовыхъ. (80). О—ва малайскіе, маскаренскіе, сейшельскіе, Азія, Африка, Америка, Австралія, Океанія, Вестиндія. Тепл. древ. или куст. рр. съ бѣлыми цв. Песков. глин. дерн. Прям. отпрысками. Темп. зимой 8—12, лѣтомъ 13—26°.

*П. Вандермееши* (*P. Vandermeeshii*, Вандермееша). О. Маврикія. Лл. сизые съ красными колючими иглами, сред. жилка тоже колючая. 20 ф. *П. Вейчи* (*P. Veitchii*, Вейча). Полинезія. Лл. широкіе, колючіе, темно-зеленые по срединѣ, съ



широкими бѣлыми краями. **П. глауцесценс** (P. glaucescens, сизоватый). Индія. Лл. сизые, густые съ бѣлыми пглами и съ длинною на концѣ колочкой. **П. конойдеус** (P. conoidens, коническій). Нов. Каледонія. Лл. темно-зеленые съ колочичными краями и двумя такими-же рядами на верхней сторонѣ, по гладкою серединой. 14 ф. Сип. **П. декорус**, **П. черамидис** (P. decorus, P. ceramensis). **П. минор** (P. minor, меньшій). Бенгалъ. Лл. почти двуридные, согнутые, съ колочичными краями. Стовь тонкій, въ 3 ф. **П. одоратиссимум** (P. odoratissimus, самый душистый). Троп. Азія. Лл. ярко-зеленые съ короткими бѣлыми пглами. Муж. пв. очень пахучіе и изъ нихъ добываются духи. Сип. **П. Бланкои** (P. Blancoi). **П. утилис** (P. utilis, полезный). Мадагаскаръ. Лл. сизые, прямые, длинные, съ красными колочками; на родинѣ 60 ф. Сип. **П. канделабрум**, **П. мауритіанум**, **П. одоратиссимум**, **П. флеллалиформис**, **П. элелатиссимум** (P. candellabrum, P. mauritianum, P. odoratissimus, P. flabelliformis, P. elegantissimus). **П. Хульдетіи** (P. Houletii, Хулетта). Сингапуръ. Лл. по краямъ и срединѣ внизу съ пглами, красноватые на верхней и темно бронзовое на нижней сторонѣ. Сип. **П. Хорнеи** (P. Hornei).

**ПАНИКУМЪ (Panicum)**. Названіе данное Плиніемъ по *paniculum* — метелочка, въ формѣ кот. обычно располочены бываютъ цвѣты. С. злаковъ. (800) Тропич. страны. Тепл., ор. или вынос. однолѣт., либо многол. травы. Садовая-обыкн. Сѣменами.

**П. капилляр** (P. capillare, волосной). Европа, Азія, С. Америка. Метелки большія, пирамидальныя, лѣтомъ. 1½—2 ф. Однол. **П. миліадеумъ** (P. miliaceum, Просо-Боръ). Средиземное побережье. Сильно развѣтвленна, пониклая метелка. Лл. дов. широкіе, съ волосками. 2 ф. Однол. **П. варіегатумъ** (P. variegatum, пестролистный). Троп. Азія. Лл. мадиновые съ бѣлыми полосками, ланцетовидные, съ волнистыми краями. Многол. Оранж. или тепл. **П. виргатумъ** (P. virgatum, листовой). С. Америка. Метелки вѣтвистыя, сначала прямыя, потомъ пониклыя, лѣтомъ. 3—5 ф. Оранж. или полувывосл. многол.

**ПАНКРАЦИУМЪ (Pancratium)**. *Pan*—все и *kratys*—могущій, по предпологающимся цѣлебнымъ свойствамъ. С. амариллисовыхъ. (12). Вестиндія, Канарскіе о. и Средиземн. побережье. Тепл., ор. или вынос. луковичн. рр. Глин. дерн. 2 ч., торф. 1 ч., листов. 1 ч. съ добавленіемъ песку Сѣменами, въ теплѣ и отпрысками.

**П. маритимумъ** (P. maritimum, мор-

ской). Ю. Европа. Цв. бѣлые, очень душистые, зонтиками, въ июнѣ. Оранж., а въ умѣр. климатѣ—вынос. 2 ф. **П. спеціозумъ** (P. speciosum) есть синонимъ *Хименокальмисъ спеціоза* (Hymenocallis speciosa).

**ПАПАРИ**. См. Момордика.

**ПАПЕРТЬ**. См. Нефродіумъ.

**ПАПАВЕРЬ (Papaver)**. Макъ. Названіе, данное Плиніемъ. С. маковыхъ. (14). Ю. Африка, троп. Австралія, умѣр. и троп. Азія, С. Африка и Европа. Вынос. или полувывосл. одно- или многол. трав. рр. Песков. глин. дерн. Сѣменами или дѣленіемъ. Упоминаемые ниже виды—вынос.

**П. альпінумъ** (P. alpinum, горный). Цв. желтые, съ рововатымъ отгибомъ или бѣлые, лѣтомъ, 6 д. **П. брактееаумъ** (P. bracteatum, съ прицвѣтниками). Кавказъ. Цв. красные, съ прицвѣтниками, въ маѣ. 4 ф. Считается разновидностью **П. ориенталис**. **П. нудикауле** (P. nudicaule, съ голымъ стеблемъ). Горы сѣв. полушарія. Цв. ярко-оранжевые, зеленые, либо бѣлые, крупныя, красивые. 9—18 д. У разновидности *кріоцеумъ* (strogium).—цв. желтые. **П. ориентале** (P. orientale, восточный). Сильной макъ. Грузія. Цв. темно-красные съ чернымъ пятномъ у основанія лепестковъ, рано лѣтомъ. 2—3 ф. Имѣетъ нѣсколько разновидностей. **П. пилосумъ** (P. pilosum, волосатый). Внонція и гора Олимпъ. Цв. бѣдно-шарлаховые или оранжевые съ бѣлымъ пятномъ внизу каждого лепестка, лѣтомъ. 1—2 ф. **П. Рёасъ** (P. Rhoeas, обыкновенный). Макъ *самосѣйка*. Европа, С. Африка, 3. Азія. Цв. ярко-красные, большіе; стебель многоцвѣтнй, покрытый жесткими волосками, лѣтомъ. Известное однол. рр., имѣющее множество разновидностей. У разновидности *умброзумъ* (umbrosium), при основаніи лепестковъ, по черному пятну. 2 ф. **П. сомниферумъ** (P. somniferum, снотворный). Садовый макъ. Европа, Азія, 3. Африка, Индія. Цв. различной окраски: бѣлые, розовые, красные, фіолетовые, полосатые, обычно съ чернымъ пятномъ у основаніи каждого лепестка. Изъ этого, однолѣтняго, р. извлекается опиѣ. Махровые сорта назыв. въ садахъ *неонифлорумъ* (raconiflorum), а съ цв. имѣющими бахромчатые края—*Мурселли* (Murselli).

**ПАПИРУСЪ (Papyrus)**. *Papyrus*—древне-греческое названіе, заимствованное у Теофраста. С. ситовниковыхъ. Малоценный родъ изъ троп. и жаркихъ странъ. Воспитывается какъ водяной рр. въ сильной тяжелой глин. дерн. Размнож. дѣленіемъ корневища.

**П. антикворумъ** (antiquorum, древнихъ). Египетъ. Стебли темно-зеленые,

треугольные, съ зонтикомъ пониклыхъ лл. на верху. 10 ф. Настоящее названіе этого р. *Циперусъ папірусъ* (Cyperus Papyrus).

**ПАПОРОТНИКИ (Filices)**. Семейство высшихъ изъ тайноцвѣтныхъ, содержащее древесныя или многолѣтнія, рѣдко однолѣтнія, травянистыя растенія, имѣющія сложно развѣтвенныя вай, на которыхъ вырастаютъ ихъ органы воспроизводства (споровыя вѣстилища, споры). Папоротники имѣютъ весьма обширное распространение, и по своей многочисленности подраздѣляются на нѣсколько отдѣловъ. Принадлежатъ къ тепличнымъ, оранжерейнымъ и воздушнымъ породамъ. Въ этомъ сем. насчитываютъ 75 родовъ и до 2,500 видовъ. Самые многочисленные роды: Адіантумъ, Акростихумъ, Аспидіумъ, Аспленіумъ, Нефродіумъ и Птерисъ. Папоротники вознѣваются въ садахъ въ теплицѣ, въ оранжереѣ и на воздухѣ. Тепличныя размножаются дѣленіемъ корневища, оставляя у каждой отдѣленной части корень; почками съ вай: части съ такими почками припиливаются въ горшки съ землей и когда зададутъ корни—отдѣляются; посѣвомъ споръ во влажномъ, тепломъ мѣстѣ, при маломъ свѣтѣ; земля для такихъ папоротниковъ—рыхлая: 2 ч. волокн. торфяной, 1 ч. волокистой глин. дерн. и 1 ч. листов. съ прибавкою къ этому песку. Темп. лѣтомъ наименьш. 15, наибольш. 20 днемъ и 13° ночью. Пересаживать въ мартъ, а маленькіе экземпляры и вторично въ іюль. Просушить — значитъ погубить папоротникъ; поэтому держать постоянно влажно, — болѣе когда корней много; при явномъ признакѣ недостаточной влажности, — горшки замачивать въ водѣ, опуская въ нее горшокъ съ краемъ; помогаетъ восстановленію здоровья тепл. папоротниковъ помѣщеніе ихъ на лѣто въ холодномъ парникѣ, причемъ опрыскивать каждый вечеръ. Зимой темп. наибольшая 13, наименьшая 10° днемъ и 9° ночью; поливка уменьшается; въ декабрѣ можно сверху земли дать удобрение (перегноя).

*Оранжев.* размножаются также и требуютъ той же земли, что и тепличныя; разниця въ темп.; ихъ на лѣто можно выставлять на воздухѣ; оранж. папоротники удобны тѣмъ, что ими можно наполнить такіе углы оранжерей, въ кот. другого ничего поставить нельзя.

*Воздушныя* папор. размнож. дѣленіемъ; отдѣленные части лучше обращивать въ холодномъ парникѣ; рѣдкіе папор. можно размножать посѣвомъ на торфѣ, подъ колономъ. Уходъ соображается съ условіями природными, — тѣми, въ которыхъ растутъ папоротники дико.

**ПАРАДИЗАНТУСЪ (Paradisanthus)**. *Paradeisos* — рай и *anthos*—цвѣтокъ, по красотѣ цв. С. орхидей. (2). Бразилія. Торф. съ мохомъ и др. углемъ.

**П. Мозеніи** (P. Mosonii, Мозена). Бразилія. Цв. зеленые съ коричневыми полосками, губа бѣлая, съ красноватыми черточками; столбикъ пурпуровый.

**ПАРАФИЗЪ**. Безплодная тонкая и длинная клѣточка, находящаяся вмѣстѣ съ плодоносными, у сумчатыхъ грибовъ.

**ПАРДАНТУСЪ (Pardanthus)**. *Pardos*—леопардъ и *anthos*—цвѣтокъ, по испятнанному цв. С. косатиковыхъ. (1). Оранж. или полувывосл. трав. многол. клубневое р. Сильная, песков. глин. дерн. Сѣменами или дѣленіемъ весной. Цв. остаются весьма короткое время.

**П. хинензис** (P. chinensis, китайскій). Китай, Японія. Цв. оранжевые съ коричнево-пурпуровыми пятнышками, на короткой трубкѣ, въ июнѣ. 1½—2 ф.

**ПАРИНАРИУМЪ (Parinarium)**. Въ Бразиліи называется *Паринари*. С. розановыхъ. (33). Ост. Индійскаго арх. и Тихаго океана, С. Австралія, троп. Африка, Бразилія, Гвинея. Тепл. куст. или древ. рр. Уходъ какъ за Хризобалинусъ.

**П. макрофиллюмъ** (P. macrophyllum, крупнолистный). Гвинея. Цв. бѣлые, въ февралѣ. Лл. большіе, сердцевидные. Куст. р. **П. экцелсумъ** (P. excelsum, высокий). Гвинея. Цв. бѣлые, въ февралѣ; лл. продолговатые, кожистые, бѣлые; плоды въ снѣгу, съ сухою, мучнистою мякотью и большою косточкой. Высокое дерево.

**ПАРИСЪ (Paris)**. *Par*—равный, по правильности частей. С. лилейныхъ (6). Европа, умѣренная и гористая Азія. Вынос. многол. трав. рр. съ ползучимъ корневищемъ. Песков. глин. дерн. Дѣленіемъ и сѣменами.

**П. квадрифолія** (P. quadrifolia, четырехлистный). *Вороній глазъ*. Европа, Россійская Азія. Цв. желтовато-зеленые, весной или лѣтомъ. Лл. 4-колычатые; плоды—темно-синіе. 9—12 д. **П. полифилля** (P. polyphylla, многолистный). Гималаи, Цв. зеленые, въ маѣ; лл. колычатые—4 до 9 въ колыцѣ; плоды ярко-шарлаховые. До 2½ ф.

**ПАРКИНСОНІЯ. (Parkinsonia)**. *Паркинсонъ* (John Parkinson)—лондонскій аптекаръ, авторъ «Paradis terestris» и «Theatrum botanicum», † 1629. С. бобовыхъ. (3). Жаркая часть Вестиндіи, Антильскіе о., Мексика. Тепл. или оранж. древесн. рр. Рыхлая глин. дерн. Сѣменами.

**П. акулеата** (P. aculeata, колючая). Троп. Америка. Цв. желтые, пахучіе, кистями; лл. дууперистые. 8—10 ф. Тепличное р.



**ПАРКИЯ** (*Parkea*). *Мунго Парк* (*Mungo Park*)—знаменитый африканский путешественник, † 1805. С. бобовых. (8). Троп. Азия, Африка и Америка. Теплодр. рр. Ухожд. как за Иппа.

**П. африкана** (*P. africana*, африканская). Африка. Цв. красно-малиновые, головками, вь февраль; лл. перистые. Изъ плодоть получаетъ приятнаго вкуса напитокъ. 30—40 ф. **П. бигляндулоса** (*P. biglandulosa*, двухжелзчатая). Малайскій полуостр. Цв. верхніе желто-коричневые или красные, нижніе—бѣлые. Лл. перистые съ черешками, имѣющими по двѣ железки.

**ПАРМАНТЬЕРА** (*Parmentiera*). *Пармантье* (A. Parmentier) — французскій ученый, писавшій о съѣдомыхъ рр. и способствовавшій введенію картофеля, † 1813. С. биньоніиныхъ. (3). Мексика и центр. Америка. Теплодр. рр. Ухожд. какъ за Биньонія.

**П. цереифера** (*P. cereifera*, восковал). Панама. Цв. бѣлые большіе; плоды въ 2—3 ф. длиной, висячіе, похожіе на восковыя свѣчи; лл. тройчатые.

**ПАРНАССІЯ** (*Parnassia*). По горѣ Парнасу, названіе Діоскориды. С. камнеломковыхъ. (20). Съв. полушаріе, горы Индіи. Выносл. многол. трав. рр. Влажная торф., болотистая. Съеменами и дѣленіемъ.

**П. азарифолия** (*P. asarifolia*, съ лл. какъ у Азарумъ). С. Америка. Цв. бѣлые, лѣтомъ; лл. корневыя сердцевидныя, стеблевыя округло-сердцевидныя. 6 д. **П. палюстрис** (*P. palustris*, болотная). *Бьлзоръ* Съв. полушаріе. Цв. бѣлые съ зелеными жилками, лѣтомъ; лл. корневыя сердцевидныя, стеблевыя—объемлющія. 6 д.

**ПАРНИКЪ**. Каменный или деревянный,—бревенчатый либо досчатый ящикъ, наполненный согревающимъ матеріаломъ и закрываемый стеклянными, поперечными рамами. Служитъ для воспитанія растений, нуждающихся въ болѣе продолжительномъ времени развитія или высшей температурѣ, чѣмъ та, которую можетъ дать климатъ. Устраивается на открытомъ для солнца и защищенномъ отъ сѣверной стороны мѣстѣ съ сухой почвой, безъ сырой подпочвы, которая задерживала бы свободный стокъ воды. Теплый парникъ для ранней выгонки дѣлается глубже и наклонъ рамамъ дается болѣе пологій, ширина рамъ обычная полтора аршина, длина же можетъ быть отъ 2 до 3 арш. Парники для содержанія лѣтомъ растений дѣлаются двускатные, на востокъ и западъ.

**ПАРАДИЗІЯ** (*Paradisica*). *Paradeisos*—рай. С. лилейныхъ. (1). Многол. выносл. рр. Ухожд. какъ за Антерикумъ.

**П. Лилиаструмъ** (*P. Liliastrum*, Лилиаструмъ). Есть р. тожественное съ Антерикумъ Лилиаструмъ.

**ПАЗАРИТЪ, ПАЗАРИТНОЕ РАСТЕНЬЕ**. Чужездное растеніе, живущее сокомъ другого.

**ПАРАКАРИУМЪ** (*Paracaryum*). *Para*—сбоку и *caryon*—орѣхъ; по положенію орѣшковъ. С. бурчанниковыхъ. (10). Ю. Европа и Сред. Азія. Большею частью полувыносл. дву-или многол. трав. рр. Ухожд. какъ за Циноглоссу.

**П. анхусойдесъ** (*P. anchusoides*, похожій на Анхуза). Кашмиръ. Цв. пурпуровые съ голубымъ краемъ, въ маѣ. 2 ф.

**ПАРКЪ**. Чистая роща съ дорожками для гулянья пѣшеходовъ и въ экипажахъ или верхомъ.

**ПАРНОЛИСТНЫЯ** рр. (*zygophyllae*). Кустарники, трав., рѣдко древесныя рр. жаркихъ тропик. странъ обоихъ полушарій. Въ с. 17 родовъ и около 100 видовъ. Изъ родовъ главнѣйшіе: Гваякумъ, Хитонія, Цингофиллюмъ.

**ПАРОНИХІЯ** (*Paronichia*). Древнегреческое названіе, данное Діоскоридомъ, *paronichia*—ноготѣда, отъ кот. р. будто бы помогаетъ. С. изълецебровыхъ. (40). Средиз. побережье, С. Африка, Америка, Ангола. Однол. или многол. трав. рр. Песков. легкая. Съеменами и дѣленіемъ.

**П. серпиллифолия** (*P. serpillifolia*, съ лл. Тимуса). Ю. Европа. Цв. головками, закрытыми серебристыми прицѣтниками, лѣтомъ; лл. обратнотычечидные, рѣсничатые; стебель лекачій. Употребляется въ узорчатыхъ цѣтникахъ, какъ р. скоро и густо заполняющее мѣсто.

**ПАРОСЛЬ, ПОРОСЛЬ**. Молодой кустарникъ или лѣсъ по вырубкѣ стараго.

**ПАРОВЕТУСЪ** (*Parochetus*). *Para*—близъ и *ochetus*—ручей. С. бобовыхъ. (1). Выносл. трав. рр. Легкая съ раст. перегноемъ. Съеменами и дѣленіемъ.

**П. коммунисъ** (*P. communis*, обыкновенный). Холодная и умеренная части Гималаи. Цв. дов. большіе голубые, лл. тройчатые, перстовидные. 2—3 д.

**ПАРРИЯ** (*Parrya*). *Parry* (*Parry*)—извѣстный арктическій мореплавателъ, † 1855. С. крестоцѣтнхъ. (10). Арктич. страны и самыя высокія горы Съв. Азій. Выносл. низкія трав. рр. Обыкн. садовая. Дѣленіемъ.

**П. арабидифолия** (*P. arabidifolia*, съ лл. какъ у Арабисъ). В. Сибирь. Цв. пурпуровые, въ маѣ. 6 д. Снн. *Хесперисъ арабидифолия*, *Невролома арабидифолия* (*Hesperis arabidifolia*, *Neurolooma arabidifolia*). **П. нудикаулисъ** (*P. nudicaulis*, съ го-

лымъ стеблемъ). Арктическія страны. Цв. лиловые, рано лѣтомъ. 2—3 д.

**ПАРРОТІЯ** (*Parrotia*). *Парротъ* (*Parrot*)—проф. дерптскаго унив., членъ акад. наукъ, физикъ и путешественникъ † 1812. С. двохлѣтниковыхъ. (2). Кашмиръ, С. Персія. Оранж. куст. или дрер. рр. Песков. глин. дерн. съ листовой. Съеменами и отводкой.

**П. персика** (*P. persica*, персидская). *Желзное дерево* Персія, Закавказье. Цв. съ высушившимися тычинками, вѣтвочки нѣтъ; лл. овальные, лѣтомъ зеленые, осенью красные. 10 ф.

**ПАРСОНСІЯ** (*Parsonsia*). *Парсонсъ* (*John Parsons*), шотландскій врачъ и естествоиспытатель, † 1770. С. куровыхъ. (12). Троп. Азія, Австралія и Нов. Зеландія. Оранж. выносл. куст. рр. Ухожд. какъ за Дилладенія.

**П. альбифлора** (*P. albiflora*, съ бѣлыми цв.). Нов. Зеландія. Цв. бѣлые, въ маѣ. Снн. **П. гетерофилля** (*P. heterophylla*). **П. велютина** (*P. velutina*, бархатистая). Австралія. Цв. ползонтниками, въ іюль. Высоко вьющійся кустарникъ.

**ПАРТЕНІУМЪ** (*Parthenium*). Древнегреч. названіе, встрѣчаемое у Гипократа и производимое отъ *parthenos*—дѣва. С. сложноцѣтнхъ. (6). С. и Сред. Америка и Вестиндія. Куст. или полукуст. рр.

**П. хистерофорусъ** (*P. hysterophorus*). *Дышникъ*. С. Америка. Цв. головки бѣловатые; лл. дууперистые. Полувыносл. однол., не имѣющее красоты. Разн. съеменами въ парникъ, входы высаживаются въ маѣ, въ обыкн. садов. землю, на солнечномъ мѣстѣ.

**ПАРТЁРЪ**. Цѣтникъ.

**ПАРЪ**. Собственно — жидкость, обращенная въ паробразное состояніе,—пары. Теплота отдѣляемая навозомъ или другимъ гниющимъ и отдѣляющимъ теплоту веществомъ. (Ставить на пары. Гнать на паряхъ).

**ПАСКАЛІЯ** (*Pascalja*). *Паскаль* (Д. Паскаль)—проф. въ Пармѣ. С. сложноцѣтнхъ. (1). Вѣт-троп. Ю. Америка. Полувыносл. многол. трав. р. Песков. глин. дерн. Дѣленіемъ весной, или черенками лѣтомъ. На зиму въ оранжереѣ.

**П. глаука** (*P. glauca*, сизая). Цв. головки желтыя; въ іюль. 1½ ф.

**ПАСЛѢНОВЫЯ** рр. (*solanaceae*). Довольно многочисленное семейство травянистыхъ, пряморослыхъ или цѣтнхъ кустарныхъ, рѣдко древесныхъ рр., встречаемыхъ преимущественно въ теплыхъ странахъ земной поверхности. Самое полезное изъ рр. этого семейства,—карто-

фельное, затѣмъ табакъ, стручковый перецъ, томатъ и поджаканъ. Въ семействѣ насчитываютъ до 66 родовъ и 1200 видовъ. Примѣрами родовъ можно причести: Ликоперискумъ, Никотиана, Петунія, Солянумъ, Физалисъ, Пеструмъ.

**ПАСОКА**. Жидкій весенній сокъ въ деревьяхъ. Восходящій сокъ.

**ПАССИФЛОРА** (*Passiflora*). *Passio*—страсть (страданіе) и *flos, floris*—цв. Названіе дано миссіонерами въ Ю. Америкѣ по сравненію частей цв. съ орудіями мученія Спасителя. С. пассифлоровыхъ. (120). Америка, Азія и Австралія. Тепло., оранж. и въ умѣр. клим. вынослива выносл. трав. или куст. рр. Глин. дерн. съ торф. и пескомъ. Черенками изъ молодого роста, весной. Упоминаемыя ниже, за исключеніемъ тѣхъ о которыхъ особо пояснено, рр. тепличныя.

**П. аліа** (*P. alata*, крылатая). Перу. Цв. очень душистые: малиновые съ пурпуровыми, бѣлыми и красно-малиновыми лучами, съ апрѣля до августа. Имѣетъ нѣсколько разновидностей. **П. альба** (*P. alba*, бѣлая). Бразилія. Цв. бѣлые, въ маѣ. Снн. **П. атомарія** (*atomaria*). **П. амабилисъ** (*P. amabilis*, милостивая). Ю. Америка. Цв. красные, шити и корона бѣлые, въ маѣ.

**П. инкарната** (*P. incarnata*, тѣлеснаго цв.). Ю. Ам. Соел. Шт. Цв. душистые бѣлые, коронка съ двойнымъ рядомъ пурпуровыхъ лучей, въ іюль—августъ; плоды сочныя, сладкіе, величина въ яблоко. Оранж. **П. квадратнуглярисъ** (*P. quadrangularis*, съ четырехграннымъ стеблемъ). Никарагуа. Цв. душистые, бѣлые съ красными внутри лепестками, лучи бѣлые съ фіолетовымъ; въ августъ—сентябрь. Плоды сочныя съ пурпуровою съѣдомою мякотью. Это—*градиалля*.

**П. кокцинеа** (*P. coccinea*, шарлаховая). Брит. Гвіана, Бразилія, Перу. Цв. шарлаховые съ оранжевыми лучами. Плоды сочныя, вкусныя, съѣдомыя. **П. радемоза** (*P. racemosa*, вѣтвистая). Бразилія. Цв. темно-красные, въ мартѣ до сентябрю. Снн. **П. принцепсъ** (*P. princeps*). **П. Раддіана** (*P. Raddiana*, Радди). Бразилія. Цв. яркіе; чашечка и лепестки кроваво-красные, лучи пурпуровые; осенью. **П. Ханіи** (*P. Hahnii*, Хаана). Мексика. Цв. бѣлые съ желтой короной, лѣтомъ. Оранж.

**П. цѣрѣлеа** (*P. coccinea*, голубая). Бразилія и Перу. Цв. душистые, зеленоватые, столбики пурпуровые, лучи пурпуровые внизу, бѣлые по срединѣ и голубые по концамъ. Оранж., а въ умѣр. климатъ выносл. **П. циннабарина** (*P. cinnabarina*, киноварная). Австралія. Цв. шарлаховые, въ мартѣ. **П. цинцинната** (*P. cincinnata*, курчавая). Бразилія. Цв. свѣтло-фіолетовые съ темно-фіолетовыми лучами, кото-



рые внизу пурпуровые по-очередно съ бѣлыми, въ августѣ. Оранже. П. *эдулис* (P. *edulis*). Бразилія. Цв. бѣлые съ пурпуровыми отгиномъ, въ июль и августъ. Плоды эллиптическіе, крупныя, вкусомъ похоже на апельсинъ.

**ПАСТЕРНАКЪ.** См. Пеucedанумъ.

**ПАСЫНКОВАТЬ.** Отщипывать, выламывать почки и побѣги, чтобы дать болѣе соку и силы листьямъ.

**ПАТАГОНУЛЯ (Patagonula).** По мѣсту родины, — Патагонія, С. бураниковъ. (2). Ю. Амер. Оранже. куст. рр. Глин. дерн. пополамъ съ торф. Черенками.

**П. американа (P. americana, американская).** Цв. бѣлые или зеленоватые, съ запахомъ какъ у Бузины; въ июль до августа. 10—12 ф.

**ПАТЕРСОНІЯ (Patersonia).** *Патерсонъ* (Paterson), англ. путешественникъ по Ю. Африкѣ, С. касатиковъ. (19). Троп. Австралія. Оранже. кустар. или многол. трав. рр. Песков. торф. Сѣменами и дѣленіемъ.

**П. глѣбрата (P. glabrata, гладкая).** Цв. пурпуровые, въ июль. 3—6 д. Сил. П. *мѣдія* (P. *media*). **П. глѣука (P. glauca, сизая).** Цв. голубые, въ июль. **П. серицеа (P. sericea, шелковистая).** Цв. темно-фіолетовые, въ июль. Стебли почти нѣтъ.

**ПАТРИНІЯ (Patria).** *Патренъ* (Patrie) — франц. путешественникъ по Сибири, † 1814. С. валеріановыхъ. (10). Средняя и вѣт.-троп. В. Азія. Выносил. многол. трав. рр. Сильная, легкая. Сѣменами.

**П. рупестрисъ (P. rupestris, со скаль).** *Рябика*. Сибирь. Цв. душистые, желтые, въ маѣ и июль. 1 ф. **П. сибирика (P. sibirica, сибирская).** *Рябика*. Сибирь. Цв. душистые какъ Жасминъ, желтые, въ маѣ — июль. 1 ф.

**ПАТАТЪ.** См. Бататаъ.

**ПАУКЪ. ПАУЧОКЪ.** Красный паучокъ, мелкое животное на исподней сторонѣ листьевъ, нападающій отъ сухого воздуха.

**ПАУЛЛИНІЯ (Paullinia).** *Паульми* (Ch. Fr. Paulli), датскій ботаникъ, † 1742. С. мыльниковъ. (80). Троп. страны Запад. полушарія. Тепл. вьющ. куст. рр. Глин. дер. съ листов. Черенками изъ вѣтлаго роста, въ парникѣ.

**П. таликтрифолія (P. thalictrifolia, съ лл. какъ у Таликтрума).** Рио-де-Жанейро. Цв. свѣтло-малиновые, въ октябрѣ. Лл. тройчато-перистые.

**ПАХИНЕМА (Pachynema).** *Pachys* — толстый и *nema* — нить; по толстымъ тычинкамъ. С. дильеніевыхъ. (4). Австралія. Полукуст. или трав. оранже. рр. До

сихъ поръ въ садахъ встрѣчается только *P. Complanatum* — болѣе любопытный, чѣмъ красивый видъ.

**ПАХИПОДИУМЪ (Pachypodium).** *Pachys* — толстый и *pous, podos* — нога, по мясистымъ корнямъ. С. кутровыхъ. (5). Ю. Африка и Мадагаскаръ. Тепл. куст. рр. Глин. дерн. съ шпукатуркой и пескомъ. Черенками въ песокъ, подъ стекломъ.

**П. суккулентумъ (P. succulentum, сочный).** М. Д. Н. Цв. красные, въ июль до ноября. Стебель внизу клубневой.

**ПАХИРА (Pachira).** Мѣстное названіе въ Гвианѣ. С. мальвовыхъ. (15). Троп. Америка. Тепл. древ. рр. Сильная глин. дерн. Черенками по колѣну съ нетронутыми лл. въ песокъ, въ парникѣ.

**П. инсигнисъ (P. insignis, замѣчательная).** Вестиндія. Цв. блѣдно-красные, въ июль. 60 ф.

**ПАХИРИДУСЪ (Pachyrhizus).** *Pachys* — толстый и *rhiza* — корень. С. бобовыхъ. (2). Жаркія страны Азіи и Америки, троп. Африка. Тепл. вьющаяся трав. рр. Легкая, сильная. Черенками, въ песокъ; клубнями; сѣменами.

**П. ангулятусъ (P. angulatus, углостый).** Тропич. страны. Цв. пурпуровые, въ июль. Разводится для большихъ, похожихъ на брюку, клубневыхъ корней, употребл. въ пищу.

**ПАХИСАНДРА (Pachysandra).** *Pachys* — толстый и *aner, andros* — тычинка. С. молочайныхъ. (2). Полувыносил. или оранже. трав. рр. изъ С. Америки и Японіи. Обыкн. садов. дѣленіемъ корней.

**П. прокумбенсъ (P. procumbens, лежачая).** С. Америка. Цв. бѣлые, въ мартѣ. 6—9 д. **П. терминалисъ (P. terminalis, макушечная).** Японія. Лл. кожистые, собранные по концамъ ветокъ.

**ПАХИСТИМА (Pachystima).** *Pachys* — толстый и *stigma* — рыльце. С. краснопольныхъ. Малочисленный родъ кустарн. рр. требующихъ такого же ухода какъ Мигида.

**П. Канби (P. Canbyi, Канби).** Горы Виргиніи. Цв. красноватые, мелкіе, лѣтомъ; стебель ползучій.

**ПАХИСТОМА (Pachystoma).** *Pachys* — толстый и *stoma* — устье, по толстой губѣ. С. орхидей. (10). Остиндія, Малайск. архип. и троп. Африка. Тепл. земн. орхиден. Уходъ какъ за Катазтумъ.

**П. Томсоніанумъ (P. Thomsonianum, Томсона).** З. троп. Африка. Цв. бѣлые, губа пурпуровая, осенью. 6 д.

**ПАХИФИЛЬДЮМЪ (Pachyphyllum).** *Pachys* — толстый и *phyllon* — листь. С. орхидей. (7). Анды юж. Америки.

Тепл. эпифиты. Уходъ какъ за Максильярія. Два вида, — *дистихумъ* (*distichum*, двусторонній) и *прокумбенсъ* (*procumbens*, приземный), имѣютъ ботаническое значеніе.

**ПЕГАНУМЪ (Peganum)** Названіе руты у Теофраста. С. рутовыхъ. (4). Средиз. побережье; жаркія страны Азіи и Мексика. Полувыносил. или выносил. трав. рр. Легкая. Дѣленіемъ.

**П. Хармалъ (P. Nigella, Хармала).** *Бибика*. Европа. Цв. съ зелеными жилками бѣлые, въ июль и августъ. 1 ф.

**ПЕДАЛИУМЪ (Pedalum).** *Pedalion* — руль; по широкому угламъ плодотв. С. руляковыхъ. (1).

**П. мурексъ (P. murex, мышиный).** Индія, Троп. Африка. Вѣтвистое однол. р. съ супротивными или очередными лл., пзъ угловъ кот. вырастаютъ желтые цв.

**ПЕДЕРІЯ (Paederia).** *Paedor* — вонь, по дурному запаху П. фѣтида. С. марециевыхъ. (6). Троп. Азія, Бразилія. Тепл. вьющ. куст. рр. Песков. глин. дерн. съ листов. Черенками, лѣтомъ, подъ прикрытіемъ.

**П. фѣтида (P. foetida, вонючая).** Троп. Азія. Цв. темно-пурпуровые, въ маѣ. Вѣтви рр., если растирать пальцами, издаютъ крайне дурной запахъ.

**ПЕДЕРОТА (Paederota).** У древнихъ *Paederota* — обозначалъ Акантъ. С. поричниковыхъ. (2) Средн. и В. Европа. Выносил. трав. рр. Легкая песчанистая или глин. дерн., песокъ и торфян. по ровну. Сѣменами.

**П. Агерія (P. Ageria, Ageria).** Цв. желтые, въ маѣ. 6—12 д. **П. Бонарота (P. Bonarota, Бонарота).** Цв. голубые, въ маѣ. 4—6 д.

**ПЕДИКУЛЯРИСЪ (Pedicularis).** *Pediculus* — вонь, по предположенію, что отъ этого р. на овецъ налагаютъ настькомы. С. поричниковыхъ. (120). Широко распространенный, преимущ. по сѣв. полушарію, многол. трав. рр. Влажн. торф. Сѣменами. Вообще вѣрнее разводить въ садахъ не долголѣтны, потому, вѣроятно, что онѣ чужездныя.

**П. вертицилліата (P. verticillata, кольчатый).** Европа. Цв. розовые или бѣлые, въ маѣ — июль. 6—12 д. **П. доліхориза (P. dolichorhiza, съ длинными корнями).** В. Европа. Цв. золотисто-желтые, колосомъ, лѣтомъ. 1—1½ ф. **П. Сцѣнтрумъ-Каролинумъ (P. Scytrum-Carolinum).** *Скинетръ Карла. Витица. Зобинца.* Европа. Цв. золотисто-желтые, въ августѣ. 3—4 ф. **П. флѣва (Flava, желтый).** Арктич. Норвегія, Исландія. Цв. блѣдно-красные, въ маѣ — июль. 6—12 д.

**ПЕДИЛАНТУСЪ (Pedilanthus)** *Pedilon* — башмакъ и *anthos* — цв., по формѣ цв. С. молочайныхъ. (15). Троп. Америка отъ Бразиліи до Мексики и Вестиндія. Тепл. куст. рр. Песков. глин. дерн. съ переносомъ. Черенками съ прозохшими основаніями, въ песокъ.

**П. титималойдесъ (P. tithymaloides, похожій на Титималосъ).** Вестиндія. Цв. полузонтиками, съ пурпуровой оберткой, лѣтомъ. 4—6 д.

**ПЕЙЗАЖЪ.** Картина, видъ мѣстности. Ландшафтъ.

**ПЕКТИСЪ (Pectis).** *Pecten* — гребень, по хохолку. С. сложноцвѣтныхъ. (40). Америка отъ Бразиліи или Боливии до Мексики. Оранже. полувыносил. многол. трав. рр.

**П. ангустифолія (P. angustifolia, узколистный).** С.-З. Америка. Цв. головки желтыя, душистыя. 4—6 д.

**ПЕЛЕКСІЯ (Pelexia).** *Pelex* — шлемъ, по задней долѣ. С. орхидей. (8). Троп. Америка, отъ Бразиліи до Вестиндіи и центр. Америки. Тепл. земн. рр. не особенно орнаментальныя. Уходъ какъ за Гудера.

**П. трилоба (P. triloba, трехлопастная).** Бразилія. Цв. зеленые съ трехлопастною губою.

**ПЕЛЕЦИФОРА (Pelecyphora).** *Pelecyphora* — несущій сѣкуру; по сходству клубней съ сѣкурой. С. кактусовыхъ. (1). Песков. земля. Сѣменами въ умѣренномъ теплѣ.

**П. азеллиформисъ (P. aselliformis, похожая на мокрицу).** Мексика. Цв. бѣлые, или розовые; стебель короткій, покрытый чешуйками, кот. сравнили со спинкою мокрицы. 4 ф. Оранже.

**ПЕЛИОЗАНТЕСЪ (Peliosanthes).** *Pelios* — тусклый и *anthos* — цв. С. кровяниковыхъ. (8). Остиндія и Малайскій архипелагъ. Теплич. многол. трав. рр. Глин. дерн. съ торф. и пескомъ. Побѣгами.

**П. тѣта (P. teta, тета).** В. Гималаи. Цв. зеленоватые, въ апрѣлѣ. **П. хумилисъ (P. humilis, маленький).** В. Гималаи. Цв. зеленоватые, въ маѣ.

**ПЕЛОРИЯ.** Превращеніе неправильнаго цвѣтка въ правильный, вслѣдствіе развитія дополнительныхъ частей.

**ПЕЛЬЛЕА (Pellaea).** *Pellos* — темноцвѣтный; по цвѣту вай. С. папоротниковыхъ. (60). Широко распространенный родъ тепл. или оранже. рр.

**П. андромедефолія (P. andromedae-folia, съ лл. Андромеды).** Америка, Канскія колоніи. Ван 6—12 д., три или четыреперистыя. Оранже. **П. атропурпуреа (P. atropurpurea, темно-пурпуровая).** С. Америка. Ван 4—12 д. длиной, перистыя. Оранже.



**П. брахиптера** (*P. brachyptera*, сь короткими крыльями). Калифорния. Ван 4—6 д. длинной, двуперистая, ланцетовидная. Оранжев. **П. Бриджесии** (*P. Bridgesii*, Бриджеса). Калифорния. Ван 4—6 д., перистая. Оранжев. **П. гераниофолія** (*P. geraniifolia*, сь лл. какъ у Герани). Тропики. Ван 2—4 д. въ длину и въ ширину, дельтовидная, разрывная. Тепл. **П. кордата** (*P. cordata*, сердцевидная). Троп. Америка. Ван въ 1 ф. и длиннее, дельтовидно-ланцетовидная. Тепл. **П. орнитопусъ** (*P. ornithopus*, птичья лапа). Калифорния. Ван 4—6 д. дельтовидная, двуперисто-разсеченная. Оранжев. **П. ротундифолія** (*P. rotundifolia*, круглолистная). Новая Зеландія, о. Норфолкъ. Ван 6—12 д. длинной, перистая. Оранжев. **П. фальсата** (*P. falcata*, серповидная). Австралія. Ван 6—18 д., продолговато-овальной, перистая, Оранжев. **П. хастата** (*P. hastata* копьевидная). Ю. Африка. Ван до 2 ф. длинной, трехперистая. Оранжев.

**ПЕЛЬОНИИ (Pellionia)**. Альфонс Пеллмон (A. Pellion) — сопровождавший Фрейсине. С. крапивоныхъ. (13). Троп. и вост. Азія до Японіи, о. Тихаго океана. Сильная песков. глини. дерн. Дѣленіемъ и черенками.

**П. Давоана** (*P. Davaoana*, Даво). Кохинхина. Цв. зеленые, мелкіе, въ августъ; лл. округло-эллиптические, оливково-бронзовые. Стебли сочные. Снн. **Пеллія Давоана** (*Begonia Davaoana*). **П. пухляра** (*P. pulchra*, красивая). Кохинхина. Лл. продолговатые, верхняя сторона по жилкамъ черная, нижняя — пурпуровая.

**ПЕЛЬТАНДРА (Peltandra)**. *Pelte* — щить и *aner, andros* — тычинка. С. ароидныхъ. (2). Оранжев. или выноса. (въ умѣр. климатѣ) многол. трав. рр. изъ С.-В. Америки. Уходъ какъ за Кальей.

**П. виргиника** (*P. virginica*, виргинская). Цв. длинными початкомъ, въ июнь; лл. большіе, остроколючные. 1 ф.

**ПЕЛЬТАРИЯ (Peltaria)**. *Pelte* — щить, по стручкамъ. С. крестоцвѣтныхъ. (3). Ю. Европа, Малая Азія, Сирія, Персія. Выноса. многол. трав. рр. Легкая. Съеменами или дѣленіемъ.

**П. альдіяца** (*P. alliacea*, сь запахомъ чесноку). В. Европа. Цв. бѣлые, въ июнь. Все р. пахнетъ чеснокомъ. 1 ф.

**ПЕЛЬТОСТИГМА (Peltostigma)**. *Pelte* — щить и *stigma* — рыльце. С. рутовыхъ. (1). Низкое, пахучее тепл. дерево. Песков. глини. дерн. и волокни. торф. Черенками, въ теплѣ.

**П. птелеойдесъ** (*P. pteleoides*, похожа на Птелею). Ямайка. Цв. бѣлые, дов. большіе, въ февраль.

**ПЕЛАРГОНИУМЪ (Pelargonium)**.

*Pelargos* — аистъ; по плодамъ, похожимъ на клювъ этой птицы. С. гераниевыхъ. (170) Мысъ Д. Н. Оранжев. многол. трав. рр. Отличаются отъ Гераниумъ тѣмъ, что верхній сегментъ вѣтвочки оканчивается шпорецъ, сросшейся съ цвѣтот. почкой. Глини. дерн. сь листов. или перегноемъ, пескомъ или древ. углемъ. Черенками. Въ садовомъ отношеніи дѣлятся на *декоративные* (съ крупными разноцвѣт. цвѣтами), *зональные* (употребл. преимущ. для посадки на воздухѣ лѣтомъ) и *помощные* (для подвѣсныхъ вазъ). Гибридныхъ формъ чрезвычайно много, особенно зональных; кот. произошли отъ помѣси П. цоале сь П. никкиансисъ. Эти послѣдніе гибриды преимущественно, если не исключительно, и воспитываются въ садахъ и бывають сь простыми и махровыми красными, бѣлыми, розовыми и тѣлесной окраски цв. Упоминаемые ниже, за исключеніемъ тѣхъ, о кот. сдѣлано поясненіе, все — южно-африканскіе, оранжевые виды.

**П. абротанифоліумъ** (*P. abrotanifolium*, сь лл. какъ у Чернобыльника). Цв. розовые или бѣлые, въ маѣ; лл. вѣерообразные, трехраздѣльные. 3 ф. **П. арденсъ** (*P. ardens*, пламенный). Цв. ярко-шарлаховые, лѣтомъ. Лл. сердцевидные, неравнобокіе. 1—1½ ф. **П. бетуликумъ** (*P. betulinum*, похожій на Березу). Цв. пурпуровые, сь темными черточками, въ июль. Лл. овальные. 3 ф. **П. бисолоръ** (*P. bicolor*, двуцвѣтный). Цв. пурпуровые, сь бѣлымъ ободкомъ, въ июль. 1—2 ф. **П. Боукери** (*P. Bowkeri*, Боукера). Цв. пурпуровые съ желтымъ краемъ, лѣтомъ. Лл. многосложные, какъ у Иксора. **П. глауцифоліумъ** (*P. glaucifolium*, сь лл. какъ у Гляуциума). Цв. темно-пурпуровые, бархатистые, сь зеленоватыми краями, очень душистые, лѣтомъ; лл. лопастные, или перисто-разсеченные, тройные, притомъ пушистые. Гибридъ между П. гибозумъ и П. лобатумъ. Корень клубневой. **П. игнесценсъ** (*P. ignescens*, огненцвѣтный). Цв. шарлаховые, лѣтомъ; лл. сердцевидные, трехлопастные. 1½ ф. **П. инквинансъ** (*P. inquinans*, маркій). Цв. отъ ярко-шарлаховыхъ до розовыхъ и бѣлыхъ, въ июль. Лл. почковидные, бархатистые. 2 ф. Это — родоначальникъ т. н. *скарлетъ-пеларгоніумовъ* нашихъ садовъ. **П. кверцифоліумъ** (*P. quercifolium*, сь лл. какъ у Дуба). Цв. пурпуровые или малиновые, въ маѣ; лл. сь сердцевиднымъ основаніемъ, перисторазсеченные. 3 ф. **П. комптумъ** (*P. comptum*, покрытый). Цв. малиновые, лѣтомъ и осенью; лл. почковидные. Гибридъ. **П. криопумъ** (*P. crispum*, курчавый). Цв. пурпуровые, въ сентябрь. Лл. вѣерообразные, курчавые. 3 ф. **П. облонгатумъ** (*P. oblongatum*, продол-

говатый). Цв. млечно-бѣлые сь пурпур. жилками на верхнихъ лепесткахъ; лл. сочные, широко овальные. 6 д. Корень клубневой. **П. пельтатумъ** (*P. peltatum*, щитовидный). Цв. отъ бѣлыхъ до красныхъ, въ июль; лл. щитовидные. 2 ф. **П. пудъхельюмъ** (*P. pulchellum*, красивый). Цв. бѣлые сь краснымъ пятномъ на каждомъ лепесткѣ, въ апрѣлѣ. Лл. перисторазсеченные. **П. Радуля** (*P. Radula*, Радуля). Цв. бѣдно-пурпуровые, сь черными черточками, въ июнь. 3 ф. Лл. дланевидно-раздѣльные, пахучие. **П. триколоръ** (*P. tricolor*, трехцвѣтный). Цв. сь двумя верхними лепестками темно-красными и тремя нижними бѣлыми, въ июль. Лл. ланцетовидные. 1½ ф. **П. фиссумъ** (*P. fissum*, разсѣченный). Цв. бѣдно-малиновые, лѣтомъ. 1 ф. **П. фратрансъ**, душистый). Цв. бѣлые, сь красными жилками на верхнихъ лепесткахъ, лѣтомъ. 2 ф. Гибридъ. **П. Шотти** (*P. Schottii*, Шоттовъ). Цв. красно-малиновые, сь черными крапинками; лл. перистые. Садов. гибридъ. **П. эхинатумъ** (*P. echinatum*, колючій). Цв. обычно бѣлые сь темно-краснымъ пятномъ на верхнихъ лепесткахъ, въ июль; лл. овально-сердцевидные. 1 ф. **П. Эндлихерианумъ** (*P. Endlicherianum*, Эндлихера). Цв. темно-розовые, большіе, въ июль. Лл. сердцевидные, складчатые, пятилопастные. 2 ф.

**ПЕНАНГЪ**. См. Бактрия.

**ПЕНЕА (Penaea)**. *Pena* (Pena) въ честь сь Лобелемъ написалъ „Adversaria botanica“ въ 1570 г. С. пенейныхъ. (9). Южн. Африка. Низкорослая оранжев. кустарники. Песков. торф. Черенками, въ песокъ, подъ стекломъ.

**П. мукроната** (*P. mucronata*, остроколючная). Цв. и прицвѣтники желтые или пурпуровые, въ июнь. 2 ф. **П. миртоидесъ** (*P. myrtoides*, похожая на Мирту). Цв. красные, въ июнь. 2 ф.

**ПЕНЕЙНЫЯ** рр. (*penaeaceae*). Малочисленное сем. сильно развѣтвленныхъ кустарниковъ, сосредоточенныхъ въ южной Африкѣ. Видовъ 12, родовъ 4. Пенеа, Саркоколя.

**ПЕННИСЕТУМЪ (Pennisetum)**. *Penna* — перо и *seta* — щетинка; по щетинкамъ на цв. колосьяхъ. С. злаковыхъ. (40). Троп. страны, преим. Африки. Оранжев. травы. Обыкн. садовая. Съеменами.

**П. латифоліумъ** (*P. latifolium*, широколистный). Монте-Видео. Цв. колосьями; лл. широко-ланцетовидные. 9—10 ф. Снн. *Гимнострикъ латифолія* (*Gymnothrix latifolia*). **П. лонгистиліумъ** (*P. longistylum*, сь длинными столбикомъ). Абиссинія. Цв. колосьями въ 4—6 д., въ августѣ. Лл. узкіе. 1—1½ ф.

**ПЕНТАГОНИА (Pentagonia)**. *Pen-*

*te* — пять и *gonia* — уголъ; по дѣленіямъ вѣтвочки. С. мареновыхъ. (8). Троп. Америка. Тепл. куст. рр. Уходъ какъ за Цинхопа.

**П. Вѣндлянди** (*P. Wendlandi*, Вѣндлянда). Цв. желтые, въ июль. Лл. овально-ланцетовидные. 2 ф.

**ПЕНТАДЕСМА (Pentadesma)**. *Pente* — пять и *desma* — пучокъ; тычинки пятью пучками. С. гуммигумовыхъ. (1). Тепл. дерево. Глини. дерн. сь торф. Черенками изъ зрѣлаго роста, не срѣзывая и не укорачивая лл., въ тепл. парникѣ. Темп. высокая, во влаж. воздухѣ: зимой 13, лѣтомъ до 26°.

**П. бутирацеа** (*P. butyracea*, мысляная). Троп. Африка. Цв. красные, большіе, красивые, въ ноябрь. Лл. кожистые сь извѣчно-расположенными жилками. Плоды съдомые.

**ПЕНТАПЕРА (Pentapera)**. *Pente* — пять и *pera* — мѣшокъ; по пятигубному плодику. С. вересковыхъ. (1). Кустарн. полувыноса. рр. Уходъ какъ за Эрика.

**П. сікула** (*P. sicula*, сицилійская). Сицилія и Мальта. Цв. бѣлые или тѣлесные, въ маѣ. 2 ф.

**ПЕНТАПЕТЕСЪ (Pentapetes)**. *Pentapetes* — пятилистный, по пятерному цв. С. навозниковыхъ. (1). Тепл. однол. р. Песков. глини. дерн. сь листвою. Съеменами или черенками изъ полузрѣлаго роста.

**П. феніцеа** (*P. phoenicea*, шарлаховый). Троп. Азія. Цв. шарлаховые, дов. большіе, въ июнь. 2—3 ф.

**ПЕНТАПТЕРИГУМЪ (Pentapterygium)**. *Pente* — пять и *pherygion* — крылышко, по чашечкѣ. С. брусничныхъ. (6). В. умѣренная часть Гималаи и горы Казн. Оранжев. эпифитная куст. рр. Торф. Черенками въ песокъ, подъ стекломъ. Содерж. въ корзинахъ или горшкахъ.

**П. ругозумъ** (*P. rugosum*, морщинистый). Казія. Цв. бѣлые сь красными разводами, 1—3 ф. Снн. *Вакийнумъ ругозумъ* (*Vaccinium rugosum*). **П. флавумъ** (*P. flavum*, желтый). С.-В. Индія. Цв. желтые сь красными ободками. 1—3 ф.

**ПЕНТАРАФИЯ (Pentarrhaphia)**. *Pente* — пять и *raphis* — игла, по формѣ чашечки. С. геснеріидныхъ. (40). Вѣстидія, Колумбія. Центр. Америка. Тепл. куст. рр. Уходъ какъ за Геснера.

**П. либанензисъ** (*P. libanensis*, ливанская). Ямайка. Цв. красно-карминовые, въ июнь. 4 д. **П. флорибунда** (*P. floribunda*, многоцвѣтная). Куба. Цв. шарлаховые, лѣтомъ. 4 д.

**ПЕНТАСЪ (Pentas)**. *Pente* — пять, по пятернымъ частямъ цв. С. мареновыхъ. (8). Ю. троп. Африка и Мадагаскаръ.



Тепл. трав. или полукуст. рр. Глин. дерн. съ лиственной и пескомъ. Черенками изъ молодого роста, въ песокъ, въ парникъ. Требуется прищипыванія.

**П. карнеа** (P. carnea, тѣлеснаго цв.). Ю. Африка. Цв. лиловые, большими головками, зимой. 1½ ф. У разновидности *кормезина* (kermesina) цв. розовые.

**ПЕНТАХЕТА (Pentachaeta).** *Pente*—пять, *chaite*—щетинка: при основаніи хохолка—пять щетинокъ. С. сложноцвѣтныхъ. Калифорнія и Мексика. Оранж. или выносъ. однол. трав. рр. Песков. глин. дер. Съменами, весной, въ парникъ.

**П. aurea** (P. aurea, золотистая). Калифорнія. Цв. головки золотисто-желтыя, 2—3 д.

**ПЕНТСТЕМОНЪ (Pentstemon).** *Pente*—пять и *stemon*—тычинка: пятая тычинка замѣтна, хотя и безплодна. С. поричниковыхъ. (66). С. Америка, преим. западная и Мексика. Полувыносъ. многол. трав. или полукуст. рр. Песков. глин. дерн. съ лиственной или перегноемъ. Съменами и черенками изъ бокового роста. Гибнутъ отъ сырости зимой.

**П. антирриноидесъ** (P. antirrhinoides, похожій на Антирринумъ). Цв. желто-лимонные, лѣтомъ. 9—18 д. **П. ацуреусъ** (P. azureus, лазуревый). Цв. лазуревые съ пурпуровою нижнею частью, въ августѣ. 1 ф. **П. баххарифолиусъ** (P. baccharifolius, съ лл. какъ у Баххарисъ). Цв. шарлаховые, въ сентябрѣ. 1½ ф. **П. барбатусъ** (P. barbatus, бородастый). Цв. отъ свѣтло-малиновыхъ до красно-карминныхъ, въ июль. 3 ф. **П. бривифолиусъ** (P. brevifolius, коротколистный). Цв. желтоватые или тѣлесные, въ сентябрѣ. 4—6 ф. **П. венустусъ** (P. venustus, прелестный). Цв. пурпуровые, въ июнь. 2 ф. **П. глаберъ** (P. glaber, гладкій). Цв. пурпуровые, въ августѣ. 6—12 д. Сын. **П. Гордони** *П. эриантера* (P. Gordoni, P. erianthera). **П. грацилисъ** (P. gracilis, изящный). Цв. лилово-пурпуровые или бѣловатые, въ августѣ. 1 ф. **П. деустусъ** (P. deustus, поблѣдный). Цв. желтоватые, въ июнь. 1 ф. **П. диффузусъ** (P. diffusus, распростертый). Цв. пурпуровые, въ августѣ. 1½ ф. **П. Йтони** (P. Eaton, Йтона). Каролина. Цв. шарлахово-малиновые, 1½ ф. Одинъ изъ лучшихъ видовъ. **П. кампанулятусъ** (P. campanulatus, колокольчатый). Цв. отъ малиновыхъ до темно-пурпуровыхъ, фиолетовыхъ и др., въ июнь. 1½ ф. Сын. **П. ангиофилусъ**, *П. атропурпуреусъ*, *П. палеолемусъ*, *Хелоне атропурпуреа*, *Х. кампанулоидесъ*, *Х. робеа* (P. angustifolius, P. atropurpureus, P. pulchellus, Chelone atropurpurea, C. campanuloides, C. rosea). **П. кордифолиусъ** (P. cordifolius, съ сердцевидными лл.). Цв.

ярко-шарлаховые, въ июнь. Полукустарничекъ. **П. Морреанусъ** (P. Morreanus, Моррея). Цв. красные, въ августѣ. 2—3 ф. **П. пубесценс** (P. pubescens, пушистый). Цв. тускло-фиолетовые или пурпуровые, въ августѣ. 1—3 ф. **П. Хартвеги** (P. Hartwegi, Хартвега). Цв. шарлаховые или кроваво-красные, въ июнь. 2 ф. **П. хетерофиллюс** (P. heterophyllus, разнолистный). Цв. малиновые или пурпурово-розовые, въ июнь. 1½ ф.

Кромѣ поименованныхъ рр. въ садахъ встрѣчается громадное число разновидностей и гибридовъ, болѣе или менѣе изящныхъ.

**ПЕНТЦІЯ (Pentzia).** *Pentzia* (Pentz) воспитаникъ Тунберга. С. сложноцвѣтныхъ. (10). Ю. Африка. Оранж. куст. рр. Уходъ какъ за Танацетумъ.

**П. флябеллиформисъ** (P. flabelliformis, вѣеролистная). Цв. головки желтыя, въ маѣ до августа. 2½ ф.

**ПЕНЬ.** Нижняя часть дерева. Стебель одноствѣтловидныхъ. Остатокъ на корню срубленнаго дерева.

**ПЕОНИЯ (Paeonia).** **ПИОНЪ.** Название, заимствованное у Теофраста имѣетъ составленное по *Пиону*—врачу, употребившему р. какъ лечебное средство. С. лютиковыхъ. (5). Европа, умѣр. Азія, С.-З. Америка, Китай. Оранж. или выносъ. съ многол. корневищемъ. Сильная глубокая, уваженная. Дѣленіемъ, которое дѣлать не часто, и ч. оно истончается р.; прививкой, иногда отводкой.

**П. альбифлора** (P. albiflora, бѣлоцвѣтная). Сибирь, Монголія. Цв. бѣлые или малиновые, въ маѣ и июнь. 2—3 ф. Сын. *П. эдулис* (P. edulis). Имѣетъ нѣсколько разновидностей. **П. Мунанъ** (P. Moutan, Мунанъ). *Древесный пионъ*. Китай и Японія. Цв. различной окраски, очень большіе, въ маѣ. Стебли кустарные. 3 ф. Имѣетъ много разновидностей. Оранж. **П. официналис** (P. officinalis, аптечная). *Пионъ*. Ю. Европа. Цв. темно-малиновые, въ маѣ. 2—3 ф. **П. тенуифолия** (P. tenuifolia, мелко-листная). *Воронокъ*. Венгрія, Ю. Россія. Цв. темно-малиновые, въ июнь. **П. Эмоди** (P. Emodi, съ горы Эмоды). Гималаи. Цв. бѣлые, въ мартѣ. 2—3 ф. Оранж.

Всѣ названные пионы имѣютъ чрезвычайно много разновидностей и гибридныхъ формъ, съ простыми и махровыми цвѣтами.

**ПЕПЕЛЬ.** Зола; пережженое и перегорѣлое въ прахъ.

**ПЕПЕРОМІЯ (Peperomia).** *Peperi*—перечь и *otomios*—подобный. С. перцовыхъ. (400). Америка и др. жаркія страны. Тепл. одно- или многол. трав. рр. Волокн. торф. и глин. дерн. съ пескомъ. Черенками и съменами. Лѣтомъ—защита

отъ солнца. Обильно поливать не нужно. Воспитываются ради лл.

**П. клюзифолия** (P. clusiofolia, съ лл. какъ у Клузіи). Вестиндія. Лл. обратно-лицевидные съ красными краями, цв. красные, въ маѣ. 1 ф. **П. макуллоза** (P. maculosa, пятнистая). Троп. Америка. Лл. мясистые, овально-ланцетовидные, ярко-зеленые съ черешками имѣющими пурпуровыя пятнышки. **П. мармората** (P. marmorata, мраморная). Ю. Бразилія. Лл. ярко-зеленые съ бѣлыми разводами; цв. столбчатыми сережками. **П. нуммуларіефолия** (P. nummulariifolia, съ лл. какъ у Нуммулярии). Ямайка. Лл. кругловатые; цв. колосовидныя. **П. Саундерси** (P. Saundersii, Саундерсова). Бразилія. Лл. округлые или овальные съ ярко-зелеными полосками по жилкамъ, между которыми—бѣлыя. Сын. *П. арифолия* *арифея*, *П. Верскаффеліи* (P. arifolia argyrea, P. Verschaffeltii).

**ПЕРВОЗІМЬЕ, — ЗІМКИ, — ЗІМНИЦА.** Начало, наступленіе зимы, или зимняго пути.

**ПЕРВОЦВѢТОВЫЯ** рр. (primulaceae). Трав. рр. обычно съ многолѣтн. корневищемъ и очень рѣдко кустар. Встрѣчаются главнѣйше въ сѣв. умѣренныхъ (особенно альпійскихъ) поясахъ и очень рѣдко на южн. полушаріи, а еще рѣже—подъ тропиками. Въ сем. до 250 видовъ, принадлежащихъ къ 21 роду, изъ которыхъ Андроэа, Лизимахія, Примуля и Циклиментъ—главнѣйшіе.

**ПЕРВОЦВѢТЪ.** См. Примуля.

**ПЕРГУЛАРІЯ (Pergularia).** *Pergula*—бесѣдка изъ раст.; по выносившимъ свойствамъ. С. ласточниковыхъ. (10). Троп. Азія и Африка, Ю. Африка. Тепл. выщ. рр. Уходъ какъ за Стефанотисъ.

**П. одоратиссима** (P. odoratissima, очень благовоющая). Китай. Цв. зеленоватые, очень душистые, въ июнь.

**ПЕРЕВІТЬ** (парникъ). Разрыхлить навозъ, снова примявъ; набить снова свѣжимъ навозомъ.

**ПЕРЕГНОЙ.** Перегноенный, перегнившій навозъ; черноземъ.

**ПЕРЕКАТІ-ПОЛЕ.** См. Фломисъ.

**ПЕРЕСАДА.** То же, что расада.

**ПЕРЕСАДКА. ПЕРЕСАЖИВАТЬ.** Сажанье на другое мѣсто или въ другую посуду со свѣжею землею.

**ПЕРЕСАДНИКЪ.** Мѣсто, куда пересаживаются растенія. Рассадникъ.

**ПЕРЕСІЯ (Perezia).** Лисарусъ *Пересъ* (Lazarus Perez),—аптекарь въ Толедо, написавшій въ 1575 г. книгу о лекарственныхъ. С. сложноцвѣтныхъ, (46). Въ

троп. южн. Америка, Мексика. Калифорнія и Бразилія. Уходъ какъ за Астеромъ.

**П. вискоза** (P. viscosa, липкая). Чили. Цв. головки пурпуровыя, въ июнь. 1½ ф.

**ПЕРЕСКІЯ (Pereskia).** *Н. Перескъ* (Peresk),—сенаторъ въ Проансѣ, собравшій значительную бібліотеку и гербарій. С. кактусовыхъ. (13). Троп. Америка и Вестиндія. Тепл. кустар. или дерев. рр. употребляемыя какъ дички для прививки др. кактусовъ. Песков. глин. дерн. съ толченымъ кирпичемъ. Черенками въ песокъ. Содержать сухо.

**П. акулеата** (P. aculeata, колючая). Вестиндія. Цв. бѣлые, въ октябрѣ. Лл. эллиптическіе. 5—7 ф. **П. Влео** (P. Bleo, Влео). Нов. Гренада. Цв. бѣдно-красные, въ октябрѣ до января. 8—10 ф. **П. грандифолия** (P. grandifolia, крупнолистная). Бразилія. Цв. бѣлые, въ августѣ. 6 ф. Сын. *П. грандифлора* (P. grandiflora).

**ПЕРИЛОМІЯ (Perilomia).** *Peri*—вокругъ и *loma*—бахрома, по крылатымъ орликамъ. С. губоцвѣтныхъ. (8). Юж. Америка отъ Чили и Боливии до Мексики. Оранж. куст. рр. Песков. торф. Черенками изъ молодого роста, въ песокъ, въ парникъ.

**П. скутелляріоидесъ** (P. scutellarioides, похожая на Скутелларію). Перу. Цв. шарлаховые, крупныя, въ августѣ. 3 ф.

**ПЕРИЛЬЯ (Perilla).** Мѣстное индійское названіе. С. губоцвѣтныхъ. (3). Горы Индіи и Китая. Полувыносъ. однол. трав. рр. Легкая нескон. глин. дерн. Съменами въ парникъ, затѣмъ—высаживаются на воздухъ въ половинѣ маѣ.

**П. оцимоидесъ** (P. ocmoides, похожая на Оцимумъ). Индія, Китай. Цв. бѣлые, въ июль—августѣ. Лл. широкіе, овальные, острокопечные, фиолетовые. 1—3 ф. Сын. *П. гетероморфи* (P. heteromorphia). У разновидности *криста* (crispa) лл. бронзово-пурпуровые съ курчавыми и бахромчатыми краями. Сын. этой разновидности—*П. панкинзисъ* (P. pankinensis).

**ПЕРИПЛОКА (Periplocia).** *Peri*—вокругъ и *ploke*—обвивъ; по обвитости нѣк. видовъ. С. ласточниковыхъ. (12). Юж. Европа, умѣр. Азія, троп. Африка. Тепл., оранж. и выносъ. куст. рр. Глин. дерн. съ пескомъ. Отводкой и черенками.

**П. грѣка** (P. graca, греческая). *Сандина*. Ю.-З. Европа, Востокъ. Цв. спаружи зеленые, внутри коричневыя, въ июль.

**ПЕРИСТЕРІЯ (Peristeria).** *Peristera*—голубь, по формѣ столбика. С. орхидей. (11). Съ Андовъ Колумбіи. Тепл. рр., нуждающіяся въ такомъ же уходѣ, какъ Ациета.



**П. элата** (*P. elata*, высокая). Панама. Цв. белые, очень пахучие, с июля до сентября. 4 ф. Называется на роднѣ, по сходству столбика съ голубемъ,—*цв. Св. Духа* (*Espiritu Santo*).

**ПЕРИТОМА** (*Peritoma*). *Peritome*—сплошной обрѣзъ, по основанію чашечки. С. каперовыхъ. Малочисл. родъ съ сѣверо-американскихъ однол. трав. pp. Уходъ какъ за Клеоме.

**П. aurea** (*P. aurea*, золотистая). Цв. желтые, въ июль—августъ. 1 ф. Спн. *Клеоме лутеа* (*Cleome lutea*).

**ПЕРИСТРОФЕ** (*Peristrophe*). *Peristrophe*, перевернутый; вѣтчикъ перевернутъ вверхъ дномъ. С. акантовыхъ. (15). Ю. Африка, Мадагаскаръ, Остиндія, Китай, Малайскій архипелагъ. Тепл. полувыносія трав. pp. Уходъ какъ за Юстиція.

**П. специоза** (*P. speciosa*, особенное). Индія. Цв. карминово-пурпуровые, зимой. 4 ф.

**ПЕРИСТЫЙ** листь. Имѣющій маленькіе листья, расположенные бородкой птичьяго пера, т. е. когда на главной жилкѣ, съ каждой стороны, выходятъ листочки.

**ПЕРИТЕЦІЙ**. Плодоносный слой сумчатыхъ грибовъ, лежащихъ внутри.

**ПЕРНЕТТИЯ** (*Pernettya*). *Pernettya* (Pernetty)—сопровождалъ Бугенвиля въ кругосвѣтномъ плаваніи, † 1804. С. вересковыхъ. (15). Горы Тасмани и Нов. Зеландіи, Бразилія и горы З. Америки отъ Огненной земли до Мексики. Полувыносія куст. pp., нуждающіеся въ такомъ же уходѣ, какъ Гаультерія.

**П. pilosa** (*P. pilosa*, пушистая). Мексика. Цв. белые, въ маѣ. 6 д. **П. фугенсъ** (*P. fucens*, одуряющая). Чили. Цв. белые, въ мартѣ. Низкій, вѣтвистый кустарничекъ.

**ПЕРО**. Листокъ перистаго листа. Зелень лука и чеснока. Колѣнце злаковъ и другихъ pp. съ суставчатымъ стеблемъ. Деревянный отвалъ у сохи.

**ПЕРСЕА** (*Persea*). Такъ названо Теофрастомъ какое-то египетское дерево. С. лавровыхъ. (100). Троп. Азія и Америка, Канарскіе о. Тепл. дрв. или куст. pp. Глин. дер. съ волокни. торф. Осенью отводкой, весной—черенками изъ зрѣлаго роста въ песокъ, въ парникъ.

**П. гратиссима** (*P. grattissima*—благодатная). *Авокада*. Вестиндія. Цв. зеленые. Лл. эллиптическіе. Плоды грушевидные, желтые или коричневые, длиной въ 4 д., вкусомъ похожіе на маслянистый каштанъ. 25—30 ф.

**ПЕРСИДСКАЯ РОМАШКА**. См. Ширетрумъ.

**ПЕРСИКА** (*Persica*). *Persica* предполагается родиною этого р<sup>з</sup> С. розановыхъ. Малочисленный родъ, причисляемый нынѣ къ Прунустъ. Европа и жаркія мѣста Азіи.

**П. вульгарисъ** (*P. vulgaris*, обыкновенная). *Персикъ*. Вѣроятно В. Азія. Цв. блѣдно- или темно-красные; плодъ покрытый бархатистою кожицею; лл. ланцетовидные. 15 ф. Спн. *Прунусъ персика* (*Prunus persica*). Имѣетъ много разновидностей какъ орнаментальныхъ, такъ и фруктовыхъ, притомъ съ простыми и махровыми цв., съ зелеными и пурпуровыми или пестрыми лл. Разновидность *лависъ* (*laevis*) имѣетъ плоды съ гладкою кожицею, называемые *нектаринами*. Спн. *Прунусъ лависъ* (*Prunus laevis*). Разводится у насъ въ оранжереяхъ на шпалеръ, могутъ быть содержимы низкорослыми деревцами.

**ПЕРСОНІЯ** (*Persoonia*). *Персоонъ* (С. П. Persoon)—извѣстный ботаникъ, авторъ „*Synopsis plantarum*“ † 1837. С. протейныхъ. (60). Новая Зеландія, Австралія. Орнам. оранж. кустарн. или малорослая дрв. pp. Глин. дер. съ торф. и пескомъ по ровну. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ песокъ, въ парникъ.

**П. лонгифолия** (*P. longifolia*, длиннолистная). Цв. желтые, въ июль. 10—20 ф. Спн. *П. Друммондиди* (*P. Drummondii*). **П. ригиди** (*P. rigida*, жесткая). Цв. желтые, въ июль. 3—4 ф. **П. ферругинеа** (*P. ferruginea*, ржавая). Цв. желтые, съ рыжеватымъ пушистымъ покровомъ, въ июль. 3 ф.

**ПЕРЦОВЫЯ** pp. (*pipercaceae*). Травянистыя, кустарныя, иногда древесныя ароматическія, возбуждающія, породы, широко распространенныя по земной поверхности. Видовъ до 1000, родовъ 8, въ томъ числѣ Готтунія, Пеперонія и Пиперъ.

**ПЕСОКЪ**. Измельченный природою камень, мелкіе камешки. *Кремневый* или *кварцевый* песокъ *крупный* (дресва, хрящъ, гравій), *рѣчной* (чистый безъ примѣси землѣстыхъ частей). Необходимая примѣсь для смѣсей земли; способствуетъ образованію скважности, рыхлости земли; положенный на поверхности, послѣ поливки, дѣлается болѣе плотнымъ и служитъ для удержанія черенковъ, которые приживаются въ чистомъ пескѣ несравненно лучше. Лучшій песокъ—рѣчной.

**ПЕСТИКОВЫЙ, ПЕСТИЧНЫЙ**. Цвѣтокъ содержащій пестикъ или пестики. Часть принадлежащая къ пестіку.

**ПЕСТИКЪ**. Плодникъ, часть цвѣтка,

оплодотворяющаяся цвѣтнемъ и образующая завязь и плодъ; состоитъ или изъ плодника, или яичника, столбика на немъ и рыльца, которое сидитъ поверхъ столбика, либо изъ плодника и рыльца.

**ПЕТАЗИТЕСЪ** (*Petasites*). Заимствовано у Dioscorida: *petasos*—зонтикъ,—по разбѣрамъ лл. С. сложноцвѣтныхъ. (12). Европа, Азія и С. Америка. Выносія. и полувыносія. пушистыя многол. трав. pp. Глин. дерн. съ пескомъ. Дѣленіемъ. Нѣк. довольно красивы.

**П. фрагрансъ** (*P. fragrans*, душистый). Ю.-З. Европа. Цв. головки белые, душистые, въ февралѣ. Лл. низку сердцевидные, округлые, зубчатые. 6 д. Спн. *Туссилло фрагрансъ* (*Tussilago fragrans*). **П. фригиди** (*P. frigida*, холодный). Арктическія страны. Цв. головки белые, въ апрѣлѣ—маѣ. Лл. округлые, почковидные, на нижней сторонѣ пушистые. 6 д. Спн. *Туссилло фригиди* (*Tussilago frigida*).

**ПЕТАЛИДИУМЪ** (*Petalidium*). *Petalon*—лепестокъ, по лепестковиднымъ прицвѣткамъ. С. акантовыхъ. (3). Остиндія. Троп. и Южн. Африка. Тепл. куст. pp. Уходъ какъ за Юстиція.

**П. барлеріоидесъ** (*P. barlerioides*, похожий на Барлерію). Индія. Цв. белые, въ июль. 4 ф.

**ПЕТАЛОСТЕМОНЪ** (*Petalostemon*). *Petalon*—лепестокъ и *stemon*—тычинка. С. бобовыхъ. (14). Жаркія страны С. Америки. Многол. полувыносія. трав. pp. Песков. глин. дерн. съ пескомъ или листовою. Дѣленіемъ весной.

**П. кандидусъ** (*P. candidus*, белый) Цв. белые, въ июль. 1 ф. **П. violaceусъ** (*P. violaceus*, фиолетовый). Цв. розово-пурпуровые, въ июль. 1 ф.

**ПЕТАЛАКТЕ** (*Petalacte*). *Petalon*—лепестокъ и *acte*—лугъ, по лепестковиднымъ чешуйкамъ ложа. С. сложноцвѣтныхъ. (1). Оранж. полукуст. Уходъ какъ за Хелихризумъ.

**П. короната** (*P. coronata*, увѣчанное). Ю. Африка. Цв. головки белые, мелкія, въ маѣ. 1 ф.

**ПЕТИВЕРІЯ** (*Petiveria*). *Петиверъ* (James Petiver)—аптекарь въ Лондонѣ и замѣчательный ботаникъ, † 1718. С. лаконосовыхъ. (1). Тепл. трав. pp. Глин. дерн. съ торф. Черенками изъ полурѣлаго роста, въ парникъ. Темп. зимой 7—12, лѣтомъ 13—24°.

**П. альбида** (*P. alba*, похожая на Лукъ). Отъ Мексики до Бразиліи. Цв. белые, въ июль. 2—3 ф. Все р. пахнетъ лукомъ.

**ПЕТЛЯ**. Мѣсто соединенія жилокъ, нервовъ, листа; анастомозъ.

**ПЕТРЕА** (*Petraea*). Лордъ *Петре* (R. J. Lord Petre) покровитель ботаники, † 1742. С. вербеновыхъ. (12). Троп. Америка. Тепл. выощ. куст. pp. Сильная, перегнойная. Черенками въ песчан. землѣ, въ парникъ. Темп. зимой до 13, лѣтомъ до 26°.

**П. арбореа** (*P. arborea*, древесная). Ю. Америка. Цв. голубые съ фиолетовымъ отливомъ, въ июль. 12 ф. **П. волюбилисъ** (*P. volubilis*, выносящаяся). Панама до Бразиліи. Цв. пурпуровые, въ июль. 20 ф.

**ПЕТРОВІУМЪ** (*Petrobium*). *Petros*—камень и *bio*—жить, по мѣсту произрастанія. С. сложноцвѣтныхъ. (1). Тепл. орнам. дрв. р. Песков. глин. дерн. Черенками въ такой-же землѣ.

**П. арбореумъ** (*P. arboreum*, древесный). О. св. Елены. Цв. головки желтыя, въ июль. Лл. супротивные, зубчатые.

**ПЕТРОФИЛІЯ** (*Petrophila*). *Petros*—камень и *phileo*—любить. С. протейныхъ. (35). Австралія. Оранж. куст. р. Уходъ какъ за Банксіа.

**П. ацикуларисъ** (*P. acicularis*, иглочатая). Цв. белые съ краснымъ, въ маѣ. Лл. тонкіе, круглые. 2 ф.

**ПЕТУНГА** (*Petunga*). Бенгальское мѣстное названіе одного изъ видовъ. С. мареновыхъ. (5). В. Бенгалъ, Малайскій, полуо., Инд. архип. Тепл. куст. pp. Уходъ какъ за Кетесбѣа.

**П. Роксбургия** (*P. Roxburghii*, Роксбурга). Индія. Цв. белые мелкіе, въ маѣ. 3—8 ф.

**ПЕТУНІЯ** (*Petunia*). *Petun* въ Бразиліи называется табакъ. С. пасленовыхъ. (12). Бразилія, Аргентинская республика. Полувыносія. одно- или многол. трав. pp. Глин. дерн. 2 ч., перегной 1 ч. Съмена-ми или черенками весной.

**П. violacea** (*P. violacea*, фиолетовая). Буеносъ-Айресъ. Цв. фиолетово-пурпуровые, воронкообразно-колокольчатые, съ горбатою трубкой и неравнобѣжными краемъ, въ августъ. С. *Нирембергійя феніцеа*, *Сальмидиссисъ интермедіа* (*Nierembergia phoenicea*, *Salpiglossis integrifolia*). **П. интермедіа** (*P. intermedia*, промежуточная). Буеносъ-Айресъ. Цв. съ желтой трубкой и пурпуровымъ покровомъ съ болѣе свѣтлымъ краемъ, въ августъ. 1 ф. Спн. *Нирембергійя интермедіа*, *Сальмидиссисъ линейарисъ* (*Nierembergia intermedia*, *Salpiglossis linearis*). **П. никтагинифлора** (*P. nyctaginiflora*, почечковидная). Ю. Америка. Цв. белые съ длинной трубкой, въ августъ. 2 ф.

Понименные три вида, особенно первый и третій, служили родоначальниками огромнаго числа формъ съ простыми и



махровыми цв. воспитываемыми теперь въ садахъ.

**ПЕУМУСЪ** (*Peumus*). Мѣстное чилийское названіе. С. остролистныхъ. (1). Оранже. дернистое дерево. Песков. торф. Черенками.

**П. Больдусъ** (*P. Boldus*, Больдусъ). Чили. Цв. бѣлые, въ маѣ. 20 ф. Лз употр. въ медицину; плоды—съѣдомые, кора идетъ для дубленія.

**ПЕУЦЕДАНУМЪ** (*Peucedanum*). Древне-греческое названіе, заимствованное у Гипократа. С. зонтичныхъ. (100). Сѣв. полушаріе, Анды троп. Америки и троп. и Южн. Африка. Многол., рѣдко однол. трав., куст. и иногда древ. рр. не имѣющія садоваго значенія. Изъ нихъ

**П. сативумъ** (*P. sativum*, съѣдомый). *Ластернякъ*—извѣстное огородное р., встрѣчаемое дико въ Европѣ и Сибири. Цв. желтые, въ іюль и августъ. 2—3 ф. Высѣвается прямо на гряды, въ огородахъ. Употр. въ пищу корень, замѣняющій петрушку.

**ПЕЧЕРИЦА. ПЕЧУРА.** Шампиньонъ.

**ПИГАФЕТТА** (*Pigafetta*). Происхождение названія не объяснено. С. пальмъ. (3). Малайскій архип. и Нов. Гвинея. Тепл. рр., требующія того-же ухода, какъ Метроксилонъ.

**П. элата** (*P. elata*, высокая). Целебесъ. Лз. растопыренные и ниспадающіе, похожіе на кокосовые. Сип. *Метроксилонъ элатумъ*, *Xiosidone elata* (*Metroxylon elatum*, *Hyospathe elata*).

**ПИЗОНІЯ** (*Pisonia*). *Пизо* (Willem Piso), амстердамскій врачъ и натуралистъ-писатель, † 1648. С. ночевѣстныхъ. (60). Троп. Америка, Азія, о. Тихаго ок. и Маскаренскіе. Тепл. или оранже. куст. или древ. рр. Глин. дерн. Черенками.

**П. аскулейта** (*P. asculata*, колючая). Тропики. Цв. зеленоватые, въ мартъ. 10 ф. Куст. р. съ загнутыми колючками.

**ПІЗУМЪ** (*Pisum*). Старо-латинское названіе, употребленное Виргиліемъ и обозначающее съ греч. *pison*. С. бобовыхъ. (2). Средиземн. побереж. 3. Азія и Таврскія горы. Выющ. выноса. однол. рр. Легкая глин. дерн. Сѣменами.

**П. сативумъ** (*P. sativum*, съѣдомый). *Горохъ*. Ю. Европа. Цв. бѣлые или красные, съ іюля до сентября. Имѣетъ весьма много разновидностей и сортовъ, которые дѣлятся на поздніе и ранніе, высокіе и низкіе, сахарные и для лушенія, съ бѣлыми и зелеными гладкими или морщинистыми горошинками.

**П. элатіусъ** (*P. elatius*, высокий). Португалия. Цв. бѣдно-красные, съ іюня до сентября. Выоющееся р.

**ПИКЕРІЯ** (*Piqueria*). *Пикерія* (*Piqueria*)—испанскій ботаникъ, переведшій Хипократъ въ 1757 г. С. сложнолистныхъ. (10). Ю.-З. Америка отъ Боливии до Мексики. Оранже. кустарника, рѣдко трав. однол. или многол. рр. Глин. дерн. съ пескомъ. Сѣменами и дѣленіемъ.

**П. латифолия** (*P. latifolia*, широколистая). Перу. Цв. головки пурпуровыя, въ іюль. 1½ ф. Однол. Сип. *Агератумъ латифолиумъ*, *Фалакрѣумъ celestiumъ* (*Ageratum latifolium*, *Phalacraeum celestium*). **П. тринервія** (*P. trinervia*, трехнервная). Мексика. Цв. головки бѣлыя, въ іюль. 2 ф. Многол. трав.

**ПИКИРОВАНИЕ.** Разсаживаніе сѣянцевъ отдѣльно въ маленькіе горшки или на грядкѣ. Дѣлается какъ только покажутся первые листья и сѣянцы можно ухватить. Необходимости пикированія избѣгается рѣдкимъ сѣвомъ, но и при этомъ отдѣльная посадка всходовъ представляется во многихъ отношеніяхъ полезною. Разсаженные растенія въ первое время нуждаются во внимательномъ уходѣ.

**ПИКНОСТАХИСЪ** (*Pycnostachys*). *Pylnos*—густой и *stachys*—колосъ, по плотнымъ колосамъ. С. губоцвѣтныхъ. (6). Троп. Африка и Мадагаскаръ. Тепл. одно- или многол. трав. рр. Уходъ какъ за Оцимумъ.

**П. уртицифолия** (*P. urticifolia*, съ лз. какъ у Крапивы). Африка. Цв. голубые, въ августъ. 3 ф. **П. церулея** (*P. caerulea*, голубой). Мадагаскаръ. Цв. голубые, въ августъ. 1 ф. Однол.

**ПИКРОРИЦА** (*Picrorhiza*). *Pitros*—горькій и *rhiza*—корень, по вкусу корня. С. норичниковыхъ. (1). Индія. Полувыш. многол. трав. рр. Уходъ какъ за Вульфенія.

**П. Курроа** (*P. Curroa*, Курроа). Гималаи. Цв. бѣлые или свѣтло-голубые, въ августъ.

**ПИКСИДАНТЕРА** (*Pyxidanthera*). *Pyxis*, *pyxidos*—ящикъ и *anthos*—цвѣтокъ. С. диаспенсіевыхъ. (1). Полуцвѣт., приземистый кустъ. Песков. земля, на солонечномъ положеніи. Дѣленіемъ.

**П. барбулата** (*P. barbata*, мало-бородая). Нов. Джерсей. Цв. бѣлые или розовые. ранней весной. Лз. узкіе, черепичатые. 2 д. Сип. *Дианѣсія барбулата* (*Dianthes barbata*).

**ПИКЕТІЯ** (*Pictetia*). *Пиктѣ* (A. Pictet) франц. естествоиспытатель, † 1825. С. бобовыхъ. (6). Троп. Америка. Оранже. куст. рр. Глин. дерн. съ торф. Черенками въ песокъ, въ парникъ.

**П. аристата** (*P. aristata*, остистая). С.-Доминго. Цв. желтые, рыхлыми кистями, въ іюнь—іюль. 5—10 ф. Сип. *Эсхиномене*

*аристата* (*Aeschynomene aristata*). **П. сквамата** (*P. squamata*, чешуйчатая). О. св. Омы. Цв. желтые, рыхлыми кистями, въ іюнь—іюль. 6 ф. Сип. *Робинія сквамата* (*Robinia squamata*).

**ПИЛА.** Стальная полоса съ нарѣзными зубьями. Садовая бываетъ въ видѣ *посевки*, обѣ одной рукояткѣ. Для распила плахи и дровъ служитъ *поперечная* двуручная пила, широкая брюшная полоса съ крупными зубьями и по обоимъ концамъ съ ручками. Пилу должно смазывать саломъ, чтобы не ржавѣла. Держать вообще въ сухомъ мѣстѣ.

**ПІЛЕА** (*Pilea*). *Pilos*—копакъ, по одному изъ сегментовъ цв. покровъ. С. крапивныхъ. (160). Вестиндія и троп. страны за исключеніемъ Австраліи. Тепл. одно- и многол. трав. рр. Глин. дер. съ листов. Сѣменами, черенками и дѣленіемъ.

**П. микрофилля** (*P. microphylla*, съ маленькими лл.). Цв. въ полузонтикахъ, лѣтомъ. 6 д. Сип. *П. мускоза* (*P. muscosa*).

**ПІЛЕАНТУСЪ** (*Pileanthus*). *Pilos*—копакъ и *anthos*—цвѣтокъ, по общей оберткѣ, заключающей цв. С. миртовыхъ. (3). 3. Австралія. Оранже. куст. рр. Уходъ какъ за Калитриксъ.

**П. лимацис** (*P. limacis*, похожій на Лимаксъ). Цв. бѣлые, въ апрѣль. 2—3 ф.

**ПИЛОКАРПУСЪ** (*Pilocarpus*). *Pilos*—копакъ и *carpos*—плодъ, по формѣ ягодъ. С. рутовыхъ. (5). Троп. Америка и Вестиндія. Тепл. кустарн. рр. Уходъ какъ за Хлороксилонъ.

**П. пеннатифолиусъ** (*P. pennatifolius*, съ лл. похожими на перья). Бразилія. Цв. пурпуровые, лл. парно-перистые. 6 ф. Это—одно изъ рр. дающихъ *лборанди*—врачебное вещество.

**ПИЛОЦЕРЕУСЪ** (*Pilocereus*). *Pilos*—копакъ и *Cereus*—Цереусъ, по длиннымъ волосамъ. С. кактусовыхъ. Мало-численный родъ, причисляемый теперь къ Цереусъ. Уходъ какъ за Кактусъ.

**П. Даутвигіи** (*P. Dautwitzii*, Даутвигіи). С. Перу. Стволъ веретенообразный съ 21 ребромъ, усаженнымъ прямыми иглами и густыми бѣлыми волосами. **П. сенілисъ** (*P. senilis*, стариковскій). Мексика и Гватемала. Стебель о 30 или 40 узкихъ ребрахъ съ бѣлыми иглами и сѣрыми волосами, приподнимающими видъ головы стараго человѣка. **П. Хульетіи** (*P. Houletii*, Хульетіи). Стебель твердый, сѣро-зеленый, о 8 или 7 ребрахъ; цв. фиолетовые съ краснымъ отливомъ.

**ПІМЕЛЕЯ** (*Pimelea*). *Pimele*—жиръ; по маслянистымъ сѣменамъ. С. ягодковыхъ. (76). Австралія и Нов. Зеландія. Оранже. древ., кустарника и рѣдко трав.

рр. Вылоки. торф. съ пескомъ или глин. дерн. съ пескомъ. Черенками изъ молодого роста, подъ стекломъ. Темпер. зимой 4—7°.

**П. лигустринна хиперидина** (*P. ligustrina hypericina*, похожая на Лигуструмъ и Хиперикумъ). Цв. бѣлыми головками, въ маѣ. 5—6 ф. **П. розеа** (*P. rosea*, розовая). Цв. малиновые или бѣлые, въ іюнь. Сип. **П. Хендерсона** (*P. Hendersonii*). **П. спектабилисъ** (*P. spectabilis*, замѣчательный). Цв. бѣлые съ малиновымъ отливомъ, въ маѣ. 3—4 ф. Сип. **П. Версхаффельтіи** (*P. Verschaeltii*). **П. суавейденсъ** (*P. suaveolens*, душистая). Цв. желтые, головками, въ апрѣль. 1—3 ф. Сип. **П. макроцефал** (*P. macrocephala*). **П. ферругинеза** (*P. ferruginea*, ржавая). Цв. розовые или красные, шаровидными головками, въ маѣ. 1—2 ф. Сип. **П. декуссата**, **П. диомифолия** (*P. decussata*, *P. diomifolia*). **П. хиспида** (*P. hispida*, волосатая). Цв. тѣлесно-розовые большими головками, въ маѣ. 2—4 ф.

**ПІМЕНТА** (*Pimenta*). Испанское названіе. С. миртовыхъ. (5). Троп. Америка, Остиндія. Очень душистая тепл. древ. рр. Уходъ какъ за Миртусъ.

**П. акрисъ** (*P. acris*, острый). Вестиндія. Цв. бѣлые съ красноватымъ отливомъ, въ маѣ до іюля. Ягоды съ горошиною, аромат. вкуса и запаха. 20—40 ф. Ягоды и лл. употребляются также въ кухнѣ. **П. официналисъ** (*P. officinalis*, аптечная). Ямайка. Цв. бѣлые, въ маѣ до іюля. 2 ф. Сип. **П. вульгарисъ**, *Евгения пимента*, *Миртусъ пимента* (*P. vulgaris*, *Eugenia Pimenta*, *Myrtus Pimenta*).

**ПІМПИНѢЛЬ.** См. Потеріумъ.

**ПІНАНГА** (*Pinanga*). Мѣстное малайское названіе. С. пальмъ. (25). Малайскій архипелагъ. Тепл. пальмъ съ тонкимъ стволомъ. Глин. дерн. 1 ч., торф. 2 ч. и немного песку. Сѣменами.

**П. Вейчій** (*P. Veitchii*, Вейча). Борнео. Лл. продолговатые, двуразцѣпленные съ красноватыми жилками. **П. короната** (*P. coronata*, вѣнчаная). Ява. Лл. перисторазсѣченные; лл. эллипсоидальные; скученные вокругъ дискообразнаго рыльца, образуютъ какъ-бы вѣнокъ. 15—20 ф. Сип. *Сифортія короната* (*Sealforthia coronata*). **П. латисекта** (*P. latisecta*, широко-разсѣченная). Суматра. Лл. перисторазсѣченные. 15 ф. Сип. *Сифортія латисекта* (*Sealforthia latisecta*). **П. тернатензисъ** (*P. ternatensis*, съ о. Терната). Лл. въ 12 ф. длиною, съ 30—40 ланцетов. серповидными сегментами. Сип. *Арека гигаантеа* (*Areca gigantea*).

**ПІНГВИКУЛЯ** (*Pinguicula*). *Pinguis*—жиръ, по жирному строенію рр. С. пузрышковыхъ. (30). Болотистыя выг-



троп. страны Сѣв. полушарія, на Андахъ до арктич. странъ Америки. Оранж. или выносл. трав. рр. Выносливы—въ болотистой землѣ и размнож. сѣменами или листов. черенками, либо дѣленіемъ; оранж.—въ торф. съ торф. мохомъ или волокн. торф. съ черенками.

**П. грандифлора** (*P. grandiflora*, крупноцвѣтная). Ю.-З. Ирландія. Цв. сине-фіолетовые, лѣтомъ; лл. розеткой. **П. каудата** (*P. caudata*, съ хвостомъ). Мексика. Цв. ярко-карминовые, осенью. Снп. **П. флос-мулионис** (*P. flos-mulionis*).

**ПИНЕЛЬДІЯ** (*Pinellia*). Такъ называлъ этотъ родъ Теноръ, въ память своего друга. С. ароидеиныхъ. (4). Сѣв. Китай и Японія. Полувыносл. клубневая трав. рр. Песков. глин. дерн. Дѣленимъ зимой, до начала роста.

**П. тубифера** (*P. tubifera*, имѣющая трубку). Японія. Чехолъ съ узкой цилинд. трубкой и продолговатой пластинкой; лл. трехрасчлененные, черешки производятъ клубышки.

**ПИНКНЕЙЯ** (*Pinckneya*). *Пинкней* (*Pinckney*)—американскій ботаникъ. С. мареновыхъ. (1). Оранж. деревцо. Глин. дерн. съ торф. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ песокъ, въ умѣр. теплотѣ подъ стекломъ.

**П. пубенсъ** (*P. pubens*, пушистая). Отъ Каролины до Флориды. Цв. розовые съ пурпуровыми пятнышками, дов. большіе, лѣтомъ. 20 ф. Существенную красоту составляютъ большіе малиновые прицвѣтники.

**ПИНУСЪ** (*Pinus*). **СОСНА**. Название, заимствованное у Виргилія и др. и вѣроятно происходящее отъ *pinx*, *picis* — смола. С. хвойныхъ. (70). Въ тропич. страны С. полушарія, нѣк. подъ тропиками въ Азіи, Востиндіи и Сред. Америки. 3. различная по каждому р. Размнож. обычно сѣменами весной или прививкой.

**П. аустриака** (*P. austriaca*, австрийская). Австрія. Лл. темнозеленые, остроколючные; шишки красноватые. 75—100 ф. Снп. **П. ларичіо нигра**, **П. нигра** (*P. Laricio nigra*, *P. nigra*). **П. Коултера** (*P. Coulteri*, Коултера). Калифорнія. Лл. сизоватые, трехгранные; шишки большія. 50—70 ф. Снп. **П. макрокарпа** (*P. macrocarpa*). **П. Ларичіо** (*P. Laricio*). *Корсиканская сосна*. Ю. Европа. Лл. растопыренные, волнистые; шишки свѣтло-коричневые. 100—150 ф. Ростъ прямой, вѣтви короткія. Имѣетъ нѣсколько разновидностей. **П. монтана** (*P. montana*, горная). Сред. Европа. Низкорослая, кустарная; лл. короткіе, шишки маленькія. 5—15 ф. Снп. **П. мугусъ**, **П. пумило** (*P. Mugus*, *P. pumilio*). **П. мон-**

**тиколя** (*P. monticola*, съ вершинъ горъ). С. Калифорнія. Лл. сизые, трехгранные; шишки остроколючныя. 75—100 ф. **П. пинастеръ** (*P. pinaster*). *Приморская сосна*. Средиземное побережье. Лл. ярко-зеленые; шишки густыми кистями. 60—80 ф. Имѣетъ нѣсколько разновидностей. **П. пинеа** (*P. pinea*, Пинія). *Италийская сосна*. Средиземное побережье. Лл. темнозеленые, полуцилиндрич., жесткіе; шишки съ твердыми чешуйками. Красивое дерево. 50—60 ф. съ кроною зонтикомъ. **П. пондероза** (*P. ponderosa*, съ тяжелою древесиной). Калифорнія. Лл. темносизые, шишки яйцевидныя. 100—150 и выше ф. **П. Сабиніана** (*P. Sabiniana*, Собинова). Калифорнія. Лл. сизо-голубые; шишки очень большія. 40—60 ф. **П. стробусъ** (*P. strobus*). *Веймута сосна*. С. Америка. Лл. свѣтло-зеленые съ серебристыми полосками, тонкіе, шишки цилиндрическія, заостренныя; вѣтви часто короткія. 120—160 ф. **П. сильвестрисъ** (*P. sylvestris*). *Сосна обыкновенная*. Сред. и Сѣв. Европа и Азія. Лл. молодые свѣтлые и длиннѣе старыхъ, шишки по 2 и по 3, къ концу острыя; кора красная. 100 и болѣе ф. **П. халепензисъ** (*P. halapensis*). *Алекая или Иерусалимская сосна*. Левантъ. Лл. тонкіе, свѣтлые; шишки округлыя. 40—50 ф. **П. сѣмбра** (*P. sembra*). *Сибирскій кедръ*. Сибирь, Уральскія горы, Сред. Европа. Лл. съ серебристой полоской, трехгранные, съ жесткимъ концомъ; шишки прямые съ гладкими чешуйками; ядро съѣдомое. 50—150 ф. **П. экцельза** (*P. excelsa*, высокая). Гималаи. Лл. сизо-зеленые, очень тонкіе и гибкіе; шишки цилиндрическія, пониклыя; вѣтви правильными кольцами. 60—150 ф.

**ПИПЕРЬ** (*Piper*). Латинское название, сходное съ греческимъ *peperi* и санскритскимъ *pippala*. С. перцовыхъ. (600). Жаркія страны, преим. троп. Америка. Тепл. иногда полувыносл. куст., либо вьющіяся и древ. рр. Глин. дерн. сильная. Черенками изъ полужрѣлаго роста въ песокъ и парникъ.

**П. декурренсъ** (*P. decurrens*, съ ниспадающими лл.). Колумбія. Лл. зеленые съ широкими серебристыми полосками. Снп. *Атланте декурренсъ*, *A. манифика* (*Atlanthe decurrens*, *A. magnifica*). **П. порфирофиллумъ** (*P. porphyrophyllum*, съ пурпуровыми лл.). Малайскій полуостр. Лл. округло-сердцевидные, темно-бронзового зеленого цвѣта съ многочисленными малиновыми крапинками, нижняя сторона тускло-пурпуровая. Тепл. вьющ. р. **П. Футокадсура** (*P. Futokadsura*; Футокадсура). Японія. Цв. зеленоватые; плоды ярко-красные, лл. овально-ланцетовидные, остроколючные.

**ПИПТАДЕНІЯ** (*Piptadenia*). *Piptadenia*—опадать и *aden*—железка, по опадающей железкѣ пыльниковъ. С. бобовыхъ. (30). Троп. Африка и жаркія страны Америки. Уходъ какъ за Аденантеромъ.

**П. латифолия** (*P. latifolia*, широколистная). Бразилія. Цв. бѣлые, лл. двуперистыя. 4 ф.

**ПИПТАНТУСЪ** (*Piptanthus*) *Piptanthus*—опадать и *anthos*—цв. С. бобовыхъ. (1). Полувыносл. куст. р. Песков. глин. дерн. Сѣменами или черенками изъ зрѣваго роста подъ стекломъ, либо отводками.

**П. непалензисъ** (*P. nepalensis*, изъ Непала). Умѣр. Гималаи. Цв. желтые, большіе, весной. 10 ф.

**ПИПТОСПАТА** (*Piptospatha*). *Piptospatha*—опадать и *spathe*—чехолъ; послѣ опыленія чехолъ опадаетъ. С. ароидеиныхъ. (1). Тепл. трав. мног. р., замѣчательное въ ботанич. отношеніи.

**П. инсигнисъ** (*P. insignis*, замѣчательная). Борнео. Цв. бѣлые съ малиновымъ оттыкомъ, лѣтомъ; лл. ланцетовидные, кожистые.

**ПИРЕНОМИЦЕТЪ**. Сумчатый грибъ, у котораго плодоносный слой находится внутри.

**ПИРЕТРУМЪ** (*Pyrethrum*). Название, заимствованное у Dioscorida и происходящее вѣроятно отъ *pyr*—огонь, по яркости цв. С. сложноцвѣтныхъ. (55). Европа, Азія. Въ настоящее время рр. этого рода включены въ родъ Хризантемумъ и нуждаются въ такомъ-же уходѣ за ними.

**П. ахиллеофоліумъ** (*P. achilleae-folium*, съ лл. какъ у Ахиллея). Кавказъ. Цв. головки золотисто-желтыя, почти шаровидныя, лѣтомъ. 2 ф. У разнов. *пубесценсъ* (*pubescens*) головки расположены щитками. **П. коримбозумъ** (*P. corimbosum*, щитковый). Европа. Цв. головки бѣлыя, щитками, въ іюль. 1 ф. **П. парте-ниофоліумъ аурумъ** (*P. partheniifolium aureum*, золотистый, съ лл. какъ у Парте-ниума). Это—наѣтное *Golden feather*, употребляемое для щиточныхъ узорчатыхъ насаждений, полувыносливое р., развивающееся весьма быстро отъ сѣмянъ и требующее выламыванія бѣлыхъ цвѣтовъ, какъ только они покажутся. Высаживается на воздухъ въ половинѣ мая. **П. розеумъ** (*P. roseum*, розовый). *Персидская ромашка*. Кавказъ, Персія, Далматія. Цв. головки съ лучевыми цв. розовыми и дисковыми желтыми, въ іюль—іюль. 1—2 ф. Имѣетъ очень много разновидностей съ простыми и махровыми цв. различной окраски. Изъ цвѣтовъ получается «персидскій порошокъ» отъ наѣтокъ. **П. Чихачевіи** (*P. Tchi-*

*hatchewii*, Чихачева). Малай Азія. Цв. головки съ лучевыми бѣлыми цв., весной. 2 ф. Можетъ расти и цвѣсти хорошо подъ деревьями, гдѣ другое р. не живетъ. До высадки въ грунтъ выращивать въ горшкѣ. Мѣсто сухое. **П. улигинозумъ** (*P. uliginosum*, любящий влажность). Европа. Цв. головки съ бѣлыми лучами, въ августъ. 5 ф.

**ПИРОЛЯ** (*Pyrola*). Уменьшительное *Pyrola*—грушевое дерево, по сходству лл. С. вересковыхъ. (14). С. и центр. Азія, С. Америка, Европа. Выносл. или полувыносл. многол. трав. рр. Песков. растит. пережной во влажныхъ или затѣненныхъ мѣстахъ. Дѣленіемъ.

**П. ротундифолия** (*P. rotundifolia*, круглолистный). *Березка*. *Грушанка*. Европа. Цв. бѣлые, съ запахомъ, кистями, лѣтомъ, лл. кругловатые. 6 д. **П. секунда** (*P. secunda*, съ боковыми цв.). *Заячья соль*. Европа, 3. Азія, С. Америка. Цв. зеленоватые, односторонними кистями, въ іюль. 4 д.

**ПИРУЛЯРІЯ** (*Pyrgularia*). Уменьшительное *Pyrgus*, по сходству плодовъ. С. сандаловыхъ. (2). С. Америка и Гималаи. Оранж. или полувын. куст. рр. Песков. глин. дерн. Черенками.

**П. олейфера** (*P. oleifera*, производящая масло). С. Америка. Цв. зеленоватые, маленькими колосками 3—12 ф. Р. это содержитъ, преимуществ. въ плодахъ, масло. Снп. **П. пубера** (*P. pubera*).

**ПИРУСЪ** (*Pyrus*). Название заимствованное у Плинія. С. розановыхъ. (40). Умѣр. мѣстности Сѣв. полушарія и горы Индіи. Древ. или кустар. рр. Рыхлая глин. дерн. Сѣменами и прививкой. У упоминаемыхъ ниже рр. цв. бѣлые, гдѣ иные—упомянуто.

**П. арбутифолия** (*P. arbutifolia*, съ лл. какъ у Арбутуса). С. Америка. Цв. съ розоватымъ оттыкомъ, въ май—іюнь. Лл. овальныя, съ мелкими рубчиками, внизу пушистые. 2—10 ф. Снп. **П. флорибунда** (*P. floribunda*). **П. Арія** (*P. Aria*, *Aria*). Европа. Цв. щитками, въ май—іюнь. Плоды съ красивыми крапинками; лл. простые, или перистые, внизу пушистые. 4—40 ф. Имѣетъ нѣсколько разновидностей. **П. Аукупарія** (*P. Aucuparia*). *Рябина*. Европа, 3. Азія. Цв. млечно-бѣлые, полужонтиками, въ май—іюнь. Плоды красные, съ желтой мякотью, шарлаховые; лл. перистые, внизу пушистые. 10—30 ф. Имѣетъ нѣсколько разновидностей. Снп. **Сорбусъ аускупарія** (*Sorbus aucuparia*). **П. бакката** (*P. baccata*, съ ягодными плодами). *Райская или сибирская яблоня*. *Ямтарка*. 3. Сибирь, Даурія. Цв. въ май. Плоды желтые съ красивымъ румянцемъ, шаровидные; лл. оваль-



ные, остроколючные; зубчатые, гладкие. 15—20 ф. **П. домашника** (*P. domestica*, домашняя). Крымская или садовая рябина. Ю. Россия, Европа. Цв. млечно-белые, в мае; лл. перистые, с пушком внизу; плоды с красными пятнышками, обратно-яйцевидные. 20—60 ф. Плоды промаренные или охваченные морозом становятся бурными, мягкими и съедобными. Сии. *Sorbus domestica* (*Sorbus domestica*). **П. коронария** (*P. coronaria*, вичанная). С. Америка. Цв. розовые, в мае, щитками, пахучие; лл. простые, овальные; плоды зеленоватые, душистые. 20 ф. **П. Малюс** (*P. Malus*). Япония. Европа. Цв. розовые с белым, в мае; лл. продолговато-округлые, зубчатые, молодые внизу пушистые; плоды желтые. 20 ф. Разнообразием весьма много. По времени посевания делятся на летний, осенний и зимний, по употреблению—на столовые (десертные) и кухонные. **П. Маулэй** (*P. Maulei*, Маулэй). Япония. Цв. ярко-красные, в апреле. Плоды золотистые, душистые, по вяжущие; лл. овальные. Описано ниже под Цидония. **П. спектабилис** (*P. spectabilis*, красивый). Китай. Цв. бледно-красные, большие, в апреле—мае; лл. продолговато-овальные. 20—30 ф. **П. торинго** (*P. Toringio*, Торинго). Япония. Цв. белые или розоватые, в мае. Лл. простые или лопастные. Куст. р. Сии. **П. Зибольди** (*P. Sieboldii*). **П. флорибунда** (*P. floribunda*, многоцветный). Япония. Цв. красные, розовые, в мае. Лл. мелкие. Плоды маленькие. Куст. р. **П. хамемиспилюс** (*P. chamaemespilus*, ложный Меспилус). Европа, гористые местности. Цв. красноватые, в мае—июне; лл. овальные, зубчатые; плоды красные, крупные. 5—6 ф. **П. японика** (*P. japonica*, японский). Япония. Цв. темно-розовые; лл. овальные, зубчатые; плоды зеленые, душистые, по не съедобные. 5—6 ф. Сии. *Cydonia japonica* (*Cydonia japonica*), как и описано.

**ПИСТАЦИЯ** (*Pistacia*). *Pistake*—древне-греч. название, употребленное Теофрастом и происходящее от персидского *pista* С. сердечниковых. (6). Средиземное побережье, Запад. Азия до Кашгарских о. Мекенка. Сильная, глубокая песков. глини. дерн. Черенками и отводкой.

**П. вера** (*P. vera*, настольная). *Фисташковое дерево*. Сия. Цв. зеленовато-коричневые, в апреле. 20 ф. **П. лентискус** (*P. Lentiscus*, мастичное дерево). Ю. Европа. Цв. зеленые, весной. 20 ф. Дает *мастику*. **П. теребинтус** (*P. terebinthus*, терпентина). Ю. Европа. Цв. зеленоватые, в июне. 30 ф. Изв. надрубать ствола вытекают терпентин кипрей или хюсский.

**ПИСТИЯ** (*Pistia*). *Pistos* — водяной,

по месту произрастания. С. ароидных. (1). Теплич. водное плавающее р.

**П. стратиотес** (*P. Stratiotes*, стратиотес). Тропики. Цв. зеленоватые, мелкие; лл. клиновидные, несколько волнистые, с волосками.

**ПИСЦИДИЯ** (*Piscidia*). *Piscis*—рыба и *caedo*—убивать; листья, кора и ветви употребляются для отравы рыб. С. бобовых. (1). Тепл. дерево. Песков. волоки. глини. дерн. Темп. зимой 7—12, летом 13—24°.

**П. эритрина** (*P. erythrina*, красная). Вестиндия. Цв. белые с кроваво-красным, в мае, 30 ф.

**ПИТАНИЕ**. Прием и усвоение пищи, обращение стороннего вещества в свою плоть.

**ПИТЕКОКТЕНИУМ** (*Pithecoctenium*). *Pitheco*, *pithecos*—обезьяна и *kteis*, *ktenos*—гребень,—перевод местнаго названия, означающего обезьяний гребень. С. бипонийных. (20). Троп. Америка от Бразилии до Мексики. Тепл. вьюш. куст. рр. Ухо как за Гиньяна.

**П. Каролинэ** (*P. Caroline*, Каролинэ). Цв. свинно-белые с желтою трубкою, душистые, в мае. 10 ф.

**ПИТЕКОЛОБИУМ** (*Pithecolobium*). *Pitheco*—обезьяна и *lobos*—лопасть уха; перевод местнаго названия, означающего обезьянье ухо. С. бобовых. (100). Троп. Азия и Америка. Тепл. дерев. рр. Ухо как за Инга.

**П. пруинозум** (*P. prinosum*, морозный). Куинсленд и Н. Ю. Валес. Цв. белые; лл. перистые; молодые ветви и лл. покрыты рыжим пухом.

**ПИТКАЙРНИЯ** (*Pitcairnia*). *Питкайрн* (*Pitcairni*)—лодонский врач. С. бромелиевых. (70). Троп. Америка. Тепл. мног. трав. рр. Ухо как за Билбергия или за Эхеа.

**П. Андреана** (*P. Andreana*, Андрэ). Нов. Гренада и Венесуэла. Цв. с лепестками желтыми, низу красными, в июле. Лл. ланцетовидные. **П. Карвинскиана** (*P. Karwinskiana*, Карвинского). Мекенка. Дол. красноватая, лепестки ярко-красные, в июле. Лл. линейные. Сии. **П. рингенс** (*P. ringens*). **П. кораллина** (*P. corallina*, красно-коралловая). Чоко, Нов. Гренада. Лепестки и доли ярко-красные с белыми краями, весной; лл. на черешках, ланцетовидные. **П. мускоза** (*P. muscosa*, мушкет). Централ. Бразилия. Цв. красные, в декабре; лл. серповидные, остроколючные, снизу бело-мучнистые. **П. пунгенс** (*P. pungens*, жгучая). Цв. красные, в мае; лл. линейные. **П. табулеформис** (*P. tabuleformis*, плоская, как доска). Цв.

ярко-красные; лл. розеткой, лопатчатые, прижатые к земл. **П. фүльгенс** (*P. fulgens*, блестящая). Бразилия. Цв. красные, в мае; лл. мечевидные. Сии. **П. Дескайнеи** (*P. Decaisnei*).

**ПИТОМНИК**. Разсадник растений, где их сьют, разводят, пересаживают для возвращения.

**ПИТОСПОРИУМ** (*Pittosporum*). *Pitta*—смола и *sporos*—спора; по смолистой поверхности сьмять. С. смольно-спяниковых. (50). Жаркая страна Африки, Азии; о. Тихого ок., Австралия, Нов. Зеландия. Оранж. кустарн. или низкое дерев. рр. Волоки. торф. Черенками из полурблого роста, в песок, под стеклом, в оранжерею. Темп. зимой 3—7, летом 13—20°.

**П. виридофлорум** (*P. viridiflorum*, с зеленым цв.). М. Д. Н. Цв. зеленовато-желтые, с запахом жасмина, в мае; лл. обратно-яйцевидные. 6 ф. **П. крацифолум** (*P. crassifolium*, жирнолистный). Нов. Зеландия. Цв. шоколадно-пурпуровые, в апреле; лл. узкие, обратно-яйцевидные. 4—10 ф. **П. тобира** (*P. Tobira*, Тобира). Япония. Цв. белые, душистые, в марте до августа; лл. тупые, обратно-яйцевидные, жесткие. 12 ф. **П. ундулатум** (*P. undulatum*, с волнистыми лл.). Австралия. Цв. белые, с февраля до июня; лл. овально-ланцетов., волнистые, к обоим концам суживающиеся. 10 ф.

**ПИХТА**. См. Аbiesь.

**ПИЦЕА** (*Picea*). **ЕЛЬ**. *Picea*—смола; рр. содержать много смолы. С. хвойных. (12). Сьв. полушарие. Прем. выносливые высокорослые деревья с шишвид. иглами и вислыми шишками, у кот. чешуйки остаются по высыванию сьмян. Ухо как за Аbiesь.

**П. альба** (*P. alba*, белая). *Белая ель*. Канада. Молодые ветви сизы; лл. длиннее и острее, чем у других елей; шишки цилиндрич. и тупые. 30—40 ф. Вынос. **П. Алькокiana** (*P. Alcockiana*, Алькока). Япония. Лл. жесткие, больше или меньше согнутые; шишки остроколючие. Дерево пирамидальное. 90—120 ф. **П. Менцесия** (*P. Menziesii*, Менцеса). С. Калифорния. Лл. линейные, согнутые во все стороны; шишки цилиндрич. 50—70 ф. **П. ориенталис** (*P. orientalis*, восточная). Таврск. и кавказские горы. Лл. четырехгранные, шишки почти цилиндрич., остроколючие. 80—100 ф. **П. Смитана** (*P. Smithiana*, Смитова). Гималайские горы. Лл. сплюснутые, четырехгранные, прямые; шишки овальные. 80—120 ф. Сии. **П. Моринда** (*P. Morinda*). **П. Энгельмани** (*P. Engelmanni*, Энгельмана). Скалистые горы. Лл. твердые, острые, четырехсторон-

ные. 80—100 ф. **П. экцельса** (*P. excelsa*). *Ель обыкновенная*. Одно из сам. распространенных наших хвойных. Лл. четырехгранные, разбросанные; шишки цилиндрич. 75—125 ф. Имать много разновидностей.

**ПИЦА** растений — вода, газы и частицы органических и неорганических веществ.

**ПИРАНТУС** (*Piarranthus*). *Piarranthus*—жир, тучность и *anthos*—цв.; по виду цв. С. ласточниковых. (6). Ю. Африка. Оранж. сочная рр. Ухо как за Станея.

**П. пүлльс** (*P. pullus*, темноцветный). Цв. темно-пурпуровые, в августе и сентябре. 6 д.

**ПИЕРИС** (*Pieris*). По мифологии, место жилища муз в Пiere, в Тессалии. С. вересковых. Гималаи, Малайский полуост., Япония, С.-З. Америка. Полувьюш. куст. и дерев. рр. Ухо как за Андромеда.

**П. флорибунда** (*P. floribunda*, многоцветный). Соед. Штаты. Цв. белые, в апреле—мае. Сии. *Андромеда флорибунда* (*Andromeda floribunda*). **П. формоза** (*P. formosa*, красивый). Соед. Штаты. Цв. белые, как бы фарфоровые. **П. японика** (*P. japonica*, японский). Япония. Цв. белые, кистями. Сии. *Андромеда японика* (*Andromeda japonica*).

**ПИОН**. См. Пеония.

**ПЛАВАЮЩАЯ** растения. Пускающая корни в воду и держащаяся листьями на поверхности воды.

**ПЛАКУНОВЫЯ** рр. (*lythraeae*). Травянистые, кустарники и древесные рр. преимущественно тропической Америки. Родов 30, видов 250. К этому сем. принадлежат роды: Грисея, Литрум и Купеа.

**ПЛАКУН**. См. Литрум.

**ПЛАНИРОВАТЬ**. Разбивать, разгачать на местности сад, парк и пр. по плану. Отсюда *Планирование* и *Планировка*.

**ПЛАН**. Плоский чертеж местности или строения, либо разбивка сада, парка и его частей. Одна из отвѣсных плоскостей, мысленно проводимых в разные точки перспективы: *первый* план (передний), *второй*, *третий*, *задний*.

**ПЛАСТИНКА**. Часть листа или цветочных лепестков и долей за исключением черенка или ножки, которою она прикреплена.

**ПЛАСТИРЬ**. Смолистый состав, накладываемый на порванные части растений.

**ПЛАТАНОВЫЯ** рр. (*platanaceae*).



Очень маленькое сем. изъ высокихъ деревь съ отшелушивающею корою. Растутъ въ умеренномъ и тропическомъ поясахъ обоихъ полушарій; два вида встрѣчаются въ Европѣ и Азій, остальные 3 въ Америкѣ. Родъ только одинъ—Платанусъ.

**ПЛАУНОВЫЯ** pp. (Lycorodiaceae). Сем. тайноцвѣтныхъ pp., состоящее изъ 4 родовъ и до 150 видовъ, встрѣчаемыхъ во всѣхъ климатахъ на землѣ и на др. растенияхъ. Имѣютъ ползучіе, двувалистые стебли, покрытые жесткими листьями. Представляютъ близкое сходство съ папоротниками. Сюда относятся Ликоподумъ и Селягинелья.

**ПЛЕЕЯ** (Pleea). *Plée* (Plée)—авторъ „*Flore des environs de Paris*“, + 1825. С. лилейныхъ. (1). Полув. многол. трав. р. Торф. Содержаніе въ горшкѣ, поставленномъ въ кадучку съ водою. Съеменамъ.

**П. тенуифолия** (P. tenuifolia, тонколистная). Ю. Ам. Штаты. Цв. бѣлые, въ октябрь. 2 ф.

**ПЛЕТЕКОМІЯ** (Plectocomia). *Plectos*—складчатый и *come*—листа. С. пальмовыхъ. (6). Горы Индіи, Малайск. архип. Теңг. pp. Глин. дерн. съ торф. по ровну. Отпрысками.

**П. ассамика** (P. assamica, ассамская). Ассамъ. Лл. согнутые дугой, широкіе, молодые дуразценные, потомъ перистые, съ бѣлою нижнею стороною. 80 ф. **П. хималайяна** (P. himalaiana, гималайская). Гималаи. Лл. большіе, перистые, перья очерченные. **П. элонгата** (P. elongata, удлиненная). Индія. Лл. перистые, перья разставленные, длиною въ 3 ф. Стебель голый.

**ПЛЕКТРАНТУСЪ** (Plectranthus). *Plectron*—шиора и *anthos*—цвѣтокъ, по губчатой цв. трубкѣ. С. губоцвѣтныхъ. (70). Троп. и Ю. Африка, троп. Азія, Малайск. арх., Австралія, о Тихаго ок., Японія. Тепл. или оранж. многол. трав., полукуст или куст. pp. Сильная глин. дерн. съ пескомъ. Черенками.

**П. колеоидесъ** (P. coleoides, похожій на Колеусъ). Нейльгерри. Цв. лиловые, лѣтомъ; лл. овальные, зубчатые. 1—2 ф. Тепл. многол. трав. Сил. *Колеусъ Кольвилля* (Coleus Colvillei). **П. фрутикозусъ** (P. fruticosus, кустарный). Капскія колоніи. Цв. голубые красивые, метелкой, лѣтомъ; лл. широко-овальные, doubly-зубчатые. 3 ф. Оранж. куст. р.

**ПЛЕКТРИТИСЪ** (Plectritis). *Plectron*—шиора, по вѣничку. С. валериановыхъ. (3). Калифорнія, Чили. Выносл. однол. трав. pp. Земля садовая. Съеменамъ.

**П. конгеста** (P. congesta, сгученный). Калифорнія. Цв. малиновые, головками, въ июнь. 9—18 д.

**ПЛЕНА**. Цвѣточный покровъ злаковъ. **ПЛЕНКА**. **ЩЕЛУХА**. Перепончатая чешуйка.

**ПЛЕТЕНЬ**. Тынъ, заборъ изъ хворосту или прутьевъ, перевитыхъ между кольевъ; рядъ колевъ заплетенныхъ хворостомъ.

**ПЛЕТЬ**. **УСЪ**. Распростертая нитевидная вѣтвь или стебель, съ укореняющимся концомъ (земляника).

**ПЛЕРОМА** (Pleroma). *Pleroma*—полнота; по гнѣздамъ плодника. С. чернотелыхъ. (124). Троп. Юж. Америка, преим. Бразилія. Тепл. или оранж. куст. и полукуст. pp. Волоки, глин. дерн. или торф. Черенками изъ полуразлагаго роста, въ парникѣ.

**П. Бентамиана** (P. Benthiana, Бентамова). Органнны горы. Цв. темнопурпуровые съ бѣлою серединою, осенью. 4 ф. **П. Гайянума** (P. Guyanum, Гал). Перу. Цв. бѣлые, осенью 1—2 ф. **П. макрантумъ** (P. macranthum, крупноцвѣтная). Бразилія. Цв. темно-фіолетовые, зимой. Р. это хорошо въ трельяхъ. **П. сарментозумъ** (P. sarmentosum, вѣтвистый) Перу. Цв. пурпурово-фіолетовые, 1—2 ф. Оранж. **П. элегансъ** (P. elegans, изящная). Органнны горы. Цв. ярко-голубые, большіе, въ май—июнь. 5 ф.

**ПЛЕУРОПЕТАЛИУМЪ** (Pleuroptalum). *Pleuron*—сторона и *petalon*—лепестокъ; по вѣничку. С. амарантовыхъ. (2). Мексика, Эквадоръ, Галапагосскіе о. Тепл. куст. pp. нуждающіяся въ такомъ же уходѣ, какъ Кодіеумъ.

**П. костариценсѣ** (P. costaricensis, изъ Коста-Рика). Центр. Америка и Мексика. Цв. зеленые, потомъ шарлаховые, осенью. Сил. *Меланокартусъ Спрюса* (Melanocarpus Sprucei).

**ПЛЕУРОСПЕРМУМЪ** (Pleurospermum). *Pleuron*—сторона, бокъ и *sperma*—сѣмя, по ребрамъ у плода. С. зонтичныхъ. (15). В. Европа, Росс. Азія и Гималаи. Выносл. дву- и многол. трав. pp. Обыкн. садов. Съеменами и дѣленіемъ. **П. аустриакумъ** (P. austriacum). Ю. Европа. Цв. бѣлые съ многолистной оберткой. 2—3 ф. Многол.

**ПЛЕУРОТАЛЬИСЪ** (Pleurothallis). *Pleuron*—сторона и *thallo*—цв., по расположенію цв. С. орхидей. (350). Вестиндія и Троп. Америка. Тепл. орхидей. Въ корзинахъ и на чуркахъ съ подкладкою изъ моха. Имѣютъ значеніе болѣе ботаническое, чѣмъ садовое.

**П. авиценсъ** (P. avicenis, птичья голова). Бразилія. Цв. зеленые съ желтыми лепестками и губой, похожіе на птичью голову. **П. пикта** (P. picta, расписная). Де-

мерара, Суринамъ. Цв. желтые съ малиновыми черточками. **П. струпифолия** (P. strupifolia, съ ремневидными лл.) Мексика. Цв. бѣлые съ пурпуровыми черточками и крапинками. Лл. ремневидные, длиннее въ 1 ф.

**ПЛИНТОВАТЬ**. (**ПЛИНТОВАТЬ**). Очищать, подготавливать землю подъ посадку или посѣвъ.

**ПЛОДИНКА**. **ПЛОДОЛИСТИКЪ**. Отдѣлъ яичника; одинъ изъ измѣняющихся листковъ, образующихъ плодникъ.

**ПЛОДНИКОВЫЙ ЦВѢТОКЪ**. Женскій приносящій плодъ, противуположный или тычковый—безплодный, мужской.

**ПЛОДНИКЪ**. Та часть, изъ которой образуется плодъ.

**ПЛОДЛИВЫЙ**. Быстро размножающійся.

**ПЛОДОВАЯ КЛАДОВАЯ**. Строеніе назначенное для помѣщенія и сохраненія плодовъ. Оно должно имѣть сухое, открытое положеніе, возможно менѣе подвергаемое колебанію въ температурѣ. Послѣднее достигается двойными стѣнами съ промежуткомъ для воздуха, который выпускается по мѣрѣ надобности. Въ случаѣ необходимости оно проталкивается на сколько пужно, чтобы воздухъ былъ сухъ и равномерно прохладенъ. Въ слишкомъ большомъ теплѣ плоды вянутъ, морщатся; при допущеніи слишкомъ большого холода при топкѣ сгущаются пары и плоды могутъ отпотѣть, что можетъ возбудить гніеніе. Вкусъ плодовъ сохраняется лучше въ темнотѣ; это дѣлается завѣшаніемъ оконъ. Плоды переносятъ въ кладовую сухими. Ихъ постоянно осматриваютъ, отдѣляя попортившіеся, которые могутъ заразить остальные. Въ крышѣ дѣлается отдушнина для выхода воздуха; она въ холодное время закрывается.

**ПЛОДОВИТКА** или **ПЛОДОВИТОЕ** яблоко. Сортъ средней поры поспѣванія и среднихъ размѣровъ, желтоватаго цвѣта съ розоватымъ румянцемъ; хорошъ въ лежкѣ. **П. кіевское** или **широкое**, такое же яблоко, какъ пл. обыкновенное, но крупнѣе, **П. красное** отличается отъ пл. обыкновеннаго сплошнымъ краснымъ цвѣтомъ.

**ПЛОДОВИТЫЙ**. Многоплодный, дающій обильный сборъ плодовъ, также скоро, быстро размножающійся.

**ПЛОДОВЫЙ**. Производящій съѣдобный или полезный плодъ. Плодовый садъ.

**ПЛОДОНОСНЫЙ**. Плодовый, плодovitый.

**ПЛОДОНОШЕНІЕ**. Произведеніе, произрастаніе плода.

**ПЛОДОРОДІЕ**. **ПЛОДОРОДНОСТЬ**. Способность производить плодъ (о землѣ). Обильный урожай плодовъ.

**ПЛОДРОЖКА ЯБЛОНЕВАЯ**. Съѣдомое, производящее червоточный плодъ, особенно яблокъ. Это—мелкая сѣрая бабочка, которая кладетъ весной въ чашечку, у завязи быстро развивающихся сортовъ, единичное яичко; вылупляющійся изъ него бѣленькій червячекъ (гусеница) входитъ въ яблокъ и достигаетъ гнѣздышка. Сдѣланное имъ наружное отверстіе служитъ для опростанія его изверженія и бываетъ замѣтно по торчащему изъ нея этому веществу. Пораженное яблоко созрѣваетъ ранѣе другихъ и опадаетъ съ гусеницею въ немъ. Впослѣдствіи гусеница выползаетъ, отыскиваетъ удобное мѣсто,—обыкновенно на стволѣ того-же дерева, для закрѣпленія въ концы, а въ концѣ лѣта вылетаетъ совершенною бабочкой. Лучшимъ средствомъ признается собираніе падали и обращеніе ея въ кормъ свиньямъ. Предупредительнымъ средствомъ окукленія служатъ жгуты изъ сѣна, которыми обматываютъ дерево на высотѣ около фута отъ земли. Жгуты эти съ собравшимися въ нихъ гусеницами потомъ сжигаются.

**ПЛОДОСМѢННОСТЬ** въ огородѣ состоитъ въ перемѣнѣ растений на томъ-же мѣстѣ на слѣдующій годъ. При сильномъ ежегодномъ удобреніи она не въ такой степени необходима, но вообще овощи того-же семейства на томъ-же мѣстѣ не можетъ расти вполне успешно, по этому послѣ капустныхъ слѣдуетъ разводить бобовыя, равнымъ образомъ послѣ корнеплодовъ не должно разводить корнеплодовъ-же, хотя и различныхъ семействъ (крестоцвѣтныхъ и зонтичныхъ), а овощи листовые; послѣ капустныхъ успешно растутъ луки.

**ПЛОДОТВОРЕНІЕ**. Оплототвореніе. Содѣланіе цвѣтка плодоснымъ.

**ПЛОДЪ**. Высшее, послѣднее проявленіе живыхъ силъ; выращиваніе сѣмени для произведенія подобнаго себѣ.

**ПЛОКАМА** (Plocama). *Plocamos*—повислые волосы; по пониклымъ вѣтвямъ. С. мареновыхъ. (1). Оранж. куст. р. Глин. дер. съ торф. Черенками, въ песокъ, подъ стекломъ.

**П. пѣндуля** (P. pendula, съ висющими вѣтвями). Канаріе о. Цв. бѣлые. 2 ф. Лл. нитевидные, вялые.

**ПЛОКОГЛОТТИСЪ** (Plocoglottis). *Plocos*—складка и *glotta*—языкъ; по складкѣ на губѣ. С. орхидей. (8). Малайск.



архип. Тепл. земл. орхидей. Уходъ какъ за Циртоподиумъ.

**П. Лови** (P. Lowii, Лоуа). Борнео. Цв. охристые съ коричневыми пятнами.

**ПЛОШКА**. Низкій, широкій пѣтлочный горшокъ, употребляемый для посѣва или для обращиванія черенковъ.

**ПЛУГЪ**. Пахатное орудіе, въ которомъ лемехъ, отрѣзъ и столбъ желѣзные, грядиль, чалига и др. деревянные. Основное отличие плуга отъ сохи есть *позже*; кошуля представляетъ переходъ отъ сохи къ плугу, который роетъ землю только бороздой, и отрѣзанный пластъ подымаетъ и переворачиваетъ.

**ПЛЮМБАГО** (Plumbago). Название заимствовано у Плинія, который производилъ его отъ *plumbum* — свинецъ, потому что р. издѣляетъ будтобы свинцовую болѣзнь. С. свинцовыхъ. (10). Жаркія страны зем. поверхности. Теплич., оранж. и выносл. многол. трав., иногда кустарн., рѣже однол. рр. Волокни. глини. торф. съ пескомъ и небольшимъ колич. листов. Отпрысками и черенками изъ почти зрѣлаго роста въ парникъ.

**П. карензисъ** (P. carensis, карское). М. Д. Н. Цв. блѣдно-голубые, короткими колосками, лѣтомъ и осенью. 2 ф. Тепл. и оранж. р. **П. Ларпенте** (P. Larentae, г-жи Ларпентъ). Мангай. Цв. фиолетовые, головками. 1 ф. Многол. трав. оранж. или полувывосл. **П. розеа** (P. rosea, розовое). Остиндія. Цв. красно-розовые, длинными колосками. 2 ф. Тепл. многол.

**ПЛЮСКЕРІЯ** (Plumeria). *Плюме* (Charles Plumer) — франц. путешественникъ и писатель — ботаникъ, † 1706 С. кутровыхъ. (40). Троп. Америка. Тепл. древ. рр. Песков. глини. дерн. съ волокни. торф. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ песокъ, подъ стекломъ.

**П. акутифолія** (P. acutifolia, съ остроколючными лл.). Одичала въ Индіи. Цв. сваружни розовые, внутри бѣлые, очень душистые, съ іюня до сентября. 20 ф. **П. лютеа** (P. lutea, желтая). Перу. Цв. блѣдно-розовые съ золотисто-желтыми глазкомъ, очень пахучіе, въ іюнь. 10—20 ф. **П. рубра** (P. rubra, красная). Ямайка. Цв. красные, въ іюль. 12—20 ф.

**ПЛЮСКОВЫЯ** рр. (cupuliferae). Весьма важное семейство древесныхъ и кустарниковъ породъ. Родовъ 10, а видовъ около 400. Принадлежащія сюда растенія распространены преимущественно по умеренному поясу сѣвер. полушарія, но нѣкоторыя встрѣчаются въ Нов. Зеландіи, Чили и на горахъ въ Явѣ, Борнео, Южн. Австраліи и др. мѣстахъ. Сюда принадлежатъ обыкновеннѣйшія наши листвен-

ныя лѣсные породы: Альнусъ, Бетуля, Ёверкусъ, Корилюсъ, также Карпинусъ, Кастанеа и Фагусъ.

**ПЛЮСКЪ**. Чашечка, въ которой сидитъ желудь.

**ПЛЮШКА**. См. Плюшеа.

**ПЛЮШЕА** (Pluchea). *Плюиз* (Pluche) напечаталъ «Spectacle de la nature», въ 1732 г. С. сложноцвѣтныхъ. (30). Жаркія страны Америки, Африки, Азии и Австраліи. Оранж. или выносл. куст. или полукуст., рѣже многол. трав. рр. Глини. дер. съ листов. Сѣменами или дѣленіемъ.

**П. каспика** (P. caspica, каспійская). Берега Каспійскаго м. Цв. головки пурпуровыя, въ августъ. Сии. *Карелинскій каспикъ* (Karelinia caspica).

**ПЛЮЩЪ**. См. Хедера.

**ПЛЯГІАНТУСЪ** (Plagianthus). *Plagias* — косою и *anthos* — цв., по неравностороннимъ лепесткамъ. С. мальвовыхъ. (11). Нов. Зеландія. Оранж. кустар. или трав. рр. Уходъ какъ за Мальва.

**П. Лампенті** (P. Lampenii, Лямпена). Ванъ-Діеменова Земля. Цв. блѣдно-желтые, почти бѣлые, съ ноябрю до февраля. 6—8 ф. **П. Лайяліи** (P. Layallii, Лайяли). Нов. Зеландія. Цв. бѣлые, въ іюль. 20 ф.

**ПЛЯГОЛИРИОНЪ** (Plagiolirion). *Plagios* — косою и *lirion* — лилія, по формѣ цв. покров. С. амариллисовыхъ. (1). Уходъ какъ за Эйхарисъ.

**П. Хорсмани** (P. Horschmannii, Хорсмани). Колумбіи. Цв. бѣлые, мелкіе, въ іюнь—іюль. Луковидна съ длинной шейкой.

**П Л Я Н Е Р А** (Planera). *Планеръ* (Planer), написавшій въ 1788 г. флору Эрфурта. С. крапивныхъ. (1). Уходъ какъ за Ульмусъ.

**П. акватика** (P. aquatica, водяная). Южн. Соед. Амер. Штаты. Цв. коричнево-бѣлые, въ апрѣль; лл. овальные, остроколючные. 20—30 ф. Сии. **П. Гмелини** (P. Gmelini).

**ПЛЯТНАГО** (Plantago). Название заимствованное у Плинія. С. полутычковыхъ. (200). Европа и С. Америка. Полукуст. или травяни. рр. не имѣющія большого значенія въ садовомъ отношеніи. 3. обикнов. садовая. Сѣменами и дѣленіемъ.

**П. бразилиэнзисъ** (P. brasiliensis, бразильское). Бразилія. Цв. бѣловатые, шпандрич. колосомъ, лѣтомъ. 1 ф.

**ПЛЯТАНУСЪ** (Platanus). *Platanos* — древне-греч. названіе отъ *platos* — широкій, по листѣ. С. платановыхъ. (6). В. Европа, Азія, Америка. Древ. рр. Рыхлая, глубокая и сильная земля. Сѣменами и отводкой.

**П. окциденталисъ** (P. occidentalis, западный). *Сикоморъ*. *Яворъ*. Атлантич. и Зап. Соед. Ам. Штаты. Цв. зеленоватые, въ маѣ. Лл. пятиугольные, рубчатые, на нижн. сторонѣ пушистые. 70—80 ф. **П. ориенталисъ** (P. orientalis, восточный). *Тинаръ*. Цв. желтовато-зеленые, въ апрѣль; лл. дланевидные, пятилопастные, менѣе глубоко-выемчатые, чѣмъ у Явора. 60—80 ф. Имѣетъ нѣсколько красивыхъ разновидностей.

**ПЛЯТИКАРІЯ** (Platycarya). *Platys* — широкій и *karyon* — орѣхъ, по формѣ плода. С. орѣшниковыхъ. (1). Кустарное или низкорослое р., зимующее въ укрѣ. климатѣ, но помѣщаемое въ оранж. Уходъ какъ за Юглансъ.

**П. стробилияцеа** (P. strobilacea, дающая шишки). Японія и С. Китай. Цв. желтые, въ августъ. Лл. 5—8 парные, ароматическіе. Сии. *Формінеа чинизисъ* (Fortunea chinensis).

**ПЛЯТИКАРПУМЪ** (Platycarpum). *Platys* — широкій и *karpus* — плодъ, по формѣ сѣм. коробочки. С. мареновыхъ. (1). Теплич. дерево. Глини. дерн. съ листов. Черенками въ парникѣ. Зимой сухо, чтобы цвѣло.

**П. ореноецъ** (P. orenocense, ореноскій). Оренко. Цв. блѣдно-розовые. 20 ф.

**ПЛЯТИКЛИНИСЪ** (Platyclinis). *Platys* — широкій и *clinis* — ложе, по широкому пыльниковому ложу. С. орхидей. (8). Остиндія, Малайск. архип. Тепл. эпифиты. Уходъ какъ за Липарисъ.

**П. гломмацеа** (P. glutinosa, пленчатый). Филиппинскіе о. Цв. бѣлые, очень душистые. **П. Коббиана** (P. Cobbiana, Кобба). Филиппинскіе о. Цв. желтые, какъ сѣра, губа оранжевая. Сии. *Дендрохилумъ Коббианумъ* (Dendrochilum Cobbianum).

**ПЛЯТИКОДОНЪ** (Platycodon). *Platys* — широкій и *kodon* — колоколь; по формѣ цв. С. колокольчиковыхъ. (5). Выносл. трав. многол. р. Уходъ какъ за Кампануля.

**П. грандифлорумъ** (P. grandiflorum, крупноцвѣтный). Китай, Манчжурія, Японія. Цв. голубые, крупныя, въ іюль. 6—12 д. Сии. **П. аушумийскіе**, **П. хинзисъ**, **Кампануля грандифлора** (P. autumnalis, P. chinensis, Campanula grandiflora).

**ПЛЯТИКРАТЕРЪ** (Platycrater). *Platys* — широкій и *crater* — пенка; по трубѣ чашечки С. камнеломковыхъ. (1). Выносл. распрост. куст. р. Уходъ какъ за Филадельфусъ.

**П. аргута** (P. arguta, острый). Японія. Цв. зеленоватые, болѣе крупныя, чѣмъ у Хидрангея. Лл. ланцетовидныя.

**ПЛЯТИЛОБИУМЪ** (Platylobium). *Platys* — широкій и *lobos* — стручокъ; по

широкимъ стручкамъ. С. бобовыхъ. (3). Австралія. Оранж. куст. рр. Уходъ какъ за Ховса.

**П. триангуларе** (P. triangulare, трехугольный). Цв. желтые съ почковиднымъ флагомъ, въ маѣ. 1 ф. Сии. **П. Морреи** (P. Morreii, Миттауанни). **П. формозумъ** (P. formosum, красивый). Цв. желтые, флаги большой, въ іюль. 4 ф.

**ПЛЯТИЛОФУСЪ** (Platylophus). *Platys* — широкій и *lophos* — гребень; по сплюснутой вершинѣ сѣмянъ, представляющей какъ бы гребень. С. камнеломковыхъ. (1). Оранж. древ. р. Глини. дерн. съ торф. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ песокъ, въ парникѣ. Тепл. зимой 4—6°.

**П. трифоліата** (P. trifoliata, трехлиственный). М. Д. Н. Цв. бѣлые, въ іюнь 40—50 ф. Сии. *Вейманиа трифоліата* (Weinmannia trifoliata).

**ПЛЯТИЦЕРІУМЪ** (Platycerium). *Platys* — широкій и *keros* — рога; ван раздѣлены на сегменты, какъ олени рога. С. папоротниковыхъ. (6). Тропич. страны. Теплич. папоротники.

**П. альцикорне** (P. alscorne, съ лосовыми рогами). Умѣр. Австралія. Безплод. ван округлая, выпуклая, плодород. — прямая, два и три раза дихотомически развѣтвленныя. Оранж. **П. Вальліихи** (P. Wallichii, Вальлиха). Малайск. полуо. Безплод. ван глубоко-лопастныя, виллообразно-раздѣльныя; плодон. парныя, пониклыя. **П. Вильянки** (P. Willinkii, Вильянки). Ява. Безплод. ван прямыя, полукруглыя, лопастныя; плодон. — тройчатая, узко-клиновидныя. **П. гранде** (P. grande, большой). С. Австралія. Безплод. ван очень большія, полукруглыя, вогнутыя; плодон. пониклыя, парныя, широко-клиновидныя. **П. Хильліи** (P. Hillii, Хилья). Куинслендъ. Ван вѣрообразныя.

**ПЛЯТИСТЕМОМЪ** (Platystemon). *Platys* — широкій и *stemon* — тычинка. С. маковыхъ. (1). Однол. р. нуждающееся въ такомъ же уходѣ, какъ Панаверъ. **П. калифорникусъ** (P. californicus, калифорнскій). Калифорнія. Цв. желтые съ тремя лепестками. 1 ф.

**ПЛЯТИСТИГМА** (Platystigma). *Platys* — широкій и *stigma* — рыльце. С. маковыхъ. (3). С.-З. Америка. Полувывосл. однол. рр., уходъ какъ за Панаверъ.

**П. линейе** (P. lineare, линейная). Цв. до распусканія пониклыя, три наружныя лепестка желтые, три внутренніе бѣлые, въ маѣ.

**ПЛЯТИТЕКА** (Platytheca). *Platys* — широкій и *theca* — калтучка. С. тремандровыхъ. (1). Оранж. полукустар. р.; Уходъ какъ за Тетратека.

**П. галиоидея** (P. galioides, похожая



на Галиумъ). Ю.-З. Австралія. Цв. голубые съ чернымъ пятномъ внизу лепестка, въ июль. 1 ф.

**ПЛЯЦЕА (Pleacea).** Мѣстное чилийское названіе. С. амариллисовыхъ. (5). Чили. Оранж. лукович. рр.; близкія къ Хиппеаструмъ. Сильная рыхлая изъ коровьяго перегноя съ пескомъ.

**П. Арцѣ (P. Arzoe, Arpa).** Цв. блѣдно-желтые съ пурпуровыми черточками. 1½ ф. **П. грандифлора (P. grandiflora)**, крупноцвѣтная). Цв. бѣлые съ ярко-карминными черточками. **П. орната (P. ornata)**, украшенная). Цв. свѣжно-бѣлые, съ ярко-карминными внутри черточками.

**ПЛѢСЕНЬ.** Гниль. Свѣтлозеленоватый или сѣроватый маленькій грибокъ на загнивающихъ веществахъ. Заводится преимущественно отъ спертго влажнаго воздуха, въ недостаточномъ провѣтриваемомъ сыромъ помѣщеніи, при тѣсной разстановкѣ рр.

**ПОА (Poa).** Древне-греческое названіе кормовой травы. С. злаковыхъ. (80). Сѣв. умѣр. поясь. Одно- или многол. травы. Обыкн. садов. Съеменами или дѣленіемъ.

**П. тривиалис альбо-вита́та (P. trivialis albo-vittata)**, нестролистная *метлица*). Низкорослый многол. злакъ съ широко-окаймленными бѣлыми лл. Хорошо и для содержанія въ горшкахъ. 6 д.

**ПОВѢГЪ.** Вѣтъ, отростокъ, отпрыскъ. Кончикъ вѣтви выросшій за лѣто; приростъ (побѣговый).

**ПОВѢТВЪ.** Второе раздѣленіе вѣтви. Вторая вѣтвь.

**ПОГАНКА.** Всякій несъѣдомый грибъ.

**ПОГЛОЩЕНІЕ. ВСАСЫВАНІЕ.** Дѣйствіе, вслѣдствіе котораго поступаютъ въ растенія жидкости и газы, главнымъ образомъ черезъ корни.

**ПОГОГИНЕ (Pogogyne).** *Pogon*—борода и *gyne*—женщина, по волосистому столбику. С. губоцвѣтныхъ. (6). Калифорнія. Однол. Обыкн. садовая. Съеменами въ парникѣ, въ горшкахъ; высаживать со ступомъ.

**П. Дуглязіи (P. Douglasii, Дугласа).** Цв. пурпуровые или темно-фіолетовые, въ августѣ. 1 ф.

**ПОГОДЛИВАЯ ПОРА.** Ненастникъ, бурная погода.

**ПОГОДНОЕ ВРЕМЯ.** Удобное время для производства известной работы.

**ПОГОНИЯ (Pogonia).** *Pogonias*—бородастый; по бахромчатой губѣ пѣк. видовъ. С. орхидей. (30). Азія, С. и Ю. Америка, Австралія, Полинезія. Тепл. земныя орхидеи. Глин. дерн смѣшанная съ торф. мохомъ.

**П. Гаммиеана (P. Gammieana, Гаммиева).** Сиккимъ. Цв. блѣдно-лиловые, въ май. **П. Форди (P. Fordii, Форда).** Гон-Конгъ. Цв. грязно-желтые; губа бѣлая. Сип. *П. пулхелла (P. pulchella)*.

**ПОГОНОПУСЪ (Pogonopus).** *Pogon*—борода и *pous*—нога, по цв. С. мареновыхъ. (5). Трон. Америка. Тепл. куст. и дрв. рр. Уходъ какъ за Муссенда.

**П. караказензисъ (P. caracasensis, каракасскій).** Каракасъ. Цв. малиновые, лѣтомъ. Кустъ. Сип. *Ховардіа караказензисъ (Howardia caracasensis)*.

**ПОГОСТЕМОНЪ (Pogostemon).** *Pogon*—борода и *stemon*—тычинка; по тычинкамъ, которыя обычно съ бородакою въ сред. части. С. губоцвѣтныхъ. (30). Остиндія, Малайск. арх., Японія. Оранж. куст. рр. Уходъ какъ за Колебронія.

**П. патчули (P. Patchouli, паучули).** Остиндія. Цв. бѣлые съ пурпуровымъ отѣнкомъ, колосомъ, въ июль. Лл. широко-овальные. Оранж. полукустъ. Доставляетъ душистое вещество *патчули* или *пачулатъ*, весьма употребительное въ Индіи. **П. плектрантоидесъ (P. plectranthoides)**, похожій на Плектрантусъ). Остиндія. Цв. бѣлые, головками, въ июль. Лл. овальные съ клиновиднымъ основаніемъ. 2—3 ф. Тепл. куст. р.

**ПОГРЕВЪ.** Покрытая яма для храненія растеній, плодовъ и пр. Въ хорошемъ погребѣ, при защитѣ его отъ знои и стужи, лѣтомъ прохладно, а зимой не мерзнетъ.

**ПОГРЕМОКЪ.** См. Ринантусъ.

**ПОГРУЖЕННЫЯ** растенія. Водныя растенія, не выпадающія на поверхность воды.

**ПОДАЛИРІЯ (Podalyria).** *Подалирий* по мнѣзлогіи былъ сынъ Эскулапа. С. бобовыхъ. (17). Ю. Африка. Оранж. кустарн. рр. Песков. глин. дерн. съ волокни. торф. Черенками изъ бокового роста весной, въ песокъ, подъ стекломъ.

**П. калипгратъ (P. calyptrata)**, съ колпачкомъ). Цв. свѣтло-пурпуровые, съ май до іюля, 6 ф. Сип. *П. стирацифолія (P. styracifolia)*.

**ПОДАНТЕСЪ (Podanthes).** *Pous*, *podos*—нога и *anthos*—цв.; цв. на длинныхъ ножкахъ. С. ласточниковыхъ. (8). Южн. Африка. Тепл. рр. нуждающіяся въ томъ-же уходѣ, какъ Станелія.

**П. гемината (P. geminata, двойной).** Цв. обычно по двое, желто-оранжевые съ кроваво-красными крапинками, въ май до ноября. Вѣрное названіе этого р.—*Піарантусъ геминатусъ (Piaranthus geminatus)*.

**ПОДАНТУСЪ (Podanthus).** *Pous*, *podos*—нога и *anthos*—цв.; по цв. на ножкѣ. С. сложноцвѣтныхъ. (2). Чили. Оранж. кустарн. рр. Торфина съ глин. дерн. Черенками въ песокъ, подъ стекломъ.

**П. Митикви (P. Mitiqui, Митикви).** Лл. овально-ланцетовидные, глубоко-зубчатые. 3 ф. **П. сватифоліусъ (P. ovatifolius)**, съ яйцевидными лл.). Лл. широко-яйцевидные. 2 ф.

**ПОДБОРЪ.** Отборъ одно къ одному растеній, имѣющихъ извѣстные признаки или достоинства.

**ПОДВОЙ.** Дичекъ для прививки. (Шиповникъ идетъ въ подвой на розѣ).

**ПОДВѢТРЕННЫЙ. ПОДВѢТЕРЕННЫЙ.** Что подъ вѣтромъ, ниже или далье по направленію вѣтра.

**ПОДВЯЗОКЪ.** Привязка, мочало, веревка и т. п.

**ПОДГНОВКЪ.** Навозъ, подгнившій уже съ исподу.

**ПОДДОНОЕЪ.** Тазикъ или тазъ, поставляемый подъ горшки, чтобы не протекала изъ нихъ на полъ вода. Дѣлаются металлическіе или глиняные, простые или поливные. Последніе особенно пригодны для комнатъ.

**ПОДДОНЪ.** Ложе цвѣта.

**ПОДЗЕМЪ. ПОДЗЕМОЕЪ.** Подпочва. Пластъ подъ верхнимъ слоемъ земли.

**ПОДЗОЛЬ.** Сѣрая, блѣсцоватая, сухая и пепельстая, самая безплодная земля.

**ПОДЛАЖАНЪ.** См. Солянумъ.

**ПОДОВІЕ. АНАЛОГІЯ.** Сходство по формѣ, но не по значенію, или по значенію, но не по формѣ.

**ПОДОКАРПУСЪ (Poricarpus).** *Pous*, *podos*—нога и *karpos*—плодъ; плоды подперты. С. хвойныхъ. (60). Южн. вѣт.-тропич. области и горныя троп. мѣстности южн. полушарія, В. Азія и троп. Америки. Рыхлая глин. дер. Черенками изъ почти зрѣлаго роста, въ песокъ, въ парникѣ.

**П. андіна (P. andina)**, съ Андскихъ горъ). Валдивія, Чили. Лл. линейные, сплюснутые. Плоды по формѣ и величинѣ похожи на бѣлый виноградъ, а по строенію на вишни и содержатъ орѣшекъ въ сочной мякоти; зрѣлые пріятнаго вкуса. 40—50 ф. Сип. *Прумпоникусъ элеганс (Prumponitus elegans)*. **П. витіензисъ (P. vitiensis, вѣт. Вити).** Вити-Леву. Лл. широкіе, овально-ланцетовидные; плоды обратно яйцевидные, тупые. 60 ф. **П. перифолія (P. peripolia)**, съ лл. какъ у Олеандра). Непаль. Лл. ланцетовидные, остроконечные. Плодовыя ножки употребляются въ Непалѣ въ пищу.

Высокое дерево. Сип. *П. макрофилля (P. macrophylla)*.

**ПОДОЛЕПИСЪ (Podolepis).** *Pous*, *podos*—нога и *lepis*—чешуйка; цв. почка чешуйчатая. С. сложноцвѣтныхъ. (12). Оранж. или полувин. одно- или многол. травянист. австралійскія рр. Легкая, рыхлая. Съеменами. Обычно какъ однолѣтній.

**П. аристата (P. aristata, остистая).** Цв. головки золотисто-желтыя съ малиновыми лучами, лѣтомъ. 1 ф. **П. грацилисъ (P. gracilis, пѣзвый).** Цв. головки пурпуровыя, лиловые или бѣлыя. 3 ф.

**ПОДОЛЪЗІЯ (Podolasia).** *Pous*, *podos*—нога и *lasia*—лзья, отъ которой Подолзья отличается длиннымъ придаткомъ початка. С. ароидныхъ. (1). Тепл. многол. Уходъ какъ за Арумъ.

**П. стипитата (P. stipitata, подпертая).** Борнео. Чехолъ красно-бурый, ладьеобразный; початокъ бѣлый, мѣняющійся на коричневы; лл. стрѣловидные. 1 ф.

**ПОДОПТЕРУСЪ (Podopterus).** *Pous*, *podos*—нога и *pterus*—крыло; наружный цв. покровъ крылатый. С. гречишныхъ. (1). Оранж. кустъ. Глин. дерн. пополамъ съ торф. Черенками изъ молодого роста, въ легкой землѣ, подъ стекломъ.

**П. мексиканусъ (P. mexicanus, мексиканскій).** Мексика. Цв. малиновые, въ июль. 2 ф.

**ПОДОСІНОВИКЪ.** См. Болетусъ.

**ПОДОСТИГМА (Podostigma).** *Pous*, *podos*—нога и *stigma*—рыльце; подпертое рыльце. С. ласточниковыхъ. (1). Полувин. трав. р. Уходъ какъ за Асклепιάсъ.

**П. пубесценс (P. pubescens, пушистая).** Ю. Соед. Амер. Штаты. Цв. оранжевые, зонтиками, въ июль. 6—12 д. Сип. *Стиландра пумилла (Stylandra pumila)*.

**ПОДОТЕКА (Podotheca).** *Pous*, *podos*—нога и *theca*—гнѣздо или корбочка, по плодовой ножкѣ. С. сложноцвѣтныхъ. (5). Австралія. Однол. трав. рр. Обыкн. садов. Съеменами.

**П. гнафалиоидесъ (P. gnaphalioides)**, похожая на Гнафаліумъ). Цв. головки на длинныхъ ножкахъ, въ июль. 1—1½ ф.

**ПОДОФИЛЬЮМЪ (Podophyllum).** *Pous*, *podos*—нога и *phyllon*—листъ, по отдаленному сходству лл. со стогою животнаго. С. барбарисовыхъ. (3). С. Америка, Гималая. о. Формоза. Многол. трав. рр. съ ползучимъ корневищемъ. Торф. влажная. Съеменами и дѣленіемъ.

**П. Эмоди (P. Emodi, Эмоди).** Индія. Цв. бѣлые; лл. два, округлыхъ, складчатыхъ, 3—5 лопастныхъ. Плоды красные, эллипсоидальные, съѣдомые. 6—12 д.



**ПОДПИЛОКЪ.** Небольшой мелкий терпугъ. Напилкокъ.

**ПОДПОЧВА. ПОДПОЧВЕННЫЙ** пластъ. Лежащий под почвою или растительным слоемъ.

**ПОДРОСТЪ.** Поросль. Молодежникъ. Молодые деревцы или кустарники.

**ПОДСАДОКЪ.** Растение для посадки.

**ПОДСНѢЖНИКЪ.** См. Галитусъ.

**ПОДСОЛНЕЧНИКЪ.** См. Хелиантусъ.

**ПОДСѢКЪ.** Железное орудіе для подсѣканья корней.

**ПОДУШЕЧКА.** Разширенная или утолщенная часть при основаніи листового черешка, отъ развитія которой происходитъ опаденіе листа.

**ПОЗЕМЪ.** Навозъ. Удобреніе.

**ПОЗИМОКЪ.** Поздний морозъ или снѣгъ. Весенній холодъ.

**ПОЗОКВЕРІЯ (Posoqueria).** Мѣстное названіе въ Гвианѣ. С. мареновыхъ. (12). Троп. Америка. Тепл. куст. рр. Ухождъ какъ за Гарденію.

**П. мультифлора (P. multiflora,** многоцвѣтная). Бразилія. Цв. бѣлые душистые, полузонтиками. Лл. широкіе, бархатистые. **П. фрагрантиссима (P. fragrantissima,** весьма душистая). Бразилія. Цв. бѣлые, очень душистые, метелками; лл. продолговатые, кожистые, гладкіе. Оба названные рр. чрезвычайно нарядны.

**ПОЙВРЕА.** См. Пуавреа.

**ПОЛЗУЩЕЕ** растение отличается отъ цѣпкаго или цѣпляющагося тѣмъ, что имѣетъ и приземистое и пониклое, висячее положеніе. Такія рр. особенно хороши для вазъ и каменистыхъ участковъ.

**ПОКОЙ.** Состояніе, въ которомъ растеніе перестаетъ расти; это бываетъ только у породъ существующихъ долѣе года; всѣ эти породы нуждаются въ покой послѣ роста, и потому содержатся суше и прохладнѣе.

**ПОКРОВЪ.** Околоцвѣтъ.

**ПОЛЕМОНИУМЪ (Polemonium).** Названіе, заимствованное у Dioscorida и производное отъ *polemos* — война, но безъ объясненія основанія. С. синюшныхъ. (9). Европа, умѣр. Азія, С. Америка, Мексика и Чили. Многол., рѣдко однол. выносл. или полувын. рр. Упоминаемые ниже виды — многол. Глубокая, рыхлая глин. дерн. Дѣленіемъ.

**П. конфертумъ (P. confertum,** скученный). Скалистые горы. Цв. ярко-голубые, лѣтомъ, 6 д. **П. хумиле (P. humile,** низкій). Скалистые горы. Цв. голубые или

пурпуровые. 6 д. Син. **П. Ричардсоніи и П. виллозумъ (P. Richardsonii, P. villosum).** **П. цѣрулеумъ (P. caeruleum,** голубой). Сѣв. полушаріе. Цв. фиолетово-голубые или бѣлые, съ зелеными и пестрыми лл., весной. 2 ф. Имѣетъ нѣсколько разновидностей.

**ПОЛИВАТЬ. ПОЛИТЬ.** (Поливка). Смачивать струею воды или жидкаго удобрения. Поливка бываетъ ручная или машинная.

**ПОЛИГАЛЯ (Polygala).** Названіе заимствовано у Dioscorida и произведено отъ *polys* — много и *gala* — молоко, въ предположеніи, что р. увеличиваетъ удой. С. истоковыхъ. (200). Умѣр. и жаркія страны. Оранж., либо выносл. однол. и многол. трав., кустарн. или полукуст. рр. Волокн. торф. съ пескомъ. Черенками изъ молодого роста, въ песков. торфяной, подъ стекломъ.

**П. oppositifolia (P. oppositifolia,** съ супротивными лл.). М. Д. Н. Цв. пурпуровые; лл. супротивные. 3—4 ф. Оранж. кустар. р. Имѣетъ нѣсколько разновидностей, отличающихся лл.

**ПОЛИГОНАТУМЪ (Polygonatum).** Названіе встрѣчаемое у Dioscorida и производимое отъ *poly* — много и *goni* — колыно; по большому числу колынь. С. лилейныхъ. (23). Умѣр. страны Сѣв. полушарія. Выносл. трав. рр. Глин. дерн. съ пескомъ. Дѣленіемъ. Годятся для ранней выгонки въ горшкахъ.

**П. бифлорумъ (P. biflorum,** двучвѣтный). С. Америка. Цв. покровъ всеносный, въ май; лл. продолговато-ланцетовидные. 1—3 ф. **П. мультифлорумъ (P. multiflorum,** многоцвѣтный). С. полушаріе. Цв. бѣлые, въ іюнѣ; лл. объемлющие стѣбель, продолговатые. 2—3 ф. Син. **Конвалларія мультифлора (Convallaria multiflora).** Имѣетъ нѣсколько разновидностей и между прочимъ съ махровыми цв.

**ПОЛИГОНУМЪ (Polygonum).** *Poly* — много и *goni* — колыно. С. гречишныхъ. (150). Повсемѣстно, за исключеніемъ тропич. странъ. Однол. или многол. выносл. или оранж. травянистыя, либо полукуст. рр. Однол. — съемами; многол. — дѣленіемъ корневища. Земля сильная садовая.

**П. affine (P. affine,** красивый). Непаль. Цв. красно-розовые, колосыми, осенью; лл. узкіе. 6—8 д. Многол. полувыносл. или выносл. въ умѣр. климатѣ. **П. вакцинифолиумъ (P. vacciniifolium,** съ брусничными л.). Гималаи. Цв. ярко-розовые, колосыми, поздно лѣтомъ или осенью; лл. эллиптические, иногда съ краснымъ отливомъ. Полувыносл. многол. **П. компактумъ (P. compactum,** плотный). Японія. Цв. бѣ-

лые, кистями, въ сентябрѣ; лл. нѣсколько курчавые. 2 ф. Выносл. многол. **П. кустидатумъ (P. cuspidatum,** съ остроколючными лл.). Японія. Цв. млечно-бѣлые, перистыми, пониклыми метелками, лѣтомъ; лл. овальные, остроколючные. 3—4 ф. Син. **П. Зибблдіи (P. Sieboldii).** Вын. многол. **П. ориентале (P. orientale,** восточный). Остиндія. Цв. темно-розовые или бѣлые, длинными кистями, въ августѣ. Цв. большіе, овально-остроколючные. 3—6 ф. Однол. **П. сахалинѣнзе (P. sachalinense,** съ о. Сахалина). О. Сахалинъ. Цв. нѣжно-желтые или желтоватые, кистями, лѣтомъ; лл. широко-овальные, остроколючные, полусердцевидные. 10—12 ф.

**ПОЛИКАРПЕЕ (Polycarpea).** *Poly* — много и *carpos* — плодъ; по многочисленнымъ сѣменамъ. С. гвоздичныхъ. (24). Тропич. Америка. Оранж. или выносл. однол. либо многол. трав. рр. Песков. легкая глин. дерн. Однол. — сѣменами, весной, въ парникъ; многол. — черенками. Упомянутыя ниже многол. — полувыносл. ливы.

**П. аристата (P. aristata,** остевая). Канарскіе о. Цв. бѣлые, полузонтиками, въ іюль. 3—6 д. Многол. **П. гнафалиоидесъ (P. gnaphalioides,** похожая на Гнафалиумъ). С. Африка. Цв. бѣлые, полулопастые, въ іюнѣ — іюль; р. распростертое. Многол. **П. латифолиа (P. latifolia,** широколистная). Тенерифъ. Цв. бѣлые, полузонтиками, въ іюль до августа. 3 д. Многол. **П. мемфитика (P. memphitica,** египетская). Египетъ. Цв. бѣлые, въ іюль. 6 д. Однол.

**ПОЛИКАЛИМНА (Polycalymna).** *Poly* — много и *calymna* — покровъ; по многочисленнымъ рядамъ обертки. С. сложноцвѣтныхъ. (1). Полувыносл. многол. трав. р., такого же ухода, какъ за Центаурею.

**П. Стюартіи (P. Stuartii,** Стюарта). Австралія. Цв. головки бѣлые. 1 ф.

**ПОЛИКСЕНА (Polyxena).** *Polix* — дочь царя Приама. С. лилейныхъ. (7). Южн. Африка. Оранж. луков. рр. Ухождъ какъ за Малинію.

**П. одората (P. odorata,** пахучая). Цв. бѣлые, похожіе на гиацинтовые съ превосходнымъ запахомъ, въ октябрѣ.

**ПОЛИМНІЯ (Polymnia).** По музѣ *Polymnia*. С. сложноцвѣтныхъ. (12). Америка отъ Бокарин до Канады. Оранж. или полувыносл. многол. трав., либо куст. и др. рр. Сильная глин. дерн. съ переносомъ. Дѣленіемъ весной, или черенками въ январѣ, въ теплѣ, либо сѣменами въ парникѣ.

**П. пирамидалис (P. pyramidalis,** пирамидальная). Нов. Гренада. Цв. головки съ желтыми лучами и темно-коричневымъ

дискомъ, лѣтомъ и осенью. 10 ф. Р. напоминаетъ собою подсолнечникъ. Быстро растущее многол. трав. полувыносл. р.

**ПОЛИМОРФНЫЙ. ПОЛИМОРФИЧЕСКИЙ.** Принимающийъ при одинаковыхъ условіяхъ различныя формы.

**ПОЛИПОДИУМЪ (Polypodium).** Древнегреч. названіе, встрѣчаемое у Теофраста и происходящее отъ *polys* — много и *podion* — ножка: по корневищу. С. папоротниковыхъ. (450). Повсемѣстно. Волокн. глин. дерн. съ перегноемъ или торф.

**П. альбо-сquamatumъ (P. albo-squamatum,** съ бѣлыми чешуйками). Малайскіе и Филиппинскіе о. Ваи обычно перистыя, въ 2 ф. длиной и 1 ф. шириной; на верхнихъ сторонахъ мелкія бѣлыя точки. Син. *Phymatodes albo-squamata* (Phymatodes albo-squamata). Тепл. **П. ауреумъ (P. aureum,** золотистый). Троп. Америка и Австралія. Ваи перистыя, ланцетовидныя, 3—5 ф. длиной и 9—18 д. шир. Син. *Phlebodium aureum* (Phlebodium aureum). Тепл. **П. вакцинифолиумъ (P. vacciniifolium,** съ брусничными лл.). Ямайка до Парагвая. Ваи двоякія: безплодные длиной 2 д. и шир. 1/2 д. эллиптическія, тупыя; плодоносныя — линейныя. Син. *Lopholepis vacciniifolia* (Lopholepis vacciniifolia). **П. веррукозумъ (P. verrucosum,** бородавчатый). Филипп. о. и Малакка. Ваи перистыя въ 3—4 ф. длиной и въ 1 ф. шир. Син. *Schellolopsis verruculosa* (Schellolopsis verruculosa). Тепл.

**П. дрепанумъ (P. drepanum,** серповидный). Мадера. Ваи перистыя, 1 1/2—3 ф. длиной, 8—12 д. шириной; перья ланцетовидныя, разностороннія. Оранж. **П. Дриоптерисъ (P. Dryopteris).** *Гризовая трава.* Сѣв. полушаріе. Ваи перистыя дельтовидныя, длиной 6—10 д., шириной такія же; перья ланцетовидныя. Выносл. **П. кверцифолиумъ (P. quercifolium,** съ дубовыми лл.). Индія, Куинслендъ. Ваи двоякія: безплодные сидячія, въ 3—12 д. длиной; плодоносныя — на ножкахъ и въ 2—3 ф. длиной. Син. *Drynaria quercifolia* (Drynaria quercifolia). Тепл. **П. краассифолиумъ (P. crassifolium,** съ сочными лл.). Вестиндія. Ваи постепенно суженныя къ обоимъ концамъ; длин. 1—3 ф., шириной 1—5 д. Син. *Pleuriidium crassifolium* (Pleuriidium crassifolium). Тепл. **П. Лингва (P. Lingua,** языкообразный). С. Индія. Японія. Ваи однообразныя, длин. 4—8 д., шир. 1—4 д., нижняя сторона со ржавыми пушикомъ. Син. *Niphobolus Lingua* (Niphobolus Lingua). Тепл. **П. пектинатумъ (P. pectinatum,** гребенчатый). Мексика. Ваи длиной 1—3 ф., шириной 2—6 д.; перья частыя, горизонтальныя, тупыя. Тепл. **П. пилоселлоидесъ (P. piloselloides,** похожій на Пилосел-



ля). Троп. Америка. Ваи двоякия: безплодные длиной 1—3 д., шир.  $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$  д., продолговатые, цѣльные; плодоносные — уже и длиннее. Сип. *Goniophlebium piloselloides*, *Lopholepis piloselloides*, *Lopholepis piloselloides*. Тепл. **П. пусулатумъ** (*P. pustulatum*, пузырьчатый). Нов. Зеландія, Австралія. Ваи различныя: отъ цѣльныхъ въ 3—9 д. длиной до длинныхъ въ 1—1½ ф. и разрыванныхъ почти до самаго черешка. Сип. *Phymatodes pustulata* (*Phymatodes pustulata*). Оранж. **П. рупестре** (*P. rupestre*, скалистый). Ява и Филиппинскіе о. Ваи въ 4—8 д. длиной и въ 1 до 1½ д. шириной, остроколючныя. Сип. *Pleuridium rupestre* (*Pleuridium rupestre*). Тепл. **П. Скоулери** (*P. Scouleri*, Скоулера). С.-З. Америка. Ваи въ 6—12 д. длиной и въ 4—8 д. шир., разрываныя до черешка на тупоконечныя перья. Сип. *Goniophlebium Scouleri* (*Goniophlebium Scouleri*). Тепл. **П. трихоманоидесъ** (*P. trichomanoides*, похожий на Трихоманесъ). Вестиндія. Ваи въ 3—6 д., шир. въ  $\frac{1}{2}$  д., разрываныя до черешка. Тепл. **П. Феготтерисъ** (*P. Fegottieris*, волосистый). Сѣв. полушаріе. Ваи перистыя, 6—9 д. длиной и въ 4—6 д. шириной, почти дельтовидныя, на нижней сторонѣ съ волосками. Выносл. **П. братернумъ** (*P. fraternum*, братственный). Мексика. Ваи перистыя, длиной въ 1—1½ ф., шир. 6—9 д.; перья съ рубчиками. Сип. **П. Хенсманни** (*P. Henchmanni*). Тепл. **П. Хераклеумъ** (*P. Heracleum*, похожий на Хераклеумъ). Ява и Филипп. о. Ваи въ 3—6 ф. длиной и въ 2 ф. шириной, съ сердцевиднымъ крыломъ; верхняя часть разрывана на лопасти. Сип. **П. морбиллоидъ**, *Drumaria Heraclea* (*P. morbillosum*, *Drumaria Heraclea*). Тепл. **П. югланди-фоліумъ** (*P. juglandifolium*, съ лл. какъ у грецкого орѣха). С. Индія. Ваи длиной въ 1½ до 2 ф., шириной въ 1 и болѣе ф., перистыя; перья съ волнистыми краями. Сип. **П. капителилатумъ**, *Pleuridium juglandifolium* (*P. capitellatum*, *Pleuridium juglandifolium*).

**ПОЛИСТАХИЯ** (*Polystachya*). *Poly*—много и *stachys*—колось; по расположенію цв. у нѣк. видовъ. С. орхидей. (40). Троп. и Южн. Африка, Индія, Малайскій архип., Троп. Америка. Тепл. эпифиты. Уходъ какъ за Бурлингтономъ.

**П. брактёза** (*P. bracteosa*, съ прицветниками). Сіерра-Леоне. Цв. желтые, губа съ коричневыми боками. **П. рупинуля** (*P. rufinula*, рыжеватая). Занзибаръ. Цв. съ коричневыми долями, зеленоватыми лепестками и желтою губою, у которой передняя часть пурпуровая.

**ПОЛИЦИКНИСЪ** (*Polycynis*). *Poly*—много и *cynos*—лебедь; по сходству губы столбика съ лебедемъ. С. орхидей. (5). Троп. Америка. Тепл. эпифиты. Уходъ какъ за Катазетумъ.

**П. граціоза** (*P. graciosa*, миловидный). Коста-Рика. Цв. коричнево-пурпуровые, кистями. **П. лепида** (*P. lepidia*, чистая). Колумбія. Цв. свѣтло-коричневые съ желтыми кончиками; губа желтая съ шоколадно-бурыми пятнами и бѣлымъ концомъ.

**ПОЛІАЛТИЯ** (*Polyalthia*). *Poly*—много и *althecis*—здоровый; по полагавшимся свойствамъ рр. С. аноновыхъ. (30). Троп. Азія, Австралія. Тепл. или оранж. древесн. либо куст. рр. Уходъ поименованныхъ тепл. какъ за Гуаттеріей.

**П. субероза** (*P. suberosa*, пробковая). Индія. Цв. съ наруж. лепестками зелеными, внутренними — бѣлыми; 30 ф. **П. церазойдесъ** (*P. cerasoides*, похожая на вишню). Остиндія. Цв. бѣловатые. 60 ф.

**ПОЛІАНТЕСЪ** (*Polyanthes*). *Poly*—бѣлый и *anthos*—цв. С. амариллисовыхъ. (1). Оранж. или полувыносл. луков. р. Глин. дерн. съ переносомъ и листовой. Лѣтомъ—въ холодномъ парникѣ или на воздухѣ, въ горшкахъ.

**П. тубероза** (*P. tuberosa*, клубневая). Мексика. Цв. бѣлые съ превосходнымъ запахомъ, кистями, осенью. 3—4 ф. Имѣетъ много разновидностей съ махровыми цв., которые обычно и воспитываются.

**ПОЛІЙ-ТРАВА**. (Мята). См. Мента.

**ПОЛКА**. Доска придѣланная къ стѣнѣ или повѣшанная къ шпаламъ, для постановки горшковъ съ растеніями и пр. Полки дѣлаются обычно изъ доймовыхъ различной ширины. Могутъ быть постоянныя или временныя. Задняя, продольная полка въ одностатной или средней, подвѣшенная въ двустатной оранжереѣ или теплицѣ—самое лучшее помѣщеніе для рр. малой или средней величины, нуждающихся въ большомъ освѣщеніи.

**ПОЛЛИНОДІЙ**. Каѣточка гриба, принашивающаяся за мужской органъ оплодотворенія аскогеновъ.

**ПОЛОТЬ**. Сорная трава выдерганная при полотѣ.

**ПОЛОТЬЕ** травы ручное при рядовомъ посѣвѣ замѣняется мотыженіемъ, или цапаніемъ вокругъ растеній. Полотье дорожекъ производится послѣ сильныхъ или продолжительныхъ дождей, когда трава легко вырывается.

**ПОЛУЦВѢТНЫЙ**. Цвѣтокъ состоящій или изъ однихъ долей чашечки или изъ однихъ только лепестковъ вѣнчика, отдѣльныхъ или сросшихся.

**ПОЛУЩЕЧНИКЪ**. См. Лизимахія.

**ПОЛЫНЬ**. См. Артемизія.

**ПОЛЯНИЗІЯ** (*Polanisia*). *Poly*—много и *anisos*—неравный, по многочисленнымъ неравнымъ тычинкамъ. С. каперовыхъ. (14). Троп. страны. Однол. сильно пахнущія трав. рр. Садовая обик. Сѣменами, въ парникѣ, весной.

**П. гравеолесъ** (*P. graveolens*, съ сильнымъ запахомъ). С. Америка. Цв. желтые съ пурпуровыми чашечкою и тычинками, въ июль до августа. 1½ ф. **П. додекандра** (*P. dodecandra*, съ двѣнадцатью пыльными). Остиндія. Цв. бѣлые, въ июль. ½ ф. **П. хелидонія** (*P. chelidonia*, похожая на Чистотѣль). Остиндія. Цв. розовые, въ июль. 1½ ф.

**ПОМАДЕРРИСЪ** (*Pomaderris*). *Poma*—крышечка и *derris*—кожа; по плечатой покрывкѣ коробочки. С. крупновыхъ. (18). Ю. и В. Австралія, Нов. Зеландія. Оранж. куст. рр. Торф. съ песков. глин. дерн. Черенками изъ полуврѣлага роста, отрѣзанными по суставу и обуханными по концамъ, въ песокъ, подъ стекломъ. Темп. зимой 3—6°.

**П. апѣталъ** (*P. apetala*, безлепестный). Цв. зеленоватые, маленькіе, многочисленныя, безъ лепестковъ, въ июль. **П. бетуліна** (*P. betulina*, березовая). Цв. бѣдножелтые, головками, безъ лепестковъ.

**ПОМАКСЪ** (*Pomax*). *Poma*—отверстіе; по отверстию у плодовъ. С. мареновыхъ. (1). Оранж. полукустарникъ. Уходъ какъ за Оперкуляріей.

**П. умбеллята** (*P. umbellata*, зонтичный). Австралія. Сип. **П. хирта**, *Opercularia umbellata*. (*P. hirta*, *Opercularia umbellata*).

**ПОМАРІЯ** (*Pomaria*). *Pomaria* (Ромаръ)—врачъ Филиппа III испанскаго. С. бобовыхъ. (6). Вѣт-троп. Ю Африка. Оранж. куст. или древ. рр. Уходъ какъ за Цезальпиніей.

**П. glandulоза** (*P. glandulosa*, железковатая). Нов. Испанія. Цв. желтые, кистями, въ май. 2 ф. Вѣтки, чашечка и вѣнчикъ усажены железками.

**ПОМЕРАНЕЦЪ**. См. Цитрусъ.

**ПОМЕРАНЦОВЫЯ** рр. (*aurantiacae*). Семейство древесныхъ и кустарныхъ породъ съ душистыми цвѣтами и сочными, у многихъ съѣдобными, плодами. Листья очередные, ушастые, сочлененные, съ прозрачными мѣшечками содержащими масло, вслѣдствіе чего листья кажутся точечными. Къ этому сем. принадлежатъ роды Лимонія и Цитрусъ.

**ПОМЕТЪ**. Калъ. Навозъ.

**ПОМИДОРЪ** (Помъ д'амуръ). См. Ликоперискумъ.

**ПОМПЕЛЬМУСЪ**. См. Цитрусъ.

**ПОМѢСЪ**. Смѣшеніе двухъ растеній, искусственное оплодотвореніе и поколѣніе отъ него.

**ПОНГАМІЯ** (*Pongamia*). Мѣстное малабарское названіе. С. бобовыхъ. (1). Теплич. древ. рр. Уходъ какъ за Дальбергіей.

**П. глянба** (*P. glabra*, гладкая). Остиндія, С. Австралія. Цв. съ бѣлыми вѣнчиками и красной чашечкой, кистями; лл. эллиптическіе, перистые. 5—10 ф. Изъ сѣмянъ получается масло «кунджі» или «пунга», употребляемое какъ освѣтительное.

**ПОНТЕДЕРІЙНЫЯ** рр. (*Pontederiaceae*). Малочисленное сем. водяныхъ, преимущ. американскихъ и рѣдко встречающихся въ тропик. Азіи и Африкѣ рр. Въ Европѣ ихъ вовсе нѣтъ. Родовъ 4,—Монохорія, Понтерерія, Хетерантера и Эйхорнія. Видовъ 35.

**ПОНТЕДЕРІЯ** (*Pontederia*). *Pontederia* (J. Pontederia)—проф. ботаники въ Падуй, † 1757. С. понтерерійныхъ (8). С. и Ю. Америка. Тепл. или выносл. водяныя рр. Дѣленіемъ.

**П. кордата** (*P. cordata*, сердцевидная). С. Америка. Цв. лазуревые, или бѣлые съ зеленымъ пятномъ на верхней лопасти, лѣтомъ и осенью. 1½—2 ф. Очень выносл. вое р. Сажать въ воду глубиной въ 6—12 д.

**ПОНТИЕВА** (*Ponthieva*). *Ponthieu* (Ponthieu)—французскій negociantъ въ Вестиндіи, пославшій рр. Банксу. С. орхидей. (10). Жаркія страны Америки отъ Бразиліи до Ю. Соед. Штатовъ. Тепл. земныя орхидеи. Песков. глин. дерн. съ торф.

**П. макулата** (*P. maculata*, пятнистая). Колумбія. Цв. съ спинной долей бѣдно-коричневой и боковыми бѣлыми съ коричневыми пятнами, съ лепестками желтыми съ красно-бурыми полосками, въ мартъ. Все р. съ мягкими длинными волосками.

**ПОПУЛЮСЪ** (*Populus*). **ТОПОЛЬ**. На древне-латинск. называлось *palpitans* отъ *palpitare*—дрожать, вѣроятно по дрожавшимъ лл. С. ивовыхъ. (18). Европа, Центр. и С. Азія, С. Америка, включая Мексику. Выносливыя деревья. Земля—различная, любятъ влажную. Черенками на воздухѣ, лучшее время—тогда, когда опаденіи лл., а гдѣ нельзя—срубанными съ осени и сохранившимися до весны въ защитѣ отъ мороза.

**П. альба** (*P. alba*, бѣлый). Сѣв. полушаріе. Цв. въ апрѣль. Лл. широко-овально-сердцевидные на вѣтках, дельтовидно-овальные—на отпрыскахъ; въ обоихъ случаяхъ съ выемками. 60—100 ф. Древесина бѣлая, легкая. У разновидности *Boyleana* (*Boyleana*) форма пирамидальная, напоми-



нающая ломбардский тополь. **П. бальзамифера** (*P. balsamifera*, бальзамический). Тополь душистый или бальзамический. Такамака. С. Америка. Лл. овальные, суживающиеся равно, остроколючные, зубчатые, снизу бледные. 70 ф. Имѣть разновидности: *vinifolia* (*vinifolia*) съ длинными ланцетовидными лл., *condicans* (*condicans*) съ лл. больше или меньше сердцевидными, больше широкими и съ пушистыми черешками (син. *П. макрофилла*, — *macrophylla*); *лаурифолия* (*laurifolia*) съ лл. овальными или ланцетовидными, зубчатыми, пушистыми молодыми (син. *П. лаурифолия*, *P. laurifolia*) и *счадовель* (*suaveolens*), съ лл. широкими, эллиптическими, остроколючными, зубчатыми, имѣющими на жилках и черешках волоски. Последн. разновидности — со Скалистых горъ. **П. монолифера** (*P. monolifera*, четочный). С. Америка. Лл. на молодыхъ рр. и на побѣгахъ сердцевидные, длин. и шир. 7—8 д., на взрослыхъ — четверо меньше, кругло-зубчатые. 80 ф. Син. *П. ангулата*, *П. канадский* (*P. angulata*, *P. canadensis*). **П. нигра** (*P. nigra*, черный). *Осокорь*. Европа. С. Азия. Цв. въ апрѣлѣ. Лл. ромбoidalные, делтовидные или почти круглые, мелко зубчатые, съ округлыми углами; молодые — снизу пушистые. 50 ф. Растъ быстрый, но дерево не долгоживуче, — дуплится. Имѣть разновидность *пирамидаль* (*pyramidalis*) съ пирамидальнымъ ростомъ, называемую *П. дилатата* и *П. fastigiata*. **П. тремула** (*P. tremula*, дрожащий). *Осица*. Арктик. Европа, Африка, Азия. Цвѣтъ въ апрѣлѣ. Лл. на побѣгахъ сердцевидные, остроколючные, цельные, снизу пушистые, на вѣтвяхъ — округло-овальные, зубчатые, выемчатые, черешки очень длинные. 40—80 ф. Имѣть нѣсколько разновидностей, между прочимъ *pendula* (*pendula*) съ пониклыми вѣтвями.

**ПОПУТНИКОВЫЕ** рр. (*plantagineae*). Травы одно- или многолѣтнія, растущія въ умеренномъ поясѣ обоихъ полушарій, главнѣйше въ Европѣ и Сѣвери. Америкѣ, весьма рѣдки въ странахъ тропическихъ. Семейство состоитъ только изъ 3 родовъ, — Бугерія, Литторелля и Платога, и 200 видовъ.

**ПORA**. Малѣйшее отверстіе въ кожѣ; пора, дышать растенія.

**ПОРАНА** (*Porana*). Мѣстное остиндское названіе. С. вьюнковыхъ. (6). Остиндія, Малайскій архип. и Австралія. Тепл. или оранж. вьющ. однол. или куст. рр. Песк. глин. дерн. съ листов. Черенками изъ боковыхъ побѣговъ, въ парникѣ, а однол. — сѣменами для высадки въ оранжереѣ. Темп. зимой 8—10, лѣтомъ 13—15°.

**П. рацемоза** (*P. racemosa*, вѣтвистая).

Остиндія. Цв. бѣлые, мелкіе, кистями, съ іюля до ноября. Однол.

**ПОРАНТЕРА** (*Poranthera*). *Poros* — отверстіе и *anthera* — пыльникъ; пыльники открываются отверстіями. С. молочайныхъ. (5). Австралія. Однол. или полукуст. оранж. рр. Торф. Сѣменами Темп. зимой 3—7°.

**П. эрицифолия** (*P. ericifolia*, съ лл. какъ у Эррики). Цв. многочисленныя бѣлые, полузонтикомъ, въ іюлѣ. 6—12.

**ПОРЕЙ-ЛУКЪ**. См. Алылюмъ.

**ПОРЛИЕРІА** (*Portieria*). *Порье* (*Portier*) — испанецъ, покровительствовавшій ботаникѣ. С. парнолистныхъ. (3). Техасъ, Мексика, Перуанскія Анды, Чили и Парана. Тепл. куст. рр. Глин. дерн. съ торф. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ песокъ, въ умѣрен. теплѣ, подъ стекломъ. Темп. зимой 8—10, лѣтомъ 13—22°.

**П. хигрометрика** (*P. hygrometrica*, гигрометрическая). Перу. Цв. зеленые съ бѣлыми, въ апрѣлѣ. Лл. семи или восьмипарные: складываются съ приближеніемъ дождя. 2 ф.

**ПОРОДА** Поколѣние, потомство имѣющее отъ отличительныя признаки.

**ПОРТЕА** (*Portea*). *Маріусъ Порте* (*Porte*) — нашедъ рр. этого рода. С. бромелиевыхъ (4). Америка. Тепл. трав. рр. Уходъ какъ за Бильбергія.

**П. кермезина** (*P. kermesina*, карминная). Багія. Цв. голубые съ розовыми прицвѣтниками. 1½ ф. Син. *Бильбергія Бронгарти* (*Billbergia Brongartii*).

**ПОРТЛАНДІА** (*Portlandia*). Герцогиня *Портландъ* (*Portland*) — переносившаяся съ Руссо и занимавшаяся ботаникой. С. мареновыхъ. (8). Вестиндія и Мексика. Тепл. кустар. или низкія древ. рр. Волокн. глин. дерн. и листовая по ровну съ добавленіемъ песку. Черенками изъ довольно крѣпкой древесины, въ песокъ, въ парникѣ.

**П. платантъ** (*P. platantha*, съ широкими лл.). Отчество неизвестно. Цв. чисто-бѣлые, лѣтомъ. 3 ф.

**ПОРТУЛАКОВЫЕ** рр. (*portulacaeae*). Сем. обычно сочныхъ травянистыхъ, рѣдко мелкокустарныхъ породъ, встречаемыхъ предпочтительно въ Америкѣ, Южн. Африкѣ и Австраліи, а частію въ Азій, Сѣв. Африкѣ и Европѣ. Видовъ 125, родовъ 15, въ томъ числѣ. Каландринія, Клайтонія и Портуляка.

**ПОРТУЛАКЪ**. См. Портуляка.

**ПОРТУЛЯКА** (*Portulaca*). Названіе взято у Плинія, который впрочемъ писалъ его *Portilaca*. С. портулаковыхъ. (16). Распространенъ по всей земной поверхности. Оранж. или выносл. одно-либо многол. сочныя трав рр. Оранж. въ глин.

дерн., листов. и песокъ. Однол. сѣменами въ парникѣ. Упомянутые ниже виды требуютъ обращенія какъ за полувыносл. рр.

**П. грандифлора** (*grandiflora*, крупноцвѣтная). Бразилія. Цв. желтые, пурпуровые, въ іюнѣ—іюлѣ. 6 д. У разновидности *Теллюсоніи* (*Thellusonii*) цв. шарлаховые, лѣтомъ. 1 ф. **П. олерасеа** (*P. oleracea*, огородная). *Портулакъ*. Ю. Европа. Цв. желтые, въ іюнѣ—іюлѣ. Лл. маленькіе клиновидные. 6 д. Употребляется для приправы какъ приятно-кислая овощъ. Въ парникѣ, гдѣ росъ прежде, посѣвается самъ.

**ПОРТУЛЯКАРИЯ** (*Portulacaria*). Названіе дано по сходству съ Портуляка. С. портулаковыхъ. (1). Оранж. куст. р. Легкая, сухая. Черенками изъ молодого роста, предварительно посадки обсушенными.

**П. афра** (*P. afra*, африканская). Африка. Цв. малиновые, мелкіе; лл. мясистые. 3 ф.

**ПОСАДКА**. Процессъ пересадки, насажденія растеній.

**ПОСЛѢДЪ СѢМЯНОСѢЦЪ**. Часть, изъ которой вырастаетъ янчко, и на которой виситъ сѣмячко; его сѣмя соединяется съ плодникомъ.

**ПОСТРѢЛЪ**. См. Акониумъ.

**ПОСѢВЪ РАДОВОЙ**. Посѣвъ на воздухѣ (поперекъ или вдоль грядки) мелкіхъ сѣмянъ въ неглубокую канавку, дѣлаемую обыкновенно граблоникомъ. Земля должна быть прежде сравнена и разграблена, направленіе рядовъ намѣчено. Рабочій чертитъ по этому направленію бороздку такой глубины, какая требуется; затѣмъ сѣмена сѣются въ борозды и загребаются. Такой посѣвъ имѣетъ много преимуществъ: оберегаетъ сѣмена, даетъ возможность легче прорѣжаты выходы и держать ихъ въ чистотѣ. Ряды должны быть параллельны и въ равныхъ промежуткахъ.

**ПОТАЙНОЕ** яблоко. Сортъ средней поры посѣванія, среднихъ размѣровъ съ ребрами, бѣлый, съ кисловатымъ ароматнымъ вкусомъ.

**ПОТЕНТИЛЛЯ** (*Potentilla*). Уменьшительное *potens* — могущественный, по предполагающимся въ рр. вращебнымъ свойствамъ. С. розановыхъ. (120). Умѣр. и холод. пояса сѣв. полушарія, одинъ только видъ въ южн. полушаріи. Обычно выносл. полукуст. или трав. рр. Умѣренно хорошая садовая, преимущ. песковатая. Дѣленіемъ или сѣменами. Упомянутые ниже — многол.

**П. амбигуа** (*P. ambigua*, сомнительная). Гималай. Цв. ярко-желтые, въ іюнѣ; лл. густые. 6 д. **П. аргирофилля** (*P. arguro-*

*phylla*, съ серебристыми лл.). Гималай. Цв. желтые, лѣтомъ; лл. съ тонкими шелковистыми волосками. 1½—3 ф. Син. *П. insignis* (*P. insignis*). **П. конгеста** (*P. congesta*, скученная). Калифорнія. Цв. скученные, бѣлые, въ августѣ. 1—2 ф. **П. нитида** (*P. nitida*, блестящая). Ю. Европа. Цв. пѣжно-розовые; лѣтомъ; лл. съ шелковистыми волосками. **П. саксифрага** (*P. saxifraga*, похожая на Саксифрагу). Ментон. Цв. бѣлые, шипками, въ маѣ—іюнѣ. 4—6 д. **П. унговикюлата** (*P. unguiculata*, погониковая). Калифорнія. Цв. жемчужно-бѣлые, метельчатые, въ іюлѣ. 9—12 д. Син. *Посія унговикюлата* (*Jvesia unguiculata*). **П. фрутикова** (*P. fruticosa*, кустарная). *Курильский чай*. С. полушаріе. Цв. желтые, многочисленные, лѣтомъ. Лл. перистые. 2—4 ф. Куст. р.

**ПОТЕРІУМЪ** (*Peterium*). *Poterion* — чаша для питья; изъ лл. одного изъ видовъ приготовлялось лекарственное питье. С. розановыхъ. (20). Тепл. или выносл. многол. трав. или куст. рр. Сильная легкая. Сѣменами или черенками.

**П. сангвисорба** (*P. sanguisorba*, кровососковая). *Синеголовникъ*. *Пиминель*. Европа. Цв. зеленоватые или пурпуровые, въ іюнѣ—іюлѣ. Лл. округлые. 1—2 ф. Воспальвается въ огородѣ какъ кухонная трава. Многол.

**ПОТОСЪ** (*Pothos*). Мѣстное цейлонское названіе. С. ароидеиныхъ. (40). Азия, Австралія и о. Тихаго ок. Тепл. вьющ. куст. рр. Уходъ какъ за Антуриумъ.

**П. целастокаулис** (*P. celastocaulis*, со скрытымъ стеблемъ) С.-З. Борнео. Цв. косяе, сидячіе, широко-эллиптические, темно-зеленые; ниж. сторона свѣтлѣе. Цвѣты непахнущіе.

**ПОТЫКАЛО**. Колышекъ, которымъ дѣлаютъ лунки или ямки при посадкѣ расады.

**ПОУРОУМА** (*Pourouma*). Мѣстное названіе въ Гвианѣ. С. крапивныхъ. (30). Троп. Ю. Америка. Тепл. или оранж. древ. рр. Уходъ какъ за Артокариусъ.

**П. эдулис** (*P. edulis*, съѣдомая). Холодные мѣста Колумбійскихъ Кордильеръ. Цв. мужекіе клубочками, женскіе полузонтиками; лл. большіе какъ у Вигандіи; плоды по очертанію и вкусу какъ лѣсные орѣхи. Оранж.

**ПОЧТОКЪ** Цвѣторасположеніе, которое можно сравнить съ колосомъ, до раскрытія завернутымъ въ обертку, называемую чехломъ.

**ПОЧВА**. Бываетъ нѣсколькихъ родовъ. Главнѣйшія: песчанистая, глинистая, известковая, растительная или перегнойная и хрищеватая. Такъ называемый *лоамъ*



(loam) англичанъ представляет смѣсь первыхъ трехъ съ дерновой, причѣмъ глины менѣе 50, а извести—менѣе 5 процентовъ. Въ нашемъ обиходѣ лоамъ замѣняетъ глинисто-дерновая земля.

**ПОЧКА.** Зародышъ цвѣтка, листа или побѣга,—неразвернувшійся цвѣтокъ или листокъ; почка цвѣтчная называется также *распушкой*, *пупочкой*, а листовая—*очкомъ*, *глазкомъ*. Почка листовая—зачаточные листья окружающіе ось нарастанія и имѣющіе подобіе чешуекъ сложенныхъ симметрически одна на другую. Вырастаетъ изъ клѣточной ткани подъ корой на концѣ сердцев. луча. У рр. собирающихъ листья почка зарождается въ углахъ и распускается слѣдующею весной. Нѣк. почки, напр. Тополя, Конского каштана и др. покрыты камедисто-смолистыми веществами. Цвѣточ. почки бывають тупѣе. *Почка стѣнная* есть яичко.

**ПРАТІА (Pratia).** *Пратъ* (Prat-Verpon)—офицеръ француз. флота, назначенный въ экспедицію съ Фрейсине, но умершій вскорѣ по отплытіи. С. колокольчиковыхъ. (15). Троп. Азія, Австралія, Нов. Зеландія, Ю. Америка. Оранж. или выносл. трав. рр. Уходъ какъ за Лобеліа.

**П. ангулята (P. angulata, ушастая).** Нов. Зеландія. Цв. бѣлые, лѣтомъ. Стебель стелющийся. Р. весьма выносливое. Сип. *Лобелія литторалис* (Lobelia littoralis). **П. реневсъ (P. reneux, ползучая).** Фалклендскіе о. Цв. бѣлые съ фіолетовымъ оттикомъ, съ іюля до октября. Сип. *Лобелія Пратіана, Л. реневсъ* (Lobelia Pratiana, L. reneux).

**ПРЕМНА (Premna).** *Premnon*—пень дерева, по низкимъ стеблямъ многихъ видовъ. С. вербеновыхъ. (30). Жаркія страны Старого Свѣта. Тепл. куст. или древ. рр. Песков. глин. дерн. съ торф. и листов. сѣменами или черенками.

**П. интегріфолія (P. integrifolia, цѣльнолистная).** Остиндія. Цв. зеленноватые, сильно пахучіе, въ іюль. Лл. овальные, рубчатые. 10—12 ф. Дерево. Сип. *П. сerratифолія, П. спиноза* (P. serratifolia, P. spinosa). **П. латифолія (P. latifolia, широколистная).** Остиндія. Цв. сѣровато-бѣлые, въ іюль. 15 ф. Кустар.

**ПРЕНАНТЕСЪ (Prenanthes).** *Prenes*—пониклый и *anthos*—цв., по пониклымъ цв. головкамъ. С. сложноцвѣтныхъ (16). Центр. Европа. Остиндія, Канарскіе о., С. Америка. Оранж. выносл. трав. рр. Песков. глин. дерн. Однол. сѣменами, многол.—дѣленіемъ.

**П. пурпуреа (P. purpurea, пурпуровый).** Европа. Цв. головки пурпуровыя, пониклыя, въ августъ. 4 ф. Выносл.

**ПРЕПУЗА (Prepusa).** *Prepo*—означаетъ «я красивъ». С. горечавковыхъ. (3). Бразилія. Оранж. трав. или куст. рр. Уходъ какъ за Лейлантусъ.

**П. Хукеріана (P. Hookeriana, Хукерона).** Цв. желтоватые, въ мартъ. 1 ф.

**ПРЕСКОТТІА (Prescottia).** *Prescottia* (Prescott) — ботаникъ, занимавшійся изслѣдованіемъ петербургской флоры. С. орхидей. (20). Троп. Америка. Земныя орхидеи. Глин. дерн. Темп. оранжерейная.

**П. денсифлора (P. densiflora, съ плотнорасположенными цв.).** Бразилія. Цв. бѣловатые; лл. розеткой. **П. плантагинѣа (P. plantaginea, похожая на Музу)** Бразилія. Цв. зеленноватые, плотнымъ колосомъ; лл. прямые.

**ПРЕСТОЕА (Prestoea).** *Prestoea* (Prestoe) — директоръ бот. сада на Три니다дѣ. С. пальмовыхъ. (2). Вестиндія. Низкорослыя перистолистные тепл. пальмы. Уходъ какъ за Фениксомъ.

**П. пубигера (P. pubigera, пушистая).** Вестиндія. Цв. мелкіе, плоды—овальные ягоды. Лл. 3—4 ф. длинной, перистораздѣленные. Стволъ въ 10—12 ф. Сип. *Хиспатте пубигера* (Hyospathe pubigera).

**ПРЕСТОНІА (Prestonia).** Докторъ *Престонъ* (Preston)—корреспондентъ Рая. С. кутровыхъ. (30). Троп. Америка. Тепл. выющіяся, цѣлкія куст. рр. Рыхлая глини. дерн. Черенками въ парникѣ Темп. зимой 7—11, лѣтомъ 13—24°.

**П. венѣза (P. venosa, съ жилками).** Сант-Винцентъ. Цв. желтовато-зеленые, въ іюнь; лл. ланцетовидные съ малиново-красными жилками. Сип. *Эхитесъ нитисъ* (Echites nitans).

**ПРИБАВОЧНЫЙ.** Выросшій, появившійся на необычномъ мѣстѣ или положеніи, имѣющій дополнительные придатки къ обычному образованію.

**ПРИВА (Priva)** Происхождение названія неизвестно. С. вербеновыхъ. (9). Жаркія страны. Оранж. трав. рр. Уходъ какъ за Стахитарфетомъ.

**П. лѣвистъ (P. laevis, гладкая).** Аргентинская республика. Цв. красноватые, лѣтомъ. 1—1½ ф.

**ПРИВИВАТЬ. ПРИВѢТЬ.** (Прививанье. Прививка). Прищеплять, колыровать. Пасаживать и приращать черенокъ. срѣзанный съ другого однороднаго растенія. Прививка бываетъ тройкая. 1. *Прививка привязкой:* лѣсника (дичокъ) и черенокъ срѣзаются накосъ и связываются; сюда же относятся: *прививку склейкой*, когда черенокъ тоньше лѣсника, почему онъ присаживается сбоку, и *прививку клиномъ*, когда лѣсника вырѣ-

зывается въ зубъ, а черенокъ вставляется зубомъ или клиномъ. 2) *Прививка глазками:* глазокъ или ростокъ съ частью коры вырѣзывается изъ добраго дерева, въ дичкѣ дѣлается двусторончатый надрѣзъ, и щитокъ вставляется подъ кору. Прививъ *спичкой* глазкомъ не освобождаютъ отъ повязки на зиму, *зрчимъ*—снимають вскорѣ. Прививка глазкомъ дѣлается почти исключительно въ древесныхъ породахъ, хотя возможна и въ травяни. многолѣтнихъ. Необходимо, чтобы дичокъ былъ въ соку и слѣд., чтобы кора отдѣлялась легко. 3) Прививка въ *пупъ*, въ *рашенъ*, либо *въ кору*, *въ зазоръ подъ кору*; въ первомъ случаѣ пень раскалывается и черенокъ вставляется клиномъ, во второмъ—онъ только всаживается за кору, на отрѣзѣ. Успѣшная прививка зависитъ отъ умѣнья производитьчаго, отъ состоянія сока, здоровья дичка и черенка и времени года. Основное начало всякаго рода прививки—прикосновеніе слоевъ внутренней коры обихъ соединяемыхъ частей, безъ этого—прочнаго срастація быть не можетъ. Хотя одинаковая степень развитія дичка и привоя условливаетъ здоровый ростъ, тѣмъ не менѣе въ нѣк. случаяхъ берется черенокъ, который крѣпче и сильнѣе дичка, чтобы прививъ соковъ къ привою былъ ограниченъ и вслѣдствіе этого возбуждалось развитіе не древесныя, а плодова. Той же цѣли достигаютъ *двойною* прививкою, когда на дичокъ прививается сортъ средней степени роста, а на него уже черенокъ желаемой разновидности. Всякая прививка производится когда растенія въ соку,—въ промежуткѣ того, какъ онъ придетъ въ движеніе весной и того, какъ окончится его движеніе осенью, избѣгая впрочемъ сильнаго жаркаго времени, или половины лѣта. Успѣху помогаетъ прививаніе въ тихую, влажную погоду; для нѣжныхъ рр. необходимо, послѣ прививки, содержаніе въ сиротѣмъ всѣхъ; для выносливыхъ породъ не нужно тепло, требуется только защита отъ высыханія и обвѣтриванія. Способовъ прививки очень много.

**ПРИВИВОЧНАЯ ЗАМАЗКА.** Дѣлается изъ двухъ частей мягкой глины и части коровьяго помета, нѣкоторые прибавляютъ къ этому рубленнаго сѣна, чтобы глина не трескалась. Смѣсь эту хорошо перемѣшиваютъ и заготовляютъ недѣли за двѣ; чтобы она не пересохла, кладутъ ее горкой, посрединѣ которой дѣлають лунку и наполняютъ ее водой.

**ПРИВИВОЧНЫЙ ВАРЪ** или **ВОСКЪ** составляется изъ 3 ч. смолы,

3 ч. воску и 2 ч. сала, все это разогрѣвается въ желѣзной посудѣ на огнѣ и остужается. Употребляется подогрѣтый, намазывая кисточкой. Пользуется извѣстностью воскъ «mastic l'homme Lefort», который намазывается щеточкой и на воздухѣ твердѣетъ.

**ПРИВОЙ. ПРИВѢВОКЪ. ПРИВИТОЕЪ.** (Привойный). Прищепокъ или прищепы. Черенокъ или глазокъ, перенесенный съ одного дерева на другое.

**ПРИВОЙНИКЪ.** Садовый ножъ для прививки.

**ПРИВЯЗОКЪ. ПРИВЯЗУШКА.** Мочала, веревка и т. п. для привива чего либо.

**ПРИГОРШНЯ.** Мѣра сыпучаго, сколько загрузить можно въ обѣ ладони вмѣстѣ.

**ПРИГРѢВА. ПРИГРѢВОКЪ.** Мѣсто, гдѣ печетъ солнце; часть противъ солнца, на югѣ.

**ПРИЖИВАТЬ. ПРИЖИТЬ.** (Прививанье). Приниматься расти по пересадкѣ, усвоиться новой мѣстностью.

**ПРИЗМАТОКАРПУСЪ (Prismatocarpus).** *Prisma*—призма и *karpos*—плодъ; по призматической формѣ длиннаго плода. С. колокольчиковыхъ. (16). Ю. Африка. Оранж. и частію выносл. кустар. или многол. трав. рр. Уходъ какъ за Кампануля.

**П. нитидусъ (P. nitidus, блестящій)** Цв. бѣлые, въ августъ и сентябрь. 6—12 д. Оранж.

**ПРИКАПЫВАТЬ. ПРИКОПАТЬ.** Закапывать на время корни, дѣлая канавку, въ которую ихъ кладутъ кучно и затѣмъ засыпать вынутою землею.

**ПРИКЛОНЫТЬ. ПРИКЛОНЫТЬ.** (Приклоненье. Приклонъ). Пригибать верхушку дерева къ низу, къ землѣ.

**ПРИКРЫВАТЬ. ПРИКРЫТЬ.** (Прикрытіе). Кладъ крышку, покрывало изъ разнаго вещества,—хвои, соломы, земли, навозу, рогожѣ и пр., для защиты растенія на зиму.

**ПРИЛИСТНИКЪ.** Застрѣшка; родъ листка или плевелки у череночка листа.

**ПРИЛѢПЫВАТЬ. ПРИЛѢПАТЬ.** Шлепать стороною лопаты по землѣ, чтобы ее выровнять для посѣва или послѣ посѣва.

**ПРИМУЛЯ (Primula).** *Primus*—первый, по раннему цвѣтенію. С. первоцвѣтныхъ. (80). Европа, умѣр. Азія, Америка, Ява, Арктич. Ю. Америка. Оранж. или выносл. многол. рр. съ корневищами Песков. глин. дерн. съ торф. и перегноемъ. Сѣменами, черенками дѣленіемъ.



**П. Альдионіи** (P. Allionii, Альдиони). Горы съ С. Ментоны. Цв. блѣдно-красно-оранжевые съ бѣлымъ глазкомъ, въ апрѣлѣ. Все р. коротко-пушистое. **П. алтайка** (P. altaica, алтайская). Алтай. Цв. красновато-пурпуровые съ желтымъ глазкомъ, весной. Лл. овальные, молодые ланцетовидные, слегка мучнистые. 3—5 д. **П. Аурікуля** (P. Auricula). Африка. Медовые ушко. Европейскія Альпы. Цв. разной окраски, обычно желтые, зонтичные, весной; лл. удлинено-ланцетовидные, мясистые, зубчатые, сизовато-мучнистые. 3 д. Имѣютъ очень много разновидностей и формъ. **П. аурікулата** (P. auriculata, ушастая). Горы Австрій. Цв. пурпуровые съ бѣлымъ глазкомъ, зонтикомъ, рано лѣтомъ; лл. продолговатые, гладкіе, зубчатые. 4 д. **П. Вовейна** (P. Voeveana, Вове). Гора Синай. Цв. желтые, многочисленные, въ апрѣлѣ; лл. розеткой. 6 д. Оранж. **П. вертициллята** (P. verticillata, кольчатая). Абиссинія. Цв. желтые кольцами по три, весной; лл. продолговато-ланцетовидные. 1—1½ ф. Снн. **П. Кюрти** (P. Courti). **П. вискоза** (P. viscosa, липкая). Пиреней. Цв. розово-пурпуровые съ бѣлымъ глазкомъ, зонтиками на липкой стрѣлкѣ, рано лѣтомъ; лл. овальные, съ частыми зубчиками и липкими волосками. 2—4 д. Снн. **П. вильоза** (P. villosa). Имѣетъ нѣсколько разновидностей. **П. вульгарисъ** (P. vulgaris). Первоцвѣтъ. Европа. Цв. обычно блѣдно-желтые съ плоскимъ отворотомъ, зонтиками, весной. Лл. скученные, сидячіе. 3 д. Имѣетъ множество разновидностей. **П. глутиноза** (P. glutinosa, клейкая). Ю. Европа. Цв. яркіе сине-пурпуровые, весной; лл. эллиптически-ланцетовидно-клиновидные. 4 д. **П. дентикулата** (P. denticulata, зубчатая). Гималаи. Цв. ярко-лиловые, мелкіе, головками или зонтиками на длинной стрѣлкѣ, лѣтомъ. Лл. продолговато-ланцетовидные, зубчатые, пушистые. 8—12 д. Имѣетъ разновидность **Кашмеріана** (Kashmeriana) съ свѣтло-пурпуровыми цв. и желтымъ глазкомъ. **П. калицина** (P. calicina, чашечная). Ломбардскія Альпы. Цв. пурпуровые, зонтиками съ короткими ножками, въ маѣ—іюнь. Лл. широко-ланцетовидные, остроколючные, съ розовымъ краемъ. **П. капitata** (P. capitata, головчатая). Гималаи. Цв. темные синефиолетовые, головками, въ апрѣлѣ—іюнь. Лл. продолговатые, на нижней сторонѣ мучнистые. Холодно-оранж. **П. кортузoidесъ** (P. cortusoides, похожая на Кортюзу). Сибирь. Цв. темно-розовые, зонтиками, рано лѣтомъ. 6—10 д. Очень красивое р. У равнов. **Зибольди** (Sieboldii) цв. темно-розовые съ бѣлымъ глазкомъ; она называется также **П. амеиа** (P. amena). **П. лютеоля** (P. luteola, желтоватая). Кавказъ. Цв. блѣдно-желтые съ золотисто-жел-

тою серединой, головками, лѣтомъ. Лл. продолговатые, книзу суженные, зубчатые. 1½—2 ф. **П. маргината** (P. marginata, каемчатая). Швейцарія. Цв. розово-фиолетовые съ мучнистымъ зѣвомъ, въ апрѣлѣ—маѣ. Лл. овальные съ бѣло-мучнистыми краями. 2—4 д. **П. миніма** (P. minima, меньшая). Ю. Европа. Цв. обычно-розовые, но иногда бѣлые, лѣтомъ; лл. клиновидные. 1½ д. **П. мольдизъ** (P. mollis, мягкая). Бутанъ, Гималаи. Цв. съ красною чашечкой и трубкой вѣнчика и съ розовымъ отворотомъ, у котораго глазокъ обведенъ кроваво-краснымъ кольцомъ; въ маѣ; лл. продолговатые, на длинныхъ черешкахъ, волосистые. **П. нивалисъ** (P. nivalis, бѣлоснѣжная). Кавказъ. Цв. бѣлые, большими лучиками, весной; лл. лопатчатые, гладкіе. 4—9 д. Имѣетъ нѣсколько разновидностей. **П. обоніка** (P. obscura, обратно-коническая). Сред. Китай. Цв. блѣдно-лиловые или пурпуровые, пониклые, зонтиками, весной и лѣтомъ; лл. корневые широко-овальные или кругло-сердцевидные. 6—12 д. **П. официналисъ** (P. officinalis, аптечная). Баранчикъ. Европа, З. Азія. Цв. ярко-желтые, зонтиками, весной и лѣтомъ; лл. суженные книзу съ короткими, жесткими волосками. 4—12 д. Снн. **П. оверисъ** (P. veris). Имѣетъ очень много садовыхъ разновидностей и формъ. **П. розеа** (P. rosea, розовая). Кашмиръ. Цв. ярко-карминные съ желтымъ глазкомъ, весной. Лл. блѣдно-зеленые, гладкіе. 4 д. **П. сапфиріана** (P. sapphirina, сапфировая). Сиккимъ на высотѣ 13—15 т. ф. Цв. свѣтло-голубые; лл. лопатчатые, тупые, розетками. 1—2 д. Маленькое р. **П. скотика** (P. scotica, шотландская). Шотландія. Цв. ярко-пурпуровые, въ іюнь; лл. овально-ланцетовидные, зубчатые, мучнистые на обѣихъ сторонахъ. 2—4 д. **П. синензисъ** (P. sinensis, китайская). Китай. Цв. бѣлые или блѣдно-лиловые съ ровными краями, весной; лл. мясистые, выемчатые съ волосками. 9 д. Оранж. Снн. **П. гранитансъ** (P. granitans). Имѣетъ множество разновидностей и формъ съ простыми и махровыми, ровными и бахромчатыми цв. и различно образованными лл. **П. Стюартіи** (P. Stuartii, Стюарта). С. Индія. Цв. золотисто-желтые, зонтиками, весной. Цв. ланцетовидные. 9—18 д. **П. фаріноза** (P. farinosa, мучнистая). Центр. и Сѣв. Европа. Цв. блѣдно-пурпуровые съ желтымъ глазкомъ, плотными зонтиками; лл. маленькіе, продолговато-овальные, кругло-зубчатые, съ бѣлымъ мучнистымъ налетомъ. 3—12 д. **П. флорибунда** (P. floribunda, многоцвѣтная). З. Гималаи. Цв. желтые, мелкіе, кольцами. Лл. эллиптически-ланцетовидные. 4—8 д. **П. эліяторъ** (P. elator). Вулканическая. Европа. Цв. блѣдно-желтые, горизонтальные или пониклые,

зонтиками, въ апрѣлѣ—маѣ. Лл. съ крылатыми черешками. 1 ф. Форма средняя между **П. вульгарисъ** и **П. официналисъ**. Имѣетъ нѣсколько садовыхъ разновидностей. **П. японика** (P. japonica, японская). Японія. Цв. малиновые, каштановые, розовые или бѣлые, кольцами, весной; лл. большіе, продолговато-лопатчатые, грубо-зубчатые. 1—1½ ф.

**ПРИПУСКАТЬ. ПРИПУСТИТЬ.** (Припускать. Припускъ). Пристановка растеній къ цвѣту или росту. Перенесеніе изъ темнаго и холоднаго помѣщенія въ свѣтлое и теплое.

**ПРИСТЛѢЯ** (Priestleya). *Пристлей* (Priestley) знаменитый химикъ, † 1804 С. бобовыхъ. (15). Ю. Африка. Оранж. кустар. рр. Песков. торф. Полівка остроколючая. Черенками изъ самаго молодого роста, въ песокъ, подъ стекломъ, отнюдь не влажно.

**П. вестита** (P. vestita, покрытая). Цв. головчатые желтые, въ маѣ—іюнь; лл. овальные, книзу пушистые. 2—4 ф. **П. серіцеа** (P. sericea, шелковистая). Цв. желтые, махровыми колосами, въ іюнь—іюль. Стручки покрыты волосками. Лл. плоскіе, остроколючные. 2—3 ф.

**ПРИТЕМНЯТЬ. ПРИТЕМНИТЬ.** (Притемнѣть). Затемнить нѣсколько, за слонить отъ сильнаго свѣта.

**ПРИТОЧНИКЪ.** См. Кампануля.

**ПРИТЧАРДІЯ** (Pritchardia). *Притчардъ* (Pritchard), авторъ Polynesian Reminiscences. С. пальмовыхъ. (7). О. Товарищества и Сандвичевы. Тепл. Лл. складчатые многораздѣльные. Торф. 2 ч. и глини. дерн. и песку по 1 ч. Стѣнами. Обильная полівка. Тем. зимой 15—17, лѣтомъ 20—26°.

**П. Вюльстекіана** (P. Vuylsteekiana, Вюльстекана). О. Помоту. Лл. большіе, густые. **П. паціфика** (P. pacifica, съ о. Тихаго ок.). О. Тихаго ок. Лл. темно-зеленые, вѣерообразные, дланевидно-разсѣченные, складчатые, молодые—съ бѣлымъ пушкомъ. 10 ф. **П. периклэарумъ** (P. periclarum, съ Опаснаго архипелага). О. Помоту изъ Опаснаго арх. Лл. вѣерообразные, съ золотисто-коричневыми черешками.

**ПРИХОДНАЯ ТРАВА.** См. Вероника.

**ПРИЦВѢТНИКЪ.** Листочекъ вырастающій у пѣк. растеній вмѣстѣ съ цвѣткомъ.

**ПРИЦѢПОКЪ. УСИКЪ. УХВАТЪ.** Гибкое нитеобразное продолженіе, которое обвиваетъ предметъ, находящійся около.

**ПРЕЦЕПЛЯТЬ. ПРИЦЕПИТЬ.** Прививать прицепомъ, срѣзавъ сучекъ,

растѣивъ песокъ и всадивъ туда вѣтку другого растенія, срѣзаннаго клиномъ.

**ПРИЦИПАТЬ. ПРИЦИПЫ. ВАТЪ.** (Прищипка. Прищипанье). Укорачивать побѣгъ, отщипывая потями указательнаго и большого пальцевъ.

**ПРІОНИУМЪ** (Prionium). *Prionium*—пшолчка; по запыленнымъ лл. С ситниковыхъ. (1). По рѣкамъ въ Ю. Африкѣ. Оранж. тростниковая трава. Глини. дерн. съ листов. въ песокъ съ водою. Дѣлаемъ.

**П. пальміта** (P. palmata, Пальміета). Цв. зеленовато-золотистые, метелкой; лл. собранные у ствола, линейные. 6 ф.

**ПРѢКА.** Упругая ткань коры у нѣкоторыхъ рр., образующаяся гостымъ слоемъ, изъ котор. получаютъ употребленія въ домашнемъ быту пробки.

**ПРОЖИЛИНА.** Жилка, полоска прочная въ цвѣтѣ или слояхъ древесины.

**ПРОЗЕРПІНАКА** (Proserpinaca). Заимствовано у Плинія, вѣроятно отъ *proserpo*—ползти, по позуемому стеблю. С. славяногородныхъ. (2). С. Америка и Вестиндія. Водяныя рр. Просторное водовѣстилище съ небольшимъ слоемъ земли. Полувынос. или оранж.

**П. палюстрисъ** (P. palustris, болотная). Канада. Цв. бѣлые, лл. ланцетовидные, зубчатые, подводные—перистые. **П. пектината** (P. pectinata, гребенчатая). С. Америка. Цв. бѣлые лѣтомъ; лл. гребенчатые.

**ПРОЗОПИСЪ** (Prosopis). Название заимствовано у Dioscorida. С. бобовыхъ. (18). Троп. страны. Тепл. дрв. и куст. рр. Песков. глини. дерн. Черенками изъ бокового роста, въ песокъ, въ умѣр. парникѣ. Темп. зимой 6—10, лѣтомъ 13—24°.

**П. силикваструмъ** (P. siliquastrum, стручинный). Чили. Цв. бѣлые, лл. перистые по 2 или 3 пары; вѣтви съ иглами. 30—40 ф.

**ПРОКІЯ** (Prockia). Происхождение названія неизвѣстно. С. липовыхъ. (3). Троп. Америка. Тепл. куст. рр. Песков. глини. дерн. съ листов. Черенками изъ ползучаго роста въ песокъ, въ парникѣ.

**П. крѣдисъ** (P. crueis, изъ Санта Крус). Вестиндія. Цв. желтые пахучіе, полузонтиками, въ іюль. 5 ф.

**ПРОКЛЕЗІЯ** (Proclesia). *Проклэ* (Procles)—царь спартанскій. С. брусничныхъ. (30). Гористая мѣста Троп. Америки. Тепл. куст. рр. Уходъ какъ за Тибодіи.

**П. акумината** (P. acuminata, остроколючная). Анды Колумбін и Эквадора. Цв. красные съ шарлаховыми прищипками. Настоящее названіе этого р. *Кавендіиша*



*acuminata* (Cavendishia acuminata). Сип. *Thibodia acuminata* (Thibaudia acuminata).

**ПРОПАЙЯ** (Propaya). *Pronat* (Propaya) — венгерскій натуралист, † 1805. С. смольнобменниковых. (1) Оранж. вьющ. р. Песков. торф. Черенками изъ молодого роста, въ песокъ, подъ стекломъ.

**П. элгансъ** (P. elegans, изящная). Австралія. Цв. голубоватые или бѣловатые, полувонючкіи; въ августъ; лл. съ завернутыми краями. Сип. *Кампилиантера Фразери* и *Спирантера Фразери* (Campylanthera Fraseri, Spiranthera Fraseri).

**ПРОРОСТАТЬ**. Расті сквозъ что, или достигать чего (корни проросли сквозъ тряпку, достигли дренажнаго слоя). Давать ростъ, тронуться въ ростъ.

**ПРОРАЩАТЬ. ПРОРОСТИТЬ**. Возбуждать растительную силу. Выращать. Искусственно вызвать ростъ сѣмянъ.

**ПРОРОСТЬ**. Вѣселеватая жилка въ плодахъ (напр. въ арбузѣ).

**ПРОРѢЗНАЯ ТРАВА**. См. Меумъ.

**ПРОСВИРНЯКЪ**. См. Алтея и Мальва.

**ПРОСО**. См. Паникумъ.

**ПРОСТАНТЕРА** (Prostanthera). *Prostithe* — зависѣть и *anthera* — пыльникъ, по связникамъ пыльниковъ. С. губовцѣтнхъ. (38). Австралія. Оранж. куст. или полукуст. рр., обычно сильно пахучія. Песков. торф. Черенками изъ молодого роста. Темп. зимой 3—7°.

**П. вюльцеа** (P. violacea, фиолетовая). Цв. синенупуровые, плотными нѣстями въ июль. 4 ф. **П. нѣвеа** (P. nivea, снѣжно-бѣлая). Цв. бѣлые, съ голубоватымъ оттенкомъ; 3—6 ф.

**ПРОСТРѢЛЬ ЛУГОВОЙ**. См. Анемона.

**ПРОСТѢННОКЪ**. Часть оранжереи и теплицы, въ которой бываетъ холоднѣе и темнѣе. Онъ служитъ для сохраненія земли, горшковъ и т. п., а также нѣкоторыхъ растений, ихъ корней, луковичъ, клубней, зимою. Въ немъ же дѣлается пересадка и тѣхъ др. работы.

**ПРОСѢВЪ. ПРОСѢВЪ. ПРОСѢВЪ**. Машинное, ручное сито.

**ПРОСѢВЕНЪ**. Ручное сито.

**ПРОТѢА** (Protea). *Протей* (Proteus) — богъ морей измѣнчиваго образа; по разнообразію видовъ. С. протейныхъ. (60). Вѣт. троп. Юж. Африка до Абиссиніи. Оранж. кустар. или низкія дрв. рр. Волокн. глин. дерн. съ пескомъ и около 1/4 ч. дрв. угля съ черепками и торф. мохомъ. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ песокъ, закрытомъ глин. дерн. з., въ холодномъ парникѣ. Темп. зимой 3—7°.

**П. кордѣата** (P. cordata, сердцевидная). Цв. пурпуровые, головками, въ апрѣль. 3—12 д. Сип. **П. кордиформъ** (P. cordifolia). **П. мелифера** (P. mellifera, медоносная). Цв. малиновые или бѣлые, въ сентябрь. 6 ф. **П. пухлякъ** (P. pulchella, красивая). Цв. красные, въ июль. 3 ф. **П. сколимусъ** (P. Scolymus, Сколимусъ). Цв. пурпуровые, въ апрѣль. 3 ф. **П. формоза** (P. formosa, прекрасная). Цв. фиолетовые, въ маѣ. 6 ф.

**ПРОТОПЛАЗМА**. Слово это составлено изъ двухъ греческихъ: *протон* — первичный и *плазма* — образовавшееся вещество. Это — образовательная полужидкость, изъ которой составляется растительная ткань. Протоплазма есть — болѣе густая, мелкозернистая, безцвѣтная часть жидкаго содержимаго кѣточки. Другая часть этого содержимаго, — болѣе жидкая, какъ вода, есть *кѣтоточный сокъ*. Въ протоплазмѣ находится округлое тѣло — *кѣтоточное ядро*, заключающее внутри одно или нѣсколько мелкихъ тѣлецъ, — *ядрышковъ*. Въ протоплазмѣ встрѣчается часть зеленыхъ ядрышекъ, — *хлорофилла*, и безцвѣтныхъ, — *крахмала*. Протоплазму признаютъ основою кѣточки, а слѣдов. и растенія.

**ПРОТОТИПЪ**. Первообразъ. Начальный, основный образецъ. Истинникъ.

**ПРУНѢЛІЯ** (Prunella). Измѣненное *brunella*, отъ нѣмец. Die Bräune — жаба, горловая болѣзнь, отъ которой будто бы помогаетъ р. С. губовцѣтнхъ. (3). Широко-распространенная трава. Всякая легкая спящая. Дѣленіемъ.

**П. вульгарисъ** (P. vulgaris, обыкновенная). *Горлянка*. Европа. Цв. съ пурпуровыми чашечкой и вѣнчикомъ, въ июль до сентяб. 4—12 д. Имѣетъ нѣсколько разновидностей. **П. грандиформъ** (P. grandiflora, крупноцвѣтная). Европа. Цв. пурпуровые или фиолетовые, въ августъ. Вѣроятно, это — только разновидность вульгарисъ, хотя и простой народъ у насъ зоветъ ее особымъ названіемъ *Щемляиной*.

**ПРУНУСЪ** (Prunus). Древне-латинское названіе сливы. С. розоцвѣтныхъ. (20). Сѣв. полушаріе, Троп. Азія и Троп. Америка. Дрв. или куст. рр. Песков. глин. дерн. Сѣменами и прививкой.

**П. дивариката** (P. divaricata, растопыренный). *Алича*. Кавказъ. Цв. бѣлые, въ апрѣль. Плоды желтые, круглые или продолговатые. 10 ф. **П. доместика** (P. domestica, домашняя). *Слива*. Ю. Европа, Кавказъ. Цв. бѣлые, обычно одиночныя, весной; плоды — различные по формѣ и окраскѣ; лл. овальные. 20 ф. Имѣетъ очень много разновидностей, между прочимъ съ махров. цв. и пестрыми лл. **П. Писсардія** (P. Pis-

sardii, Писсарда). Персія. Цв. бѣлые, въ апрѣль; лл. широко-овальные, красно-пурпуровые; плоды мелкіе. Куст. р. **П. сипензисъ** (P. sinensis, китайскій). Китай. Цв. бѣлые, мелкіе, весной; лл. продолговатые, острокопечные; плоды шаровидные, мелкіе, темно-красные, особеннаго пріятнаго вкуса. **П. трилоба** (P. triloba, трехлопастная). Китай. Цв. бѣлые или розовые, обычно махровые, рано весной. Лл. трехлопастные. 6 ф. Сип. **П. виргата**, *Амидальпесисъ Линдлея*, *Прунописисъ Линдлея* (P. virgata, Amygdalopsis Lindleyi, Prunopsis Lindleyi). **П. церазифера** (P. cerasifera, вишневая). *Миробаланъ*. Отчество неизвѣстно. Цв. бѣлые, въ апрѣль. Лл. эллиптическіе острокопечные; плоды шаровидные, красные съ желтой мякотью, въ которой острокопечная косточка.

**ПРУСТІЯ** (Proustia) *Пру* (Proust) — франц. химикъ, † 1826. С. сложноцвѣтныхъ. (7). Юж. Америка. Мексика. Тепл. или оранж. вьющ. рр. Уходъ какъ за Мутизія.

**П. пирифолія** (P. purifolia, съ лл. какъ у сливы). Чили. Цв. голыки бѣлые, хоолок пурпуровый. Лл. на нижней сторонѣ пушистые.

**ПРѢЛЬ** растений, — преждевременная гниль листьевъ, цвѣтотъ и стеблей бываетъ чаще у молодыхъ и пѣжныхъ сѣянцевъ, когда они сидятъ густо или не пользуются достаточнымъ воздухомъ; прѣль происходитъ тоже отъ излишней сырости въ воздухѣ или у корней; у черенковъ — отъ засухи и потомъ избыточной поливки; она бываетъ и тогда, когда въ помѣщеніи съ растеніями воздухъ холоднѣе наружнаго.

**ПРЫЩЕНІЧНЫЯ** рр. (myristiceae). Семейство изъ одного рода Мирстиака и 80 видовъ, встречаемыхъ преимущественно въ тропическихъ Азіи и Америкѣ; нѣсколько видовъ находится въ Африкѣ и по одному на Мадагаскарѣ и въ Австраліи.

**ПСАММА** (Psamma). *Psammis* — песокъ. С. злаковъ. (2). Берега Европейскихъ и С. африканскихъ морей. Песковатая. Черенками изъ корневища.

**П. аренарія** (P. arenaria, песочная). Колоски прямые, въ июль, лл. длинные, жесткіе съ длинными влагалищами. 2—4 ф. Корневище длинное, ползучее.

**ПСАММИЗІЯ** (Psammisia). *Псаммисъ* или Псамметихъ, египетскій царь. 376 до Р. Х. С. брусничныхъ. (30). Анды и горы Венецуелы и Гвианы. Тепл. куст. р. Уходъ какъ за Тибодіи.

**П. Жессипѣ** (P. Jessice, Жессики). *Бетменъ*. Каракасъ. Цв. блѣднорозовые, въ сентябрь. Лл. овально-ланцетовидные.

**ПСЕВДОДРАКОНТИУМЪ** (Pseudodracontium). *Pseudo* — ложный и *Драконтиумъ*, по сходству съ этимъ р. С. орхидейныхъ. (2). Кохинкина. Тепл. клубневая трав. рр. Уходъ какъ за Калладіумъ.

**П. Лакүрия** (P. Lacourii, Лякура). Это настоящее названіе *Аморфифаллюсъ Лакүрия* (Amorphophallus Lacourii).

**ПСЕВДОЛЯРИКСЪ** (Pseudolarix). *Pseudo* — ложный и *Larix*, по сходству съ Лариксъ. С. хвойныхъ. (1). Китай. Дрв. р. выносливое въ умѣр. климатѣ. Уходъ какъ за Пинусъ.

**П. Кемпфери** (P. Kämpferi, Кемпфера). Лл. пучками, линейно-ланцетовидные; шишки висѣющія, коническіе съ опадающими чешуйками. 120 — 130 ф. Сип. *Лариксъ Кемпфери* (Larix Kämpferi).

**ПСЕВДОПАНАКСЪ** (Pseudopanax). *Pseudo* — ложный и *Panax*, по сходству съ Панаксъ. С. аралиевыхъ. Нов. Зеландія, Чили. Оранж. куст. или дрв. рр. Уходъ какъ за Аралія.

**П. краассифоліумъ** (P. crassifolium, толстолистный). Нов. Зеландія. Лл. очередные, длиной въ 2 ф. и шир. 1 д., толстые, мясистые, съ острою нѣдой на концѣ; верх. сторона темно-оливковаго цв. съ оранжевою сред. жилкой. 10 ф. Сип. *Аралія краассифолія*, *Панаксъ краассифоліумъ*, *П. лонгиссимумъ* (Aralia crassifolia, Panax crassifolium, P. longissimum). **П. Лессоніи** (P. Lessonii, Лессона). Нов. Зеландія. Цв. дов. большіе, зеленые, вонючкіи; лл. 3—5-листные, кожистые, толстые. Сип. *Аралія трифоліата* (Aralia trifoliata).

**ПСЕВДОТСУГА** (Pseudotsuga). *Pseudo* — ложный и *Tsuga* — тсуга, по сходству. С. хвойныхъ. (1). Высокое дерево. Уходъ какъ за Пинусъ.

**П. Дугласіи** (P. Douglasii, Дугласа). С. Америка. Лл. плоскіе, тупые, гребенчатые, внизу серебристые. 100—180 ф. Имѣетъ нѣсколько разновидностей. Сип. *Абіесъ Дугласіи* (Abies Douglasii).

**ПОЙДИУМЪ** (Psidium). На греческомъ языкѣ означаетъ гранатъ. С. миртовыхъ. (100). Троп. В. Азія и Америка. Тепл. дрв. или куст. рр. Песков. волоки. глин. дерн. съ листовъ и коровымъ переносомъ. Черенками изъ молодого роста, въ песокъ, въ парникѣ.

**П. Гуава** (P. Guava, Гуава). Вестиндія. Цв. бѣлые, въ июль. Плоды желтые, шаровидные съ пріятнымъ запахомъ. 6—15 ф. Сип. **П. помиферумъ** (P. pomiferum). **П. Каттлейанумъ** (P. Cattleyanum, Каттлейевъ). Бразилія. Цв. бѣлые, въ маѣ. Плоды темно-малиновые, съ мягкимъ, красно-пурпуровымъ мясомъ къ серединѣ бѣлаго цвѣ-



та, сочнымъ, вкусомъ похожимъ на землянику. 10—20 ф.

**ПСИЛОТУМЪ (Psilotum).** *Psilos* — нагой: рр. почти безъ лл. С. плауновыхъ. (2). Тепл. плаунъ. Волоки. торф или на шлѣ Диксоніа анарктика.

**П. тризетрумъ (P. triquetrum)**, трех-сторонній). Стебли дихотомическіе, сжатые, угластые, лл. очень мелкіе, въ видѣ прилистничковъ; споровыя кучки полушаровидныя. 9 д.

**ПСИХОТРИЯ (Psychotria).** *Psyche* — жизнь, по врачевнымъ свойствамъ. С. мареновыхъ. (500). Тропич. страны. Тепл. куст. рр. Уходитъ какъ за Иксора.

**П. цанокюкка (P. canosocosa)**, съ голубыми плодами). Никарагуа. Цв. бѣлые; плоды ярко-голубые, соvrъвающіе зимой; лл. эллиптическіе. **П. жасминифлора (P. jasminiflora)**, съ цв. какъ у Жасмина). Никарагуа. Цв. свѣжно-бѣлые; лл. кожистые, продолговато-овальные.

**ПСИХРОМЕТРЪ.** Снарядъ для опредѣленія влажности воздуха. Гигрометръ. Вагометръ.

**ПСОРАЛЕА (Psoralea).** *Psoraleos* — бородавчатый, по железистымъ точкамъ на р. С. бобовыхъ. (100). Ю. Африка, С. и Ю. Америка, Австралія, Троп. Азія, Европа и С. Африка. Оранж. или выносл. одно-, либо дву- и многол. трав. и кустар. рр. Песков. торф. Кустар. — черенками, въ апрѣлѣ — маѣ, въ пескѣ, травяи. многол. — дѣленіемъ при началѣ роста; однол. — сѣменами.

**П. акулеата (P. aculeata)**, колючая). М. Д. Н. Цв. голубые съ бѣлыми, въ іюнѣ — іюлѣ. 2—3 ф. Оранж. **П. пинната (P. ripinata)**, перистая). Цв. бѣлые, полосатые, въ маѣ до іюля. 3—6 ф. Оранж.

**ПТЕЛЕА (Ptelea).** Древне-греч. названіе Вяза. С. рутовыхъ. (6). Умѣр. С. Америка. Кустар. или низкоросл. выносл. рр. Обыкн. садов. Отводкой.

**П. трифоліата (P. trifoliata)**, трехлистая). **Клекочка.** Цв. зеленовато-желтые, въ маѣ и іюнѣ; лл. на длинныхъ черешкахъ; листочки овальные, острокопечные. 4—8 ф.

**ПТЕРИСЬ (Pteris).** Съ древне-греч. названія, означающаго папоротникъ и производимое отъ *pteron* — перо. С. папоротниковыхъ. (70). По всей земл. поверхности. Тепл., оранж. и выносл.

**П. аргута (P. arguta)**, острозубчатый). Мадера. Ван длиной въ 1—3 ф., шир. 1 или болѣе ф., перистыя, нижнія перья развѣтвленныя. Оранж. **П. асперикаулис (P. aspericaulis)**, съ жесткими черешками). Индія. Ван перистыя, въ 1½ ф. длиною, перья съ серповидными сегментами, на ниж-

ней сторонѣ съ бѣлыми крапинками. Тепл. У разновидности *триколоръ* (tricolor) молодыя ван по срединѣ имѣютъ красную полосу, которая мѣняется съ возрастомъ въ зеленую съ серебристыми мѣтками и красными средними жилками. **П. квадриаурита (P. quadriaurita)**, съ четырьмя ушками). Тропики. Ван длиной отъ 3 д. до 4 ф., шир. въ 4—12 д.; конечное перо съ многочисленными лопастями, боковыя разсѣченные на нѣсколько меньшихъ. Тепл. У разновидности *аргута* (arguta) идетъ вдоль ван бѣлая полоса. **П. крѣтика (P. cretica)**, критскій). Греція. Ван перистыя, въ 6—12 д. длиной и 4—8 д. шир.; перья въ 2—6 паръ. Оранж. **П. лептофилля (P. leptophylla)**, тонколистный). Бразилія. Ван дельтовидныя, длин. и шир. 9—12 д., перистыя; верхнія перья цѣльныя, средняя ланцетовидная, перисторазсѣченная, нижнія — дельтовидныя, перисторазсѣченные. Сип. **Литоброхія лептофилля (Litobrochia leptophylla)**. Тепл. **П. лонгифолія (P. longifolia)**, длиннолистный). Тропики. Ван длиною въ 1—2 ф., шир. 4—9 д., перистыя, продолговато-ланцетовидныя; перья сидячія, до 20 паръ. Тепл. **П. пальмата (P. palmata)**, ланцевидный). Троп. Америка. Ван въ длину и въ ширину 4—9 д., безплодные съ широкою цѣльною серединою и 5 или болѣе трехугольными лопастями; плодососныя развѣтвляющіяся на линейныя лопасти. Сип. **П. колыма, Доридиерисъ пальмата (P. collina, Doryopteris palmata)**. Тепл. **П. патенсъ (P. patens)**, зонтичный). Цейлонъ. Ван въ 3—4 ф. длин., 2 ф. шир.; верхнее перо съ нѣсколькими узкими долями; боковыя перья много, изъ нихъ нижнія развѣтвленныя. Тепл. **П. педата (P. pedata)**, стоповидный). Троп. Америка. Ван въ длину и шир. 1—2 д., съ тупораздѣльными лопастями. Сип. **Доридиерисъ педата (Doryopteris pedata)**. Тепл. **П. сактитифолія (P. sagittifolia)**, съ стрѣловидными листьями). Отъ Венесуелы до Бразиліи. Ван 4—6 д. длин. и 2—3 д. шир., широкія, копьевидно ланцетовидныя. Сип. **Доридиерисъ сактитифолія (Doryopteris sagittifolia)**. Тепл. **П. скаберула (P. scaberula)**, жестковатый). Нов. Зеландія. Ван въ 1—1½ ф. длиной и въ 6—9 д. шириной, овально-ланцетовидныя, трехъ или четырехъ-перистыя. Оранж. **П. серрулята (P. serrulata)**, съ зубчатыми краями). Китай. Ван въ 9—18 д. длиной и въ 6—9 д. шир., широко-овальные, двуперистыя. Оранж. Имѣетъ нѣсколько разновидностей. **П. тремула (P. tremula)**, дрожащій). Австралія и Нов. Зеландія. Ван въ 2—4 ф. длинны и въ 6—12 д. ширины, съ линейными, цѣльными лопастями. Тепл. **П. умброза (P. umbrosa)**, тѣнистый). Австралія. Ван въ 1—2 ф. длиной и въ 6—12 д.

шириной, съ 6—9 боковыми перьями. Оранж.

**ПТЕРОДИСКУСЪ (Pterodiscus).** *Pteron* — крыло и *discus* — дискъ, по широкимъ крыльямъ у диска плода. С. руляковыхъ. (3). Южн. Америка, Ангола. Оранж. трав. рр. съ клубнев. корнями. Песков. глин. дерн. съ лист. Сѣменами весной или осенью, или дѣленіемъ весной.

**П. специоуусъ (P. speciosus)**, отхланный). Ю. Америка. Цв. лиловые или красноватые, въ маѣ. Корни большіе, высушшіеся пѣз земли.

**ПТЕРОКАРІЯ (Pterocarya).** *Pteron* — крыло и *caryon* — орѣхъ; по крылатому плоду. С. орѣшниковыхъ. (4). Умѣр. Азія. Выносл. древ. рр. Сѣменами. Садов. обыкн.

**П. фраксинифолія (P. fraxinifolia)**, съ лл. какъ у ясеня). Кавказъ (по влажнымъ лѣсамъ). Цв. зеленоватые, въ маѣ. Лл. съ 19 листочками, овальными, острокопечными, зубчатыми. 20—40 ф. Сип. **П. каукъзика (P. caucasica)**.

**ПТЕРОКАРПУСЪ (Pterocarpus).** *Pteron* — крыло и *karpos* — плодъ, по крылатому стручку. С. бобовыхъ. (15). Троп. Азія, Африка и Америка. Тепл. древ. рр. Уходитъ какъ за Дальбергія.

**П. драко (P. Draco)**, дракононый). Троп. Америка. Цв. желтые, метелками, въ маѣ. 30 ф.

**ПТЕРОЛОБИУМЪ (Pterolobium).** *Pteron* — крыло и *lobus* — стручекъ; по крылатымъ стручкамъ. С. бобовыхъ. (4). Троп. Азія, Африка и Австралія. Тепл. выощ. кустарни. колючія рр. Уходитъ какъ за Цезальпинія.

**П. индикумъ (P. indicum)**, индійскій). Остиндія. Цв. желтоватые, метелчатые; лл. перистые. Сип. **Цезальпинія ланерансъ (Caesalpinia lacerans)**.

**ПТЕРОНЕВРУМЪ (Pteroneurum).** *Pteron* — крыло и *neuron* — жилка; по крылатымъ послѣдамъ. С. крестоцвѣтныхъ. (2). В. Европа. Многол. травяи. рр. Уходитъ какъ за Кардаминае.

**П. карнозумъ (P. carnosum)**, мясистый). Венгрія. Цв. бѣлые, въ іюнѣ. 3 д.

**ПТЕРОСПЕРМУМЪ (Pterospermum).** *Pteron* — крыло и *sperma* — сѣмя; по крылатымъ сѣменамъ. С. павозниковыхъ. (14). Троп. Азія. Тепл. древ. или куст. рр. Песков. волоки. глин. дерн. съ торф. Черенками изъ полужрѣдой древесины, въ пескѣ, въ парникѣ. Темп. зимой 8—10, лѣтомъ 13—23°.

**П. ацерифоліумъ (P. acerifolium)**, съ лл. какъ у клена). Остиндія. Цв. бѣлые, съ іюля до сентября; лл. косо-сердцевидные, продолговатые. Большое дерево. Можетъ

содержаться и въ оранж. **П. суберифоліумъ (P. suberifolium)**, съ пробковыми лл.). Остиндія. Цв. бѣлые, лл. продолговатые, острокопечные съ сердцевиднымъ основаниемъ. Низкое дерево. Сип. *Pentanetess suberifolia* (Pentapetes suberifolia).

**ПТЕРОСТИЛИСЪ (Pterostylis).** *Pteron* — крыло, *stylis* — столбикъ, по крылатому столбику. С. орхидей. (36). Нов. Зеландія, Нов. Каледонія, Австралія. Оранж. земныя орхидеи съ маленькимъ подземнымъ стеблемъ. Листов. съ пескомъ; дренажный слой на третѣ вышины кома.

**П. Баптизатія (P. Baptistii)**, Баптиста). Австралія. Цв. зеленые съ бѣлыми и коричневыми разводами, зимою. 1 ф.

**ПТИЛОМЕРИСЪ (Ptilomeris).** *Ptilon* — перо и *meris* — часть, по перистымъ палочкамъ нѣк. видовъ. С. сложн. цвѣтныхъ. (3). Калифорнія. Выносл. однол. рр.

**П. коронарія (P. coronaria)**, вѣнчаный). Цв. гол. съ желтыми лучами; обертка чешуйчатая, въ іюнѣ. 1 ф. Воспитывается какъ всякій другой лѣтникъ. Сип. *Хименоксисъ калифорника* (Hymenoxis californica).

**ПТИХОСПЕРМА (Ptychosperma).** *Ptyche* — складка и *sperma* — сѣмя, по бороздчатому сѣмени. С. пальмъ. (12). Троп. Австралія, Нов. Гвиней, о. Тихаго Океана. Тепл. высокая пальма. Волоки. глин. дерн. съ листов. и пескомъ. Сѣменами. Темп. зимой 13—15, лѣтомъ 15—24°.

**П. Зееманія (P. Seemanii)**, Земана). О. Фиджи. Лл. перистые, перья выгнаны зубчатыя. Красивая низкорослая пальма. **П. Коннигаміана (P. Cunninghamiana)**, Коннигамова). Куинслендъ и Нов. Южн. Валлисъ. Лл. перистые, длиной въ 2 до 10 ф., перья ланцетовидныя, узкія. 60 ф. Сип. *Архонтотрофисъ Коннигаміана, Сифортія элеганс (Archontophoenix Cunninghamiana, Seafortia elegans)*.

**ПТИЦЫ.** Говоря вообще, птицы приносятъ большіе пользы, чѣмъ вреда, если защищать отъ нихъ сѣмена и плоды; особенно полезны мелкія птички, — пташки, питающіяся личинками и самими насекомыми.

**ПУАВРЕА (Poivre).** *Puavre* (Poivre), франц. путешественникъ, † 1786. С. млекоцѣдныхъ. Малочисленный родъ, шлѣ соединенный съ Комбрегумъ, съ которымъ сходенъ и по признакамъ и по условіямъ воспитанія.

**П. кокцинеа (P. coccinea)**, шарлаховая). Мадагаскаръ. Цв. шарлаховые, съ іюня до декабря. Сип. *Комбрегумъ пурпуреумъ (Combretum purpureum)*.



**ПУАРЕТІЯ** (Poiretia). *Пуаре* (Poiret), франц. ботаникъ и путешественникъ, † 1785. С. бобовыхъ. (5). Ю. Америка, преим. Бразилія до Мексики. Тепл. многол. травяни. или полукуст. рр. Ухождъ какъ за Пиктегія.

**П. сканденсъ** (P. scandens, лазящая). Каракасъ. Цв. желтые, кистями; стебель цѣпляющийся. Сип. *Turpinia punctata* (Turpinia punctata).

**ПУАТЭА** (Poitea). *Пуато* (Poiteau), авторъ „Flore Parisienne“, 1808—13. С. бобовыхъ. (2). Сант-Доминго и Куба. Тепл. кустарники. Ухождъ какъ за Сабинія.

**П. галегойдесъ** (P. galeoides, похожая на Галегу). О. Доминго. Цв. розово-пурпуровые, въ июль. 1 ф.

**ПУДОВИЗЪ** См. Наливъ бѣлый.

**ПУЕНСИАНА** (Poinciana). *Пуенси* (Poinci), губернаторъ Антильскихъ ос. въ половинѣ XVII ст., покровительствовавшій ботаникѣ. С. бобовыхъ. (3). Жаркія страны В. Африки, Маскаренскіе о. и запад. часть Индіи. Ухождъ какъ за Цезальпинія.

**П. пультхеррима** (P. pulcherrima, очень красивая). Вестиндія. Цв. красно-оранжевые, иногда красные, въ июль. 10 ф. Колочій кустъ. Настоящее названіе *Цезальпинія пультхеррима* (Caesalpinia pulcherrima). **П. регія** (P. regia, королевская). Мадагаскаръ. Цв. яркіе шарлаховые, лѣтомъ. 30—40 ф. Великолѣнное дерево.

**ПУЕРАРИЯ** (Pueraria). *Пуерари* (Puerari)—проф. ботаники въ Копенгагенѣ. С. бобовыхъ. (10). Троп. Азія, Японія. Оранж. полукуст. или трав. выющая рр. Ухождъ какъ за Клиторія.

**П. Вальліхія** (P. Wallichii, Вальлиха). Индія. Цв. красноватые, въ июль. 3 ф. **П. тубероза** (P. tuberosa, клубневая). Индія. Цв. голубоватые, въ июль. 3 ф. Сип. *Хедизарумъ тубероза* (Hedysarum tuberosa). **П. Тунбергiana** (P. Thunbergiana, Тунбергова). Казія. Цв. желтые, лѣтомъ. Высоко выющ. оранж. р. Волокна для тканей, крахмаля изъ корней — для пищи въ Китаѣ и Японіи.

**ПУІЯ** (Puia), Мѣстное чилийское названіе. С. бромеліевыхъ. (10). Чили, Перу. Тепл. или оранж. многол. трав. рр. Глин. дер. съ торф. Отпрысками или съ менами.

**П. Вайтеи** (P. Whytei, Уайта). Чили. Цв. пирамидальной метелкой металлической синей окраски; пыльники ярко-оранжевые, осенью. 3 ф. Оранж. **П. гигагъ** (P. gigas, гигантская). Нов. Гренада. Цв. розовые или бѣлые, колосыми; л. похожие на л. Агавы. 30 ф. До сихъ поръ въ садахъ не цвѣла, и потому настоящее названіе не определено.

**ПУЛЬМОНАРИЯ** (Pulmonaria). *Пульмо*, *пульмонис*—легкія, по пятнамъ на л., напоминающимъ большія легкія. С. бурачниковыхъ. (4). Европа. Выносл. многол. трав. рр. Всякая умѣренно-хорошая. Дѣленіемъ весной.

**П. августифолія** (P. augustifolia, узколистная). Европа. Цвѣты сначала малиновые, потомъ ярко-голубые, весной; л. продолговато-ланцетовидные, покрытые пушистыми волосками. 1 ф. **П. сахарата** (P. saccharata, сахарная). *Медуница*. *Медотжелъ трава*. Европа. Цв. малиновые, въ июль. Л. коренные овальные, острокопечные, обтѣгающіе, стеблевые—сидячіе. 1 ф.

**ПУЛТЕНЕА** (Pultenaea). Д-ръ *Пултенеи* (Pulteney) авторъ ботанич. сочиненій, † 1801. С. бобовыхъ. (75). Австралія. Оранж. куст. рр. Волоки. торф. съ добавленіемъ  $\frac{1}{4}$  части песку. Съмѣнами и черенками изъ макушечныхъ ростовъ почти вызрѣвшихъ. Темп. зимой 4—7, лѣтомъ 13—19°.

**П. вильоза** (P. villosa, косматая). Цв. одиночные, желтые, въ апрѣль. Л. продолговато-линейные, выносу косматые. 1—3 ф. **П. обкордата** (P. obcordata, обратно сердцевидная). Цв. оранжевые, въ апрѣль; л. колчатые по три. 2 ф. **П. розеа** (P. rosea, розовая). Цв. малиновые, головками, въ апрѣль; л. линейные, круглые. 2 ф. **П. стрикта** (P. stricta, прямая). Цв. желтые, маленькими, плотными головками, въ апрѣль до іюля. Л. обратно-линейные. 1—3 ф.

**ПУНИКА** (Punica). У Плинія *Мабитъ руниситъ*—пуническое или картагенское яблоко, или отъ *рунисеус*—красный, по цв. С. плакуновыхъ. (1). Индія. Теплич. или оранж. р. Сильная глин. дерн. Черенками изъ побѣговъ и корней.

**П. гранатумъ** (P. granatum). *Гранатъ*. Цв. красные, съ іюня до сентября; л. ланцетовидные, продолговатые. 15—30 ф. Имѣетъ нѣсколько формъ съ бѣлыми и красными махровыми цв., нуждающимися въ теплич. помѣщеніи.

**ПУПАВКА**. См. Антемисъ.

**ПУПАЛІЯ** (Pupalia). Мѣстное остиндское названіе. С. амарантовыхъ. (3). Троп. Азія и Африка. Тепл. многол. трав. или полукуст. рр. Песков. глин. дерн. Черенками въ песокъ, въ парникъ.

**П. атропурпуреа** (P. atropurpurea, черно-пурпуровая). Тропич. страны. Цв. темно-пурпуровые, въ сентябрь. Л. овальные, острокопечные.  $1\frac{1}{2}$ —2 ф.

**ПУПЛЯТА**. Завязь, молодые плодики огурцовъ.

**ПУПОКЪ**. **ПУПЫШЪ**. **ПУПЫШЕКЪ**. Цвѣточная почка, распуколка. Основаніе внутренней оболочки съмени,

то мѣсто гдѣ ядро съмени соединено съ оболочкой.

**ПЪРШІЯ** (Purshia). *Пуришъ* (Pursh), авторъ Флоры С. Америки. 1817. С. розановыхъ. (1). Полувыносл. куст. р. Песковатая. Черенками изъ молодого роста въ песокъ, въ умѣр. парникъ, лѣтомъ.

**П. тридентата** (P. tridentata, трехзубчатая). С.-З. Америка. Цв. желтые, въ іюль. Л. обратно-клиновидные, трехзубчатые. 2—3 ф.

**ПУСТОЦВѢТЬ**. Цвѣтокъ безъ завязи, тычиночный, недающий плода.

**ПУТИНСКОЕ ЯБЛОКО**. Раннее яблоко, превосходнаго вкуса, цвѣта желтоватаго, средняго размѣра, рѣпообразной формы.

**ПУТОРИЯ** (Putoria) *Путор*—вонь, по сильно пахнущимъ л. С. мареновыхъ. (3). Средиземное побережье. Полувыносл. куст. Хращеватая. Дѣленіемъ.

**П. калѣбрика** (P. calabrica, калабрийская). Цв. красные, въ іюль. 6 д. Сип. *Асперула калѣбрика*; *Эрибеда монтана* (Asperula calabrica, Ernodea montana).

**ПУТТЕРЛИКІЯ** (Putterlickia). *Путтерлики* (Putterlick)—австрійскій ботаникъ, † 1845. С. краснопузырьковыхъ. (2). Ю. Африка. Оранж. колочіе кусты. Ухождъ какъ за Целяструсъ.

**Р. пираканта** (P. rugosantha, съ л. какъ у Пираканта). Цв. зеленые, зимой; л. скученные, овальные. 2 ф. и выше.

**ПУШИЦА**. См. Эриофорумъ.

**ПУШКИНІЯ** (Pushkinia). *Пушкинъ* А. С., русскій знаменитый поэтъ. С. лилейныхъ. (2). Кавказъ, Малая Азія, Афганстанъ. Выносл. и полувыносл. лукович. рр. Песков. глин. дерн. съ листов. Дѣленіемъ, что дѣлать черезъ каждые 2—3 года.

**П. сциллоидесъ** (P. scilloides, похожая на Сциллу). Востокъ. Цв. бѣлые съ блѣдно-голубыми полосками, весной. Л. ланцетовидные, вогнутые. 4—8 д. Сип. *П. либанотика*, *П. сиккула*; *Адамсія сциллоидесъ* (P. libanotica, P. sicula, Adamsia scilloides). У разновидности *компанкта* (compacta) цв. многочисленныя и сидятъ гуще.

**ПФАФФИЯ** (Pfaffia). *Пфаффъ* (Pfaff) проф. химіи въ Килѣ, † 1852. С. амарантовыхъ. (15). Бразилія. Тепл. трав. рр. Ухождъ какъ за Целозія.

**П. гнафалойдесъ** (P. gnaphaloides, похожая на Гнафалумъ). Цв. бѣлые, въ июль. 1 ф. Многол.

**ПЫЛЬНИКЪ**. Часть тычковаго (мужскаго) органа въ цвѣткѣ, содержащая цвѣтень или пылю.

**ПЫЛЬЦЕ**. **ЦВѢТЕНЬ**. Окрашенная

мелкія зернышки, заключающіяся въ пыльникахъ тычинокъ и подъ вліяніемъ которыхъ совершается оплодотвореніе яичекъ въ плодникѣ, послѣдствіемъ чего является производительный зародышъ.

**ПЪТУШКІЙ**. См. Мелампирумъ и Ци-припедіумъ.

**ПЯДА**. **ПЯДЕНЬ**. **ПЯДЬ**. Протяженіе межъ большаго и указательнаго перстовъ, растянутахъ по плоскости.

**ПЯДЕНИЦЫ**. Ночныя бабочки, которыхъ гусеницы ползаютъ какъ бы измѣряя пространство пядями: придерживаясь грудными ногами, онѣ приближаются къ нимъ заднія, причемъ изгибаютъ тѣло дугою.

**ПЯТКА**. Нанливъ на концѣ укореняющагося черенка, мозоль, каллусъ. Верхняя часть корнеплода (редисъ красный съ бѣлой пяткой, у кот. низъ красный, а верхъ бѣлый).

**РАВАТКА**. Опушка; узкая града по бокамъ дорожки; подорожные цвѣтники.

**РАВЕНІЯ** (Ravenea). *Равене* (Ravene) покровитель садоводства. С. пальмъ. (1). Тепл. р., нуждающееся въ такомъ же уходѣ, какъ Арека.

**Р. Хильдебрандтіи** (R. Hildebrandtii, Гильдебрандта). Коморосскіе о. Л. перистые, на длинныхъ черешкахъ; перья ланцетовидныя, острые. 10 ф.

**РАВЕНАЛІЯ** (Ravenala). Мѣстное мадагаскарское названіе. С. инбирныхъ. (2). С. Бразилія, Гвѣана и Мадагаскаръ. Тепл. рр., требующія такого же ухода, какъ Муза.

**Р. гвианѣнзисъ** (R. guianensis, гвианская). Бразилія и Гвѣана. Цв. бѣлые; л. двурядные, продолговато-овальные, такой же длины какъ черешки. 15 ф. **Р. мадагаскаріензисъ** (R. madagascariensis, мадагаскарская). *Дерево путешественниковъ*. Мадагаскаръ. Цв. бѣлые, л. вѣроятъ, на длинныхъ охватывающихъ черешкахъ, очередные. Сип. *Уранія спеніоза* (Urania spenciosa).

**РАВЕНІЯ** (Ravenia). Происхожденіе названія не объяснено. С. рутовыхъ. (2). Куба и Бразилія. Тепл. куст. рр. Песков. торф. съ волоки. глин. дерн. Черенками изъ полузрѣлаго роста въ песокъ, въ парникъ.

**Р. розеа** (R. rosea, розовая). Бразилія. Цв. красно-розовые, лѣтомъ; л. тройчатые. 2 ф. **Р. спектабилисъ** (R. spectabilis, красивая). Куба. Цв. темно-шарлаховые, въ іюль и августъ. Л. тройчатые. 2 ф.



**РАДИСКА** или **РЕДИСКА**. См. Рафанусъ.

**РАЗМНОЖЕНИЕ**. Умножение числа растений; производится прививкою, черенкомъ или глазкомъ, черенками, отводками и листьями, главнымъ же образомъ съемами. Размножение листьями удается со многими рр., преимущественно его применяют къ бегониямъ, геснерамъ, глоксиниямъ и многимъ сочнымъ породамъ. Въ этомъ случаѣ дѣлаются надрѣзы главной и некоторыхъ боковыхъ жилокъ у молодыхъ образовавшихся, но не старыхъ листьевъ, которые потомъ прищипываются или слегка придавливаются къ легкой землѣ. Это дѣлается въ разводочномъ парничкѣ, въ спертую и влажную воздушн. Когда изъ надрѣзовъ и образовавшихся у нихъ наплывовъ появятся корни, растения отдѣляются и сажаются врознь.

**РАЗСАДА**. Посѣянные въ тепломъ помещеніи растенія, которые въ извѣстный срокъ рассаживаютъ на воздухъ.

**РАЗСАДНИКЪ**. Парничокъ или теплая (навозная) гряда, гдѣ сѣять растенія для ранней выгонки и пересадки потомъ въ гряды и клумбы. Рассадники иногда дѣлаются на столбахъ и помостѣ, и покрываются отъ морозовъ.

**РАЗВОДНИКЪ**. Питомникъ для развожденія растений.

**РАЗБРОСЪ**. **РАЗБРОСОМЪ**. Посѣвъ или посадка въ разбросъ, розсыпью, въ разсыпную; *радами въ разбросъ* — въ разсыпъ, чтобы одинъ рядъ приходился противъ промежутковъ другого, въ разбѣжку.

**РАЗВОДИТЬ**. **РАЗВЕСТИ**. Размножать, производить (растения). Заботиться о разсадкѣ и приплодѣ. Отвести врознь, направить въ разныя стороны (разводить сучья, не давая имъ сплетаться).

**РАЗСЪЧЬЕ**. Развѣлье. Раздѣленіе вѣтви на двѣ или болѣе. Въ последнемъ случаѣ — мутовка.

**РАЙЛЬЯРДІЯ** (*Raillardia*). *Райльяръ* (*Raillard*), французскій флотскій офицеръ. С. сложноцвѣтныхъ. (9). Сандвичевы о. Оранж. куст. рр. Уходъ какъ за Сенеціо.

**Р. циліолата** (*R. ciliolata*, съ бахромчатыми лл.). Цв. головки собранныя щиткомъ, желтыя, въ іюль. Лл. кольчатые, ланцетовидные. 2 ф.

**РАКІТНИКЪ ВОЛГСКІЙ**. См. Каляфа.

**РАКЪ**. Болѣзненное состояніе преимущественно плодовыхъ деревьевъ, выражающееся желваками болѣе или менѣе значительнаго размѣра, которые потомъ рас-

трескиваются, а затѣмъ слѣдуетъ омертвѣніе и выгниваніе древесины. Ракъ поражаетъ чаще всего плодовые растенія, преимущественно яблоки и груши. Настоящая причина этого страданія неизвѣстна. Полагаютъ — холодная почва съ сырою подпочвой. Поздняя обрѣзка больныхъ вѣтвей часто производитъ эту болѣзнь, равнымъ образомъ слишкомъ сырая погода и нападеніе насѣкомыхъ тоже вызываютъ ее. Поэтому, въ предупрежденіе рака, должно сажать на хорошо дренированной землѣ, не употреблять слишкомъ сильнаго удобренія, чтобы не вызывать чрезмѣрно-большого развитія, избѣгать перемѣнять землю, только обрѣзывать, способствовать весеннему развитію и осеннему вызрѣванію роста.

**РАМОНДІЯ** (*Ramondia*). *Рамонъ* (*Ramond*) — франц. ботаникъ и путешественникъ, † 1827. С. геснеріевыхъ. (3). Ю. Европа, Сибирь, Греція. Выносл. и полувыносл. трав. рр. Торф. Съемами или дѣленіемъ.

**Р. пиренейка** (*R. pyrenaica*, пиренейская). Пиреней. Цв. пурпуровые, въ маѣ; лл. розеткой, овальные. 3 д. Сип. *Вербаскумъ Микони* (*Verbascum Miconi*).

**РАМНУСЪ** (*Rhamnus*). *Rhamnos* — древне греч. названіе, употребленное Теофрастомъ. С. крушиновыхъ. (60). Тепл., оранж. и выносл. куст., либо дрв. рр. Выносл. — въ обикн. и размножаются съемами, либо отводкой; теплич. и оранж. — въ легкой и черенками въ песокъ; въ парничкѣ.

**Р. алятернусъ** (*R. alaternus*, вѣчно зеленый). Средиземн. побережье. Цв. зеленые, съ апрѣля до іюня; лл. эллиптическіе или ланцетовидные. 20 ф. Имѣетъ нѣсколько разновидностей. Оранж. **Р. катартикусъ** (*R. catharticus*, слабительный). *Крушина*. Европа. Цв. зеленые, въ маѣ до іюля. Лл. овальные, плоды черные. 5—10 ф. **Р. латифолюсъ** (*R. latifolius*, широколистный). Азорскіе о. Цв. зеленоватые, въ іюль; лл. эллиптическіе. 5 ф. Оранж. **Р. макрофиллюсъ** (*R. macrophyllus*, крупнолистный). Китай. Лл. широкіе съ пурпуровыми черешками. Оранж. **Р. франгуля** (*R. frangula*). *Крушина ломкая, пороговая*. Европа. Цв. зеленоватые, въ маѣ—іюнь; лл. овальные, плоды шаровидные, черные.

**РАМЫ**. Стекланные крыши, постоянныя или подвижныя на помѣщеніяхъ съ растеніями; обыкновенно—это такія деревянныя или желѣзныя обвязки со вставленными въ нихъ стеклами, которые или отворяются, приподыманіемъ съ одного конца, или вовсе снимаются.

**РАНУНКУЛОСЪ** (*Ranunculus*). Ла-

тинское названіе, соответствующее лагункѣ, потому что гдѣ находится эти рр. тамъ водятся лагушки. С. лютиковыхъ. (160). Повсемѣстно, но преим. въ холодныхъ поясахъ сѣв. полушарія. Почти всѣ выносл. одно- или многол. травы. Глин. земля, влажное положеніе. Съемами и дѣленіемъ

**Р. азіатикусъ** (*R. asiaticus*, азіатскій). *Ранункулъ*. Левантъ. Цв. различной окраски, въ маѣ—іюнь; лл. тройчатые или двутройчатые; 9 д. Въ культурѣ только съ махровыми цв. Имѣетъ очень много разновидностей и садовыхъ формъ. **Р. аконитифолюсъ** (*R. aconitifolius*, съ лл. какъ у Аконита). Европа. Цв. бѣлые, въ маѣ—іюнь; лл. дланевидно-раздѣльные; до 2 ф. Имѣетъ форму съ махровыми цв. **Р. амплексикаулисъ** (*R. amplexicaulis*, съ лл. обхватывающими стебель). Пиреней и З. Альпы. Цв. бѣлые, иногда махровые, въ маѣ; лл. ланцетовидные, обнимающіе стебель. 3—9 д. **Р. анемоидесъ** (*R. anemoides*, похожій на Анемону). Штирійскія Альпы. Цв. бѣлые съ малиновымъ отблескомъ, лѣтомъ. **Р. граминеусъ** (*R. gramineus*, похожій на злакъ). Ю.-З. Европа. Цв. желтые, съ апрѣля до іюня. Лл. линейно-ланцетовидные. 6—12 д. **Р. кортузифолюсъ** (*R. cortusifolius*, съ лл. какъ у Кортуса). Тенерифъ. Цв. желтые, въ маѣ; лл. корневые, сердцевидно-почковидные, стеблевые—пятираздѣльные. 2 ф. **Р. Лайелія** (*R. Lyellii*, Лайеля). Новая Зеландія. Цв. бѣлые, какъ-бы изъ воску, весной и лѣтомъ; лл. щитовидные. 2—4 ф. Холодно-оранж. **Р. парнасифолюсъ** (*R. parnassifolius*, съ лл. какъ у Парнассія). Альпы и Пиреней. Цв. сѣдно-бѣлые, въ іюнь—іюль; лл. корневые сердцевидные, стеблевые овально-ланцетовидные. 3—6 д.

**РАНДІЯ** (*Randia*). *Рандъ* (*Rand*), — бывшій префектъ ботан. сада въ Чельси, въ Лондонѣ. С. мареновыхъ. (90). Троп. Азія и Африка. Тепл. или оранж. дрв. или куст. рр. Уходъ какъ за Гарденіей.

**Р. макранта** (*R. macrantha*, крупноцвѣтная). Бразилія. Цв. блѣдно-желтые, въ іюнь. 9—30 ф. **Р. макулата** (*R. maculata*, пятнистая). Сьерра-Леоне. Цв. бѣлые, въ апрѣль. Малорослое деревцо.

**РАНУНКУЛЪ**. См. Ранункулоусъ.

**РАПАТОВЫЕ** рр. (*rapateaceae*). Многѣтныя, обычно высокія, болотистыя, одностолбныя травы, съ короткими и толстыми корневищами, встречаемыя въ Бразиліи, Гвианѣ и Венесуелѣ. Видовъ болѣе 12, родовъ 6, въ томъ числѣ Рапатеа, Саксофидерція и Спатаутусъ.

**РАПИДОФИЛЛУМЪ** (*Rhapido-phyllum*). *Rhapis*—Рapisъ и *phylon*—

листь; по сходству съ *Rhapis*, но дающія отпрыски, что необходимо для пальмъ. С. пальмъ. (1). Уходъ какъ за Хамѣропсѣ.

**Р. Хистрикисъ** (*R. Hystrix*, ежевидный). Ю. Соед. Шт. Цв. желтые, мелкіе, въ іюнь—іюль. Лл. складчатые, разрывные, влагалница волокнистыя, со сплетшимися иглами. Стволъ въ 3—4 ф. Сип. *Хамѣропсъ Хистрикисъ* (*Chamaerops Hystrix*).

**РАПИСЪ** (*Rhapis*). *Rhapis*—игла, по узкимъ сегментамъ лл. С. пальмъ. (5). Китай, Японія. Низкорослая оранж. рр. Уходъ какъ за Хамѣропсѣ.

**Р. кохинхинензисъ** (*R. cochinchinensis*, кохинхинскій). Кохинхина. Лл. вѣерообразные, дланевидно-раздѣльные, сегменты тупые, складчатые. 8 ф. **Р. флабеллиформисъ (*R. flabelliformis*, вѣеролистный). Китай и Японія. Лл. 5—7-раздѣльные, сегменты сплошные съ выгнутыми концами. Стволъ въ 1½ ф. съ оставшимися влагалницами. Имѣетъ пестро-форму. Сип. *Р. аспера* (*R. aspera*). **Р. хумилисъ** (*R. humilis*, низкій). Японія. Въ общемъ походитъ на предыдущій, но меньше. Сип. *Р. Сиросикъ* (*R. Sirotsik*).**

**РАПОНТИКУМЪ** (*Rhaponticum*). *Rhâ* — древне-греч. названіе ревеня и *ronticus* — понтийскій. С. сложноцвѣтныхъ. (6). Включенъ въ родъ Пентауриумъ, и воспитывается такъ же. Одно- или многол. трав. рр.

**Р. скаріозумъ** (*R. scariosum*, жесткій). Швейцарія. Цв. головки пурпуровыя, въ іюль. лл. овальные, верхніе—удлиненные, остроконечные. 2½ ф.

**РАСА**. Разновидность, на столько постоянная, что передается вѣрно отъ сѣмянъ; въ болѣе же широкомъ смыслѣ рядъ сродныхъ между собою индивидуумовъ, изъ которыхъ нельзя составить опредѣленнаго вида.

**РАСПАЛІЯ** (*Raspalia*). *Распалъ* (*Raspail*) — знаменитый французскій химикъ, † 1878. С. бруннѣныхъ. (8). Ю. Африка. Оранж. низкіе кустарники. Песков. торф. Черенками изъ молодого роста, въ песокъ, въ холод. парничкѣ.

**Р. микрофилля** (*R. microphylla*, мелколистная). Цв. бѣлые, головками въ горшину, въ іюль. 1 ф. или нѣск. выше.

**РАСТИТЕЛЬНЫЙ**. Относящійся къ растенію. Растительный перегной — состоящій изъ растител. частей, въ отличіе отъ животнаго.

**РАСТЕНЬЕ**. Орудное прозябаемое тѣло, живущее питаніемъ отъ корня. (Сѣмя пускаетъ изъ *пуговки* своей *корневище*, уходящее въ *корешокъ* и *стебелку* со *восточными* листьями, кои, выросши въ *стебель* (а въ деревянистыхъ растеніяхъ



лоску), сушь, впит, пахоты съ лисьями, опадают.

**РАУВОЛЬФИЯ (Rauvolfia).** *Rauvolfia* (Rauvolf) — аусбургский врач, путешествовавший по Палестине и др. восточным странам в 1753—5 гг. С. кустовых. (40) Троп. Америка и Африка, Азия и Ю. Африка. Тел. куст. пр. Глин. дерн. съ торф. и песком. Черенками въ песок, въ парникъ.

**Р. денсифлора** (*R. densiflora*, съ густыми цв.). Остиндія. Цв. бѣлые, лл. ланцетовидные. 6 ф. **Р. серпентина** (*R. serpentina*, змеевикова). Остиндія. Цв. бѣлые или малиновые, въ маѣ; лл. пленчатые, не выше 1 ф.

**РАФАНУСЪ (Raphanus).** Название древне-греческое, употребленное Теофрастомъ. С. крестоцвѣтныхъ. (6) Вынос. однол. или двулѣтн. трав. пр. изъ умѣр. Европы и Азии. Рыхлая глин. дерн. Съ менами на воздухѣ или въ парникѣ.

**Р. каудатусъ** (*R. caudatus*, хвостовый). Ява. Цв. пурпуровые, съ маѣ до августа; стручокъ сжатый длиннѣе растенія, загнутый, употребляемый въ пищу въ сыромъ видѣ. **Р. однол.** **Р. сативусъ** (*R. sativus*, съѣдомый). *Радика*. Умѣр. страны Старого Свѣта. Цв. бѣлые до фіолетовыхъ; лл. лирообразные; корень перетенообразный, овальный, рѣбовидный и пр. Р. двулѣтнее, разводимое на огородахъ, какъ пѣкветная овощъ. Разновидность *радикала* (*radicula*) есть такъ называемая *редиска*, при ранней выгонкѣ прѣтущая и дающая съмена въ тотъ-же годъ.

**РАФИДОФОРА (Raphidophora).** *Rhaphidos* — игла и *phero* — нести; по игловиднымъ волоскамъ. С. ароидеиныхъ. (30). Троп. Азия, Малайск. архипелагъ. Австралія, о. Тихого океана, Африка. Тел. куст. пр. съ длинными вѣтвями. Глин. дерн. съ волокн. торф. по ровну. Съ менами или черенками въ песок, глин. дерн. и торф., въ парникѣ.

**Р. декурсива** (*R. decursiva*, со свѣгающими лл.). Индія. Цв. съ желтоватымъ чехломъ и сѣро-зеленоватымъ початкомъ; лл. неравномерно-перисторазсѣченные. **Р. ланцифолія** (*R. lancifolia*, ланцетолстная). Сильхетъ, Казія. Цв. съ абрикосово-окрашеннымъ чехломъ снаружи съ зелеными пятнами, початокъ бѣлый; лл. ланцетовидные. **Р. пертуза** (*R. pertusa*, продырявленная). Остиндія. Цв. съ чехломъ почти одинаковой длины съ початкомъ; лл. продолговато-эллиптические, продырявленные или перисторазсѣченные.

**РАФИТАМУСЪ (Raphitamnus).** *Raphis* — игла и *thamnus* — кустъ; по колючимъ пр. С. вербеновыхъ. (6). Чили. Оранж. куст. пр. Уходъ какъ за Миртусъ.

**Р. ціанокарпусъ** (*R. cyanocarpus*, синеплодный). Цв. бѣдно-голубые, лѣтомъ; лл. овальные. 15—20 ф.

**РАФИСТЕМА (Rafistemma).** *Raphis* — игла *stemma* — вѣнецъ; по узкимъ сегментамъ вѣнчика. С. ласточкинковыхъ. (2). Остиндія, Малайск. архипелагъ. Тел. куст. или полукуст. пр. Уходъ какъ за Стефанотисъ.

**Р. пульхеллюмъ** (*R. pulchellum*, красивая). Остиндія. Цв. бѣлые, въ іюль. Лл. сердцевидные.

**РАФИОЛЕПИСЪ (Raphiolepis).** *Rhaphis* — игла и *lepis* — чешуйка; по узкимъ, клиновиднымъ прицвѣтникамъ. С. розановыхъ. (5). Китай, Японія, Сандвичевы о. Оранж. куст. или трав. пр. Глин. дерн., съ торф. и пескомъ. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ песокъ, подъ стекломъ.

**Р. индика** (*R. indica*, индѣйскій). Китай. Цв. бѣлые или розовые, съ февраля до августа; лл. ланцетовидные или овальные. 4 ф. Имѣетъ нѣсколько разновидностей. **Р. японика** (*R. japonica*, японскій). Японія. Цв. бѣлые, душистые, въ іюнь. Лл. широко-овальные. Кустар. р.

**РАФИЯ (Raphia).** *Raphis* — игла, по крючку на плодѣ. С. пальмъ. (7). Америка отъ устья Амазонской р. до Никарагуа, Троп. Африка, Мадагаскаръ. Тел. пр. Лл. перисторазсѣченные. Уходъ какъ за Кокошъ.

**Р. винифера** (*R. vinifera*, производящая вино). Сьерра-Леоне. Лл. въ 6—7 ф., перисторазсѣченные, съ колючками. Сред. вышины дерево. **Р. Руффія** (*R. Ruffia*, руффія). Москаренскіе о. Лл. длинной въ 50—60 ф. Высокое дерево. **Р. тедигера** (*R. tedi-gera*, дающая факелы). Амазонская долина. Лл. въ 50 ф. и длиннѣе, выростающие снопомъ въ 40 ф. въ поперечникъ. Стволъ 6—8 ф. вышиной съ остатками лл. влагалитъ.

**РАФИЯ (Rafnia).** *Rafn* (Rafn) — датскій ботаникъ, † 1796. С. бобовыхъ. (22). Ю. Африка. Оранж. куст. или полукуст. пр. Волокн. глин. дерн. съ пескомъ. торф. и съ добавлением дрв. угля и битыхъ черенковъ. Темп. зимой 4—7°.

**Р. ангулата** (*R. angulata*, угловая). Цв. желтые, въ маѣ. Полукуст. въ 1—1½ ф. съ углистыми вѣтвями. Син. **Р. филифолія** (*R. filifolia*). **Р. трифлора** (*R. triflora*, трехцвѣтковая). Цв. желтые, въ іюнь; вѣтви двугранные. Кустъ въ 2—3 ф.

**РАХМАНКА.** См. Духовая груша.

**РАЩЕНОЕ СЪМЯ.** Пустившее въ мочкѣ ростокъ.

**РЕВЕНЬ.** См. Реумъ.

**РЕВЕЗИЯ.** См. Ривесія.

**РЕГЕЛИЯ (Regelia).** Э. Л. Регель (Regel) — директоръ Императорскаго Спб. ботан. сада. С. миртовыхъ. (3). Зап. Австралія. Оранж. куст. Уходъ какъ за Бофортія.

**Р. циліата** (*R. ciliata*, бахромчатая). Цв. красные, маленькіе, шаровидными головками. 3—5 ф.

**РЕЗЕДА (Reseda).** Старинное латинское названіе, употребленное Плиніемъ и происходящее отъ *resedo* — успокоиваю, утѣляю. С. резедовыхъ. (26). Одно-, дву- или многол. трав. пр. Глин. дер. съ пескомъ. Съ менами.

**Р. одората** (*R. odorata*, душистая). С. Африка. Цв. желтоватые съ бѣлыми лепестками и красно-оранжевыми пылинками, съ іюня до октября. Свѣтъ на мѣсто или высаживать съ комомъ. Имѣетъ нѣсколько разновидностей.

**РЕЗЕДОВЫЯ пр. (resedaceae).** Сем. однолѣтнихъ или многолѣтнихъ травянистыхъ, рѣдко кустарныхъ породъ, встречаемыхъ преимущественно въ Южн. Европѣ, Сѣв. Африкѣ, Сириі, Малой Азии и Персін. Видовъ болѣе 30, родовъ 6, изъ которыхъ главнѣйшій Резеда.

**РЕЗЕРВЪ.** Запасъ. Скопленный на будущее употребленіе матеріалъ, преимуществ. земля и навозъ.

**РЕЙНВАРДТИЯ (Reinwardtia).** *Reinwardtia* (Reinwardt) — бывший директоръ бот. сада въ Лейденѣ, † 1822. С. леоповыхъ. (3). Горы Остиндіи. Оранж. куст. или полукуст. пр. Глин. дерн. съ листовой. Черенками, въ песокъ, въ парникѣ.

**Р. тригунумъ** (*R. trigynum*, съ тремя пестиками). Цв. желтые, одиночные или расположенные зонтикомъ, въ октябрь. 2—3 ф.

**РЕЙНЕКЕА (Reineckea).** *Reinecke* (Reinecke) — нѣмец. садоводъ. С. лилейныхъ. (1). Китай, Японія. Оранж. многол. трав. р., неприхотливое на землю и размножаемое дѣленіемъ.

**Р. карнеа** (*R. carnea*, тѣлеснаго цвѣта). Цв. тѣлесные, хорошо пахнущіе, въ апрѣль. Корневище далеко ползучее. Син. *Сансевиѣра карнеа*, *С. сессилифлора* (*Sansevieria carnea*, *S. sessiliflora*).

**РЕКСИЯ (Rhexia).** *Rhexis* — разрыть, С. черноустовыхъ. (7). Троп. вост. часть С. Америки. Оранж. или ползучий. многол. или полукуст. пр. Уходъ какъ за Плерома.

**Р. виргиника** (*R. virginica*, виргинская). Цв. ярко-пурпуровые, полузонтиками, въ іюль—августъ. 6—12 д. **Р. циліоза** (*R. ciliosa*, рѣсичная). Цв. пурпуровые, съ іюля до августа. 1—1½ ф.

**РЕЛЬХАНІЯ (Relhania).** Англич. пасторъ *Рельханъ* (Relhan) напечаталъ въ 1875 г. *Flora santabrigensis*. С. сложнотвѣтныхъ. (18). Юж. Африка. Оранж. или однол. трав. пр. Уходъ какъ за Атанасія.

**Р. пунгенсъ** (*R. pungens*, колючая). Цв. головки желтыя, въ сентябрѣ. Слабый, сильно вѣтвистый кустъ.

**РЕМАННІЯ (Rehmannia).** *Rehmann* (Rehmann) — врачъ въ Спб., † 1831. С. поричниковыхъ. (2). Китай, Японія. Оранж. или ползучий. многол. трав. пр. Глин. дерн. съ пескомъ. Черенками.

**Р. глютиноза** (*R. glutinosa*, слизистая). С. Китай. Цв. грязно-пурпуровые, въ апрѣль. Лл. остроконечные. 1—2 ф. Оранж.

**РЕМЕРІЯ (Roemeria).** *Reimer* (Roemer), — ботаникъ въ Лейденѣ, † 1819. С. маковыхъ. (2). З. Европа. Однол. Съ менами въ обыкн. садовой.

**Р. гибрида** (*R. hybrida*, гибридная). Цв. пурпурово-фіолетовые съ чернымъ низу пятномъ, въ маѣ и іюнь. 2 ф. Син. *Р. рефракта* (*R. refracta*).

**РЕМНЕЦВѢТНИКОВЫЯ пр. (Ranunculaceae).** Семейство кустарныхъ пр. съ неопавшими на зиму листомъ, живущихъ паразитами на двусѣменодольныхъ породахъ. Насчитываютъ до 13 родовъ и 500 видовъ; къ первымъ относятся: Вискумъ и Ларантусъ.

**РЕМУЗАТІЯ (Remusatia).** *Remusat* (Abel Remusat) — знаменитый врачъ и ориенталистъ, † 1832. С. ароидеиныхъ (4). Остиндія и Ява. Тел. клубневый трав. пр. Уходъ какъ за Каладіумъ.

**Р. вивіара** (*R. vivipara*, живородящая). Остиндія. Л. щитовидно-сердцевидные, остроконечные.

**РЕНАНТЕРА (Renanthera).** *Ren-* почка и *anthera*, по почковидной формѣ пыльниковъ. С. орхидей. (7). Троп. Азия, Малайск. архипелагъ. Тел. эпифитъ. Торф. мохъ съ черенками.

**Р. Лоуи** (*R. Lowii*, Лоуа). Борнео. Цв. на томъ же колосѣ двойные: нижніе желтые съ малиновыми пятнышками, верхніе бѣдно-зеленые съ красно-бурыми пятнами. Син. *Арахнанте Лоуи* (*Arachnanthe Lowii*).

**РЕНЕАЛЬМІЯ (Renealmia).** *Renealmia* (Renealmie) — франц. ботаникъ, написавшій въ 1611 г. *"Histoire des Plantes"*. С. иббирныхъ. (14). Троп. Америка и троп. запад. Африка. Тел. трав. многол. пр. Уходъ какъ за Алыниія.

**Р. экзальтата** (*R. exaltata*, удлиненная). Вестиндія. Цв. шарлаховые, въ іюль; плоды черно-фіолетовые съ ароматическими съ менами. 2—3 ф.

**РЕО (Rhoeo).** Происхожденіе назва-



ния не объяснено. С. коммелиновых. (1). Тепл. многол. трав. р. Уходъ какъ за Традесканція.

**Р. дискolorъ** (*R. discolor*, отчасти окрашенный). Центральная Америка. Цв. голубые или пурпуровые, въ июль. Стебель очень низкій, или его вовсе нѣтъ.

**РЕОМЮРИЯ** (*Reaumuria*). *Реомюръ* (*René A. Ferchault de Réaumur*) — знаменитый франц. энтомологъ, † 1757. С. тама-ридовыхъ. (10). Центр. Азія, Средиземн. побережье, Оранж, или полувыносл. куст. рр. Глин. дерн. съ торф. Черенками изъ молодого роста въ холоди. парникѣ, въ той же смѣси земель.

**Р. хиперикойдесъ** (*R. hypericoides*, похожая на Хиперикумъ). Сирія. Цв. пурпуровые, въ августъ; дл. линейные, кожистые. 2 ф.

**РЕПЕЙНИКЪ ПАХУЧІЙ**. См. Аг-римонія.

**РЕСТРЕПІЯ** (*Rastrepia*). *Рестрепъ* (*Restrep*) — путешественникъ по юж. Америкѣ. С. орхидей. (20). Троп. Америка отъ Бразиліи до Мексики. Тепл. орхидей съ ползучими вѣтвями. Уходъ какъ за Плевроталисъ.

**Р. антеннифера** (*R. antennifera*, \* съ усиками). Венецуела. Цв. желтые съ красными или пурпуровыми крапинками, губа съ придатками внизу. Син. *Р. макулята* (*R. maculata*). *Р. прорѣсненъ* (*R. prorepens*, ползучая впередъ). Коста-Рика. Цв. желтые. *Р. элегансъ* (*R. elegans*, изящная). Каракасъ. Цв. желтые съ пурпуровыми пятнами.

**РЕТИНИФИЛІУМЪ** (*Retiniphyllum*). *Ретина* — смола и *phyllon* — листъ; дл. покрыты смолистыя слоемъ. С. мареновыхъ. (6). С. Бразилія и Гвиана. Тепл. куст. рр. Уходъ какъ за Хамильтономъ.

**Р. секундифлорумъ** (*R. secundiflorum*, съ боковыми цв.). Цв. бѣлые, въ июль. 4 ф.

**РѢУМЪ** (*Rheum*). *Рхеон* — прилагательное изъ *rha*, древне-греч. названіе ревеня. С. гречинныхъ. (20). Монголія, в. Азія, Гималаи. Многол. трав. рр. съ мясистыми корневищемъ, доставляющимъ лекарств. ревенъ. Сильная, глубокая глина. дерн. съ торф. Сѣменами и дѣленіемъ.

**Р. аустрали** (*R. australe*, южный). Непаль. Цв. длинной метелкой съ пурпур. чашечками; дл. почти круглые, сердцевидные. 6—10 ф. *Р. нobile* (*R. nobile*, благородный). Сиккимъ. Цв. зеленые, незначительные; дл. корневые большіе съ красными черенками и жилками. 3 ф. *Р. официнале* (*R. officinale*, аптечный ревенъ). Тибетъ. Цв. зеленоватые, мелкіе, колосьями; дл. большіе округло-почковидные, пятинервные. 8—10 ф. *Р. пальматумъ* (*R. palma-*

*tum*, дланевидный). Монголія, Тибетъ. Лл. сердцевидно-округлые, лопастные. 5 ф. Разновидности *thunbergicum*, по изслѣдованіямъ покойнаго Пржевальскаго, даетъ настоящій китайскій ревенъ.

**РЕЦЛІЯ** (*Roezlia*). *Рецль* (*Roezl*) — извѣстный путешественникъ и коллекторъ. С. черноустовыхъ. (1). Тепл. куст. р., нуждающееся въ такомъ же уходѣ, какъ Монохѣтумъ.

**Р. гранадензисъ** (*R. granadensis*, новогренадская). Новая Гренада. Цв. карминово-пурпуровые, осенью. 3 ф.

**РИБЕСЪ** (*Ribes*). Названіе арабское ревеня. С. кампеломковыхъ. (56). Европа, умѣр. Азія и Америка, Анды юж. Америки. Выносл. кустарн. рр. на землю не прихотливые. Черенками, отводками и сѣменами.

**Р. ауреумъ** (*R. aureum*, золотистый). С.-З. Америка. Цв. золотисто-желтые въ апрѣль — май; дл. трехлопастные; плоды желтые, рѣдко черные, прекраснаго вкуса. 6—8 ф. Имѣетъ нѣсколько разновидностей. *Р. грациле* (*R. gracile*, тонковѣтвочная). С. Америка. Цв. бѣлые; дл. округлые; плоды темно-пурпуровые. 4—5 ф. Син. *Р. нивеумъ* (*R. niveum*). *Р. Гроссулярія* (*R. Grossularia*). *Крыжовникъ*. Европа. Цв. зеленоватые; дл. округлы, 3—5 лопастные; плоды овальные, мохнаты или гладкіе. Имѣетъ много садовыхъ разновидностей. *Р. ляскустре* (*R. lacustre*, болотный). С. Америка, въ холодныхъ лѣсахъ и по влажнымъ мѣстамъ. Цв. зеленовато-желтые; дл. сердцевидные; плоды колючие, мелкіе, неспрѣтлаго вкуса. 4 ф. *Р. нигрумъ* (*R. nigrum*). *Смородина черная*. Европа. Цв. зеленые; дл. 3—5 лопастные; плоды черные, красные или бѣлые, кислые. 4 ф. Имѣетъ нѣсколько разновидностей и формъ. *Р. сангвинеумъ* (*R. sanguineum*, кроваво-красная). С.-З. Америка. Цв. темно-розовые; дл. сердцевидные, иногда 5-лопастные съ пушкомъ на нижней сторонѣ, плоды пурпуровые. 4—8 ф. Имѣетъ нѣсколько разновидностей. *Р. спеціозумъ* (*R. speciosum*, особенный). Калифорнія. Цв. темно-красные, дл. съ клиновидными основаніемъ, съ наклонною къ образованію 3-лопастныхъ; плоды красные. 3—4 ф., въ культурѣ гораздо выше. *Р. флоридумъ* (*R. floridum*, цвѣточная). С. Америка. Цв. бѣловатые, крупныя; дл. сердцевидные, о 3—5 лопастяхъ; плоды черные, вкусомъ и запахомъ похожіе на черную смородину. 4 ф. Син. *Р. миссуріензе*, *Р. пеннсилванікумъ* (*R. missouriense*, *R. pennsylvanicum*).

**РИВЕА** (*Rivea*). *Отость де-ля Ривъ* (*De la Rive*) — жевевскій филологъ. С. вьюнковыхъ. (2). Остиндія. Тепл. вьющ. рр. Уходъ какъ за Ипомея.

**Р. хипократериформисъ** (*R. hypocrateriformis*, блюдчатая). З. Индія. Цв. чисто-бѣлые, въ июль. Лл. округло-сердцевидные. Считается самымъ лучшимъ изъ вьюнковыхъ рр.

**РИВИНА** (*Rivina*). *Ривинусъ* (*Rivinus*), — проф. ботаники и медицины въ Лейпцигѣ, † 1722. С. лаконосовыхъ. (2). Троп. Америка. Тепл. многол. трав. рр. Песков. сильная глина. дерн. Сѣменами или черенками, въ парникѣ.

**Р. левисъ** (*R. laevis*, гладкая). Вестиндія. Цв. розоватые, съ февраля до сентяб-ря. 7—8 ф. *Р. хумилис* (*R. humilis*, низкая). Карибскіе о. Цв. розоватые, съ января до сентября. 1—2 ф.

**РИВЕСІЯ** (*Reevesia*). Джонъ *Ривесъ* (*Reeves*) — ревностный ботаникъ въ Кантонѣ. С. навозниковыхъ. (2). Тропич. В. Азія. Оранж. древ. рр. Уходъ какъ за оранж. видами Стеркулія.

**Р. тирсоидеа** (*R. thyrsoidea*, съ расположеніемъ цв. тирсомъ). Китай. Цв. бѣлые, въ июль. 3—4 ф.

**РИГИДЕЛІЯ** (*Rigidella*). Уменьшительное *rigidus* — жесткій; по твердымъ плодovýmъ почкамъ. С. косатиковыхъ. (3). Мексика и Центр. Америка. Оранж. луковичн. рр. Уходъ какъ за Тригидія.

**Р. фламмеа** (*R. flammea*, огненно-красная). Мексика. Цв. ярко-красные съ темно-пурпуровыми полосками, въ май. 3—5 ф.

**РИГОЛЕНЬЕ** или **РІОЛЕНЬЕ**. См. Копанье.

**РИЖСКОЕ ЯВЛОКО**. Ранній сквозной сортъ рѣпообразной формы, средняго размѣра, зеленоватого цвѣта съ румянцемъ, хорошаго вкуса.

**РИКОТІЯ** (*Ricotia*). *Рикотъ* (*Ricot*) — малозвѣстный ботаникъ. С. крестоцвѣтныхъ. (4). С. Африка, Сирія и Малай Азія. Выносл. однол. трав. рр. Песковатая. Сѣменами.

**Р. лунарія** (*R. lunaria*, съ полудунными плодами). Сирія, Египетъ. Цв. лиловые, въ июль — июль. 9 д.

**РИНАКАНТУСЪ** (*Rhinacanthus*). *Rhis*, *rhinos* — носъ и *Acanthus*, по вѣтви, похожую на цв. Акантуса. С. акантовыхъ. (4). Троп. и Южн. Африка, Мадагаскаръ, Остиндія, Малайскій архип. Тепл. куст. рр. Уходъ какъ за Юстиція. *Р. коммунисъ* (*R. communis*, обыкновенный). Остиндія. Цв. бѣлые, въ июль. Лл. продолговатые. 2 ф.

**РИНАНТУСЪ** (*Rhinanthus*). *Rhis*, *rhinos* — носъ и *anthos* — цв., по очертанію вѣтви. С. норичниковыхъ. (3). Европа, умѣр. Азія и Сѣв. Америка. Выносл. однол. Песков. глин. дерн. Сѣменами. Рр.

эти — полупаразиты на корняхъ злаковъ и любятъ влажное положеніе.

**Р. криста-галли** (*R. Crista-galli*, — пѣтушия гребешокъ). *Зеоненъ*. Европа. Цв. желтые съ синю верхнею губой, въ июль — июль; дл. ланцетовидные, округло-зубчатые. 6—18 д. *Р. майоръ* (*R. major*, большій). *Потрелокъ*. Европа. Цв. оранжевые, позднимъ лѣтомъ; дл. глубоко-зубчатые. 6—18 д.

**РИНХАНТЕРА** (*Rhynchanthera*). *Rhynchos* — клювъ и *anthera* — пыльникъ; С. черноустовыхъ. (24). Бразилія, Гвиана, Новая Гренада, Перу. Одно- или многол. тепл. рр. Песков. сильная торф. и волокн. глина. дерн. Черенками въ песков. глин. дерн., въ парникѣ.

**Р. грандифлора** (*R. grandiflora*, крупноцвѣтная). С. Бразилія. Цв. пурпуровые съ пурпуровою чашечкой, осенью. 6 ф.

**РИНХОГЛОССУМЪ** (*Rhynchoglossum*). *Rhynchos* — клювъ и *glossa* — языкъ; нижняя губа въ видѣ клювообразнаго язычка. С. геснеріиныхъ. (2). Остиндія и Малайскій архипелагъ. Тепл. трав. рр. Уходъ какъ за Клозія.

**Р. цейланікумъ** (*R. zeulanicum*, цейлонскій). Цейлонъ. Цв. голубые, въ июль. 1 ф.

**РИНХОЗИЯ** (*Rhynchosia*). *Rhynchos* — клювъ; по ладѣ. С. бобовыхъ. (75). Жаркія страны. Тепл. и оранж. трав. или куст. рр. не особенно изящныя. Песков. легкая. Сѣменами.

**Р. фазелойдесъ** (*R. phaseloides*, похожая на Фасоль). Вестиндія. Цв. съ пестрыми пурпуровымъ флагомъ, въ июль — июль. Тепл.

**РИНХОСТИЛИСЪ** (*Rhynchosy- lis*). *Rhynchos* — клювъ, носокъ и *stylos* — колонна, столбикъ. С. орхидей. (3). Остиндія, Малайскій архипелагъ. Тепл. эпифиты. Уходъ какъ за Сакколябіумъ.

**Р. ретюза** (*R. retusa*, вызубренный). Остиндія. Цв. бѣлые съ фиолетовыми черточками. Син. *Сакколябіумъ Блумей* (*Saccolabium Blumei*).

**РИНХОТЕХУМЪ** (*Rhynchosy- chum*). Названіе не объяснено. С. геснеріиныхъ. (6). Остиндія и Малайскій архипелагъ. Тепл. полукуст. рр. Уходъ какъ за Геснера.

**Р. эллиптикумъ** (*R. ellipticum*, эллиптический). Ассамъ и Сиккимъ. Цв. темно-розовые, лѣтомъ. 2—3 ф.

**РИПОГОНУМЪ** (*Rhipogonum*). *Rhips* — жердь и *goni* — колѣно, по составчатому черенку. С. ллейныхъ. (5). Нов. Зеландія, Австралія. Оранж. высоко-выщ. куст. рр. Уходъ какъ за Мирсифиллюмъ.

**Р. альбумъ** (*R. album*, бѣлый). Австралія. Цв. бѣлые, въ июль — июль; дл. элли-



тические; плоды — съѣдѣ красные, сухие черные.

**РИПСАЛИСЬ (Rhipsalis).** *Rhyps* — иловая вѣтка, по гибкости вѣтвей. С. кактусовыхъ. (30). Троп. Америка, о. Маврикія и о. Цейлонъ. Оранж. сочныя рр. Песков. глин. дерн. съ листов. и толчеными черенками. Черенками въ хрящев. пескѣ, по обсушкѣ. Темп. зимой 4—10, лѣтомъ 13—24°.

**Р. Кассита (R. Cassytha, Кассита).** Тропики. Цв. зеленоватые, въ сентябрѣ. 1 ф. **Р. саликорнойдесъ (R. salicornioides)**, похожій на Саликорнію. Бразилія. Цв. желтые, весной. **Р. Хульлеттіи (R. Houletti, Хульлета).** Бразилія. Цв. бѣлые, въ апрѣлѣ.

**РИТЧІЯ (Ritchiea).** *Ritchiea* (Ritchie) — англичанинъ убитый въ 1819 г. при изслѣдованіи въ центр. Африкѣ. С. капарсовыхъ. (3). Троп. Африка. Тепл. куст. рр. Уходъ какъ за Эваденіа.

**Р. фрагрансъ (R. fragrans, душистая).** Цв. блѣдно-желтые, въ іюнѣ. 3 ф. Син. **Р. полипеталя (R. polypetala).**

**РИССОПТЕРИСЬ (Rissopteris).** *Rysson* — морщинистый и *pteron* — крыло, по крылу у плода. С. мальпигійныхъ. (6). Индѣйскій архипелагъ и Австралія. Тепл. или оранж. куст. рр. Волокн. торф. съ песков. глин. дерновой. Черенками въ пескѣ, въ парникѣ.

**Р. микростема (R. microstema),** съ маленькими пыльниками). Ява. Цв. бѣловатые; пыльники крошечные, въ августѣ. Тепл. р.

**РИТИДОФИЛЛЮМЪ (Rhytidophyllum).** *Rhytis, rhytidus* — морщина и *phyllon* — листъ, по морщинистымъ лл. С. геснерійныхъ. (10). Вестиндія и Колумбія. Тепл. кустар. и низко древесныя рр. Уходъ какъ за Геснера.

**Р. аурикулатумъ (R. auriculatum, ушатый).** Бразилія. Цв. зеленоватые съ красными пятнышками, въ августѣ. 1 ф. **Р. томентозумъ (R. tomentosum, пушистый).** Вестиндія. Цв. зеленоватые съ пурпуровыми разводами, лѣтомъ. 2—3 ф.

**РИТТЕРШПОРЫ.** См. Дельфиниумъ.

**РИХАРДІЯ.** См. Рихардія.

**РИХЕА.** См. Рихеа.

**РИЦИНУСЪ (Ricinus).** *Ricinus* — клещъ, но сходству съмянъ. С. молочайныхъ. (1). Полувыпос. однол. рр. въ жаркихъ странахъ — полукуст. Сильная. Съеменами въ горшкахъ, по одному, въ парникѣ или теплицѣ, весной.

**Р. коммунисъ (R. communis, обыкновенный).** *Клещевина.* Троп. Африка, но распространенъ по тропической области. Цв. зеленые, въ іюлѣ; лл. щитовидные, 7 или

болѣе лопастные; 3—5 ф. Имѣть нѣсколько разновидностей; у разн. *Гибсоніи (Gibsonii)* лл. бронзово-пурпуровые.

**РИШАРДІЯ (Richardia).** *Richardia* (L. C. Richard) — знаменитый французскій ботаникъ. † 1821. С. ароидеиныхъ. (5). Ю. Африка. Оранжер. или полувыпос. многол. трав. рр. съ толстыми корневищами. Глин. дер. пополамъ съ коровинымъ переносомъ. Корневыми отпрысками.

**Р. африкана (R. africana, африканская).** Цв. съ бѣлымъ чехломъ обернутымъ внизу и желтымъ початкомъ, весной; лл. стрѣловидные, остроколючные на длинныхъ черешкахъ. 2 ф. Син. **Р. этиопика, Калла этиопика (R. aethiopica, Calla aethiopica).** У разновидности *албо-макулата (albo-maculata)* лл. съ бѣлыми мѣтками. 2 ф. **Р. меланолеука (R. melanoleuca, черная съ бѣлымъ).** Чехолъ блѣдно-желтый съ черно-пурпуровымъ пятномъ при основаніи, початокъ бѣлый, лѣтомъ; лл. продолговатые, стрѣловидные съ бѣлыми пятнами. 1½ ф.

**РИШЕА (Richea).** *Richea* (Riche) — франц. натуралистъ, † 1791. С. эпакрисовыхъ. (18). Тасманія, Ю.-В. Австралія. Оранж. куст. или низкоросл. рр. Уходъ какъ за Шпренгелия.

**Р. панданифолія (R. pandanifolia, съ лл. какъ у Пандануса).** Цв. мелкіе, бѣлые; лл. волнистые, похожія на лл. Пандануса. 20—30 ф.

**РІАНІЯ или РАЙНІЯ (Ryania).** *Raiant* (Ruan) — англійскій ботаникъ. С. биксовыхъ. (6). Троп. Америка. Тепл. древ. рр. Торф. съ глин. дерн. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ пескѣ, въ парникѣ.

**Р. специоза (R. speciosa, отъѣнная).** Вестиндія. Цв. бѣлые, крупные, въ августѣ. 10 ф.

**РІОКРЕКСІЯ (Riocreuxia).** *Riocreux* (Riocreux) — знаменитый ботаническій рисовальщикъ. С. ласточниковыхъ. (4). Ю. Африка. Оранж. выющая полукуст. рр. Песков. глин. дерн. Черенками, въ пескѣ, въ парникѣ, весной.

**Р. торуллоза (R. torulosa, искривленная).** Цв. блѣдно-желтые, лѣтомъ; лл. сердцевидно-овальные. Корни клубневые.

**РОВИНІЯ (Robinia).** Веспасіанъ Робинъ (Robin) — воспитавшій впервые въ Европѣ бѣлую акацію. С. бобовыхъ. (6). С. Америка, Мексика. Оранж. или выносливые (въ умѣр. климатѣ) древ. или куст. рр. Всякая, не сырая. Отводками, прививкой и съеменами.

**Р. вискоза (R. viscosa, липкая).** С. Америка. Цв. розовые, въ май—іюлѣ. Листочки 11—15. Высота 20—40 ф. **Р. псеудоакація (R. pseudoacacia).** *Ложная или*

*бѣлая акація.* С. Америка. Цв. бѣлые, душистые, въ апрѣлѣ — май. Листочки 9—17 эллиптически. 30—60 ф. Имѣть много разновидностей. **Р. хиспида (R. hispida, щетинистая).** С. Америка. Цв. темно-розовые, въ май—іюлѣ. Листочки 11—18, продолговато-овальныхъ. 3—8 ф.

**РОГУЛЬКИ.** См. Трапа.

**РОГОЖА.** Плетенка изъ мочаль. Высшаго разбора называется цыновкой.

**РОГОЗА.** См. Тифа.

**РОГОВЫЯ.** См. Палочниковыя.

**РОДАМНІЯ (Rhodamnia).** *Rhodamnis* — вѣточка; по величинѣ р. С. миртовыхъ. (12). Вост. и Троп. Австралія, Троп. Азія. Тепл. или оранж. куст. рр. Уходъ какъ за Миртусъ.

**Р. тринервіа (R. trinervia, съ тремя нервами).** Австралія. Цв. бѣлые, въ май; лл. овально-ланцетовидные. Оранж.

**РÓДЕА (Rhoidea).** *Rode* (Rohde) — врачъ и ботаникъ въ Бременѣ. С. лилейныхъ (1). Оранж. многол. р. Уходъ какъ за Рейнекея.

**Р. японика (R. japonica, японская).** Японія. Цв. покровъ бѣлый, мясистый, съ являя по апрѣлѣ. 2 ф.

**РÓДЖЕРСІЯ (Rodgersia).** Адмиралъ с. американскаго флота *Роджерсъ (Rodgers)* — въ экспедиціи подъ его начальствомъ было найдено р. С. камнеломковыхъ. (1). Полувын. многол. трав. р. съ толстымъ корневищемъ. Сильная глин. дерн. съ торф. Дѣленіемъ.

**Р. подофилля (R. podophylla, съ черешковыми лл.).** Японія. Цв. желтоватые, въ іюнѣ—іюлѣ; лл. большіе. 3—4 ф. Син. **Р. японика (R. japonica).**

**РОДИТЕЛЕВА** вишня. Одинъ изъ лучшихъ сортовъ владимірской вишни.

**РОДОДЕНДРОНЪ (Rhododendron).** *Rhodos* — розанъ и *dendron* — дерево. С. вересковыхъ. (100). Горы Европы, Азія, о. Малайскія и С. Америки. Тепл. или оранж. древ. и преимущ. кустар. рр. Торф. съ листов. Съеменами, черенками, отводкой и прививкой.

**Р. Антопогонъ (R. Anthorogon, Антопогонъ).** Центр. и С. Азія. Цв. свѣтло-желтые, въ апрѣлѣ и май; лл. овальные со ржавчиною внизу. 1—1½ ф. **Р. арбореумъ (R. arboreum, древесный).** Гималаи. Цв. бѣлые, розовые или кроваво-красные, густыми головками, въ мартѣ май; лл. большіе, ланцетовидные, кожистые. 20—25 ф. Служить для произведенія лѣтисей, которыхъ образовалъ весьма много. **Р. Аукландіи (R. Aucklandii, Аукланда).** Сиккимъ. Цв. темно-пурпуровые или кроваво-красные, плотными головками, въ май; лл. продолговато-элли-

птические, кожистые. 4—8 ф. **Р. бландфордифлорумъ (R. blandfordianellorum, съ цв. какъ у Бландфордін).** Гималаи. Цв. киповарно-красные; лл. ланцетовидные, кожистые, внизу ржавые. 8 ф. **Р. Вейчялунъ (R. Veitchianum, Вейча).** Австралія. Мульмейнъ. Цв. чисто-бѣлые, въ май; лл. остроколючные, обратно-яйцевидные. 6 ф. **Р. глаукумъ (R. glaucum, сизый).** Сиккимъ. Цв. магново-пурпуровые, въ май; лл. широко-ланцетовидные, внизу сизые. 2 ф. **Р. гранде (R. grande, большой).** Сиккимъ. Цв. бѣлые, зонтиками, въ май до іюля; лл. эллиптически съ ржавыми внизу пятнами 30 ф. **Р. Дальгоузіе (R. Dalhousiae, Дальгоуза).** Сиккимъ. Цв. бѣлые, съ зына хомъ лимона, въ апрѣлѣ—іюлѣ; лл. овальные, пониклые. 6—8 ф. **Р. энфитное.** **Р. калофиллумъ (R. calophyllum, съ красивыми лл.).** Ботанъ. Цв. бѣлые, въ май; лл. эллиптически, темные, глянцевитые. 3 ф. **Р. кампанулятумъ (R. campanulatum, колокольчатый).** Сиккимъ. Цв. свѣтло-лиловые съ пурпуровыми крапичками, въ апрѣлѣ; лл. эллиптически, тупые, сърогато-пориштые внизу. 4 ф. Син. **Р. аргинозумъ (R. argentinum).** **Р. кампилокарпумъ (R. campylocarpum, съ искривленными плодами).** Сиккимъ. Цв. желтоватые съ медовымъ запахомъ, въ іюлѣ; лл. кожистые съ сердцевиднымъ основаніемъ. 6 д. **Р. кауказикумъ (R. caucasicum, кавказскій).** Кавказъ. Цв. снаружи розоватые, внутри бѣлые съ зелеными крапичками въ горлышкѣ. **Р. ланатумъ (R. lanatum, шерстистый).** Сиккимъ. Цв. желтоватые, въ іюнѣ; лл. овально-эллиптически, къ нижней сторонѣ блѣдно-пушистые. Высокій кустъ. **Р. лепидотумъ (R. lepidotum, чешуйчатый).** Сиккимъ. Цв. желтые или пурпуровые, верхнія лопасты съ зелеными крапичками; въ май—іюнѣ. Лл. ланцетовидные съ ржавыми чешуйками. 2—4 ф. **Р. Маддені (R. Maddeni, Маддена).** Сиккимъ. Цв. бѣлые, съ іюня до августа; лл. эллиптически-ланцетовидные. 6—8 ф. **Р. Меттерніхія (R. Metternichii, Меттерниха).** Японія. Цв. розовые, весной; лл. продолговато-яйцевидные, внизу ржаво-пушистые. **Р. Нутталліи (R. Nuttallii, Ноттоля).** Ботанъ. Цв. бѣлые, слегка розоватые, душистые, въ май; лл. большіе, кожистые, овальные, внизу съ темными чешуйками. 12—30 ф. **Р. понтикумъ (R. ponticum, понтийскій).** Малая Азія. Цв. пурпуровые съ крапичками на верхнихъ доляхъ, въ май; лл. продолговато-ланцетовидные, внизу ржавые. 6—12 ф. Съ этимъ р. образовано множество красивыхъ гибридовъ, которые обычно и воспитываются въ садахъ. **Р. Томсона (R. Thomsoni, Томсона).** Сиккимъ. Цв. съ красною чашечкой и кроваво-краснымъ въичкомъ, въ іюнѣ; лл. широкіе, округло-овальные. 6 до 15 ф.



**Р. Фальконери** (*R. Falconeri*, Фальконе-ра). Сиккимъ. Цв. бѣлые, въ маѣ; лл. очень кожистые, внизу съ бѣло-жвѣлымъ пухомъ. 30 ф. Сип. *Р. экзимумъ* (*R. eximium*). *Р. хирсutumъ* (*R. hirsutum*, волосатый). Ю. Европа. Цв. красные или шарлаховые, въ маѣ до июля; лл. эллиптические, съ жесткими рѣсничками, внизу съ ржавыми крапинками. 1—2 ф. Вынос. *Р. Хукера* (*R. Hookeri*, Хукера). Ботангъ. Цв. красные, въ апрѣлѣ; лл. кожистые, продолговато-овальные. 12—14 ф. *Р. цилиатумъ* (*R. ciliatum*, рѣсничатый). Сиккимъ. Цв. бѣдно-пурпуровые, съ краснымъ оттыкомъ, въ маѣ; лл. эллиптические, остроконечные. 2 ф. *Р. циннабаринумъ* (*R. cinnabarinum*, киноварный). Сиккимъ. Цв. красно-коричневые, пониклые, въ апрѣлѣ, маѣ; лл. овальные или ланцетовидные, внизу ржавые. *Р. Эджевортса* (*R. Edgeworthii*, Эдженорса). Сиккимъ. Цв. бѣлые, въ маѣ и июнѣ, душистые; лл. овально-ланцетовидныя съ загнутыми краями. *Р. яваникумъ* (*R. javanicum*, явайскій). Ява. Цв. оранжевые, въ разное время года; лл. продолговато-овальные. 4 ф. *Р. яминифлорумъ* (*R. jasmiflorum*, съ цв. какъ у жасмина). Малакка. Цв. бѣлые, въ маѣ; лл. продолговато-ланцетовидные, на нижней сторонѣ съ чешуйками бурого цвѣта. 4 ф.

**РОДОЛЕЯ** (*Rhodoleia*). *Rhodon* — розанъ и *leios* — гладкій, по цв. похожимъ на розы и по стеблямъ безъ шиповъ. С. двомѣстниковыхъ. (2). Суматра, Гонконгъ. Оранж. или тепл. дрв. пр. въ общемъ напоминающій рододендронъ. Уходъ какъ за Гардени.

**Р. Чемпиона** (*R. Championi*, Чемпиона). Гонконгъ. Цв. розовые, въ февралѣ лл. овально-эллиптические, тупые.

**РОДОМИРТУСЪ** (*Rhodomyrtus*). *Rhodos* — розанъ и *myrtos* — миртъ, по цв. и родству съ Миртомъ. С. миртовыхъ. (5). Троп. Азия, В. Австралия. Тепл. или оранж. куст., либо древесн. пр. Уходъ какъ за Миртусъ.

**Р. томентоза** (*R. tomentosa*, пушистая). Китай. Цв. розовые, въ июлѣ; лл. овальные, 5 ф.

**РОДОРА** (*Rhodora*). *Rhodos* — розанъ, по окраскѣ цв. С. вересковыхъ. (1). С. Америка. Оранж. или полувынос. куст. р.

**Р. канадэнзисъ** (*R. canadensis*, канадская). С. Америка. Цв. розово-пурпуровые, иногда бѣлые. 2—4 ф. Сип. *Рододендронъ родора* (*Rhododendron Rhodora*).

**РОДОСПАТА** (*Rhodospatha*). *Rhodon* — розанъ и *spatha* — чехолъ, по окраскѣ чехла. С. ароидныхъ. (7). Троп. Америка. Тепл. вьющ. пр. Пескв. глин.

дерн. съ торф. Сѣменами или черенками. Атмосфера влажная.

**Р. бланда** (*R. blanda*, пріятная). Бразилія. Чехолъ зеленовато-охристый; лл. удлинено-эллиптические, остроконечные.

**РОДОСТАХИСЪ** (*Rhodostachys*). *Rhodon* — розанъ и *stachys* — колосъ С. бромелиевыхъ. (7). Чили, Колумбія и Гватана. Тепл. трав. пр. Уходъ какъ за Бромелия.

**Р. андина** (*R. andina*, съ Андскихъ горъ). Чилийскія Анды горы. Цв. бѣдно-розовые, лѣтомъ 1 ф. Сип. *Бромелия карнеа*. *В. лонгифолия* (*Bromelia carnea*, *B. longifolia*).

**РОДОТАМНУСЪ** (*Rhodothamnus*). *Rhodos* — розанъ и *thamnus* — вѣточка, по цв. С. вересковыхъ. (1). Оранж. кустъ. Уходъ какъ за Апаля.

**Р. Хамейцестусъ** (*R. Chamaecistus*, Хамейцестусъ). Альпы В. Европы. Цв. малиновые, въ маѣ. Лл. ланцетовидно-эллиптические, рѣсничатые. 6 д. Сип. *Рододендронъ Хамейцестусъ* (*Rhododendron Chamaecistus*).

**РОДОТИПОСЪ** (*Rhodotypos*). *Rhodos* — розанъ и *typos* — типъ, образецъ; по сходству цв. С. розановыхъ. (1). Куст. р. похожее на Керрія и воспитываемое какъ послѣдняя.

**Р. керриодесъ** (*R. kerrioides*, похожій на Керрію). Японія. Цв. бѣлые, въ апрѣлѣ. 15 ф.

**РОДОХИТОНЪ** (*Rhodochiton*). *Rhodo* — красный и *chiton* — хламада, по большой окрашенной чашечкѣ. С. порчниковыхъ. (1). Оранж. трав. р. Уходъ какъ за Маурандія.

**Р. волюбиле** (*R. volubile*, вьющійся). Мексика. Цв. съ красноватой чашечкой и темнымъ, кроваво-краснымъ вѣтникомъ, въ июнѣ. 10 ф.

**РОДРИГЕСІЯ** (*Rodrigesia*). *Родригезъ* (*Rodriguez*) — испанскій врачъ и ботаникъ. С. орхидей. (20). Троп. Америка. Теплич. эпифиты. Волокн. торф. съ волокн. глин. дерн. и пескомъ, съ добавленіемъ дрв. угля. Черенками въ песокъ, въ парникъ. Темп. зимой 8—10, лѣтомъ 13—24°.

**Р. Лееана** (*R. Leeana*, Ли). Отечество неизвестно. Доли бѣлыя, по срединѣ желтыя; лепестки и губа бѣлые съ двумя желтыми полосками. *Р. рефракта* (*R. refracta*, согнутая назадъ). Перу. Цв. желтовато-шарлаховые. *Р. секунда* (*R. secunda*, съ односторонними цв.). Тринидадъ. Цв. темно-розовые. 6 д. *Р. ланцолата*, *Плеуроталлисъ кокцинеа* (*R. lanceolata*, *Pleurothallis coccinea*).

**РОДЯНКА**. См. Седумъ.

**РОДЪ**. Собрание близкихъ, сродныхъ видовъ.

**РОЕЛЪЯ** (*Roella*). *Роелли* (*Roell*) —

проф. анатоміи въ Амстердамѣ. С. колокольчиковыхъ. (11). Ю. Африка. Оранж. полукуст. или трав. пр. Песков. глин. дерн. съ торф. Сѣменами или черенками.

**Р. цилиата** (*R. ciliata*, рѣсничатая). Цв. съ бѣлою нижнею частью и темно-пурпуровымъ ободкомъ, надъ которымъ бѣдно-фиолетовый, а надъ нимъ — бѣлый. 6—12 д.

**РОЖА**. См. Алтея и Штокъ-роза.

**РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЯБЛОКО** или **ГРЕМУШКА**. Поздній, осень крупный сортъ, формою напоминающій лимонъ, т. е. къ обоимъ концамъ острый, кожица желтоватая съ румянцемъ; вкусомъ кислотный съ виннымъ запахомъ.

**РОЖКИ**. См. Цератонія.

**РОЗА** (*Rosa*). Древнелатинское названіе отъ греческаго *rhodon* — розамъ. С. розановыхъ. (250). Умѣр. полоса съ верш. полушарія, простирающаяся до Абиссиніи, Остиндскаго полуо., а въ Америкѣ до Мексики Полувынос. или вынос., либо оранж. цѣпка, обычно колючія, либо пряморослая куст. пр. Глин. дерн. сдобренна коровьимъ навозомъ. Черенками, прививкой, отпрысками, отводкой.

**Р. ацикулярисъ** (*R. acicularis*, остистая). Сѣв. умѣр. поясъ. Цв. бѣдно-розовые, пахучіе, въ июнѣ; плоды оранжевые, обратно-линейные. 8 ф. *Р. альба* (*R. alba*, бѣлая). Садоваго происхожденія. Цв. бѣлые или нѣжно-розовые, въ июнѣ—июлѣ; плоды продолговатые, кроваво-красные. 4—7 ф. *Р. альпина* (*R. alpina*, альпійская). Европа. Цв. малиновые или красно-розовые, въ июнѣ; плоды красно-оранжевые, овальные. 3 ф. Есть нѣсколько разновидностей. *Р. Банксіе* (*R. Banksiae*, леди Банксъ), Китай. Цв. бѣлые, махровые, съ приятнымъ запахомъ, въ июнѣ. Вѣтв. тонкія, цѣпка. 20 ф. *Р. бланда* (*R. blanda*, привлекательная). С. Америка. Цв. розовые, въ маѣ—июнѣ. Плоды шаровидные. 1—3 ф. Сип. *Р. Вудси*, *Р. фраксинифолия* (*R. Woodsii*, *R. fraxinifolia*). *Р. брактѣата* (*R. bracteata*, прицѣтничковая). Китай. Цв. большіе бѣлые съ большими прицѣтничками, въ июлѣ. 2 ф. *Р. дамасцена* (*R. damasceana*, дамасская). Востокъ. Цв. розовые или бѣлые, крупныя, въ июнѣ—июлѣ. Плоды овальные, мясистые. 2—4 ф. *Р. галлика* (*R. gallica*, французская). Европа и З. Азия. Цв. отъ красныхъ до карминныхъ, въ июнѣ—июлѣ. Плоды полушаровидные, кожистые. 2—3 ф. Имѣетъ много разновидностей. *Р. индика* (*R. indica*, китайская, индійская, мѣсячная). Отечество съ точностью неизвестно. Цв. красныя, обычно полумахровыя, во все время года. Плоды шарлаховые, обратнолинейные. 4—20 ф. Очень много разновидностей, изъ нихъ мнѣнныя или *Лауренциана* (*minima*, Lawren-

сеана) имѣетъ очень маленькій цв. и ростъ. *Р. каніна* (*R. canina*). *Шиповникъ*. Европа, Востокъ. Цв. обычно розовые, съ июня до августа. Плоды яйцевидныя или почти шаровидныя. 6—8 ф. Разнообразностей "бесчисленное множество". *Р. лютеа* (*R. lutea*, желтая). Востокъ. Цв. желтые, съ пріятнымъ запахомъ, въ июнѣ. 3 ф. Сип. *Р. Эглантерія* (*R. Eglanteria*). *Р. люцида* (*R. lucida*, ясная). С. Америка. Цв. красныя, съ мая до июля. 1—2 ф. Цв. простыя или махровыя. *Р. мольлисъ помифера* (*R. mollis pomifera*, мягкая съ плодами какъ яблочки). С. Европа. Цв. красныя, плоды грушевидныя, шарлаховые, крупныя, вызрѣвающіе осенью. *Р. мошата* (*R. moschata*, мускусная). Ю. Европа до Индіи. Цв. желтовато-бѣлые, скученныя, въ августѣ. Плоды темно-коричневые. 12 ф. Цѣпка р. Сип. *Р. Брундои* (*R. Brunonii*). *Р. мультифлора* (*R. multiflora*, многоцвѣтная). Китай, Японія. Цв. бѣлые, малиновые или пурпуровые, въ июнѣ; плоды ярко-красные. 12 ф. Имѣетъ нѣсколько разновидностей. *Р. нитида* (*R. nitida*, глянцевитая). С. Америка. Цв. ярко-красныя, въ июнѣ, плоды сплюснутые, ярко-шарлаховые. 2 ф. *Р. рубигиноза* (*R. rubiginosa*, со ржавыми лл.). Европа. Цв. малиновые, въ июнѣ; плоды шаровидныя. 5 ф. Сип. *Р. Эглантерія* (*R. Eglanteria*). *Р. ругоза* (*R. rugosa*, морщинистая). Японія. Цв. крупныя, красныя, въ июнѣ; плоды отъ оранжевыхъ до темно-красныхъ. 4 ф. Сип. *Р. фeroxъ* (*R. ferox*). *Р. семпервиренсъ* (*R. sempervirens*, постоянно зеленая). Ю. Европа, Индія. Цв. бѣлые, пахучіе, многочисленныя, съ июня до августа. Вьющеяся р. *Р. синика* (*R. sinica*, китайская). Китай. Цв. бѣлые, крупныя, въ июнѣ; плоды оранжевые. Сип. *Р. лаовата* (*R. laevigata*). *Р. спинозиссима* (*R. spinosissima*, очень колючая). Европа, С.-В. Азия. Цв. бѣлые или малиновые, въ маѣ и июнѣ. Плоды короткіе. 1—4 ф. Сип. *Р. пимпеллифолия* (*R. pimpinellifolia*). Имѣетъ нѣсколько разновидностей. *Р. хемисферика* (*R. hemispherica*, полушаровидная). Востокъ. Цв. желтые, въ июлѣ; плоды шаровидныя. 3 ф. Сип. *Р. сульфуреа* (*R. sulphurea*). *Р. центифолия* (*R. centifolia*, центифольная). Востокъ. Цв. розово-пурпуровые, душистые, большіе, въ июнѣ—июлѣ. Плоды овальные, довольно мясистые, пахучіе. 3—6 ф. Отъ этого вида произошло весьма много разновидностей и формъ.

**РОЗАНОВЫЯ** pp. (*rosaceae*). Обширное семейство пряморослыхъ или распростертыхъ, иногда вьющихся, цѣпкихъ трав., кустарн. или дрв. пр., широко распространенныхъ по земной поверхности. Это — одно изъ важнѣйшихъ въ садовомъ отношеніи семействъ, заключаю-



шее многи плодовые породы. Число родовъ определяется цифрою 71, а видовъ отъ 100 до 150. Главнѣйшіе роды: Крайгусъ, Потентилля, Пирусъ, Роза, Рубусъ, Спиреа и Хризобалинусъ.

**РОЙЕНА (Roeyna).** *Ванъ Ройенъ* (Van Roeyen) — отецъ и сынъ были профессорами ботаники въ Лейденѣ. С. збеновыхъ. (13). Видъ троп. Африка. Оранж. кустарн или дров. пр. Песков. глин. дерн. Черенками въ песокъ, подъ стекломъ. Темп. 4—7 зимой, 13—19° лѣтомъ. Р. люцида (R. lucida, ясная). Цв. бѣлые; лл. эллиптическіе; плоды красные. 5—12 ф.

**РОЙЛЕЯ (Roylea).** *Ройль* (John Forbes Royle) — профессоръ фармакогнозій въ Лондонѣ и директоръ бот. сада въ Сагармпуру. С. губоцвѣтныхъ. (1). Гималай. Оранжер. кустарники. Всякая легкая песчанистая. Черенками, подъ стекломъ. Зимн. темп. 4—7°.

Р. элегансъ (R. elegans, изящная). Цв. бѣлыми колѣсами, въ июлѣ. 3—5 ф.

**РОКАМБОЛЬ** — лукъ. См. Альиумъ. **РОКСБУРГІЕВЫЯ** пр. (roxburghiaeae). Малочисленное сем. полукуст. пр. изъ тропич. Азии и Австраліи, а также изъ Японіи и Флориды. Видовъ только 8 изъ трехъ родовъ: Кроонія, Стемона и Стихонеуронъ.

**РОМАНЦОВІЯ (Romanzoffia).** Графъ *Румянцовъ* — покровитель наукъ. С. водолистныхъ. (2). В. Азия. Выносн. много. пр. Уходъ какъ за Саксифрага.

Р. ситхензисъ (R. sitchensis, съ Ситхи). Ситха. Цв. бѣлые, въ апрѣлѣ; лл. почковидные. 4 д.

**РОМАШКА ГОЛУБАЯ.** См. Астеръ. Р. дикая. См. Матрикарія. Р. римская. См. Антемисъ.

**РОМНЕЯ (Romneya).** *Ромней Робинсонъ* (Romney Robinson) — астрономъ. С. маковыхъ. (1). Оранж. многол. трав. р. Песков. глин. дерн. Съменами весной.

Р. Коультері (R. Coulteri, Коультера). Калифорнія. Цв. бѣлые, лѣтомъ. 2—4 ф.

**РОМНЕНСКОЕ** или **ПАВЛОВСКОЕ** яблоко. Поздній сортъ продолговатой формы, темно-краснаго цвѣта съ бѣлыми крапинками, превосходнаго кисловатого вкуса.

**РОМУЛІЯ (Romulea).** *Ромуль* (Romulus) — мнѣшескій основатель Рима. С. костяковыхъ. (54). С. Европа, Средиземн. побережье, Ю. и З. Африка. Оранж. луков. пр. Песков. глин. дерн. съ торфяной. Отпрысками.

Р. бульбодіумъ (R. Bulbosodium, Бульбодіумъ). Ю. Европа. Цв. желтые въ нижней и фіолетовые въ верхней части, въ мартѣ. 6 д.

Р. специоза (R. speciosa, отъбная). М. Д. Н. Цв. розовые съ желтыми и фіолетовыми черточками, въ маѣ. 6 д.

**РОПАЛОСТІЛИСЪ (Rhopalostylis).** *Rhopalon* — клубень, шишка, и *stylis* — столбъ, по шишкообразному чехлу. С. пальмъ. (2). Новая Зеландія. Норфолкъ. Оранж. пальмы. Уходъ какъ за Арека.

Р. Бауери (R. Baueri, Баура). Норфолкъ. Лл. перистые, длиною въ 6—9 ф. Стволъ до 20 ф. Р. сапида (R. sapida, вкусный). Лл. перистые, длиною 4—6 ф. Стволъ до 20 ф. Сип. Арека сапида и Кентія сапида (Arecia sapida, Kentia sapida).

**РОНДЕЛІЯ (Rondeletia).** *Ронделе* (Rondelet) — врачъ занимавшійся изученіемъ водорослей и рыбъ, † 1566. С. мареновыхъ. (60). Вестиндія. Троп. Америка, рѣдко въ Гвианѣ и Перу. Теплолюб. куст. или деревн. пр. Глин. дерн. съ торф. и пескомъ. Черенками въ песокъ, въ парникѣ.

Р. амѣна (R. amesena, красивая). Гватемала. Цв. малиновые, въ июлѣ. 4 ф. Сип. Р. верзиколоръ, *Rodrigeria amena* (R. versicolor, Rodrigeria amena). Р. гратиссима (R. gratissima, самая пріятная). Мексика. Цв. малиновые, душистые. Р. кордата (R. cordata, сердцевидная). Гватемала. Цв. малиновые, лѣтомъ. 4 ф. Р. одората (R. odorata, душистая). Куба. Цв. ярко-кишноварные, пахучіе, въ ноябрѣ. 3 ф. Р. Пюрдіи (Purdiei, Пюрдн). Колумбія. Цв. бѣло-желтые, пахучіе, лѣтомъ. 4 ф.

**РОННБЕРГІЯ (Ronnbergia).** *Роннбергъ* (Ronnberg) — директоръ департамента земледѣлія и садоводства въ Бельгін. С. бромелиевыхъ. (1). Тепл. многол. трав. р. Уходъ какъ за Бильбергія.

Р. Морреніана (R. Morreniana, Моррена). Нов. Гренада. Цв. голубые, лл. большіе, продолговатые съ темнозелеными полосками и пятнами.

**РОСИТЬ.** Мочить мелкою струею, пульверизировать.

**РОСКОВА (Roscoeae).** Уил. *Роско* (Roscoe) — знаменитый историкъ и основатель ливерпульскаго бот. сада, † 1831. С. пшеничныхъ. (6). Гималай. Тепл. многол. трав. пр. Легкая глин. дерн. Дѣленіемъ.

Р. пурпуреа (R. purpurea, пурпуровая). Цв. пурпуровые; лл. ланцетовидные. 10 д.

**РОСТИЛО.** Посудина съ землею, мохомъ и др. веществомъ для испытанія сѣмянъ, ихъ всхожести.

**РОСТИТЬ.** Обращивать. Приличнымъ тепломъ и сыростью пробудить жизнь въ сѣмени, заставить его пустить ростокъ, (проябн, прорости). Выраживать. Пло-

дить. Размножать. Испытывать всхожесть сѣмянъ.

**РОСТОКЪ**, — чекъ. Мочка, первый отростокъ, который пускаетъ сѣмя, прозябая или проростая. Ростокъ развивается изъ зародыша, прорывается въ пупокъ и дѣлится на двѣ ланки, — на корешокъ и стебелекъ; показавшійся надъ почвой стебелекъ также называется *росткомъ*.

**РОСТЪ.** Вышина растенія. Возрастаніе. Развитие вслѣдствіе усвоенія пищи.

**РОСЯНКА.** См. Дрозера.

**РОСЯНКОВЫЯ** пр. (droseraceae). Многолѣтнія или однолѣтнія травянистыя, рѣдко полу-кустарныя пр. Большинство растетъ въ болотахъ. Въ сем. этомъ 6 родовъ и свыше 100 видовъ, сродныхъ съ камеломковыми. Примѣрами родовъ служатъ Дюнеа, Дрозера и Дрозофиллюмъ.

**РОУПАЛІЯ (Roupala).** Называется также *Ropala* (Rhopala, Ropala) и *Rupala* (Rupala). Мѣстное названіе въ Гвинѣ. С. протейныхъ. (30). Троп. Америка. Тепл. деревн. пр. Торф. съ глин. дерн. Черенками въ песокъ, въ парникѣ. Темп. зимой 6—8, лѣтомъ — защищенное помѣщеніе.

Р. Поліи (R. Pohlii, Поли). Мншасъ-Хераесъ. Цв. красно-оранжевые, лл. жесткіе, перисторазсѣченные, на нижней сторонѣ пушистые. 6—20 ф. Сип. Р. корковадензисъ (R. corcovadensis). Р. хетерофилля (R. heterophylla, разнолистная). Бразилія. Цв. угловатыя кистями; лл. тупозубчатые, съ приподнятыми на обвѣхъ сторонахъ жилками.

**РОУПЕЛЛІЯ (Roupellia).** *Роупелль* (Roupell) — покровительствовавшій ботаникъ. С. кутровыхъ. Африка. Тепл. или оранж. куст. пр. Волокн. глин. дерн. съ торф. Черенками изъ молодого роста, въ песокъ, въ парникѣ.

Р. грата (R. grata, съ пріятнымъ запахомъ). Сьерра-Леоне. Цв. бѣлые, въ маѣ. Лл. продолговато-эллиптическіе съ красными черенками.

**РОХЕА.** См. Рошеа.

**РОШЕА (Rochea).** *Де ля Рошъ* (De la Roche) — французскій ботаникъ. С. толстяковыхъ. (4). Ю. Африка. Оранж. куст. сочныя пр. Уходъ какъ за Кассуля.

Р. одоратиссима (R. odoratissima, чрезвычайно душистая). Цв. бѣдно-желтые, или бѣлые, въ июлѣ. Лл. шпоровидные. 1—1½ ф. Сип. *Крассула одоратиссима* (Crassula odoratissima).

**РОШЕРІЯ (Roscheria).** Происхожденіе названія не объяснено. С. пальмъ. (1). Тепл. пальма, дающая воздушные корни. Уходъ какъ за Фениксъ.

Р. меланохетесъ (R. melanochaetes,

съ черными иглами). Сейшельскіе о. Лл. перистые, влагалища ихъ съ черными иглами; стволъ 15—25 ф. съ иглами подъ каждымъ л. Сип. *Верскаффелтія меланохетесъ* (Verschaffeltia melanochaetes).

**РУВЕЦЪ.** См. Клеовское яблоко.

**РУБУСЪ (Rubus).** Древнелатинское названіе, происходящее вѣроятно отъ *ruber* — красный, по плодамъ. С. розоцвѣтныхъ. (100). Широкое распространеніе по земной поверхности. Тепл., оранж. или выносн. полукуст. травы или прямо-рослыя, иногда колючія кустарн. пр. Садовая хорошая. Съменами, отводкой, дѣленіемъ.

Р. аустралисъ (R. australis, южный). Нов. Зеландія. Цв. малиновые или бѣловатые, пахучіе, рано весной; цѣнное оранж. Р. бифлорусъ (R. biflorus, двухцвѣточный). Гималай. Цв. бѣлые, въ маѣ; плоды золотисто-желтые. Р. делиціозусъ (R. deliciosus, превосходный). С. Америка. Цв. пурпуровые, въ маѣ, плоды крупныя, превосходнаго вкуса. 3 ф. Р. идѣусъ (R. idaeus). Малина. Европа. Цв. бѣлые, пониклые, съ іюня до августа; плоды красные или желтые. 3—5 ф. Имѣетъ нѣсколько садовыхъ разновидностей. Р. лациниатусъ (R. laciniatus, лоскутной). Цв. бѣлые или розоватые, съ іюня до сентябрю. Лл. разсѣченные. Р. одоратусъ (R. odoratus, душистый). С. Америка. Цв. розово-пурпуровые, въ августѣ; лл. 3—5 лопастные; плоды красные плоскіе. 3—5 ф. Р. спектабилисъ (R. spectabilis, красивый). С. Америка. Цв. ярко-красные, очень большіе, въ маѣ; плоды крупныя, красныя, овальные, по вкусу хуже чѣмъ у малины; лл. перисторазсѣченные. 6—10 ф. Р. фрутикозусъ (R. fruticosus). Ежевика. Европа. Цв. бѣлые или малиновые, съ іюля до сентябрю. Плоды черные или красно-пурпуровые; лл. съ 3—5 листочками. Имѣетъ много (21) разновидностей, признаваемыхъ подородами. Р. хамѣморусъ (R. chamaemorus). Мороника. Европа. Цв. бѣлые, въ июлѣ-июлѣ; плоды желтооранжевые; лл. сердцевидные, 5—7 лопастные. 4—8 д.

**РУВЦОВСКОЕ ЯБЛОКО.** Ранній сортъ, съ ребрами, рѣшотчатой формы, зеленого цвѣта, хорошаго вкуса.

**РУДБЕКІЯ (Rudbeckia).** Олафъ *Рудбекъ* (Rurbee) — проф. ботаники въ Упсалѣ. С. сложноцвѣтныхъ. (25). С. Америка. Оранж. или полувыносн., многол. трав. пр. Обыкн. садов. Съменами и дѣленіемъ.

Р. грандифлора (R. grandiflora, крупноцвѣтная). Цв. головки съ лучевыми цв. желтыми и темно-пурпуровымъ выпуклымъ дискомъ, въ августѣ. 3½ ф. Р. максима



(*R. maxima*, самая большая). Цв. гол. съ чистожелтыми лучами и столбовидным дискомъ, въ августъ. 4—9 ф. *R. пинната* (*R. pinnata*, съ перистыми лл.). Цв. головки съ светло-желтыми лучами, крупный, пониклый, въ июль. 3 ф. *R. спеціоза* (*R. speciosa*, отъинная). Цв. головки съ оранжевыми лучами и темнымъ дискомъ, лѣтомъ. 2—3 ф. Сип. *R. Ньюманни* (*R. Newmannii*).

**РУДЖЕА** (*Rudgea*). *Руджя* (*Rudge*), англійскій ботаникъ. С. мареновыхъ. (45). Троп. Америка. Тепл. куст. или низкія древ. пр. Ухождъ какъ за Кофеа.

*R. макрофилля* (*R. macrophylla*, крупнолистная). Бразилія. Цв. бѣлые, лѣтомъ; лл. большіе, продолговато-овальные. 6 ф.

**РУДОЛЬФИЯ** (*Rudolphia*) *Рудольфъ* (*K. A. Rudolph*) — ботаникъ въ Іенѣ, † 1832. С. бобовыхъ. (3). Санъ-Доминго. Тепл. вьющ. пр. Волокн. глин. дерн. съ песков. торф. и древ. углемъ. Темп. зимой 7—12, лѣтомъ 13—21°.

*R. волюбиль* (*R. volubilis*, вьющаяся). Цв. шарлаховые, въ июль. *R. розеа* (*R. rosea*, розовая). Цв. розовые, въ июнь.

**РУЛИНГІЯ** и **РОЛИНГІЯ** (*Rulingia*). *Роллингъ* (*Roling*) — англійскій ботаникъ, † 1766. С. навозниковыхъ. (15). Мадагаскаръ и Австралія. Тепл. и оранж. куст. или полукуст. пр. Глин. дерн. съ торф. и пескомъ. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ песокъ, подъ стекломъ.

*R. панноза* (*R. pannosa*, съ плотными лл.). Австралія. Цв. бѣлые, въ апрѣль; лл. ланцетовидные. 2 ф.

**РУМБЕКЪ** (*Rumex*). Древнелатинское названіе, встрѣчаемое у Плинія. С. гречихинныхъ. (150). Въсѣмъ умѣренныя страны. Садоваго значенія не имѣютъ.

*R. ацетоза* (*R. acetosa*), *щавель* и *R. паціентія* (*R. pasientia*), *англійскій шпинатъ* — извѣстны какъ овощи.

**РУМЯНКА**. См. Оносма.

**РУСКУСЪ** (*Ruscus*). Древнелатинское названіе, привоженное Виргиліемъ и Плиніемъ. С. лилейныхъ. (3). Европа и Средиземное побережье. Вынос. или полувынос. полукуст. пр. Обыков. садовал. Корневыми отпрысками.

*R. хипофиллюмъ* (*R. hypophyllum*). *Бабы лоды*. Средизем. побережье. Цв. мелкіе, посреднихъ нижнихъ вѣтвяковъ, въ май-июнь. Вѣтвяки продолговато-ланцетовидные. 1—1½ ф.

**РУССЕЛІЯ** или **РОССЕЛІЯ** (*Russelia*). Александръ *Росселъ* (*Russel*) — авторъ «Natural history of Aleppo». С. покривниковыхъ. (6). Мексика, Центр. Аме-

рика. Тепл. куст. пр. Песков. глин. дерн. съ торф. и листов. Черенками въ песокъ, въ парникъ. Темп. зимой 6—10, лѣтомъ 13—22°.

*R. сарментоза* (*R. sarmentosa*, дающая отпрыски). Центр. Америка. Цв. шарлаховые, кольцами, въ июль. 4 ф. Сип. *R. мультифлора* и *R. тернифолія* (*R. multiflora*, *R. ternifolia*). *R. юнсеа* (*R. juncea*, тростниковая). Мексика. Цв. шарлаховые, кистями, въ июль. 4 ф.

**РУСЪ** (*Rhus*). Названіе заимствованное у Теофраста. С. сердечниковыхъ. (120). Умѣр. страны обоихъ полушарій, но преим. въ Ю. Африкѣ. Оранж. или вынос. трав. или куст. пр. большею частью ядовитыя. На землю неразборчивы. Черенками изъ корней или обычныхъ черенками и отводками.

*R. глянба* (*R. gravea*, гладкій). С. Америка. Цвѣтеть въ июнь; лл. перистые, ланцетно-ланцетовидные, внизу бѣловатые. 5—18 ф. Сип. *R. каролиниана*, *R. кокиннеа*, *R. сангойна*, *R. элганса* (*R. caroliniana*, *R. coccinea*, *R. sanguinea*, *R. elegans*). *R. котинусъ* (*R. cotinus*). *Сумахъ*. Отъ Испаніи до Кавказа. Цв. бѣдно-пурпуровые, въ июнь-июль. Лл. обратно-ланцетовидные. 6—8 ф. *R. суккеданеа* (*succedanea*). *Красный сумахъ*. Японія. Цв. зеленые, въ июнь-июль. Лл. перистые, листики овально-ланцетовидные. 10—16 ф. *R. токсикодендронъ* (*R. Toxicodendron*, ядовитый). С. Америка. Цв. зеленые, въ июнь. Лл. тройчатые, съ овально-ромбическими листочками. Куст. р., ядовитое при дотрогиваніи. *R. тифина* (*R. typhina*, лихорадочный). *Уксусное дерево*. С. Америка. Цв. зеленые, въ июнь; листочки продолговато-ланцетовидные. 10—30 ф. Сип. *R. виридифлора* (*R. viridiflora*).

**РУТА** (*Ruta*). Названіе древне-греческое. С. рутовыхъ. (40). Средиземное побережье и З. и Центр. Азія. Вынос. и полувынос. многол. пр. съ сильнымъ запахомъ. Всякая сильная легкая. Сѣменами или черенками.

*R. гравеоленсъ* (*R. graveolens*, вонючая). Ю. Европа. Цв. желтые, при распусканіи съ 10, впоследствии съ 8 тычинками, въ июнь до сентября. 3 ф. *R. суавеоленсъ* (*R. suaveolens*, съ приятнымъ запахомъ). Таврскія горы. Цв. желтые съ запахомъ первоцвѣта (Примуля официнальсъ), въ июнь до сентября. 2 ф.

**РУТОВЕА**. См. Галгеа.

**РУТОВЫЯ** пр. (*Rutaceae*). Кустарники, древесныя, рѣже трав. пр. съ железками. Распространены по умѣреннымъ и жаркимъ странамъ, преимущественно въ Ю. Африкѣ и Австраліи. Въ семействѣ до 83 родовъ и 650 видовъ. Глав-

нѣйшіе роды: Корреа, Кроунел, Рута и Цитрусъ.

**РѢДКА**. См. Рафанусъ. *R. земляная*. См. Аписъ.

**РѢЖУХА**. См. Настурціумъ.

**РѢПКА**. Ранній сортъ яблока, формою похожего на рѣпу, мелкое, превосходнаго вкуса, напоминающаго редвѣтъ.

**РѢШЕТО**. Барабанъ съ сѣтчатымъ дномъ, для просѣвки; крупное сито.

**РЮЕЛЬІЯ** (*Ruellia*). *Рюель* (*Ruelle*) — врачъ Франциска I и ботаникъ, † 1537. С. акантовыхъ. (150). Америка, Азія, Африка и Австралія. Тепл. или оранж. однол., многол. трав., полукуст. и куст. пр. Сильная легкая. Черенками, подъ стекломъ. Темп. зимой 7—12, лѣтомъ 13—21°.

*R. Байкеи* (*R. Baikiei*, Байкал). З. Африка. Цв. шарлаховые, зимой. 3 ф. Полукуст. *R. макрофилля* (*R. macrophylla*, крупнолистная). Мексика. Цв. шарлаховые, лѣтомъ 3—4 ф. Травн. *R. Портеллы* (*R. Portellae*, Портеллы). Бразилія. Цв. малиново-розовые, зимой. 1 ф. Однол. и многол. *R. спеціоза* (*R. speciosa*, отъинная). Бразилія. Цв. ярко-шарлаховые, въ июль. 20 ф. Куст. р. *R. спектабилисъ* (*R. spectabilis*, замѣчательная). Перу. Цв. сине-пурпуровые съ черными жилками, въ августъ. 2 и болѣе ф. *R. Хербстия* (*R. Herbstii*, Хербста). Бразилія. Цв. красно-пурпуровые, въ сентябрь. 3 ф. Полукуст. р.

**РЮИСІЯ** (*Ruizia*). *Донъ Рюисъ* (*Ruiz*) — вмѣстѣ съ Павономъ написали «Flora peruviana et chilensis». С. навозниковыхъ. (3). О. Бурбогъ. Тепл. куст. пр. Глин. дерн. съ торф. и пескомъ. Черенками, въ парникъ.

*R. варіабиль* (*R. variabilis*, измѣнчивая). Цв. бѣдно-розовые, въ май; лл. ланцетовидные, 10 ф. *R. лобата* (*R. lobata*, съ лопастиными лл.). Цв. свѣтло-красные, въ май; лл. сердцевидные, 3—5 лопастиные. 6 ф.

**РЮИШІЯ** (*Ruyschia*). Фридр. *Рюишъ* (*Ruysch*) — проф. ботаники въ Амстердамѣ, † 1731. С. тернестрейныхъ. (8). Троп. Америка. Тепл. эпифит. или вьющ. кустар. пр. Растит. пережной съ глин. дерн. Черенками изъ вызрѣлаго роста, въ песокъ, подъ стекломъ, въ теплѣ. Темп. зимой 10—13, лѣтомъ 13—24°.

*R. клюзіефолія* (*R. clusiae-folia*, съ лл. какъ у Клузіи). Гвiana и Карибскіе о. Цв. пурпуровые съ красными прицвѣтниками. 4 ф.

**РЯБИКА**. См. Патринія.

**РЯВИНА**. См. Пирусъ.

**РЯВИННИКЪ**. См. Комарумъ.

**РЯВЧИКЪ**. См. Фритиллярія.

**РЯСКОВЫЯ** пр. (*Lemnaceae*). Семейство маленькихъ растений-плавающихъ по поверхности стоячихъ водъ всѣхъ климатовъ; состоитъ изъ двухъ только родовъ — Вольфія и Лемпа и 20 видовъ.

**РЯСТЬ**. См. Сцилла.

**САВАЛЬ** (*Sabal*). Полагаютъ, что это мѣстное названіе. С. пальмъ. (6). Троп. Америка. Тепл. и оранж. пр. Легкая глин. дерн. Сѣменами или отпрысками.

*S. Адамсо́ни* (*S. Adamsonii*, Адамсона). Ю. А. Соед. Штаты. Лл. округлые, вѣрообразные, несного перисторазсѣченные, черешки короче пластинокъ; плоды черные, цвѣтеть въ июнь-июль. Оранж. *S. Блэкборниана* (*S. Blackburniana*, Блэкборниевъ). Бермудскіе о. Лл. сердцевидные, полукруглые съ мечевидными сегментами, болѣе или менѣе глубоко разсѣченными. Стволъ 20—25 ф. Сип. *S. умбракуліфера* (*S. umbraculifera*). С. пальметто (*S. Palmetto*, пальметто). Юж. Штаты. Лл. сердцевидные, вѣрообразно-разсѣченные съ тонкими и узкими частями. Стволъ въ 20—40 ф. Сип. *Хаммеронъ Палметто* (*Chamaerops Palmetto*). Оранж. *S. умбракуліфера* (*S. umbraculifera*, производящій зонтикъ). Вестиндія. Лл. почти округлые, свисые, многоразсѣченные до 1/3 или 2/3; стволъ въ 60—80 ф. Оранж.

**САВБАТІЯ** (*Sabbatia*). *Саббатъ* (*L. Sabbati*) — италійскій ботаникъ. С. горечавковыхъ. (13). С. Америка и Куба. Одно- или двул. вынос. тр. р. Сѣменами въ горшкахъ съ торф. Горшки ставить на поддонники съ водой, п. ч. пр. болотныя. Упомянутые ниже виды изъ С. Америки и цвѣтутъ лѣтомъ.

*S. каликоза* (*S. calycosa*, съ болѣею чашечкой). Цв. бѣлые, чашечка съ длинными долями. 5—20 д. *S. кампестрисъ* (*S. campestris*, полевая). Цв. розовые, лл. овальные. 1 ф.

**САВИНЕА** (*Sabinea*). Джозефъ *Савинъ* (*Sabine*) — одно время секретарь лондонскаго общ. садоводства. С. бобовыхъ. (3). Вестиндія. Тепл. древ. или куст. пр. Песков. глин. дерн. Черенками изъ молодого роста въ песокъ, въ парникъ.

*S. кариналисъ* (*S. carinalis*, съ болѣею ладьей). Цв. ярко-шарлаховые; листья перистые, о 6—8 паряхъ. *S. флорида* (*S. Florida*, обильно цвѣтущая). Цв. розовые; листья о 8—15 паряхъ.

**САВИЦЕА** (*Sabicea*). Мѣстное названіе въ Гвianѣ. С. мареновыхъ. (28). Троп. Америка, Африка и Мадагаскаръ. Тепл. вьющ. кустар. пр. Глин. дерн. съ торф.



и пескомъ. Черенками въ песокъ, въ парникахъ.

**С. аспера** (*S. aspera*, жесткая). Гвiana. Цв. бѣлые, пучками, въ июнь. 6 ф. **С. хирта** (*S. hirta*, волосистая). Ямайка. Цв. бѣлые, въ июнь. 6 ф.

**САВИЙНЫЯ** pp. (*sabiaceae*). Незначительное семейство изъ древесныхъ или кустарныхъ породъ, встречаемыхъ въ тропическихъ странахъ, преимущественно сѣвернаго полушарія. 4 рода и 32 вида. *Меліосма*, *Офиокарионъ*, *Сабія* и *Фоксантусъ*.

**САГИНА** (*Sagina*). *Sagina* — тучность, по предполагаемой значительной питательности pp. *S. гвоздичныхъ*. (8). Умѣр. и холод. страны сѣв. полушарія. Одно или многол. травы.

**С. пиллифера** (*S. pilifera*, волосатая). Корсика. Цв. бѣлые, въ июль—августъ; лл. шиловидные; стебель ползучій. 2 д. Употреб. для образования ковра; для этого съюты на мѣсто и почаше убиваютъ обухомъ лопаты.

**САГИТТАРИЯ** (*Sagittaria*). *Sagittaria* — стрѣла; по преобладающей формѣ лл. *С. частушныхъ*. (15). Тропич. и умѣр. поясы. Тепл., оранж. или вынос. болотныя pp. Глин. дерн. Дѣленіемъ. Цвѣтутъ лѣтомъ.

**С. монтевидензисъ** (*S. montevidensis*, изъ Монте-Видео). Ю. Америка. Цв. бѣлые съ малиновымъ пятномъ при основаніи каждаго лепестка; лл. стрѣловидные. Тепл. или оранж. водяное р. *С. сагиттифолия* (*S. sagittifolia*, стрѣлолистная). *Болотникъ*. Европа. Цв. бѣлые, у лепестковъ поглотки пурпуровые, въ июнь.

**САГОВЫЯ** или **ЦИКАДЕИ** (*cusacaeae*). Низкорослые, похожие на пальмы деревья или кустарники, обычно съ неразвѣтвленными пнями, имѣющими слѣды бывшихъ листьевъ. Родовъ 9, изъ нихъ должно назвать: *Діоонъ*, *Цикасъ*, *Цамія* и *Энцефалартосъ*. Растенія эти близки съ хвойными и встречаются въ природѣ въ тропич. странахъ и умѣренномъ климатѣ южнаго полушарія.

**САГРѢА** (*Sagraea*). Рамонъ *де-ла-Сагра* (*De la Sagra*) — директоръ ботан. сада въ Гавани. *С. черноустыхъ*. (27). Экваторіальная Америка. Тепл. куст. pp. Уходъ какъ за *Меліосма*.

**С. сессилифлора** (*S. sessiliflora*, съ сидячими цв.). Цв. красные, въ апрѣль. 4 ф. **С. умброза** (*S. umbrosa*, любящая тѣнь). Цв. красные, въ мартъ.

**САДЛЕРІЯ** (*Sadleria*). *Садлеръ* (*Sadler*) — проф. ботаники въ Пестѣ. *С. папоротниковъ*. (2). Сандвичевы о. и Суматра. Тепл. древовид. папоротники.

**С. цатеойдесъ** (*S. cyathoides*, похо-

жая на *Цатеа*). Сандвичевы о. Ваи перистая въ 2—6 ф. длиной и въ 9—18 д. шир., перья или остроколенные, или тупые.

**САДЪ**. Участокъ земли, засаженный стараньемъ человека деревьями, кустами, цвѣтами, съ убитыми дорожками и разнаго рода и вида затѣями, украшениями. Садъ бываетъ *плодовый* для плодовыхъ растений, *потѣшный*, для прогулокъ, и *огородъ* (овощный) для разводки полезныхъ, болѣе съѣдомыхъ растений.

**САЖА**. Употребляется въ садоводствѣ какъ удобрение и какъ средство отъ нашествій комыхъ. Состоитъ изъ 12% воды, отъ 35 до 50% золь и остальнаго количества летучихъ веществъ, содержащихъ аммоніи, который обнаруживаетъ свое присутствіе при прикосновеніи къ сажѣ извести съ водою. Какъ поверхностное удобрение, сажа дѣйствуетъ содержащимися въ немъ сѣрнистымъ и хлористымъ аммоніемъ (нашатыремъ); въ этомъ случаѣ оно имѣетъ губительное вліяніе на личинокъ. Обмываніе водою съ сажей стволы по тому-же основанію избавляетъ отъ гнѣздящихся въ корѣ яченокъ и личинокъ нашествіемъ.

**САЖЕНЕЦЪ**. Посаженное корнемъ, отводками, клубнемъ, кочешкомъ, а пересаженное послѣ посѣва растеніе.

**САЖЕНЪ**. **САЖЕНЬ**. Мѣра въ 3 арш., въ 12 четвертей, въ 7 англійск. или русск. футовъ и въ 6 франц. футовъ.

**САЙКА**. Одинъ изъ сортовъ владимірской или вязниковской вишни.

**САККОЛЯБУМЪ** (*Saccolabium*). *Saccus* — мѣшокъ и *labium* — губа, по мѣхообразной губѣ. *С. орхидей* (30). Остиндія и Малайскій архипелагъ. Тепл. эпифиты. Уходъ такой же, какъ за *Аеридесъ*, съ тою разницею, что они лучше идутъ въ корзинкахъ или вазахъ, подвѣшенныхъ къ шпаламъ.

**С. акутифолюмъ** (*S. acutifolium*, остролистный) Казія. Цв. желтые, губа блѣдно-розовая. 6 д. **С. Беркелей** (*S. Berkeleyi*, Беркелей). Андамаскіе о. Цв. крупные, бѣлые съ аметистовыми полосками и пятнышками; губа аметистовая. **С. бигибумъ** (*S. bigibbum*, двугорбый). Рангунъ. Цв. блѣдно-желтые, губа бѣлая, по серединѣ желтая, въ ноябрь. **С. борнеенсисъ** (*S. borneense*, съ о. Борнео). Борнео. Цв. коричневато желтые. **С. виолацеумъ** (*S. violaceum*, фиолетовый). Манилла. Цв. чисто бѣлые съ желто-розовыми пятнышками и болѣе темными полосками, въ январь и февраль. Сип. *Ванда вольфеа* (*Vanda wolfeae*). У разновид. *Харрисоніумъ* (*Harrisonianum*) бѣлые цвѣты пахнутъ и цвѣтутъ зимой. **С. гигантеумъ** (*S. giganteum*, гигантскій). Бурма. Цв. бѣлые, очень ду-

шистые, губа желто-фиолетовая, зимой. Сип. *Ванда денсифлора* (*Vanda densiflora*). **С. курвифолюмъ** (*S. curvifolium*, криволистный). Остиндія. Цв. киноварно-красные, въ май и июнь. **С. рубрумъ** (*S. rubrum*, красный). Индія. Цв. темно-розовые, въ май — июнь. Сип. **С. ампуллацеумъ** (*S. ampullaceum*). **С. Тюрнера** (*S. Turneri*, Тюрнера). Индія. Цв. съ лиловыми пятнами, въ июнь. **С. цѣлесте** (*S. coeleste*, небесный). Мульмейнъ. Цв. съ лазуревыми кончиками, передняя часть губы голубая.

**САКСЕГОТЕА** (*Saxegothea*). Принцъ Альбертъ саксен-готскій. *С. хвойныхъ*. (1). Полувыш. древ. р. Уходъ какъ за *Таксусъ*.

**С. конспискуа** (*S. conspicua*, поразительно-красная). Ю. Чили. Цвѣтеть въ июль. Шишки плотныя, приплюснутыя, мясистыя; лл. кожистые, твердые. 30 ф.

**САКСИФРАГА** (*Saxifraga*). Названіе взято у Плинія, отъ *saxum* — скала и *frago* — ломать; по врачевнымъ свойствамъ. *С. камнеломковыхъ*. (170). *С. и Ю. умѣр.* и арктич. мѣстностей, рѣдко въ Азіи, еще рѣже въ Ю. Америкѣ, вовсе нѣтъ въ Австраліи, Ю. Африкѣ и на о. Тихаго ок. Большею частью выносл. многол., иногда однол. трав. pp. На землю не прихотливы, любятъ вокругъ себя камни. Дѣленіемъ или отпрысками.

**С. айзойдесъ** (*S. aizoides*, похожая на *Айзонъ*). Альпійская и арктич. Европа. Цв. оранжевые съ красными крапинками, въ июнь и июль. Р. распростертое. **С. ареиойдесъ** (*S. aretioides*, похожая на *Арею*). Пиренеи. Цв. золотисто-желтые, въ июль—августъ. 2 д. **С. Бурсеріана** (*S. Burseriana*, Бурсера). Альпы. Цв. млечно-бѣлые, крупные, съ марта до іюня. 1½ д. **С. вальдензисъ** (*S. valdensis*, лонская). Альпы Ліона. Цв. бѣлые, относительно крупные, въ май—июнь. 3 д. **С. виргиніензисъ** (*S. virginiensis*, виргинская). *С. Америка*. Цв. бѣлые, въ апрѣль до іюня. 4—9 д. Имѣетъ форму съ махровыми цв. **С. гранулата** (*S. granulata*, зернистая). Европа. Цв. бѣлые, въ апрѣль—май. 6—18 д. Имѣетъ форму съ махровыми цв. **С. диверсифолия** (*S. diversifolia*, съ разнообразными лл.). Индія. Цв. желтые съ пятнами, въ июль. 6—16 д. **С. Кампосіи** (*S. Camposii*, донна Педро дель Кампо). Испанія. Цв. бѣлые, въ май 3—6 д. **С. кортузифолия** (*S. cortusaeifolia*, съ лл. какъ у *Кортузы*). Японія. Цв. бѣлые, въ октябрь. Стебли нѣтъ. **С. котиледонъ** (*S. cotyledon*, пирамидальная). Альпы. Цв. бѣлые, въ май до іюля. 1—2 ф. **С. непальнзисъ** и **С. пирамидальнзисъ** (*S. nepalensis*, *S. pyramidalis*) — болѣе сильныя формы. **С. крацифолия** (*S. crassifolia*, съ толстыми

лл.). *Вадинъ*. Сибирь. Цв. красные, метелкою, въ мартъ до мая. 1 ф. **С. лигулата** (*S. ligulata*, язычковая). Непаль. Цв. блѣдно-красные, въ мартъ до мая. 1 ф. **С. лонгифолия** (*S. longifolia*, длиннолистная). Пиренеи. Цв. бѣлые съ красными крапинками, въ июль. **С. мошата** (*S. moschata*, мускусовая). Пиренеи. Цв. блѣдно-желтые или пурпуровые, въ май и июнь. 3 д. Сип. **С. мускойдесъ** (*S. muscoides*). **С. оппозиitifolia** (*S. oppositifolia*, съ супротивными лл.). Европа. Ц. ярко-пурпуровые, въ апрѣль и май. 6—8 д. Имѣетъ нѣсколько разновидностей. **С. пельтата** (*S. peltata*, щитовидная). Калифорнія. Цв. бѣлые или блѣдно-розовые, въ апрѣль. Одинъ изъ самыхъ высокаго вида. **С. пигмѣа** (*S. pygmaea*, крошечная). Альпы. Цв. пурпуровые, въ май и июнь. 1½ д. **С. пурпурасценсъ** (*S. purpurascens*, пурпуроватая). Гималаи. Цв. пурпуровые, въ июль. 3—6 д. **С. ретуза** (*S. retusa*, съ вызубренными лл.). Альпы. Цв. пурпуровые, въ май и июнь. 1½ д. **С. Рохелияна коріофилля** (*S. Rocheliana coriophylla*, Рохели съ лл. какъ у *Корпеса*). Австрія. Цв. бѣлые, лѣтомъ. 3 д. **С. санкта** (*S. sancta*, святая). Гора Авонъ. Цв. желтые, лѣтомъ. Густое, дернистое р. **С. сарментоза** (*S. sarmentosa*, дающая лсты). *Ааронова борода*. *Венерины косы*. Китай. Японія. Цв. бѣлые, два внутри. Лепестка съ желтыми, а средній съ двумя шарлаховыми пятнышками, въ июнь и июль. 9 д. У разновидности *триколоръ* (*tricolor*) лл. съ бѣлыми и красными пятнами. **С. умброза** (*S. umbrosa*, любящая тѣнь). Испанія. Португалія. Цв. бѣлые, иногда искрпанные краснымъ, въ июль—июль. 6—12 д. **С. Форчуней** (*S. Fortunei*, Форчуна). Японія. Цв. бѣлые, метелкой; лл. почковидные. **С. хипнойдесъ** (*S. hypnoides*, похожая на мохъ *Хипнумъ*). Европа. Цв. бѣлые, въ май и июль. Р. большими дернинами **С. хиркулосъ** (*S. Hirculus*, хиркулоу, желтая). Арктическія и альпійскія страны. Цв. желтые съ красными точками у основанія лепестковъ. 4—8 д. **С. Хостіи** (*S. Hostii*, Хосты). Ю. Европа. Цв. бѣлые, въ май. 6—12 д. **С. цезія** (*S. caesia*, сѣрая). Альпы. Цв. млечно-бѣлые, въ май и июнь. 1½—3 д. **С. цеспитоза** (*S. caespitosa*, кустистая). Европа. Цв. бѣлые, колокольчатые, въ июль—августъ. 3 д.

**САКСОФРИДЕРИЦИЯ** (*Saxofrideria*). Фридрихъ Августъ, король саксонскій. *С. рапатовыхъ*. (5). Гвiana и Бразилія. Тепл. трав. pp. Глин. дерн. съ торф. Дѣленіемъ.

**С. субкордата** (*S. subcordata*, почти сердцевидная). Амазонская долина. Цв. съ коричневыми пятнышками и краснымъ чех-



ломъ. 1 ф. Сип. *Panatea pandanoides* (Rapatea pandanoides).

**САХАРУМЪ (Saccharum).** *Saccharum* на древне-греч. языкъ—сахаръ, съ санскритскаго *sakara*. С. злаковъ. (12). Тропич. страны. Тепл. трав. пр. Легкая, сильная. Отпрысками или черенками изъ стебля, дающими корни изъ колыть. Темп. зимой 10—13, лѣтомъ 13—26°.

**С. эгиптиакумъ (S. aegyptiacum, египетскій).** Алжиръ. Цв. метелки шелковисто-серебристыя, въ июль; лл. лентовидныя, длинные, 7 ф.

**САЛАДЪ-МАШЪ и С. ПОЛЕВОЙ.** См. Валерьянелія.

**САЛІКСЪ (Salix).** ИВА. Древнелатинское названіе, встрѣчаемое у Виргилія. С. ивовыхъ. (160). Распространеніе широкое. Дрв. или куст. пр. Тяжелая, влажная. Черенками изъ плотнаго роста, осенью, или сохраненными отъ мороза весной.

**С. альба (S. alba).** Бѣлая верба. Европа. Цвѣтеть вмѣстѣ съ лл. въ маѣ; лл. узколанцетовидныя. 80 ф. **С. бабилоніка (S. babylonica, вавилонскій).** *Плакучая ива.* Левантъ. Цвѣтеть въ маѣ. Лл. узколанцетовидныя, зубчатые; почки очень острыя. 30 ф. Сип. **С. пендула (S. pendula).** **С. капреа (S. carpea, козій).** Красная верба. Европа. Цвѣтеть до лл., цв. почки шелковистыя, въ апрѣль, маѣ. Лл. эллиптическія, удлиненныя или ланцетовидныя, на нижней сторонѣ пушистыя. Употребляется въ Вербную субботу въ церковномъ богослуженіи, — верба. Имѣетъ нѣсколько разновидностей. **С. филицифолія (S. philicifolia, съ лл. какъ у Филіка).** Европа. Цв. въ апрѣль — маѣ. Лл. удлиненно-овальныя или эллиптически-ланцетовидныя. 10 ф. Имѣетъ очень много формъ.

**САЛЬВАДОРА (Salvadora).** *Сальвадоръ (Salvador)* — испанскій ботаникъ. С. сальвадорскихъ. (3). В. Африка, Аравія, Индія. Тепл. куст. или дрв. пр. Глин. дерн. Черенками въ песокъ, въ парникѣ.

**С. персика (S. persica, персидская).** Цв. бѣлые, въ июнь. Лл. продолговато-овальныя. Сип. **С. индіка (S. indica).** Полагаютъ, что это — то горьчичное растеніе, о которомъ говорится въ евангеліи (Мат. ХІІІ, 32).

**САЛЬВАДОРОВЫЯ пр. (salvadoraceae).** Малочисленное сем. дрв. или куст. пр., встрѣчаемыхъ преимущ. въ З. Азіи, Африкѣ и на Маскаренихъ о. Въ сем. заключается три рода: Ацима, Добра и Сальвадора, и около 9 видовъ.

**САЛЬВІЯ (Salvia).** Древнелатинское названіе, отъ *salvo* — спасать, излечивать, по врачевнымъ свойствамъ нѣк.

видовъ. С. губоцвѣтныхъ. (450). Широко распространеныя по умѣр. и жаркимъ поясамъ земной поверх., тепл., оранж. или выносл. одно- дву- и мног. травин. Сильная, глин. дерн. съ переносомъ пополамъ. Съмѣнами и черенками, въ обоихъ случаяхъ въ теплѣ. Упоминаемые ниже виды — многол. пр.

**С. альбо-церулеа (S. albo-coerulea, бѣло-лазуревая).** Мексика. Цв. бѣлые съ синею нижнею губою. лѣтомъ. 3 ф. Оранж. куст. р. **С. асперата (S. asperata, жесткая).** Кашмиръ. Цв. бѣлые, въ июль 2 ф. **С. биколоръ (S. bicolor, двуцвѣтная).** Варварійскія влад. Цв. длинныя, верх. губа фиолетовая съ золотистыми крапинками, нижняя бѣловатая, въ июнь. 2—3 ф. Полувын.

**С. болливіана (S. boliviana, болливіанская).** Боливія. Цв. ярко-шарлаховыя, осенью. 4 ф. Оранж. полу-куст. р. **С. геснерефлора (S. gesneriiflora, съ цв. какъ у Геснера).** Колумбія. Цв. шарлаховыя, болѣе многочисленныя, чѣмъ у *С. фульгенс*, 2 ф. Оранж. многол. трав. р. **С. Гудотія (S. Goudotii, Гудота).** Колумбія. Цв. ярко-карминныя, лѣтомъ. 2 ф. Сип. **С. лантанифолія (S. lantanifolia).** **С. Греэма (S. Grahami, Греэма).** Мексика. Цв. сине-пурпуровыя, лѣтомъ. 2 ф. Оранж. куст. р. **С. Греггя (S. Gregii, Грегга).** Сѣв. Мексика. Цв. карминныя, осенью. 3 ф. **С. дисколоръ (S. discolor, разноцвѣтная).** Андскія горы въ Перу. Цв. темно-пурпуровыя. 2—3 ф. **С. интэррупта (S. interrupta, перемежная).** Танжеръ. Цв. фиолетово-пурпуровыя; въ маѣ. 3 ф. **С. іантіна (S. ianthina, фиолетовая).** Отечество неизвѣстно. Цв. фиолетово-пурпуровыя, яркія, въ июнь. 2 ф. Сип. **С. Ховейи (S. Hoveyi).** **С. какаліефолія (S. casaliifolia, съ лл. какъ у Калаліи).** Мексика. Цв. темно-голубые, въ июнь. 3 ф. Оранж. многолѣтн.

**С. кардуалеа (S. carduacea, съ лл. какъ у Кардууса).** Калифорнія. Цв. голубо-лиловые, въ июль. 1 ф. **С. кокцинеа (S. coccinea, шарлаховая).** Центр. и Южн. Америка. Цв. темно-шарлаховыя, въ июль. 2 ф. Оранж. или полу-выносл., однол., либо многол. пр. **С. конфертифлора (S. confertiflora, со скученными цв.).** Рио-Манейро и Органнныя горы. Цв. красныя внутри, желтоватыя снаружи, въ августъ. 3 ф. Оранж. полукуст. р. **С. оппозиitifолія (S. oppositifolia, съ супротивными лл.).** Перу. Цв. шарлаховыя, въ июнь. 2 ф. Полу-выносл. полу-куст. р. **С. патенсъ (S. patens, поникающая).** Мексика. Цв. голубые, въ августъ. 2½ ф. Полу-выносл. многол. р.; имѣетъ нѣсколько формъ. **С. рингенсъ (S. ringens, зияющая).** Греція. Цв. красно-пурпуровыя, лѣтомъ. 1—2 ф. Выносл. кустар. р. **С. Ремериана (S. Roemeriana, Ремерова).** Техасъ. Цв. темно-шарлаховыя, въ июль.

**С. синуата (S. sinuata, волнистая).** Цв. темно-пурпуровыя, паленые или иной окраски, часто полосатыя; красныя. 2 ф. Въ садахъ называются также: *С. атропурпуреа*, *О. Барклайана*, *С. никта*, *С. страминіа* (S. atropurpurea, S. Barklayana, S. picta, S. straminea).

**САЛЬПИХРОА (Salpichroa).** *Salpinx* — труба и *chroos* — кожа; по формѣ и плотности цв. С. пасленовыхъ. (10). Вѣтроп. Южн. Америка или Андскія горы. Тепл. или оранж. трав., полукуст. или куст. пр. Торф. съ глин. дерн. Черенками изъ полужрълаго роста въ песокъ, подъ стекломъ. Темп. зимой 6—8°.

**С. glandulоза (S. glandulosa, съ железками).** Чили. Цв. желтыя, въ июль, 2 ф.

**САЛЬМЕА (Salmea).** Голландскій князь Карлъ *Сальм-Дикъ (Salm Dych)* — страстный любитель цвѣтовъ. С. сложноцвѣтныхъ. (12). Мексика, Вестиндія. Тепл. куст. пр. Легкая, сильная. Черенками изъ молодого роста, въ песокъ, въ парникѣ. Цвѣты бѣлые. Темп. зимой 7—12, лѣтомъ 13—24°.

**С. сканденсъ (S. scandens, цѣпкая).** Вера-Круикъ. Цв. головки полушаровидныя, въ июнь. 6 ф. **С. хирсута (S. hirsuta, пушистая).** Ямайка. Цв. щитками, въ августѣ. Р. цѣпкое.

**САЛЬПИГЛОССИСЪ (Salpiglossis).** *Salpinx* — труба и *grossis* — языкъ; по языковому столбику. С. пасленовыхъ. (3). Чили. Одно- и двул. трав. пр. Сильная, легкая. Съмѣнами въ грунтъ или въ парникѣ, весной.

**С. синуата (S. sinuata, волнистая).** Цв. темно-пурпуровыя, паленые или иной окраски, часто полосатыя; красныя. 2 ф. Въ садахъ называются также: *С. атропурпуреа*, *О. Барклайана*, *С. никта*, *С. страминіа* (S. atropurpurea, S. Barklayana, S. picta, S. straminea).

**САЛЬПИХРОА (Salpichroa).** *Salpinx* — труба и *chroos* — кожа; по формѣ и плотности цв. С. пасленовыхъ. (10). Вѣтроп. Южн. Америка или Андскія горы. Тепл. или оранж. трав., полукуст. или куст. пр. Торф. съ глин. дерн. Черенками изъ полужрълаго роста въ песокъ, подъ стекломъ. Темп. зимой 6—8°.

**С. glandulоза (S. glandulosa, съ железками).** Чили. Цв. желтыя, въ июль, 2 ф.

**САЛЬМЕА (Salmea).** Голландскій князь Карлъ *Сальм-Дикъ (Salm Dych)* — страстный любитель цвѣтовъ. С. сложноцвѣтныхъ. (12). Мексика, Вестиндія. Тепл. куст. пр. Легкая, сильная. Черенками изъ молодого роста, въ песокъ, въ парникѣ. Цвѣты бѣлые. Темп. зимой 7—12, лѣтомъ 13—24°.

**С. сканденсъ (S. scandens, цѣпкая).** Вера-Круикъ. Цв. головки полушаровидныя, въ июнь. 6 ф. **С. хирсута (S. hirsuta, пушистая).** Ямайка. Цв. щитками, въ августѣ. Р. цѣпкое.

**САЛЯККА. См. Цыякка.**  
**САЛЯЦІЯ (Salacia).** *Саллія (Salacia)* — жена мифологическаго бога Нептуна. С. жаснолузырыныхъ. (70). Тропич. Азія. Тепл. куст. или дрв. пр. Песков. глин. дерн. Черенками изъ зрълаго роста, въ песокъ, въ парникѣ.

**С. пириформисъ (S. pyriformis, похожая на грушу).** Верх. Гвинея. Цв. зелено-вишневые, мелкія, въ июнь. Плоды пѣлиночно въ бергамотъ, очень вкусныя. 5 ф. Кустъ.

**САМБУКУСЪ (Sambucus).** Древнелатинское названіе отъ *sambuke* — музыкальный инструментъ, дѣлавшійся изъ этого р. С. жимолостныхъ. (12). Въ умѣр. страны (за исключеніемъ Ю. Африки) и тропич. гористыя мѣстности. Большинство выносл. дрв. или куст. пр. На землю не выскательны. Съмѣнами, дѣленіемъ и черенками.

**С. нигра (S. nigra, черная).** Бузина. Европа. С. Африка. Цв. бѣлые, въ июнь; плоды черныя, или зеленые; лл. о 2 или 4 паряхъ. 25 ф. Дерево. Имѣетъ нѣсколько садовыхъ формъ. **С. рацемоза (S. racemosa, кистевѣтная).** Бузина красная. Европа. Сибирь. Цв. бѣлые, въ апрѣль — маѣ. Лл. перистые. 10—20 ф. Большой кустъ.

**САМИДА (Samyda).** *Samydo* по греч. означаетъ березу. С. самидовыхъ. (2). Вестиндія. Тепл. и оранж. куст. пр. Глин. дерн. съ торф. Черенками въ песокъ, въ парникѣ.

**С. гляндрата (S. glabrata, гладкая).** Цв. зеленоватыя, въ июль — августъ. 5—12 ф. Сип. **С. спинулоза (S. spinulosa).** **С. серрулата (S. serrulata, мелко зазипленная).** Цв. бѣлые или красныя, въ июль. 4 ф.

**САМИДОВЫЯ пр. (samydaceae).** Дрв. и куст. пр. широко распространеныя по тропич. областямъ. Въ семействѣ этомъ 17 родовъ и до 150 видовъ. Главнѣйшіе роды: Абація, Банара, Каскарія, Самиды и Хомалиумъ.

**САМИЕЪ.** Особь. Индивидуу. Недѣлимое.

**САМОВЕРТНИКОВЫЯ пр. (monotropaeae).** Безлистныя, травянистыя растенія, живущія чужеядно на корняхъ елей и бука въ умѣренномъ поясѣ сѣвернаго полушарія. Родовъ 9, видовъ 12. Птероспора и Хинофитусъ.

**САМОЛЮСЪ (Samolus).** Старинное друидическое названіе одного изъ видовъ. С. первоцвѣтовыхъ. (8). Морскія побережья вѣтроп. южныхъ странъ. Оранж. или полувыносл. трав. пр. Обыкновен. Дѣленіемъ.

**С. репенсъ (S. repens, ползучій).** Австралія. Цв. розоватыя, въ августъ. 6—12 л.

**САМОСѢВЪ.** Растеніе, уродившееся отъ сѣмянъ само собою.

**САМШИТЪ.** См. Букусъ и Вибурнумъ.

**САНВИТАЛІЯ (Sanvitalia).** *Санви-*



*тали* (Sanvitali)—итальянский ботаник. С. сложноцветных. (4). Мексика. Тепл. или полувынос. однол. или многол. трав. пр. Песков. глин. дерн. с торф. Сѣменами.

С. *прокумбенс* (S. procumbens, распростертая). Цв. головки мелкие, похожи на цв. Рудбекии, с ярко-желтыми лучами и темным диском. Есть разновидность с махровыми цв.

**САНГВИНАРИЯ (Sanguinaria).** *Sanguis*—кровь; корень содержит кроваво-красный сок. С. маковых. (1). Многол. трав. р. Песков. глин. дерн. или торф. Сѣменами или дѣленіемъ корня.

С. *канадэнзис* (S. canadensis, канадская). С. Америка. Цв. белые, в апрѣлѣ и маѣ. 6 д.

**САНДАЛОВЫЯ** pp. (santalaceae). Древесный, кустар. и низкорослый трав. пр., распространенный по тропическим и умеренным поясам. В семействѣ 28 родовъ и почти 220 видовъ. Изъ родовъ наиболее замѣчательны Грубия, Санталюмъ, Тезиумъ и Экзокарпусъ.

**САНДАЛЬНОЕ** дерево. См. Хематоксилонъ.

**САНДЕРСОНІЯ (Sandersonia).** *Sanderson* (Sanderson)—секретарь общ. садоводства въ Наталь. С. лилейныхъ. (1). Тепл. клубневое трав. р. Уходъ какъ за Гладиолусомъ.

С. *аурантіака* (S. aurantiaca, оранжевая). Наталь. Цв. оранжевые, лл. ланцетовидные. 1½ ф.

**САНДОРІКУМЪ (Sandoricum).** *Santoor*—малайское названіе этихъ пр. С. ясенковыхъ. (4). Молуккскіе о. Тепл. и оранж. древ. пр. Глин. дерн. с торф. Черенками въ песокъ, въ парникъ.

С. *индикумъ* (S. indicum, индѣйскій). Цв. желтые, плоды с пріятнымъ кисловатымъ вкусомъ. Красное дерево.

**САНСЕВІЕРА (Sansevieria).** Раймондъ де Сансегріо князь *Sansevierio* (Raïmond de Sansgrio prince de Sansevierio) † 1776. С. кровяниковыхъ. (9). Троп. и Южн. Африка и Остиндія. Тепл. многол. трав. пр. Песков. глин. дерн. Отпрысками. С. *гвинеевиз* (S. guineensis, гвинейская). Гвинея. Цв. бѣловатые, в сентябрѣ. С. *лонгифлора* (S. longiflora, длинноцвѣточная). Троп. З. Африка. Цв. зеленые, в июль.

**САНТАЛУМЪ (Santalum).** По персидски—*чандамъ*, с санскрита *чандана*. С. сандаловыхъ. (8). Остиндія, Малайск. архип., Австралія и о. Тихаго Океана. Тепл. древ. или куст. пр. Песков. глин. дерн.

С. *альбумъ* (S. album). *Бѣлый сандалъ*.

Остиндія. Цв. внутри красноватые, в маѣ. 15 ф. Древесина бѣлая, сухая, пахнетъ пріятно.

**САНТОЛИНА (Santolina).** Отъ *Santolina*, р. упоминаемаго Плиніемъ. С. сложноцветныхъ. (8). Побережье Средиземнаго моря. Полувынос. пахучія полукуст. пр. Уходъ какъ за Ахиллея.

С. *хамеципариссусъ* (S. chamaecyparissus, похожая на Хамеципариссусъ). Ю. Европа. Цв. головки похожи на ромашечные, в июль. 1—2 ф. Разновидность *индика* (indica) низкаго роста, употребляемая въ узорчатыхъ насажденіяхъ для составленія разграниченій.

**САНХЕЦІЯ.** См. Санчесія

**САНЧЕСІЯ (Sanchezia).** *Sanchez* (Sanchez)—проф. ботаники въ Кадиксѣ. С. акантовыхъ. (8). Перу, Колумбія, Бразилія. Тепл. многол. трав. или полукуст. пр. Уходъ какъ за Барлерія.

С. *лонгифлора* (S. longiflora, длинноцвѣточная). Гвайнѣ. Цв. ярко пурпуровые, в апрѣлѣ. Многол. трав. С. *нобилисъ* (S. nobilis, благородная). Эквадоръ. Цв. желтые, в июль. 1—3 ф. Полукуст.

**САПОНАРИЯ (Saponaria).** *Sapo*—мыло; листья S. officinalis образуютъ съ водою пѣну, похожую на мыльную, и имѣющую свойство уничтожать, какъ мыло, жировыя пятна. С. гвоздичныхъ. (30). Европа и внѣ-троп. Азія. Вынос. или полувынос. трав. одно- или многол. пр. Песокъ, глин. дерн. и торф. вмѣстѣ. Сѣменами или дѣленіемъ.

С. *калѣбрика* (S. calabrica, калабрійская). Калабрія. Цв. розовые, в августѣ; лл. овально-лопастчатые. 6—12 д. Вынос. однол. С. *официналіс* (S. officinalis, аптечная). *Мыльница*. Европа. Умер. Азія. Цв. белые или лиловатые, в августѣ. 1—3 ф. Вынос. многол. С. *осимойдесъ* (S. osimoides, похожая на Базиліку). Италия, Швейцарія. Цв. красные или малиновые, с май до августа. Полувынос. стелящиеся многол. р.

**САПОТА (Sapota).** С. сапотовыхъ. (1). Тепл. древ. р. с млечнымъ сокомъ. Глин. дерн. Черенками.

С. *ахрасъ* (S. Achras, Ахрасъ). Востиндія и Центральная Америка. Цв. бѣловатые, в маѣ. Плоды очень сладкіе. 10—50 ф.

**САПОТОВЫЯ** pp. (sapotaceae). Древ. и куст. пр. с млечнымъ сокомъ изъ тропич. и внѣ-тропич. странъ. Содержатъ много полезныхъ для человѣка пр. Родовъ въ сем. 24, видовъ 320. Изъ родовъ главнѣйшіе представители Лукума, Сидероксилонъ и Хризифильюмъ.

**САРАЙ.** Холодное, холостое строеніе

для уборки въ него разныхъ предметовъ. Сарай *грунтовый*—постройка для защиты на зиму плодовыхъ растений, довольствующихся лѣтними климатическими условіями, но не выносящихъ зимнихъ.

**САРАНА ВЪЛАЯ, КРАСНАЯ** и **ЛЪСНАЯ.** См. Лилиумъ.

**САРКОКОККА (Sarcococca).** *Sarz, sarcos*—мясо и *kokkos*—ягода; по мясистымъ плодамъ. С. молочайныхъ. (3). Остиндія и Малайск. архипел. Тепл. или оранж. куст. пр. Песков. глин. дерн. Черенками въ песокъ въ умѣр. парникъ.

С. *салигна* (S. saligna, похожая на пиву). Непаль. Цв. бѣдно-желтые, в июль. 4 ф. Оранж. Имѣетъ нѣсколько разновидностей. С. *Хукеріана* (S. Hookeriana, Гукерова). Сиккимъ. Цв. желтоватые, в июль. 1—4 ф. Оранж.

**САРКОКОЛЛЯ (Sarcocolla).** *Sarz, sarcos*—мясо и *kolla*—клей, по смолистымъ выдѣленіямъ нѣкот. видовъ. С. пейнейныхъ. (10). Ю. Африка. Оранж. куст. пр. Уходъ какъ за Пенѣа.

С. *имбриката* (S. imbricata, настельная). Цв. малиновые, в июль. 1½ ф. Син. *Пенѣа имбриката* (Penaea imbricata). С. *скамбоза* (S. squamosa, чешуйчатая). Цв. красные, в июль. 1 ф. Син. *Пенѣа саркоколля*, *П. скамбаза* (Penaea sarcocolla, P. squamosa).

**САРКОСТЕММА (Sarcostemma).** *Sarz, sarcos*—мясо и *stemma*—вѣнецъ; по мясистымъ лепесткамъ коронки. С. листочниковыхъ. (8). Троп. Азія, Африка и Австралія. Тепл. вьющіяся куст. пр. Уходъ какъ за Церофегія.

С. *Бруноніанумъ* (S. Brunonianum, Брауна). Индія. Цв. ярко-желтые.

**САРМЕНТА (Sarmienta).** *Sarmiento*—испанскій ботаникъ. С. геснерійныхъ. (1). Оранжер. цѣнное куст. р. На стволѣ древеснаго папоротника или чуркѣ на торф. с мохомъ и древ. углемъ.

С. *репенс* (S. repens, ползучая). Чили. Цв. шарлаховые, лѣтомъ. Стебли тонкіе. **САРАКА (Saraca).** Мѣстное американское названіе. С. бобовыхъ. (5). Троп. Америка. Тепл. древ. пр. Уходъ какъ за Броуниа.

С. *инклината* (S. inclinata, наклоненная). Ява и Суматра. Цв. желтовато-оранжевые. С. *индика* (S. indica, индѣйская). Индія. Цв. ярко-оранжевые.

**САРАЧА (Saracha).** *Saracha* (Saracha)—испанскій бенедиктинскій монахъ, доставившій много рѣдкихъ пр. мадритскому корол. саду. С. пасленовыхъ. (12). З. Америка отъ Боливій до Мексики. Упомянутые ниже два вида—однол., высаживаемы весною въ обыкновен. садовую з.

С. *стапеліоидесъ* (S. stapelioides, похожая на Стапелію). Цв. бѣдно-желтые с коричневыми пятнышками, лѣтомъ. 1½ ф. Оранж. С. *умбеллята* (S. umbellata, зонтичная). Перу. Цв. белые или зеленоватые, в июль—июль. 2—4 ф. Оранж.

**САРКАНТУСЪ (Sarcanthus).** *Sarz, sarcos*—мясо и *anthos*—цвѣтокъ, по мясистымъ цв. С. орхидей. (20). Остиндія, Китай, Малайскій архипелагъ. Тепл. эпифиты. Волокн. торф. с мохомъ и кусками древ. угля.

С. *паникулѣтусъ* (S. paniculatus, метельчатый). Китай. Цв. желтоватые. Син. *Аэридеъ паникулѣтусъ* (Aerides paniculatus). С. *рострѣтусъ* (S. rostratus, съ отроосткомъ). Китай. Цв. желто-зеленые, губа фиолетовая съ отроосткомъ. С. *сущітусъ* (S. succisus, отломленный). Китай. Цв. зеленые, губа желтая. С. *теретифоліусъ* (S. teretifolius, съ круглыми лл.). Китай. Цв. желто-зеленоватые съ кроваво-красными жилками; губа бѣлая, съ бѣлыми краями у горшкани. Син. *Ванда теретифолія* (Vanda teretifolia).

**САРКОКАПНОСЪ (Sarcocapnos).** *Sarz, sarcos*—мясо и *capnos*—дымнякъ, по гречески. С. маковыхъ. (4). С. Африка, Испанія. Многол. трав. полу-вынос. или вынос. пр. Сѣменами и черенками. На з. незыскательны.

С. *эпнеафилля* (S. epnephylla, о дѣвяти лл.). Ю. Европа. Цв. желтые с пурпуровыми пятнышками, в июль. 2—5 д.

**САРКОКАУЛОНЪ (Sarcocaulon).** *Sarz, sarcos*—мясо и *caulon*—стебель. С. гераніевыхъ. (3). Ю. Африка. Оранж. трав. пр. Глин. дерн. с торф., листов. и пескомъ. Черенками изъ молодого роста или корни, въ песокъ, подъ стекломъ.

С. *Бурманни* (S. Burmanni, Борманна). Цв. пурпуровые, в маѣ. 1 ф. С. *Патерсоні* (S. Patersoni, Патерсона). Цв. пурпуровые, мелкіе, в маѣ. 2 ф.

**САРКОХИЛЮСЪ (Sarcophilus).** *Sarz, sarcos*—мясо, и *cheilos*—губа, по мясистой губѣ. С. орхидей. (30). Остиндія, ос. Малайского архип. и Тихаго океана, Австралія. Тепл. эпифиты. Торф. с мохомъ.

С. *Фитджеральди* (S. Fitzgeraldi, Фитджеральда). Австралія. Цв. снѣжно-бѣлые с малиновыми или коричневыми пятнами. Р. оранж.

**САРКОЦЕФАЛУСЪ (Sarcocephalus).** *Sarz, sarcos*—мясо и *kerhale*—голова, по мясистымъ плодамъ. С. мареновыхъ. (8). Троп. Азія, Африка и Австралія. Тепл. куст. или древ. пр. Глин. дерн. с торф. и пескомъ. Черенками, въ песокъ, въ парникъ.



**С. кордатузъ** (*S. cordatus*, сердцевидный). Австралія, Индія. Цв. желтые, въ маѣ. 10 ф. Сип. *Науклеа коадната* (*Nauclaea coadnata*). **С. эскулентусъ** (*S. esculentus*, съѣдобный). Сіера-Леоне. Цв. малиновые, въ іюль. Плоды головками велич. въ персикъ. Р. цѣлое. 20 ф.

**САРРАЦЕНІЕВЫЯ** pp. (*Sarraceniaceae*). Небольшое семейство своеобразныхъ многол. трав. растений, живущихъ въ торфяныхъ болотахъ въ Америкѣ. Замѣчательны не цв., а лл., которые всѣ корневыя съ трубчатымъ черешкомъ и небольшою пластинкою, какъ-бы крышечкою для этой трубки. Родовъ всего на все — три: Дарлингтонія, Сарраценія и Хелиамфора, видовъ 8.

**САРРАЦЕНІЯ** (*Sarracenia*). Д-ръ Саррацинъ (*Sarracina*)—въ Квебекѣ, впервые доставившій эти pp. изъ С. Америки въ Европу. **С. сарраценіевыхъ**. (6). С. Америка. Оранж. трав. многол. pp. съ лл. свернутыми трубкой. Волокн. торф. съ мохомъ. Корни не должны просыхать. Дѣленіемъ.

**С. Друммондіи** (*S. Drummondii*, Друммонда). Цв. пурпуровые, въ апрѣлѣ; у лл. крышечка бѣлая съ сѣтчатыми пурпуровыми жилками. Сип. *С. ундулята* (*S. undulata*). Имѣть разновидности *алба* (*alba*) съ крышечкой и верхн. частью трубки бѣло-сѣтчатыми, и *рубра* (*rubra*)—красными. **С. пситтаціна** (*S. psittacina*, съ попугайнымъ клювомъ). Цв. пурпуровые, въ апрѣлѣ—маѣ. Лл. узко-трубчатые съ бѣлыми пятнами и пурпуровою сѣткой; крышечка загнута, почти закрывающая трубку. **С. пурпуреа** (*S. purpurea*, пурпуровая). Цв. пурпуровые, въ апрѣлѣ—маѣ; трубки вздуты, крышечка почковидная съ пурпуровыми жилками. **С. рубра** (*S. rubra*, красная). Цв. красно-пурпуровые, въ маѣ; лл. съ пурпуровыми жилками; крышечка внутри пушистая. **С. флѣва** (*S. flava*, желтая). Цв. желтые, въ апрѣлѣ—маѣ. Лл. желтоватые съ желтой крышечкой. Имѣть нѣсколько разновидностей. Въ садахъ, кромѣ названныхъ видовъ, возпитывается очень много красивыхъ гибридовъ.

**САССАФРАСЪ** (*Sassafras*). Испанское названіе камедоки. С. лавровыхъ. (1). В. соед. ам. Штаты. Оранж. дерево. Уходъ какъ за Лауромъ.

**С. официналіс** (*S. officinalis*, аптечный). Цв. зеленовато-желтые, въ апрѣлѣ. 15—30 ф. Сип. *Лаурусъ сассафрасъ* (*Laurus sassafras*).

**САТІРИУМЪ** (*Satyrion*). Диоскоридъ такъ называлъ (*Satyrion*)—одну орхидею. С. орхидей. (60). Остиндія, Маскаренскіе о. и Ю. и Троп. Африка. Тепл. и оранж. земныя, клубевыя орхидеи. Дернистая

торф. съ волокн. глин. дерн. и пескомъ. Дѣленіемъ корней, при началѣ роста.

**С. ауреумъ** (*S. aureum*, золотистый). Цв. темно-оранжевые съ ярко-малиновымъ отбѣнкомъ, въ іюль и августѣ. 1 ф. и выше. **С. корифолиумъ** (*S. coriifolium*, съ кожистыми лл.). Цв. желтые, въ октябрѣ. 1 ф. **С. непалензе** (*S. nepalense*, изъ Непала). Цв. розовые, пахучіе, въ іюль 1 ф.

**САТУРІЯ** (*Satureia*). Названіе, взятое у Плинія. С. губоцвѣтныхъ. (14). Флорида и Средиземное побережье. Аромат. выносл. трав. или полукуст. pp. Песков. глин. дерн. Сѣменами и дѣленіемъ весной.

**С. монтана** (*S. montana*, горная). Зимний чаберъ. Ю. Европа. Цв. блѣдно-пурпуровые, въ іюль; лл. узкіе, клиновидные. Полукуст. р. С. хортензисъ (*S. hortensis*, садовая). Чаберъ. Ю. Европа. Цв. лиловые, мелкіе; лл. узкіе, остроконечные. Пушистое однол.

**САУНДЕРСИЯ** (*Saundersia*). *Саундерсъ* (*Saunders*)—коллекторъ рѣдкихъ и замѣчательныхъ pp., † 1879. С. орхидей. (1). Тепл. энфитъ. Уходъ какъ за Эпидендумъ.

**С. мирабилис** (*S. mirabilis*, удивительная). Бразилія. Цв. зеленоватые съ желтымъ и пурпуровымъ отбѣнкомъ.

**САУРАУХА** (*Saurauja*). *Саураухо* (*Sauraujo*)—португальскій ботаникъ, современникъ Вильденова. С. тернстреміиныхъ. (60). Азія, Троп. Америка. Тепл. дерев. или куст. pp. Глин. дерн. съ торф. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ песокъ, въ парникѣ. Темп. зимой 8—10, лѣтомъ 13—22°.

**С. непалензисъ** (*S. nepalensis*, изъ Непала). Непаль. Цв. бѣлые, въ августѣ. 6 ф. **С. спектабилис** (*S. spectabilis*, замѣчательная). Бразилія. Цв. бѣлые, въ іюль. 10 ф. **С. эксцельза** (*S. excelsa*, высокая). Каракасъ. Цв. бѣлые, въ іюль. 10 ф.

**САУРАУЯ**. См. Саурауха.

**САУРОПУСЪ** (*Sauropus*). *Sauros*—ящерица и *pous*—нога; почему примѣнены эти предметъ—не объяснено. С. молочайныхъ. (14). Остиндія, Малайскій архипелагъ. Тепл. куст. pp. Уходъ какъ за Филлятусъ.

**С. альбикансъ** Гарднеріанусъ (*S. albicans* Gardnerianus, бѣловатый Гарднера). Цейлонъ. Лл. продолговато-овальные, темнозеленые съ сѣрыми пятнами.

**САУРОМАТУМЪ** (*Sauromatum*). *Saura*—ящерица, по испещренной внутренней чехлѣ. С. ароидныхъ. (6). Троп. Азія и Африка. Тепл. клубневые многол. трав. pp. Легкая глин. дерн. пополамъ съ торф. Отпрысками.

**С. венозумъ** (*S. venosum*, съ жилками). Остиндія. Чехолъ снаружи пурпуровый, внутри желтоватый съ пурпуровыми пятнышками; ноготокъ длинный. 1 ф.

**САУРУРУСЪ** (*Saururus*). *Sauros*—ящерица и *oura*—хвостъ. С. перцовыхъ. (2). В. Азія и С. Америка. Многол. водяныя pp. Песков. глин. дерн. въ кадкѣ. Сѣменами или дѣленіемъ.

**С. цернуусъ** (*S. ceruus*, пониклый). С. Америка. Цв. бѣлые, колосьями, въ іюль до августа; лл. сердцевидные. 1—2 ф.

**САФЛОРЪ**. См. Картамусъ.

**САХАРНОЕ** яблоко. Ранній сортъ рѣпообразнаго яблока средней величины, очень сладкаго вкуса.

**СВОРЪ ПЛОДОВЪ**. Долженъ дѣлаться осторожно, чтобы не помять плодовъ, особенно съ нѣжной кожей. Избегать погоду сухую. При собираніи плодовъ, снимаемыхъ до полного поспѣванія (напр. персиковъ), должно брать ихъ не одними концами, а всѣми пальцами и ставить плоды основаніемъ ихъ на что нибудь мягкое. Плоды, выросшіе въ оранжереѣ, требуютъ большей осторожности при снѣтѣ, нежели растущіе на воздухѣ. Пора сбора спѣлыхъ такихъ плодовъ, какъ яблоки и груши, указывается или естественнымъ ихъ опаденіемъ, или изслѣдованіемъ спѣлости сѣмечекъ въ нихъ.

**СВАЙНСОНА** (*Swainsona*). *Свайнсонъ* (*Swainson*)—знаменитый въ свое время (въ прошл. стол.) садовникъ въ Англіи. С. бобовыхъ. (23). Нов. Зеландія и Австралія. Оранж. трав. или полукуст. pp. Песков. глин. дерн. съ торф. Черенками изъ молодого роста, въ песокъ, подъ стекломъ, или сѣменами.

**С. галегифолия** (*S. galegifolia*, съ лл. какъ у Галеры). Австралія. Цв. темно-красные, въ іюль. 1 и болѣе ф. **С. Грейяна** (*S. Greyana*, Грей). Австралія. Цв. малиновые, въ іюль. 2—3 ф. Многол. трав. или полукуст. р.

**СВАРЦІЯ** (*Swartzia*). Олафъ *Сварцъ* (Olaf Swartz)—шведскій врачъ, долгое время находившійся въ Вестиндіи и написавшій "*Flora Indiae occidentalis*", † 1818. С. бобовыхъ (60). Троп. Африка и Америка. Тепл. дерев. pp. Песков. глин. дерн. съ торф. Черенками съ лл. въ песокъ, въ парникѣ. Темп. зимой 8, лѣтомъ 13—24°.

**С. грандифлора** (*S. grandiflora*, крупноцвѣтная). Вестиндія. Цв. желтые, въ іюль. 6 ф. Сип. *С. симплицифолія* (*S. simplicifolia*).

**СВѢКЛА**. См. Бета.

**СВЕРБЕЖНИЦА**. См. Цефаларія.

**СВѢРТИЯ** (*Swertia*). *Свертъ* (*Swert*)

—голландскій садоводъ луковницъ, авторъ "*Florilegium*" 1612. С. горечавковыхъ. (40). Европа, Азія и Африка. Оранж. и выносл. одно- или многол. трав. pp. Торф. Сѣменами весной въ парникѣ.

**С. коримбоза** (*S. corymbosa*, съ цв. щиткомъ). Цв. голубые, въ маѣ. 8—20 д. **С. паникулата** (*S. paniculata*, метельчатая). Цв. бѣлые съ пурпуровыми пятнышками, лѣтомъ. 1 ф.

**СВИДІНА**. См. Периплока.

**СВИНЕЦЪ** или **СВИНЦОВОЕ ЯБЛОКО**. Поздній, очень тяжелый на вѣсъ сортъ, длинной цилиндрической формы, зеленоватого цвѣта, вкусомъ слабосладковатымъ. Не разваривается въ вареньѣ.

**СВИНЦОВКОВЫЯ** pp. (*plumbagineae*). Сем. изъ многолѣтнихъ травянистыхъ или древесныхъ породъ, имѣющихъ широкое распространѣніе по прибрежнымъ морскимъ мѣстностямъ. Видовъ 200, родовъ 8. Армерія, Плумбаго и Стапсаже.

**СВИТЕНІЯ** (*Swietenia*). *Свиетенъ* (*Swieten*),—голландскій ботаникъ, † 1772. С. ясенковыхъ. (1). Тепл. высокорослое дерево, доставляющее "красное дерево". Глин. дер. съ пескомъ. Черенками изъ зрѣлаго роста, не отрывая лл., въ песокъ, въ парникѣ. Темп. зимой 8—13, лѣтомъ 13—24°.

**С. Махагони** (*S. Mahagoni*). *Красное дерево*. Центральн. Америка, Антильскіе о. Цв. красно-желтые, мелкіе, въ маѣ. Лл. перистые. 70 ф.

**СВѢТЪ** Состояніе противоположное тѣмъ. *Свѣтъ прямой*, самоцвѣтъ, отъ горящаго тѣла и отъ солнца; *чужой, отраженный* или *отражательный*—отъ темнаго тѣла, на которое падаетъ прямой свѣтъ. Растеніе тогда только можетъ развиваться успѣшно, когда пользуется солнечнымъ свѣтомъ,—въ отсутствіи или при недостаткѣ его оно тянется, бываетъ слабое, блѣдное и не приноситъ цвѣтовъ, а тѣмъ менѣе плода.

**СДВАИВАТЬ. СДВОИТЬ**. Перекопать дважды вдоль и поперекъ (въ клѣтку).

**СЕБЕА** (*Sebaea*). Альбертъ *Себа* (*Seba*),—аптекарь и ботаникъ въ Амстердамѣ. С. горечавковыхъ. (18). Троп. и Южн. Африка, Мадагаскаръ, Австралія и Нов. Зеландія. Тепл. или оранж. однол. pp. Выводятся въ парникѣ, а потомъ высаживаются на воздухъ.

**С. альбенсъ** (*S. albens*, бѣлый). Ю. Африка. Цв. бѣловатые, въ іюль. 6 д. **С. ауреа** (*S. aurea*, золотистая). Ю. Африка. Цв. золотисто-желтые, въ іюль. 6 д. **С. овата** (*S. ovata*, овальная). Австралія. Цв. желтые, въ августѣ. 6 д.



**СЕВЕРИНИА (Severinia).** *Severino* (Severino),—проф. академии в Неаполе, † 1656. С. рутовых. (1). Оранж. куст. р.—Уходь как за Цитрус.

**С. бухифолия (S. buxifolia),** съ лл. Буксуса. Китай. Цв. белые, въ маѣ, 3 ф.

**СЕВЕРЦОВИЯ (Sewerzowia).** *Стеверцовъ*—русский ученый путешественник. С. бобовых. (1). Однол. вынос. р.

**С. туркестаника (S. turkestanica),** туркестанская. Туркестанъ. Цв. мелкие, лѣтомъ, 6 д.

**СЕДУМЪ (Sedum).** *Sedes*—сидѣть, по плотному прирастанію къ камнямъ. С. толстянковых. (120). Умѣр. и холодные пояса Сѣв. полушарія, рѣдко въ Америкѣ. Травяни., рѣже полукуст. обыкновен. выносливыя рр. Глнн. дерн. между камней.

**С. акре (S. acre, горькій) Молодикъ.** Европа. Цв. желтые, лѣтомъ; 2 д. Имѣетъ много разновидностей, изъ нихъ у *ауреумъ* (aureum) кончики лл. желтые. **С. айдоонъ (S. Aizoon, Айдоонъ).** Сибирь. Цв. желтые, поздно лѣтомъ. 1 ф. **С. альбумъ (S. album, белый).** Европа. Цв. белые, 4—6 д. Сип. *С. фариндзумъ* и *С. пеглестумъ* (S. farinosum, S. pegglistum). Имѣетъ нѣсколько разновидностей. **С. англикумъ (S. anglicum, английский).** Зап. Европа. Цв. чисто-бѣлые или розоватые, въ іюлѣ. Вѣтви стелющіяся, данною до 6 д. **С. бревифолюмъ (S. brevifolium, съ короткими лл.).** Франція. Доли и лепестки малиновые, въ іюлѣ. **С. glandulозумъ (S. glandulosum, железковатый).** Испанія. Цв. свѣтло-пурпуровые, въ іюлѣ. Однол. **С. глаукумъ (S. glaucum, сизый).** Сред. и Южн. Европа. Цв. малиновые, въ іюлѣ; лл. сѣроватые, краснѣющіе. **С. камчатикумъ (S. kamtschaticum, камчатскій).** Камчатка. Цв. желтые, поздно осенью. Стебли стелющіяся. Сип. *С. Сельскианумъ (S. Selskianum).* **С. лидіумъ (S. lydim, лидійскій).** Малай Азія. Цв. малиновые, поздно лѣтомъ; безплодные побѣги пурпуровые. Сип. *С. мидидумъ (S. midium).* **С. максимумъ (S. maximum, сам. большой).** Европа и Азія. Цв. бѣлые съ кончиками искрапанными краснымъ, въ августѣ и сентябрѣ, 1—2 ф. Имѣетъ нѣсколько разновидностей. **С. пуджеллумъ (S. pulchellum, красивый).** Соед. ам. Шт. Цв. розово-пурпуровые, вѣтви тонкія. **С. рефлексумъ (S. reflexum, закривленный наружу).** Европа. Цв. желтые, лѣтомъ, 8—10 д. Сип. *С. колымнумъ* и *С. айренсъ (S. collinum, S. virens).* Имѣетъ много разновидностей. **С. Родіоля (S. Rhodiola).** Роданка. Европа. Цв. зеленоватые или красновато-пурпуровые, лѣтомъ. Корень пахнетъ розовой водой. Имѣетъ нѣсколько разновидностей. **С. сарменто-**

**зумъ (S. sarmentosum, дающій плети).** Китай. Цв. ярко-желтые. Оранж. р. **С. спектабиле (S. spectabile, замѣчательный).** Японія. Цв. малиновые, въ сентябрѣ 1½—2 ф. Оранж. **С. пѣрулеумъ (S. coeruleum, голубой).** Средиземн. побережье. Цв. голубые, въ іюлѣ. 2—3 д. **С. японикумъ (S. japonicum, японскій).** Японія. Цв. желтые, лѣтомъ. Оранж. **С. Эверси (S. Ewersii, Эверса).** Европа. Цв. малиновые или свѣтло-фіолетовые, въ іюлѣ. 2—3 ф. Имѣетъ нѣсколько разновидностей. **С. эрихтостиктумъ (S. erythrostictum, красновато-окрашенный).** Японія. Цв. зеленоватые, въ сентябрѣ, 1—1½ ф. Оранж.

**СЕЗАМУМЪ (Sesamum).** *Sesamon*—древне-греческое названіе, употребленное Гиппократомъ. С. руляковых. (10). Троп. Ю. Африка. Тепл. трав рр. Уходъ за Мартиніа.

**С. индикумъ (S. indicum, индійскій).** *Кунжутъ.* Цв. бѣловатые съ розовыми, пурпуровыми или желтыми крапинками, въ іюлѣ. 1—2 ф. Сѣмена содержатъ до 95% масла. Сип. *С. лутеумъ, С. ориентале (S. luteum, S. orientale).*

**СЕЗУВИУМЪ (Sesuvium).** Происхожденіе названія неизвѣстно. С. деянниковых. (4). Побережье тропич. морей. Тепл. или оранж. трав. или полукуст. рр. Песковатая. Обусловенными черенками въ такой же з. Поливка осторожная.

**С. портулякаструмъ (S. portulacastrum, звѣздчатый портулакъ).** Цв. снаружи зеленые, внутри красноватые, въ іюлѣ—іюлѣ. **С. револютифолюмъ (S. revolutifolium, съ завитыми лл.).** Куба. Цв. красные и бѣлые, въ іюлѣ до августа.

**СЕЙМЕРІЯ (Seymeria).** *Сеймеръ (Seymer)*,—англ. ученый. С. норичниковых. (9). С. Америка, Мадагаскаръ. Премъ вынос. одно- или многол. трав. рр. Сѣменами въ легкую, сильную з.

**С. пектината (S. pectinata, гребенчатая).** С. Америка. Цв. желтые, въ іюлѣ. 1 ф. **С. тенуифолия (S. tenuifolia, тонколистная).** С. Америка. Цв. желтые, въ іюлѣ. 2—4 ф.

**СЕКАТЕРЪ (Secateur).** Рѣжущій инструментъ въ видѣ ножницъ ручныхъ или прикѣпленныхъ къ рукояткѣ, для обрѣзки растений. Недостатокъ всякаго секатора—не вполне ровный, какъ можемъ, отрѣзъ.

**СЕКВОИЯ (Sequoia).** Происхожденіе не выяснено. С. хвойнымъ. (2). Калифорнія. Гигантскія оранж. древ. рр., неприхотливыя на з. Черенками, прививкой и сѣменами.

**С. гигантеа (S. gigantea, гигантская).** Лл. игольчатые, вѣтви горизонтальныя.

Сип. *Веллингтоніа шлангеа (Wellingtonia gigantea).* Имѣетъ нѣсколько разновидностей. **С. семпервиренсъ (S. sempervirens, всегда живая).** Лл. линейные, тупые, вѣтви горизонтальныя. Лл. зимою краснѣютъ.

**СЕКУРИГЕРА (Securigera).** *Securis*—топоръ и *gero*—производитъ; по формѣ стручка. С. бобовых. (1). Однол. вынос. р. **С. коронилля (S. coronilla, похожая на Коронилля).** Ю. Европа. Цв. желтые, въ іюлѣ; лл. непарно-перистые. 1 ф.

**СЕКУРИДАКА (Securidaca).** *Securis*—сѣчка, топоръ, по крылу на концѣ стручка. С. истоковых. (25). Жаркія страны Америки, тропич. Азія и Африка. Тепл. куст рр. Глнн. дер. съ торф. и пескомъ. Черенками, въ песокъ, въ парникѣ. Темп. зимой 8—13, лѣтомъ 13—22°.

**С. виргата (S. virgata, вѣтвистая).** Вестиндія. Цв. душистые, вѣнчикъ желтый съ розовыми крыльями, въ іюлѣ. Высоко-выносящаяся р. **С. эректа (S. erecta, прямая).** Троп. Америка. Цв. пурпуровые, въ іюлѣ. 10—15 ф. Пряморослый кустъ.

**СЕКУРИНЕГА (Securinega).** *Securis*—топоръ и *nego*—отказывать, по твердости древесины. С. молочайных. (8). Умѣр. и троп. страны. Тепл., оранж. и вынос. куст. рр. Глнн. дерн. спящая. Черенками изъ полурѣзлага роста, въ песокъ, въ парникъ.

**С. дуриссима (S. durissima, самая твердая).** О. Маврикія. Цв. бѣлые, въ іюлѣ. 35 ф. Тепл. Сип. *С. Коммерсоны, С. нитида (S. Commersonii, S. nitida).* Это „bois dur“ колонистовъ.

**СЕЛЕНИПЕДИУМЪ (Selenipedium).** *Selenis*—полудлинный и *pedion* или *podion*—туфля, по губѣ. С. орхидей (12). Гористыя мѣстности Ю. Америки. Тепл. земныя рр., близкія къ Циприпедіумъ и нуждающіяся въ такомъ же уходѣ.

**С. карицидумъ (S. caricium, похожій на Карексъ).** Перу. Цв. блѣдно-зеленые, доли и лепестки съ бѣлыми краями. 1 ф. и выше. Сип. *С. Пирсеи, Циприпедіумъ карицидумъ (S. Pearcei, Cypripedium caricium).* **С. каудатумъ (S. caudatum, съ хвостами).** Перу. Цв. желтоватые съ коричневыми пятнами, въ апрѣлѣ—маѣ. Сип. *Циприпедіумъ каудатумъ (Cypripedium caudatum).* **С. Линдена (S. Lindenii, Линдена).** Нов. Гренада. Цв. бѣлые, въ маѣ. Сип. *Уропедіумъ Линдена (Uropedium Lindenii).* **С. Редліи (S. Roezlii, Рецля).** Нов. Гренада. Цв. бѣлые, доля спинная желтовато-зеленая, боковая—тѣлесная; лепестки зеленые съ пурпуровыми краями и губой, въ маѣ до мая. Сип. *Циприпедіумъ Редліи (Cypripedium Roezlii).* **С. Шляма (S. Schlama).** Нов. Гренада. Цв. бѣлые, съ тем-

но-розовыми крапинками, губа съ такимъ же пятномъ. Сип. *Циприпедіумъ Шляма (Cypripedium Schlami).* Кромѣ упомянутыхъ видовъ, въ садахъ воспитывается много гибридовъ.

**СЕЛЕНИА (Selenia).** *Selene*—луна; основаніе не объяснено. С. крестоцвѣтныхъ. (2). Техасъ и Арканзасъ. Малорослая однол. трав. рр. Какъ другіе однол.

**С. ауреа (S. aurea, золотистая).** Цв. золотисто-желтые, въ іюлѣ. 9 д.

**СЕЛЪДЕРЕЙ.** См. Апіумъ.

**СЕЛЯГИНЕЛЛЯ (Selaginella).** Уменьшительное Selago, — названіе плауна. С. плауновыхъ (300). Тропич. страны, глав. образомъ троп. Америка. Тепл., оранж. или полувынос. рр., похожія на мхн. Легкая съ добавленіемъ древеснаго угля или мелко разбитыхъ черенковъ. Черенками изъ стеблей. Вообще уходъ какъ за оранж. напоротниками. Поставленная числа соответствуютъ длинѣ стеблей.

**С. апусъ (S. apus, безногая).** Канада. 4 д. Оранж. Сип. *С. анда, С. денса (S. andea, S. densa).* **С. атровиридисъ (S. atroviridis, чернопозеленая).** Мадрагъ. 1 ф. Тепл. **С. Вальдихи (S. Wallichii, Вальдиха).** Индія. 2—3 ф. Тепл. **С. Вильденовіи (S. Willdenowii, Вильденова).** Кохинхина. 12—20 ф. Тепл. Сип. *С. цѣзля арбореа (S. caesia arborea).* **С. грандисъ (S. grandis, большая).** Борнео. 1½—2 ф. Сип. *С. платифилля (S. platyphylla).* **С. дентикулата (S. denticulata, зубчатая).** Средизем. побережье. 6 д. Оранж. **С. каналікулата (S. canaliculata, бороздчатая).** В. Гималаи. 3—4 ф. Сип. *С. каудата, С. синдизис, С. синдизис (S. caudata, S. sinensis, S. chinensis).* Тепл. **С. каулесценсъ (S. caulescens, стебельчатая).** Японія, Китай. 12 д. Тепл. Имѣетъ нѣсколько разновидностей. **С. куспидата (S. cuspidata, остроконечная).** Мексика. 6 д. Тепл. обыкновен. р. **С. Крауссіана (S. Kraussiana, Крауссова).** Ю. Африка. 6—12 д. Оранж. **С. левигата (S. laevigata, гладкая).** Мадагаскаръ. 1—1½ ф. Тепл. **С. лепидофилля (S. lepidophylla, съ чешуйчатыми лл.).** Отъ Техаса до Перу. Оранж. **С. Мартенсіи (S. Martensii, Мартенса).** Мексика. 6—12 д. Оранж. Имѣетъ много разновидностей. **С. Поултеріи (S. Poulterii, Поултера).** Азорскіе о. 2—3 д. Оранж. **С. унцината (S. uncinata, крючковатая).** Китай. 1—2 ф. Оранж. **С. хематода (S. haematoda, кровавая).** Анды. 1½—2 ф. Тепл. Одна изъ лучшихъ селягнелъ.

**СЕЛЪГО (Selago).** Древне-латинское названіе р., которое собирали друиды съ таинственными обрядами. С. селягивыхъ. (80). Мадагаскаръ, троп. и въ



трои. Африка. Песков. глин. дерн. или торф. съ пескомъ. Съменами или черенками изъ полурѣзлаго роста, въ песокъ, въ парникъ.

**С. Гилли** (*S. Gillii*, Гилли). Ю. Африка. Цв. малиновые; лл. скученные, бѣловатые. 6 д.

**СЕЛЯГОВЫЕ** pp. (*selagineae*). Куст., полукуст., многол. и однол. пр. изъ вѣт. тронич. странъ, исключая Австралію. Въ семействѣ всего 8 родовъ и около 140 видовъ. Наибольше известные роды: Глобулярія, Селяго, Хебенстретія.

**СЕМЕЙСТВО**. Отдѣлъ или разрядъ родовъ растений между собою подобныхъ и схожихъ. Семейство растений наз. *естественными*.

**СЕМЕКАРПУСЪ** (*Semecarpus*). *Se-me-ion* — мѣтка и *karpus* — плодъ; сокъ плода употребляется для окрашиванія бумажныхъ матерій. С. сердечниковыхъ. (20). Троп. Азія, преимущ. о. Цейлонъ. Тепл. дерев. пр. Уходъ какъ за Анакардіумъ.

**С. Анакардіумъ** (*S. Anacardium*, Анакардій). Остіндія (на горахъ). Цв. зеленовато-желтые, въ іюль и августъ. 50 ф.

**СЕМЕЛЕ** (*Semele*). *Семела*—мать мифологическаго Бахуса. С. лилейныхъ. (1). Оранж. цѣпкій кустарникъ. Сильная. Дѣлениемъ корня.

**С. андрогина** (*S. androgyna*, обоеполоя). Канарскіе о. Цв. мелкіе, зеленовато-бѣлые, въ апрѣль. Снп. *Рѣскусъ андрогинусъ* (*Ruscus androgynus*).

**СЕМЕЯНДРА** (*Semeiandra*). *Seme-ion*—мѣтка и *aner*, *andros*—мужчина, по чрезвычайной величинѣ одной изъ тычинокъ. С. онагриновыхъ. (2). По горамъ въ Мексикѣ. Оранж. куст. пр. Уходъ какъ за Фуксіа.

**С. грандифлора** (*S. grandiflora* крупноцвѣтная). Мексика. Цв. большіе шарлаховые, красивые, чашечка трубчатая, край о четырехъ сегментахъ, лепестки линейные, весной. 6 ф.

**СЕМИТЫЧНИКЪ**. См. Триенталисъ.

**СЕМПЕРВИВУМЪ** (*Sempervivum*). Древне-латинское названіе, употребленное Плиніемъ и составленное изъ *Semper vivo*—живу всегда. С. толстянковыхъ. (50). Гористая центр. и Южн. Европа, Мадера, Канар. о., Малайя Азія, Нубія, Абиссинія, Зап. Гималаи. Оранж. или выносл. сочныя трав. или полукуст. пр. Песков. Съменами или молодыми пр. вырастающими вокругъ старыхъ.

**С. арахноидеумъ** (*S. arachnoideum*, паутинистый). Цент. Европа. Цв. ярко-красные, слабо пахучіе, въ іюнь; лл. соединены тонкими бѣлыми волосками, какъ бы паутиной. 3—4 д. **С. аренариумъ** (*S. are-*

*num*, песочный). Тироль. Цв. блѣдно-желтые, лѣтомъ. 6—9 д. Снп. **С. соболіферумъ** (*S. soboliferum*). **С. атлантикумъ** (*S. atlanticum*, атлантический). Атласъ. Цв. блѣдно красные, лѣтомъ. 1 ф. **С. ауреумъ** (*S. aureum*, золотистый). Тенерифъ. Цв. желтые, въ іюль—августъ. 1 ф. Оранж. полукуст. Снп. **С. Болли**, **С. каллициформе** (*S. Bollii*, *S. calyciforme*), **Грандіа ауреумъ** (*Granovia aureum*). **С. Брауни** (*S. Braunii*, Брауна). Тироль. Цв. тускло-желтые, въ іюль, 6—9 д. **С. Вульфени** (*S. Wulfeni*, Вульфена). Центр. Европа. Цв. блѣдно желтые, лѣтомъ. 6—9 д. **С. калькареумъ** (*S. calcaratum*, мыльной). Альпы Дофинне. Цв. блѣдно-красные, лѣтомъ. 1—1½ д. Снп. **С. калифорникумъ** (*S. californicum*). **С. Ламоттеи** (*S. Lamottei*, Ламотта). Центр. Франція. Цв. блѣдно-малиновые, лѣтомъ. 1 ф. **С. Моггриджее (*S. Moggridgei*, Моггриджа). Альпы. Цв. красные, въ сентябрь. 9 д. **С. монтанумъ** (*S. montanum*, горный). Альпы и Пренен. Цв. блѣдно-пурпуровые, въ іюнь. 6 д. **С. Помелли** (*S. Romellii*, Помелли). Овернь. Цв. красно-розовые, яркіе, въ іюль. 6—9 д. **С. соболіферумъ** (*S. soboliferum*, дающий плети). Австралія. Цв. блѣдно-желтые, лѣтомъ. 6—9 д. **С. табулѣформе** (*S. tabulaeforme*, столообразный). Мадера. Цв. блѣдно-желтые, какъ сѣра, въ іюль—іюль. 1 ф. Оранж. куст. р. **С. фимбриатумъ** (*S. fimbriatum*, бахромчатый). Альпы Дофинне. Цв. ярко-красные, въ іюль. 6—9 д. **С. Функи** (*S. Funckii*, Функа). Тироль. Цв. красно-пурпуровые, яркіе, въ іюль. 6—9 д. **С. Хейффели** (*S. Heuffelii*, Гейффели). Трансильванія и Греція. Цв. красно-бурые, въ августъ. 6—8 д.**

**СЕНЕЦИО** (*Senecio*). Названіе, встрѣчаемое у Плинія и происходящее отъ *senex*—старикъ, по бѣлому хохолку цв. С. сложноцвѣтныхъ. (900). По всей поверхности земли. Тепл., оранж. или выносл., одно-, дву или многол. трав., полукуст., кустар., рѣдко древесн. пр. Глин. дерн. Съменами, дѣлениемъ и черенками. Уходъ, подобный какъ за Какалія, Кальцеоларія и Лигуларія.

**С. аргентеусъ** (*S. argentens*, серебряный). Чили. Цв. головки желтоватыя. 1—2 ф. Оранж. полукуст. **С. Дорія** (*S. Doria*, Дорія). Ю. Европа. Цв. головки желтыя, въ августъ 4 ф. Полувын. многол. **С. Дороникумъ** (*S. Doronicum*, Дороникумъ). Ю. Европа. Цв. головки желтыя, лѣтомъ. 1 ф. Многол. полувын. **С. макроглоссумъ** (*S. macroglossum*, съ большимъ языкомъ). Ю. Африка. Цв. съ желтыми лучами, лѣтомъ. Оранж. выносл. **С. пѣльхеръ** (*S. pulcher*, красивый). Уругвай. Цв. съ пурпуровыми лучами, лѣтомъ и осенью. 1—2 ф. Полул. многол.

**С. пирамидатусъ** (*S. pyramidatus*, пирамидальный). Ю. Африка. Цв. головки желтыя, лѣтомъ. 2 ф. Оранж. **С. спеціозусъ** (*S. speciosus*, особенный). Ю. Африка. Цв. ярко-пурпуровые, въ іюль. Оранж. многол. **С. хордафолія** (*S. chordifolia*, съ лл. какъ веревки). Ю. Африка. Цв. головки съ пурпуровыми лучами, лѣтомъ. 1—2 ф. Полувын. многол. **С. элегансъ** (*S. elegans*, нарядный). Ю. Африка. Цв. съ пурпуровыми лучами и желтымъ дискомъ. 1—2 ф. Имѣетъ разновидности съ махровыми цв.

**СЕРАПІАСЪ** (*Serapias*). Названіе, данное Dioscoridemъ одной орхидеѣ. С. орхидей. (5). Средиземное побережье, Азорскіе о. Выносл. земныя орхидеи. Уходъ какъ за Орхисъ.

**С. кордигера** (*S. cordigera*, съ сердцевидными цв.). Ю. Европа. Цв. коричневыя съ свѣтло-лиловыми. 1 ф.

**СЕРАФИТА** (*Seraphyta*). *Ser*—шелковичный червь и *phyton*—растение, по предполагаемому сходству цв. съ шелковичнымъ червемъ. С. орхидей. (1). Тепл. эпифитъ. Уходъ какъ за Эпидендрумъ.

**С. диффуза** (*S. diffusa*, растопыренная). Вестиндія. Цв. зеленоватые, въ апрѣль. 1—2 ф. Снп. **Эпидендрумъ диффузумъ** (*Epidendrum diffusum*).

**СЕРДѢЧНАЯ ТРАВА**. См. Вероника.

**СЕРДЕЧНИКОВЫЕ** pp. (*anacardiaceae*). Довольно многочисленное семейство изъ древесныхъ и кустарныхъ растений, содержащихъ млечный, смолотый сокъ. Къ этому семейству, между прочимъ, принадлежатъ: Анакардіумъ, Мангифера и Русъ. Цвѣтки незначительные.

**СЕРДЦЕВИНА**. Средняя часть растенія, проходящая отъ корня до вершины. Сердцевинные *лучи*—расположеніе сердцевины радиусомъ отъ средины стебля къ корѣ.

**СЕРЕЖКА**. Онадающій колосокъ изъ однопольныхъ безлестныхъ цвѣтковъ.

**СЕРЕНЖІЯ** (*Seringia*). *Serenus* (Nicolas Charles Seringe).—проф. и директоръ бот. сада въ Лионѣ. † 1858. С. навозниковыхъ. (1). Оранж. куст. р. Песокъ съ глин. дер. и торф. Черенками въ такой же землѣ, подъ стекломъ, или съменами.

**С. платифилля** (*S. platyphylla*, съ плоскими лл.). Австралія. Цв. бѣлые, въ іюнь. 10 ф.

**СЕРЕНОА** (*Serenoa*). *Sereno Watson* (Seren Watson), знаменитый с.-а. ботаникъ. С. пальмъ. (1) Оранж. красное р. Уходъ какъ за Сабаль.

**С. серрулата** (*S. serrulata*, мелко-зубчатая). Юж. Соед. Штаты. Лл. округлые, вѣерообразныя, въ 2—4 ф. длинной. Стволъ

въ 4—8 ф. Снп. *Сабаль серрулата* (*Sabal serrulata*).

**СЕРЖАНІЯ** (*Serjania*). Поль *Serjeant* (Paul Serjeant),—француз. монахъ и ботаникъ. С. мыловниковыхъ (60). Троп. Южн. Америка. Тепл. выносл. пр., не отличающіися особенною красотою въ встрѣчаемыя только въ ботанич. собраніяхъ.

**СЕРИКОКАРПУСЪ** (*Sericocarpus*). *Serikos*—шелковистый и *karpus*—плодъ; по волоскамъ на зерновкѣ. С. сложноцвѣтныхъ. (5). С. Америка. Многол. трав. выносл. пр. Уходъ какъ за Астеръ.

**С. кониоденсъ** (*S. conyzoides*, похожий на Конница). Цв. головки съ бѣлыми лучами, въ іюнь до августа. 1—2 ф. **С. солидагинеусъ** (*S. solidagineus*, похожий на Солидаго). Цв. головки съ бѣлыми лучевыми цв. 2 ф.

**СЕРИНГІЯ**. См. Серенжія.

**СЕРИССА** (*Serissa*). Отъ *Seris*, упоминаемаго Dioscoridemъ. С. мареновыхъ. (1). Оранж. куст. р. Глин. дерн. съ торф. и пескомъ. Черенками въ песокъ, въ парникъ.

**С. фѣтида** (*S. foetida*, вонючая). Индія, Китай, Японія. Цв. бѣлые, лѣтомъ. 2 ф. Одна разновидность съ махровыми цв., другая съ отороченными желтою каймою лл.

**СЕРПЪ**. Зазубренный кривой ножъ для сжатія хлѣба или травы съ корня.

**СЕРРАТУЛА** (*Serratula*). *Serratula*—пилька, по лл. С. сложноцвѣтныхъ. (30). Европа, С. Африка и Азія. Выносл. многол. трав. пр. Обыкновен. Съменами или дѣлениемъ.

**С. квинкефолія** (*S. quinquefolia*, пятилистная). Кавказъ. Цв. головки ярко-пурпуровыя, въ іюль. 3 ф.

**СЕРРЮРИЯ** (*Serruria*). *Serrurier* (Serrurier), проф. бот. въ Утрехтѣ. С. протейныхъ. (52). Южн. Африка. Оранж. куст. пр., пущающіися въ такомъ-же уходѣ какъ Протеа.

**С. вильдлова** (*S. villosa*, косматая). Цв. пурпуровые, въ іюль. 2 ф. и выше. **С. амагината** (*S. emarginata*, съ выемками). Цв. малиновые, въ іюль. 2 ф. Снп. *Протеа абротанифолія* (*Protea abrotanifolia*).

**СЕСБАНИЯ** (*Sesbania*). Арабское названіе. С. бобовыхъ. (16). Жаркая страна. Тепл. или оранж. трав. или куст. пр. Глин. дернов. съ песков. торф. Съменами или черенками изъ полурѣзлаго роста въ песокъ, въ парникъ. Тепл. зимой до 13, лѣтомъ до 26°.

**С. везикария** (*S. vesicaria*, пузырная). Флорида и Каролина. Цв. желтые, въ іюль—августъ. 5—7 ф. Оранж. однол. Снп. *С. платикарпумъ*, *Глоттидумъ флориданумъ*



(*S. platycarpum*, *Glottidium floridanum*). *C. египтіака* (*S. aegyptiaca*, египетская). Египет. Цв. желтые, в июль—август. 5 ф. Тепл. куст. *C. макркарпа* (*S. macrocarpa*, крупноплодная). Флорида. Мексика. Цв. желтые, в август и сентябрь. 3 ф. Оранж. куст.

**СЕСЕЛИ** (*Seseli*). Греческое название, данное Гипократом одному зонтичному р. *C. зонтичных*. (40). Сѣв. умѣр. мѣстности. Многол. иногда двул. трав. рр. Обычн. сад. Сѣменами.

*C. гуммифера* (*S. gummiifera*, камедистое). Таврскія горы. Цв. бѣлые съ малиновымъ, отѣнкомъ, съ іюля до сентября. 3—4 ф. Изъ срѣзаннаго стебля вытекаетъ камедь. Красное дуул.

**СЕСІУМЪ** (*Seschium*). *Sekos* — прикормка, плоды въ Вестиндіи идутъ на кормъ свиней. *C. тыквенныхъ*. (1). Вестиндія. Троп. Африка и Америка. Ухождъ какъ за тыквой вообще.

*C. ѣдуле* (*S. edule*, съедомый). *Чакочайота*. Отечество неизвѣстно. Цв. желтые, в июль; плоды яйцевидные или грушеобразные, употребляемые въ пищу, корни толстые и мясистые, тоже съедомые. 6—12 ф.

**СИВТОРПІЯ** (*Sibthorpia*). *Сибторпъ* (*Sibthorp*), проф. бот. въ Оксфордѣ. † 1796. *C. поричниковыхъ*. (6). З. Европа, троп. и С.-З. Африка, Непаль и Ю. Америка. Оранж. трав. рр. Легкая, сильная. Дѣленіемъ или черенками.

*C. peregrina* (*S. peregrina*, иноземная). Мадера. Цв. желтые, в июнь. Распростертое р.

**СИГМАТОСТАЛИКСЪ** (*Sigmatostalys*). *Sigma*, *sigmatos*, — похожій на букву сигму (Σ) и *stalis* — колы. *C. орхидей*. (7). Троп. Америка. Тепличн. низкорослыя рр. Ухождъ какъ за Онцидиумъ.

*C. мальдифера* (*S. malleifera*, съ молоткомъ). Нов. Гренада. Цв. желтые съ коричневыми пятнами. *C. радикаль* (*S. radicans*, укореняющийся). Бразилія. Цв. желтые, съ зеленоватымъ и пурпуровымъ отѣнкомъ.

**СИГНАТУРА**. Приставленная или привязанная къ растенію подпись его названія. Дѣлается обычно изъ деревянной дощечки, но бываетъ металлическая, фарфоровая, аспидная и бумажная.

**СИДА** (*Sida*). У Теофраста такъ названа кушника (пурпура). *C. мальвовыхъ*. (80). Жаркія страны въ Африкѣ и Азіи, Австралія и Америка. Оранж. или выносл. трав., полукуст. и куст. рр. Сильная. Сѣменами и черенками, въ песокъ, въ парникъ.

*C. инѣквалис* (*S. inaequalis*, съ косо-

бокими лл.). Бразилія. Цв. рыжеватые, вѣтчикъ бѣлый, въ маѣ. 7 ф. Тепл. кустъ. *C. Напѣа* (*S. Napea*, рѣпчатая). С. Америка. Цв. бѣлые, мелкіе, въ августъ до ноября. 3 ф. Тепл. полукуст.

**СИДАЛЬЦЕА** (*Sidalcea*). Составное изъ *Sida* и *Alcea* — древне-греч. названія мальвы; по сходству съ обими рр. *C. мальвовыхъ*. (8). З. С. Америки. Полувыносл. многол. трав. рр. Ухождъ какъ за Мальва.

*C. кандида* (*S. candida*, бѣлая). Колорадо. Цв. бѣлые, лѣтомъ. 2—3 ф. *C. мальведфлора* (*S. malvaeflora*, съ цв. какъ у Мальвы). Техасъ. Цв. лиловые, лѣтомъ. 1½ ф. Снп. *Каллирбе спиката* (*Calirhoe spicata*).

**СИДЕРИТИСЪ** (*Sideritis*). *Sideros* — желѣзо, по предполагавшимся свойствомъ заживать раны холоднаго оружія. *C. губоцвѣтныхъ*. (45). Средиз. побережье, Востокъ. Оранж. или полувыносл. трав., полукуст. и куст. рр. Сухая песковатая или мѣловая. Сѣменами, черенками и дѣленіемъ. У всѣхъ желтые цв., лѣтомъ.

*C. канариензис* (*S. canariensis*, съ Канарскихъ о.). Тенерифъ. Нѣск. футовъ выш. Оранж. куст. р. *C. кордіоидесъ* (*S. cordioides*, похожій на Кордіумъ), Ю. Европа. 1 ф. Полувын. полукуст.

**СИДЯЧІЙ**. Вырастающій непосредственно, безъ промежуточной части.

**СИЗИРИНХІУМЪ** (*Sisyrinchium*). Такъ называлъ Теофрастъ мятъ. *C. крестоцвѣтныхъ*. (80). Умѣр. и холод. страны сѣв. полушарія, иногда попадаютъ въ южномъ. Одно-или двул. трав. рр.

*C. грандифлорумъ* (*S. grandiflorum*, крупноцвѣтный). С. Америка. Цв. темно-пурпуровые, въ маѣ. 8—10 д. Снп. *C. Дугласи* (*S. Douglasii*). *C. иридофоліумъ* (*S. iridifolium*, съ лл. какъ у Ириса). Бразилія до Чили. Цв. желтоватые, в июнь. 4—12 д. *C. лаксумъ* (*S. laxum*), *Марика иридофоліа* (*Marica iridifolia*).

**СИКОМОРУСЪ** (*Sycomorus*). Древне-греческое названіе, употребленное Dioscoridemъ и происходящее отъ *sycos* — смоква и *moros* — шелковица. *C. крапивныхъ*. (20). Тепл. или оранж. древ. рр. Старога Свѣта.

*C. антикворумъ* (*S. antiquorum*, древнихъ). Египетъ. Цв. зеленоватые или желтоватые; лл. овальные. Снп. *Фикусъ сикоморусъ* (*Ficus sycomorus*).

**СИКОМОРЪ**. См. Плитанусъ.

**СИЛЕНЕ** (*Silene*). Отъ *sialon* — слюна, по клейкому отдѣленію стебля и чашечки многихъ видовъ. *C. гвоздичныхъ*. (400). Ю. Европа, С. и Ю. Африка, тропич. Азія и С. Америка. Оранж. или выносл. одно-, дву-и многол. трав. рр. Легкая,

глин. дерн. Сѣменами, черенками и дѣленіемъ.

*C. акаулисъ* (*S. acaulis*, безстебельное). Европа. Цв. малиновые, рѣдко бѣлые, в июнь—августъ. 2 д. Многол. *C. альпестрисъ* (*S. alpestris*, альпійское). Австрійскія Альпы. Цв. бѣлые, довольно большіе, въ маѣ до іюля. 6 д. Многол. *C. Атоціонъ* (*S. Atocion*, *Атоціонъ*). Левантъ. Цв. малиновые, в июнь и июль. 6—12 д. Однол. *C. виргиника* (*S. virginica*, виргинское). С. Америка. Цв. темно-карминные, в июнь до августа. 1—2 ф. Многол. *C. маритима* (*S. maritima* морская). Европа. Цв. бѣлые, съ іюля до августа. Многол. распростертое. *C. пендула* (*S. pendula*, пониклое). Италия. Цв. тѣлесные, въ маѣ до августа. Однол. распростертое. *C. пенсильваника* (*S. pensylvanica*, пенсильванское). С. Америка. Цв. малиновые, съ апрѣля до іюля. 4—8 д. Многол. *C. саксифрага* (*S. saxifraga*, камнеломковое). Ю. Европа. Цв. желтоватые, снизу красноватые, съ іюня до августа. 3—6 д. Многол. *C. Хукери* (*S. Hookeri*, Гукера). Калифорнія. Цв. свѣтло-малиновые, въ маѣ. Многол. лежачее. *C. Шафта* (*S. Schafta*, Шафта). Персія. Цв. пурпуровые, съ іюня до октября. 6 д. Многол. *C. Элизабетѣ* (*C. Elisabethae*, Елизаветы). Италия. Цв. съ малиново-красными лепестками, в июль. 9 д. и выше. Многол.

**СИЛІВУМЪ** (*Silybum*). Древне-греч. названіе встрѣчаемое у Dioscorida. *C. сложновѣтныхъ*. (1). Дуул. трав. р. Обычн. садов. Сѣменами.

*C. Маріанумъ* (*S. Marianum*, св. Маріи). Ю. Европа. Цв. головки розово-пурпуровыя, в июль до сентября. 1—4 ф. Лл. съ бѣлыми на верхней сторонѣ пятнами.

**СИЛЬФИУМЪ** (*Silphium*). Древне-греч. названіе, встрѣчаемое у Гипократа. *C. сложновѣтныхъ*. (11). С. Америка. Трав. многол. рр. Обычн. садов. Дѣленіемъ.

*C. лацинѣатумъ* (*S. laciniatum*, разрыванный). Цв. головки желтыя, в июнь. 3—6 ф. Лл. этого рр. въ преріяхъ обращены на С. и Ю., поэтому р. называютъ *компасовымъ* или *полярнымъ*.

**СИМАБА** (*Simaba*). Мѣстное названіе въ Гвинѣѣ. *C. синарубовыхъ*. (14). Ю. Америка. Тепл. куст. или древ. рр. Глин. дерн. волокнистая. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ песокъ, въ парникъ, или привозными сѣменами.

*C. Цедронъ* (*S. Cedron*, *цедронъ*). Нов. Гренада. Цв. кистями; плоды въ гусиное яйцо; лл. перистые. Сѣмена имѣютъ противухорадоочныя свойства и на роднищъ служатъ средствомъ отъ укушенія змѣй.

**СИМАРУБА**. (*Simaruba* или *Sima-*

*rouba*). Мѣстное названіе. *C. синарубовыхъ*. (3). В. тропич. Америка. Тепл. древ. рр. Ухождъ какъ за Квассіа.

*C. амара* (*S. amara*, горькая). Вестиндія. Цв. желтоватые, в маѣ. 10 ф. Снп. *C. официнальнисъ* (*S. officinalis*).

**СИМАРУБОВЫЯ** (*Simarubaeae*). Деревья или безстебельные кустарники изъ тропич. и жаркихъ странъ. Въ семействѣ 31 родъ и около 112 видовъ. Наибольше извѣстные роды Баляинтесъ, Квассія, Синара и Синаруба.

**СИМЕТИСЪ** (*Simethis*). *Симетиса* — нимфа. *C. лилейныхъ*. (1). Многол. выносл. трав. р., встрѣчаемое въ Ирландіи. Перегонитъ съ пескомъ. Дѣленіемъ.

*C. бѣкодоръ* (*S. bicolor*, двуцвѣтный). Европа. С.-З. Африка. Цв. бѣлые, снизу пурпуровые, в июнь. *C. планифолія* (*S. planifolia*).

**СИММОНДСІЯ** (*Simmondsia*). *Симмондс* (*Simonds*) — ботаникъ и путешественникъ, † 1805. *C. молочайныхъ*. (1). Кустарное, полувын. р. Легкая глин. дерн. съ торф. Черенками.

*C. калифорника* (*S. californica*, калифорнская). Калифорнія. Цв. зеленоватые.

**СИМПІЕЦА** (*Sympieza*). *Sympieso* — давить, прижимать: по тычинкамъ, приросшимъ къ трубкѣ вѣтчика. *C. вересковыхъ*. (5). Ю. Африка. Оранж. куст. рр. Волоки. торф. съ пескомъ. Черенками изъ молодого роста въ песокъ, подъ рамами.

*C. капительлата* (*S. capitellata*, съ маленькими головками). Цв. малиновые, в июль. 1½ ф.

**СИМПОКАРПУСЪ** (*Symplocarpus*). *Symploke* — соединеніе и *karpos* — плодъ, по срастанію плодниковъ. *C. ароидныхъ*. (1). Америка, С.-В. Азія и Японія. Полувыносл. многол. водяное р., имѣющее воночіи запахъ, какъ отъ хорька. Торфян. болотистая. Дѣленіемъ.

*C. фѣтидусъ* (*S. foetidus*, воночіи). Цв. въ плодососе; чехолъ полосатый пурпуровый съ желто-зеленымъ, потоготъ фиолетовый, въ маѣ. 1 ф. Снп. *Помбесъ фѣтидусъ* (*Pothos foetidus*).

**СИМПОЛОСЪ** (*Symplocos*). *Symploke* — соединеніе, по сросшимся основаніямъ тычинокъ. *C. стипраксовыхъ*. (150). Жаркія страны Азіи, Австраліи и Америки. Тепл. и оранж. древ. или куст. рр. Глин. дерн. съ торф. и пескомъ. Черенками въ песокъ, подъ рамами.

*C. кокцинеа* (*S. coccinea*, шарлаховый). Мексика. Цв. красные, в маѣ. 10 ф. Тепл. дерево. *C. японіка* (*S. japonica*, японскій). Японія. Цв. блѣдножелтые, в июнь. 10 ф. Оранж. дерево.



**СИМФИТУМЪ** (*Symphytum*). Древне-греч. название, взятое у Диоскорида: *symphoeo* — сроснуть, по предлагавшемуся способу заживлять раны. С. бурачниковыхъ. (4). Европа, С. Африка и З. Азия. Выносл. трав. пр. Обык. сад.; могут расти под деревьями, цвѣтутъ почти все лето; размнож. дѣлениемъ.

С. **кавказикумъ** (*S. caucasicum*, кавказский). Кавказъ. Цв. голубые; лл. ланцетовидные, съ волосками. 3 ф. С. **туберозумъ** (*S. tuberosum*, клубневой). Европа. Цв. желто-охристые. 1—2 ф. Корневище короткое.

**СИМФИАНДРА** (*Symphiandra*). *Symphio* — расти вмѣстѣ, и *aner, andros* — пыльникъ; по сросшимся пыльникамъ. С. колокольчиковыхъ (7). Востокъ. Выносл. многол. трав. пр. Сильная песков. глин. дерн. при хорошемъ водостокѣ. Черенками изъ молодого роста и съемами.

С. **Ваннери** (*S. Wanneri*, Ванныера). Албѣя. Цв. голубые, лѣтомъ. 6 д. Син. *Campanula Wanneri* (*Campanula Wanneri*).

**СИМФИОСТЕМОНЪ** (*Symphiostemon*). *Symphoeo* — соединять и *stemon* — тычинка; по сросшимся внизу тычинкамъ. С. косатиковыхъ. (3). Вѣт.-троп. Ю. Америка и на Андахъ. Оранж. многол. трав. пр. Песков. глин. съ листов. Съемами или отпрысками, весной.

С. **нарциссойдесъ** (*S. narcissoides*, похожий на Нарцисъ). Юж. берега Ю. Америки. Цв. бѣловатые съ пурпуровыми жилками, душистые, въ июлѣ. 1—1½ ф. Син. *Sisyrinchium odoratissimum* (*Sisyrinchium odoratissimum*).

**СИМФОРИКАРПУСЪ** (*Symphoricarpos*). *Symphoreo* — нести вмѣстѣ и *karpos* — плодъ; по скученнымъ ягодамъ. С. жимолостныхъ. (6). С. Америка. Горы Мексики. Выносл. куст. пр. Обыкн. садовая. Отпрысками.

С. **окциденталисъ** (*S. occidentalis*, западный). С. Америка. Цв. бѣлые, лѣтомъ; плоды тоже бѣлые; лл. овальные. С. **рацемозусъ** (*S. racemosus*, вѣтвистый). *Синьюное дерево*. С. Америка. Цв. розовые, съ июля до сентября; плоды бѣлые, дов. большіе; лл. снизу сизые. 4—6 ф.

**СИНАДЕНИУМЪ** (*Synadenium*). *Syn* — вмѣстѣ и *aden* — железа; железки обертки соединены въ дискъ. С. молочайныхъ. (3). Ю. и троп. В. Африка. Тепл. куст. пр. Песков. глин. дерн. съ коровникъ переносимъ. Черенками обсушенными внизу, въ песокъ, въ парникъ.

С. **Грантіи** (*S. Grantii*, капит. Гранта). Центр. Африка. Цв. красно-пурпуровые, въ ноябрѣ. 6—10 ф.

**СИНАНДРА** (*Synandra*). *Syn* — вмѣстѣ и *aner, andros* — пыльникъ; задніе безплодные пыльники срослись. С. губоцвѣтныхъ. (1). Выносл. многол. трав. пр. Уходъ какъ за Ляміумъ.

С. **грандифлора** (*S. grandiflora*, крупноцвѣтная). С. Америка. Цв. бѣлые, въ июлѣ. 1—2 ф.

**СИНАПИСЪ** (*Sinapis*). Древне-греч. название горчицы. С. крестоцвѣтныхъ. (7). Европа, Азия. Трав. однол. выносл. р.

С. **альба** (*S. alba*). *Вълая горчица*. Европа. Цв. желтые, въ июлѣ, 3 ф. Легкая, перегнойная глин. дерн. Съемами весной. Для получения съмянъ сѣять рѣдко; на рѣску въ салатъ — густо, на воздухъ и въ парникъ.

**СИНГОНІУМЪ** (*Syngonium*). *Syn* — вмѣстѣ и *gone* — утроба, по сросшимся яичникамъ. С. ароидныхъ. (3). Троп. Америка. Тепл. вьющ. куст. пр. Глин. дерн. съ торф. или листов. и пескомъ. Черенками изъ стеблей, частями съ 3 междоузліями.

С. **ауритумъ** (*S. auritum*, съ ушками). Ямайка. Чехолъ пурпуровый съ желтымъ отворотомъ; лл. 3 или 5 раздѣльные, широко-овальные. С. **подофиллюмъ альбо-линеатумъ** (*S. podophyllum albo-lineatum*; стопообразный съ бѣлыми полосками). Центр. Америка. Лл. стрѣловидные, взрослые продолговато-ланцетовидные съ бѣлыми жилками. Син. С. *Зеemannii* (*S. Zeemannii*).

**СИНЕГОЛОВНИКЪ**. См. Потериумъ.

**СИНЕХАНТУСЪ** (*Synechanthus*). *Syneches* — непрерывный и *anthos* — цв., по цвѣторасположенію. С. пальмъ. (3). Центр. Америка и Колумбія. Тепл. перистолостные пальмы. Уходъ какъ за Хамедореей.

С. **фиброзусъ** (*S. fibrosus*, волокнистый). Центр. Америка. Лл. длинной въ 4 ф., листочки многочисленныя, длинной въ 1—1½ ф. Стволъ 4 ф.

**СИНЬЛНИКЪ**. См. Изатисъ.

**СИНІЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ**. См. Горечавка.

**СИННОТІЯ** (*Synnotia*). *Синнотъ* (*Synnot*) — коллекторъ капскихъ пр. С. косатиковыхъ. (3). Ю. Африка. Оранж. лукович. пр. Песков. глин. дерн. Отпрыски съемами.

С. **варіега** (*S. variegata*, пестрая). Цв. желтые съ фіолетовымъ, въ маѣ; лл. мечевидные, овально-ланцетовидные.

**СИНИЮШНЫЯ** пр. (*polemoniaceae*). Приморскія или вьющіяся травянистыя, рѣдко кустарныя породы, большинство которыхъ встрѣчается въ Сѣв. Америкѣ и на Анскомъ хребтѣ въ Южной, нѣкоторые виды растутъ въ Европѣ и умѣ-

ренной Азій. 8 родовъ и болѣе 150 видовъ. Гилія, Кольомія, Полемоніумъ, Флоксъ.

**СИРИНГА** (*Syringa*). *Syrin*, *syringos* — трубка, длинная прямая вѣтвь содержитъ сердцевину. С. масличныхъ. (10). В. Европа, умѣр. Азия. Полувын. или выносл. куст. пр. Обыкн. сад. Отводкой, побѣгами, черенками и съемами; рѣдкіе сорта — прививкой.

С. **вульгарисъ** (*S. vulgaris*, обыкновенная). *Сирень*. Персія. Венгрія. Цв. красные, голубые или бѣлые, душистые, въ маѣ. 8—20 ф. Имѣетъ много красивыхъ разновидностей. С. **іозикѣа** (*S. Iosikea*, графини Іозика). Венгрія. Цв. бѣдно-пурпуровые, безъ запаха, въ маѣ. 5—10 ф. С. **персика** (*S. persica*, персидская). Персія. Цв. голубовато-пурпуровые или бѣлые, въ маѣ — июлѣ. 4—5 ф. Самый низкорослый видъ. С. **эмоди** (*S. Emodi*, съ горы Эмодуса). Гималаи. Цв. пурпуровые или бѣлые, въ апрѣлѣ. 6 ф. Сирень обыкнов. и персидская употребляется для выгонки къ раннему цвѣтенію.

**СИРИНГОДЕА** (*Syringodea*). *Syrigodes* — трубчатый, по тонкой трубкѣ цв. покрова. С. косатиковыхъ. (3). Ю. Африка. Низкорослая оранж. трав. пр. Уходъ какъ за Іксисъ.

С. **пульхелля** (*S. pulchella*, красивая). Цв. бѣдно-пурпуровые, осенью. 3—4 д.

**СИРЕНЬ**. См. Сиринга.

**СИСТЕМА**. Планъ, порядокъ расположенія. Последовательный порядокъ.

**СИТНИКОВЫЯ** или **СИТОВНИКОВЫЯ** пр. (*juncaceae*). Семейство, содержащее до 130 видовъ многолѣтнихъ, рѣдко однолѣтнихъ травянистыхъ пр., встрѣчаемыхъ преимущ. въ умѣренномъ и арктическомъ поясахъ. Наиболѣе извѣстные роды: Калектазія, Кингія, Ксанторрея, Ксеротесъ, Луцуня и Юнкусъ.

**СИТО**. Употребляется для различныхъ цѣлей и потому различной крупности. Черезъ сито просѣивается земля для горшечныхъ растений, сѣмена для отдѣленія шелухи и сору.

**СИФОКАМПИЛОСЪ** (*Siphocampylus*). *Siphon* — трубка и *campylus* — согнутый; по вѣтвичку. С. колокольчиковыхъ. (100). Троп. Америка. Тепл. или оранж. трав. полукуст. или куст. пр. Легкая, дернистая глинистая съ торф. Черенками.

С. **бетулѣфоліусъ** (*S. betulaeifolius*, съ лл. какъ у березы). Органіи горы. Цв. красные, въ июлѣ. 3 ф. Тепл. С. **гладулозусъ** (*S. glandulosus*, железный). Богота. Цв. розовые, въ июлѣ. 3 июлѣ. 3 ф. Тепл. С. **кохцинеусъ** (*S. coccineus*, шарлаховый). Органіи горы. Цв. шарлахо-

вые, въ июлѣ. 3 ф. Тепл. полукуст. С. **манеттіефлорусъ** (*S. manettiaeflorus*, съ цв. какъ у Манеттіи). Нов. Гренада. Цв. красные съ желтымъ, въ апрѣлѣ. 1 ф. Тепл. полукуст. С. **Хумбольдтіанусъ** (*S. Humboldtianus*, Гумбольдтовъ). Перу. Цв. шарлаховые, лѣтомъ. 3 ф. Тепл.

**СИАГРУСЪ** (*Syagrus*) Название пальмы, встрѣчаемое у Плинія. С. пальмъ. (7). Троп. страны. Тепл. пр. съ перистыми лл. Уходъ какъ за Кокосъ.

С. **кампестрисъ** (*S. campestris*, полевой). Бразилія. Лл. 2—6 ф. длинной съ перьями въ 1½—2 ф. длинной; стволъ внизу разширенный. С. **кокойдесъ** (*S. cocoides*, похожий на Кокосъ). Бразилія. Лл. макушечные, длинной 4—6 ф., перья въ 9—12 д. длинной. Стволъ 8—10 ф.

**СКАВІОЗА** (*Scabiosa*). *Scabies* — чешотка, отъ которой будто-ты избавляется р. С. нореликовыхъ. (80). Европа, Азия, Африка. Преимущ. одно или многол. трав. пр. и притомъ вынослными, либо полувыносл. Садовая. Съемами и дѣлениемъ.

С. **амѣна** (*S. amena*, пріятная). Россія. Цв. головки лиловые или розовые, въ июлѣ — июлѣ. 2—3 ф. С. **атропурпуреа** (*S. atropurpurea*, чернопурпуровая). Ю.-З. Европа. Цв. головки темно-карминовые, съ пріятнымъ запахомъ, въ июлѣ — августѣ. 2—3 ф. Однол. Имѣетъ очень много красивыхъ разновидностей съ цв. различной окраски. С. **Веббіана** (*S. Webbiana*, Вебба). Фригія. Цв. головки желтыя, въ июлѣ. 6 д. С. **кавказика** (*S. caucasica*, кавказская). Кавказъ. Цв. головки голубыя, въ июлѣ до августа. 1 ф.

**СКАФИГЛОТТИСЪ** (*Scaphyglottis*). *Skaphē* — лодка и *glotta* — языкъ; по полою губѣ. С. орхидей. (8). Троп. Америка. Тепл. эпифиты. Уходъ какъ за Кеттлейей.

С. **виолѣцеа** (*S. violacea*, фіолетовый). Демарара. Цв. фіолетовые, мелкіе, губа бѣлая.

**СКИММИЯ** (*Skimmia*). *Скимми* — мѣстное японское названіе С. рутовыхъ. (6). Гималаи, Японія. Оранж. кустарн. пр. Глин. дерн. съ торф. Черенками въ песокъ, въ умѣренномъ нагрѣтомъ грунтѣ и съемами.

С. **лауреоля** (*S. Laureola*, лавролистная). Непаль. Цв. бѣдно-желтые, очень пахучіе, весной; лл. продолговато-ланцетовидные. 4 ф. Син. *Лимонія лауреоля* (*Limonia lauroleola*). С. **облѣта** (*S. oblata*, со сплюснутыми плодами). Японія. Плоды киповарно-красные, плоскіе; муженіе экз. въ садахъ называютъ *С. фразгрантиссима* (*S. fragrantissima*) по сильному запаху цв. С. **рубелля** (*S. rubella*, красноватая). Китай. Цв. зеленовато-бѣлые, душистые. С. **японика** (*S. japonica*, японская). Японія. Цв. бѣлые, съ превосходнымъ запахомъ, въ



мартъ. 3—4 ф. Имѣеть нѣсколько разновидностей.

**СКАМЕЙКИ** для отдыха гуляющихъ въ саду или паркѣ дѣлаются изъ дерева или желѣза, простыя или со спинками, либо съ наметомъ отъ солнца, а также съ откиднымъ сидѣньемъ, въ предупрежденіе его отсырѣлости отъ дождя или росы. Размѣръ тоже различный, но болѣе чѣмъ для восьмерыхъ не принять.

**СКЛЕРІЯ (Scleria).** *Scleria* — твердость, крепость; по плоду. С. ситовнико-выхъ. (100) Тропич. страны до умѣр. С. Америк. Тепл., оранж. или выносл. трав. pp. Уходъ какъ за Циперусъ.

С. **вертициллата** (S. verticillata, кольча-чая). С. Америка. Цв. колоски мелкіе, въ іюнь, іюль; дл. линейные. 6—12 ф. С. **ци-лиата** (S. ciliata, ресничная). Ю. Соед. Шт. Колоски безплодные большіе, въ іюль до августа. 1—2 ф.

**СКЛЕРОТАМНУСЪ (Sclerotheramus).** *Scleros* — твердый и *thamos* — кустъ. С. бобовыхъ. (1). Оранж. кустъ. Уходъ какъ за Хорицеа.

С. **микрофиллюсъ** (S. microphyllus, мелколистный). Австралія. Цв. желтые, мелкіе, въ маѣ. Спн. *Эмтасія эмпетрифолия* (Eutascia empetrifolia).

**СКЛЕРОТІЙ.** Уплотненная грибница, изъ которой можетъ развиться сумчатый или базидіальный грибъ.

**СКВЕРЪ.** Площадъ въ городѣ, огороженная и обсаженная деревьями и кустами.

**СКВОЗНИНА ДЛИННАЯ** или **ЦАРСКИЙ ПИЩЪ.** Ранній сортъ наливного яблока, цилиндрической формы. желтаго цвѣта, пріятнаго вкуса, съ рыхлою мякотью. С. **круглая** или **Сквозной наливъ.** Ранній сортъ наливного яблока круглой формы, кислаго вкуса, дѣлающагося лучшимъ, когда наливается (сдѣлается сквознымъ). С. **круглая.** Ранній наливной сортъ, сходный съ С. круглой, только крупнѣе.

**СКОЛИМУСЪ (Scolymus).** Древнегреч. названіе, встречаемое у Теофраста и также Гезіода. С. сложноцвѣтныхъ. (3). Средиземн. побережье. Выносл. одно-дву-и многол. трав. pp. Обыкн. садов. Сѣменами и дѣленіемъ.

С. **грандифлорусъ** (S. grandiflorus, крупноцвѣтный). Средиз. побережье. Цв. головки желтыя, въ маѣ. 3 ф.

**СКОЛОПЕНДРИУМЪ (Scolopendrium).** Древнегреч. названіе, взятое у Теофраста и данное, по многочисленнымъ параллельнымъ черточкамъ на плодѣ, похожимъ на ноги сколопендры. С. панороти-никовыхъ. (9). Европа, Востокъ, Алжи-

рія, Америка, Остиндія. Тепл., оранж. и выносл. pp.

С. **вульгаре** (S. vulgare, обыкновенный). *Олений языкъ.* Европа. Ваи въ 6—18 д. длиной, ярко-зеленыя, вильды, съ волнистыми краями; черешки твердые. Спн. С. **офи-цинарій** (S. officinarum). Имѣеть много разновидностей. С. **пиннату** (S. pinnatum, перистый). Филиппинскіе о. Ваи длиною въ 2—4 ф. съ конечнымъ длиннымъ перомъ. Оранж. С. **ризофиллюмъ** (S. rhizophyllum, съ укореняющимися дл.). С. Америка Ваи ланцетовидныя, въ 4—9 д. длиною. Концы ихъ, коснувшись земли, окореняются и производятъ самостоятельныя pp. Оранж.

**СКОПОЛІЯ (Scopolia).** Д. А. *Скополи* (J. A. Scopolii) — проф. натуральной исторіи въ Павіи, + 1788 С. пасленовыхъ. (3). Европа, Японія, Гималаи. Выносл. и полувын. многол. трав. pp. Сухая, легкая. Дѣленіемъ.

С. **карніолика** (S. carniolica, карніо-лійская). *Сибирская блена.* Россія. Цв. красные, желтые внутри, въ апрѣлѣ. 1 ф. и выше.

**СКОРЛУПЪ.** Кожура. Твердая оболочка.

**СКОРОДЪ.** См. Алыіюмъ.

**СКОРОСПѢЛЫЙ.** Пospѣвающий скоро, ранѣе обыкновеннаго срока.

**СКОРПІЕВИДНЫЙ.** Одностороннее цвѣторасположеніе, въ почкѣ свернутое попереку; въ болѣе же тѣсномъ смыслѣ двустороннее расположеніе цвѣтовъ, которые размѣщены попеременно: одинъ вправо, другой влѣво.

**СКОРПИУРУСЪ (Scorpiurus).** *Scorpius* — скорпионъ и *oura* — хвостъ, по закрученнымъ стручкамъ. С. бобовыхъ. (6). Ю. Европа, С. Африка и З. Азія. Полувыносл. трав. pp. Сѣменами, какъ лѣтники вообще.

С. **вермикулата** (S. vermiculata, червеобразный). Цв. желтые съ красными черточками на флагѣ, въ іюнь — іюль. Стручки свернутые, морщинистые, похожіе на гусеницу наскочаго.

**СКОРЦОНЕРА (Scorzonera).** Съ древне-франческаго *scorzon* или каталонскаго *scurzon* — змѣя; прежде употреблялось въ Испаніи отъ ужаленія змѣй. С. сложноцвѣтныхъ. (120). Европа, С. Африка, Цент. и Зап. Азія. Многол., рѣже дву-или однол. трав. pp. Глин. дерн. съ торф. и нескомъ Сѣменами и дѣленіемъ.

С. **ундулата** (S. undulata, волнистая). Алжиръ и Марокко. Цв. головки розово-пурпуровыя, въ іюль. 1—2 ф. Многол. полувыносл. С. **хиспаніка** (S. hispanica, испанская). *Ослиный корень.* Ю. Европа.

Цв. головки желтыя, съ іюня до сентябрі. Корень длинный съ черной кожей, внутри бѣлый, употребляется въ пищу какъ овощъ. Землю требуетъ глубокую, рыхлую. Размн. сѣменами весной; хотя это р. — многол., но корень получается въ томъ же году, осенью.

**СКОТТЕА (Scottea) P. Скоттъ** (R. Scott), — проф. ботаники въ Дублинѣ. С. бобовыхъ (1). Австралія. Оранж. куст. р. Песков. торф. Черенками изъ молодаго роста, въ песокъ, подъ стекломъ.

С. **дентата** (S. dentata, зубчатая). Цв. красно-оранжевые, съ зеленымъ отбѣнкомъ, лѣтомъ. 3—7 ф.

**СКРЕВКОЪ.** Малой величины и различной формы заступъ или желѣзная пластинка на рукояткѣ, для чищенія дорожекъ и подрѣзаніе травы.

**СКРОФУЛІЯ (Scrophularia).** *Scrophulla* — золотуха, по предполагавшимся врачевнымъ свойствамъ. С. поричниковыхъ. (100). Выѣ-тронич. мѣстности сѣв. полушарія. Одно, дву или многол., обычно выносл. трав. pp. Садоваго значеніе не имѣютъ, кромѣ

С. **хризанта** (S. chrysantha, желтоцвѣтная). Кавказъ. Цв. золотисто-желтые, въ мартѣ. 6—18 д. Содержать въ горшкахъ, съ которыми высаживать на лѣто въ грунтъ.

**СКРУТЪ НѢМЕЦКІЙ.** Сортъ яблока средней поры поспѣванія, среднихъ размѣровъ, бѣлаго цвѣта съ румянцемъ, вкусомъ походить на Высотское, также хорошо въ мочкѣ.

**СКРЫЖАПЕЛЬ.** Поздній сортъ рѣно-образнаго, граненаго яблока темно-зеленаго цвѣта съ румянцемъ. Вкусъ кисло-вато-сладкій.

**СКУТЕЛІЯ (Scutellaria).** *Scutella* — подношь, блюдо, по чашечкѣ во время плодоношенія. С. губоцвѣтныхъ. (90). Умѣренныя страны и гористыя тропич. Тепл., оранж., или выносл. одно и мног. трав. и кустарн. pp. Глин. дерн. съ нескомъ и торф. Сѣменами или дѣленіемъ.

С. **альпіна** (S. alpina, альпійская). Европа и Сред. Азія. Цв. пурпуровыя, нижн. губа желтая, стебель лежащій. Выносл. мног. С. **костарикана** (S. costaricana, изъ Коста-Рика). Коста-Рика. Цв. съ темнопурпуровой чашечкой и золотисто-пурпуровымъ вычникомъ, въ іюнь. 2—3 ф. Тепл. мног. С. **моциана** (S. Mociniana, Мочина). Мексика. Цв. свѣтло-пурпуровыя, лѣтомъ. 1½ ф. Тепл. кустъ. С. **оріенталисъ** (S. orientalis, восточная). Ю. Европа и Сред. Азія. Цв. желтыя съ пурпуровой нижней губой, въ августъ. Полувыносл. многол. трав. С. **сплендентъ** (S. splendens, вели-

кобная). Мексика. Цв. шарлаховыя, въ октябрѣ. 1 ф. Тепл. трав. мног. С. **Хартвеги** (S. Hartwegi, Гартвега). Квито. Цв. ярко-красныя съ нижней фіолетовою губой, лѣтомъ. 1—2 ф. Тепл. полукустъ.

**СКУТИКАРІЯ (Scuticaria).** *Scutica* — хлыстъ, по формѣ л. С. орхидеи. (2). Гвіана, Бразилія. Тепл. эпифитъ съ длинными лл. На чуркахъ съ подстилкою торф. моха. Дѣленіемъ при началѣ роста. С. **стилія** (S. Steellii, Стиля). Брит. Гвіана. Цв. свѣтло-желтые съ красно-коричневыми пятнышками, пахучіе. Спн. *Максильлярія Стилли* (Maxillaria Steellii).

**СЛАНОГОДНИКОВЫЯ pp. (haloragaceae).** Трав. и полукуст. рѣдко однол. водяныя или земляныя pp. распространенныя по всей земной поверхности. Въ сем. 18 видовъ принадлежали къ 9 родамъ. Изъ послѣднихъ наиболѣе извѣстны Гуппера и Хипуристъ.

**СЛИВА.** См. Прунусъ. С. **каменная** или **сибирская.** См. Арменияка.

**СЛИВНЯКЪ.** Посаженіе, поросль сливы.

**СЛІЗНИ.** Мягкотѣлая улитки, объѣдающія листья, производя тѣмъ болѣе или менѣе значительныя дыры.

**СЛОАНЕА (Sloanea).** Сэръ *Слоанъ* (Hans Sloane) — прадѣдъ, основатель британскаго музея (British museum) и ботаническаго сада въ Челси, въ Лондонѣ + 1753. С. линовыхъ. (30). Троп. Америка. Тепл. древ. pp. Глин. дерн. съ торф. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ песокъ, въ парникѣ.

С. **дентата** (S. dentata, зубчатая). Цв. бѣлыя, большіе, съ августа до ноябрі. 50 ф. С. **синемариэнсисъ** (S. sinemariensis, изъ Синемаріи). Цв. бѣлыя, мелкіе, въ іюль, августъ. 50 ф.

**СЛОЖНОЦВѢТНЫЯ pp. (compositae, или asteraceae)** Самое многочисленное семейство изъ травянистыхъ, кустарныхъ и древесныхъ растеній, обнимающихъ до 800 родовъ и около 10.000 видовъ. Цвѣты собраны въ головку на общемъ ложѣ, которая включена въ обертку. Важнѣйшіе роды: Астеръ, Далія, Хризантемумъ.

**СЛОЖНЫЙ.** Состоящій изъ нѣсколькихъ частей. *Сложный листъ* — о нѣсколькихъ листкахъ, пальцеватъ.

**СЛОНИКИ.** Жучки, у которыхъ голова вытянута въ хоботокъ, на концѣ котораго помѣщается ротъ. Число видовъ слониковъ доходитъ до 10.000. Личинки ихъ живутъ скрытно, питаются плодами, сѣменами, листьями, стеблями. Вообще эти наѣдомыя — вредныя для садоводовъ. *Сло-никия глобевый, цвѣточникъ глобевый.*



Темноблещущій маленький жучок (*Anthonomus pomorum*), обгрызающий весной почки на яблонях и кладущий в них свои яички (по одному), которые там вылупляются и производят личинку, объедающую тычинки и пестики. Против этого жучка советуют развешивать под деревьями весной бѣлые простыни и открывать кроны, вследствие чего сваливаются жучки.

**СЛУЧАЙНЫЙ.** Вырастающий на не обыкновенном мѣстѣ или имѣющій видъ, который не ожидался.

**СМИТІЯ (Smithia).** Сэръ Д. Смитъ (Sir James Edward Smith)—основатель лондонскаго Линнеевскаго Общества, авторъ нѣсколькихъ капитальных сочиненій, † 1828. С. бобовыхъ. (20). Троп. Азія, В. Африка. Тепл. куст. или полукуст. либо однол. пр. Уходъ какъ за Минзоя.

**С. пурпуреа (S. purpurea, пурпуровая).** Остиндія. Цв. пурпуровые, лѣтомъ. 6—12 д. Однол. р.

**СМИТМАННІЯ (Smeathmannia).** Смитманъ (Smeathmann)—путешественникъ въ Африку и коллекторъ тамошнихъ пр. С. кавалерниковыхъ. (4). Зап. ч. троп. Африки. Тепл. куст. пр. Глип. дерн. съ торф. и пескомъ. Черенками изъ полурѣзлаго роста въ песокъ, въ парникѣ. Темп. зимой 10—12, лѣтомъ 13—24°.

**С. лѣвигата (S. laevigata, съ гладкими черешками).** Цв. бѣлые, въ іюль. 6 ф. **С. пубесценсъ (S. pubescens, пушистая).** Цв. крупные, бѣлые съ пушистыми рыльцами, въ февраль. 6 ф.

**СМИЛЯКСЪ (Smilax).** Древне-греческое названіе, занимавшее у Теофраста. С. лилейныхъ. (187). Умѣр. и троп. пойма. Оранж. куст. либо трав. мног. пр. Пескомъ. Глип. дерн. Дѣленіемъ корня.

**С. аспера (S. aspera, жесткій).** Ю. Европа. Цв. бѣловатые или розовые, въ іюль. 5—10 ф. Имѣетъ нѣсколько разновидностей. **С. орната (S. ornata, украшенный).** Отчество неизвестно. Лл. овальные, остроколючные съ серебристо-сѣрыми пятнами по темно-зеленому. Сип. **С. макрофилля (S. macrophylla).** Оранж. красивое р. **С. ротундифолия (S. rotundifolia, круглолистный).** С. Америка. Цв. зеленоватые, въ іюль, плоды темно-синіе. Сип. **С. квадратиллис (S. quadrangularis).** Стебель высоко-выходящий Оранж.

**СМИЛЯЦИНА (Smilacina).** Уменьшительное *Smilax*, съ которой впрочемъ сходства мало. С. лилейныхъ. (20). С. и Центр. Америка, умѣр. и гористая Азія. Оранж. или полувын. мног. трав. пр. Легкая. Дѣленіемъ.

**С. олераса (S. oleracea, огородная).** Спикниъ. Цв. бѣлые съ розовымъ отгиномъ снаружи, въ маѣ. Ягоды розово-пурпуровыя съ черными пятнышками. 4 ф. **С. стеллати (S. stellata, звездчатая).** С.-З. Америка. Цв. бѣлые, въ маѣ. 1—2 ф.

**СМОЛА.** Густой древесный сокъ хвойныхъ деревьевъ (еловая, сосновая, лиственничная); березовая смола есть *дѣготъ*; *тѣкъ*—самотечка.

**СМОЛКА.** См. Лихнисъ.

**СМОЛЕНСКОЕ ЯБЛОКО.** Сортъ средній поры посѣванія, среднихъ размѣровъ, съ ароматнымъ приятнымъ вкусомъ; кожица желтая съ полосатымъ румянцемъ.

**СМОЛЬНОСЪМЯННИКОВЫЯ** пр. (*pittosporae*). Малочисленное семейство кустарниковъ приморскихъ или цѣпляющихся, либо приземистостелющихся кустарниковъ и полукустарниковъ породъ, встречаемыхъ преимущественно въ Австраліи. Содержатъ въ своемъ составѣ горькое, ароматическое и смолотое вещество. Родовъ 9, видовъ 90. Билльардиера, Марпантусъ, Питтоспориумъ и Солья.

**СМОРОДИНА.** См. Рябесъ.

**СНОСЛИВЫЙ.** Выносливый. Переносимый непогоду, климатъ или не вполне тщательный уходъ. Привычный къ теплу и холоду, выносящий лишенія.

**СНѢЖНОЕ ДЕРЕВО.** См. Симфорикарпусъ.

**СНѢГЪ.** Въ большинствѣ случаевъ полезенъ въ садоводствѣ, преимущественно какъ защита отъ холода и ранняго нагрѣванія. Онъ вреденъ поздней весной, когда напаваетъ на всходы, или зимой, когда тяжестью своею обламываетъ вѣтви предпочтительно хвойныхъ.

**СОБРАЛІЯ (Sobralia).** Донъ С. Собралъ (Sobral)—испанскій ботаникъ. С. орхидей. (30). Анды троп. Америки, отъ Перу до Мексики. Земныя орхидеи. Грубая волокна. торф. Дѣленіемъ.

**С. дихотома (S. dichotoma, вилообразная).** Перу. Цв. снаружи бѣлые, внутри фіолетовые, съ розовой губой, въ мартъ. 6—20 ф. **С. Кеттлейя (S. Cattleya, похожая на Кеттлею).** Колумбія. Цв. коричнево-пурпуровые, похожіе на цв. Кеттлею. **С. макранта (S. macantha, крупноцвѣтная).** Мексика и Гватемала. Цв. ярко-пурпуровые и карминные, лѣтомъ. 6—8 ф. Едва ли не лучшая Собралія. **С. роzea (S. rosea, розовая).** Перу и Нов. Гренада. Цв. очень большіе, темно-розово-оранжевые, губа карминовая съ бѣлою серединой. 4—6 ф. Сип. **С. Рукери (S. Ruckeri).**

**СОВАЖЕСІЯ (Savagesia).** *Буассе*

*de Savages* (Boissier de Sauvages)—проф. ботаники въ Монпелье, † 1767. С. фіалковыхъ (10). Троп. Америка. Тепл. трав. или полукуст. пр. Глип. дер. съ торф. Сѣменами въ маргѣ.

**С. эркта (S. erecta, приморская).** Мексика. Цв. малиновые или красно-пурпуровые, въ маѣ до октября. 6 д.

**СОВЕРБЕА.** См. Соуербѣа.

**СОВИНОГОЛОВКИ** или *совки*. Крупныя наши ночныя бабочки, гусеницы которыхъ объедающа листья приносятъ значительный вредъ. Число совиноголовокъ огромное.

**СОВОКЪ.** Желобоватая лопатка для насыпанія, а также для выкапыванія земли или р.

**СОКРАТЕА (Socratea).** *Сократъ*—великій греч. философъ. С. пальмъ. (5). С. Бразилія и Колумбія. Тепл. пальмы. Уходъ какъ за *Ириартеа*.

**С. эсхорица (S. exorhiza, пускающая снаружи корни).** Гвиана, Амазонская р. Лл. престола съ черными, длиной въ 12—20 ф., перья кособокля. Стволъ 60—100 ф. Даетъ до 20 и болѣе воздушн. корней. Сип. *Ириартеа эсхорица* (*Iriarte exorhiza*).

**СОКЪ.** Жидкость, содержащаяся въ клеточкахъ живаго растенія, въ разныхъ частяхъ различнаго состава. Образуется изъ жидкостей, вносимыхъ въ растеніе корнями, измѣняющихся по мѣрѣ прохожденія чрезъ стебель до листьевъ; такой сокъ назыв. *сырымъ, восходящимъ*. При измѣненіи его листьями и отложеніи изъ его составныхъ частей различныхъ образованій, преимущественно крахмала, сокъ получаетъ обратное направленіе и наз. *нисходящимъ*; полагаютъ, что онъ нисходитъ по клетчаткѣ коры и сердцевинѣ, а также по заболони, — самой внутренней части коры.

**СОЛЕНАНТУСЪ (Solenanthes).** *Solen*—трубка и *anthos*—цв., по формѣ вѣтвочки. С. бурачниковыхъ. (10). Ю. Европа и Зап. русской Азіи. Вынос. многол. трав. пр., изъ которыхъ былъ въ садахъ видъ *цирцидумъ* (*circinatus*), но теперь исчезъ.

**СОЛЕНИДИУМЪ (Solenidium).** *Solen*—трубка и *eidion*—подобіе. по формѣ цв. С. орхидей. (1). Эпифитъ. Уходъ какъ за Онцидиумъ.

**С. расцѣмлюмъ (S. racemosum, вѣтвистый).** Анды Колумбіи. Цв. желтые съ красными пятнами, въ ноябрѣ. 6 д.

**СОЛЕНОМЕЛУСЪ (Solenomelus).** *Solen*—трубка и *melos*—край, по трубчатому цв. покрову. С. ксантиковыхъ (2). Чили. Полувын. пр. съ корневищемъ. Уходъ какъ за Сизиринхіумъ.

**С. хилензисъ (S. chilensis, чилийскій).** Цв. темно-желтые, въ іюль. 1—1½ ф. Сип. *Сизиринхіумъ лонгистилумъ, С. педункулятумъ* (*Sisyrinchium longistylum, S. pedunculatum*).

**СОЛЕНОФОРА (Solenophora).** *Solen*—трубка и *pherein*—нести, по трубчатому вѣтвику. С. геснеріевыхъ (1). Мексика. Тепл. куст. пр. Уходъ какъ за Глоксинія.

**С. Эндlicheriana (S. Endlicheriana, Эндлихера).** Цв. оранжевые съ пурпуровыми мѣтками, въ апрѣлѣ. 1—2 ф.

**СОЛЫЯ (Sollya).** *Солли* (Solly)—физиологъ и анатомъ растеній, † 1858. С. смольносымянниковыхъ. (2). Австралія. Оранжер. выощ. пр. Торф. Черенками въ песокъ, подъ стекломъ.

**С. Друммондii (S. Drummondii, Друммонда).** Цв. головы мелкія, желтыя, лѣтомъ. 1—3 ф. **С. ланцеолата (S. lanceolata, ланцетовидное).** Цв. гол. коническія, желтыя, въ іюль. 2 ф. Сип. *Энтамія граммифилля* (*Euthamia graminifolia*). **С. степциоза (S. speciosa, обильная).** Цв. головки довольно большія желтыя, въ октябрѣ. 3—6 ф. Полувынос.

**СОЛИДАГО (Solidago).** *Solido*—соединить, по врачебному свойству затягивать раны. С. сложнотвѣстныхъ. (80). С. Америка, умѣр. Азія, Европа. Два вида въ Ю. Америкѣ, одинъ на Азорскихъ о. Вынос. или полувын. многол. трав., иногда куст. пр. Упомнаемые ниже виды с. американскіе, для нихъ—обыкн. сад.; дѣленіемъ.

**С. парвифлора (S. parviflora, мелкоцвѣтная).** Цв. голубые, въ іюль; лл. овальные. 6 ф. **С. хетерофилля (S. heterophylla, разнолистная).** Цв. голубые, въ іюль; лл. ланцетовидные и продолговато-эллиптические. 6 ф.

**СОЛДАНЕЛЛЯ (Soldanella).** Уменьшительное *solida*—мелкая монета; по формѣ лл. С. первоцвѣтовыхъ. (4). Альпы центр. Европы. Вынос. или полувын. многол. трав. пр. Въ горшкахъ съ глип. дерн. и торф. Сѣменами и дѣленіемъ.

**С. альпина (S. alpina, альпійская).** Цв. фіолетовые, пониклые, въ апрѣлѣ; лл. округло-почковидные. 3 д. Имѣетъ форму *Вилери* (Weeleri), которая цвѣтетъ легче. **С. монтана (S. montana, горная).** Цв. пурпуровые, въ апрѣлѣ; лл. почти круглыя. 3 д.

**СОЛЬ.** Соединеніе кислоты съ металомъ или иную щелочью. Обыкновен. (поваренная) соль оказываетъ благотворное вліяніе только въ примѣси съ азотнымъ удобреніемъ.

**СОЛЯНДРА (Solandra).** Даниэль Сольандеръ (Solander)—шведъ, ученикъ Линнея и путешественникъ съ Балксомъ



и Кукомъ, † 1782. С. пасленовыхъ. (4). Троп. Америка. Телл. высоко-цвѣтлющіяся рр. Глин. дерн Черенками. При просторной посудѣ и сильной поливкѣ растутъ быстро, но не цвѣтутъ; чтобы вызвать цвѣтъ, ихъ поливаютъ, пока отъ избытка влаги не станетъ обваливаться л., а потомъ перестаютъ поливать.

**С. виридофлора** (*S. viridiflora*, съ зелеными цв.). Бразилія. Цв. зеленые, въ маѣ до июля. 2—3 ф. Снн. *Dissochroa viridiflora* (*Dissochroa viridiflora*). **С. грандифлора** (*S. grandiflora*, крупноцвѣтная). Ямайка. Цв. зеленовато-бѣлые, въ мартѣ—апрѣль. 15 ф.

**СОЛЯНУМЪ** (*Solanum*). Древне-латинское названіе, употребленное Плиніемъ. С. пасленовыхъ. (700). Пирепм. жаркія страны, особенно въ Америкѣ. Телл., оранжево-красн. куст. или трав. рр. Сильная, глин. дерн. Съеменами, клубнями, черенками изъ молодого роста, въ парникѣ. Цвѣтутъ лѣтомъ.

**С. акантоидея** (*S. acanthoides*, похожій на Акантусъ). Бразилія. Цв. блѣдно-голубые; стебли темно-зеленые съ ярко-оранжевыми. 3—6 ф. Телл. **С. атропурпуреумъ** (*S. atropurpureum*, чернопурпуровый). Бразилія. Цв. съ пурпуровой чашечкой и желтымъ вѣнчикомъ; стебель кроваво-красный. Выш. нѣсколько ф. Оранжево-красн. **С. гигантеумъ** (*S. giganteum*, гигантскій). Индія. Цв. голубые; стебли мягкіе, колочіе. 10—25 ф. Оранжево-красн. **С. капсикаструмъ** (*S. capsicastrum*, звѣздчатый). *Стручковый перецъ*. Бразилія. Цв. бѣлые, плоды шарлаховые, въ лѣсной орѣхъ. 1—2 ф. Оранжево-красн. **С. криспумъ** (*S. crispum*, курчавый). Чили. Цв. пурпурово-голубоватые, пахучіе; плоды желтоватые, съ горошиною; л. съ курчавыми краями. 12—14 ф. Полувыносл. **С. маргинатумъ** (*S. marginatum*, каемчатый). Абиссинія. Цв. бѣлые съ пурпуровой середкой. Стебель въ 3—4 ф. Бѣлопушстый, колочій. Оранжево-красн. **С. марониензе** (*S. maroniense*, съ р. Марони). Бразилія. Цв. голубовато-фіолетовые, стебель съ колочками, 6—14 ф. Телл. **С. мелонгена** (*S. melongena*). *Подлажанъ, Баклажанъ, Яичное дерево*. Отечество съ познательностью неизвѣстно. Цв. голубые; л. овальные, выемчатые. 2—3 ф. Снн. **С. эскулендумъ** (*S. esculentum*). Оранжево-красн. или парниковое. Имѣетъ нѣсколько разновидностей. **С. псевдо-капсикумъ** (*S. pseudo-capsicum*). *Любовница вишни*. Мадера. Цв. бѣлые, плоды шарлаховые или желтые. 4 ф. Оранжево-красн. Много разновидностей. **С. пирасантумъ** (*S. pyracanthum*, съ огненно-красными иглами). Мадагаскаръ. Цв. синевато-фіолетовые. 3—6 ф. Оранжево-красн.

полукуст. **С. робустумъ** (*S. robustum*, сильный). Бразилія. Цв. бѣлые, плоды шаровидные, волосистые, оранжевые. 2—4 ф. Оранжево-красн. или полу-выносл. для лѣтней высадки. **С. сизимбриолистное** (*S. sisymbriifolium*, съ лл. какъ у Сизимбриума). С. Америка, Бразилія. Цв. голубые или бѣлые; плоды красные. 4 ф. Оранжево-красн. одно- или много-колочее. **С. ясминоидея** (*S. jasminoides*, похожій на ясминъ). Ю. Америка. Цв. голубоватые. 3—4 ф. Оранжево-красн. выносл. р.

**СОЛЯРИЯ** (*Solaria*). *Франциски де Боржа Соляръ* (*Francisci de Borja Solar*), знаменитый чилийскій математикъ. С. лилейныхъ. (1). Оранжево-красн. рр. Песков. глин. дер. съ листов. Съеменами и отростками. По мѣрѣ заиваданія лл. уменьшать поливку.

**С. мьерсиоидея** (*S. miersioides*, похожая на Мьерсио). Чили. Цв. зеленые, мелкіе, весной; лл. линейные. 4 д. Снн. *Symea miersioides* (*Symea gillesioides*).

**СОЛНЕЧНЫЙ СВѢТЪ И ТЕПЛОТА**. Отъ нихъ зависитъ жизнь всего на земной поверхности, а потому и растений. Отъ вліянія свѣта минеральныя соединения и газы превращаются въ вещества питательныя рр. Нѣкоторые рр. нуждаются въ свѣтѣ болѣе, нежели др., вообще же цвѣтоносныя (явноцвѣтныя) въ отсутствіи или при недостаткѣ свѣта, усиленно развиваться не могутъ.

**СОЛНОВОРОТЪ. СОЛНЕЦЕВОРОТЪ**. Поворотъ солнца на прибыль или на убыль дня (зимній 10 дек., лѣтній 9 июня).

**СОЛНОПЕКЪ**. Жаркій пригрѣвъ солнца. Полуденная пора въ ясный, жаркій день.

**СОЛОМИНА**. Колѣнчатый, внутри пустой стебель злаковъ.

**СОЛОНЧАКЪ**. Земля пропитанная солью, изъ которой соль выступаетъ или выцвѣтаетъ.

**СОНЕРИЯ** (*Sonerila*). Одинъ изъ видовъ на мѣстномъ индѣйскомъ нарѣчій называется *гутли-сонери-илъ*. С. черноустовыхъ. (53). Гористыя мѣста въ Остиндіи. Телл. трав. или низкія куст. рр. Волокн. торф. съ торфянымъ мхомъ, частью песку и кусками древ. угля или битыхъ черепковъ. Съеменами или черенками въ горшкахъ, по одиночно, въ пескѣ, въ парникѣ. Всѣ цвѣтутъ лѣтомъ.

**С. Бенсоны** (*S. Bensoni*, Бенсона). Цв. розово-пурпуровые; л. остроколючные, запыленные. **С. маргаритацея** (*S. margaritacea*, съ жемчужинами). Цв. розово-шарлаховые, л. овально-ланцетовидные, съ овальными бѣлыми пятнышками по прямымъ линиямъ. Стебель 8—10 д. яркаго шарлаховаго цв. Имѣетъ нѣсколько разновидно-

стей, между прочимъ, *Хендерсоны* (*Hendersoni*) съ яркими лилово-розовыми цвѣтами.

**СОЛННАЯ ОДУРЪ**. См. Атропа.

**СОННЕРАТІЯ** (*Sonneratia*). Француз. ботаникъ и путешественникъ *Соннеръ* (*Sonnerat*), † 1814. С. плакуновыхъ. (6). Тропич. морскія побережья В. полушарія. Телл. кустар. или низкорослыя древ. рр. Ухождъ какъ за Лагерстремія.

**С. альба** (*S. alba*, бѣлая). Остиндія. Цв. бѣлые, въ маѣ. Маленькое дерево.

**СОНХУСЪ** (*Sonchus*). *Sogchos* упоминается Теофрастомъ. С. сложноцвѣтныхъ. (24). Космополитъ. Оранжево-красн. или выносл. одно-, либо многол. трав. рр. Обыкновен. садов. Съеменами и черенками въ пескѣ, подъ стекломъ.

**С. гуммиферъ** (*S. gummifer*, камедистый). Канарскіе о. Цв. головки желтыя, длтмъ. 2—3 ф. **С. Жакіни** (*S. Jacquinii*, Жакена). Канарскіе о. Цв. головки золотисто-желтыя, въ мартѣ. 1—2 ф.

**СОНЪ**. Состояніе растений, въ которомъ части его принимаютъ пошное, какъ бы бездѣтельное, положеніе. *Сонъ-блѣдный* и *Сонъ-земле*. См. Анемоне.

**СОПУВІЯ** (*Sorubia*). Мѣстное остиндское названіе. С. поричниковыхъ. (9). Троп. и юж. Африка, Мадагаскаръ, Остиндія, Малайскій архипелагъ, Австралія. Телл. однол. рр. Торф. Съеменами.

**С. дельфиниолистная** (*S. delphinifolia*, съ лл. какъ у Дельфиніума). Индія. Цв. розовые, въ іюль. 3—4 ф. Снн. *Gerardia delphinifolia* (*Gerardia delphinifolia*).

**СОРГУМЪ** (*Sorghum*). Съ италіанскаго *Sorgho*. С. злаковъ. (2). Жаркія страны земной поверхности. Оранжево-красн. или полувыносл. однол. либо многол. трав. рр., не имѣющія садоваго значенія.

**СОРИНДЕЯ** (*Sorindeia*). Мѣстное мадагаскарское названіе. С. сердечниковыхъ. (6). Троп. Африка, Ява, Мадагаскаръ. Телл. древ. рр. Ухождъ какъ за Анакардіумъ.

**С. мадагаскаріензисъ** (*S. madagascariensis*, мадагаскарскій). Мадагаскаръ. Цв. пурпуровые, мелкіе, въ маѣ, 10 ф.

**СОРОЦЕФАЛЮСЪ** (*Soroserphalus*). *Soros*—кучка и *kephale*—голова, по скупеннымъ цв. головкамъ. С. протейныхъ. (10). Юж. Африка. Оранжево-красн. куст. рр. Ухождъ какъ за Протея.

**С. имбрикатусъ** (*S. imbricatus*, настельный). Цв. лиловые, въ іюль. 3 ф. Снн. *Protea imbricata* (*Protea imbricata*).

**СОРТОВОЙ**. Подходящій подъ извѣстный разбортъ.

**СОРТЪ**. Разрядъ растений или плодъ по качеству.

**СОСЕНКА**. См. Хиппурисъ.

**СОСОКЪ. СОСОЧЕКЪ**. Маленькое остроколючное возвышеніе на поверхности.

**СОССЮРЕА** (*Saussurea*). *Соссюръ* (*Saussure*)—извѣстный швейцарскій ученый, † 1799. С. сложноцвѣтныхъ. (60). Гористыя мѣстности въ Европѣ, Азій и Сѣв. Америкѣ. Выносл. или полувыносл. трав. рр. Обыкновен. садовая. Съеменами. Не особенно красивы.

**С. пульхелла** (*S. pulchella*, красивая). В. Сибирь. Цв. головки пурпуровыя, въ іюль. 2 ф.

**СОСУДЪ**. Посудина. Емкая вещь. Волокно служащее для проведенія жидкости или содержащее особаго рода жидкости. (Сосудистыя или безсосудистыя растения).

**СОТТОНІЯ** (*Suttonia*). Англійскій пасторъ *Sutton* (*Rev. Sutton*)—ботаникъ, † 1846. С. прищипочныхъ. (4). Нов. Зеландія и Сандвичевы о. Оранжево-красн. куст. рр., причисленные теперь къ роду Мирсины. Ухождъ какъ за Ардизіа.

**С. аустралис** (*S. australis*, южная). Нов. Зеландія. Цв. мелкіе, розовые. 8—10 ф. Снн. *Myrsine Urvilleanii* (*Myrsine Urvilleanii*).

**СОУЕРБЕЯ** (*Sowerbaea*). *Соуерби* (*James Edward Sowerby*)—знаменитый ботаникъ, художникъ, † 1828. С. лилейныхъ. (4). Австралія. Оранжево-красн. рр. съ волокнистыми корнями. Песков. глин. дерн съ торф. Дѣленіемъ.

**С. лаксифолия** (*S. laxifolia*, съ рѣдкими лл.). Цв. малиновые, зонтикомъ, въ іюль. 1—2 ф.

**СОФОРА** (*Sophora*). Измѣненное арабское названіе *Sophora*—одного бобово-го р. С. бобовыхъ. (22). Жаркія страны земной поверхности. Телл., оранжево-красн. или полувын. древесн., куст. или многол. трав. рр. Песков. глин. дерн. Съеменами и прививкой.

**С. секундифлора** (*S. secundiflora*, съ односторонними цв.). Мексика. Цв. фіолетовые, дов. большіе, односторонніе, въ іюль. 6 ф. Оранжево-красн. **С. тетраптера** (*S. tetraptera*, четыре-крылая). Нов. Зеландія. Цв. желтые, въ маѣ. Оранжево-красн. **С. японика** (*S. japonica*, японская). Китай. Японія. Цв. бѣловатые, мелкіе, въ августъ—сентябрь; листья красная. Снн. *Styphnolobium japonicum* (*Styphnolobium japonicum*). Въ южн. европ. климатъ р. выносл. вое. 30—40 ф.

**СОФРОНИТИСЪ** (*Sophrontitis*). *Sophront*—скромный, по низшимъ маленькимъ цв. С. орхидей. (5). Органнныя горы въ Бразиліи. Оранжево-красн. элифты. Волокн. торф. съ кусками древ. угля. Влаж-



ное содержаніе круглый годъ. Дѣленіемъ при началѣ роста.

**СОХА.** Обыкновеннѣйшее орудіе для паханія земли. Основа сохи *колотка*, — поперечный чурбаль; въ колодку вдѣляется наглухо — спереди *обой* (оплоби), сзади — *рукоятки* разнаго вида (*рога-чемъ* — разсохой изъ поперечныхъ брусковъ, — *казачкомъ*). Надъ колодкой находится *пдлогъ*, *подбива* или *разсѣдъ*, на развиле коей насаживаются *сошники*, *лемехи*; надъ ними — *пдлица*, желѣзная лопаточка которой ручка закрючена *под-тужинами* или *притужинами* (веревкою накрестъ); она перекачивается на обѣ стороны и служитъ для отвала земли. Соха существенно отличается отъ пуга тѣмъ, что не имѣетъ ножа или отрѣза.

**СПАРАКСИСЪ (Sparaxis).** *Sparasso* — разрывать, по разорваннымъ чехламъ. С. косатиковыхъ. (5). Ю. Африка. Оранж. луков. пр. Уходъ какъ за Иксіа. С. грандифлора (S. grandiflora, крупноцвѣтнѣй). Цв. желтые съ пурпуровымъ и бѣлымъ, въ апрѣлѣ. Син. *Иксія ариата*, *И. грандифлора* (Ixia aristata, I. grandiflora). Имѣетъ нѣсколько разновидностей. С. пѣндуля (S. pendula, пониклый). Цв. лиловые, въ июлѣ. С. триколоръ (S. tricolor, трехцвѣтнѣй). Цв. оранжевые, въ маѣ.

**СПАРЖА.** См. Аспарагусъ.

**СПАРМАННІА (Sparmannia).** *Sparmannia* (Sparmann), — шведскій ботаникъ, путешествовавшій съ Кукомъ, † 1820. С. липовыхъ. (3). Троп. или въ троп. Ю. Африка. Оранж. куст. или дерев. пр. Глин. дерн. съ торф. Черенками въ пескахъ торфяной, въ парникѣ.

С. африкана (S. africana, африканская). Южн. Африка. Цв. бѣлые съ желтыми безплодными тычинками, у кот. пурпуровые кончики, въ маѣ. 10—20 ф. Имѣетъ махровую разновидность.

**СПАРТИУМЪ (Spartium).** Древнегреч. названіе отъ *sparton* — веревка; вѣтви р., вымоченныя въ водѣ, даютъ хорошее волокно. С. бобовыхъ. (1). Полувын. или оранж. куст. р. съ лл. какъ у тростника. Обыков. Сѣменами и черенками подъ стекломъ.

С. юнцеемъ (S. junceum, тростниковый). Мексика. *Бобровникъ*. Канарскіе о. и Средиземн. побережье. Цв. желтые, пахучіе, съ июля до сентября. 6—10 ф.

**СПАРТОТАМНУСЪ (Spartothamnus).** *Sparton* — веревка и *thamnus* — вѣтвь, по употребленію р. С. вербеновыхъ. (1). Оранж. куст. р. (зимн. темп. 3—5°). Черенками, въ пескѣ, подъ стекломъ.

С. юнцеемъ (S. junceus, тростниковый). Австралія. Цв. мелкіе бѣлые, въ августѣ. 2 ф.

**СПАТАЛЛЯ (Spatalla).** *Spatalos* — нѣжный, по строенію цв. С. протейныхъ. (17). Ю. Африка. Оранж. куст. пр. Уходъ какъ за Протеа.

С. пирамидалисъ (S. pyramidalis, пирамидаліная). Цв. желтоватые, пушистые, въ июлѣ. 3 ф.

**СПЕЙРАНТА (Speirantha).** *Speira* — петля и *anthos*. — цвѣтокъ. С. лилейныхъ. (1). Оранж. безстеб. пр. съ корневищемъ. Уходъ какъ за Альбука.

С. конваллярійоидесъ (S. convallarioides, похожая на ландышъ). Китай. Цв. бѣлые или зеленоватые, въ июлѣ. Син. *Альбука Гардена* (Albica Gardeni).

**СПЕКУЛЯРІА (Specularia).** Прежде одинъ изъ обычныхъ европейскіхъ видовъ назывался *Speculum Veneris*. — Венерино зеркало. С. колокольчиковыхъ. (8). Сѣв. полушаріе, одинъ видъ въ Юж. Америкѣ. Вынос. или полувынос. трав. пр. Уходъ какъ за Кампанула.

С. пентагонія (S. pentagonia, пятигранная). Левантъ. Цв. голубые, въ июлѣ. 1 ф. С. перфоліата (S. perfoliata, съ лл. пропускающими стебель). С. Америка. Цв. синепурпуровые, въ маѣ до августа. 3—10 д. С. спекулумъ (S. speculum, зеркальце). Европа. Цв. пурпуровые, въ июлѣ. 1 ф. С. хибрида (S. hybrida, гибридная). Европа. Цв. голубые внутри, лиловые снаружи, съ июля до сентября. 6—10 д.

**СПЕРМАТІЙ.** Зооспора, лишенная движения и не имѣющая поэтому рѣсничекъ, но сохраняющая то же значеніе, что и живички, въ оплодотвореніи.

**СПИГЕЛІА (Spigelia).** Адрианъ Спигель (Spiegel), латинизированный *Spigileus* (Spigileus), — проф. анатоміи и хирургіи въ Падувѣ, † 1625. С. югачевыхъ. (30). Троп. и С. Америка. Тепл., оранж. или полувын. одно- или многол., рѣдко полукуст. пр. Глин. дер. съ торф. Сѣменами и черенками.

С. антелмія (S. anthelmia, противуглистная). Гватемала до Бразиліи. Цв. пурпуровые, въ июлѣ. 1½ ф. Тепл. однол. С. мариландика (S. marylandica, мариландская). С. Америка. Цв. снаружи красные, внутри желтые. 6—18 д. Полувынос. С. спленденсъ (S. splendens, великолѣпная). Мексика и Гватемала. Цв. ярко шарлаховые, въ июлѣ. 1½ ф. Тепл. многол.

**СПИНАЦІА (Spinacia).** *Spina* — колочка, по плоду. С. лебедовыхъ. (4). Вынос. Вынос. однол.

С. олерасеа (S. oleracea, огородная). *Шпинатъ*. Цв. муж. зеленые, колосьями женскіе — угловые, въ июлѣ. Глубокая, сильная, вѣск. влажная. Сѣменами въ февралѣ — мартѣ въ парникѣ, затѣмъ въ маѣ и июлѣ на воздухѣ. Сорта въ весьма много, раздѣ-

ляемыхъ на имѣющія гладкія и колючія сѣмена; первыя выносивые.

**СПИРАНТЕРА (Spiranthera).** *Speira* — спираль и *anthera* — пыльникъ, по спиральнымъ пыльникамъ. С. рутовыхъ. (1). Тепл. куст. Торф. съ песковъ, глин. дерн. Черенками изъ полузрѣлаго роста, въ пескѣ, подъ стекломъ.

С. одаратиссима (S. odoratissima, весьма пахучая). Бразилія. Цв. бѣлые, въ июлѣ. Все р. пахучее. 6 ф.

**СПИРАНТЕСЪ (Spiranthes).** *Speira* — спираль и *anthos* — цв., по спиральному цвѣторасположенію. С. орхидей. (80). Умѣр. и троп. области. Тепл., оранж. и вынос. земныя орхидеи. Для выносивыхъ — волокн. глин. дерн. съ кусками мѣловыхъ или известковыхъ породъ, для тепл. и оранж. — волокн. глин. дерн. съ торф. Дѣленіемъ передъ началомъ роста.

Г. колорансъ (S. colorans, окрашенный). Вестиндія и Мексика до Венецулы. Цв. шарлаховые, въ апрѣлѣ. 2 ф. Тепл. Син. *Неоттія специоза*, *Стеноринхусъ специозусъ* (Neottia speciosa, Stenorrhynchus speciosus), Г. циннабарина (S. cinnabarina, киноварная). Мексика. Цв. желто-темные, въ июлѣ. 2—3 ф. Тепл. Син. *Стеноринхусъ циннабаринусъ* (Stenorrhynchus cinnabarinus).

**СПИРА (Spiraea).** Древнегреч. названіе, происходящее вѣроятно отъ *Speiras* — свивать, — вѣйки. С. розановыхъ. (50). Умѣр. и холодныя страны сѣв. полушарія, рѣдко тропическ. Кустар., полукуст. или трав., преимущ. выносивыя пр. Глин. дер. Черенками, дѣленіемъ и сѣменами.

С. Дугласіи (S. Douglasii, Дугласова). С.-З. Америка. Цв. розовые, въ августѣ. 3 ф. С. кантоніензисъ (S. cantoniensis, кантонская). Японія. Цв. бѣлые, рано весной. 3—4 ф. Оранж. Син. О. *Ривесіана* (S. Reevesiana). С. Линдлейяна (S. Lindleyana, Линдлей). Гималаи. Цв. бѣлые, въ сентябрѣ. 4—8 ф. полувын. С. пальмата (S. palmata, съ дваневидными лл.). Японія. Цв. ярко-карминовые, въ июлѣ до августа. 1—2 ф. Полувын. С. ульмарія (S. ulmaria, *Медушникъ*). Европа. Цв. бѣлые, душистые, съ июня до августа. 2—4 ф. Мног. тр. имѣетъ форму съ махровыми цв. С. филипендуля (S. filipendula). Таюта. Европа. Цв. розовые, снаружи красноватые, простые или махровые, въ июлѣ и июлѣ. 2—3 ф. Клубневое многол. трав. р.

**СПИРИДИУМЪ (Spyridium).** *Spyris* — корзинка и *eidon* — подобіе, по чашечкѣ. С. крушиновыхъ. (25). Австралія. Оранж. куст. пр. Торф. съ песковъ, глин. дерн. Черенками изъ полузрѣлаго роста, обсушенными внизу, въ пескѣ, подъ рамой.

С. глобулозумъ (S. globulosum, шаровидный). Цв. головки изъ угловъ лл.; лл. овальные. Высokій кустъ.

**СПИРОНѢМА (Spironema).** *Speira* — спираль и *nema* — нить; по спирально завитымъ сосудистымъ пучкамъ въ нитяхъ. С. комелииновыхъ. (1). Тепл. многол. пространство р. Легкая, сильная. Дѣленіемъ. С. фрагрансъ (S. fragrans, пахучая). Мексика. Цв. мелкіе, бѣлые, душистые, въ маѣ. 2 ф.

**СПОНДІАСЪ (Spondias).** Такъ называлъ Теофрастъ сливы, съ которыми имѣютъ сходство плоды этихъ пр. С. сердечниковыхъ. (8). Троп. страны. Тепл. деревья. Глин. дерн. съ пескомъ. Черенками въ пескѣ, въ парникѣ. Темп. зимой 8—10, лѣтомъ 13—21°.

С. борбоника (S. borbonica, съ о. Бурбона). О. Бурбонъ и Маврикія. Цв. темно-пурпуровые, 40 ф. С. дѣльцисъ (S. dulcis, сладкій). О. Товарищества. Цв. зеленоватые, въ июлѣ. 50 ф. С. лютеа (S. lutea, желтый). Вестиндія. Цв. желтые, лѣтомъ; плоды вкусныя, кисловатые, ароматныя. 30 ф. С. пурпуреа (S. purpurea, пурпуровая). Вестиндія. Цв. свѣтло-пурпуровые, лѣтомъ. 30 ф.

**СПОРА.** Воспроизводительная часть тайноцвѣтнѣхъ. Отличается отъ сѣмени тѣмъ, что не содержитъ зародыша.

**СПОРАНГІЙ.** Часть въ папоротникѣ и грибахъ, заключающая въ себѣ споры.

**СПРАГВЕА (Spraguea).** Исаакъ *Sprague* (Sprague) — американскій живописецъ. С. портулаковыхъ. (1). Полувынос. многол. трав. р. Глин. дерн. съ листовою. Сѣменами или черенками въ холод. парникѣ, весной.

С. умбеллята (S. umbellata, зонтичная). Калифорнія. Цв. съ бѣлыми чашечными долями и розовыми лепестками, въ июлѣ.

**СПРѢСКИВАТЬ СПРѢСНУТЬ.** Смочить, прѣсая сильнымъ брызгомъ.

**СПРЫСКЪ.** Брызгалка. Прѣскъ. Шприцъ. Трубка съ поршнемъ для спрыскиванія растений.

**СПѢТЬ.** Посѣвать. Приходить къ концу вызрѣванія.

**СТАВЕНЬ. СТАВНИ.** Деревянные затворы, щиты для закрытія рамъ.

**СТАКГОУЗИЕВЫЯ пр. (Stackhousiaeae).** Все семейство состоитъ изъ одного рода Стакгоузія, содержащаго до 20 видовъ, изъ нихъ большинство растетъ въ Австраліи и по одному виду въ Новой Зеландіи и на Филиппинскихъ о.

**СТАКГОУЗИЯ (Stackhouseia).** *Stackhouse* (Stackhouse), — англійскій альгологъ, † 1819. С. стакгоузіевыхъ. (20).



Австралія, Нов. Зеландія, Филипп. о. Многол. трав. р. Обыкновенная. Черенками изъ молодого роста, въ песокъ, въ парникъ.

**С. моногіна** (*S. monogyna*, съ однимъ рыльцемъ). Австралія. Цв. бѣлые, въ апрѣлѣ. 1—1½ ф. Сн. *C. linariifolia* (*S. linariaefolia*).

**СТАНЖЕРІЯ** (*Stangeria*). *Станжеръ* (*Stanger*)—главный начальникъ въ Наталѣ, † 1854 г. С. цикадеидныхъ. (1). Тепл. р., нуждающееся въ такомъ же уходѣ, какъ Памія.

**С. парадокса** (*S. paradoxa*, необычайная). Ю.-В. троп. Африка. Лл. длинные, перистые; стволъ въ 1—2 ф.

**СТАНЛЕЯ** (*Stanleya*). *Станлей* графъ Дерби (*Edw. Stanley earl of Derby*),—ученый преимущественно орнитологъ. С. крестоцвѣтныхъ. (3). Калифорнія. Полувыносл. или выносл. многол. трав. рр. Перегонная. Сѣменами и дѣленіемъ.

**С. пиннатифида** (*S. pinnatifida*, перисторазсѣченная). Цв. желтые, очень похожіе на цв. Клеоме, въ маѣ. 3 ф.

**СТАНХОПЕА** (*Stanhopea*). Графъ *Станхопъ* (*Earl Stanhope*),—президентъ медико-ботаническаго лондонскаго общества, † 1855. С. орхидей. (30). Троп. Америка отъ Бразиліи до Мексики. Тепл. эпифитъ съ красивыми, обычно душистыми цв. Сажаютъ въ свѣжій торф. мохъ съ нѣсколькими кусками торф. з. и древ. угля. Въ состояніи покоя корни держатъ нѣсколько сухо. Дѣленіемъ.

**С. буцефалюсъ** (*S. bucephalus*, бычачья голова). Ю. Мексики до Перу. Цв. ярко-желтые, сильно пахучіе, въ августѣ. Замѣчательно красивая орхидея. **С. грандифлора** (*S. grandiflora*, крупн. цвѣтная). Тринидадъ. Цв. бѣлые, съ карминными крапинками на губѣ, очень душистые. Сн. *Ceratophyllum grandiflorum* (*Ceratophyllum grandiflorum*) **С. инсингнисъ** (*S. insignis*, замѣчательная). Бразилія. Цв. желтые съ пурпуровыми пятнышками, душистые, въ августѣ-сентябрѣ. Красивая, типическая орхидея. **С. окулята** (*S. oculata*, съ глазами). Мексика. Цв. желто-лимонные, съ бѣлыми и коричневыми пятнами, въ іюль до ноября. Сн. *C. guttata*, *Ceratophyllum oculatus*). Много разновидностей. **С. тигрина** (*S. tigrina*, тигровая) Мексика. Цв. оранжевые съ коричневыми пятнами, сильно пахучіе, въ іюль до сентября. Нѣсколько разновидностей. **С. Уардii** (*S. Wardii*, Уарда). Гватемала и Венецуела. Цв. золотисто-желтые съ пурпуровыми крапинками и блѣдно-желтой губой, пахучіе.

**СТАПЕЛІЯ** (*Stapelia*). *Бодерусъ а Станелъ* (*Boderus a Stapel*)—амстердам-

скій врачъ и комментаторъ Теофраста, † 1631. С. ласточкинхъ. (60). Ю. Африка. Оранже. сочныя безлистья рр. Песков. глин. дерн. съ толченымъ кирпичемъ. Зимой поливать мало. Свѣтлое, провѣтриваемое мѣсто. Размноженіе черенками. Темп. зимой 4—8, лѣтомъ 13—22°.

**С. астеріасъ** (*S. Asterias*, морская астеріа). Цв. тускло-фіолетовые съ пестрыми желтыми полосками, крупные, въ маѣ до ноября. 6 д. **С. намаквензісъ** (*S. namaquensis*, изъ Намаквы). Цв. желтые съ темно-пурпуровыми пятнами. 3—4 д. **С. сорорія** (*S. sororia*, сестрина). Цв. темно-пурпуровые, покрытые полосками, въ іюль. 6—10 д.

**СТАТИЦЕ** (*Statice*). *Статикосъ*—вижущій. С. свинцовыхъ. (120). Азія, Европа. Оранже. полувын. и выносл. трав., полукуст. или куст. рр. Трав. выносл. и полувын. въ песков. глин. дерн. и сѣменами; ораж.—въ волохн. глин. дер. съ древ. углемъ и пескомъ, черенками.

**С. арборесценсъ** (*S. arborescens*, древовидный). Тенерифъ. Цв. голубые, въ іюль. 2 ф. Оранже. **С. латифолия** (*S. latifolia*, широколистный). Кермекъ. Ю. Россія. Цв. голубые, въ іюль. 1 ф. Многол. трав. **С. макрофилля** (*S. macrophylla*, крупнолистный). Тенерифъ. Цв. бѣлые, въ маѣ. Оранже. куст. **С. профуза** (*S. profusa*, изобильный). Цв. пурпуровые, въ августѣ. 2 ф. Оранже. гибриды. **С. синюата** (*S. sinuata*, съ выемчатыми лл.) Ливантъ. Цв. пурпуровые съ желтымъ, въ августѣ. 1 ф. **С. Суворови** (*S. Suworowi*, Суворова). Туркестанъ. Цв. лиловые, лѣтомъ; однол. выносл. **С. татарика** (*S. tatarica*, татарскій). Визитъ. Ю.-В. Европа. Цв. рубиново-красные, въ іюль и іюль. 1 ф. **С. элата** (*S. elata*, высокій). Ю. Россія. Цв. голубые, въ іюль. Выносл. многол.

**СТАУНТОНІЯ** (*Stauntonia*) *Сэръ Стаунтонъ* (*Staunton*)—путешественникъ въ Китаѣ. С. барбарисовыхъ. (2). Китай, Японія. Оранже. или полувыносл. выносл. куст. рр. Песков. глин. дерн. Черенками изъ полузрѣлаго роста.

**С. хексафилля** (*S. hexaphylla*, шестилестная). Цв. бѣлые, пахучіе, въ апрѣлѣ.

**СТАУРАНТЕРА** (*Staurationera*). *Страуросъ*—крестъ и *anthera*—пыльникъ; пыльники образуютъ крестообразную форму. С. геснериныхъ. (3). Остіндія, Малайскій арх. Тепл. трав. рр. Уходъ какъ за Кюзію.

**С. грандифолия** (*S. grandifolia*, крупнолистная). Мьямьинъ. Цв. блѣдно-пурпуровые, съ бѣлымъ горлышкомъ и темно-желтыми пятнышками на нижней поверхности, въ августѣ. 1 ф.

**СТАУРОПСИСЪ** (*Stauropsis*) *Стан-*

*росъ*—крестъ и *opsis*—подобіе: по цв. С. орхидей. (8). Малайск. архип. Тепл. эпифитъ. Уходъ какъ за Ванда.

**С. Ватманни** (*S. Batemanni*, Ватманна). Филипп. остр. Цв. желтые съ красно-малиновыми пятнышками и красно-пурпуровую губой, съ іюля до сентября. Сн. *Fieldia lissoschiloides*, *Vanda Batemanni* (*Fieldia lissoschiloides*, *Vanda Batemanni*).

**СТАУРОСТИГМА** (*Staurostigma*). *Стауросъ*—крестъ и *stigma*—рыльце; по крестовидному рыльцу. С. ароидныхъ. (6). Троп. Америка. Теплич. клубеносная трав. рр. Песков. глин. дерн. съ торф. Сѣменами въ теплому грунту или дѣленіемъ. Темп. зим. 13—17, лѣт. 19—24°.

**С. концинна** (*S. concinna*, красивая). Бразилія. Чехолъ узко-ланцетовидный, потоготъ бѣлый или пурпуровый, лл. почковидные, потомъ трехраздѣльные, черешки пурпуровые. 1½ ф. Имѣетъ нѣсколько разновидностей.

**СТАФИЛЕЯ** (*Staphylea*). *Стафилея*—пучокъ, по расположенію цвѣтовъ и плодовъ. С. мыльниковыхъ. (5). Европа, Гималаи, Японія, С. Америка. Выносл. или полувыносл. куст. рр. Глин. дер. съ песк. Побѣгами, отводками или черенками.

**С. кольчиха** (*S. colchica*, кавказская). Кавказъ. Цв. бѣлые, лѣтомъ; лл. тройчатые. 3—5 ф. **С. пинната** (*S. pinnata*, перистая). Ю. Европа. Цв. бѣлые кистями, въ маѣ-іюнь; лл. перистые. 6—12 ф.

**СТАХИСЪ** (*Stachys*). Древне-греч. названіе: *stachys*—колось; по цвѣторасположенію. С. губоцвѣтныхъ. (200). С. умѣр. и вост. пояса. Оранже. или выносл. многол., либо однол. трав. рр. Обыкн. садовая. Сѣменами и дѣленіемъ.

**С. германника** (*S. germanica*, германскій). Монаголъ. Европа. Цв. блѣдно-малиновые съ бѣлыми разводами, въ апрѣлѣ до ноября. 1—3 ф. Душ. **С. грандифлора** (*S. grandiflora*, крупноцвѣтный). 3. Сибирь. Цв. фіолетовые, въ маѣ. 1 ф. **С. ланата** (*S. lanata*, пушистый). *Медтожъ лама*. Таврскія горы. Цв. полосатые, въ іюль. 1—1½ ф. **С. Моуеана** (*S. Mawean*, Мауа). Марокко. Цв. блѣдно-желтые, въ іюль. 1 ф. Все р. покрыто серебристо-бѣлыми волосками.

**СТАХИТАРФЕТА** (*Stachytarpheta*). *Stachys*—колось и *tarphys*—толстый; по цвѣторасположенію. С. вербеновыхъ. (40). Троп. Америка, Азія и Африка. Тепл. трав. рр. Песков. глин. дер. съ лист. переносимъ. Сѣменами и дѣленіемъ. Темп. зимой 8—12, лѣтомъ 13—24°.

**С. мутабилисъ** (*S. mutabilis*, пмѣничивая). Ю. Америка. Цв. карминные, потомъ розовые, круглый годъ. 3 ф. Полукуст. р.

**СТАХИУРУСЪ** (*Stachyurus*). *Ста-*

*chus*—колось и *oura*—хвостъ; по сережкамъ. С. тернстреміиныхъ. (2). Японія и Гималаи. Оранже. куст. или низкорослая древ. рр. Обыкн. сад. Черенками изъ полузрѣлаго роста, въ песков. землѣ, подъ стекломъ.

**С. прѣкоксъ** (*S. praecox*, ранній). Японія. Цв. желтовато-зеленые, въ мартѣ. 10 ф.

**СТЕВѢЛЕКЪ**. Вѣтка, на которой держится цвѣтокъ. Цвѣточная вѣтка. Мелкое развѣтвленіе вѣтки.

**СТЕБЕЛЬ**. Часть, растущая поверхъ земли,—росника травянистыхъ и кустарныхъ и стволъ древесныхъ растений, отъ коней идутъ вѣтки и листья.

**СТЕВЕНСОНІЯ** (*Stevenson*). *Стевенсонъ* (*Stevenson*)—губернаторъ о. Маурикія. С. пальмъ. (1). Тепл. р. Волохн. торф. съ глин. дер., пескомъ и кусками древ. угля. Сѣменами.

**С. грандифолия** (*S. grandifolia*, крупнолистная). Сейшельскіе о. Лл. клиновидно-ланцетовидные, двуразсѣченные, стволъ сильно колочій, особенно молодой. 40 ф. Сн. *Arca senecioides*, *Astrocaryum borsignianum*, *A. pictum*, *Phoenicophorium Sechellarium*.

**СТЕВІЯ** (*Stevia*). *Эстева* (*Esteve*)—проф. ботаники въ Валенсіи, жившій въ XVI ст. С. сложноцвѣтныхъ (100). Жаркія страны Америки. Тепл., ораж. или полувыносл. трав., либо полукуст. рр. Сѣменами, черенками или дѣленіемъ. Песк. глин. дерн.

**С. бревистата** (*S. brevistata*, съ короткой остью). Тукуманъ. Цв. головки розовыя, въ іюль. 2—3 ф. Тепл. **С. трахеліоидесъ** (*S. trachelioides*, похожая на Трахеліумъ). Мексика. Цв. головки пурпуровыя, въ августѣ. 2½ ф. Оранже.

**СТЕЛИСЪ** (*Stelis*). Древне-греческое названіе какого-то чужезданого р. С. орхидей. (150). Троп. Америка. Тепл. эпифитъ. Уходъ какъ за Плеуроталлисъ.

**С. цилиарісъ** (*S. ciliaris*, рѣсничатый). Мексика. Цв. темнопурпуровые, бахромчатые, въ февралѣ. 6 д. Сн. *C. atropurpurea* (*S. atropurpurea*).

**СТЕЛЛЯРІЯ** (*Stellaria*). *Stella*—звѣзда; по цв. С. гвоздичныхъ. (70). По всей земной поверхности. Трав. рр. не имѣющія значенія въ садоводствѣ.

**СТЕМОДИЯ** (*Stemodia*). *Stemon*—тычинка и *dis*—двойной; по пыльникамъ изъ двухъ глѣздъ. С. норичниковыхъ. (26). Троп. южн. Америка, Африка и Азія и Австралія. Теплич. и ораж. трав. либо полукуст. рр. Сильная, влажная. Дѣленіемъ.



**С. лобелиоидесъ** (*S. lobelioides*, походя на Лобелию). Бразилія. Цв. яркисиніе, въ августѣ. 1 ф.

**СТЕМОНА** (*Stemona*). *Stemon* — тычинка, по листовиднымъ тычинкамъ. *С. роксбургіевыхъ*. (5). Остіндія, Малайскій арх. и троп. Австралія. Тепл. вьющіяся рр. Легкая, волокн. глин. дерн. Отпрысками.

**С. глоріозойдесъ** (*S. gloriosoides*, походя на Глоріоза). Остіндія. Цв. колокольчатые, зеленые, въ іюль. 6 ф. Сип. *Роксбургіа глоріоза*, *R. viridiflora* (*Roxburghia gloriosa*, *R. viridiflora*).

**СТЕНАНТЕРА** (*Stenantha*). *Stenos* — узкій и *anthera* — пыльникъ: нити шире пыльниковъ, вслѣдствіе чего они кажутся узкими. *С. энкарпиевыхъ*. (2). Австралія. Оранж. куст. рр. Третъ песковатой глин. дерн. съ  $\frac{2}{3}$  очень песков. торфяной. Черенками изъ молодого роста, въ песокъ, въ парникъ. Темп. зимой 4—6°.

**С. пинифолия** (*S. pinifolia*, съ лл. какъ у хвойныхъ). Цв. сидячіе, угловые, красноватые, въ маѣ. 2—3 ф.

**СТЕНАНТИУМЪ** (*Stenanthium*). *Stenos* — узкій и *anthos* — цвѣтокъ, по узкимъ сегментамъ цв. покрова. *С. лизейныхъ*. (5). Зап. и Сѣв. Америка. Оранж. луковичн. рр. Песков. глин. дерн. съ торф. дѣленіемъ.

**С. ангиустифолиумъ** (*S. angustifolium*, узколистный). Цв. зеленовато-бѣлые, въ іюнь—іюль. 2—3 ф. **С. фригидумъ** (*S. frigidum*, холодный). Цв. пурпуровые, въ іюль. 2—3 ф.

**СТЕНІЯ** (*Stenia*). *Stenos* — узкій, по пыльцевымъ массамъ. *С. орхидей*. (3). Гвѣана, Колумбія и Перу. Эпифиты. Уходъ какъ за Максильаріа.

**С. гуттата** (*S. guttata*, испятнанная). Перу. Цв. свѣтло-желтые съ пурпуровыми пятнами. **С. фимбриата** (*S. fimbriata*, бахромчатая). Колумбія. Цв. блѣдно-желтые, внизу бахромчатой губы буро-пурпуровыя пятнышки. Сип. *Хондроринка фимбриата* (*Chondrorhyncha fimbriata*).

**СТЕНОГЛОТТИСЪ** (*Stenoglottis*). *Stenos* — узкій и *glotta* — языкъ; по узкой губѣ. *С. орхидей*. (1). Оранжер. земная орхидей. Глин. дерн. съ листов. переносомъ, гнилушками и дрв. углемъ. Дѣленіемъ. Во время роста обильно поливать.

**С. фимбриата** (*S. fimbriata*, бахромчатый). Ю. Африка. Цв. малиново-розовые. Корень клубневой.

**СТЕНОКАРПУСЪ** (*Stenocarpus*). *Stenos* — узкій и *karpos* — плодъ, по плоскимъ плодовымъ мѣшечкамъ. *С. протейныхъ*. (14). Австралія, Нов. Каледонія. Тепл. или оранж. деревья. Уходъ какъ за Ломатія.

**С. синуатусъ** (*S. sinuatus*, выемчатый). Австралія. Цв. ярко-красные, въ іюнь; лл. продолговатые или цѣльные, или перисто-разсѣченные. 60—100 ф. Сип. *С. Куннингаміи* (*S. Cunninghamii*).

**СТЕНОКОРИНЕ** (*Stenocoryne*). *Stenos* — узкій и *korune* — шишка; по клубообразной гипорцѣ у боковыхъ долей. *С. орхидей*. (1). Тепл. эпифитъ. Уходъ какъ за Максильаріа.

**С. лонгикорнисъ** (*S. longicornis*, съ длинными рожекми) Демерара. Цв. оранжевые съ коричневыми пятнышками, въ апрѣль. 1 ф.

**СТЕНОМЕССОНЪ** (*Stenomesson*). *Stenos* — узкій и *messon* — середина, по формѣ цв. покрова. *С. амариллисовыхъ*. (19). Троп. Америка. Тепл. или оранж. луковичн. рр. Уходъ какъ за Хиппеаструмъ.

**С. инкарната** (*S. incarnata*, тѣлеснаго цвѣта). Кито. Цв. обычно красные, въ августъ, Сип. *Кобургіа инкарната* (*Coburgia incarnata*). Имѣетъ нѣсколько формъ съ цв. иной окраски. **С. кокцинеумъ** (*S. coccineum*, шарлаховый). Перуанскія Анды. Цв. ярко-карминные, въ маѣ. Сип. *Кобургіа кокцинея* (*Coburgia coccinea*).

**СТЕНОСПЕРМАТИОНЪ** (*Stenospermation*). *Stenos* — узкій и *sperma* — уменьшительное *sperma* — сѣмя; по мелкимъ сѣменамъ. *С. ароидеиныхъ*. (7). Троп. Америка. Тепл. трав. рр. Уходъ какъ за Спатифиллюмъ.

**С. помпаянзензе** (*S. pompayanense*, помпаянскій). Помпаянскія Анды. Чехолъбѣлый, початокъ блѣднотелый; лл. эллиптически продолговатые. 1 ф. Сип. *С. Вальлизи*, *Спатифиллюмъ Вальлизи* (*S. Wallisii*, *Spathiphyllum Wallisii*).

**СТЕНОСТОМУМЪ** (*Stenostomum*). *Stenos* — узкій и *stoma* — устье; по формѣ цв. мареновыхъ. (5). Вестиндія. Тепл. деревья. Уходъ какъ за Хамилтонія.

**С. люцидумъ** (*S. lucidum*, свѣтлый). Цв. бѣлые, широко разставленные, въ маѣ. Черешки раздѣлены ниже середины. **С. томентозумъ** (*S. tomentosum*, пушистый). Цв. бѣлые, въ маѣ. Черешки раздѣлены не доходя середины.

**СТЕНОТАФРУМЪ** (*Stenotaphrum*). *Stenos* — узкій и *taphros* — борозда, по бороздчатому цв. стеблю. *С. злаковыхъ*. (3). Троицы. страны. Тепл. травы. Легкая, глин. дерн. Сѣменами или дѣленіемъ.

**С. американумъ** (*S. americanum*, американскій). Колосъ макушечные. 1 ф. Имѣетъ форму съ пестрыми лл.

**СТЕНОХИЛЮСЪ** (*Stenochilus*). *Stenos* — узкій и *cheilos* — губа. *С. мышечлѣбниковыхъ*. (8). Австралія. Кустар. кра-

сивыя рр. Песков. торф. Черенками въ песокъ, подъ рамой. Темп. зимой 4—6°.

**С. глэберъ** (*S. glaber*, гладкій). Цв. желтые или красные, либо той или другой окраски вмѣстѣ, въ апрѣль. 3 ф. Сип. *С. инканусъ*, *С. оискдусъ*, *Эремифіла Бродуни* (*S. incanus*, *S. viscosus*, *Eremophila Brownii*). **С. макуллатусъ** (*S. maculatus*, пятнистый). Цв. красные съ желтыми разводами. 3 ф. Сип. *Эремифіла макуллата* (*Eremophila maculata*).

**СТЕРИФОМА** (*Steriphoma*). *Steriphoma* — основаніе, по плодовой кожкѣ. *С. каперсовыхъ*. (3). Перу, Нов. Гренада. Венецуела и о. Троицы. Тепл. куст. рр. Глин. дерн., торф. и песокъ по ровну. Черенками изъ молодого роста, въ песокъ, въ парникъ.

**С. клеомойдесъ** (*S. cleomoides*, походя на Клеоме). Каракасъ. Цв. съ красно-бурою чашечкой и желтымъ вѣнчикомъ и тычинками, въ апрѣль до іюля. 6 ф. Сип. *С. парадоксумъ* (*S. paradoxum*).

**СТЕРКУЛІЯ** (*Sterculia*). *Stereus* — навозъ; лл. нѣкоторыхъ видовъ имѣютъ вонючій запахъ. *С. навозниковыхъ*. (60). Предпочт. Троп. Азія. Тепл. или оранж. дрв. рр. Легкая глин. дерн. или глин. дерн. съ торф. Черенками изъ зрѣлаго роста, не обрѣзая лл., въ песокъ, въ парникъ. Темп. зимой 6—10, лѣтомъ 13—24°.

**С. дисколоръ** (*S. discolor*, безцвѣтная). 3. Австралія. Цв. съ красно-розовой чашечкой. 40 ф. Оранж.

**СТЕФАНІЯ** (*Stephania*). *Stefan* (Stefan) — русскій ученый профессоръ, † 1817. *С. луносѣмянниковыхъ*. (3). Троп. Азія, Африка и Австралія. Тепл. или оранж. вьющ. рр. Уходъ какъ за Морисонія.

**С. ротунда** (*S. rotunda*, съ круглыми лл.). Гималай. Цв. оранжевые, зонтиками, въ іюнь. Оранж.

**СТЕФАНАНДРА** (*Stephanandra*). *Stephanos* — корона и *aner*, *andros* — мужчина, по рослополюженію тычинокъ. *С. розановыхъ*. (1). Вынос. куст. р. Уходъ какъ за Сипрѣа.

**С. флексуба** (*S. flexuosa*, гибкая). Японія. Цв. бѣлые, мелкіе; въ іюль.

**СТЕФАНОКОМА** (*Stephanocoma*). *Stephanos* — вѣнецъ и *kome* — волосъ; по хохолку. *С. сложноцвѣтныхъ*. (1). Оранж. трав. р. Уходъ какъ за Бекхея.

**С. кардуойдесъ** (*S. cardnoides*, походя на Кардуусъ). Ю. Африка. Цв. головки желтыя, осенью. 2½ ф.

**СТЕФАНОТИСЪ** (*Stephanotis*). *Stephanos* — вѣнецъ и *ous*, *otos* — ухо; по усикамъ тычиночного вѣнца. *С. ласточкинскихъ*. (14). Мадагаскаръ, Малайскій

архипелагъ, Юж. Китай, Куба и Перу. Тепл. вьющ. куст. рр. Волокн. глин. дерн. Черенками предшествовавшего года, по одиночкѣ, въ горшкахъ, весной, въ темп. 13°. Обростія рр. высаживаются въ тепл. грунтъ и по мѣрѣ выростанія расправляются по шпалерѣ.

**С. флорибунда** (*S. floribunda*, цвѣтущій пучками). Мадагаскаръ. Цв. бѣлые, весьма душистые, въ маѣ; лл. овальные, острокопечные. 10 ф.

**СТИГМАФИЛЛОНЫ** (*Stigma-phyllon*). *Stigma* — рыльце и *phyllon* — листъ, по устройству рыльца. *С. мальнигійныхъ*. (50). Троп. Америка. Тепл. вьющ. куст. рр. Глин. дерн. съ лист., торф. и пескомъ. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ песокъ, въ парникъ. Темп. зимой 7—10, лѣтомъ 13—21°.

**С. литторале** (*S. littorale*, побережный). Ю. Бразилія. Цв. желтые, осенью; лл. различной формы. **С. цилиатумъ** (*S. ciliatum*; реснитчатый). Бразилія. Цв. желтые, въ іюль до августа; лл. сердцевидные.

**СТИЛИДІЕВЫЯ** рр. (*stylidiaceae*). Малочисленное семейство травянистыхъ или полукуст. рр., растущихъ въ Австраліи, троп. Азіи, въ Нов. Зеландіи и антаркт. Америкѣ. Родовъ всего четыре, а видовъ до 100, изъ нихъ на одинъ родъ Стилидиумъ приходится 84, остальные виды распределены между родами Левенхукія, Филляхне и Форстера.

**СТИЛИДИУМЪ** (*Stylidium*) *Stylos* — столбикъ: тычинки срослись со столбикомъ. *С. стилидеевыхъ*. (84). Остіндія, Австралія. Красивыя рѣдкія оранж. трав. многол. рр. Песков. глин. дерн. съ торф. Сѣменами или дѣленіемъ, иногда черенками.

**С. бульбиферумъ** макрокарпумъ (*S. bulbiferum macrocarpum*, луковичный крупноплодный). Австралія. Цв. зелено-пурпуровые, въ маѣ. 6 д. **С. граминифолиумъ** (*S. graminifolium*, съ лл. какъ у злаковъ). Австралія. Цв. малиновые, въ іюль. **С. спатулатумъ** (*S. spathulatum*, лопатчатый). Австралія. Цв. желтые, лѣтомъ.

**СТИЛОФОРУМЪ** (*Stylophorum*). *Stylos* — столбикъ и *phero* — несущ. *С. маковыхъ*. (3). С. Америка, Гималай, Манжурия и Японія. Вынос. трав. рр. съ желтымъ сокомъ. Легкая, всякая. Сѣменами или дѣленіемъ.

**С. дифиллюмъ** (*S. diphyllum*, двулистный). С.-З. Америка. Цв. темно-желтые, въ маѣ. 1 ф. Похоже на Хелиодиумъ. Сип. *С. охионензе* (*S. ohioense*).

**СТИПА** (*Stipa*). *Stipe* — шелковистая или перистое вещество; по цвѣторасположенію. *С. злаковъ*. (100). Троп. и умѣр.



пояса. Тепл., ораж. или вынос. многол. травы. Обыкн. сад. Сѣменами и дѣленіемъ.

**С. лязиарбостисъ** (*S. Lasiagrostis*, *Kil*). Ю. Европа. Ср. Азія. Цв. развѣтвленной метелкой, соломка иногда вѣтвляющаяся. Син. *Лязиарбостисъ калмагробостисъ* (*Lasiagrostis Calamagrotis*). **С. пеннѣта** (*S. pennata*, перистая). Кавказ. Европа. Рыхлая, перистая метелка, въ июль—августъ. 2 ф.

**СТИПАНДРА** (*Styandra*). *Stype*—павла и *aner*, *andros*—пыльникъ, по пышнымъ тычинкамъ. С. лилейныхъ (3). Австралія. Ораж. многол. трав. пр. Песков. глин. дерн. съ торф. дѣленіемъ.

**С. глѣука** (*S. glauca*, сизая). Цв. голубые, въ июль. 1—3 ф. **С. умбеллята** (*S. umbellata*, зонтичная). Цв. бѣлые или желтоватые, въ июль. 8—10 л.

**СТИРАКОВЫЯ** пр. (*styraceae*). Древесныя или кустарныя пр. изъ жаркихъ странъ Азіи, Австраліи и Америки; часть ихъ растетъ въ умѣр. сѣверныхъ поясахъ. Въ семействѣ этомъ семь родовъ и около 220 видовъ. Главнѣйшіе роды Симилокъс и Стираксъ.

**СТИРАКСЪ** (*Styrax*). Названіе взято у Теофраста. С. стираксовыхъ (60). Жаркіе страны Азіи и Америки, немногія въ умѣр. Азіи и Европѣ. Ораж. или вынос. дерев., либо куст. пр. Легкая. Отводкой осенью.

**С. грандифолия** (*S. grandifolia*, крупнолиственный). С. Америка. Цв. бѣлые, весной. 6 ф. **С. сerratulата** (*S. serrulata*, зубчатый). Индія. Японія. Цв. бѣлые, весной. 40 ф.

**СТИФЕЛІЯ** (*Styphelia*). *Styphelos*—твердый, крѣпкій. С. элакарисовыхъ (11). Австралія. Ораж. куст. пр. Волокн. торф. съ 1/2 песку. Черенками.

**С. тубифлора** (*S. tubiflora*, съ трубчатыми цв.). Цв. красные, въ июль. 5 ф.

**СТЕЛЯНКА. СТЕЛЯНКОВОЕ ЯБЛОКО.** Сортъ поздній, продолговатой формы и средней величины. Кожица зеленоватая, очень глянцевитая, какъ-бы стеклянная. Легкій румянецъ. Вкусъ—кисловатый. **С. остраковское.** Очень походитъ на с. обыкновенное, но съ желтоватою кожицею и болѣе кислымъ вкусомъ. **С. песочное.** Походитъ на с. обыкновенное, но съ кожицею шероховатою, какъ-бы посыпанною пескомъ.

**СТОКЕЗІЯ** (*Stokesia*). *Stokes*—врачъ, занимавшійся съ Уитерингомъ описаніемъ британскихъ пр., † 1831. С. сложновѣтвистыхъ. (1). Ораж. многол. трав. пр. обыкнов. Сѣменами или дѣленіемъ корней.

**С. піанеа** (*S. suanea*, голубая). С. Америка. Цв. головки голубыя, въ августъ. 1—1 1/2 ф.

**СТОЛѢТНЕЕ ДЕРЕВО.** См. Агава.

**СТРАВАДИУМЪ** (*Stravadium*). На Малабарѣ одинъ изъ видовъ называется мѣстно *самстравади*. С. миртовыхъ. (5). Остиндія, Полинезія. Тепл. дрв. пр. Волокн. глин. дерн. съ торф., пескомъ и дрв. углемъ. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ песокъ, въ парникъ. Темп. зимой 13—15, лѣтомъ 15—26°.

**С. альбумъ** (*S. album*, бѣлый). Полинезія. Цв. бѣлые, длинными кистями; въ июль. 20 ф. **С. рубрумъ** (*S. rubrum*, красный). Остиндія. Цв. красные, очень длинными кистями, въ июль. 20—30 ф. Син. *Барринтонія акутангула* (*Barringtonia acutangula*).

**СТРАНВѢЗІЯ** (*Stranvæzia*). *Странвейсъ* (*Strangways*)—англійскій ботаникъ. С. розановыхъ. (1). Полувын. дерево. Прививкою къ боярышнику.

**С. глянцесценсъ** (*S. glaucescens*, сизоватая). Умѣр. Гималаи. Цв. бѣлые, въ июль. Плоды мелкіе, оранжевые. 20 ф.

**СТРЕВЛОРІЦА** (*Streblorhiza*). *Streblos*—перевитый, *rhiza*—корень; по корню. С. бобовыхъ. (1). Ораж. вьющ. р. Глин. дерн. съ листов. и дрв. углемъ. Сѣменами или черенками.

**С. спеціоза** (*S. speciosa*, отъишная). О. Норфолькъ. Цв. тѣлесные, довольно крупные, похоти на цв. кліантусъ, въ май. 3 ф.

**СТРЕВЛЮСЪ** (*Streblus*). *Streblos*—перевитый; по вѣтвямъ. С. крапивныхъ. (1). Тепл. кустъ. Сильная глин. дерн. съ волокн. торф. или лист. Сѣменами, или черенками въ песокъ, въ парникъ.

**С. асперъ** (*S. asper*, жесткій). Троп. Азія. Цв. двудомные, мужскіе—головками, женскіе—одиночные; лл. жесткіе, зубчатые. 20 ф.

**СТРЕЛІТЦІЯ** (*Strelitzia*)—герцогиня мекленбургъ-стрелицкая Шарлота. С. вибрныхъ. (5). Ю. Африка. Тепл. многол. трав. пр. Глин. дерн. 2 ч., торф. 1 ч. съ добавленіемъ песку. Отпрысками и дѣленіемъ. Лѣтомъ обильно поливать. Темп. зимой 6—10, лѣтомъ 13—22°.

**С. августа** (*S. augusta*, величественная). Цв. бѣловатые (чашечка и вѣнчикъ), въ мартъ; лл. почти сердцевидные. 10 ф. **С. регинѣ** (*S. Reginae*, царицына). Цв. оранжевые съ пурпуровымъ, въ апрѣль, лл. овальные. 5 ф. Каффы употребляютъ сѣмена въ пищу. Син. *С. хумиліс* (*S. humilis*). У разновидности *пролифера* (*prolifera*) на той же стрѣлкѣ вырастаютъ два чехла съ цв.

**СТРЕПТАНТЕРА** (*Streptanthera*). *Streptos*—перевитый и *anthera*—пыльникъ. С. косатиковыхъ. (2). Ю. Африка. Низкорослыя оражер. луковичныя пр. Песков. глин. дерн. Отпрысками.

**С. элегансъ** (*S. elegans*, изящная). Цв. бѣлые съ легкимъ розоватымъ оттенкомъ, весной. 9 д.

**СТРЕПТАНТУСЪ** (*Streptanthus*). *Streptos*—перевитый и *anthos*—цв.; у нѣк. видовъ завитой поготовъ лепестковъ. С. крестоцвѣтныхъ. (13). 3. часть С. Америки. Вынос. одно- или многол. трав. пр. Упомянутый ниже видъ—однол. Сѣменами въ парникъ.

**С. макулѣтусъ** (*S. maculatus*, испятнаный). Цв. съ пурпуровой чашечкой и темно-пурпуровыми, бархатистыми лепестками, въ августъ. 1 1/2 ф.

**СТРЕТОКАРПУСЪ** (*Streptocarpus*). *Streptos*—перевитый и *karpos*—плодъ; по спирально-завитымъ плодишкамъ. С. гесперійныхъ. (12). Южн. и троп. Африка, Мадагаскаръ. Тепл. или ораж. иногда безстебельныя трав. пр. Растит. пережной. Сѣменами и дѣленіемъ. Упомянутые ниже виды—многол. изъ Южн. Африки.

**С. Дюни** (*S. Dunnii*, Дюнна). Трансвааль. Цв. розовые, въ май-июль; л. одинъ, горизонтально разложенный; стебель очень короткій. Тепл. **С. парвифлора** (*S. parviflora*, мелкоцвѣтная). Цв. многочисленныя, бѣлые съ пурпуровыми черточками, въ июль; лл. много. Растеніе оранжевое. **С. Рѣксіи** (*S. Rexii*, Рѣкса). Цв. голубоватые, въ июль; лл. несколько, но только корневыхъ. 6 д. Син. *Дидимокартусъ Рѣксіи* (*Didymocarpus Rexii*). Тепл. **С. Саундерсіи** (*S. Saundersii*, Саундерса). Цв. голубые лѣтомъ; л. одинъ, коревой. 1 ф. Тепл.

**СТРЕПОПУСЪ** (*Streptopus*). *Streptos*—перевитый, *pous*—ножка или черешокъ; по согнутому по срединѣ черешку. С. лилейныхъ. (4). Европа, умѣр. и горная Азія и С. Америка. Ораж. или вынос. многол. трав. пр. Песков. легкая. Сѣменами или дѣленіемъ.

**С. розеусъ** (*S. roseus*, розовый). С. Америка. Цв. розово-пурпуровые, въ май. 1 1/2 ф. Син. *Увуларія розеа* (*Uvularia rosea*).

**СТРЕПОСОЛЕНЪ** (*Streptosolen*). *Streptos*—перевитый и *solen*—трубка; по формѣ трубки вѣнчика. С. пасленовыхъ. (1). Ораж. куст. р. Песков. глин. дерн. Черенками, въ песокъ подъ рамой.

**С. Джемсоніи** (*S. Jamesonii*, Джемсона). Колумбія. Цв. оранжевые, въ июль. 4 ф.

**СТРІХНОСЪ** (*Strychnos*). Названіе, заимствованное у Теофраста, который давалъ его какому-то пасленовому р. С. логаніевыхъ. (60). Тропич. страны. Тепл. дрв. или куст. пр., имѣющія важныя лекарственныя свойства, но не представляющія садового значенія.

**СТРОВИЛОРАХИСЪ** (*Strobilora-chis*). *Strobilos*—шишка и *rachis*—цв. ножка; по цвѣторасположенію. С. акантовыхъ. (2). Бразилія. Тепл. куст. пр. Уходитъ какъ за Руеллія.

**С. призматика** (*S. prismatica*, призматическій). Цв. желтые, въ июль. 2—3 ф. Син. *С. глѣбра*, *Хидроместусъ макулѣтусъ* (*S. glabra*; *Hydromestus maculatus*).

**СТРОВИЛАНТЕСЪ** (*Strobilanthes*). *Strobilos*—шишка и *anthos*—цв.; по формѣ цвѣторасположенія. С. акантовыхъ. (180). Остиндія, Чили, Японія, Малайскій архип. и троп. Африка. Тепл. трав. или куст. пр. Легкая. Черенками изъ полузрѣлага роста въ песокъ, въ парникъ. Темп. зимой 8—10, лѣтомъ 13—24°. Упомянутые ниже виды—индѣйскіе.

**С. анизифиллюсъ** (*S. anisophyllus*, съ неровными лл.). Силежъ Цв. свѣтло-лиловые, въ июль. 2—3 ф. Син. *Гольдфуссія анизифилля*, *Руелія анизифилля*, *Р. персифилля* (*Goldfussia anisophylla*, *Ruelia anisophylla*, *R. persicifolia*). **С. Вальхейи** (*S. Wallichii*, Вальхей). Цв. голубые, въ октябрь. 6 д. до 2 ф. **С. гломерѣтусъ** (*S. glomeratus*, скученный). Цв. пурпуровые, въ ноябрь. 2—6 ф. **С. изифиллюсъ** (*S. isophyllus*, съ ровными лл.). Цв. свѣтло-лиловые, осенью 1—2 ф.

**СТРОМАНТЕ** (*Stromanthe*). *Stroma*—ложе и *anthos*—цв., по расположенію. С. ибирныхъ. (4). Бразилія. Тепл. многол. трав. пр. Уходитъ какъ за Калатея.

**С. амабиліс** (*S. amabilis*, милостивое). Л. продолговато-овальные, равнобокіе, нестрѣные, съ темными полосами по направлению жилокъ и съ серебристыми промежутками. Очень орнаментально. **С. портеана** (*S. Porteana*, Порта). Цв. метельчатые; лл. овальные или ланцетовидные, пріятнаго зеленого цв.

**СТРОФАНТУСЪ** (*Strophanthus*). *Strophos*—свитой жгутъ и *anthos*—цв.; по лоскутамъ вѣнчика. С. кутровыхъ. (18). Троп. Африка и Азія. Тепл. или ораж. кустарн. пр. Песков. глин. дерн. съ торф. Черенками въ песокъ, въ умѣр. теплѣ.

**С. дихотомусъ** (*S. dichotomus*, вилораздѣленный). Остиндія. Цв. бѣловатые, въ мартъ. 3 ф. Тепл. **С. калензіс** (*S. calensis*, калскій). Мысъ Д. Над. Цв. желтоватые, въ июль. 3 ф.

**СТРУКЪ. СТРУЧОКЪ.** Лопатка. Долгій двустворчатый сѣмянникъ бобовыхъ растений,—гороха, бобовъ и т. п.

**СТРУМАРІЯ** (*Strumaria*). *Struma*—бугорокъ; по разширенной срединѣ столбика. С. амариллисовыхъ. (6). Ораж. лукович. пр. Песков. глин. дерн. Дѣленіемъ или сѣменами.



**С. рубелля** (*S. rubella*, красноватая). Цв. красноватые, зонтикомъ, въ маѣ. 5—6 д.  
**С. труката** (*S. truncata*, усѣченная). Цв. бѣлые, выпук красноватые, въ апрѣлѣ. 6—8 д.

**СТРУТЮЛЯ (Struthiola).** *Struthion* — воробушекъ; по сходству съмятъ съ клювомъ этой птицы. С. ягодковыхъ. (20). Ю. Африка. Оранжев. куст. или полукуст. рр. Песков. торф. Черенками въ песокъ, подъ рамой. Темп. зимой 4—7°.

**С. виргата** (*S. virgata*, тонковѣтчатая). Цв. красные, въ июлѣ. 2 ф. **С. лонгифлора** (*S. longiflora*, длиновѣтчатая). Цв. красноватые или желтоватые, въ июлѣ. 2 ф.

**СТРУЧКИ ЦАРЕГРАДСКІЕ.** См. Цератонія.

**СТРУЧКОВЫЙ ПЕРЕЦЪ.** См. Капсикумъ.

**СТРУЧКОВЫЯ ОВОЩИ.** Горошекъ, бобы, фасоль, соя, чечевица.

**СТРѢЛКА.** Длинная безлистная или почти безлистная прѣточная ножка, выходящая изъ верхней части корня.

**СТУАРТІЯ (Stuartia).** Джонъ Стюартъ лордъ Бютъ (John Stuart lord Bute) — покровитель ботаники, † 1792. С. теристрѣмійныхъ. (3). Ств. Америка, Японія. Оранжев. куст. рр. Торф. съ глини. дерн. Отводкой или черенками подъ рамой.

**С. виргиника** (*S. virginica*, виргинская). С. Америка. Цв. бѣлые, въ апрѣлѣ — маѣ. 8 ф. **С. пентагина** (*S. pentagyna*, съ 5 столбиками). С. Америка. Цв. бѣлые, въ маѣ — июлѣ. 10 ф. Сив. *Маллаходендронъ оватумъ* (*Malachodendron ovatum*).

**СУГЛИНОКЪ.** Земля съ малою примѣсью глины.

**СУКЪ, СУЧЕВЪ.** Боковая отрасль лѣсной, стебля. Отъ корня дерева идетъ *шѣла, стрѣла, голомъ*, до первой розсохи, гдѣ она разбивается на *сучья*, отъ коихъ идутъ вторыя розсохи — *вѣтви* и третьи — *вѣтки*, а далѣе — *побѣты*. Сучья и вѣтви въ просторѣчьи называются *ножомъ* дерева. Въ садоводствѣ подъ комомъ разумѣется совершенно противоположная часть растенія, — корень съ развѣтвленіями, окруженный землей.

**СУЛТАНЪ** яблоко. См. Лежанка.

**СУМАХЪ.** См. Русъ.

**СУМКА.** Продолговатая клѣточка плодоноснаго слоя сумчатыхъ грибовъ; въ этихъ клѣточкахъ содержатся споры, обычно 8. Грибы, имѣющие такой плодоносный слой, называются *сумчатыми*.

**СУТЕРЛАНДІЯ (Sutherlandia).** *Сутерландъ* (Sutherland) — инспекторъ садовъ Единбурга, написавшій „Hortus

medicus edinburgensis“ 1683. С. бобовыхъ. (1). Оранжев. куст. р. Глин. дерн. съ торф. Сѣменами или черенками изъ молодого роста.

**С. фрутесценсъ** (*S. frutescens*, кустарная). Ю. Африка. Цв. шарлаховые или красные, въ июлѣ. 3 ф.

**СЪТКИ.** День и ночь вмѣстѣ, раздѣляемые на 24 часа. Время въ одинъ оборотъ земли около своей оси.

**СУХОЦВѢТЫ.** См. Аммобиумъ, Безсмертники и Хелихризумъ.

**СФАЦЕЛЕ (Sphacele).** *Sphakos* — шалфей; по сходству л. С. губоцвѣтныхъ. (20). 3. Америка отъ Бразиліи и Чили до Калифорніи, одинъ видъ на Сандвичевыхъ о. Тепл. или оранжев. рр. Уходъ какъ за нѣжными видами Сальвии.

**С. кампанулата** (*S. campanulata*, колокольчатое). Чили. Цв. голубоватые, въ июлѣ. 2—3 ф.

**СФЕНАНДРА (Sphenandra).** *Sphen* — клинъ и *aner, andros* — мужчина; по формѣ пыльниковъ. С. поричниковыхъ. (1). Оранжев. одно- или многол. трав. р. Глин. дерн. Сѣменами.

**С. вискоза** (*S. viscosa*, липкая). Ю. Африка. Цв. фиолетовые, въ июлѣ. 1 ф.

**СФЕНОДЕСМА (Sphenodesma).** *Sphen* — клинъ и *desma* — пучокъ; по способу расположенію. С. вербеновыхъ. (8). В. Индія и Малайскій архипелагъ. Тепл. выющ. куст. рр. Песков. глин. дерн. Черенками въ песокъ, въ парникѣ.

**С. пентандра** (*S. pentandra*, въ пятью пыльниками). Остиндія. Цв. пурпуровые, въ июлѣ. 6 ф. Сив. *С. Жакіана* (*S. Jacciana*).

**СФЕРАЛЬЦЕА (Sphaeralcea).** *Sphaera* — шаръ и *Alcea*, по расположенію плодинокъ кругомъ головки. С. мальвовыхъ. (25). Мысъ Д. Н., жаркія страны Америки. Тепл., оранжев. или выносл. трав. полукуст. или куст. рр. Сильная глин. дерн. Черенками изъ молодого роста, въ песокъ, подъ стекломъ. Темп. зимой 4—7°.

**С. миниата** (*S. miniata*, красно-сукриковая). Ю. Америка. Цв. киноварно-красные, въ маѣ до июля. 1 ф. Оранжев. полукуст. р. С. *элегансъ* (*S. elegans*, изящная). Ю. Африка. Цв. блѣдые съ пурпуровыми жилками, въ июлѣ. Оранжев. полукуст.

**СФЕРОЛОВИЮМЪ (Sphaerolobium).** *Sphaera* — шаръ и *lobos* — стручокъ; по шаровиднымъ стручкамъ. С. бобовыхъ. (13). Австралія. Оранжев. куст. или полукуст. рр. Глин. дерн. съ торф. Черенками изъ молодого роста, въ песокъ, подъ стекломъ.

**С. виминѣумъ** (*S. vimineum*, съ побѣгами). Цв. желтые, лѣтомъ. С. *медиумъ*

(*S. medium*, промежуточный). Цв. красные или оранжевые, лѣтомъ. Сив. *С. акуминатумъ* (*S. acuminatum*).

**СФЕРОПТЕРИСЪ (Sphaeropteris).** *Sphaera* — шаръ и *pterus* — папоротникъ; по оберткамъ. С. папоротниковыхъ. (1). Тепл. р.

**С. барбата** (*S. barbata*, бородачатый). Непаль, Сиккимъ. Ван трехперистый, длиною въ 2—3 ф. Сив. *Перанема цатеоидесъ* (*Pernanema cyatheoides*).

**СФЕРОФИЗА (Sphaerophysa).** *Sphaera* — шаръ и *physa* — пузырь; по стручкамъ. С. бобовыхъ. (3). Русская Азія, Востокъ. Выносл. многол. трав. или полукуст. рр. Песков. глин. дерн. Поливать по временамъ соленою водою. Сѣменами. **С. сальсуля** (*S. salsa*, любящая соль). Кирг. степи, Сибирь до С. Китая. Цв. грязно-пурпуровые, въ июлѣ и августѣ. 1½ ф. Сив. *С. каспика* (*S. caspica*).

**СХЕМА.** Образецъ. Образъ, отвлеченно отъ предмета.

**СЦЕВОЛА (Scaevola).** *Scaeva* — лѣвша; по вѣтвику. С. гуденовѣвыхъ. (60). Австралія, о. Тихаго Океана, приморская Азія, Африка и Вестиндія. Тепл. или оранжев. кустарн. либо многол. трав. рр. Волоки. глин. дерн. съ торф. и пескомъ. Черенками, въ парникѣ.

**С. Кенигъ** (*S. Koenigii*, Кенига). Вестиндія. Цв. блѣдно-красные, въ августѣ. 2 ф. Куст. р.

**СЦЕЛОХИЛЮСЪ (Scelochilus).** *Skelos* — бедро и *cheilos* — губа; по формѣ раздѣленной губы. С. орхидей. (4). Анды южн. Америки. Тепл. эпифиты. Уходъ какъ за Бурингтоніи.

**С. Оттонисъ** (*S. Ottonis*, Оттона). Каракасъ. Цв. желтые съ пурпуровыми полосками, въ маѣ.

**СЦИЛЬДЯ (Scilla).** Древнегреч. названіе, приводимое Гиппократомъ. С. лилейныхъ. (80). Европа, умѣренная и гористая Азія и вѣтвотронія, или горная тропич. Африка, Чили. Тепл., оранжев. и выносл. лукович. рр. Обыкновенная для выносливыхъ, которая сажалъ осенью, песков. глин. дернов. — для оранжев. и тепличныхъ. Размнож. сѣменами и отпрысками.

**С. амѣна** (*S. amaeua*, приятная). *Синій подстожникъ*. Европа. Цв. голубые, иногда бѣловатые, въ мартѣ. 6—9 д. Выносл. **С. бифolia** (*S. bifolia*, двулистная). *Подсинжикъ*. Раст. Средиз. побережье, Ю. Россія. Цв. голубые, въ мартѣ. Лл. обычно дву. 4—8 д. Выносл. Имѣетъ разновидности *требоксъ* и *таурика* (*praecox, taurica*). **С. нутансъ** (*S. nutans*, пониклая). 3. Европа. Цв. голубые, пурпуровые, бѣлые или мали-

новые, пониклые, въ апрѣлѣ до іюня. 10—18 д. Сив. *С. нонскрипта*, *Аграфисъ нутансъ*, *Хиамитусъ нонскриптусъ* (*S. non-scripta, Agraphis nutans, Hyacinthus non-scriptus*). Имѣетъ нѣсколько садовыхъ формъ. **С. перувіана** (*S. peruviana*, перуанская). Средиземн. побережье. Цв. лиловые, красноватые или бѣловатые, въ маѣ. 6—12 д. Выносл. **С. пратенсисъ** (*S. pratensis*, луговой). Далмація. Цв. голубые, колокольчиками, въ маѣ. 6—12 д. Выносл. **С. сибиріка** (*S. sibirica*, сибирская). Сибирь. Цв. темно-голубые, малочисленные, въ мартѣ. 4—6 д. Выносл. Сив. *С. амбуля*, *С. унифлора* (*S. amoenula, S. uniflora*). **С. хиандитойдесъ** (*S. hyacinthoides*, похожая на Гиацинтъ). Средиз. побережье. Цв. лиловатые, въ августѣ. 1—1½ ф. Выносл. **С. хинѣнзисъ** (*S. chinensis*, китайская). Китай. Цв. розово-пурпуровые, въ июлѣ. 1 ф. и выше. Оранжев. Сив. *Барнардія сциллоидесъ* (*S. Barnardia scilloides*). **С. хиспаніка** (*S. hispanica*, испанская). Португалія. Цв. голубые или бѣлые, въ маѣ. 6—9 д. Полувыносл. или оранжев.

**СЦИДОПИТИСЪ (Sciadopitys).** *Skyas* — тѣнь (зонтикъ) и *pitys* — ель; по кольчатымъ лл. С. хвойныхъ (1). Въ умѣр. климатѣ выносливое дерево. Сильная, влажная глин. дерн. Сѣменами. Ростъ весьма тихій.

**С. вертициллата** (*S. verticillata*, кольчатый). Японія. Лл. длинные, линейные, нѣсколько серповидные, расположенные по концамъ вѣтокъ распростертымъ кольцомъ, какъ бы зонтикомъ; линіи эллиптически-цилиндрической. 80—120 ф. Имѣетъ нѣсколько разновидностей, между прочимъ *варіеата* (*variegata*) съ частью желтаго цв. листьевъ.

**СЦИДОФИЛЬЮМЪ (Sciadophyllum).** *Skyas, skyados* — тѣнь и *phylon* — листъ; лл. широки и потому даютъ много тѣни. С. аралиевыхъ. (22). Троп. Америка. Тепл. или оранжев. куст. рр. Глин. дерн. съ торф. и пескомъ. Черенками въ песокъ и парникѣ.

**С. акуминатумъ** (*S. acuminatum*, съ заостренными лл.). Перу. Цв. желтые, мелкими головками, въ маѣ. Р. цѣнное. 10 ф. Оранжев. **С. Броуніи** (*S. Brownii*, Броуна). Ямайка. Цв. бѣлые, въ июлѣ. Стебель деревянистый. 10—15 ф. Тепл. **С. коникумъ** (*S. conicum*, коническій). Перу. Цв. красноватые, маленькими головками, въ маѣ. Стебель кустарный. 10 ф. Тепл.

**СЪМЕНИКЪ. СЪМЯННИКЪ.** Плодъ или его часть, въ которой заключается сѣмя. Плодъ оставленный на сѣмена.

**СЪМЕНОДОЛЯ.** Зачаточный листокъ



сѣмени, называемый обыкновенно сѣмоннымъ листомъ.

**СЪМЯ.** Оплодотворенное яичко, содержащее одинъ, иногда два или болѣе, зародышей, т. е. зачатокъ будущихъ пр. Бываетъ только у явнѣйшихъ пр.

**СЪМЯНКА.** Сухая, твердая, односѣмянная верхняя плодинка.

**СЪРНАЕЪ.** См. Ляміумъ.

**СѢТКА. СѢТЬ.** Необходима въ садоводствѣ для защиты посѣваемыхъ плодовъ, сѣмянъ и молодыхъ сѣменныхъ растений отъ птицъ. Она бываетъ или постоянная, — проволочная гальванизованная, или временная, — изъ рыболовной сѣти, которая можетъ тоже служить долго, если ее передъ уборкою просушить и сохранять потомъ въ сухомъ мѣстѣ.

**СЪЯНЧИКЪ. СЪЯНЕЦЪ.** Луковички отъ сѣмени. Всходы луковичаго растения.

**ТАБАКЪ.** См. Никотіана.

**ТАБЕВУЯ (Tabebuia).** Мѣстное бразильское названіе. С. биньоніиныхъ. (60). Троп. Америка. Тепл. куст. или древ. пр. Уходъ какъ за Текома.

**Т. эскулифолія (T. aesculifolia),** съ лл. какъ у эскулюса. Мексика. Цв. оранжевые, въ іюнѣ. 20 ф. Спн. *Bignonia aesculifolia* (Bignonia aesculifolia).

**ТАВЕРНЕМОНТАНА (Tabernaemontana).** *Tabernaemontanus* — знаменитый гейделбергскій врачъ и ботаникъ, † 1590. С. кутровыхъ. (110). Тропич. страны. Тепл. кустар. или древ. пр. Глин. дерн. съ торф. и пескомъ. Черенками въ песокъ, въ парникъ. Упомянутые ниже виды — кустарники съ бѣлыми цв.

**Т. Вартери (T. Barteri),** Бартера. 3. троп. Африка. Цв. въ іюлѣ. 6 ф. **Т. коронарія (T. coronaria),** вѣчная. Отечество неизвѣстно. Цв. пахнутъ ночью; въ іюлѣ. 4 ф. Разводится въ Индіи повсемѣстно.

**ТАВЕРНЬЕРА (Taverniera).** *Taverniera* — знаменитый путешественникъ въ Левантъ, † 1689. С. бобовыхъ. (7). Остіндія и Востокъ. Оранж. подукуст. Уходъ какъ за Десмодіумъ.

**Т. пуммуларія (T. pumiliaria),** монетная. Индія. Афганістанъ. Востокъ. Цв. красные, въ іюлѣ—іюлѣ. 1—2 ф.

**ТАВОЛГА.** См. Спирея.

**ТАГЕТЕСЪ (Tagetes).** *Tagus* — одно изъ эгрусскихъ божествъ. С. сложноцвѣтныхъ. (20). Жаркія страны Америки. Большинство однол. выносл. пр. Обыкн. садов. Сѣменами весною въ парникъ, потомъ высадить.

**Т. патуля (T. patula),** распростертый. *Бархатцы.* Мексика. Цв. головки темно-золотистыя, въ августѣ. 1½ ф. Спн. *T. corimbosa* (T. corimbosa). **Т. тенуифолія (T. tenuifolia),** тонколистный. Мексика и Перу. Цв. головки желтыя, въ августѣ 2 ф. **Т. эректа (T. erecta),** прямой. *Шалочки.* Мексика. Цв. головки желто-лимонныя, вдвое крупнѣе чѣмъ у бархатцевъ, въ іюлѣ. 2 ф. Всѣ эти пр. имѣютъ много садовыхъ разновидностей и формъ.

**ТАИНІЯ (Tainia).** *Tainia* — полоса, по прямой губѣ. С. орхидей. (7). Остіндія, Ю. Китай, Малайск. архипелагъ. Тепл. орхидей. Уходъ какъ за Калите.

**Т. бикорнис (T. bicornis),** двурогая. Цейлонъ. Цв. зеленые съ краснымъ отгиномъ, губа желтая, пыльники двурогіе; въ мартѣ. Спн. *Ania bicornis* (Ania bicornis). **Т. латифолія (T. latifolia),** широколистная. Силхетъ. Цв. зеленоватые съ коричневыми. Спн. *Calanthe viridifusca* (Calanthe viridifusca).

**ТАЙТОНІЯ (Tytonia).** *Tytonia* — англійскій садоводъ, сохранившій многія старинныя садовыя пр. С. гераниевыхъ. (1). Теплич. водяное сѣменами, весною.

**Т. натаанс (T. natans),** плавающая. Троп. Азія. Цв. пестрые — красные съ бѣлымъ и желтымъ, въ іюлѣ до сентября. Спн. *Hydrocera triflora* (Hydrocera triflora).

**ТАКАМАГАКА** См. Популюсъ.

**ТАККА (Tacca).** Малайское названіе. С. таквовыхъ. (9). Тропич. страны. Тепл. многол. трав. пр. Глин. дерн. съ торф. и пескомъ. Дѣленіемъ.

**Т. интегрифолія (T. integrifolia),** цѣлолистная. Чинтагонъ. Цв. зеленые съ пурпуровыми и желтыми разводами, въ іюнѣ. Стебли почти нѣтъ. Спн. *T. aspera* (T. aspera). **Т. пинналіфиды (T. pinnatifida),** перисторазсѣченная. Остіндія, о. Товарищества. Цв. пурпуровые, въ іюлѣ. Стебли нѣтъ. Корневище клубневое.

**ТАККАРУМЪ (Taccarum).** Отъ *Tacca*, по сходству. Спн. ароидныхъ. (4). Бразилія. Тепл. клубневые высокія пр. Уходъ какъ за Стауростигма.

**Т. перегринумъ (T. peregrinum),** иноземный. Чехоль оливковаго цвѣта, початокъ цилиндрической, покрытый сплошь цв.; лл. большіе, о трехъ сегментахъ. Корень — полушаровидный клубень. Спн. *Lysistigma peregrinum*, *Эндера конофаллоидея* (Lysistigma peregrinum, Endera conophalloidea).

**ТАКОВЫЯ** пр. (Taccaseae). Малочисленное сем. многол. трав. пр. съ клубневымъ или ползучимъ корневищемъ, встрѣчаемыхъ въ тропич. странахъ и Китаѣ. Всего въ с. 10 видовъ, принад-

лежащихъ къ 2 родамъ Такка и Шницка.

**ТАКСОДИУМЪ (Taxodium).** *Taxus* — тисъ и *ido* — сходство, по сходству лл. С. хвойныхъ. С. Америка, Мексика и Китай. Полувыносл. орнамент. деревья. Влажная глин. дерн. съ торф. и пескомъ. Черенками съ неострѣзанными лл. въ водѣ; отводкой и сѣменами.

**Т. дистихумъ (T. distichum),** двустрочный. С. Ам. Штаты. Лл. въ два ряда, плоскіе, линейные, острокопечные; шишки округлыя, величиною съ голубиное яйцо. 120 ф. Имѣетъ нѣсколько разновидностей.

**ТАКСОНІЯ (Tacsonia).** По мѣстному названію (*tacso*) одного вида, растущаго въ Перу. С. кавалерниковыхъ. (30). Троп. Америка. Тепл. или оранж. вьющіяся куст. пр. Уходъ какъ за Пассифлора.

**Т. Ванъ-Вольксеміи (T. Van-Volxemi),** Ванъ-Вольсема. Новая Гренада. Цв. шароховые; плоды яйцевидные, съѣдомые. Теплич. р. **Т. инсигнис (T. insignis),** замѣчательная. Перу. Цв. съ красно-фиолетовыми долями и темнокрасными лещиками. Тепл. р. Спн. *Passiflora insignis* (Passiflora insignis).

**ТАКСУСЪ (Taxus).** Древне-латинское названіе тиса. С. хвойныхъ. (6). С. умѣренный поясъ. Полувыносл. деревья, рѣдко куст. пр. Обыкновен. Сѣменами, весною; черенками въ песокъ. з. въ августѣ, подъ рамой; разновидности — приивкой, или отводкой.

**Т. бакката (T. baccata),** ягодный. *Тиссъ.* Европа. Индія. Лл. линейные, болѣе или менѣе серповидные, острокопечные; плоды округлые съ красною слизистою плоскою. 15—50 ф. Имѣетъ очень много разновидностей, между прочимъ *адпресса* (adpressa), *Довастони* (Dovastoni), *фастигіата* (fastigiata) и *эректа* (erecta), особенно красивыя и рѣзко отличающіяся отъ типической формы.

**ТАЛАУМА (Talauma).** Мѣстное названіе въ Ю. Америкѣ одного изъ тамошнихъ видовъ. С. магноліиныхъ. (15). Троп. Америка и Азія, Японія. Тепл. древ. пр. Глин. дерн. съ торф. и пескомъ. Отводкой; черенками не отрѣзая лл. въ песокъ, въ парникъ. Темп. зимой 6—10, лѣтомъ 13—22°.

**Т. пумила (T. pumila),** низкорослая. Амбонна и Ява. Цв. бѣлые, пониклые, очень душистые вечеромъ; цвѣтъ круглый годъ. Спн. *Magnolia pumila* (Magnolia pumila).

**ТАЛИГАЛЕА (Taligalea).** Мѣстное названіе въ Гваѣ. С. вербеновыхъ. (6). Троп. Америка. Тепл. полукуст. пр. Уходъ какъ за Клеродендронъ.

**Т. пуніцеа (T. punicea),** красно-бурая. Бразилія. Цв. блѣдно-желтые съ ярко-крас-

ными прицвѣтниками, въ маѣ и іюнѣ. 2—3 ф. Спн. *Amazonia calycina*, *A. punicea* (Amazonia calycina, A. punicea).

**ТАЛИЗІЯ (Talisia).** Мѣстное названіе въ Гваѣ. С. млиовниковыхъ. (18). Бразилія, Нов. Гренада и Гваѣ. Тепл. древ. пр. Волоки. глин. дер. съ торф. Черенками съ оставленными лл. въ песокъ, въ парникъ. Темп. зимой 8—12, лѣтомъ 13—24°.

**Т. гвианѣнзисъ (T. guianensis),** гвианскій. Гваѣ и Кайенна. Цв. розовые, кистями, въ іюнѣ. 4 ф.

**ТАЛИКТРУМЪ (Thalictrum).** Древне-греч. названіе, взятое у Dioscorida и, вѣроятно, произведенное отъ *thallo* — ростъ зеленымъ. С. лютиковыхъ. (3). С. умѣр. и холодные пояса. Выносл. трав. пр. Хорошая садовая. Дѣленіемъ.

**Т. анемоноидесъ (T. anemoneoides),** похожий на Анемонъ. С. Америка. Цв. бѣлые, рѣдко малиновые, рано весной. 6 д. **Т. аквилегифоліумъ (T. aquilegifolium),** съ лл. какъ у Аквилегіи. *Матренка.* Европа и Азія. Доли бѣлыя, опадающія, тычинки пурпуровыя, въ маѣ до іюля. Имѣетъ нѣск. разновидностей. **Т. туберозумъ (T. tuberosum),** клубневой. Испанія. Цв. бѣлые, въ іюнѣ. 1 ф.

**ТАЛИНУМЪ (Talinum).** Названіе растенія въ Сенегалѣ. С. портулаковыхъ. (11). Жаркія страны Африки, Азіи и Америки. Оранж. трав. или полукуст. пр. Торф. съ глин. дерн., пескомъ и битыми черепками. Сѣменами въ парникъ, рано весной. Темп. зимой 6—11, лѣтомъ 13—22°.

**Т. Арнотіи (T. Arnotii),** Арно. Южн. Африка. Цв. золотисто-желтые, лѣтомъ. Вѣтви въ 1 ф. сочныя. Стебель деревянистый. Оранж. р.

**ТАЛІЯ (Thalia).** *Talius* (J. Thalius) — иѣмекскій врачъ и ботаникъ, † 1588. С. инбирныхъ. (5). Троп. Америка до Ю. Соед. Шт. троп. Африка. Тепл., оранж. или полувын. трав. пр.

**Т. деальбата (T. dealbata),** бѣлесоватая. Водяное р. съ мучнистымъ мелкимъ налетомъ. Изъ Ю. Каролины. Цв. пурпуровые, мелкіе, въ іюнѣ до сентября. Въ водоемъ глубиною въ 2 ф. Разнож. дѣленіемъ корневища.

**ТАМАРИКСЪ (Tamarix).** Древне-латинское названіе, заимствованное у Плинія. С. тамарисовыхъ. (20). Тѣ же страны, что и все семейство. Выносл. или полувыносл. кустар. пр. Торф. съ глин. дерн. Черенками, въ песокъ и парникъ.

**Т. галлика (T. gallica),** французскій. Остіндія до Европы. Цв. малиновые или бѣлые, въ іюлѣ до сентября. 5—10 ф. Вын. кустарн. р. Имѣетъ нѣсколько разновидно-



стей. **Т. парвифлора** (*T. parviflora*, мелколистный). Европа, Левантъ. Цв. малиновые, мелкие, лютымъ. Сип. *T. африкана*, *T. тетрандра* (*T. africana*, *T. tetrandra*).

**ТАМАРИНДУСЪ** (*Tamarindus*). *Tamr* по арабски—финикъ, и *Hind*—Индія, въ буквальномъ переводѣ „индійскій финикъ“. С. бобовыхъ. (1). Тел. высокое дерево. Волокн. глини. дерн. съ пескомъ. Черенками въ песокъ, въ парникъ. Темп. зимой 8—13, лѣтомъ 13—24°.

**Т. индига** (*T. indica*, индійскій). Тропики. Цв. желтые съ красными черточками, въ июнь и июль. Лл. перистые. 40—60 ф. Сип. *T. окциденталис*, *T. официниалис* (*T. occidentalis*, *T. officinalis*).

**ТАМАРИСОВЫЯ** рр. (*tamariscineae*). Кустар., полукуст., рѣдко дрв. рр. изъ умѣренныхъ и жаркихъ мѣстъ Сѣв. полушарія и Ю. Африки. Въ семействѣ пять родовъ.—*Мирикария*, *Реомюрия*, *Тамариксъ*, *Фукиера* и *Холохлякс*.

**ТАМНЕВА** (*Thamnea*). *Thamnos*—кустарникъ. С. брусничныхъ. (1). Оранж. полукуст. Торф. съ пескомъ. Черенками въ песокъ, подъ рамой.

**Т. унифлора** (*T. uniflora*, одноцвѣтная). Ю. Африка. Цв. бѣлые, въ апрѣль. 1 ф.

**ТАМУСЪ** (*Tamus*). Древне-латинское названіе, встрѣчаемое у Плинія. С. діоскорейныхъ. (2). Европа, С. Африка, Канарскіе о., умѣр. Азія. Оранж. или выносл. трав. мног. вьющіяся рр. Обыкн. садовая. Дѣленіемъ или сѣменами въ парникъ.

**Т. коммунисъ** (*T. communis*, обыкновенный). *Водолюбъ*. Европа. Цв. женскіе кистями короче мужскихъ, въ май—июнь; плоды красные, продолговатые. Стебель въ нѣск. ф.

**ТАНАЦЕТУМЪ** (*Tanacetum*). Полагаютъ переначенное *Athanasia*, отъ *athanatos*—бессмертный С. сложнопѣстныхъ. (30). Европа, Сѣв. Африка, Центр. и С. Азія и С. Америка. Одно- или многол., иногда полукуст. выносл. рр. Обыкн. садов. Дѣленіемъ. Упоминаемая ниже—многол.

**Т. лейкофиллумъ** (*T. leucophyllum*, бѣлолистный). Туркестанъ. Цв. головки золотисто-желтыя, лѣтомъ. 9 д. Все растеніе шелковисто-пушистое.

**ТАНГІНІЯ** (*Tanghinia*). На Мадагаскарѣ зовется *тантинъ*. С. кутровыхъ. (1). Тел. низкорослое дерево. Уходъ какъ за Церберу.

**Т. вененифера** (*T. venenifera*, ядоносная). Мадагаскаръ. Цв. большіи полузонтиками, розовые, въ май; лл. ланцетовидные. 20 ф. Сѣмена чрезвычайно ядовиты.

**ТАПСІЯ** (*Thapsia*). Древне-греч. названіе отъ о. Талпосъ. С. зонтичныхъ. (4). Средиземное побережье, о. Мадера.

Оранж. многол. трав. рр. Глинисто-дерн. Сѣменами.

**Т. эдулисъ** (*T. edulis*, съѣдомая). Мадера. Цв. бѣлые, въ май. 4 ф. Корни, черные снаружи и бѣлые внутри, употребляются на о. Мадерѣ въ пищу. Сип., *Монизія эдулисъ* (*Monizia edulis*).

**ТАРХОНАНТУСЪ** (*Tarchonanthus*). *Tarchon*—арабское названіе чабра и *anthos*—цв., по сходству цв. С. сложноцвѣтныхъ. (3). Ю. Африка. Оранж. дрв. рр. Песков. волокн. глини. дерн. съ добавленіемъ листовой. Черенками въ песокъ, весной, въ парникъ.

**Т. камфоратусъ** (*T. camphoratus*, камфорный). Цв. головки пурпуровыя, въ июнь до октябрия. 6 ф.

**ТАСКИНОКОЕ**. Ранній сортъ яблока, иначе называемый *тѣмечкой грузинской*. Плодъ крупный, вкусомъ походитъ на грушовку, получше. *Таскинское сладкое яблоко*. Такой же ранній сортъ, какъ и обыкновенное таскинское, но болѣе сладкаго вкуса.

**ТАХИАДЕНУСЪ** (*Tachadenus*). *Tachia*—Тахія, названіе рода соединеннаго съ Тахигалия, и *aden*—железа: ячникъ окруженъ железами, какъ у Тахія. С. горечавковыхъ. (5). Мадагаскаръ. Тел. трав. или полукуст. рр. Песокъ, глини. дерн. и торф. Черенками въ песокъ, въ парникъ. Зимой держать сухо.

**Т. каринатусъ** (*T. carinatus*, съ килемъ). Цв. бѣлые, въ октябрь, лл. овальные; стебель полукустарный.

**ТАЧКА**. Ручная тележка, обычно на одномъ колесѣ, которую везутъ толкая впередъ.

**ТЕВЕТІЯ** (*Thevetia*). *Teve* (*Thevet*)—франц. монахъ, путешествовавшій въ Бразилію и Гвианѣ, † 1590. С. кутровыхъ. (8). Парагвай до Мексики. Тел. куст. рр. Волокн. глини. дерн. Черенками въ песокъ, въ парникъ.

**Т. ахуай** (*T. Ahuai*, ахуай). Бразилія. Цв. бѣдно-желтые, въ июнь. 20 ф. Сип. *Церберу ахуай* (*Cerbera Ahuai*). **Т. Иккотли** (*T. Iccotli*, иккотли). Мексика. Цв. желто-шафранные, въ июнь. 8 ф.

**ТЕЕДІЯ** (*Teedia*). *Teede* (*Teede*)—германскій ботаникъ, путешествовавшій по Суринаму. С. норичниковыхъ. (2). Ю. Африка. Оранж. кусты. Легкая, сильная. Сѣменами или черенками.

**Т. люцида** (*T. lucida*, свѣтлая). Цв. малиновые, въ апрѣль; лл. ланцетовидные. 2 ф. **Т. пубесценсъ** (*T. pubescens*, пушистая). Цв. розовые, въ май; лл. овальные. 2 ф.

**ТЕЙКРИУМЪ** (*Teucrium*). Древне-

греч. названіе, заимствованное у Діоскорида. С. губоцвѣтныхъ. (100). Умѣр. и жаркія страны. Оранж. или выносл. трав., полукуст. или куст. р. Умѣр. качествъ з. Черенками и дѣленіемъ.

**Т. фрүтикансъ** (*T. fruticans*, кустарный). Юж. Европа. Цв. голубые, лѣтомъ. 2—3 ф. Оранж. куст. р. **Т. хамедриксъ** (*T. chamaedrys*). *Дубровка*. Европа. Цв. голубые, лѣтомъ. 6—18 д. Выносл. многол. трав.

**ТЕЙСМАННІЯ** (*Teysmannia*). *Тейсманнъ* (*Teysmaun*)—голландскій садоводъ, напечатавшій въ 1838 г. «Catalogus plantarum». С. пальмъ. (1). Тел. р. Уходъ какъ за Корифа.

**Т. алтифронсъ** (*T. altifrons*, длиннолистный). Суматра. Лл. продолговато-ромбодальные, въ 6—7 ф. длиной и въ 1½ ф. шириной, складчатые съ выемчатыми краями.

**ТЕКОМА** (*Tecoma*). Сокращено изъ мексиканскаго названія *текомахоцитль* (*tecмахochitl*). С. биньонныхъ. (24). Жаркія и тропич. страны. Теллич. или оранж. вьющ. кустар. рр. Глини. дерн. Черенками изъ корня или молодого полувызрѣваго роста, либо отводкой.

**Т. аустралисъ** (*T. australis*, южная). Австралія. Цв. желтоватые, внутри пурпуровые, въ июнь. Сип. *Т. диверсифолия*, *Бигнонія Пандореа* (*T. diversifolia*, *Bignonia Pandorea*). **Т. грандифлора** (*T. grandiflora*, крупноцвѣтная). Японія и Китай. Цв. шарлаховые, въ июль. 30 ф. Оранж. цѣпкое раст. Сип. *Бигнонія грандифлора* (*Bignonia grandiflora*). **Т. капенсисъ** (*T. capensis*, съ М. Д. Н.). Мысъ Д. Н. Цв. красно-оранжевые, въ августъ. 15 ф. **Т. радикансъ** (*T. radicans*, укорениющійся). С. Америка. Цв. красно-шарлаховые, лѣтомъ. 25 ф. Полувывносл. цѣпляющееся воздушными корнями. Сип. *Бигнонія радикансъ* (*Bignonia radicans*). **Т. ясминіодесъ** (*T. jasminoides*, похожая на ясминъ). Австралія. Цв. бѣлые, въ августъ. 20 ф. Оранж. цѣпкое р.

**ТЕКОФИЛЕА** (*Tecophilaea*). *Тесопхила*—имя дочери ботаника Бильоти. С. кровяниковыхъ. (2). Чили. Оранж. луков. рр. Песков. глини. дер. Сѣменами или отростками.

**Т. цианео-крѣпеа** (*T. cyaneo-crocea*, сине-желтая). Цв. голубые съ бѣлымъ горлышкомъ.

**ТЕЛИМИТРА** (*Thelymitra*). *Thelys*—женщина и *mitra*—шляпа, колпакъ; по куколеобразному столбику. С. орхидей. (20). Австралія, Нов. Зеландія, Нов. Карлиина, Малайск. архип. Оранж. земныя рр. Уходъ какъ за Блетія.

**Т. варіегата** (*T. variegata*, пестрая).

Австралія. Цв. пурпуровые, пестрые, въ май—июнь. 1 ф. Сип. *Макдональдія варіегата*, *М. спиральс* (*Macdonaldia variegata*, *M. spiralis*). **Т. иксиодесъ** (*T. ixioides*, похожая на Иксио). Австралія. Цв. голубые, въ май. 1 ф.

**ТЕЛИПОГОНЪ** (*Telipogon*). *Telos*—вершина и *podon*—борода; столбикъ на верху бородатый. С. орхидей. (40). Анды Колумбін и Перу. Тел. эпифитная орхидея. Въ корзинкахъ съ торфянистой з., черепками и торф. мохомъ, или на чуркахъ съ подстилкой свѣжаго торфа моха.

**Т. Эрѣзусъ** (*T. Croesus*, Крѣзусъ). Колумбія. Цв. желтые съ черной сѣткой.

**ТЕЛОПЕА** (*Telopea*). *Telopos*—видный издали: по ярко-краснымъ цв., которые видны издали. С. протейныхъ. (3). Австралія. Оранж. куст. рр. Песков. глини. дерн. Отводкой побѣговъ, зимой, въ маленькіе горшки. Темп. зимой 6—10, лѣтомъ 13—20°.

**Т. спекіозіссима** (*T. speciosissima*, отъменно-красная). Цв. карминно-красные, въ июнь. 6—8 ф.

**ТЕЛЪЛИМА** (*Tellima*). Анаграмъ *Mitella*,—подъ какимъ названіемъ слытъ этотъ родъ. С. камнеломковыхъ. (6). С.-З. Америка. Одно-или многол. трав. рр. Уходъ какъ за Мятелью.

**Т. грандифлора** (*T. grandiflora*, крупноцвѣтная). Цв. зеленоватые, въ апрѣль. 2 ф.

**ТЕЛЬФАЙРІЯ** (*Telfairia*). Чарльсъ *Тельфейръ* (*Telfair*)—ирландскій ботаникъ. С. тыквенныхъ. (2). Тропич. Африка. Тел. цѣпкіе кусты. Песков. глини. дерн. съ небольшоимъ колич. торфни. Черенками съ цвѣтоносныхъ побѣговъ, въ песокъ, въ теплѣ.

**Т. окциденталис** (*T. occidentalis*, западная). З. Африка. Цв. бѣлые съ пурпуровымъ глазкомъ, въ сентябрь; плоды желто-зеленоватые. Сѣмена употребляются неграми въ пищу. **Т. педата** (*T. pedata*, стоповидная). Занзибаръ. Цв. пурпуровые, въ июль; плоды зеленые. Сип. *Фейллеа педата*, *Жолиффія африкана* (*Feuillea pedata*, *Joliffia africana*).

**ТЕМИСТОКЛЕЗІЯ** (*Themistoclesia*). *Themistocles*—древне-греч. полководецъ. С. брусничныхъ. (4). Андскія горы Перу, Боливія и Венецуелы. Тел. куст. рр. Волокн. глини. дерн. съ торф. и пескомъ. Черенками въ песокъ подъ стекломъ и даже безъ покрывки.

**Т. коронилья** (*T. coronilla*, съ маленькою короною). Венецуела. Цв. темно-красные; въ январь, низкій кустъ. Сип. *Тибодія коронарія* (*Thibaudia coronaria*).



**ТЕМПЛЬТОНІЯ** (*Templetonia*). *Темпльтонъ* (*Templeton*) — австралийскій ботаникъ. С. бобовыхъ. (7). Оранж. куст. или полукуст. рр. изъ Австраліи. Песков. глин. дерн. съ торф. Черенками въ песокъ, подъ рамою. Темп. зимой 4—7°.

**Т. ретуса** (*T. retusa*, съ вызубренными лл.). Цв. красные или иногда бѣлые, въ мартъ до іюня. 3 и болѣе ф. Сип. *T. glauca* (*T. glauca*).

**ТЕНАРДІЯ** (*Thenardia*). *Тенаръ* (*Thenard*) — извѣстный франц. химикъ. С. кутровыхъ. (1). Темп. вьющ. кустар. р. Уходъ какъ за Дипладеніа. Темп. зимой 10—12, лѣтомъ 13—24°.

**Т. флорибунда** (*T. floribunda*, съ собранными цв.). Мексика. Цв. малиновые, въ іюнь. 10 ф.

**ТЕНАРИСЪ** (*Tenaris*). Мѣстное названіе въ Ю. Африкѣ. С. ласточниковыхъ. (2). Ю. Африка. Оранж. многол. трав. рр. Уходъ какъ Цероперія.

**Т. рострата** (*T. rostrata*, съ клювомъ). Вост. троп. Африка. Цв. бѣловатые. Стебель въ 1½ ф.

**ТѢНИТОСЪ** (*Taenitis*). *Tainia* — нить или лента, по линейнымъ перьямъ. С. паноретниковыхъ. (5). Тропич. страны. Темп. рр.

**Т. блехнойдесъ** (*T. blechnoides*, похожій на Блехнумъ). Малакка и Филиппинскіе о. Ваи въ 1—2 ф. длинной и въ 8—12 д. шириной, перистыя.

**ТЕОВРОМА** (*Theobroma*). *Theos* — богъ и *broma* — пища, по плодамъ Т. какао. С. навозниковыхъ. (6). Жаркія страны Америки. Темп. деревья. Волокн. глин. дерн. съ песков. торф. Черенками изъ полузрѣлаго роста въ песокъ, въ парникъ. Темп. зимой 10—15, лѣтомъ 15—25°.

**Т. какао** (*T. cacao*, какао). *Шеколадное дерево*. Тринидадъ и др. Цв. розовыми чашечками и желтыми вѣнчиками, въ маѣ. Плодъ желтый или красноватый, яйцевидный съ 10—100 съемами. 16—18 ф.

**ТЕОФРАСТА** (*Theophrasta*). *Теофрастъ* — древне-греч. ботаникъ, † 285 до Р. Х. С. прищипанныхъ. (1). Темп. куст. р. Глин. дерн. съ торф. Черенками изъ полузрѣлаго роста, въ песокъ, подъ стекломъ. Темп. зимой 8—12, лѣтомъ 13—24°.

**Т. Жюссѣи** (*T. Jussiei*, Жюссѣе). Санъ-Доминго. Цв. бѣлые, довольно крупныя; лл. продолговато-линейныя съ колючими зубчиками. 3 ф. **Т. имперіалисъ** (*T. imperialis*) есть синонимъ *Хризифиллоумъ имперіале* (*Chrysophyllum imperiale*).

**ТЕПЛИЦА**. Теплое, на половину стеклянчатое строеніе, приспособленное для содержанія и воспитанія растений теплыхъ, жаркихъ странъ.

**ТЕПЛОТА ГРУНТОВАЯ**. Необходима для размноженія рр. Получается нагрѣвомъ гниющего вещества (навоза, коры и т. п.) или искусств. отопленіемъ подъ грунтомъ. Она должна регулироваться соотвѣтственно условіямъ, для которыхъ должна служить. Поэтому въ грунтъ постоянно долженъ быть термометръ.

**ТЕРМИНАЛІЯ** (*Terminalia*). *Терминусъ* — предѣлъ, по расположенію лл. С. млекобѣдниковыхъ. (90). Троп. страны. Темп. куст. или дерев. рр. Глин. дерн. съ торф. Черенками въ песокъ, въ парникъ.

**Т. бензойна** (*T. Benzoin*, ладонная). О. Маврикія. Цв. бѣлые. 30—40 ф. Млечный сокъ даетъ ладонъ. Сип. *T. аугустифолия*, *T. мауриціана* (*T. angustifolia*, *T. mauritiana*). Древ. р. **Т. латифолия** (*T. latifolia*, широколиственная). Вестиндія. Цв. цилиндрическими колосьями. 80—100 ф. Древ. р. **Т. серицеа** (*T. sericea*, шелковистая). Ю. Африка. Цв. колосьями, которые короче лл. 6 ф. Куст. р.

**ТЕРМИНЪ**. Условное выраженіе или названіе предмета. (Терминологія — собраніе и объясненіе такихъ рѣченій).

**ТЕРМОПСИСЪ** (*Thermopsis*). *Thermos* — Луниинъ и *opsis* — сходство; по сходству съ Луниномъ. С. бобовыхъ. (12). С. Америка и Азія. (Сибирь и Гималаи). Виносы. многол. трав. рр. Сильная, легкая. Съемами, потому что отъ дѣленія пропадаютъ.

**Т. барбата** (*T. barbata*, бородачатый). Гималаи. Цв. темно-пурпуровые, въ іюнь. 1 ф. **Т. монтана** (*T. montana*, горный). С. Америка. Цв. желтые, въ іюнь—іюль. 1—2 ф. Сип. *T. фабацеа* (*T. fabacea*).

**ТЕРНОСТРЕМІЯ** (*ternstroemia*). Древ. или куст. рр. преимущ. изъ тропич. Америки и Вост. Азіи, изъ которыхъ весьма важно экономическое значеніе имѣетъ *чайное*. Въ семействѣ 33 рода и 260 видовъ. Изъ родовъ особенно замѣчательны: Камеллія, Каріокаръ, Терностремія и Фрециера.

**ТЕРНОСТРЕМІЯ** (*Ternstroemia*). Христофоръ *Терностремъ* (*Ternstroem*) — шведскій натуралистъ, путешествовавшій въ Китай, въ 1745 г. С. терностреміиныхъ. (25). Жаркія мѣстности Азіи, Индійскій Архипелагъ и троп. Америка. Темп. куст. рр. Волокн. глин. дерн. Черенками изъ полузрѣлаго роста, въ песокъ, въ парникъ. Темп. зимой 5—7, лѣтомъ 15—24°.

**Т. веноза** (*T. venosa*, жилчатая). Бразилія. Цв. бѣлые, съ іюня до августа; лл. съ сильными жилками. 6 ф. **Т. сальва-тика** (*T. sylvatica*, лѣсная). Мексика. Цв. бѣлые, въ іюнь. 2 ф. **Т. эллиптича** (*T. elliptica*, эллиптическая). Вестиндія. Цв. бѣ-

лые, въ іюль. 6 ф. Сип. *T. педункулярисъ* (*T. peduncularis*).

**ТЕРОПОГОНЪ** (*Theropogon*). *Theros* — лѣто и *pogon* — борода; по времени цвѣтенія и густотѣ р. С. губоцвѣтныхъ. (1). Оранж. многол. трав. р. Песков. глин. дерн. съ листвою. Съемами въ парникъ, весной, или дѣленіемъ.

**Т. пальмидусъ** (*T. pallidus*, блѣдный). Гималаи. Цв. бѣлые съ красноватымъ отливкомъ, весной. 1 ф.

**ТЕРПЕНТИННОЕ ДЕРЕВО**. См. Пастация.

**ТЕСПЕЗІЯ** (*Thespesia*). *Thespesios* — божественный: Т. популяреа часто сажается около церквей въ тропич. странахъ. С. мальвовыхъ. (6). Троп. Азія, о. Тихаго о. и Мадагаскаръ. Темп. дерев. рр. Глин. дерн. съ торф. Черенками изъ зрѣлаго роста въ песокъ, въ парникъ. Темп. зимой 7—10, лѣтомъ 15—24°.

**Т. грандифлора** (*T. grandiflora*, крупноцвѣтная). Порто-Рико. Цв. красные, въ маѣ. 30 ф. **Т. популяреа** (*T. popularis*, тополевал). Тропики Старога Свѣта. Цв. вначалѣ желтые съ пурпуровою серединою, потомъ сплошь пурпуровые, въ іюнь. 40 ф.

**ТЕСТУДИНАРІЯ** (*Testudinaria*). *Testudo* — черепаха; по сходству подземнаго корня. С. діоскорейныхъ. (2). Юж. Африка. Оранж. вьющіяся рр. Песков. глин. дерн. Ввозимыми корнями.

**Т. элефантинесъ** (*T. elephantipes*, слоновая ступня). Цв. зеленоватые, въ іюль; лл. широко-сердцевидныя, почти почковидныя. 10 ф.

**ТЕСЪ, ТЕСНИНА**. Пилеяная доска тоньше вершка.

**ТЕТРАГОНИЯ** (*Tetragonia*). *Tetra* — четыре и *gonia* — уголь, по плоду. С. деппиновыхъ. (20). По берегамъ В. Азіи, Австраліи и умѣр. Юж. Америки. Рыхлая. Съемами.

**Т. экспанса** (*T. expansa*, раскидистая). *Новозеландскій шпинатъ*. Австралія, Нов. Зеландія. Цв. желтые, мелкіе, лл. овальные, треугольныя и стрѣловидныя. Хорошая овощъ. Свѣтъ въ мартъ въ парникъ, цѣлымъ плодомъ, въ горшечекъ; всходы рассаживать по одному въ горшки и продерживать въ парникъ до мая, потомъ высадить на гряды въ промежуткѣ подутора арш.

**ТЕТРАГОНОТЕКА** (*Tetragonotheca*). *Tetragonos* — четырехугольный, и *theca* — коробочка, по четырехугольнымъ съемамъ С. сложноцвѣтныхъ. (3). С. Америка. Многол. виносы. трав. рр. Сильная легкая. Съемами и дѣленіемъ.

**Т. хелиантоидесъ** (*T. helianthoides*, похожая на хелиантусъ). Цв. головки блѣдно-желтыя, большія, въ августѣ. 2—3 ф.

**ТЕТРАДИУМЪ** (*Tetradium*). *Tetradenion* — четверной, части цв. и плодотъ четверные. С. рутовыхъ. (1). Темп. дерево. Уходъ какъ у Бруцеа.

**Т. трихотомуумъ** (*T. trichotomum*, трихотомическій). Кокхинна. Цв. бѣловатые, въ маѣ. 20 ф. Сип. *Эвобдіа фраксинифолия* (*Evodias fraxinifolia*).

**ТЕТРАМИКРА** (*Tetramicra*). *Tetra* — четыре и *micros* — малый, по четыремъ мелкимъ гнѣздамъ въ пыльникъ. С. орхидей. (6). Троп. Америка отъ Бразиліи до Вестиндіи. Темп. земныя или эпифитныя рр. Воспитаніе при тѣхъ же условіяхъ, какъ для Софронитисъ.

**Т. биколоръ** (*T. bicolor*, двуцвѣтная). Бразилія. Цв. бѣлые, губа съ пурпуровыми черточками, въ мартъ. Сип. *Лептотесъ биколоръ* (*Leptotes bicolor*).

**ТЕТРАНЕМА** (*Tetranema*). *Tetra* — четыре и *nema* — нить; по 4 тычинкамъ. С. норичниковыхъ. (1). Оранж. многол. трав. р. Съемами или дѣленіемъ. Листов. съ песков. глин. дерн. Темп. зимой 6—8°.

**Т. мексикана** (*T. mexicana*, мексиканская). Мексика. Цв. фиолетово-пурпуровые; стебель короткій.

**ТЕТРАПТЕРИСЪ** (*Tetrapteris*). *Tetra* — четыре и *pteron* — крыло, по четырехкрылымъ летучкамъ. С. мальпигіевыхъ. (52). Троп. Америка, преим. Бразилія. Темп. куст. рр. Торф. съ пескомъ. Черенками изъ зрѣлаго роста въ песокъ, въ парникъ.

**Т. дисколоръ** (*T. discolor*, разноцвѣтный). Гвиана и Тринидадъ. Цв. желтые, въ маѣ; лл. эллиптическіе. **Т. инеквалисъ** (*T. inaequalis*, неровный). Бразилія и Ямайка. Цв. желтые, въ маѣ. Сип. *T. цитрифолия* (*T. citrifolia*).

**ТЕТРАТЕКА** (*Tetratheca*). *Tetra* — четыре и *theca* — клѣточка, коробочка, по четырехклеточному пылинку. С. тремандровыхъ. (18). Австралія. Оранж. куст. рр. Волокн. торф. съ пескомъ. Черенками изъ молодого роста, въ песокъ, подъ рамою.

**Т. пиллоза** (*T. pilosa*, пушистая). Цв. пурпуровые, въ іюль. 1—1½ ф. **Т. хирсута** (*T. hirsuta*, волосистая). Цв. малиновые, въ мартъ. 6—18 д.

**ТЕТРАЦИГИЯ** (*Tetrazygia*). *Tetra* — четыре и *zygos* — хомутъ, развилка, по четвертому расположенію частей цв. С. черноустовыхъ. (13). Вестиндія. Темп. куст. или дерев. рр. Уходъ какъ за Молястома. Темп. зимой 10—13, лѣтомъ 14—24°.



**Т. ангустифолия** (*T. angustifolia*, узколистная). Цв. белые, крупные, в мае. 20 ф. **Т. эдеальнойдез** (*T. elaeagnoides*, похожий на лох). Цв. белые или малиновые, в июне, 2 ф. и выше.

**ТЕФРОЗИЯ** (*Tephrosia*). *Tephrosia* — непальско-срый; по л. С. бобовых. (90). Жаркие страны. Тепло или оранжев. трав., либо кустар. и полукуст. пр. Песков. торф. с листов. Сбывами или черенками в песок, в парник.

**Т. виргиниана** (*T. virginiana*, виргинская). С. Америка. Цв. желтоватые с пурпуровыми крапинками, в июне и июле. 1—2 ф. Многол. трав. оранжев. **Т. капензис** (*T. capensis*, капская). Ю. Африка. Цв. пурпуровые, в июле. 2—3 ф. Куст. оранжев.

**ТИБОДИЯ** (*Thibaudia*). *Thibo de Berno* (*Thibaut de Berneaud*) — секретарь парижского линнеевского общества. С. брусничных. (2). Анды Перу и Нов. Гренады. Тепло. куст. пр. Волокн. глин. дерн. с торф. и песком. Черенками в песок, под стеклом или просто. Темп. зимой 8—13, летом 13—24°.

**Т. пичинчензис** (*T. pichinchensis*, из Пичинча, в Ла-Плат). Пичинча. Цв. шаролаховые. 6—12 ф.

**ТИГРИДИЯ** (*Tigridia*). *Tigris* — тигр и *eidon* — похожий, по испорченным цв. С. косатиковых. (7). Мексика. Центр. Америка, Перу и Чили. Оранжев. лукович. пр. Песковатая. Сбывами и отпрысками.

**Т. атрата** (*T. atrata*, черная). Ю. Мексика. Цв. темно-пурпуровые, в апреле. 2 ф. **Т. Ван-Хуттеи** (*T. Van-Houttei*, Ван-Гутта). Ю. Мексика. Цв. фиолетовые с розово-пурпуровыми крапинками, в мае. 7—14 д. **Т. павония** (*T. pavonia*, павлиньи). Мексика. Цв. золотисто-желтые, в июне. 1—2 ф. Сп. *Ferraria pavonia*, *F. tigridia* (*Ferraria pavonia*, *F. tigridia*) Имеет несколько разновидностей.

**ТИДЕА** (*Tydaea*). *Tydaea* — сын Эней. С. геснериальных. Малочисленная группа тепло. трав. пр. из троп. Америки, соединенных теперь с родом Изолома. Уходит как за Геснера.

**Т. амабиле** (*T. amabilis*, милая). Нов. Гренада. Цв. темно-розовые крупные, покрытые волосками, весной. 1—2 ф. Все р. с волосками.

**ТИЗАНОТУС** (*Thysanotus*). *Thysanotus* — бахромчатый; три внутри сегмента цв. покрова бахромчатые. С. лилейных. (19). Австралия, Филиппинские о. и Ю. Китай. Оранжев. многол. трав. пр. Песков. глин. дерн. Отпрысками.

**Т. туберозус** (*T. tuberosus*, клубневой). Австралия. Цв. пурпуровые, метелкой, в июне. Корни разрастаются в клубни.

1 ф. **Т. юнсеус** (*T. junceus*, тростниковый). Австралия. Цв. пурпуровые, зонтиком, в августе. 1—2 ф.

**ТИКОРЕА** (*Ticorea*). Местное название одного вида в Гвиане. С. рутых. (20). Бразилия и Гвиана. Тепло. куст. или дерев. пр. Торф. с глин. дерн. и песком. Черенками из зрелого роста, в песок, в парник. Темп. зимой 8—10, летом 13—21°.

**Т. фетида** (*T. foetida*, вонючая). Гвиана. Цв. белые, в феврале. 10 ф. Куст. р. **Т. ясенифлора** (*T. jasminiflora*, с цв. как у жасмина). Бразилия. Цв. белые. 20 ф. Дерв. р.

**ТИЛИАКОРА** (*Tiliacora*). Местное бенгальское название. С. лунолистниковых. (1). Тепло. вьющ. куст. р. Песков. глин. дерн. с торф. Черенками в песок, в парник.

**Т. рацемоза** (*T. racemosa*, с кистями цв.). Остиндия. Цв. желтые, в мае; плоды красные.

**ТИЛИЯ** (*Tilia*). **ЛИПА**. Древне-латинское название этого рода растений, встречаемое у Плиния и Виргиния. С. липовых. (8). Умбренских стран Св. полушария. Орнамент. выносил. древесн. пр. Хорошая глинисто-дерн., несколько влажная. Отводкой и редко сбывами.

**Т. аргентеа** (*T. argentea*, серебристая). В. Европа. Цв. желтоватые, душистые, в августе; лл. сердцевидные, остро-конечные, зубчатые, внизу бело-пушистые. 30—40 ф. **Т. вульгарис** (*T. vulgaris*, обыкновенная). Липа. Европа, Кавказ. Цв. желтоватые, летом; лл. гладкие, внизу с волосками в углах жилки. 50 ф. Имеет форму с пестрыми лл. Сп. *T. эвроней*, *T. интермедия* (*T. euronaea*, *T. intermedia*). **Т. дазистыла** (*T. dasystyla*, с толстым столбиком). Ю. Таврских гор. У цв. нижняя часть столбика пушистая. Лл. большие, с косо-срзванным основанием. 30—60 ф. **Т. кордата** (*T. cordata*, сердцевидная). Европа, Сибирь. Цв. желтоватые, летом. Лл. гладкие. Сп. *T. микрофилла*, *T. парвифолия*, *T. ulmifolia* (*T. microphylla*, *T. parvifolia*, *T. ulmifolia*). **Т. петиоларис** (*T. petiolaris*, черешковатая). Крым. Цв. зеленоватые, в июле; лл. бледно-зеленые, внизу белые; черешок такой же длины, как пластинка. Сп. *T. альба пендула*, *T. американа пендула*, *T. аргентеа пендула* (*T. alba pendula*, *T. americana pendula*, *T. argentea pendula*). **Т. платифильюс** (*T. platyphyllos*, широколистный). Европа. Цв. желтоватые, в июне. Лл. пушистые на обеих сторонах. 70—80 ф. Сп. *T. эвроней*, *T. грандифлора* (*T. euronaea*, *T. grandiflora*).

**ТИЛОФОРА** (*Tylophora*). *Tylos* — опухоль и *phoreo* — нести; по листьям веника. С. ласточниковых. (40). Троп. Африка, Азия и Австралия. Тепло. вьющ. полукуст. или трав. пр. Уходит как за Хойя. Темп. зимой 4—6, летом 13—24°.

**Т. грандифлора** (*T. grandiflora*, крупноцветная). Австралия. Цв. пурпуровые, в июле. 10 ф.

**ТИЛЛАНДСИЯ** (*Tillandsia*). Элиас *Тилландс* (*Elias Tillands*) — шведский ботаник, проф. медицины в Або. С. бромелиевых. (120). Троп. Америка до С. Америки. Тепло. эпифиты, редко земные трав. мног. пр. Волокн. торф. с малым колч. глин. дерн. и дерев. углем — для наиболее сильных и волокн. торф. с мохом, битыми черенками и дерев. углем — для более вьющихся видов. Делением и отпрысками. Темп. зимой 10—12, летом 13—22°.

**Т. виргиниалис** (*T. virginialis*, хрупкая). Мексика. Цв. с зелеными долями и белыми лепестками; лл. бледно-зеленые с мучнистым налетом. **Т. ионанта** (*T. ionantha*, фиолетовая). Бразилия. Цв. бледно-фиолетовые; лл. ланцетовидные, остро-конечные, верхние вначале розового цв. Сп. *T. эрубесценс*, *Питрофиллум ионанта* (*T. erubescens*, *Pitrophyllum ionantha*). **Т. карината** (*T. carinata*, с килем). Ю. Бразилия. Цв. колосыми, бледно-желтые, в ноябре. Лл. широкие, светло-зеленые. Сп. *T. брахистахис*, *Вризия брахистахис*, *В. пситтацина* (*T. brachystachys*, *Vriesia brachystachys*, *V. psittacina*). **Т. кораллина** (*T. corallina*, кораллово-красная). Минас-Херас. Цв. зеленые, двурядным колосом; лл. продолговатые, зеленые. Сп. *Вризия кораллина*, *Энхольрион кораллинум* (*Vriesia corallina*, *Encholirion corallinum*). **Т. ксифоидея** (*T. xiphioides*, похожая на Ксифион). Аргентинская республика и Уругвай. Цв. белые, двурядным колосом, в мае. Лл. широкие, остро-конечные, с серебристым пушком. Р. красивое, душистое. **Т. ксифостакхис** (*T. xiphostachys*, с кинжаловидным колосом). Мексика и Венесуэла. Цв. темно-пурпуровые с зелеными прицветниками, в августе. Лл. темно-зеленые, нижние внизу пурпуровые. Сп. *Вризия ксифостакхис* (*Vriesia xiphostachys*). **Т. Линдена** (*T. Lindenii*, Линдена). Анды в Перу. Цв. с зелеными долями и сине-пурпуровыми лепестками в овалном, сжатом колосе. Сп. *Т. Морреніана*, *Фитарриза Линдена* (*T. Morreniana*, *Phytarrhiza Lindenii*). Имеет несколько разновидностей. **Т. Моррени** (*T. Morrenii*, Моррена). Бразилия. Цв. односторонние, чашечка светло-коричневая, вичник зеленовато-желтый; лл. с изогну-

тыми полосками. **Т. пситтацина** (*T. psittacina*, попугайча). Леса около Рио-Жанейро. Цв. большие, прицветники красные, лепестки зеленые, колос в 1 ф., в июле. Лл. желтоватые, волнистые. Сп. *Вризия пситтацина* (*Vriesia psittacina*). Имеет несколько разновидностей. **Т. пультра** (*T. pulchra*, красивая). Ю. Бразилия. Цв. с зеленоватой чашечкой и белыми лепестками, прицв. розовые. Лл. шиловидные. Сп. *Т. пультра*, *Пурретила суринамензис* (*T. pulchella*, *Pouretia surinamensis*). **Т. регина** (*T. regina*, царская). Ю. Бразилия. Цв. белые с запахом жасмина, прицв. розовые; колос двусторонний на ножке около 7 ф. выше. Лл. длинные, по концам согнутые. Сп. *Вризия гигантеа*, *В. Глазиована*, *В. регина* (*Vriesia gigantea*, *V. Glaziovana*, *V. regina*). **Т. Саундерси** (*T. Saundersii*, Саундерса). Бразилия. Цв. светло-желтые, лл. розеткой, светло-зеленые с белыми точками, на нижней стороне кроваво-красные. Сп. *Энхольрион Саундерси* (*Encholirion Saundersii*). **Т. спленденс** (*T. splendens*, великолепная). Франц. Гвиана. Цв. желтые, прицв. ярко-пурпуровые; лл. продолговато-линейные, светло-зеленые, внизу с темно-красными поперечными полосками. Сп. *Т. никта*, *Т. спендиза*, *Т. зебрина*, *Вризия спленденс* (*T. picta*, *T. speciosa*, *T. zebрина*, *Vriesia splendens*). **Т. умбеллата** (*T. umbellata*, зонтичная). Экватор. Цв. сафирово-голубые в середине белые, прицв. светло-зеленые; лл. широкие светло-зеленые. Визка к Т. Линдену. **Т. Хамалеана** (*T. Hamaleana*, Хамала). Анды в Перу. Цв. душистые с зеленоватыми долями, белыми, деляющимися фиолетовыми лепестками; лл. линейные, вогнутые. Сп. *Вальмисия Хамалеана*, *Фитарриза Хамалеана* (*Walmsleya Hamaleana*, *Phytarrhiza Hamaleana*).

**ТИМБРА** (*Thymbra*). Древнегреч. название чабра. С. губоцветных. (1). Полувысокл. полукуст. р., похожее на *Thymus*. Хрящеватая глин. дерн. Сбывами, весной, или черенками в июле, в холод. парник.

**Т. спиката** (*T. spicata*, колосчатая). Средиземное побережье. Цв. бледно-пурпуровые, в июне—июле. 6—12 д.

**ТИМЕЛЕА** (*Thymelaea*). *Thymos* — тимус и *Elai* — олеа, по лл. положим на лл. тимуса, а по плодам — на мелкие оливки. С. ягодковых. (20). В. Средизем. побережье — от Канарских о. до Перси, Центр. Азия и Европа. Одно или многол. трав. или низкие кустарн. пр. Гли. дерн. пополам с торф. Черенками, в оранжев.

**Т. хирсута** (*T. hirsuta*, волосистая). Средиземное побережье. Цв. белые, в



июль. 1—2 ф. Оранже. куст. р. Сип. *Пас-серина хирсута* (*Passerina hirsuta*).

**ТИМУСЪ** (*Thymus*). *Thymos*—древне-греч. название, обозначающее у Теофраста чаберъ. С. губоцвѣтныхъ. (60). Северные умеренные поясы и преимущественно Средиземное побережье. Обычно выносившия кустарники рр. Ухождъ какъ за Каллинта.

**Т. серпильномъ** (*T. Serpyllum*). *Вогородская трава*. Европа. Цв. пурпурово-розовые, съ июня до августа. Стебли лежачие. **Т. хамедрисъ** (*T. chamaedrys*). *Тимьянъ*. Европа. Цв. сѣтло-пурпуровые, лѣтомъ и осенью. Стебли тонкіе, приподы. малочислы. Имѣть нѣсколько разновидностей, между прочимъ, *мистриодорусъ* (*scitodorus*), лл. котораго пахнутъ лимонной цедрой.

**ТИМЪАНЪ** См. Тимусъ.

**ТИНА** Водяныя питчатыя и другія растенія.

**ТИНАНТІЯ** (*Tinantia*). *Тинанъ* (*Tinant*)—бельгійскій ботаникъ. С. комелиновыя. (3) Троп. Америка. Тепл. трав. рр. Глин. дерн. Сѣменами.

**Т. фугаксъ-эректа** (*T. fugax-erecta*, прямая скороприходящая). Цв. голубые или пурпуровые, въ июль 1½ ф. Сип. *Тра-дескантіа латифолиа*, *T. undata*, *T. erecta* (*T. latifolia*, *T. undata*, *T. erecta*).

**ТИННѢА** (*Tinnea*). Дѣвица *Тинне*—(*Tinne*), путешественница по Нилу. С. губоцвѣтныхъ. (50). Троп. Африка. Тепл. травин. или полукуст. рр. Сильная глин. дерн. съ листов. Черенками.

**Т. эгіопіка** (*T. aethiopica*, эгіопская). Цв. коричнево-пурпуровые съ запахомъ фіалки, зимой. 4 ф.

**ТИПЪ** Первообразъ. Основной образецъ (типичный).

**ТИРСАКАНТУСЪ** (*Thysacanthus*). *Thysos*—тиръ и *Акантусъ*, по цвѣторасположенію. С. акантовыхъ. (20). Троп. Америка. Тепл. трав. или кустар. рр. Глин. дернов. съ листовой. Черенками весной, въ горшечкахъ, въ парникѣ. Цвѣты красные. Поименованные ниже виды—кустарные.

**Т. брактеолатусъ** (*T. bracteolatus*, съ прицвѣтниками). Нов. Гренада. Цвѣтеть въ июль—августъ. 2 ф. **Т. каллистакхисъ** (*T. callistachis*, съ красивыми колосьями). Мексика. Цв. въ июль и августъ. 2 ф. Сип. *Т. миллидинусъ*, *Юстиція миллиана* (*T. ilacinus*, *Justicia lilacina*). **Т. рутілянсъ** (*T. rutilans*, красноватый). Колумбія. Цвѣтеть зимой и весной. 2 ф. **Т. Шомбургіанусъ** (*Schomburgkianus*, Шомбургка). Новая Гренада. Цв. карминные, зимой и весной. 3 ф. Сип. *Т. рутілянсъ* (*T. rutilans*).

**ТИРСОПТЕРІСЪ** (*Thyrsopteris*).

*Thysos*—пучокъ или кисть и *pteris*—папоротникъ, по листовому плоношенію. С. папоротниковыхъ. (1). Оранже. р.

**Т. элегансъ** (*T. elegans*, изящный). Хуанъ Фернандесъ. Ван многосложныя, длинной въ 5—6 ф. съ ланцетовидными перьями. 15 ф.

**ТИТОНІЯ** (*Tithonia*). *Титонъ*—многологическая личность связанная съ баснею объ Аврорѣ. С. сложноцвѣтныхъ. (5). Мексика, центр. Америка, Куба. Полувын. одиол. рр. Всякая легкая. Сѣменами.

**Т. специоза** (*T. speciosa*, отъиная). Мексика. Цв. головки съ ярко-красными язычков. цв., въ августъ. 4 ф. Сип. *Хелиантусъ специозусъ* (*Helianthus speciosus*). **Т. тагетифлора** (*T. tagetiflora*, съ цв. какъ у Тагетеса). Вера-Круцъ. Цв. головки желто-оранжевыя, въ августъ. 6 ф.

**ТИТОВСКОЕ** или **ТИТОВКА**. Яблоко средней поры поснѣванія, среднихъ размѣровъ, удлиненной формы, желтоватое съ роспичью, сладкаго вкуса. *Т. роспичное* отличается отъ Т. обыкновеннаго менѣе сладкимъ вкусомъ и сплошною окраской.

**ТИФА** (*Turpha*). Древне-греч. название, встречаемое у Теофраста. С. розовыхъ. (10). Троп. и умѣр. страны. Тепл. и выносл. болотныя рр. С. сѣменами въ горшечкахъ, которые ставятся въ воду, или дѣленіемъ корневища.

**Т. ангиустифолия** (*T. angustifolia*, узколистная). *Палочникъ*. Европа. Цв. коричневыя, колосьями въ ½ до ¾ д. шириной, въ июль. **Т. латифолия** (*T. latifolia*, широколистная). *Рогоза*. Европа. Цв. темно-бурые, колосья въ 6—12 д. длиной, въ июль—августъ. 3—7 ф.

**ТИФОНІУМЪ** (*Turphonium*). *Тифонъ*—многологическій великанъ. С. аропдейныхъ. (13). Троп. Азія, Австралія, о. Тихаго ок. Тепл. клубнев. многол. трав. рр. Легкая, сильная. Дѣленіемъ клубня.

**Т. Броуни** (*T. Brownii*, Броуна). Австралія. Чехоль темно-пурпуровый, въ апрѣль, лл. раздѣленные на три сегмента.

**ТИАРѢЛЬЯ** (*Tiarella*). *Tiara*—тиара, по формѣ плодниковъ. С. камнеломковыхъ. (5). Сѣв. Америка, Гималай. Полувыносл. многол. трав. рр. Глин. дерн. съ листовой. Дѣленіемъ.

**Т. кордифолия** (*T. cordifolia*, съ сердцевидными лл.). С. Америка. Цв. бѣлые, въ апрѣль.

**ТЛЯ ТРАВЯНАЯ ВОШЪ** (*Aphis*). Мелкія, мягкія настькомыя съ длинными ножками и сосаломъ, которымъ онѣ высасываютъ соки изъ нѣжныхъ частей растенія и тѣмъ наносятъ ему значительный

вредъ, а иногда и гибель. Каждое почти растеніе имѣетъ своего вида тлю. Настѣкомое замѣчательно огромною производительностью; оно размножается весной изъ личка, сложенного осенью и зимовавшего, а потомъ—зыготородицими индивидуями, распложающимися въ изумительно большомъ количествѣ. Для уничтоженія тли приобѣгаютъ къ слѣд. средствамъ: *табаку*,—въ порошокъ, которымъ осыпаютъ смоченныя части съ напавшими настькомыми, или окуриваютъ сухія растенія, либо обмываютъ настоемъ изъ него (табачной водой), *квасцы* съ жидкимъ мыломъ, *зеленому* или жидкому *мылу* и различнымъ средствамъ, рекомендуемымъ для истребленія настькомыхъ. Лучшимъ средствомъ для охраненія русскихъ бобовъ, смородины и т. п. отъ распространенія тли служатъ прищипываніе кончиковъ молодыхъ побѣговъ, на которые настьла тля.

**ТЛЯ КРОВЯНАЯ, ПИЗОНѢВРА** *Schioneura lanigera*. Представляется въ видѣ бѣло-хлочатаго вещества на корѣ яблоневыхъ и др. плодовыхъ деревъ и принадлежитъ настькому, близкому къ травяной тлѣ или вѣшѣ, но съ болѣе короткими ногами. Самка безкрылая, самецъ крылатый, появившійся въ июль—августѣ. Вредъ, наносимый этимъ настькомымъ, становится ощутительнымъ не вдругъ, но потомъ раздражается раковыми язвами и гибелью вѣтвей, за которыми слѣдуетъ и гибель всего дерева. Мѣры къ уничтоженію этого настькомаго должны предприниматься немедленно послѣ его появленія и состоятъ въ очисткѣ и обмывкѣ ствола, а затѣмъ въ обмазкѣ его керосиномъ или газовой жидкостью, а также уничтоженіемъ зимовавшаго настькомаго раскладываніемъ извести у основанія дерева.

**ТЛЯДИАНТА** (*Thladiantha*) *Thladias*—сжатый и *anthos*—цв., н. ч. р. было впервые описано по сухому сжату экземпляру. С. тыквенныхъ. (4). С. Китай, Ява и Гималай. Оранже. и выносл. трав. рр. Обыки. садов. Сѣменами и дѣленіемъ.

**Т. дубія** (*T. dubia*, сомнительная). Китай, Индія. Цв. разнополныя желтыя, дов. большіе; лл. глубоко-сердцевидныя. Выносл. многол.

**ТМИНЪ** См. Карумъ.

**ТОВОМИТА** (*Tovomita*). Мѣстное названіе одного изъ видовъ. С. гумнигетовыхъ. (20). Тропич. Америка. Тепл. деревяныя или кустар. со смолистыя соккомъ. Глин. дерн. съ торф. и пескомъ. Черенками изъ зрѣлаго роста въ песокъ, въ парникѣ. Темп. зимой 12—15, лѣтомъ 15—26°.

**Т. гвианѣнзисъ** (*T. guianensis*, изъ Гвианы). Бразилія и Гвиана. Цв. зеленые въ июль. 10 ф. Сип. *Маріальва гвианѣнзисъ* (*Marialva guianensis*). **Т. фруктипендула** (*T. fructipendula*, съ висющими плодами). Перу. Цв. желтыя, въ январь и февраль. Плоды кубаревидныя, вислице. 18 ф. Сип. *Бонарнезія фруктипендула* (*Beuharnoisia fructipendula*).

**ТОДАРОА** (*Todaroa*). Названіе, данное въ честь кого-то. С. орхидей. (15). Троп. Америка. Тепл. эпифиты. Ухождъ какъ за *Антрехумъ*.

**Т. микрантумъ** (*T. micranthum*, мелкоцвѣтная). Цв. бѣлые, въ февраль. Стебель короткій.

**ТОДДАЛІЯ** (*Toddalia*). На Малабарѣ однимъ изъ видовъ зовется *кака тоддали*. С. рутовыхъ. (8). Троп. страны Старого свѣта и М. Д. Н. Тепл. куст. рр. Глин. дерн. съ торф. и пескомъ. Черенками въ песокъ, въ парникѣ. Темп. зимой 8—13, лѣтомъ 13—21°.

**Т. акулеата** (*T. aculeata*, колючая). О. Маврикія. Цв. бѣлые, въ маѣ. Выощ. колючее р. **Т. ланцеолата** (*T. lanceolata*, ланцетовидная). О. Маврикія. Цв. бѣлые, въ маѣ; р. приморское. 4 ф. Сип. *Вѣприсъ ланцеолата* (*Verpris lanceolata*). **Т. паникулата** (*T. paniculata*, метельчатая). О. Маврикія. Цв. зеленоватыя, въ маѣ. 20 ф. Приморскій кустъ.

**ТОДЕЯ** (*Todea*). *Tode* (Tode) нѣмецкой микологъ, † 1797. С. папоротниковыхъ. (5). Ю. умѣр. страны. Волоки торф. съ пескомъ. Полное затѣненіе, частое опрыскиваніе.

**Т. барбара** (*T. barbara*, варварійская). Австралія, Новая Зеландія. Ван 3—4 ф. длин., 1 ф. шир. съ частыми зубчатыми перьями. Сем. *Т. африканка*, *Т. ривуларисъ* (*T. africana*, *T. rivularis*). **Т. суперба** (*T. superba*, превосходная). Новая Зеландія. Ван въ 2—3 ф. длин. и 6—10 д. шир., трехперисторазсѣченный, съ плотно-лежащими перьями. Великолѣпное р. **Т. хименофилля** (*T. hymenophylla*, похожая на хименофиллюмъ). Новая Зеландія. Ван длин. 1—2 ф., шир. 8—12 д., трехперисторазсѣченный, съ перьями плотными, ланцетовидными. Сип. *Т. пеллюцида* (*T. pellucida*).

**ТОКОЙЕНА** (*Tokoyna*). Мѣстное названіе въ Гвианѣ. С. мареновыхъ. (8). Бразилія, Гвиана. Тепл. куст. рр. Волоки торф. съ небольшимъ колич. глин. дерн., древ. углемъ и пескомъ. Черенками изъ полузрѣлаго роста въ песокъ, въ парникѣ. Темп. зимой 8—12, лѣтомъ 13—24°.

**Т. лонгифлора** (*T. longiflora*, длиноцвѣтная). Гвиана. Цв. бѣлые съ желтой трубкой. 6 ф.



**ТОКОКА** (Тососа). Местное название в Гвианѣ. С. черпучеюстных. (30). Сѣв. Бразилія, Венесуэла, Гвиана. Тепл. куст. пр. Песков. глини. дерн. 1 ч., волокнист. торф. 2 ч. Черенками, в февралѣ.

**Т. гвианензисъ** (*T. guianensis*, гвианская). Гвиана. Цв. розовитые, в август—сентябр. 3—4 ф. **Т. имперіалис** (*T. imperialis*, императорская). Перу. Листв. орнам. р.; лл. большіе, эллиптические, темно-зеленые, бархатистые, съ красноватыми жилками. Спн. *Sphaerogune imperialis* (*Sphaerogune imperialis*).

**ТОКСИКОДЕНДРОНЪ** (*Toxicodendron*). *Toxicon*—ядъ и *dendron*—дерево, по ядовитости плодовъ. С. молочайныхъ. (2). Юж. Африка. Оранжев. древ. пр. Песков. глини. дерн. Черенками в песков. землѣ, подъ рамою.

**Т. капензе** (*T. capense*, съ М. Д. Н.). Цв. двудомные, мужскіе кистями съ овальными, толстыми привѣтниками, в июнь. 5—6 ф. Спн. *Xiananthe globosa* (*Hymenoclelea globosa*).

**ТОКСИКОФЛЕА** (*Toxicophlaea*). *Toxicon*—ядъ и *phlaea*—кора, по ядовитой корѣ. С. кутровыхъ. (3). Юж. Африка, Абиссинія. Оранжев. очень ядовитыя куст. или низкоросл. пр. Легкая, сильная, съ повременною полнкою жидкимъ удороженіемъ. Черенками в пескѣ, в умѣр. теплѣ.

**Т. спектабилис** (*T. spectabilis*, красивая). Ю. Африка. Цв. бѣлые длинною (до 2 ф.) кистью, весной. 4—6 ф.

**ТОЛОКНЯНКА**. См. Акатостафилосъ.

**ТОЛСТЯНКОВЫЯ** пр. (*crassulaceae*). Обширное семейство обычно сочныхъ травянистыхъ и кустарныхъ растений. Цвѣты макушечные или угловые по лузонтникамъ; лепестковъ 3 или 5, рѣже 10—12 или болѣе, отдѣльных или сростшихся. Листья очередные или супротивные, безъ прилистниковъ, часто расположенныхъ розеткой по концамъ развѣтвленій. Родовъ около 14; главнѣйшіе: Бріофиллюмъ, Крассула, Седумъ и Сеперивумъ. Видовъ около 400.

**ТОЛЬМИЯ** (*Tolmiea*). *Тольмей* (*Tolmie*) хирургъ холсон-бейской компании. С. камнеломковыхъ. (1). Трав. р. съ многол. корневищемъ. Уходитъ какъ за Тіареллю.

**Т. Менціесіи** (*T. Menziesii*, Менци). С.-З. Америка. Цв. зеленоватые, дов. большіе, пониклые, в апрѣлѣ. 1—2 ф. Спн. *Tiarella Menziesii*, *Heuchera Menziesii* (*Tiarella Menziesii*, *Heuchera Menziesii*).

**ТОЛЬПИСЪ** (*Tolpis*). Происхожденіе названія неизвѣстно. С. сложноцвѣт-

ныхъ. (18). Канарскіе о. и Средиземно-побережье. Полувып. одно- или многол. трав. пр. Глини. дерн. съ листов. и пескомъ. Съменами весной. Цвѣтутъ в июнь. Цв. свѣтло-желтые.

**Т. барбата** (*T. barbata*, бородастый). Ю. Европа. Обертка цв. головокъ съ мучнистыми налетомъ. Спн. *Кренисъ барбата* (*Crepis barbata*). **Т. виргата** (*T. virgata*, съ длинными вѣтками). Ю. Европа. Цв. головки мелкія, 3 ф. Спн. *Т. алтиссима* (*T. altissima*). Имѣетъ разнов. *грандифлора* (*grandiflora*) съ лимонно-желтыми цв. **Т. умбеллята** (*T. umbellata*, зонтичная). Ю. Европа. Цв. головки блѣдно-желтыя, 2 ф.

**ТОМАСІЯ** (*Thomasia*) Петръ и Авраамъ *Томасъ* (*Thomas*) коллекторы швейцарскихъ пр. во времена Галлера. С. наземныхъ. (25). Австралія. Оранжев. кустарники. Глини. дерн. съ торф. и пескомъ. Черенками изъ зрѣлаго роста, в пескѣ, подъ стекломъ. Темп. зимой 4—6°.

**Т. макрокарпа** (*T. macrocarpa*, крупноплодная). Цв. съ красною чашечкою, вычичка нѣтъ, в июнь. 3 и болѣе ф.

**ТОМСОНІЯ** (*Thomsonia*). *Томсонъ* (*Thomson*) англ. ботаникъ. С. ароидныхъ. (2). Горы Гималаи и Казин. Тепл. клубневые многол. трав. пр. Уходъ какъ за Каллидумъ.

**Т. непалензисъ** (*T. nepalensis*, непальская). Непаль. Чехолъ и початокъ зеленые; лл. триразсѣченные, сегменты перистые, клубень большой. 2 ф.

**ТОНКА. ТОНКИНСКІЙ ВОВОКЪ**. См. Динтериксъ.

**ТОНКОВѢТКА**. Довольно крупная группа желтаго цвѣта съ румянцемъ. пріятнаго вкуса.

**ТОПИНАМВУРЪ**. См. Хеллантусъ.

**ТОПОЛЬ** бальзамическій, *Т. душистый*. См. Популюсъ.

**ТОПОРЪ**. Желѣзное, настальное орудіе для тески или рубки. В немъ отличаются лопасть съ лезвомъ и обухъ съ проухомъ. Обухъ насаживается на топорницъ—рукоятку.

**ТОРЕНИЯ** (*Torenia*). Шведскій исторъ Олафъ *Торенъ* (*Toren*) нашедшій *T. asiatica* и нѣк. др. китайскія пр. † 1753. С. поричниковыхъ. (16). Троп. и вост. вѣт. троп. Азія и троп. Африка, Ю. Америка. Тепл. многол. пр. Глини. дерн. съ листов., пескомъ и древ. углемъ. Съменами и черенками изъ молодыхъ побѣговъ в пескѣ, в парникѣ. Темп. зимой 5—8, лѣтомъ 13—22°.

**Т. азіатика** (*T. asiatica*, азіятская). Индія и др. Цв. голубые съ темно-фіолетовыми боковыми сегментами, в июнь.

**Т. флѣва** (*T. flava*, желтая). Индія и др. Цв. желтые съ пурпуровымъ глазкомъ, лѣтомъ. 6—10 д. Спн. *Т. Байльони* (*T. Baillonii*). **Т. Фурньери** (*T. Fournieri*, Фурнье). Кохинхина. Цв. съ блѣдно-фіолетовой трубкой, свѣтло-лиловой верхней губой, средній лоскутъ которой ярко-фіолетовый съ золотисто-желтымъ пятномъ у основанія лѣтомъ.

**ТОРНЕРА** (*Turnera*). У. *Торнеръ* (*W. Turner*) авторъ „New Herbal“, † 1568. С. турневохъ. (70). Троп. Америка, Ю. Африка. Тепл. трав., полукуст. и куст. пр. Легкая. Съменами и черенками в парникѣ, а также дѣленіемъ Темп. зимой 8—13, лѣтомъ 13—24°.

**Т. ульмифолія** (*T. ulmifolia*, съ лл. какъ у Ульмуса). Ю. Америка. Цв. желтые, в июнь до сентября. 2—4 ф. Многол. трав. р., имѣющее много разновидностей.

**ТОРРЕЯ** (*Torreya*). *Торрей* (*Torreya*)—американскій ботаникъ, † 1873. С. хвойныхъ. (4). С. Америка, С. Китай, Японія. Оранжев. деревья; при разстираніи всякой части отдѣляется крѣпкій непріятный запахъ. Глини. дер. съ пескомъ. Съменами и черенками, в пескѣ, в августѣ, в парникѣ.

**Т. грандисъ** (*T. grandis*, большая). Китай. Лл. очень жесткіе, линейно-ланцетовидные, короткіе, нѣсколько серповидные; вѣтви колючатыя; плоды зеленые, в грецк. орѣхъ. 60—80 ф. Спн. *Цефалотаксусъ умбракуліфера* (*Cephalotaxus umbraculifera*). **Т. таксифолія** (*T. taxifolia*, съ лл. какъ у тисса). Флориды. Лл. съ округлымъ основаніемъ и согнутою вершиной, линейные, серповидные, кожистые; вѣтви колючатыя, горизонтальныя; плоды овальные, съ маленькимъ остроколючемъ. 40—50 ф.

**ТОРФЯНОЙ МОХЪ** или *Сфагнумъ* (*Sphagnum*). Мохъ, составляющій существенную часть тундры и болотъ (моховыхъ) въ холодныхъ странахъ земной поверхности. Имѣетъ весьма важное примѣненіе въ садоводствѣ, по свойствамъ своего строения, вслѣдствіе котораго способенъ вбирать въ себя значительное количество воды и отдѣлять ее постепенно. Сухой торфяной мохъ представляетъ превосходное вещество при укладкѣ пр., переваемыхъ на дальнее разстояніе.

**ТОФИЛЬДІЯ** (*Tofieldia*). *Тофилдъ* (*Tofield*)—англійскій ботаникъ. С. лилейныхъ. (14). Андекія горы. Полувыносл. многол. трав. пр. Легкая. Дѣленіемъ.

**Т. пубенсъ** (*T. pubens*, пушистая). С. Америка. Цв. бѣловатые, в июль. 1—2 ф.

**ТОРФЪ**. Плотно слежавшіяся болотныя растения, преимущественно болотный мохъ *Sphagnum*.

**ТОЧИЛО. ТОЧИЛКА**. Брусомъ или стальной пруть для точенія позла.

**ТРАВА**. *Травянистое* растение. Однолѣтнее или многолѣтнее растение, у котораго на зиму вянуть, а весной снова вырастаетъ стебель съ листьями и цвѣтами.

**ТРАВЫ КУХОННЫЯ**. Подъ этимъ названіемъ сгруппированы не только тѣ огородныя растения, которые употребляются въ приправу кушанья, но и лекарственныя, — мята, шалфей, зорь, меланс и т. п.

**ТРАГОПОГОНЪ** (*Tragopogon*). *Tragos*—козелъ и *podon*—борода, по длиннымъ шелковистымъ хохолкамъ на съменахъ. С. сложноцвѣтныхъ. (40). Европа, С. Африка, умѣр. и около троп. Азія. Выносл. дву и многол. трав. пр. Рыхлая. Съменами.

**Т. глѣберъ** (*T. glaber*, гладкій). Ю. Европа. Цв. головки пурпуровыя, в июль. 1½ ф. Душ. Спн. *Героніонъ глѣберъ* (*Geropogon glaber*).

**ТРАДЕСКАНЦІЯ** (*Tradescantia*). Иоганъ *Традекантъ* (*Tradescant*)—садовникъ Карла I, † 1638 г. С. коммелиновыхъ. (32). С. и троп. Америка. Тепл. оранжев. или выносл. многол. трав. пр. Глини. дерн. съ пескомъ и торф. Дѣленіемъ.

**Т. виргиника** (*T. virginica*, виргинская). Флориды и сѣвернѣе. Цв. фіолетовые, пурпуровые или бѣлые, в апрѣлѣ—маѣ. 6 д. 2. Выносл. многол. Имѣетъ нѣсколько разновидностей.

**ТРАМВОВАТЬ**. Уколачивать, убивать землю ручною бабою—*трамбовкою*, состоящею изъ отрубка бревна съ рукоятками и желѣзнымъ обручемъ внизу.

**ТРАПА** (Трапа). Выкроенное изъ *calciatrapa*—рогатка, древняго бросательнаго орудія, которое имѣетъ четыре рубца и употреблялось въ войнѣ, какъ препятствіе конница. С. онагриковыхъ. (3). Цент. и южн. Европа, тропич. Азія и Африка. Сильная глини. дерн. Содержатъ въ водѣ. Съменами.

**Т. нѣтансъ** (*T. natans*, плавающий). *Розетки. Чертовы орѣшки*. Отъ Персид до Европы. Цв. невзрачные; лл. плавающие съ клиновиднымъ основаніемъ, зубчатые. Плоды съ четырьмя колючими отростками.

**ТРАУТФЕТТЕРІЯ** (*Trautvetteria*). Э. Р. *Траутфеттеръ*—отечеств. ученый ботаникъ. С. лютиковыхъ. (1). Выносл. многол. трав. р. Дѣленіемъ. Обыкновен. садовая.

**Т. пальмата** (*T. palmata*, дланеобразная). Японія. С. Америка. Цв. бѣлые, мелкіе, в июль—августѣ. 2—3 ф. Спн. *Актѣя пальмата* (*Actaea palmata*).

**ТРАХЕЛИУМЪ** (*Trachelium*). *Trachelos*—горло, по предполагаемому



цѣлебнымъ свойствамъ въ горловыхъ бо-  
лѣзняхъ. С. колокольчиковыхъ. (5). Средиз.  
побережье. Полувысол. многол. трав.  
или полукуст. рр. Песков. глин. дерн. съ  
растит. перегноемъ. Сѣменами весной, въ  
парникѣ или черенками изъ молодого  
роста, въ песокъ, подъ рамой.

**Т. цѣрѣдеумъ** (*T. cœruleum*, голубой).  
Италия и Испанія. Цв. мелкіе, полузонти-  
комъ, сине-фіолетовые, въ августѣ. 2 ф.  
Имѣетъ разнородность съ бѣлыми цв.

**ТРАХЕЛОСПЕРМУМЪ** (*Trache-  
lospermum*). *Trachelos*—горло и *sper-  
ma*—сѣмя, по отростку у сѣмени. С. кур-  
ровыхъ. (4). Остиндія, Малайскій архи-  
пелагъ, В. Азія. Телл. или оранжев. куст.  
рр. Легкая глин. дерн. съ торф. Черен-  
ками.

**Т. ясинойдесъ** (*T. jasminoides*, по-  
хожій на жасминъ). Шанхай. Цв. бѣлые,  
душистые, въ июль. Силн. *Rhynchospermum*  
*jasminoides* (*Rhynchospermum jasminoides*).  
У разновидности *angustifolium* (*angusti-  
folium*) лл. уже. Силн. *P. angustifolium*  
*R. angustifolium*).

**ТРАХИКАРПУСЪ** (*Trachycar-  
pus*). *Trachys*—грубый и *karpos*—плодъ,  
по жестковолосымъ плодамъ. С. пальмъ.  
(4). Горы С. Индіи и Бурмы, Китай,  
Японія. Оранжев. вѣеролистн. пальмы. Глин.  
дерн. съ раст. перегноемъ. Сѣменами и  
отпрысками.

**Т. Форчунѣи** (*T. Fortunei*, Форчуна).  
Китай. Цв. желтые. Лл. полукруглые, вѣе-  
рообразные, длиной и шириной въ 1 1/2 ф.  
Стволъ 8—12 ф. Въ Китаѣ изъ лл. дѣлаютъ  
шляпы, веревки, подошвы и одежду. **Т.**  
**эксельсѣусъ** (*T. excelsus*, высокій). Япо-  
нія, Китай. Лл. продолговатые, дланевидно-  
разсѣченные, округлые, діаметромъ въ 1 1/2  
ф. Стволъ до 24 ф. Силн. *Hampeopsis ex-  
celsa* (*Chamaecops excelsa*).

**ТРАХИМЕНЕ** (*Trachymene*).  
*Trachys*—грубый, жесткій, *hymene*—перс-  
понка, по плодамъ. С. зонтичныхъ. (14).  
Нов. Каледонія, Борнео, Австралія. Телл.  
или оранжев. одно или многол. трав. рр.  
Сѣменами въ парникѣ.

**Т. цѣрѣдеа** (*T. cœrulea*, голубое). 3.  
Австралія. Цв. голубые, въ июль. 1—2 ф.  
Силн. *Didiscus cœruleus* (*Didiscus cœru-  
leus*).

**ТРАХИСТЕМОМЪ** (*Trachystem-  
on*). *Trachys*—грубый, жесткій и  
*stemon*—тычинка, по волосистымъ тычин-  
камъ. С. бурачниковыхъ. (2). Востокъ.  
Полувыл. многол. трав. рр. Глин. дерн.  
съ пескомъ. Сѣменами и дѣленіемъ.

**Т. оріенталис** (*T. orientalis*, восточ-  
ный). Цв. сине-пурпуровые, въ мартъ до  
маі. Стебель пушистый. 1—2 ф. Силн. *Bo-  
rago orientalis* (*Borago orientalis*).

**ТРЕВЕЗІЯ** (*Trevesia*). Семейство  
падуанскихъ любителей *Treves di Bon-  
figli* (*Trevesdi Bonfigli*)—оказывало  
содѣйствіе ученымъ ботаникамъ. С. ара-  
лиевыхъ. (9). Троп. Азія, Малайскіе и  
тихоокеанскіе о. Телл. кустар. или низко-  
древ. рр.

**Т. пальмата** (*T. palmata*, дланевидная).  
Индія. Цв. зеленовато-бѣлые, въ мартъ;  
лл. очень большіе, дланевидные или пер-  
стовидные, съ перисторазсѣченными сег-  
ментами. 10—15 ф. Силн. *T. sundaica*, *Ga-  
stonia palmata* (*T. sundaica*, *Gastonia*  
*palmata*).

**ТРЕВІЯ** (*Trewia*). *Treves* (*Trew*)—  
ботаникъ, жившій въ Нюрнбергѣ. †1769.  
С. молочайныхъ. (2). Остиндія Телл. древ.  
рр. Песков. глин. дерн. съ торф. Черен-  
ками въ песокъ, въ парникѣ.

**Т. нудифлора** (*T. nudiflora*, съ обна-  
женными цв.). Цв. двудомные, безлепест-  
ные, въ маі; лл. широко-овальные, остро-  
конечные. 5 ф. и выше.

**ТРЕКУЛІЯ** (*Treculia*). *O. Трекуль*  
(*Aug. Trecul*)—франц. ботаникъ. С. кра-  
пивныхъ. (3). Троп. Африка. Телл. древ.  
или куст. рр. Глин. дерн. съ листовой.  
Черенками изъ зрѣлага роста въ песокъ,  
глин. дерн., въ парникѣ.

**Т. африкана** (*T. africana*, африкан-  
ская). Цв. зеленые, въ сентябрь; лл. про-  
долговато-овальные или ланцетовидные.  
60—80 ф.

**ТРЕМАНДРА** (*Tremandra*). *Tre-  
mo*—дрожать и *aner*, *andros*—мужъ: по  
начинанію пыльниковъ отъ малѣйшаго дви-  
женія воздуха. С. тремандровыхъ. (2).  
Австралія. Оранжев. куст. рр. Уходъ какъ  
за Тетрагека.

**Т. стеллигера** (*T. stelligera*, вѣдча-  
тая). Цв. красные, на короткихъ ножкахъ,  
съ темно-пурпуровыми пыльниками, лѣтомъ.  
2 или больше ф.

**ТРЕМАНДРОВЫЯ** рр. (*treman-  
dreae*). Семейство это состоитъ изъ не-  
большаго числа австраліискихъ кустарни-  
ковъ, похожихъ на верески. Сюда отно-  
сятъ роды Плянтатека, Тетрагека и Тре-  
мандра, содержащіе 21 видъ.

**ТРЕУГОЛКА**. См. Тригонелья.

**ТРЕФОЛЬ**. См. Меніантесъ.

**ТРЕЩИНЫ**. На деревьяхъ происхо-  
дятъ или отъ слишкомъ сильной земли,  
или отъ подпочвеннаго застоя. У плодо-  
выхъ косточковыхъ онѣ сопровождаются  
истеченіемъ камедистаго сока. Необходимо  
устроить водосточный слой и очистить  
дерево.

**ТРИГЛОХИНЪ** (*Triglochin*).  
*Treis*—три и *glochin*—грань, окончаніе,

по трехграннымъ плодникамъ С. наядо-  
выхъ. (12). Умѣр. и холодные пояса земли.  
поверхности. Оранжев. или высол. болот-  
ныя трав. рр. Заслуживаетъ вниманія  
одинъ—оранж.

**Т. бульбозумъ** (*T. bulbosum*, лукович-  
ный). Европа, Малая Азія и Ю. Африка.  
Цв. пурпуровые, въ октябрь. 1 ф. Силн.  
*T. Barrelieri* (*T. Barrelieri*).

**ТРИГОНЕЛЛИЯ** (*Trigonella*).  
*Treis*—три и *goni*—колено, сгибъ; флагъ—  
стоячий, крылья распростертыя, такъ что  
вмѣстѣ составляютъ трехугольную фигу-  
ру. С. бобовыхъ. (50). Европа, Азія, Афри-  
ка, Австралія. Высол. одно- и многол.  
трав. рр. съ сильнымъ запахомъ. Сѣме-  
нами на воздухѣ. въ обмкн. 3

**Т. рутеника** (*T. ruthenica*, русская).  
*Пажитникъ*. В. Сибирь. Цв. желтые, го-  
ловками, въ июль—июль. 1 1/2 ф. Многол.  
**Т. фенумъ-грекумъ** (*T. foenum-grae-  
cum*). *Божья трава*. Треуголка. Ю. Фран-  
ція. Цв. бѣлые, въ июль до августа. 1—2  
ф. Однол.

**ТРИГОНИДИУМЪ** (*Trigonidium*).  
*Trigona*—треугольникъ и *eidos*—похожій,  
по треугольной формѣ частей. С. орхидей.  
(8). Троп. Америка. Телл. эпифитъ. На  
чуркѣ или въ корзинѣ съ подкладкой  
волоки торф., и торф. мха.

**Т. obtusumъ** (*T. obtusum*, тупой). Де-  
мерара. Цв. съ красноватыми долями, бѣ-  
лыми съ розовыми жилками лепестками и  
бѣлою губой спереди желтой, а съ боковъ—  
отороченною краснымъ.

**ТРИДАКСЪ** (*Tridax*). Название взя-  
то у Dioscorida и означеніе салатное  
р., отъ *treis*—три и *akis*—острие, зубчикъ,  
по лучевымъ цв. С. сложноцвѣтныхъ. (7).  
Троп. Америка. Многол. трав. оранжев. рр.  
не представляющія особаго садоваго зна-  
ченія. Дѣленіемъ и сѣменами. Глин. дерн.  
съ пескомъ.

**Т. трилобата** (*T. trilobata*, трехлопаст-  
ный). Мексика. Цв. головки желтыя, лу-  
чевые цв. пятизубчатые, въ июль. 1 ф.  
Силн. *Galinsoga trilobata* (*Galinsoga*  
*trilobata*).

**ТРИКОРИНЕ** (*Tricoryne*). *Treis*—  
три и *coryne*—булава: по формѣ плод-  
никовъ. С. лилейныхъ. (6). Австралія. Оранжев.  
многол. трав. рр., рѣдко встрѣчаемая въ  
культуру.

**Т. эліаторъ** (*T. elatior*, высокое). Цв.  
бѣлые, въ июль. 1—2 ф. Земля сильная,  
легкая; размнож. дѣленіемъ.

**ТРИКСИСЪ** (*Trixis*). *Trixis*—трой-  
ной, по трехгнѣзному, трехгранному  
плоднику. С. сложноцвѣтныхъ. (30). Цент.  
и Юж. Америка и Вестиндія. Телл. или  
оранж. трав., либо куст. рр. Песков.

лив. дерн. съ листов. Черенками въ пе-  
скѣ, подъ рамами, въ маі.

**Т. дивариката-аурикулата** (*T. diva-  
ricata auriculata*, растопыренный съ уш-  
ками). Бразилія. Цв. головки бѣлыя или  
желтоватыя, въ августъ—сентябрь. 1 1/2 ф.  
**Т. сенедіойдесъ** (*T. senecioides*, похо-  
жій на Сенеціо). Чили. Цв. головки бѣ-  
лыя, въ августъ и сентябрь. 1 ф. Одно-  
лѣтнее р.

**ТРИЛИЗА** (*Trilisa*). *Trilix*—трой-  
ной, по хохолку. С. сложноцвѣтныхъ. (2).  
С. Америка. Высол. многол. трав. рр.  
Легкая глин. дерн. съ пескомъ или торф.  
Дѣленіемъ весной или сѣменами съ осени.  
**Т. одоратиссима** (*T. odoratissima*, по-  
чень душистая). Цв. головки ярко пур-  
пуровыя, въ сентябрь. 2—4 ф. Лл. при  
растираніи пахнутъ ванилью. Силн. *Liatris*  
*odoratissima* (*Liatris odoratissima*).

**ТРИЛЬДУМЪ** (*Trillium*). *Trilix*—  
тройной, по тройчатымъ частямъ цв. и  
лл. С. лилейныхъ. (12). С. Америка, вѣс-  
троп. Азія—отъ Гималая до Японіи. По-  
лувысол. многол. трав. рр. Глубокая  
торф. Дѣленіемъ корней или сѣменами.

**Т. грандифлорумъ** (*T. grandiflorum*,  
крупноцвѣтный). Цв. бѣлые, мѣняющіеся  
въ розовые, въ маі. 1—1 1/2 ф. **Т. нивале**  
(*T. nivale*, сѣбно-бѣлый). Цв. бѣлые, въ  
апрѣль. 2—4 ф. **Т. эректумъ** (*T. erect-  
um*, прямой). Цв. темно-пурпуровые, мѣ-  
няющіеся въ зеленые, въ маі, съ дур-  
нымъ запахомъ. Силн. *T. pendulumъ*, *T.*  
*romboideumъ*, *T. fistidumъ* (*T. pendulum*,  
*T. rhomboideum*, *T. foetidum*).

**ТРИМАЛИУМЪ** (*Trymalium*). *Try-  
malia*—прободеніе, по отверстіямъ въ  
верху плодника. С. крупноцвѣтныхъ. (5).  
Австралія. Оранжев. куст. рр. не имѣющія  
значенія. Глин. дерн. съ листовой. Че-  
ренками подъ рамой.

**Т. Вильярдьері** (*T. Billiardieri*,  
Вильярдьера). Цв. пурпуровые мелкіе. Р.  
кустарное.

**ТРИМЕЗИЯ** (*Trimezia*). *Treis*—три  
и *mezis*—дѣлитъ, по тройчатымъ раздѣ-  
ламъ цв. С. косатниковыхъ. (6). Вестин-  
дія, Ю. Африка. Телл. луков. рр. Уходъ  
какъ за Ирисъ.

**Т. мартиницѣнзисъ** (*T. martinicensis*,  
мартиникская). Вестиндія. Цв. ярко-желтые,  
въ апрѣль. Силн. *Ирисъ мартиницѣнзисъ*,  
*Лансбергія караказна*, *Цинура мартини-  
цѣнзисъ* (*Iris martinicensis*, *Lansbergia ca-  
racasana*, *Iris martinicensis*).

**ТРИНАКСЪ** (*Thrinax*). *Thrinax*—  
вѣтеръ, по формѣ лл. С. пальмъ. (10).  
Флориды, Антильск. о. Телл. средней вел.  
или низкія пальмы. Глин. дерн. съ торф.  
и пескомъ. Сѣменами въ песков. глин.



дери. въ горшкахъ, поставленныхъ въ теплый грунтъ. Темп. зимой 10—12, летом 13—26°.

**Т. барбадензисъ** (*T. barbadensis*, изъ Барбадоса). Барбадосъ. Лл. снизу шелковисто-блѣдые, складчатые, вѣрные. Стволъ 12 ф. **Т. мультифлора** (*T. multiflora*). Таити. Лл. почти округлые, щитовидные, съ 40 и болѣе сегментами, раздѣленными до полр. Стволъ въ 6—8 ф. Сип. **Т. гаминофилла** (*T. graminifolia*). **Т. парви-флора** (*T. parviflora*, мелкоцвѣтный). Ямайка. Лл. гладкіе, раздѣлы соединены на  $\frac{1}{6}$  или  $\frac{1}{4}$  длины. Стволъ 10—12 ф. **Т. радиата** (*T. radiata*, лучистый). Тринидадъ. Лл. длиною въ 1—2 ф.; раздѣлы соединяются ниже трети длины. Стволъ короткий. Сип. **Т. трицилис** и **Т. элеганс** (*T. gracilis*, *T. elegans*).

**ТРИПТЕРИГУМЪ** (*Tripterygium*). *Treis* — три и *pterygion* — крылышко; по плоду. С. краснопузырьниковыхъ. (1). Полуцвѣткѣ кустъ. Уходъ какъ за Целяструмъ.

**Т. Вильфортіи** (*T. Wilfordii*, Вильфорта). Японія. Формоза и Корея. Цв. бѣлые, мелкіе, въ іюнь. 2—3 ф.

**ТРИПТИЛИОНЪ** (*Triptilion*). *Treis* — три и *ptilon* — крыло; по хохолку. С. сложнцвѣтныхъ. (6). Чили. Оранж. или волоки, одно-, либо мног. трав. пр. Легкая, сильная. Съеменами въ парникѣ, потомъ на воздухъ, а на зиму — въ защиту, въ оранжерею.

**Т. кордифолиумъ** (*T. cordifolium*, сердцелистный). Цв. головки бѣлыя, въ іюль. 6 д. Однол. **Т. спинозумъ** (*T. spinosum*, колючій). Цв. головки съ внутр. цв. бѣлыми, а наружными голубыми, въ іюль. 6 д. Многол.

**ТРИСТАГМА** (*Tristagma*). *Treis* — три и *stagma* — капля, по тремъ медовикамъ. С. лилейныхъ. (3). Чили. Оранж. лукович. пр. Песков. глин. дерн. Съеменами или отростками.

**Т. нарциссоиде** (*T. narcissoides*, похожа на Нарциссъ). Цв. бѣлые съ оранжевой коронкой, въ сентябрь. Сип. **Стемматіумъ нарциссоидесъ**, **Стефанолірионъ нарциссоидесъ** (*Stemmatium narcissoides*, *Stephanolirion narcissoides*).

**ТРИСТАНІА** (*Tristania*). Жюль **Тристанъ** (*Tristan*) — франц. ботаникъ, † 1861. С. мятловыхъ. (12). Инд. архип., Нов. Каледонія и Австралія. Тепл. или оранж. древ., либо куст. пр. Понменованные ниже виды — оранж. австралийскіе. Глин. дерн. съ торф. и пескомъ. Черенками изъ полузрѣлаго роста въ песокъ, подъ рамой.

**Т. конферта** (*T. conferta*, скученная). Цв. желтые, въ іюль до сентября. Сип.

**Т. макрофилла** (*T. macrophylla*). Деревцо. **Т. перифолия** (*T. perifolia*, съ лл. какъ у Озеандра). Цв. желтые, съ іюня до сентября. Сип. **Малайя перифолия**, **М. саллицифолія** (*Melaleuca perifolia*, *M. salicifolia*). Кустъ. **Т. суавеоленс** (*T. suaveolens*, пахучая). Цв. желтые, въ августъ. Сип. **Т. депресса** (*T. depressa*) Кустъ.

**ТРИТЕЛЕІА** (*Triteleia*). *Treis* — три и *teleios* — полный, по тройчатымъ частямъ цв. С. лилейныхъ. (9). Америка. Оранж. луков. пр. Легкая, рыхлая. Съеменами или отростками. Въ пасмурную погоду цв. свертываются.

**Т. ляска** (*T. laxa*, рыхлая). Калифорнія. Цв. голубые, въ іюль. **Т. поррифолія** (*T. porrifolia*, съ лл. какъ у Поррея). Чили. Цв. фиолетовые, въ іюль. Сип. **Милла поррифолія** (*Milla porrifolia*). **Т. унифлора** (*T. uniflora*, одноцвѣтковая). Буеносъ-Айресь. Цв. бѣдно-лиловые, въ апрѣль—маѣ. Сип. **Милла унифлора** (*Milla uniflora*).

**ТРИТОНИА** (*Tritonia*). *Trilon* — флюгеръ; по различному направленію тычпочекъ у разныхъ видовъ. С. косатиковыхъ. (24). Ю. Африка. Оранж. луков. пр. Рыхлая, сильная. Съеменами или дѣленіемъ. Вообще уходъ такой же, какъ за Иксиа.

**Т. кроката** (*T. crotata*, крокусная). Цв. желто-нафранные, въ іюнь. Сип. **Иксиа кроката** (*Ixia crotata*). **Т. миниата** (*T. miniata*, шарлаховая). Цв. шарлаховые, въ августъ. **Т. Поттси** (*T. Pottsii*, Поттс). Цв. ярко-желтые, въ августъ. Сип. **Монбретія Поттси** (*Montbretia Pottsii*).

**ТРИТРИНАКСЪ** (*Trithrinax*). *Treis* — три и *thrinax* — вѣтеръ, по формѣ, и раздѣламъ лл. С. пальмъ. (3). Бразилія, Чили. Тепл. вѣроист. пальм. Уходъ какъ за Трипаксъ.

**Т. акантокома** (*T. acanthocoma*, покрытый иглами). Рио-Гранде. Лл. большіе, вѣрные, разрываемые до двухъ третей. **Т. бразилиензисъ** (*T. brasiliensis*, бразильскій). Бразилія. Лл. длин. въ 3 и болѣе ф. вѣрные, почти круглые. Стволъ 6—10 ф. выш. и 2—3 д. толщ.

**ТРИФАЗІА** (*Triphasia*). *Tiphias* — тройной, по числу долей и лепестковъ. С. рутовыхъ. (1). Оранж. колючій куст. со вкусными плодами. Волок. глин. дерн. съ торф. Черенками въ песокъ, въ парникѣ. **Т. трифолиата** (*T. trifoliata*, трехлиственная). Бѣтай. Цв. бѣлые, пахучіе съ мая до іюля. Плоды красные, овальные, въ лѣсной орѣхъ. 5 ф.

**ТРИФИЗАРІА** (*Triphysaria*). *Treis* — три и *phusa* — пузырь, по мѣшчатымъ сегментамъ нижней губы мѣшечка. С. поричниковыхъ. (23). С. Америка.

Вынос. однол., разводимыя обмы. порядкомъ.

**Т. верзиколоръ** (*T. versicolor*, разноцвѣтная). Цв. бѣлые, мѣняющіеся въ розово-пурпуровые, въ іюнь. 9 д. и выше. Сип. **Ортокарпусъ эриантусъ розеусъ** (*Orthocarpus erianthus roseus*).

**ТРИФОЛИУМЪ** (*Trifolium*). *Tres* — три, *folium* — листъ; по тройчатымъ лл. С. бобовыхъ (480). Сѣв. полушаріе, горы троп. Америки, Африки и вѣс-троп. Ю. Америка. Вынос. одно-и многол. трав. пр. Глин. дерн. съ пескомъ. Съеменами и дѣленіемъ. Упомянуты ниже пр.—многоч.

**Т. альпестеръ** (*T. alpestre*, альпійскій). Европ. Альпы. 3. Азія. Цв. пурпуровые, въ іюнь—іюль. 6—12 д. **Т. люпинастеръ** (*T. Lupinaster*). **Дятлина-сѣтка**. Сибирь. Цв. большіе, пурпуровые, въ іюнь до августа. 1—1½ ф. Имѣетъ форму съ бѣлыми цв. **Т. унифлорумъ** (*T. uniflorum*, одноцвѣтный). Сирія. Цв. пурпуровые съ голубымъ флагомъ, съ мая до сентября. Имѣетъ форму съ бѣлыми цв.

**ТРИФУРЦІА** (*Trifurcia*). *Tres* — три и *furca* — вилы, по трехцвѣтному пестичу. С. косатиковыхъ. (4). Америка. Тепл. или оранж. луковичныя пр. Глин. дерн. съ торф. и пескомъ, по ровну. Съеменами и отростками.

**Т. пульхелла** (*T. pulchella*, красивая). Буеносъ-Айресь. Цв. лиловые съ желтоватымъ или бѣловатымъ ноготкомъ некрапаннымъ пурпуровымъ, въ іюль. Оранж. р. Сип. **Хербертія пульхелла** (*Herbertia pulchella*).

**ТРИХАНТА** (*Trichantha*). *Trix*, *trichos* — волосъ и *anthos* — цв., по тонкимъ цв. почкамъ. С. геснерійныхъ. (2). Колумбія. Тепл. ползучіе кустарники. Листов. перегной съ пескомъ. Черенками въ песокъ. 3. въ парникѣ.

**Т. мѣноръ** (*T. minor*, меньшая). Цв. желтые, пурпуровые и шарлаховые, стебель вьющійся; лл. сочные.

**ТРИХИЛІА** (*Trichilia*). *Tricha* — по трое; плодный и коробочка обычно трехмѣстные. С. ясенковыхъ. (30). Троп. Африка и Америка. Тепл. древ. или куст. пр. Глин. дерн. съ торф. Черенками изъ зрѣлаго роста съ оставленными лл. въ песокъ, въ парникѣ.

**Т. одората** (*T. odorata*, душистая). Вестиндія. Цв. желтоватые, пахучіе, въ іюнь. 12—25 ф.

**ТРИХИНІУМЪ** (*Trichinium*). *Trichinis* — волосатый; по кажущемуся виду цв. С. амарантусовыхъ. (50). Австралія. Оранж. трав. или полукуст. пр. Глин. дерн. съ перегноемъ и пескомъ. Черенками изъ корня, въ песокъ, въ парникѣ.

**Т. Манглесіи** (*T. Manglesii*, Манглеса). Цв. съ малыми и бѣловатыми кончиками, шаровиднымъ или яйцевиднымъ колосомъ, въ іюнь. Стебли приподнимающіеся. 6—12 д.

**ТРИХОГЛОТТИСЪ** (*Trichoglottis*). *Thrix*, *tricho* — волосъ и *glottis* — языкъ по длиннымъ волоскамъ на губѣ. С. орхидей. (5). Малайскій арх. Тепл. орхидей. Торф. съ торф. мхомъ. Во время роста возможно большая влажность.

**Т. фасциата** (*T. fasciata*, съ каемкой). В. тронич. Азія. Доли съ каптаново-коричневыми каемками, губа бѣловатая съ желтыми кончиками на передней части и пурпуровыми на нижней сторонѣ.

**ТРИХОДЕСМА** (*Trichodesma*). *Trix*, *trichos* — волосъ и *desmos* — связь; тычинки соединены волосками. С. бурачниковыхъ. (10). Африка, Троп. и центр. Азія, Австралія. Оранж. трав. пр. Обык. глин. дерн. съ пескомъ.

**Т. цейланікумъ** (*T. zeylanicum*, цейлонскій). Ю. Индія. Цейлонъ. Маскренскіе о. и Австралія. Цв. бѣдно-голубые, кистью. Нѣсколько ф. Однол. выносливое.

**ТРИХОКАУЛОНЪ** (*Trichocaulon*). *Thrix*, *trichos* — волосъ и *caulon* — стволъ, по щетинкамъ на каждомъ клубышкѣ. С. ласточниковыхъ. (2). Ю. Африка. Оранж. сочные трав. пр. На стебляхъ клубнеобразныя возвышенія со щетинками. Уходъ какъ за Станеліа.

**Т. пиліферумъ** (*T. piliferum*, пушистый). Цв. бѣдно-желтые снаружи, темно-пурпуровые внутри. Сип. **Пиарантусъ пиліферусъ**, **Станелія пиліфера** (*Piarganthus piliferus*, *Stapelia pilifera*).

**ТРИХОМАНЕСЪ** (*Trichomanes*). *Thrix*, *trichos* — волосъ и *manos* — мягкій, по ваямъ. С. папоротниковыхъ. (100). Тронич. и умѣр. страп. Тепл. пр.

**Т. алатумъ** (*T. alatum*, крылатый). Вестиндія. Вап ланцетовидныя или овально-ланцетовидныя дву-трехперистыя; средний черешокъ крылатый. Сип. **Т. аттенуатумъ** (*T. attenuatum*). **Т. апицфолиумъ** (*T. apiculatum*, съ лл. какъ у Аниума). Филиппинскіе о. Вап широкія четыре-перисторазсѣченные, сред. черешокъ крылатый. Сип. **Т. мейфолиумъ** (*T. meifolium*). **Т. Банкрофтіа** (*T. Bancroftii*, Банкрофта). Троп. Америка. Вап продолговатые овальныя, перисторазсѣченные до крылатого черешка. **Т. Крауссіа** (*T. Kraussii*, Краусса). Вестиндія. Вап продолговатые, глубоко перисторазсѣченные до крылатого черешка. **Т. максимумъ** (*T. maximum*, наибольшій). Ява. Вап четыре-перисторазсѣченные. Сип. **Т. аписеръ** (*T. aipers*). **Т. пиксидіферумъ** (*T. pixidiferum*, съ коробочками). Троп. Америка. Вап продолговато-оваль-



ный, три-перисторазсеченный; окончательные сегменты часто съ выемчатыми кончиками. **Т. радикансъ** (*T. radicans*, укореняющийся). Европа. Выш. широкія, три-перисторазсеченныя, низшіе сегменты глубоко-зубчатые. Спн. *T. brevicaule* (*T. brevicaule*). **Т. ригидумъ** (*T. rigidum*, жесткій). Нов. Зеландія. Выш. дельтовидныя или овальныя, остроконечныя, три-или четырёхперисторазсеченныя. Спн. *T. achilleifolium*, *T. obscurum* (*T. achilleifolium*, *T. obscurum*).

**1 ТРИХОПЕТАЛОМЪ (Trichopetalum).** *Thrix, trichos*—волосъ и *petalon*—лепестокъ: внутр. сегменты цв. покрыва бахромчатые. С. лилейныхъ. (1). Оранже. многол. трав. р. Легкая. Дѣленіемъ.

**Т. стеллатумъ** (*T. stellatum*, звѣздчатый). Чили. Цв. зеленоватыя, ранней весной. 1—3 ф. Спн. *T. gracile*, *Anterium plumosum*, *Bottionea thysanotoides* (*T. gracile*, *Anterium plumosum*, *Bottionea thysanotoides*).

**ТРИХОПИЛИЯ (Trichopilia).** *Thrix, trichos*—волосъ и *pilion*—копачекъ: пыльникъ скрытъ копачкомъ съ тремя пучечками волосковъ. С. орхидей. (16). Жаркія страны Америки. Оранже. эпифиты. Волокн. торф. и живой торф. мохъ съ добавлениемъ дрв. угля. Дѣленіемъ.

**Т. Галеоттіана** (*T. Galeottiana*, Галесотти). Мексика. Цв. зеленые съ бурюю полоскою посрединѣ, губа желтая съ малиново-пурпуровыми полосками и бѣлымъ краемъ. Спн. *T. nicta*, *T. Turrialvae* (*T. nicta*, *T. Turrialvae*). **Т. криста** (*T. crispa*, курчавая). Центр. Америка. Цв. красно-вишневые съ бѣлою каймой, въ апрѣлѣ до іюня. **Т. маргината** (*T. marginata*, каемчатая). Центр. Америка. Цв. красно-вишневые съ желто-зелеными коймами; губа бѣлая, въ маѣ—іюнь. Спн. *T. coccinea* (*T. coccinea*). **Т. нобилис** (*T. nobilis*, благородная). Колумбія. Цв. бѣлые, пахучіе, губа посрединѣ съ желтымъ пятномъ. **Т. суависъ** (*T. suavis*, пахучая). Коста-Рика. Цв. бѣлые, душистые, губа желтая съ розово-фіолетовыми пятнышками, въ мартѣ и апрѣлѣ. **Т. фрагрансъ** (*T. fragrans*, благоуханная). Нов. Гренада. Цв. желтые, съ приятнымъ запахомъ, губа бѣлая съ оранжевыми пятнами, зимой. Спн. *Pilumna fragrans* (*Pilumna fragrans*).

**ТРИХОСАКМЕ (Trichosacme).** *Thrix, trichos*—волосъ и *sacme*—вершина: по волосистому придатку вѣшника. С. ласточниковыхъ. (1). Тепл. вьющ. куст. Уходъ какъ за Стапелія.

**Т. ланата** (*T. lanata*, шерстистое). Мексика. Цв. пурпуровые, въ іюль.

**РТИХОСАНТЕСЪ (Trichosanthos)**

*Thrix, trichos*—волосъ и *anthos*—цв., по бахромчатому вѣшнику. С. тыквенныхъ. (30). Троп. Азія, С. Австралія и Полинезія. Тепл. и оранж., либо полувыносл. вьющ. одно-и многол. трав. рр. Сѣменами, подобно огурцамъ.

**Т. ангиана** (*T. anguina*, похожий на змѣю). Индія. Цв. бѣлые, плоды удлинённые, цилиндрическіе, съѣдомые; лл. сердцевидные. Полувыносл. Спн. *T. colubrina* (*T. colubrina*). **Т. пальмата** (*T. palmata*, дланевидный). Индія и С. Австралія. Цв. бѣлые, плоды почти шаровидные. Лл. дланевидные. Тепл. р.

**ТРИХОСМА (Trichosma) Treis**—три и *choma*—дѣленіе: по трехлопастной губѣ. С. орхидей. (1). Тепл. эпифитъ. Волокн. торф. съ мохомъ.

**Т. суависъ** (*T. suavis*, съ приятнымъ запахомъ). Горы Казин. Цв. пахучіе, дов. крупныя, бѣлые, губа съ малиново-буроватыми черточками, средняя часть желтая съ малиновымъ ободкомъ. Спн. *Celogyne coronaria*, *Эрия коронарія*, *Э. суависъ* (*Celogyne coronaria*, *Eria coronaria*, *E. suavis*).

**ТРИХОЦЕНТРУМЪ (Trichocentrum).** *Thrix, trichos*—волосъ и *kentron*—шпора, по длинной и тонкой шпорѣ у губы. С. орхидей. (14). Троп. Америка. Тепл. эпифиты. На чуркахъ, съ подкладкой торф. моха и торф. з. Дѣленіемъ.

**Т. альбо-пурпуреумъ** (*T. albo-purpureum*, бѣло-пурпуровый). Бразилія. Цв. снаружи коричневыя, тускло-желтые внутри, губа бѣлая съ двумя пурпуровыми пятнами. **Т. ортоплектронъ** (*T. orthoplectron*, съ прямою шпорей). Бразилія. Цв. большіе, коричневыя съ желтыми кончиками и бѣлою губою, на которой малиновыя пятнышки, передняя-же часть желтая, въ октябрѣ. **Т. Пфауи** (*T. Pfaui*, Пфава). Центр. Америка. Цв. коричневыя съ бѣлымъ, губа бѣлая съ краснымъ посрединѣ. **Т. тигринумъ** (*T. tigrinum*, тигровый). Эквадоръ. Цв. зеленовато-желтые съ пурпуровыми поперечными полосками, губа бѣлая съ желтымъ гребнемъ и пурпуровыми пятнами.

**ТРИХОЦЕРОСЪ (Trichoceros)** *Thrix, trichos*—волосъ и *keras*—рогъ: по двумъ отросткамъ пестика. С. орхидей. (7). Перу и Колумбія. Тепл. эпифиты. Въ корзинѣ съ торф. з. и торф. мохомъ. **Т. парвифлорусъ** (*T. parviflorus*, мелкоцвѣтливый). Колумбія. Цв. зеленые съ пурпуровыми и коричневыми пятнами.

**ТРИЦЕЙКСИСЪ (Trizeuxis).** *Treis*—три и *zeuxis*—союзъ, по сросшимся тремъ долямъ. С. орхидей. (1). Тепл. эпифиты. На чуркѣ. Дѣленіемъ.

**Т. фальската** (*T. falcata*, серповидный). Анды въ Колумбія. Тринидадъ. Цв. зеленые, мелкіе.

**ТРИЦИРТИСЪ (Tricyrtis).** *Treis*—три и *kyrtos*—выпуклый; по наруж. сегментамъ цв. покрыва. С. лилейныхъ. (5). Гималая, Японія, Китай. Оранже. многол. трав. рр. Песков. глин. дерн. съ торф. Отпрысками. Лѣтомъ могутъ быть на воздушнѣ.

**Т. макропода** (*T. macrodon*, съ большими корнями). Японія, Китай. Цв. бѣловато-пурпуровые съ мелкими крапинками, въ маѣ. 2—3 ф. **Т. хирта** (*T. hirta*, волосистый). Японія. Цв. бѣлые съ наруж. сегментами, имѣющими пурпуровыя крапинки, въ маѣ. 1—3 ф.

**ТСУГА (Tsuga)** Мѣстное японское названіе. С. хвойныхъ. (8). Сѣв. Америка, Азія. Оранже. дрв. рр. Уходъ какъ за Пинусъ.

**Т. Зибольдіи** (*T. Sieboldii*, Зибольда). Японія. Лл. двурядные, густые, плоскіе, съ двумя серебристыми полосками на нижней сторонѣ. 80—100 ф. Шишки эллиптическія, маленькія, тупыя. Спн. *Abies tsuana* (*Abies Tsuga*). **Т. канадѣнзисъ** (*T. canadensis*, канадская). С. Америка. Лл. плоскіе, неправильно двурядные, тупые, съ завернутыми краями и мучнистою нижнею стороною. Вѣтви пониклыя. 70—80 ф. Шишки маленькія. Спн. *Abies brunnopiana*, *A. dimorpha* (*Abies Brunnopiana*, *A. dimorpha*). Имѣетъ нѣсколько разновидностей. **Т. Мертенсіана** (*T. Mertensiana*, Мертенса). Калифорнія. Похожа на Канадѣнзисъ, но лл. короче и тоньше, мельче, ростъ-же сильнѣе. 100—150 ф. Спн. *Abies Mertensiana* (*Abies Mertensiana*). **Т. Паттоніана** (*T. Pattoniana*, Паттона). Сiera-Невада. Лл. углестые, острые, часто согнутые; шишки въ 2—3 д. 100—150 ф. Спн. *Abies Williamsoni* (*Abies Williamsoni*). **Т. Хукеріана** (*T. Hookeriana*, Хукерова). Калифорнія. Лл. густые, тупоконечные, прямые, сизоватые. Шишки висіячія, темно-пурпуровыя.

**ТРИАНА (Trianea).** *Хосе Триана* (*Jose Triana*)—ботаникъ и путешественникъ въ Колумбія. С. лягушниковыхъ. (4). С. Америка, Мексика и троп. юж. Америка. Тепл. или оранж. водяныя трав. рр. Побѣгами.

**Т. боготѣнзисъ** (*T. bogotensis*, изъ Боготы). Колумбія. Цв. мелкіе, лл. продолговато-овальные. Спн. *Limnobia bogotense* (*Limnobia bogotense*).

**ТРИАСЪ (Trias).** *Treis*—три, по тройчатымъ частямъ цв. С. орхидей. (3). Мульмейнъ и Остиндія. Тепл. ползучія, низкія рр. Торф. съ торф. мхомъ въ корзинѣ или съ подкладкой тѣхъ же материаловъ—на чуркѣ.

**Т. облонга** (*T. oblonga*, продолговатый). Мульмейнъ. Цв. коричневатозеленые съ пурпуровой губой, въ апрѣлѣ. 3 д.

**ТРИЕНТАЛИСЪ (Trientalis).** Латинскій терминъ означающій вышиною  $\frac{1}{3}$  фута; по росту р. С. первоцвѣтковыхъ. (2). Европа, С. Азія, С.-З. Америка. Выносл. трав. многол. рр. Сильная, легкая и затѣненное положеніе. Сѣменами весной, подъ стекломъ, или дѣленіемъ.

**Т. американа** (*T. americana*, американскій). С.-З. Америка. Цв. бѣлые, раздѣлы покрыва остроконечные, въ маѣ. Лл. ланцетовидные. 9 д. **Т. европея** (*T. europaea*, европейскій). *Семитичникъ*. Европа. Цв. бѣлые съ овальными, остроконечными лоскутами покрыва, въ іюнѣ—іюль; лл. обратно-яйцевидные или яйцевидно-ланцетовидные. 4—8 д.

**ТРИОЛЕНА (Triolena) Treis**—три и *olene*—рука, по тремъ отросткамъ у основанія пыльниковъ. С. черноустовыхъ. (3). Мексика, Венецуэла, Нов. Гренада. Тепл. трав. рр. Песков. глин. дерн. съ листов. Сѣменами или черенками въ парникѣ.

**Т. скорпиоидесъ** (*T. scorpioides*, скорпиовидная). Чили. Цв. розовые, скорпиовидно кистью. 6 д.

**ТРИОПТЕРИСЪ (Triopteris).** *Treis*—три, *pteron*—крыло; по трехкрылымъ летучкамъ. С. мальпигиныхъ. (3). Вестиндія, Мексика. Тепл. вьющ. кустар. рр. Торф. съ пескомъ. Черенками въ песокъ, въ парникѣ. Темп. зимой 7—12, лѣтомъ 13—24°.

**Т. ригида** (*T. rigida*, жесткій). Вестиндія. Цв. голубые, въ маѣ.

**ТРИОСТЕУМЪ (Triosteum).** *Treis*—три, *osteon*—кость, по тремъ костистымъ сѣмечкамъ или орѣшкамъ. С. жимолостныхъ. (3). Гималай и С. Америка. Полувыносл. многол. трав. рр. Песков. глин. дер. съ листовой. Дѣленіемъ весной или черенками изъ молодыхъ побѣговъ, въ началѣ лѣта, подъ рамой.

**Т. перфоліатумъ** (*T. perfoliatum*, съ прободенными лл.). С. Америка. Цв. буропурпуровые, въ іюнѣ. 2—4 ф. Выносл. пушистое р.

**ТРОСТА.** См. Фаларисъ.

**ТРОКСИМОНЪ (Trochimom).** *Troximos*—съѣдомый, хотя ни одного вида съѣдомаго нѣтъ. С. сложноцвѣтныхъ. (16). С.-З. и Ю. вѣв-троп. Америка. Одно и многол. трав. рр. выносл. или оранж. Песков. глин. дерн. Сѣменами и дѣленіемъ.

**Т. глаукумъ** (*T. glaucum*, сизый). Соед. Ам. Штаты. Цв. головки ярко-желтыя, въ маѣ—іюнѣ. 1 ф. Многол. полу-выносл.

**ТРОЛЬІУСЪ (Trollius).** Полагаютъ отъ древнегерманскаго *trol*—шаръ. С. лютиковыхъ. (9). Умѣр. и холодные пояса сѣв. полушарія. Выносл. многол. трав



пр. Тяжелая нѣсколько влажная. Дѣленіемъ осенью или сѣменами, которыя всходятъ туго.

**Т. европеусъ** (Т. europaeus, европейскій). *Кушумница*. Свв. Европа. Цв. свѣтло-желтые, шарообразные, въ июнь до августа. До 2 ф.

**ТРОПЕОЛИУМЪ** (Tropeolum). *Tropeion*—трофей: лл. похожи на щиты, цв.—на шлемы. С. гераніевыхъ. (35). Ю. Америка. Оранж. или выносл. многол., либо однол. трав. пр. Сильная, легкая. Сѣменами и черенками.

**Т. ацуреумъ** (Т. azureum, лазуревый). Чили. Цв. лазуревые, слегка душистые, въ октябрѣ. Оранж. **Т. Лоббианумъ** (Т. Lobbianum, Лобба). Колумбія. Цв. оранжевые, въ ноябрѣ. Оранж. **Т. маюсъ** (Т. majus, большій). *Капуцинъ*. Перу. Цв. ярко-оранжевые, крупные, красивые, съ іюля до октября. Выносл. однол. Имѣетъ очень много разновидностей. **Т. минусъ** (Т. minus, меньшій). Перу. Похожъ на маюсъ, но меньше ростомъ. То-же имѣетъ много разновидностей. **Т. перегринумъ** (Т. peregrinum, экзотическій). Перу и Мексика. Цв. свѣтло-желтые, съ іюня до октября. Выносл. однол. или оранж. многол. Снн. **Т. адукумъ** (Т. aduncum). **Т. полифиллюмъ** (Т. polyrhylum, многолиственный). Чили. Цв. желтые, въ іюнь. Оранж. многол. распростертое р. **Т. специозумъ** (Т. speciosum, отъѣнный). Чили. Цв. шарлаховые, съ іюня до октября. Оранж. трав. **Т. триколорумъ** (Т. tricolorum, трехцвѣтный). Чили. Цв. оранжевые съ черными кончиками, съ іюня до октября. Оранж. Имѣетъ нѣсколько разновидностей. **Т. Яратти** (Т. Jaratti, Яратта). Сантъ-Яго. Цв. красно-оранжевые, съ желтыми внизу пятнами, въ іюнь. Оранж.

**ТРОПИЧЕСКОЕ** растеніе. Растеніе жаркихъ странъ, собственно изъ жаркаго пояса между двухъ тропиковъ.

**ТРОСТНИКЪ-ТРЕЗУБКА**. См. Арундо.

**ТРОХОКАРПА** (Trochocarpa). *Trochos*—колесо и *karpos*—плодъ; по лучистому плоду. С. эпакрисовыхъ. (6). Австралія. Оранж. кустар. или низко-древ. пр. Волоки. торф. съ пескомъ. Черенками изъ молодого роста съ окрѣпшей нижн. частью, въ песокъ, въ парникѣ.

**Т. лауріна** (Т. laurina, похожая на Лавръ). Цв. бѣлые, мелкіе, въ іюнь. 20—40 ф.

**ТРОШЕТІЯ** (Trochetia). *Du Trochet*—франц. физиологъ и ботаникъ, † 1847. С. навозниковыхъ. (6). О. Маврикія, св. Елены и Мадагаскаръ. Телл. или оранж. кустар., либо древ. пр. Глин.

дерн. съ листов. и пескомъ. Черенками въ песокъ, подъ рамами.

**Т. трифлора** (Т. triflora, о трехъ цв.). О. Маврикія. Цв. бѣлые съ желтымъ, въ декабрѣ; на ножкѣ три цв., въ декабрѣ. 10 ф.

**ТУВЕРОЗА**. См. Полянтезъ.

**ТУЙНІЯ** (Thouinia). *Tuénz* (André Thouin)—проф. земледѣлія въ Парижѣ, † 1824. С. мыловиковыхъ. (12). Троп. Америка. Телл. куст. или древ. пр. Ухоть какъ за Тикореа. Темп. зимой 8—12, лѣтомъ 18—24°.

**Т. пинната** (Т. pinnata, перистая). Сантъ-Доминго. Цв. бѣлые, въ іюнь. 8 ф.

**ТУЮПСИСЪ** (Thujopsis). *Thuya*—Туя и *opsis*—сходство, по сходству обоихъ родовъ. С. хвойныхъ (1). Холодно-оранж. или полу-выносл. р. Ухоть какъ за Туя.

**Т. долабрата** (Т. dolabrata, съ строго-образными лл.). Японія. Цв. четырьмя рядами, чешуйчатые, широкіе, толстые, овальные, снизу серебристые; шишки маленькія, яйцевидныя; вѣтви вертикальныя. 40—50 ф. Имѣетъ нѣсколько разновидностей.

**ТУІЯ** (Thuya) *Thuia*—древне-греческое названіе, встрѣчаемое у Теофраста. С. хвойныхъ. (12). С. Америка и вѣдъ тропич. В. Азія. Выносл. и полу-выносл. куст. и древ. пр. Глин. дерн. съ пескомъ, нѣсколько влажная. Сѣменами, весной, черенками изъ полурѣзлага роста и прививкой.

**Т. гигантеа** (Т. gigantea, гигантская). С.-З. Америка. Лл. очередные, плотно-настельные; шишки маленькія, яйцевидныя. 50—150 ф. Имѣетъ нѣсколько разновидностей. Холодно-оранж. **Т. оксиденталисъ** (Т. occidentalis, западная). *Негінючка*. С. Америка. Лл. мелкіе, супротивными парами, тупые, плотно-настельные, четырьмя рядами; шишки обратно-яйцевидныя. 40—50 ф. Имѣетъ очень много разновидностей. Выносл. **Т. ориенталисъ** (Т. orientalis, восточная). Китай, Японія. Лл. очень мелкіе, въ четыре ряда, овально-ромбоидальные, прижатые; шишки овально-эллиптическия; вѣтви сначала горизонтальныя, потомъ пониклыя. 18—20 ф. Имѣетъ много разновидностей. Холодно-оранж.

**ТУЛИПА** (Tulipa). **ТЮЛЬПАНЪ**. Съ турецкаго *тульбандъ*—чалма, по сходству цв. С. лилейныхъ. (60). Европа, С. Африка, З. и центр. Азія до Японіи. Выносл. луков. трав. пр. Песков. глин. дерн. съ листов. и перегноемъ, при хорошемъ водостокѣ. Сѣменами (очень долго ждать до цвѣтенія), обычно-же—отпрысками. По отцвѣтенію—вынуть, просушить въ тѣни, и посадить снова, положивъ вокругъ луковицы песокъ. Употр. для горшечной и выгоночной культуры.

**Т. аустралисъ** (Т. australis, южная). Савойя. Видъ похожій на Т. сильвестрисъ, но цв. болѣе вытянутый, съ краснымъ отбѣнкомъ. Снн. *Т. Бреймана*, *Т. Целсиана* (Т. Breyniana, Т. Celsiana). Т. Геснеріана (Т. Gesneriana, Геснеровъ). Левантъ. Цв. большіе, колокольчатые, равной окраски, если красной, то съ темнымъ внизу пятномъ. 2 ф. Родоначальникъ разнообразныхъ садовыхъ *тильпановъ*, имѣющихъ множество формъ. **Т. Грейгги** (Т. Greigii, С. А. Грейга). Туркестанъ. Цв. ярко-красные, колокольчатые; лл. съ коричневыми пятнами, въ апрѣль—маѣ. 9 д. **Т. Кюзиана** (Т. Clusiana, Кюзиуса). Средиземное побережье. Цв. бѣлые, снаружи съ краснымъ отбѣнкомъ и пурпуровымъ основаніемъ, въ іюль. 1—1½ ф. **Т. макроспейда** (Т. macrospeila, широко-распаванный). Отечество неизвѣстно. Цв. ярко-красные съ клиновиднымъ чернымъ пятномъ на сегментахъ и желтымъ ободкомъ, въ маѣ. **Т. окулисъ-солісъ** (Т. oculis solis, солнечный глазъ). Ю. Франція. Цв. ярко-красные съ большимъ чернымъ пятномъ у основанія сегментовъ и желтыми краями, въ апрѣль. 1—1½ ф. **Т. прѣкоксъ** (Т. praecox, ранній). Италия. Форма Окулисъ-солісъ, отличающаяся болѣе сильнымъ ростомъ и болѣе раннимъ цвѣтеніемъ. **Т. пубесценсъ** (Т. pubescens, пушистая). Есть вѣроятно помѣсь между Геснеріана и Суавеоленсъ. Цв. разной окраски, душистые. **Т. ретрофлексъ** (Т. retroflexa, загнутая назадъ). Вѣроятно гибридъ. Цв. желтые, въ маѣ. **Т. суавеоленсъ** (Т. suaveolens, пахучая). Ю. Европа. Цв. красные съ желтымъ; весной рано. Это садовый тюльпанъ *Ванъ Толъ* (Van Thol) употребляемый въ ранней выгонкѣ. **Т. сильвестрисъ** (Т. sylvestris, лѣсной). Европа. Цв. пахучіе, ярко-желтые, въ маѣ. Снн. *Т. фрагрансъ* (Т. fragrans). **Т. Эйхлера** (Т. Eichleri, Эйхлера). Грузія. Цв. ярко-карминовые, съ черными поотками, въ апрѣль—маѣ. **Т. элегансъ** (Т. elegans, изящная). Вѣроятно гибридъ. Цв. ярко-красные съ желтымъ глазкомъ, въ концѣ апрѣля.

**ТУЛЬБАГІЯ** (Tulbaghia). *Тулбагъ* (Tulbagh)—голл. губернаторъ на М. Д. Н. † 1771. С. лилейныхъ. (12). Юж. и троп. Африка. Оранж. многол. трав. пр. Песков. глин. дерн. съ торф. Отирысками и сѣменами.

**Т. алліяцеа** (Т. alliacea, съ луковымъ запахомъ). Цв. зеленовато-пурпуровые съ тускло-красной коронкой, въ іюнь. Имѣетъ нѣск. разновидностей. **Т. виоліацеа** (Т. violacea, фиолетовая). Цв. пурпурово-фиолетовые, въ маѣ. **Т. калензисъ** (Т. capensis, капская). Цв. зеленовато-пурпуровые, коронка пурпуровая, въ іюнь.

**ТУНБЕРГІЯ** (Thunbergia). *Тунбергъ* (С. Р. Thunberg)—путешественникъ въ Батавіи и Японіи, затѣмъ проф. въ Упсаль, † 1822. С. акантовыхъ. (30). Юж. и троп. Африка, Мадагаскаръ и жаркія страны Азіи. Телл. вьющ. или прямые однол. или многол. трав. пр. Волоки. глин. дерн. съ пескомъ и частью перепои. Сѣменами или черенками изъ окрѣпшаго молодого роста, въ парникѣ, при темп. 15—17°. Темп. содержанія зимой 7—13, лѣтомъ 13—21°.

**Т. алата** (Т. alata, крылатая). Ю. Африка. Цв. желтые съ краснымъ, весной. Однол. цѣнное. 4 ф. **Т. кокинеа** (Т. coccinea, шарлаховая). Индія. Цв. красные до оранжево-розовыхъ, весной. Цѣнное вьющ. пр. **Т. лаурифолія** (Т. laurifolia, лавролистая). Индія. Цв. голубые. Многол., высоковетвящ. р. Снн. *Т. Харриса* (Т. Harrisii). **Т. фрагрансъ** (Т. fragrans, душистая). Индія. Цв. бѣлые, душистые; стебли тонкіе, вьющ. **Т. эрѣкта** (Т. erecta, пряморослая). З. Африка. Цв. темно-голубые съ оранжевымъ горлышкомъ и желтою трубкой. 6 ф. Цвѣтетъ почти круглый годъ. Снн. *Мейенія эрѣкта* (Meunieria erecta).

**ТУНИКА** (Tunica). *Tunica*—покрывъ, по покрывающимъ цв. оберткамъ. С. гвоздичныхъ. (10). Юж. Европа, З. Азія. Полувын. или выносл. многол. или однол. трав. пр. Легкая. Сѣменами.

**Т. саксифрага** (Т. saxifraga, похожая на Саксифрага). Центр. и Ю. Европа. Цв. малиновые, въ іюль. Многол.

**ТУПИДАНТУСЪ** (Tupidanthus). *Tupis*, *Tupidos*—колотушка и *anthos*—цв., по формѣ цв. почекъ. С. аралиевыхъ. (1). Телл. вьющ. р. Песков. глин. дерн. Черенками въ песокъ, въ парникѣ.

**Т. калипратусъ** (Т. calyptratus, съ колпачкомъ). Индія. Цв. зеленые; лл. ланцетовидные, о 7—9 сегментахъ.

**ТУПИСТРА** (Tupistra). *Tupis*—колотушка; по особенной формѣ рыльца. С. лилейныхъ. (4). Гималаи, Бурма. Телл. многол. трав. пр. Глин. дерн. Побѣгамъ или дѣленіемъ.

**Т. макростигма** (Т. macrostigma, съ большимъ рыльцемъ). Казія. Цв. темно-пурпуровые, въ декабрѣ. Снн. *Макростигма тулистройдесъ* (Macrostigma tupistroides).

**ТУРѢЦКАЯ ГВОЗДИКА**. См. Діантусъ.

**ТУРНЕРА**. См. Турнера.

**ТУРНЕРОВІЯ** пр. (turneraceae). Травяни. или куст. пр., почти исключительно американскія; нѣсколько встрѣчается въ Африкѣ, а одна—въ Азіи.



Къ сем. принадлежать только три рода, — Вормскюльдія, Торнера и Эрблихія, въ которыхъ 76 видовъ.

**ТУРНЕФОРТИЯ** (*Tournefortia*) Жозефъ Питтопъ де Турнефоръ (*De Tournefort*) — знаменитый франц. ботаникъ, на, писавшій „*Institutiones Rei herbariae*“ — 1708. С. бурачниковыхъ (100). Жаркія страны земной поверхности. Тепл., оранж. древ. или кустари. рр. не имѣющія садового значенія. Глин. дерн. съ листов. Черенками.

**Т. хелиотропoidесъ** (*T. heliotropoides*, похотная на Гелиотропъ). Буеносъ-Айресъ. Цв. похотны на хелиотроповые, но безъ запаха; въ маѣ. 2 ф.

**ТУРРЕА** (*Turraea*). *Турра* (*Turra*) — проф. ботаники въ Падуѣ, авторъ многихъ ботан. сочиненій, † 1688. С. асенковыхъ. (17). Ю. Африка, троп. Азія и Австралія. Тепл. или оранж. древ., либо куст. рр. Глин. дерн. съ торф. Черенками изъ зрѣлаго роста съ нетронутыми л., въ песокъ, въ парникъ.

**Т. obtusifolia** (*T. obtusifolia*, туполистная). Ю. Африка. Цв. бѣлые, въ маѣ 4—6 ф. Оранж. кусты.

**ТУРРЕТИЯ** (*Tourretia*). *Кларе-де-ла-Турреттэ* (*Claret de la Tourrette*) — ботаникъ, другъ Ж. Ж. Руссо, † 1793. С. биньоніиныхъ. (1). Выносъ. цѣнное трав. р., воспитываемое какъ одол. Съедами въ парникъ, затѣмъ въ грунтъ, около подставки.

**Т. ларрасеа** (*T. larrasea*, похотная на Лопушникъ). Горы троп. Америки. Цв. фиолетово-пурпуровые, длинными кистями, въ июль. 6 ф.

**ТУРЧА**. См. Хоттонія.

**ТУССИЛАГО** (*Tussilago*). Древне-латинское названіе, заимствованное у Латиня: отъ *tussis* — кашель, во врачеванію лл. С. сложноцвѣтныхъ. (1). Обыкновеннѣйшее дико-растущее трав. многол. р., съ желтыми цв., появляющимися рано весной.

**Т. фарфара** (*T. farfara*). *Мать-мачиха*. Употребляется въ садахъ въ формѣ пестролистной (*variegata*, *variegata*) лиственной породы; лл. съ бѣлою каемкою и такими же пятнами.

**ТУТОВНИКЪ**. См. Морусъ.

**ТЫКАЛО. ТЫКАЛКА. ТЫКАЧЪ**. Колъ или заостренная чурочка на палкѣ для дѣланія лунокъ на грядахъ.

**ТЫКВА**. См. Кукурбита. *Тыква три-вѣлика*. См. Лягенарія.

**ТЫКВЕННЫЯ** рр. (*cucurbitaceae*). Обширное семейство сочныхъ цѣпкихъ раст. съ одиночными боковыми узлами. Цвѣты одиночные, метельчатые или пуч-

ками, одно- и двудомные, вѣтчикъ о 5, рѣдко 3 или 6 лепесткахъ, иногда каемчатыхъ, съ сильно развитыми сѣтчатыми жилками. Плодъ сочный, болѣе или менѣе мясистый. Листья супротивные, на черешкахъ, ланцетовидные или стоповидные, часто сердцевидные, сочные, жесткіе. Родовъ около 70 (въ томъ числѣ Бріонія, Кукумисъ, Кукурбита и Трихозантесъ), видовъ около 470.

**ТЮЛПАНЪ**. См. Туліпа.

**ТЮЛПАНОЕ ДЕРЕВО**. См. Лиодендронъ. *Тюлпанное яблоко*. Сортъ средній поры посѣванія, среднихъ размѣровъ, продолговатой формы, бѣлаго цвѣта съ румянцемъ, вкусъ разсыпчатой мякоти пріятный, съ кваскомъ.

**ТУРПИНИЯ** (*Turpinia*). *Турпенъ* (*Turpin*) — французскій натуралистъ и художникъ, † 1840. С. мыловниковыхъ. (8). Индѣйскій архипелагъ Китай, Вестиндія и сѣв. часть южной Америки. Тепл. или оранж. древ. либо куст. рр. Торф. съ глин. дерн. и пескомъ. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ песокъ, въ парникъ.

**Т. окциденталис** (*T. occidentalis*, западная). Вестиндія. Цв. бѣлые, въ маѣ; плоды темносиніе. 20—30 ф. Тепл. дерево. **Т. помифера** (*T. pomifera*, дающая яблоки). Индія. Китай. Цв. бѣлые, въ маѣ; плоды красные. 20—25 ф. Тепл. куст. р.

**ТУССАСІЯ** (*Tussacia*). *Туссакъ* (*Tussac*) — франц. ботаникъ, авторъ флоры антильскихъ о. С. геснеріиныхъ. (5). Вестиндія, Гвіана, Колумбія. Тепл. трав. рр. Уходъ какъ за Геснера.

**Т. пухлякелля** (*T. pulchella*, красивая). Вестиндія. Цв. съ красной чашечкой, вѣтчикъ желтый, въ июль. 1 ф. Сил. *Беслерія пухлякелля* (*Besleria pulchella*).

**УАЙЭТИЯ** (*Wyethia*). *Уайетъ* (*Wyeth*) — нашель рр. этого рода на горахъ въ Сѣв. Америкѣ. С. сложноцвѣтныхъ. (7). Многол. трав. полувыносъ. рр. Уходъ какъ за Хелиантусъ.

**У. ангиустифолія** (*W. angustifolia*, узколистная). Соед. Штаты. Цв. головки желтыя, осенью. До 2 ф.

**УАЙТХЕДИЯ** (*Whiteheadia*). Пас-торъ *Уайтхедъ* (*Whitehead*), — нашедшій р. С. лилейныхъ. (1). Оранж. луков. р. Сильная. Отпрысками.

**У. бифолія** (*W. bifolia*, двулистная). Ю. Африка. Цв. свѣтло-зеленые, въ апрѣль. Сил. *Мелантіумъ массоніефоліумъ*, *Эйкомисъ бифолія* (*Melantium massoniaefolium*, *Eucomis bifolia*).

**УАТСОНІЯ** (*Watsonia*). *Уатсонъ* (*Watson*) — проф. ботаники въ Чельси, въ Лондонѣ, † 1787. С. косатиковыхъ. (25).

Ю. Африка. Оранж. лукович. рр. Очень песков. гл. дерн. съ малымъ колич. торф. Съедами или отпрысками. Въ грунтъ лучше, чѣмъ въ горшкахъ.

**У. денсифлора** (*W. densiflora*, съ плот-посидищими цв.). Цв. красно-розовые, густымъ двуряднымъ колосомъ, въ июль. **У. Меріана** (*W. Meriana*, г жи Меріанъ). Цв. пурпуровые или шарлаховые, въ маѣ. Сил. *Антюліца Меріана* (*Antholyza Meriana*). **У. розеа** (*W. rosea*, розовая). Цв. розовые пирамидальнымъ колосомъ, въ июль. Сил. *Гладиолусъ пирамидатусъ* (*Gladiolus pyramidalis*).

**УБЛЮДОКЪ. УБЛЮДЕНЪ**. Помѣсь двухъ видовъ Гибриды.

**УВАРІЯ** (*Uvaria*). *Ува* — виноградная кисть, по плодамъ нѣк. видовъ. С. аноповыхъ. (35). Троп. Азія и Африка. Тепл. куст. рр. Песков. глин. дерн. съ торф. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ песокъ, въ парникъ. Темп. зимой 10—13, лѣтомъ 13—24°.

**У. Кёрки** (*U. Kirkii*, Керка). Зап.-баръ. Цв. грязнопалевые съ зеленымъ налетомъ, въ октябрѣ. 3—4 ф. **У. цейланіка** (*U. Zeylanica*, цейлонская). Цейлонъ. Цв. тускло-красные, въ маѣ. 20 ф.

**УВИРАНДРА** (*Ouvirandra*). Мѣстное названіе обозначающее «водяной ямсъ», потому что корни съѣдомы. С. наядовыхъ. Малочисленный родъ водяныхъ растений, главное отличіе которыхъ — особенность устройства ихъ листьевъ. Глин. дерн. съ животнымъ перегноемъ Съедами или дѣленіемъ корней. Глубина воды до 1½ ф. Темп. не выше 20°.

**У. фенестрالیс** (*O. fenestralis*, оконная). Мадагаскаръ. Листья представляютъ собою сѣтку въ 6 до 18 д. длиной и въ 2—4 д. шириной, продолговатой, тупоконечной формы, плавающую тотчасъ надъ поверхностью воды, которая ихъ только покрываетъ. Цв. зеленые, въ августѣ.

**УВЛАЖНЕНЬЕ ВОЗДУХА**. Для благосостоянія растений въ теплицахъ во всякое время года, а въ оранжереяхъ — лѣтомъ, необходимо. Оно производится опрыскиваніемъ водою стѣнъ, полокъ и пола (дорожекъ); при надлежащемъ увлажненіи воздуха нѣжныя растенія могутъ идти хорошо безъ сильнаго провѣтриванія, имъ предупреждается избытокъ испаренія листьями. При отопленіи термосифономъ, трубки его опрыскивать не должно: это вредитъ растеніямъ.

**УВЛАЖАТЬ. УВЛАЖНЯТЬ**. Мочить. Поливать. Дѣлать растенія или землю влажными.

**УВУЛЯРІЯ** (*Uvularia*). *Увуларія* — уменьшительное *uvula* — гортань, по пло-

дамъ. С. лилейныхъ. (5). Сѣв. Америка. Полувыносъ. или выносъ. луков. рр. Песков. глин. дерн. или листов. Дѣленіемъ.

**У. грандифлора** (*U. grandiflora*, крупноцвѣтная). Цв. пурпуровые, въ маѣ. 1 ф. **У. сессилифлора** (*U. sessiliflora*, съ сидящими цв.). Цв. желтоватые, въ июль. 6 д.

**УГОЛЕКЪ ВЪ ОГНѢ**. См. Адонисъ.

**УГЛОВОЙ или ПАЗУШНЫЙ** Выходящій изъ угла, образуемаго листомъ и стеблемъ.

**УГОЛЬ**. Черный остатокъ горѣлаго дерева. *Каменный уголь* — ископаемый допотопный растенія.

**УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ**. Главнѣйшая изъ плотныхъ частей органическихъ тѣлъ; состоитъ изъ углерода. Поглощаетъ газы и составляетъ превосходную часть удобрения, будучи смѣшенъ съ землею въ пропорціи 1/16 части. Кромѣ разрыхленія и способствованія водостоку, замѣчательнъ по своей прочности и нестгиваемости. Вбирая углекислоту и др. газы, онъ отдаетъ ихъ растеніямъ, когда имъ они нужны для питанія. Кусками въ лѣсной орѣхъ его кладутъ въ воду, при выгонкѣ въ ней глицериновыхъ луковичъ. Въ содержаніи орхидей составляетъ необходимую примѣсь къ землѣ.

**УДОБРЕНЬЕ**. Все чѣмъ удобряется земля: навозъ, перегной и разн. искусственные примѣсы. Служитъ для доставленія пищи необходимой, чтобы способствовать развитію рр., поэтому все то, что служитъ, непосредственно или косвенно, къ увеличенію плодородности земли, есть удобрение. Непосредственное вліяніе удобр. состоитъ въ доставленіи р. необходимыхъ питательныхъ веществъ, косвенное же въ дѣйствіи на другія вещества такимъ образомъ, что онѣ превращаются въ полезныя для питанія части. Удобр. могутъ быть органическими и неорганическими. Къ первымъ относятся: кровь, кости, навозъ, рыбы, садовые и огородные отбросы, гуано, роговые части, листья раст., жидкое удобрение, ночное золото, морскія раст., сажа, шерсть и шерстяныя вычески; къ неорганическимъ, употребляемымъ въ садоводствѣ — аммоній и аміакъ, гипсъ, известь, мергель, зола, азотнокислая сода и обыкновенная соль.

**УЖОВНИКЪ**. См. Офіоглоссумъ.

**УЗОРЧАТЫЕ ЦВѢТНИКИ**. Клумбы разной величины, въ которыхъ растенія цвѣтущія или листовныя расположены узоромъ, — по геометрическимъ фигурамъ. Цвѣтники эти считаются самыми красивыми, но и самыми неестественными насажденіями.



**УИЛЬДЮГВЕЯ (Willughbeia).** Френсисъ *Willughbeia* (Willughby), английский натуралист, ученикъ Рея, † 1672. С. кутровыхъ. (10). Тепл. малайскія и восточно-азиатскія куст. цѣлкія рр. Ухоть какъ за Альяманда.

**У. эдулис (W. edulis, съдомая).** Индія. Цв. блѣдно-малиновые, въ іюль; плоды съдомые, формою похожіе на лимонъ. Громадный цѣлкія кустъ.

**УКРОПЪ.** См. Анетумъ

**УКОУСНОЕ ДЕРЕВО.** См. Русъ.

**УЛЕКСЪ (Ulex).** Древне-латинское названіе какого-то кустарника. С. бобовыхъ. (12). З. Европа, С. З. Африка. Полувынос. или вынос. куст. рр. съ колючими вѣтками. Обыкн. сад., черенками или сѣменами.

**У. генистойдесъ (U. genistoides, похожий на Гениста).** Средиземн. побережье. Цв. желтые, въ августъ. 1—3 ф. Сип. *Staurogynus aphyllus* (Staurogynus). **У. нанусъ (U. nanus, низкій).** Англія, Бельгія, Франція. Цв. желтые кистями, съ іюля до сентября. 1—3 ф. **У. европейскаго (U. europaeus, европейскій).** Утесникъ. З. Европа. Цв. желтые, длинныя, душистые, въ февраль-мартъ, потомъ въ августъ-сентябрь. 2—3 ф. Имѣетъ нѣсколько разновидностей, между прочимъ—махровую (флореплено, flore pleno).

**УЛИТКИ (helicea).** Слизни имѣющие известковую витую риковину. Объѣдаютъ почки.

**УЛЛЮКУСЪ (Ullucus).** Мѣстное названіе въ Кито. С. лебедовыхъ. (1). Оранж. или полу-вынос. мясистое трав. р., распространено обильно по горамъ Перу и Боливии и разводимо иногда ради мелкихъ клубней, замѣняющихъ картофель. Легкая; клубнями.

**У. туберозусъ (U. tuberosus, клубневой).** Анды, Ю. Америка. Цв. золотисто-желтые, въ іюнь. 1 ф.

**УЛЬМУСЪ (Ulmus).** Древне-латинское названіе, встречаемое у Виргилия. С. крапивныхъ. (16). С. умѣр. области, въ троп. Азии восходитъ на горы. Вынос. древ. рр. Сильная глубокая песково-гл. дерн. Сѣменами тотчасъ по выплываванію (въ іюль).

**У. американъ (U. americana, американскій).** С. Америка. Лл. продолговатые, овалы; плоды овалы. 80—100 ф. **У. кампестрисъ (U. campestris, полевой).** Вязъ. Европа. Лл. книзу суженныя, плоды обратно-яйцевидные. 125 ф. Имѣетъ много разновидностей. **У. монтана (U. montana, горный).** Ильмъ. Европа. Лл. часто округлыя, дву- и три-зубчатые; плоды—продолговатые летучки. 80—120 ф. Имѣетъ много красивыхъ разновидностей.

**УМБЕЛЬЮЛЯРИЯ (Umbellaria).** Уменьшительное *Umbella*—зонтикъ; по цвѣтрасположенію. С. лавровыхъ. (1). Оранж. древ. или (на горахъ) куст. р., отдѣляющее сильный камфарный запахъ. Ухоть какъ за Лаурусъ.

**У. калифорника (U. californica, калифорнская).** Калифорнія. Цв. зеленоватые, въ іюль; лл. душистые, ланцетовидные. 100 ф. Сип. *Ocotea californica*, *Oreodaphne californica* (*Ocotea californica*, *Oreodaphne californica*).

**УНГНАДИЯ (Ungnadia).** Баронъ фонъ *Ungnad* (Ungnad), введшій конскій каштанъ (эскулюсъ). С. млиовниковыхъ. (1). Полу-вынос. куст. р., похожее на Павія. Не разборчива на почву; отводкой или сѣменами.

**У. специоза (U. speciosa, отъбная).** Техасъ. Цв. малиновые, въ іюль; лл. овально-ланцетовидные.

**УНИОЛІЯ (Uniola).** *Unus*—одинъ, по сросшимся пленкамъ. С. злаковъ. (4). С. Америка. Вынос. или полувынос. многозлаки. Сѣменами.

**У. латифолия (U. latifolia, широколистная).** Цв. продолговатыми колосками, собранными въ рыхлую метелку, въ августъ. 2—4 ф. **У. паникулата (U. paniculata, метельчатая).** Цв. овальными колосками въ метелкѣ. 4—8 ф.

**УНКАРИЯ (Uncaria).** *Uncus*—крючокъ, старые черешки превращаются въ крючковатые нллы. С. мареновыхъ. (30). Троп. Азия, Африка и Америка. Тепл. вьющ. рр. Глин. дерн. съ пескомъ и торф. Черенками въ песокъ, въ парникѣ.

**У. Гамбиеръ (U. Gambier, Гамбиеръ).** Индія. Цв. желтоватые, въ май. 10 ф.

**УНЦИФЕРА (Uncifera).** *Uncus*—крючокъ и *fero*—нести, по крючковатому отростку, къ которому прикрѣплены пылевые массы. С. орхидей. (3). Казія. Тепл. эпифиты. На чуркѣ или въ корзинѣ.

**У. хетероглосса (U. heteroglossa, съ разнообразной губой).** Цв. бѣлые.

**УРАЙТИЯ (Wrightia).** *Urayit* (Wright),—шотландскій врачъ и ботаникъ, † 1827. С. кутровыхъ. (12). Троп. Африка, Азия и Австралія. Тепл. куст. или древ. рр. Торф. съ глин. дерн. и пескомъ. Черенками, въ песокъ, въ парникѣ.

**У. кокцинея (W. coccinea, шарлаховая).** Индія. Цв. темно-красныя, въ іюль. 12 ф. Сип. *Nerium kokkiniu* (*Nerium coccineum*).

**УРАРИЯ (Uraria).** *Ura*—хвостъ, по прицѣвѣтникамъ. С. бобовыхъ. (8). Троп. Азия, Африка и Австралія. Глин. дерн. съ торф. и пескомъ. Черенками въ песокъ, въ парникѣ. Темп. зимой 10—13, лѣтомъ 13—24°.

**У. кринита (U. crinita, волосатая).** Индія. Цв. пурпуровые, въ іюль. Лл. о 3—7 листочкахъ. 3—6 ф. **У. пикта (U. picta, расписная).** Гималай. Филиппинскіе о. Цв. пурпуровые, въ іюль; лл. линейные. 3—6 ф.

**УРГИНЕА (Urginea).** Арабское племя *Ben Urgin* (Ben Urgin) въ Алжиріи. С. линейныхъ (24). Европа, Средиз. побережье и Ю. Африка. Тепл. оранж. или вынос. лукович. рр. Ухоть какъ за Сциллія.

**У. маритима (U. maritima, приморская).** Средиз. побережье. Цв. бѣловатые, осенью. Полувынос. Сип. *U. Scilla*, *Ornithogalum Scilla* (*U. Scilla*, *Ornithogalum Scilla*).

**УРЕХИТЕСЪ (Urechites).** *Oura*—хвостъ и *Echites*—сродный родъ: по завитымъ отросткамъ вѣтника. С. кутровыхъ. (4). Вестиндія и Мексика. Тепл. полукустар. Ухоть какъ за Дипладенія.

**У. субъ-эректа (U. sub-erecta, почти приморская).** Нов. Гренада. Цв. желтые, въ май. Сип. *Dipladenia flava*, *Echites erecta* (*Dipladenia flava*, *Echites erecta*).

**УРОСКИННѢРА (Uroskinnera).** *Ure Skinner*—коллекторъ южно-американскихъ рр. С. порничниковыхъ. (2). Мексика и Центр. Америка. Тепл. трав. рр. Песков. глин. дерн. Черенками въ песокъ, въ парникѣ.

**У. спектабилисъ (U. spectabilis, красивый).** Мексика. Цв. розовато-фіолетовые, въ іюль. 1—1½ ф.

**УРОСПАТА (Urospatha).** *Oura*—хвостъ и *spatha*—чехолъ, по длинному остроконечному чехлу. С. ароидныхъ. (10). Троп. Америка. Тепл. болот. трав. рр. Легкая, глин. дерн. Дѣланемъ.

**У. десципенсъ (U. desciscens, вырождающаяся).** Бразилія. Чехолъ коричневыя, початокъ цилиндрич., короче чехла. Лл. широко-лопастныя, треугольныя. 3 ф. **У. сагиттифолия (U. sagittifolia, со стрѣловидными лл.).** Пара. Чехолъ желтовато-зеленый съ сѣрыми или розовыми крапинками; початокъ зеленый, цилиндрич.; лл. стрѣловидно-копьевидные.

**УРОСПЕРМУМЪ (Urospermum).** *Oura*—хвостъ и *spermum*—сѣмя; по сгнатымъ зерновкамъ. С. сложноцѣтныхъ. (2). Средиземн. побережье. Одно- или двул. вынос. рр. Земля обыкн. Сѣменами.

**У. Далешампіи (U. Dalechampii, Далешампа).** Ю. Европа. Цв. головки желтыя, въ іюль. 1½ ф. Сип. *Argemone Dalechampii* (*Argemone Dalechampii*).

**УРОСИНА (Ursinia).** *Ursinus* (Ursinus) изъ Перенсбурга наисаль, "Arbogatum biblicum", † 1666. С. сложноцѣтныхъ. (54). Оранж. трав. или куст. рр. изъ Ю.

Африки. Глин. дерн. съ торф. Сѣменами или черенками, въ песокъ, въ парникѣ.

**У. критифолия (U. crithmifolia, съ лл. какъ у Критмума).** Цв. головки желтыя, въ іюль. 1—2 ф. Сип. *Sphenogune crithmifolia* (*Sphenogune crithmifolia*). **У. пульхра (U. pulchra, красивая).** Отечество не извѣстно. Цв. головки ярко-оранжевыя, въ іюль и іюль. 1 ф. Однол. Сип. *Sphenogune speciosa* (*Sphenogune speciosa*).

**УРЦЕОЛИНА (Urceolina).** *Urceolus*, маленький кувшинъ, по формѣ цв. покрыва. С. амариллисовыхъ. (3). Анды Ю. Америки Оранж. лукович. рр. Ухоть какъ за Амариллисъ.

**У. латифолия (U. latifolia, широколистная).** Цв. желто-красныя, въ апрѣль. Сип. *Leperezia latifolia* (*Leperezia latifolia*). **У. пендула (U. pendula, пониклая).** Цв. желтыя, пониклыя, въ іюль. Сип. *U. aurea*. *Collania urceolata* (*U. aurea*, *Collania urceolata*).

**УСЪ. УСИБЪ.** Повойные отростки, превратившіеся изъ листьевъ или побѣги стебля (виноградъ, земляника). *Усѣтый, усѣстый*, выражаютъ это свойство.

**УТРО.** Время дня отъ восхода солнца до полудня.

**УТРИКУЛЯРИЯ (Utricularia).** *Utriculus*—мѣшечекъ; по пузырькамъ на лл. и корняхъ. С. пузырчатыхъ. (150), разсыпанныхъ по земной поверхности. Тепл. оранж. и вынос. плавающая, эпифитная и земная рр.

**У. бифида (U. bifida, двуразсѣченная).** Голъ-Конгъ. Цв. ярко-желтые, въ сентябрь. Оранж.-земн. Въ горникахъ съ обыкн. з., подъ водой. **У. Хумбольдтія (U. Humboldtii, Гумбольдта).** Гвѣяна. Цв. синевато-пурпуровые, большіе. Тепл. Въ просторной посудѣ съ торф. з. и мохомъ, поставя посуду въ воду. **У. Эндрессіи (U. Endresii, Эндреса).** Коста-Рика. Цв. съ зеленоватой чашечкой и блѣдно-лиловымъ вѣтникомъ, у котораго желтый зѣвъ, весной. Оранж. Въ подвѣсныхъ корзинкахъ съ волокон. торф. и мохомъ.

**УХВАТЪ.** Часть или отростокъ, который выносея или цѣпляющееся р. ухватывается при возрастаніи.

**УШАСТЫЙ.** Имѣющій ушки—округлыя придатки у листа (напр. обыкн. шалфей, померанца).

**ФАБА (Faba).** Отъ того-же корня, что и *phago*—ѣсть; по съдомымъ сѣменамъ. С. бобовыхъ. Въ настоящее время этотъ родъ слѣтъ съ Видія. Востокъ. Однолѣтнее. Глин. дернов. рыхлая, безъ уваженія. Сѣменами рано весной.



**Ф. вульгарисъ** (*F. vulgaris*, обыкновенная). *Бобы огородные или конские*. По Дендрологическому отечеству—берега Каспийского м. и С. Африка. Цв. белые, съ черно-синими пятнами по срединѣ крыльевъ. 2—3 ф. Въ огородахъ разводятся во многихъ сортахъ, изъ которыхъ наиболѣе распространены *индюрские* белые и зеленые, *мацанъ* и *эффуртские*.

**ФАБИАНА** (*Fabiana*). Испанецъ Франциско *Фабiano* (*Fabiano*) покровитель ботаники. С. пасленовыхъ. (11). Южн. Америка. Оранж. куст. рр. 3. Обыкновен. Черенками изъ взрѣвшаго роста, въ песокъ, въ парникъ, весной.

**Ф. имбриката** (*F. imbricata*, настельная). Чили. Цв. белые, въ маѣ. 3 ф.

**ФАГЕЛІЯ** (*Fagelia*). Каспаръ *Фегелиусъ* (*Fagelius*)—занимавшийся воспитаніемъ рр. С. бобовыхъ. (1). Ю. Америка. Оранж. выш. р. Торф. съ глини. дер. Сѣменами, размоченными прежде въ теплой водѣ и посыпанными въ легкую землю, въ парникъ. Черенками съ мягкой древесной, въ песокъ, подъ стекломъ. Темп. зимой 4—7°.

**Ф. битуминоза** (*F. bituminosa*, смолистая). М. Д. Н. Цв. желтые съ фиолетовыми кончиками, въ апрѣль до сентября.

**ФАГОПИРУМЪ** (*Fagopyrum*). *Phago*—ѣсть и *pyrus*—пшеница. С. гречихныхъ. (2). Азия. Обыкн. Сѣменами, весной.

**Ф. эскулентумъ** (*F. esculentum*, съдомый). *Греча*. Центр. Азия. Цв. розовые. 2—3 ф. Однол. р. воспитываемое въ полѣ.

**ФАГРЕА** (*Fagraea*). Теодоръ *Фатреусъ* (*Fagraeus*)—врачъ и ботаникъ, † 1797. С. люгевыхъ. (30). Малайя. архип. Австралія. О. Тихого ок. Тепл. кустарн. и древ. рр. Глини. дерн. съ торф. и пескомъ. Черенками изъ молодого роса, въ апрѣль, въ песокъ, подъ стекломъ. Темп. 13—22 лѣтомъ и 10—12° зимой.

**Ф. аурикулата** (*F. auriculata*, ушастая). Ява. Эпифитный кустарникъ. Цв. большіе, желтые.

**ФАГУСЪ** (*Fagus*). Старинное названіе Латиняны; вѣроятно отъ *phago*—ѣсть, п. ч. сѣмена употреблялись въ пищу. О. плюсковыхъ. (15). Умѣр. поясы обоихъ полушарій. Песчан. дернов. съ известковой подпочвой, вообще—легкая глини. дерн. Сѣменами, прорѣжанными въ прослойки. Разновидности—прививкой.

**Ф. антарктика** (*F. antarctica*, антарктический). Огненная З. Лл. овальные, тупые. Кустъ съ кривыми вѣтвями. **Ф. бетулоидесъ** (*F. betuloides*, похожий на березу). Огненная Земля. Лл. овальные, тупые, зубчатые. **Ф. сибиратика** (*F. sylvatica*, лѣсной). *Букъ*. Обнимаетъ площадь

треугольника отъ Норвегіи къ Малой Азии и къ Испаніи. Лл. продолговато-овальные съ рѣсчатными краями. 60—100 ф. Имѣетъ нѣсколько разновидностей, самыя важныя изъ нихъ: *аргенто-варіегата* (*argenteo variegata*) съ серебристыми полосками, *аспленифолия*, *гетерофилля инциза* и *кверцифолия* (*asplenifolia*, *heterophylla*, *incisa*, *quercifolia*) съ болѣе или менѣе разсѣченными лл., *аурео-варіегатисъ* (*aureo-variegatus*) съ золотисто-желтыми полосками, *пурпуреа* (*purpurea*) съ темно-пурпуровыми лл. и *пендула* (*pendula*) съ пониклыми вѣтвями. **Ф. ферругинеа** (*F. ferruginea*, ржавчинный). Соед. Амер. Штаты. Лл. овальные, остроконечные, зубчатые. Очень походить на обыкновен. букъ, но съ болѣе узкими лл.

**ФАДАЙНІЯ** (*Fadyenia*). Макс *Фадайнъ* (*Mac Fadyen*)—авторъ флоры Ямайки, † 1850. С. папоротниковъ. (1). Куба. Ямайка. Тепл. папоротникъ содержимый въ вардовомъ ящикѣ.

**Ф. пролифера** (*F. prolifera*, перерослая). Куба и Ямайка. Ван-цѣльны, дихотомическія.

**ФАДИЕНСІЯ** См. Фадайнія.

**ФАЗЕОЛУСЪ** (*Phaseolus*). Названіе заимствованное у Диоскорида: *phaseolus*—означаетъ буквально лодочку. С. бобовыхъ. (60). Жаркая страна земной поверхности. Выющая или распростертая тепл., оранж. или полувынос. одно, либо многол. трав. рр. Уходъ какъ за Фаба или за Долихосъ.

**Ф. вульгарисъ** (*P. vulgaris*, обыкновенный). *Фасоль*. Троп. и умѣр. страны. Цв. различной окраски, обычно белые или лиловые, въ іюнь до сентября. Цѣнное однол. У разновидности *мультифлорусъ* (*multiflorus*), называемой *турецкими бобами*, цв. красные. Стручки и сѣмена—превосходный овощъ. Въ огородничествѣ весьма много сортовъ, раздѣляемыхъ на низкіе и высокіе или коловые, ранніе или поздніе, парниковые или грядковые и пр.

**ФЮЯСЪ** (*Phajus*). *Phaios*—блестящій. (25). Троп. Азия, троп. Африка, Маскаренскіе о. Теплич. земныя или эпифитныя рр. Глини. дерн. съ лѣст. и коровинымъ перегноемъ. Дѣленіемъ луковичны послѣ цвѣтенія.

**Ф. альбусъ** (*P. albus*, белый). Непаль. Цв. белые, губа съ желтымъ дискомъ, по которому красныя жилки. 2 ф. Син. *Тунія алба* (*Thunia alba*). **Ф. Бенсоніе** (*F. Bensonae*, г-жи Бенсонъ). Рангунъ. Цв. розово-пурпуровые, губа съ желтымъ дискомъ. 1 ф. Син. *Тунія Бенсоніе* (*Thunia Bensoniae*). **Ф. биселоръ** (*P. bicolor*, двуцвѣтный). Цейлонъ. Цв. красно-бурые съ розовою, желтою и бѣлою губой. 2 ф. **Ф. Вальди**

**хия** (*P. Wallichii*, Вальхиха). Индія. Цв. желто-оранжевые, губа желтая съ коричневыми вѣномъ, съ марта по май. 4—5 ф. **Ф. грандифолюсъ** (*P. grandifolius*, крупнолистный). Китай, Австралія. Цв. снаружи белые, внутри коричневатые, въ январь до марта. 3 ф. Син. *Блетія Танкервилліе*, *Лимодорумъ Танкервилліе* (*Bletia Tankervilleae*, *Limodorum Tankervilleae*). **Ф. Доджсоніи** (*P. Dodsonii*, Доджсона). Индія. Цв. белые съ основаніемъ губы свѣтло-краснымъ. **Ф. иррогатусъ** (*P. irrogatus*, орошенный). Помѣсь между *Ф. грандифолюсъ* и *Калие* вестита. Цв. белые съ розовыми кончиками, губа винно желтая. **Ф. Маршалліе** (*P. Marshalliae*, Маршалля). Мульмейнъ. Цв. белые, губа въ верхней части желтая, въ іюнь. 2 ф. Син. *Тунія Маршалліе* (*Thunia Marshalliae*). **Ф. туберкулозусъ** (*P. tuberosus*, бугорчатый). Мадагаскаръ. Цв. белые съ желтыми лопастями, по которымъ разбросаны коричневыя пятна.

**ФАКА** (*Phaca*). Древне-греч. названіе какого-то бобового р. С. бобовыхъ. Европа. Многол. вынос. или полувын. трав. рр. Уходъ какъ за Астргалусъ.

**Ф. фригида** (*P. frigida*, холодная). С. Европа. Цв. млечно-бѣлые, въ іюль. 1 ф.

**ФАЛЕНОПСИСЪ** (*Phalaenopsis*). *Phalaena*—ночная бабочка и *opsis*—сходство; по цв. С. орхидей. (20). Малайск. архип. и вост. Индія. Тепл. орхидей, содержимыя въ корзинахъ или на чуркахъ. Торф. мохъ съ небольшо. колич. волоки. торф. и древ. углемъ, поверхъ котор. сажается раст. Размноженіе дѣленіемъ, трудное.

**Ф. амabiliсъ** (*P. amabilis*, пріятный). Ява. Цв. белые, на губѣ желтыя черточки; осенью. **Ф. аметистина** (*P. amethystina*, амethystовый). Зондскіе о. Цв. белые, губа бѣлая съ желтымъ основаніемъ и амethystовою серединою. **Ф. Афродите** (*P. Aphrodite*, Афродита). Манилла. Цв. белые, губы часто съ желтыми, оранжевыми и малиновыми черточками. Имѣетъ нѣсколько формъ. **Ф. Вейчiana** (*P. Veitchiana*, Вейча). Филиппинскіе о. Цв. похожи на цв. **Ф. Шиллерiana**, но мельче и пурпуровые; губа пурпуровая съ белымъ. **Ф. виолacea** (*P. violacea*, фиолетовый). Цв. белые, винзу съ розово-фиолетовымъ отѣнкомъ, губа темно-фиолетовая, съ желтымъ основаніемъ, столбикъ красно-фиолетовый. **Ф. Люддеманниана** (*P. Ludde-manniana*, Люддеманновъ). Филиппинскіе о. Цв. белые съ поперечными коричневыми полосками, а внизу пурпуровыми; губа съ темно-фиолетовою серединою. **Ф. Паріши** (*P. Parishii*, Париша). Бурма. Цв. белые съ пурпуровою губою. Замѣчатель-

ный эпифитъ. **Ф. Рейхенбахiana** (*P. Reichenbachiana*, Рейхенбаховъ). Цв. зеленые съ коричневыми мѣтками; губа съ оранжевыми сторонами и синеватою серединою. **Ф. Сандерiana** (*P. Sanderiana*, Сандера). Цв. розовые, губа бѣлая съ коричневыми и пурпуровыми, а иногда и желтыми черточками. **Ф. спеціоза** (*P. speciosa*, отъишый). Цв. белые съ розовыми, черточками и пятнышками, губа розовая съ двумя желтыми пятнышками. Имѣетъ нѣсколько разновидностей. **Ф. Стюартiana** (*P. Stuartiana*, Стюартовъ). Цв. белые, доли снаружи желтоватые, внутри съ коричневыми пятнышками. **Ф. Шиллерiana** (*P. Schilleriana*, Шиллеровъ). Манилла. Цв. розовые, губа трехлопастная, средняя лопасть бѣлая съ желтыми выступами. **Ф. Эсмеральда** (*P. Esmeralda*, Эсмеральда). Кохинхина. Цв. розовые.

**ФАЛЕРІЯ** (*Phaleria*). *Phaleros*—отдѣчивающій бѣлымъ, по цв. С. ягодковыхъ. (8). Цейлонъ, Малайскій арх. и Австралія. Тепл. или оранж. древ. либо куст. рр. Сильная, легкая глини. дерн. съ волоки. торф. Сѣменами въ парникъ, весной или черенками изъ молодого роста, въ песокъ и парникъ.

**Ф. лаурифолия** (*P. laurifolia*, лавролистная). Цейлонъ. Цв. белые. 6 ф. Тепл.; цв. пахнутъ какъ у Дяфне.

**ФАЛЬКІЯ** (*Falkia*). *Фалкъ* (*Falk*)—по прошенію шведъ, проф. ботаники въ С.-Петербургѣ. С. выюнковыхъ. (4). Юж. Африка. Оранж. трав. рр. Глини. дерн. съ торф. или вообще легкая. Черенками подъ стекломъ, въ парникъ, или дѣленіемъ.

**Ф. репенсъ** (*F. repens*, ползучая). М. Д. Н. Цв. красные, колокольчатые, въ маѣ.

**ФАЛЛЮГІЯ** (*Fallugia*). Фаллюгусъ (*Fallugius*)—флорентинскій ботаникъ 17 стол. С. розановыхъ. (1). Калифорнія, Нов. Мексика. Оранж. куст. р. Легкая, песчан. Черенками и дѣленіемъ.

**Ф. парадокса** (*F. paradoxa*, необычная). Нов. Мексика. Цв. белые, крупныя.

**ФАЛЯРИСЪ** (*Phalaris*). Названіе заимствованное у Диоскорида. С. злаковыхъ. (9). Европа и Средиземное побережье, вѣтъ тропич. Америка, Африка, Австралія. Одно- или многол., оранж. или вынос. трав. рр. Упоминаемый ниже видъ вынос. Обыкновен. садов. Сѣменами или дѣленіемъ.

**Ф. арундинаcea** (*P. arundinacea*, тростниковый). *Тростя*. Съв. умѣр. и азиатч. страны. Цв. метельчатые съ пурпуровымъ отѣнкомъ, въ іюль. 3—5 ф.

**ФАРАМЕА** (*Faramea*). Мѣстное названіе. С. мареновыхъ. (40). Троп. Аме-



рика. Въ садахъ встрѣчается только названный выше видъ, для кот. нужна волокн. торф. съ глин. дерн. и добавкою песку и древесн. угля. Разн. черенками, въ песокъ, подъ стекломъ.

**Ф. одоратиссима** (*F. odoratissima*, самая душистая). Вестиндія. Цв. бѣлые, душистые. такой-же величины, какъ у жасмина. 6 ф.

**ФАРНАЦЕУМЪ** (*Pharnaceum*). *Фарнакс* сынъ Митридата Великаго, разбивъ войско котораго Цезарь возвѣстилъ о побѣдѣ словами: «пришелъ, увидѣлъ, побѣдилъ» (*veni, vidi, vici*). С. деянниковыхъ. (16). Ю. Африка. Одно- или многол. трав. рр. Песков. легкая. Сѣменами и черенками. Темп. зимой 8—12, лѣтомъ 13—22°.

**Ф. инканумъ** (*P. incanum*, бѣлопушистый). Цв. внутри бѣлые, снаружи зеленые, зонтиками, въ маѣ до октября. 6 д.

**ФАРСЕТІЯ** (*Farsetia*). Филиппъ *Фарсети* (*Farseti*)—венеціанскій ботаникъ. С. крестоцвѣтныхъ. (20). Средиземн. побережье, Востокъ, Африка. Сѣв. Индія. Полувыносл. или оранж. травяни. либо полукуст. рр. Песчан. дерн. съ торф. Сѣменами.

**Ф. клипеата** (*F. clypeata*, щитовидная). Ю. Европа. Цв. желтые, въ июлѣ—июлѣ. 1—2 ф.

**ФАРУСЪ** (*Pharus*). *Pharos*—покрышка, по употребленію лл. на кровлю. С. злаковыхъ. (5). Троп. Америка. Тепл. трав. рр., нуждающихся въ такомъ же уходѣ, какъ Бамбуза.

**Ф. латифолюсъ** (*P. latifolius*, широколистный). Ямайка. Цв. въ июлѣ; лл. продолговато-эллиптич. 1½—3 ф. Имѣть разновидности *vitata* (vittata) съ пестрыми лл., — бѣлыми полосками съ ровнымъ отгнѣномъ.

**ФАСОЛЬ**. Турецкіе бобы. См. Фазеолусъ.

**ФАТСІЯ** (*Fatsia*). Такъ наз. одинъ изъ видовъ въ Японіи. С. аралиевыхъ. (3). Японія, Китай, Сѣв. и Зап. Америка. Уходъ какъ за Аралія.

**Ф. папиріфера** (*F. papyrifera*, бумажная). Формоза. Цв. зеленоватыя, лл. 5—7 лопастные. 6—8 ф. Болѣе вѣтра. Сил. *Аралія папиріфера* (*Aralia papyrifera*). **Ф. японика** (*F. japonica*, японская). Японія. Лл. большіе, кожистые, перистовидные, стебель прямой. 3—5 ф. Сил. *Аралія Зибольди*, *А. японика* (*Aralia Sieboldii*, *A. japonica*). Имѣть пестролистныя формы: *variegata* (variegata) съ бѣлою и *var. aurea*—съ ярко-желтою пестротою на лл.

**ФАЦЕЛІЯ** (*Phacelia*). *Phacelos*—пучекъ, по расположенію цв. С. водо-

листныхъ. (50). Зап. часть Сѣв. Америки, Мексика. Чилийскія Анды. Большею частью выносл. одно- или многол. трав. рр. Обыкн. садов. Многол.—дѣленіемъ, однол.—сѣменами.

**Ф. висида** (*P. viscida*, липкая). Калифорнія. Цв. темно-голубые, въ июлѣ. 1 ф. **Ф. Витлэвія** (*P. Whitlavia*, Витлэвія). Калифорнія. Цв. голубые, въ июлѣ. 2 ф.

**ФЕВАЛІУМЪ** (*Rhebaliun*). *Phibale*—мирта, по сходству. С. рутовыхъ. (28). Ю. Австралія, Нов. Зеландія. Оранж. куст. или низко-древ. рр. Песков. торф. 3 ч., песков. глин. дерн. 1 ч. Черенками изъ молодого роста въ песокъ. Темп. зимой 3—7°.

**Ф. скамулозумъ** (*P. squamulosum*, чешуйчатый). Австралія. Цв. желтые, въ маѣ. 2 ф. Сил. *P. ауреумъ* (*P. aureum*).

**ФЕВИЛЬЕА** (*Fevillea*). Луи *Фейлье* (*Fevillee*)—франц. путешественникъ и ботаникъ † 1782. С. тыквенныхъ. (5). Троп. Америка. Тепл. выносл. куст. рр. Песч. глин. дерн. Черенками изъ молодого роста въ песокъ, въ парникъ. Темп. лѣтомъ 14—21, зимой 13—15°.

**Ф. Мурѣи** (*F. Moorei*, Мура). Гвiana. Цв. (извѣстны только мужскіе) красно-кирпичные; лл. широко-овальные.

**ФЕДІЯ** (*Fedia*). *Fedus*—козель, козлы, по запаху р. С. валериановыхъ. (1). Средиземн. побережье. Однолѣт. Садовая. Сѣменами.

**Ф. Корнукопіе** (*F. Cornucopiae*, рогъ изобилія). Ю. Европа. Цв. красные, въ июлѣ. 6 д.

**ФЕДРАНАССА** (*Phaedranassa*). *Phaidros*—веселый и *anassa*—королева; по красотѣ цв. С. амриллисовыхъ. (6). Анды Ю. Америки. Тепл. или оранж., либо полувыносл. лукович. рр. Желтая глин. дерн. Отпрысками.

**Ф. Кармиоли** (*P. Carmioli*, Кармиоли). Коста-Рика. Цв. ярко-красные съ зелеными кончиками. Лл. примы. Тепл. **Ф. Леманни** (*P. Lehmanni*, Леманна). Колумбія. Цв. шарлаховые. Тепл. **Ф. эвкросиодесъ** (*P. eucrosioides*, похожая на Эвкросию). Эквадоръ. Цв. красные, съ зеленой трубкой. Сил. *Lespedeza эвкросиодесъ* (*Lespedeza eucrosioides*). Тепл.

**ФЕЛИПЕА** (*Phelipea*). По семейству *Филипо* (*Philipeaux*), покровителствовавшему Турнефору. С. заразниковыхъ. (2). Восточ. страны. Оранж. трав. рр. живущія паразитами на корняхъ др. рр. До сего времени съ успѣхомъ воспитывалась только.

**Ф. Фоліата** (*P. foliata*, листовенная). Кавказъ. Цв. шарлаховые. Сѣмена высвѣваютъ вмѣстѣ съ Центауреа деальбата

(*Centaurea dealbata*), на кот. Филипеа растетъ, и всходы кот. видѣются въ корни всходовъ Центауреи.

**ФЕЛИЦІЯ** (*Felicia*). *Felix*—счастливый, по красотѣ. С. сложноцвѣтныхъ. (45). Ю. Африка, Абиссинія. Низкорослая полу-кустар., рѣдко трав. однол. оранж. рр. Песчан. торф. Сѣменами и черенками въ песокъ, подъ стекломъ.

**Ф. Фрутикозусъ** (*fruticosus*, кустарная). М. Д. Н. Цв. головки съ пурпуровыми лучевыми и желтыми торовыми цв., въ маѣ. 1—2 ф.

**ФЕЛЬТХЕЙМІЯ** (*Veltheimia*). Графъ Авг. Ферд. *Фельтгеймъ* (*Veltheim*)—нѣмецкій ботаникъ, † 1801. С. лилейныхъ. (3). Ю. Африка. Оранж. луков. рр. Легкая глин. дерн. Отпрысками, которые даютъ въ землѣ дѣтокъ.

**Ф. глаука** (*V. glauca*, сизая). Цв. красные, съ желтыми пятнышками, въ мартѣ. Лл. сизые. **Ф. виридофобія** (*V. viridifolia*, зеленолистая). Цв. красноватые или желтые съ крапинками, въ августѣ. Лл. зеленые, волнистые. Сил. *Алетрисъ капензисъ* (*Alettris capensis*).

**ФЕНИКСЪ** (*Phoenix*). Название, заимствованное у Теофраста. С. пальмъ. (12). Троп. и около-троп. Азія и Африка. Тепл. или оранж. (дактилифера) рр. Сильная волокн. глин. дерн съ ¼ ч. коровьяго перегноя. Сѣменами въ нагрѣтомъ грунтѣ.

**Ф. акаулисъ** (*P. acaulis*, безстебельный). Центр. Индія. Лл. перистые въ 1—3 ф. длинной, нижній перья превращены въ иглы. 12 ф. **Ф. реклината** (*P. reclinata*, согнутый киззу). Ю.-В. Африка. Лл. перистые, перья линейныя, трехугольныя, растопыренныя. 50 ф. **Ф. рупиколя** (*P. guricola*, съ каменстаго мѣста). Индія. Лл. перистые, дугообразные; перья длинныя, на тонкомъ черешкѣ. 15—20 ф. **Ф. сильвѣстрисъ** (*P. sylvestris*, лѣсной). Индія. Лл. перистые, сѣровато-зеленые; длиною въ 7 до 12 ф.; перья многочисленныя. 40 ф. **Ф. тенуисъ** (*P. tenuis*, узкій). Отечество неизвѣстно. Походитъ на Дактилифера, но мельче во всѣхъ частяхъ. Введенъ недавно.

**ФЕНИКУЛОМЪ** (*Foeniculum*). Старинное латинское название С. зонтичныхъ (3). Средиземн. побережье. Одно-, дву- и многолѣт. трав. рр. Рыхлая глин. дерн. Сѣменами.

**Ф. вулгаре** (*C. vulgare*, обыкновенный). *Фенхель*. Юж. Европа. Цв. желтые, лѣтомъ и осенью. Лл. 2 и 3 перистые. Многол. Сил. **Ф. официнале** (*C. officinale*). **Ф. дѣльце** (*C. dulce*, сладкій). *Флорентинскій фенхель*. Ю. Европа. Имѣть сильно разви-

тыя листовлагалища. Двуд. Оба растенія разводятся какъ овощи.

**ФЕНОКОМА** (*Phaenocoma*). *Phaino*—блестѣть и *come*—волось, по оберткѣ. С. сложноцвѣтныхъ. (1). Оранж. куст. рр. Волок. торф. съ рѣчнымъ пескомъ. Черенками изъ молодого бокового роста, вызрѣвшего въ ниж. части, въ умѣр. теплѣ. Темп. зимой 5—7°.

**Ф. пролифера** (*P. prolifera*, перерослая). М. Д. Н. Цв. головки красно-малиновыя, лѣтомъ. 4 ф. Сил. *Ксерантемумъ пролиферумъ*, *Элихризумъ пролиферумъ* (*Xeranthemum proliferum*, *Elichrysium proliferum*).

**ФЕНОЛОГІЯ. ФЕМЕНОСКОПІЯ.** Отъ *phenomenos*—явленіе, *logos*—ученіе и *skopeo*—смотрю. Наблюденіе надъ особенными явленіями въ природѣ, въ частности же надъ временемъ цвѣтенія, плодоношенія и прекращенія развитія растеній.

**ФЕНОСПЕРМА** (*Phaenosperma*). *Phaino*—блестѣть и *sperma*—сѣмя; по сѣменамъ. С. злаковыхъ. (1). Высокій, выносл. злакъ, довольствующійся обыкн. садовою з. и размножаемый сѣменами весной.

**Ф. глобозумъ** (*P. globosum*, съ шаровидными сѣменами). Китай. Цв. большой метелкой. 6 ф.

**ФЕНХЕЛЬ**. См. Феникуломъ.

**ФЕРНАНДЕЦІЯ** (*Fernandezia*). Георгъ Грассіасъ *Фернандесъ*—(*Fernandez*)—испанскій ботаникъ. С. орхидей. Малочисленный родъ эпифитовъ съ сходныхъ и Брассія и требующихъ такого же ухода. Рр. не очень красивыя.

**Ф. робуста** (*F. robusta*, сильная). Гватемала. Цв. ярко-желтые съ красными пятнами, въ маѣ.

**ФЕРНЕЛІЯ** (*Fernelia*). *Фернель* (*Fernel*)—врачъ Генриха II французскаго короля. С. мареновыхъ. (4). Троп. страны. Теплич. куст. рр. Волон. торф. и волон. глин. дерн. съ пескомъ, битыми черенками и древ. углемъ. Черенками изъ концовъ побѣговъ въ песокъ, въ парникъ. Темп. зимой 7—10, лѣтомъ 13—24°.

**Ф. буксифолия** (*F. buxifolia*, съ лл. какъ у Буксуса). О. Маврикія. Цв. и лл. мелкіе. 1—3 ф.

**ФЕРОНІЯ** (*Feronia*). *Феронія*—нимфа лѣсовъ, которой поклонялись древніе Римляне. С. рутовыхъ. (1). Троп. Индія, Ява. Теплич. дерево, близкое къ Цитрусъ. Сѣмѣ изъ глин. дерн. съ торф. и пескомъ. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ песокъ, въ парникъ.

**Ф. элефантумъ** (*F. elephantum*, слоновый). Коромандель. Цв. бѣлые; плоды больш.



шие, въ яблоко, съ зеленоватою кожей; мякоть ихъ съдояма. 30 ф.

**ФЕРРАРИЯ (Ferraria).** *Ferraria* (Ferrari) — итальянский батаник † 1653. Сем. косатиковыхъ. (6). Мысь Д. Н. Полуостр. луков. рр. Песч. дерновъ съ торф. Сѣменами и отпрысками. Рр. рѣдко выше 6 д.

**Ф. ундулата (F. undulata)**, волнистая. Цв. зеленовато-коричневые, въ мартъ—апрѣль. **Ф. феррариоля (F. ferrariola)**, маленькая феррарія. Цв. зеленовато-бурые, въ мав—июнь. Сип. **Ф. антероза (F. anterosa)**.

**ФЕРУЛЯ (Ferula).** Название занм стовоанное у Плиния. С. зонтичныхъ. (60). Юж. Европа, С. Африка, Азия. Садовая, добрая. Сѣменами весной. Трав. многол.

**Ф. аспарагифолія (F. asparagifolia)**, съ лл. похожими на спаржевые). Малая Азия. Цв. желтые. Лл. четыре-перистые. 4—5 ф. **Ф. гдѣука (F. glanduca)**, (сизал). Ю. Европа. Цв. желтые, въ июль. Лл. сложные съ линейными сегментами. Стебель круглый. 6—8 ф. **Ф. коммунасъ (F. communis)**, обыкновенная. Средиземн. побережье. Цв. желтые, въ июль. Лл. сложные съ линейно-шпидовидными сегментами. 8—12 ф. **Ф. тингитана (F. tingitana)**, изъ Танжерна. С. Африка. Цв. желтые, въ июль. Лл. сложные съ продолговато-ланцетовидными сегментами. 6—8 ф.

**ФЕСТУКА (Festuca).** Древне-латинское название вообще соломины. С. злаковъ. (200). По всей земл. поверхности, изъ нихъ до 80—арктич., холодныхъ и умеренныхъ поясовъ. Имѣютъ значеніе сельскохозяйственное, но не садовое. Обыкновен. Сѣменами.

**ФЕТИДИЯ (Foetidia).** *Foetidus* — вонючий, по запаху древесины. С. мирто выхъ. (3). Маскаренские о. Тепл. древ. рр. Ухоть какъ за Густанія.

**Ф. мавриціана (F. mauritiana)**, съ о. Маврикія. О. Маврикія. Цв. безъ лепестковъ, лл. овальные, тупые. 15—20 ф.

**ФИГЕЛИУСЪ (Phygellus).** *Phyga* — побѣга, и *helios* — солнце, — побѣгаютъ солнца. С. поричниковыхъ. (2). Ю. Африка. Оранж. кустар. рр. Легкая, сильная глин. дерн. Сѣменами весной, въ парникѣ; черенками.

**Ф. капензисъ (P. capensis)**, съ Мыса Д. Н.). М. Д. Н. Цв. шарлаховые, лѣтомъ; лл. овально-ланцетовидные. 3 ф.

**ФИЗАЛИСЪ (Physalis).** *Physa physalis* — пузырь, по вздутой чашечкѣ. С. пасленовыхъ. (30). Мексика и С. Америка. Оранж. или вино-л. одно, либо многол. трав. рр. Глин. дер. съ пескомъ Сѣменами и дѣленіемъ. Упоминаемые ниже виды — травяни. многол.

**Ф. Алькекенги (P. Alkekengi)**, жидовскія или песьи вишни). Кавказъ, Китай. Цв. бѣлые съ желтыми пыльниками, въ июль; плоды красные или шарлаховые, чашечка постылая красная. 1 ф. **Ф. перувіяна (P. peruviana)**, перуанскій). Ю. Америка. Цв. бѣлые съ фиолетовыми пыльниками, зрѣлая чашечка бѣдная, въ июль; плоды пурпуровые. Имѣетъ разновидности *violacea* (violacea) съ темнофиолетовыми плодами и *edulis* (edulis) съ желтыми съдоямыми.

**ФИЗИДИУМЪ (Physidium).** *Physa* — пузырь и *eidos* — похоть, по нижней губѣ. С. поричниковыхъ. Малочисленный родъ южно-америк. рр., причисленный теперь къ Ангелоніи. Тепл. трав. или полукуст. рр. Ухоть какъ за Ангелонію.

**Ф. корнигерумъ (P. cornigerum)**, имѣющій рога). Бразилія. Цв. ярко-пурпуровые съ сегментомъ ближайшимъ къ губѣ съ рогообразнымъ отросткомъ: въ августѣ. 1 ф. Однол. Сип. *Angelonia cornigera* (Angelonia cornigera).

**ФИЗИАНТУСЪ (Physianthus).** *Physa* — пузырь и *anthos* — цв. С. ласточкинковыхъ. (13). Тропич. Америка. Тепл. или оранж. вьющ. кустар. или полукуст. рр. Песков. глин. дерн. и вольк. торф. Черенками изъ вѣтвистаго роста, въ парникѣ, или сѣменами, въ парникѣ, весной.

**Ф. альбенсъ (P. albus)**, бѣловатый). Бразилія. Цв. бѣлые съ краснымъ отгиномъ, въ июль. Сип. *Arauca albens* (Arauca albens).

**ФИЗОСИФОНЪ (Physosiphon).** *Physa* — надувать и *siphon* — трубка, по нѣсколько вздутой трубкѣ цв. С. орхидей. (4). Троп. Америка. Тепл. эпифитъ. Ухоть какъ за Плевроталіи.

**Ф. Лоддигесія (P. Loddigesii)**, Лоддигеса). Мексика. Цв. желто-зеленые съ красно-оранжевою верхнею частью, въ июль. **Ф. пунктатусъ (P. punctatus)**, точечный). Богота. Цв. желтовато-зеленоватые съ пурпуровыми крапинками.

**ФИЗОСТЕГИЯ (Physostegia).** *Physa* — пузырь и *stegē* — крышка. С. губоцвѣтныхъ. (3). С. Америка. Виносл. травяни. рр., нуждающіяся въ такомъ же уходѣ, какъ Дракоцефаломъ.

**Ф. виолѣца (P. violacea)**, фиолетовая). Цв. пурпуровые или тѣлесные, въ июль до сентября. 1½—4 ф. Сип. *Dracopcephalum variegatum*, *D. virginianum*. Имѣетъ нѣсколько разновидностей, изъ нихъ заслуживаетъ вниманія *speciosa* (speciosa) съ густыми соцветіями.

**ФИЗОСТЕЛМА (Physostelma).** *Physa* — пузырь и *stelma* — поясъ; по че-

шуйкамъ коронки. С. ласточкинковыхъ. (2). Малайскій архип. Тепл. вьющ. куст. рр. Ухоть какъ за Хойя.

**Ф. Вальчиха (P. Wallichii)**, Валиха). Цв. зеленовато-желтые, въ мав; лл. свѣтлые. Сип. **Ф. кампанулятумъ, Хойя кампанулята (P. campanulatum)**, *Hoia campanulata*.

**ФИЗОХЛІЯНА (Physochlaina).** *Physa* — пузырь и *chlaina* — хламиды, плащъ; по вздутой чашечкѣ. С. пасленовыхъ. (4). Сред. Азия. Виносл. многол. трав. рр. Обыкновен. Сѣменами и черенками.

**Ф. физалойдесъ (P. physaloides)**, похожая на Физалисъ). Сибирь. Цв. фиолетово-пурпуровые, въ апрѣль. 1—1½ ф. Сип. *Xiosydamus physaloides* (Xiosydamus physaloides).

**ФИЗУРУСЪ (Physurus).** *Physa* — пузырь и *oura* — хвостъ, по шпорцѣ. С. орхидей. (20). Жаркія страны Азии и Америки. Тепл. земные орхидеи; ухоть за ними какъ за Анектохилусъ.

**Ф. аргентеусъ (P. argenteus)**, серебряный). Бразилія. Лл. свѣтло-зеленые съ серебряными мѣтками. Держится въ теплицѣ хорошо безъ прикрытія стекломъ. Сип. *Anectochilus argenteus* (Anectochilus argenteus). **Ф. нобилисъ (P. nobilis)**, благородный). Бразилія. Лл. овальные, темно-зеленые съ серебряными жилками. Сип. *Anectochilus nobilis* (Anectochilus nobilis). **Ф. пиктусъ (P. pictus)**, расписной). Бразилія. Лл. широкіе съ черно-зеленымъ краемъ и серебристою продольною полоскою по срединѣ, отъ которой идетъ свѣтъ серебряныхъ жилокъ. Сип. *Anectochilus pictus*, *Microchilus pictus* (Anectochilus pictus, Microchilus pictus).

**ФИКУСЪ (Ficus).** Древне-латинское название смоквы. С. крапивныхъ. (600). Преимущ. тропич. страны. Теплич. или оранж. древесн. или куст. рр. Торфъ съ глин. дерн. Отводкой и черенками съ обсушенными отрѣзками, не отнимая листьевъ, въ песокъ, въ парникѣ.

**Ф. барбата (F. barbata)**, бородачатый). Остиндія. Лл. сердцевидные съ вытянутымъ концомъ, съ коричневыми по краямъ волосками. **Ф. Брассія (F. Brassii)**, Брасія). Сiera-Леоне. Лл. скрипичеобразные, стебли и черенки ржавые. **Ф. деальбата (F. dealbata)**, бѣловатый). Перу. Лл. эллиптически, широкіе, кожистые, на нижней сторонѣ съ волосками, отчего она бѣлая. **Ф. диверсифолія (F. diversifolia)**, разнолиственный). Оранж. видъ. Лл. на верху округлые, внизу суженные; верхн. сторона съ коричневыми пятнышками, нижняя — бѣлая. **Ф. Карика (F. Carica)**, каріекий). Средиземн. побережье. Обыкн. *Смока или Фига*. Лл.

ланцевидные, почти трехлопастные. Имѣетъ много культурныхъ формъ. **Ф. Купери (F. Cooperi)**, Купера). Австралія. Лл. овальные. Хорошее орнамент. р. **Ф. макрофилля (F. macrophylla)**, крупнолиственный). Куинслендъ и Нов. южн. Валлисъ. Лл. продолговатые съ сердцевиднымъ основаниемъ. Оранж. р. **Ф. Парселли (F. Parcelli)**, Парселя). Полинезія. Лл. продолговатые, остроконечные съ темно-зелеными и бѣлыми пятнами. **Ф. стипулята (F. stipulata)**, съ прилистниками). Японія. Лл. мелкіе, округлые; р. цѣльное. Сип. **Ф. репенсъ и Ф. сканденсъ (F. repens, F. scandens)**. **Ф. Шовьері (F. Chauvieri)**, Шовьера). Лл. тупо-овальные, темно зеленые съ желтыми жилками. **Ф. эбурнея (F. eburnea)**, какъ слопава кость). Индія. Лл. продолговато-овальные, съ бѣлыми жилками и черенками. **Ф. эскюльпта (F. exscripta)**, вѣтвистой). Ост. южн. Океана. Лл. ланцетовидные съ вѣтвистыми лопастями, которые въ свою очередь вѣтвисты. **Ф. эластича (F. elastica)**, упругій). Остиндія. Лл. кожистые, широкіе; верхн. сторона темно-зеленая, нижняя — желтоватая. Въ природѣ изъ него извлекается каучукъ. Имѣетъ разновидность *foliis aureo-marginatis* (foliis aureo-marginatis) съ золотистыми краями у лл.

**ФИЛЕЗИЯ (Philesia).** *Phileo* — любить, по красивымъ цв. С. лилейныхъ. (1). Оранж. куст. р. Торф. Корень побѣгами. **Ф. буксифолія (P. buxifolia)**, съ лл. какъ у Буксеуса). Чили. Цв. красные, одиночные, въ июль. 4 ф.

**ФИЛИДРОВЫЯ рр. (phylodraceae).** Очень малочисленное сем. травянистыхъ рр., встрѣчаемыхъ въ Австраліи, Вост. Азии и на ос. малай-каго архипелага и Тихаго океана. Видовъ только восемь, а родовъ три: Гельмгольція, Притцелія и Филидрумъ.

**ФЙЛИДРУМЪ (Phylidrum).** *Phileo* — любить и *hydor* — вода. С. филидровыхъ. (1). Оранж. двухлѣт. р. не представляющее особаго садоваго значенія. Песков. глин. дер. съ торф. Сѣменами въ теплѣ. **Ф. ланугинозумъ (P. lanuginosum)**, перстистый). Троп. Азия, Австралія. Цв. желтые, въ июль. 2—3 ф.

**ФЙЛИКА (Phyllica).** *Phyllicas* — листовный; по обильной листьѣ. С. крупнолистныхъ. (65). Ю. Африка, Тристамъ Акунья, Мадагаскаръ. Оранж. куст. рр. Песков. торф. Черенками изъ ползвѣлаго роста, въ теплицѣ.

**Ф. плюмоза скварроза (P. plumosa var. squarrosa)**, Ф. перистая шершавая). Цв. бѣлые, головками, въ августъ—ноябрь; лл. линейные, нижняя ихъ сторона шершавая. 2 ф. Сип. **Ф. пубесценсъ (P. pubescens)**.

**ФИЛОДЕНДРОНЪ (Philoden-**



dron). *Phileo*—любить и *dendron*—дерево, по древесному росту нѣк. видовъ. С. аронейныхъ. (20). Троп. Америка. Теплолюбивый куст. или дерев. рр. Глн. дерн. съ торф. или листовою, съ добавлением песка. Двѣняемъ ствола частями о двухъ узлахъ и посадкою въ горшки, на сильно пагрѣтомъ мѣстѣ. Слишкомъ высокіе экз. срѣзаются и верхняя часть втыкается въ горшокъ, гдѣ она вскорѣ прирастаетъ безъ хлопотъ.

**Ф. веррукозумъ** (*P. verrucosum*, бородавчатый). Экваторъ. Лл. сердцевидные, атласные съ металлическимъ оливковымъ отливомъ на верхней сторонѣ. Одинъ изъ лучшихъ видовъ. Снн. *Ф. dagueuse*, *Ф. Кардери*, *Ф. Линдери* (*P. dagueuse*, *P. Carderi*, *P. Lindeni*). **Ф. Вильямси** (*P. Williamsii*, Уильямса). Багн. Чехолъ внутри желтый; лл. стрѣловидные, остроконечные. **Ф. грандифолиумъ** (*P. grandifolium*, большелистный). Демерара. Цв. изъ трепины при основаніи черенка, сначала блѣдно-зеленые, потомъ розоватые; початокъ внизу зеленый, сверху блѣлый; въ апрѣлѣ. Лл. сердцевидно-стрѣловидные; стебель цѣпкій, съ пурпуровыми пятнами. **Ф. крассионервиумъ** (*P. crassinervium*, съ толстыми жилками). Чехолъ блѣдно-желтый, съ красными пятнами, въ маѣ. Лл. широко-ланцетовидные, съ красными краями. Стебель знач. длинн. **Ф. Мамей** (*P. Mamei*, Мама). Экваторъ. Лл. большіе сердцевидные съ бѣлыми разводами **Ф. меланохризумъ** (*P. melanochrysium*, золотисто-черный). Колумбія. Лл. темно-зеленые, глянцевитые съ золотистымъ отливомъ. **Ф. пиннатифидумъ рубро-пунктатумъ** (*P. pinnatifidum rubro-punctatum*, перисто-разсѣченный съ красными крапинками). Ю. Бразилія. Чехолъ блѣлый съ кроваво-красными черточками, въ маѣ; лл. стрѣловидно-овальные, перисторазсѣченные, съ закривленными лопастями; стебли нѣтъ. **Ф. сангвинеумъ** (*P. sanguineum*, кровавый). Мексика. Чехолъ зеленый; лл. удлиненно-сердцевидные, трехлопастные, иногда на нижней сторонѣ пурпуровые. Цѣпкій. **Ф. Селлоумъ** (*P. Sellowii*, Селло). Чехолъ темно-зеленый съ бѣлымъ краемъ; лл. длинно-овальные, двуперисторазсѣченные съ двумя нижними просто перисторазсѣченными лопастями. Стебель даетъ вводящые корни. **Ф. эубесценсъ** (*P. eubescens*, красноватый). Чехолъ внутри шарлаховый, снаружи темно-пурпуровый; лл. между сердцевидными и стрѣловидными съ пурпуровыми внизу влагаллисами.

**ФИЛОТЕКА** (*Philotheca*). *Philos*—гладкій и *theke*—влагище, по гладкимъ тычинкамъ. С. рутовыхъ. (2). Вѣв. троп. и вост. тропич. Австралія. Оранж. куст. рр. Уходъ какъ за Феладіумъ.

**Ф. аустралисъ** (*P. australis*, южная). Цв. блѣдно-красные, въ апрѣлѣ. 2 ф.

**ФИЛЬДИЯ** (*Fieldia*). Баронъ *Фильди* (*Field*)—пѣвца судья верховнаго суда въ Нов. южн. Валлисѣ. С. гесперійныхъ. (1). В. Австралія. Оранж. вьющ. кустарн. р. Смѣсь изъ торф. съ глн. дерн., пескомъ и дерев. углемъ. Черенками изъ арѣлыхъ боковыхъ побѣговъ, въ песокъ, подъ стекломъ.

**Ф. аустралисъ** (*F. australis*, австралийская). Цв. бѣлые, въ іюлѣ.

**ФИЛЬИВЕРТИЯ** (*Philibertia*). *Филлиберти* (*Philibert*)—авторъ печальныхъ руководствъ по ботаникѣ. С. ласотичниковыхъ. (30). Троп. Америка. Теплолюбивый оранж. вьющ. куст. рр. Глн. дерн. съ торф. и пескомъ. Черенками въ песокъ, въ умѣр. парникѣ.

**Ф. грацилисъ** (*P. gracilis*, пѣвца). Буеносъ-Айресъ. Цв. желтоватые снаружи, пестрые, красные внутри, въ октябрѣ. Оранж. полу-куст.

**ФИЛЛИСЪ** (*Phyllis*). *Phyllon*—листъ, вся красота р.—въ листѣ. С. мареновыхъ. (1). Оранж. куст. р. Черноземъ. Черенками, въ песокъ, подъ стекломъ.

**Ф. Нобля** (*P. Nobla*, Нобля). Мадера, Канарскіе о. Цв. бѣлые, въ іюлѣ. 3 ф.

**ФИЛЛОДОЦЕ** (*Phyllodoce*). Название нимфы, упоминаемой Виргиліемъ, и производимое отъ *phyllon*—листъ и *dokein*—блестѣть. С. вересковыхъ. (3). Гористыя и холодныя страны Европы, Азии и Сѣв. Америки. Выносл. маленькіе кустарнички. Торф. Отводкой.

**Ф. таксифолия** (*P. taxifolia*, съ лл. какъ у Тиссы). Европа, С. Америка. Цв. лиловые, въ маѣ. 2 ф. Снн. *Ф. цѣррелл*, *Менциезія цѣррелла* (*P. coerulea*, *Menziesia coerulea*).

**ФИЛЛОКАКТУСЪ** (*Phyllocactus*). *Phyllon*—листъ и *Cactus*—кактусъ, по листовидному стеблю. С. кактусовыхъ. (13). Троп. Америка отъ Мексики до Перу. Тепло. рр. Уходъ какъ за Эпифиллумъ.

**Ф. Аккермани** (*P. Ackermannii*, Аккермана). Мексика. Цв. ярко-карминовые, лѣтомъ; стебель плоскій. **Ф. ангулигеръ** (*P. anguliger*, угловатый). Мексика. Лепестки бѣлые, доли оранжевыя или желтыя, въ октябрѣ. Стебли съ глубокими углами. **Ф. крепатусъ** (*P. crenatus*, зазубренный). Гондурасъ. Цв. млечно-бѣлые, очень душистые; стебель плоскій, зазубренный. **Ф. латифронсъ** (*P. latifrons*, широко-стелебный). Мексика. Цв. большіе, бѣлые, доли красныя, стебли плоскіе съ глубокими зубцами. 8—10 ф. Снн. *Цереусъ латифронсъ*, *Ц. окситеталусъ* (*Cereus latifrons*, *C. oxitetalus*).

*frons*, *C. oxypetalus*. **Ф. фильантоидесъ** (*P. phyllanthoides*, похожий на Фильянтусъ). Мексика. Цв. розоватые съ неправильными бѣлыми черточками, въ іюлѣ. Стебель плоскій. Снн. *Кактусъ фильантоидесъ*, *К. специозусъ* (*Cactus phyllanthoides*, *C. speciosus*).

**ФИЛЛОКЛЯДУСЪ** (*Phyllocladus*). *Phyllon*—листъ и *klados*—вѣтвь; по листамъ. С. хвойныхъ. (4). Тасманія, Нов. Зеландія, Борнео. Оранж. куст. и дерев. рр. Глн. дерн. Черенками изъ вырѣзаннаго роста, въ песокъ, подъ стекломъ, весной; до образованія наплыва не держать въ большомъ теплѣ.

**Ф. ромбоидалисъ** (*P. rhomboidalis*, ромбоидальный). Нов. Зеландія. Лл. мелкіе, шиловидные; листовыя вѣточки капповидныя или ромбоидальныя. 60 ф. Снн. *Подокарпусъ аспленифолиусъ* (*Podocarpus asplenifolius*).

**ФИЛЛОСТАХИСЪ** (*Phyllostachys*). *Phyllon*—листъ и *stachys*—колосъ; вѣточки имѣютъ лл. С. злаковыхъ. (5). Китай, Японія. Древовидные оранжер. злаки. Уходъ какъ за Бамбузомъ.

**Ф. нигра** (*P. nigra*, черный). Лл. линейноланцетов., соломина весьма твердая и крѣпкая, до 45 ф. Снн. *Бамбуза нигра* (*Bambusa nigra*).

**ФИЛЛОТА** (*Phyllota*). *Phyllon*—листъ, *ous, otis*—ухо, по формѣ лл. С. бобовыхъ. (6). Австралія. Оранж. куст. рр. Уходъ какъ за Пультенелъ.

**Ф. филикойдесъ** (*P. phyllicoides*, похожая на Филику). Цв. желтые, въ маѣ. 2 ф. Снн. *Ф. аспера*, *Ф. хомоза*, *Ф. скавррррза* (*P. aspera*, *P. comosa*, *P. squarrosa*).

**ФИЛЛЯГАТИСЪ** (*Phyllagatis*). *Phyllon*—листъ и *agathos*—божественный; по красотѣ лл. С. черноустовыхъ. (2). Малайскій полуост. и остр. Тепло. куст. Троф. съ пескомъ и небольшимъ колич. листовой. Черенками изъ лл. въ тепло. парникѣ.

**Ф. гимнанта** (*P. gymnantha*, съ голыми цв.). Борнео. Цв. малиновые; лл. овальные; стебель короткій. **Ф. ротундифолия** (*P. rotundifolia*, круглолистный). Суматра. Цв. малиновые, въ іюлѣ; лл. большіе, округлые, темнаго металлически-зеленаго цв. съ краснымъ отливомъ, нижняя сторона темно-красная. 1—2 ф.

**ФИЛЛЯНТУСЪ** (*Phyllanthus*). *Phyllon*—листъ и *anthos*—цвѣтокъ, у нѣк. видовъ цв. вырастаютъ изъ краевъ лл. С. молочайныхъ. (450). Тропич. и рѣдко умѣр. страны. Тепло. трав. кустар. или дерев. рр. Песков. глн. дерн. съ волоки. торф. толченаямъ кирпичемъ, дерев. углемъ и сухимъ коровьимъ навозомъ. Черенками изъ вырѣзаннаго роста, въ песокъ,

въ парникѣ. Темп. зимой 8—10°, лѣтомъ 13—24°.

**Ф. пальлидофидіусъ** (*P. pallidifolius*, съ блѣдно-зелеными лл.). Ява. Цв. желтые съ краснымъ основаніемъ, лѣтомъ; лл. широкіе, продолговатые. Снн. *Рендия глянцисценсъ* (*Reidia glaucescens*). **Ф. Шантриери** (*P. Chantrieri*, Шанриера). Кохинхина. Цв. красные съ желтыми волосками; лѣтомъ; вѣтви подъ примымъ угломъ къ стеблю, такъ что кажутся перистоллистными.

**ФИЛЛЯРТТРОНЪ** (*Phyllarthron*). *Phyllon*—листъ и *arthros*—суставъ, по прилистникамъ, считавшимся за суставы лист. черенка. С. биннионійныхъ. (5). Мадагаскаръ. Тепло. дерев. рр. Песков. глн. дер. или волок. торф. съ небольшо. кол. листовой и дерев. углѣ. Черенками изъ боковаго роста въ песокъ, въ парникѣ.

**Ф. Вейеріана** (*P. Bojeriana*, Бофе). Цв. малиновые, въ іюлѣ. Настоящихъ лл. нѣтъ, ихъ замѣняетъ растяженіе черенка. 3 ф. Снн. *Артрофиллумъ мадагаскаріензе* (*Arthrophyllum madagascariense*).

**ФИЛЛИРЕА** (*Phillyrea*). *Philyra*—такъ называлъ Теофрастъ бирючину. С. маслиновыхъ. (4). Полу-выкосл. куст. р. со Средиземнаго побережья и Востока. Глн. дерн. съ пескомъ. Черенками и прививкой на бирючину.

**Ф. Вильморіаниа** (*P. Vilmoriniana*, Вильморена). Малая Азія. Цв. бѣловатые. Въ садахъ извѣстна подъ назв. *Ф. лаури-фолія* (*P. laurifolia*). **Ф. медія** (*P. media*, средняя). Ю. Европа. Цв. бѣлые въ маѣ. 10—15 ф. Имѣетъ нѣсколько разновидностей, отличающихся по лл.

**ФИЛЯГЕРІЯ** (*Philageria*). Сочетаніе родовыхъ названій *Филезія* и *Ляпагерія*. С. лилейныхъ. (1). Полувыносл. раст. произведенное Вйчемъ отъ помѣси Филягерія буксифилія (*Philageria buxifolia*) съ Ляпагерія альба (*Lapageria alba*) и похоже болѣе на женскаго производителя (Ляпагерію). лл. промежуточной формы, но напоминающіе болѣе мужскаго производителя, цвѣты ближе къ женскому производителю. Торф. въ оранж. Въ декоративномъ отношеніи не особенно важно.

**Ф. Вейччи** (*P. Veitchii*, Вейча). Цв. одиночные. розово-пурпуровые; лл. продолговатые, остроконечные.

**ФИЛАДЕЛЬФУСЪ** (*Philadelphus*). Древнегреческое названіе, обозначающее братскую любовь. С. камнеломковыхъ. (20). Сред. Европа, умѣр. С. Америка, Японія, Гималайскія горы. Выносл. оранж. куст. рр. Всякая добрая земля. Цвѣтутъ на ростѣ прошлаго года, поэтому послѣ цвѣтенія цвѣтнія вѣтки срѣзаютъ, чтобы вызвать свѣжій ростъ, для образованія



цв. въ будущемъ году. Побѣгами, отводкой, черенками.

**Ф. Гордоніанусъ** (P. Gordonianus, Гордона). С.-З. Америка. Цв. бѣлые, безъ запаха, въ июль. 10 ф. **Ф. грандифлорусъ** (P. grandiflorus, крупноцвѣтный). Ю. Соед. Шт. Цв. бѣлые, крупные, пахучіе, въ июль 6—10 ф. Сил. **Ф. специозусъ** (P. speciosus). Имѣетъ разновидность **Лаксусъ** (laxus) съ цв. по трп. 4—6 ф.; изъ С. Америки **Ф. индодорусъ** (P. inodorus, безъ запаха). Горы Виргиніи. Цв. крупныя, одиночныя или по 3, въ июль. 4—6 ф. **Ф. коронаріусъ** (P. coronarius, вѣнчанный). **Воздушный** или **садовый Жасминъ**. **Цубушиникъ**. Ю. Европа. Цв. бѣлые съ сильнымъ запахомъ померанцовыхъ цв., въ май—июнь. 2—10 ф. Имѣетъ нѣсколько формъ.

**ФИНЕА** (Phinaea). Анаграмъ Niphaea, съ которымъ родъ имѣетъ сходство. С. гесперійскихъ. (4). Ю. Америка. Тепл. трав. пр. Ухожь какъ за Ахменесъ.

**Ф. альбо-линеата** (P. albo-lineata, съ бѣлыми полосками). Нов. Гренада. Цв. бѣлые, въ сентябрь; 9 д. **Ф. рубида** (P. rubida, красноватая). Гватемала. Цв. бѣлые, въ июль. 6 д. Все р. покрыто красноватыми волосками.

**ФИСТАШКОВОЕ ДЕРЕВО**. См. Пистація.

**ФИТЕВМА** (Phyteuma) Древне-греч. названіе растенія вообще. С. колокольчиковыхъ. (50). Европа по Средиземн. побережью, умѣр. Азія. Выносилъ или полувывосилъ. многол. трав. пр. Глин. дер. съ пескомъ. Сѣменами или дѣленіемъ весной.

**Ф. сомозумъ** (P. somosum, кустистая). Южн. Тироль. Цв. голубые или пурпуровые, выносу вадутые, въ июль. 3—6 д. **Ф. хумиле** (P. humile, низкорослая). Швейцарія. Цв. голубые, головками. въ июль. 3 д.

**ФИТЕЛЕФАСЪ** (Phytelephas). *Phyton*—растеніе и *elephas*—слонъ, по сѣмени, которое извѣстно подъ названіемъ растительной слоновой кости. С. пальмы. (3). Перу и Нов. Гренада. Тепл. пальмы. Сильной глин. дерн. 2 ч. и торф. и песку по 1 ч. Сѣменами. Темп. зимой 8—12°, лѣтомъ 15—24°. Сильная поливка, лучшій дренажъ.

**Ф. макрокάρпа** (P. macrosarpa, крупноплодный). Нов. Гренада. Лл. перистые, въ 15—20 ф. длинной, перья очень длинныя. 6 ф. Въ плодъ 6—9 орѣшковъ.

**ФИТОЛЯККА** (Phytolacca). *Phyton*—растеніе и *lac*—лакъ; по красному соку въ плодахъ. С. лаконосовыхъ (10). Троп. Америка, Африка и Азія. Тепл., оранже. и выносил. кустар. или древ. пр.

Песков. глин. дерн. съ листовою. Сѣменами и черенками лѣтомъ.

**Ф. декандра** (P. decandra, съ десятию тычинками). **Лаконосъ**. Ю. Америка. Цв. бѣлые, лѣтомъ; ягоды пурпуровыя съ краснымъ сокомъ; корень большой, ядовитый. 3—10 ф.

**ФИТТОНІЯ** (Fittonia). Э. и С. *Фиттонъ* (Fitton)—авторы ботан. сочиненій. С. акантовыхъ. (2). Перу. Тепл. пр. Сильная песчан. дерн. съ торф. Черенками изъ полу-зрѣлаго роста въ песч. дерн. въ парникѣ. Темп. лѣтомъ 13—21, зимой 6—10°.

**Ф. Верскаффельтіи** (F. Verschaffeltii, Верскаффельта). Лл. темно-зеленыя, съ темно-красными жилками. Сил. **Ф. рубро-пёраумъ** и **Ф. рубровенозумъ** (F. rubroperatum, F. rubrovenosum) **Ф. гигантеа** (F. gigantea, гигантская). Лл. широко-овальныя съ карминовыми жилками; цв. блѣдно-красныя.

**ФИЦРОЙЯ** (Fitzroya). Кап. англійскаго флота **Р. Фитрой** (K. Fitzroy, С. хвойныхъ. (2). Ю. Чили, Патагонія, Тасманія. Оранже. древ. пр. Глин. дерн. съ пескомъ. Сѣменами и черенками изъ полу-зрѣлаго роста.

**Ф. Арчери** (F. Archeri, Арчера). Тасманія. Лл. плотно-черепичатые, тупые, толстые. Приморскій кустъ. Сил. **Дисельма Арчери** (Diselma Archeri). **Ф. патагоніка** (F. patagonica, патагонская). Патагонія. Лл. мелкія, овально-удлиненныя, тупые, дву- или четырехрядныя. Дерево.

**ФИШЕРІЯ** (Fischeria). **Фишеръ** (Fischer), быв. директоръ Сиб. ботан. сада, извѣстный ботаникъ. С. восточниковыхъ. (12). Троп. Америка. Тепл. вьющ. куст пр. Глин. дерн. съ торф. Черенками въ легкой з., въ теплѣ.

**Ф. хиспида** (F. hispida, волосистая). Бразилія. Цв. коричневыя, зонтикомъ, въ июль. 4 ф.

**ФИЯЛКА НОЧНАЯ; Ф. ОСЕННЯЯ**. См. Хесперисъ.

**ФИЯЛКОВЫЯ** пр. (violarineae). Широко-распространенныя трав. или кустар. пр., первыя—по умѣреннымъ, вторыя—по тропическимъ странамъ. Въ сѣмьствѣ 240 видовъ, распредѣленныхъ по 21 роду, изъ которыхъ въ садахъ наибольше извѣстны Виола, Соважезія и Химантера.

**ФЛИНДЕРСИЯ** (Flindersia). **Флиндерсъ** (Flinders),—капитанъ англ. флота, изслѣдовавшій берега Австраліи. С. ясенковыхъ (4). Троп. Австралія и Молуккскія о. Тепл. или оранже. куст. пр. Глин. дерн. съ торф. Черенками съ оставленными лл., въ песокъ, въ парникѣ. Темп. зимой 3—7°.

**Ф. аустралис** (F. australis, австралійская). Кунислендъ. Цв. бѣлые, мелкіе, въ май. 60 ф. Оранже.

**ФЛОГАКАНТУСЪ** (Phlogacanthus). *Phlox*, *phlogos*—пламя и *acanthus*—акантусъ. С. акантовыхъ. (12). Гималайскія горы. Мартобангъ. Тепл. трав. или куст. пр. Ухожь какъ за Юстиція.

**Ф. асперулюсъ** (P. asperulus, жестко-ватый). Ассамъ, Казія. Цв. красно-пурпуровые, въ январь. 3 ф. **Ф. курвифлорусъ** (P. curviflorus, кривоцвѣтный). Горы Казія. Цв. желтоватыя, въ ноябрь. 3—6 ф.

**ФЛОКСЪ** (Phlox). *Phlox*—пламя, по яркости цв. С. сипюнныхъ. (27). С. Америка, Россійская Азія, Вынос. одно- или многол. трав., либо полу-куст. пр. Песков. глин. дерн. съ торф. Сѣменами, черенками и дѣленіемъ.

**Ф. амёна** (P. amoena, красивый). Виргинія до Флориды. Цв. пурпуровые или малиновыя, рѣдко бѣлые, въ июль. Стебель приподнимающийся. 6—15 д. Сил. **Ф. пилоса амёна** (P. pilosa amoena). **Ф. глядберрима** (P. glaberrima, очень гладкій). Огайо до Флориды. Цв. красныя, ползучицами, въ июль. 1—2 ф. **Ф. дивариката** (P. divaricata, раскидистый). С. Америка. Цв. блѣдно-лиловые или розоватыя, весной или рано лѣтомъ. 9—16 д. Сил. **Ф. канадэнзисъ** (P. canadensis). **Ф. Друммондii** (P. Drummondii, Друммондъ). Техасъ. Цв. красныя, переходящіе въ розовыя, пурпуровые или бѣлые съ темнымъ глазкомъ, въ августъ. 1 ф. Полувын. однол. Имѣетъ много разнообразныхъ разновидностей. **Ф. макулята** (P. maculata, пятнистый). Пенсильванія, Iowa, Флорида. Цв. типическія пурпуровыя, пахучіе, въ июль. 2 ф. Имѣетъ нѣсколько формъ назыв. *пирамидальс* (pyramidalis); разновидности его и **Ф. паникулата** въ каталогахъ ставятся въ отдѣлъ *декуссата* (decussata). Сил. **Ф. лонгифлора** и **суаебленсъ** (P. longiflora et suaveolens). **Ф. овата** (P. ovata, съ яйцевидными лл.). С. Америка. Цв. красновато-пурпуровые, весной. Назыв. тоже **Ф. трифлора**. **Ф. паникулата** (P. paniculata, метельчатый). Соед. Америк. Штаты. Цв. малиново-пурпуровые, переходящіе въ бѣлые, большими метелками, въ августъ. 3—4 ф. Назыв. тоже **кордата**, **коримбоза** и **скабра** (P. cordata, P. corymbosa, P. scabra). **Ф. пилоса** (P. pilosa, пушистый). Каролина. Цв. малиновыя, пурпуровыя, розовыя, или бѣлые, въ май. 1—2 ф. **Ф. рептансъ** (P. reptans, ползучій). Аллеганская область. Цв. пурпуровые или фиолетовые, весной. Стебель ползучій. Сил. **Ф. красифолия**, **Ф. столонифера** (P. crassifolia, P. stolonifera). **Ф. субулата** (P. subulata, съ шиловидными лл.). Ю. Нов. Юркъ до Фло-

риды. Цв. розоватыя съ темной серединой; въ апрѣль—май. Лл. шиловидныя. Сил. **Ф. сетacea** (P. setacea).

Разновидностей флокса чрезвычайно много; онѣ увеличиваются ежегодно. Въ садахъ ихъ обычно дѣлятъ на *поздно цвѣтущіе* (decussata, decussata) и *рано цвѣтущіи* (suffruticosa, suffruticosa). Каждый отдѣлъ подраздѣляется по колерамъ и росту. Разновидности Ф. Друммондii воспроизводятся вѣрно сѣменами.

**ФЛОМИСЪ** (Flomis). Древне-греческое названіе, заимствованное у Dioscorida. С. губоцвѣтныхъ. (70). Умѣр. и гористыя страны Азіи, Средиз. побережье. Полу-выносил. или выносил. трав. или полукуст., либо куст. пр. Глин. дерн. съ пескомъ. Сѣменами, черенками и дѣленіемъ. Уном. пр.—многолѣтняя, полувывн.

**Ф. кашмеріана** (P. cashmeriana, кашмирская). Кашмиръ. Цв. блѣдно-лиловые, въ июль. 2 ф. **Ф. ферругінеа** (P. ferruginea, ржавый). Италія, Критъ. Цв. желтые, въ июль. 2—3 ф. **Ф. фругікоза** (P. fruticosa, кустарный). Средиземн. побережья. Цв. желтые, въ июль. 2—4 ф. Выносилъ въ умѣр. климатъ. **Ф. херба-венти** (P. herba-venti,—перекати поле; железникъ). Ю. Европа. Цв. фиолетово-пурпуровые, съ июня до сентября. 1—1½ ф.

**ФЛОРА**. Растительность извѣстной мѣстности. Совокупность растеній Книга содержащая описаніе ихъ.

**ФЛЮГГЕА** (Flueggea). *Fluome* (Flucgge)—нѣмцкій криптологъ. С. молочайныхъ. (6). Троп. страны вост. полушарія. Тепл. кустар. пр. Сильная перегонная, во влажной теплицѣ, Черенками.

**Ф. лейкопирусъ** (F. leucopurus, блѣдноплодная). Остиндія. Цв. безлепестныя, ягоды бѣлыя, съдымыя.

**ФЛЯВЕРІЯ** (Flaveria). *Flavus*—желтый,—въ Чили пр. красятъ въ желтый цвѣтъ. С. сложноцвѣтныхъ. (7). Южн. Америка, Австралія. Оранже. трав. пр. Песч. дернов. Сѣменами въ теплѣ.

**Ф. контрайерба** (F. contrayerba, противуглистная). Перу. Цв. головки желтыя, съ іюля до сентября. 1½ ф.

**ФЛЯКЪРТІЯ** (Flacourtia). **Флакургъ** (Flacourt)—директоръ франц. Остиндской компаніи, † 1661. С. бикесовыхъ. (12). Жаркія страны Азіи и Африки. Тепл. многол. съ бѣлыми цв. и съдымыми плодами. Торф. съ глин. дерн. Черенками изъ полу-зрѣлаго роста, въ апрѣль, въ песокъ, въ парн. Темп. зимой 8—10, лѣтомъ 13—24°.

**Ф. катафракта** (F. cataphracta, во всеоружіи). Остиндія. 4 ф.

**ФОЛИДОКАРПУСЪ** (Pholidocarpus). *Pholis*, *pholidos*—чешуя и *karpus*—



плодь, по чешуйчатому плоду. С. пальмъ. (2). Малайск. архип. Тепл. пр. Глин. дер. съ листовою.

**Ф. Ихуръ** (P. Ihur, Ихуръ). Лл. какъ у Борассусъ флябельлиформисъ; плоды 3—4 сѣменами.

**ФОЛИДОТА** (Pholidota). *Pholis* — чешуя *ous*, *otis* — ухо; по придѣлнкамъ. С. орхидей. (20). Индія, Малайск. архип. до юж. Китая. Уходъ какъ за Целогине.

**Ф. имбриката** (P. imbricata, настельная). Остиндія. Цв. желтоватые съ фиолетовымъ пятномъ. 1 ф.

**ФОНАРИКЪ НАЛИВНОЙ**. Ранній сортъ наливнаго яблока длинной формы, средняго размѣра, хорошаго вкуса.

**ФОНТАНЕСІЯ** (Fonsanesia). Рене Дефонтанъ (Desfontaines) — франц. ботаникъ. С. маслинныхъ. (1). Востокъ. Оранж. кустарникъ, похожій на бирючину. Глин. дерн. съ пескомъ. Черенками осенью, или прививкой на бирючину.

**Ф. филлигериоидесъ** (P. phillygerioides, похожая на Филлигею). Сирія. Цв. желтоватые, въ августѣ. 14 ф.

**ФОРМИУМЪ** (Phormium). *Phormos* — корзина; по употребленію волокна р. С. лилейныхъ. (2). Нов. Зеландія. Оранжер. трав. пр. Сильная глин. дерн. Дѣленіемъ весной, передъ началомъ роста, также сѣменами.

**Ф. Кукианумъ** (P. Cookianum, Куковъ). Цв. желтые, лѣтомъ; лл. болѣе острые, чѣмъ у Ф. тенаксъ, мечевидные, жесткіе. 2—3 ф. Спн. **Ф. Коленсои**, **Ф. Форстеріанумъ** (P. Colensoi, P. Forsterianum). Имѣетъ пестролистную форму, — *variegatum* (variegatum). **Ф. тенаксъ** (P. tenax, крѣпкій). **Новозеландскій ленъ**. Цв. желтые или красные, въ августѣ. Лл. длиною въ 3 до 6 ф. жесткіе, темно-зеленые съ коричневымъ краемъ, старые съ расколотымъ концомъ. Имѣетъ нѣсколько разновидностей, отличающихся листьями.

**ФОРРЕСТІЯ** (Forrestia). *Forrestia* (Forrest) — англійскій ботаникъ XVII ст. С. коммелиновыхъ. (7). Троп. Африка, Остиндія, Малайск. архип. Тепл. мног. пр. Уходъ какъ за Коммелина.

**Ф. Хукера** (F. Hookeri, Хукера). Малайск. Архип. Цв. пурпуровые. 3 ф.

**ФОРСИТІЯ** (Forsythia). У. *Forsythia* (Forsyth) — придвор. садов. въ Кенсингтонѣ, авторъ нѣсколькихъ сочиненій по садоводству. † 1804. С. маслинныхъ. (2). Китай, Японія. Оранж. или воздушн. куст. пр. Уходъ какъ за Фонтанесіей.

**Ф. виридиссима** (P. viridissima, очень зеленая). Японія. Цв. желтые, многочисленныя, въ мартѣ. 10 ф. **Ф. суспенса** (F. suspensa, пониклая). Японія и Китай. Цв. желтые. Р. можетъ цвѣтѣть по стѣнѣ. Въ

садахъ назыв. **Ф. Форчунъ** и **Ф. Зибольди** (F. Fortunei, F. Sieboldii).

**ФОРСИТІЯ**. См. Форсиція.

**ФОСЕРГИЛЬЯ** (Fothergilla). *Fothergilla* (Fothergill) — извѣстный врачъ и покровитель ботаники. С. двоюбѣстниковыхъ. (1). Сѣв. Америка. Выносливое или полувынос. куст. р. Песчан. торф. Сѣменами, а разновидностей — отводкой.

**Ф. альнифолия** (F. alnifolia, съ лл. какъ у ольхи). С.-В. Америка. Цв. бѣлые, пахучіе, въ апрѣлѣ—маѣ. 3—6 ф. Имѣетъ нѣсколько разновидностей.

**ФОТЕРГИЛЬЯ**. См. Фосергилья.

**ФОТИНІЯ** (Photinia). *Photinos* — блестящій, по лл. С. розановыхъ. (20). Оранж. куст. или дерев. пр. съ гористыхъ мѣстъ Индіи, Китая и Калифорніи. Легкая глин. дерн., но не плотная. Черенками изъ бокового роста, въ песокъ, подъ стекломъ и прививкой къ айвѣ.

**Ф. серрулата** (P. serrulata, зубчатая). Китай, Японія. Цв. бѣлые, мелкіе, въ маѣ—іюнѣ. 10—20 ф. Спн. **Кратегусъ глѣбра** (Crataegus glabra). **Ф. японика** (P. japonica, японская). Японія. Цв. бѣлые, осенью: лл. жесткіе, снизу пушистые; плоды въ видѣ яблока красно-оранжевы. цв. 10—20 ф.

**ФРАГАРИЯ** (Fragaria). *Fraga* — того же корня, что *Fragrans* — благоуханный, по хорошему запаху плодовъ. С. розановыхъ. (4). Европа, Азія, о. Вурбонъ, Непаль. Многоч. трав. пр., размножающаяся отпрысками (плетями). Глубокая глин. дерн. Сѣменами и отпрысками.

**Ф. вѣска** (F. vesca, съѣдомая). *Земляника лѣсная*. Цв. бѣлые, въ апрѣлѣ—маѣ; лл. снизу пушистые. 6—12 д. У разновид. *монофилла* (monophylla, однолистной, альпійской), плоды крупныя. **Ф. виргиніана** (F. virginiana, виргинская). С. Америка. Цв. бѣлые, въ апрѣлѣ; плоды темно-красныя. 1 ф. **Ф. индика** (F. indica, индійская). Индія, Японія. Цв. золотисто-желтые съ мая до октября, плоды красныя, безвкусныя. Оранж. цвѣтующеся р. **Ф. чилѣнзисъ** (F. chilensis, чилийская). Южн. Америка. Цв. бѣлые; цв. ножки толстыя, пушистыя, въ апрѣлѣ—маѣ. Плоды — ровные съ бѣлою мякотью. 1 ф. У разновидности *грандифлора* (grandiflora, крупноцвѣтная) плоды красныя. **Ф. элзандоръ** (F. elatior, высокая). *Клубника*. Европа. Цв. бѣлые, въ апрѣлѣ—маѣ; лл. и сверху и снизу пушистые. 1 ф.

Помѣси съ чилийской образовали тотъ рядъ формъ, который теперь разводятъ въ садахъ.

**ФРАЗЕРА**. См. Фрезера.

**ФРАКСИНУСЪ** (Fraxinus). Ставленное латинское названіе. С. Америка.

Глин. дерн. съ пескомъ. Сѣменами, а разновидностей — прививкой.

**Ф. американа** (F. americana, американскій). Вост. Соед. Ам. Штаты. Цв. бѣлые, въ апрѣлѣ—маѣ. Лл. съ 2 или 4 парами овальныхъ, острокопечныхъ сегментовъ. 30—40 ф. Спн. *аккумулята*, *альба*, *Куртисіи*, *эпиптеръ* и *голландифолия* (F. acuminata, alba, Curtisii, epiptera, juglandifolia) **Ф. экцельсиоръ** (F. excelsior, высочій). Ясень. Европа. Цв. зеленоватые, въ мартѣ—апрѣлѣ. Лл. о 5—6 паряхъ продолговато-ланцетов. зубчатыхъ сегментовъ. 30—80 ф. Имѣетъ весьма много разновидностей и формъ.

**ФРАНКЕНІЕВЫЯ** пр. (frankeniasae). Малочисленное сем. трав. или полукуст. пр. принадлежащихъ къ одному только роду, — Франкенія. Вяды широко раскинулись по умирнымъ и теплымъ странамъ. Въ садовомъ отношеніи значенія не имѣютъ.

**ФРАНКЕНІЯ** (Frankenia). *Frankenia* (Frankenius) — проф. ботаники въ Упсаль † 1661. С. франкеніевыхъ. (20). Европа, Востокъ, С. и Ю. Африка, Америка, Австралія. Выносливая или полувынос. многол. пр. Песчан. глин. дерн. съ торф. Дѣленіемъ.

**Ф. лѣвисъ** (F. laevis, гладкая). З. Европа. Цв. тѣсные, въ іюлѣ. 6 д. **Ф. пульверулента** (F. pulverulenta, порошистая). Ю. Европа. Цв. красныя, въ іюлѣ. 3 д.

**ФРАНКОА** (Francoa). *Франко* (Franco) — испанскій врачъ и ботаникъ XVI стол. С. камнеломковыхъ. (3). Чили. Оранж., или полувынос. многол. трав. пр. Сѣменами въ парникѣ, или оранжереѣ. Песчанистая глин. дерн.

**Ф. аппендикулата** (F. appendiculata, съ придатками). Цв. блѣдно-красныя, въ іюлѣ. 2 ф. **Ф. рамоза** (F. ramosa, вѣтвистая). Цв. бѣлые въ іюлѣ. 2—3 ф. **Ф. сонхифолия** (F. sonchifolia, съ лл. какъ у Истода). Цв. малиновые, въ іюлѣ. 2 ф.

**ФРЕЗЕРА** (Fraseria). *Фрезеръ* (Fraser) — англ. коллекторъ с.-американскихъ пр. С. горечавковыхъ. (7). С.-З. Америка. Вынос. многол. трав. пр. Обыкновен. садов. Сѣменами и дѣленіемъ.

**Ф. Вальтера** (F. Walteri, Вальтера). Каролина. Цв. желтые, въ іюлѣ. 3—6 ф.

**ФРЕЗІЯ** (Freesia). Происхожденіе названія неизвѣстно. (3). Ю. Африка. Оранж. луковичн. пр. Сѣменами въ легкой песчан. землѣ, въ парникѣ. Цв. пахучіе.

**Ф. Лейхтлинъ** (F. Leichtlinii, Лейхтлинъ). М. Д. Н. Цв. желтые или цвѣта сливочнаго масла. 1 ф.

**ФРЕЙСИНЕТІЯ** (Freycinetia).

*Фрейсинетъ* (Freycinet) — французскій адмиралъ, кругосвѣтныя плаватели. С. пандусовыхъ. (30). В. тропич. Азія, Малайск. архип., троп. Австралія и о. Тихаго океана. Тепл. цѣпкія деревья пр. Песчан. дерновая. Отпрысками.

**Ф. Банксіи** (F. Banksii, Банкса). Нов. Зеландія. Цв. колосыми, окруженными бѣлыми придѣлнками. Плоды съѣдомыя.

**ФРЕЛИХІЯ** (Froelichia). *Фрѣлихъ* (Froelich) — нѣмецкій ботаникъ, † 1841. С. амарантовыхъ. (10). Теплыя страны Америки, — отъ Техаса до Ю. Бразиліи. Одно- и мног. травяни. пр. Песчан. глин. дер. съ листов. Сѣменами, въ теплѣ.

**Ф. флоридана** (F. floridana, пѣзъ Флориды). Ю. Соед. Штаты. Цв. бѣлые, пушистые. 6 д. до 3 ф.

**ФРЕМОНТІЯ** (Fremontia). *Фремонтъ* (Fremont) — полковникъ американскихъ войскъ. С. мальвовыхъ. (1). Калифорнія. Кустар. полу-вынос. р. Песчан. глин. дерн. Черенками весной, подъ рамами, и сѣменами.

**Ф. калифорника** (F. californica, калифорнская). Цв. ярко-желтые, въ апрѣлѣ. 6—10 ф.

**ФРИМА** (Phryma). Происхожденіе названія неизвѣстно. С. вербеновыхъ. (1). Вынос. многол. трав., не особенно красиво. Земля всякая. Сѣменами и дѣленіемъ.

**Ф. лептостакхія** (P. leptostachya, лептостакхія). Сред. Азія. Сѣв. Америка. Цв. пурпуровые, колосыми, въ августѣ. 2—4 ф.

**ФРИНІУМЪ** (Phrynium). *Phrynios* — лягушка, по произрастанію въ болотахъ. С. лилейныхъ. (20). Остиндія, Малайск. архип., троп. Африка. Тепл. мног. трав. пр. Уходъ какъ за Калатея.

**Ф. сангвинеумъ** (P. sanguineum, кроваво-красная). Отечество неизвѣстно. Цв. кроваво-красныя, зимой и весной. Лл. продолговатые, на нижней сторонѣ ярко-пурпуровые, на короткихъ черешкахъ. Стебли нѣтъ.

**ФРИСІЯ** (Friesia). *Фрисъ* (Fries) — извѣстный криптологъ. С. лилейныхъ. (1). Австралія Оранж. куст. Волокнист. торф. съ глин. дерн. Черенками въ песокъ. Темп. зимой 3—6°.

**Ф. педункуларисъ** (F. peduncularis, черешчатая). Ванъ-Диемова земля. Цв. бѣлые, въ сентябрѣ. 3—6 ф.

**ФРИТИЛЬЯРИЯ** (Fritillaria). *Фритиллъ* — шахматная доска. С. лилейныхъ. (50). Европа, Азія, Америка. Выносливыя луковичн. пр. Сильная рыхлая, на хорошемъ водосточъ слоѣ. Съ мелкими луковичками лучше содержатъ въ горшкахъ и держать зиму въ защитѣ. Размнож. от-



прыскамі. Полезно вообще на зиму луковицы вынимать, когда завянут листья.

**Ф. армена** (F. armena, армянская). Грузія. Цв. белые, одиночные. 6 д. **Ф. грёка** (F. graeca, греческая). Греція. Цв. одиночные или по два, ржаво-коричневые, в марте—апрель. 6 д. **Ф. дельфиниэзис** (F. delphinensis, из Дюфине). Ю. Европа. Цв. тускло-пурпуровые с желтыми пятнами. 6—12 д. **Ф. имперіаліс** (F. imperialis, императорская). Цв. различ. окраски, — от желтой до карминовой, колечками, в апрель. 3 ф. Имѣет много разновидностей. **Ф. лютеа** (F. lutea, желтая). Кавказ. Цв. желтые с пурпуровым оттенком, в апрель—май. 6 д. до 1 ф. **Ф. макрофилла** (F. macrophylla, крупно-лиственная). Миссури. Цв. розовые, в апрель до июня. 3 ф. **Ф. мелеагріс** (F. Meleagris, фазанья). *Раб-чикъ*. Европа от 3. до Кавказа. Цв. клѣтчатые блѣдно и темно-пурпурные, в апрель. 1 ф. Есть блѣлая форма. **Ф. паллидо-флора** (F. pallidiflora, с блѣдными цвѣтами). Сибирь. Цв. желтые с красивыми внутри клѣтками) 9 д. **Ф. персика** (F. persica, персидская). Персія. Цв. темно-фіолетовые, довольно мелкіе, с легким запахом. 3 ф. **Ф. пудика** (F. pudica, стыдливая). С.-З. Америка. Цв. темно-желтые, в май 6—9 д. **Ф. пиренейка** (F. pyrenaica, пиренейская). Горы южн. Франціи и св. Італіи. Цв. темно пурпуровые, крупныя, в июнь. 1½ ф. **Ф. рекурва** (F. recurva, отвороченная). Калифорніа. Цв. ярко-шарлаховые, в май. 2 ф. **Ф. тенелля** (F. tenella, тонкая). Приморскія Альпы. Цв. желтоватые с коричнево-пурпуровыми клѣтками, в апрель. Снп. **Ф. монтана** (montana). **Ф. тулипи-фолія** (F. tulipifolia, с л. какъ у Тюльпана). Кавказ. Цв. сизо-голубые, в мартъ.

**ФРИЗИЯ**. См. Фрисія.

**ФУГОРИЯ** (Fugoria). Б. *Cienfuegos* (Cienfuegos)—испанскій ботаникъ XVI ст. С. мальвовыхъ. (12). Троп. Америка. Австралія, Африка. Тепл. куст. рр. Темп. лѣтомъ 13—20, зимой 6—10°. Торф. съ глин. дерн. и частію песку. Черенками в апрель—май, в парникъ.

**Ф. кунейформис** (F. cuneiformis, с клиновиднымъ л.). Зап. Австралія. Цв. красныя, в июнь до августа. 15 ф. Снп. *Хибискусъ кунейформис* и *Лагуарія кунейформис* (Hibiscus cuneiformis, Lagunaria cuneiformis). **Ф. хакеа-фолія** (F. hakeaefolia, с л. какъ у Хакеа). Южн. Австралія. Цв. лилово-пурпуровые, в августъ. 8—10 ф. Снп. *Хибискусъ хакеа-фоліус* и *Х. мультифидус* (Hibiscus hakeaefolius, H. multifidus). **Ф. хетеро-филля** (F. heterophylla, разно-листной).

Ю. Америка. Цв. желтые с пурпуровыми погонками. 3 ф. Снп. *Редутеа хетеро-филля* (Redoutea heterophylla).

**ФУМАРИЯ** (Fumaria). *Гитис*—дымъ, по неприятному запаху р. С. дыминокъ. (40). Европа, Востокъ, Африка, Средиземн. побережье. Одно-, рѣдко многол., травян. рр. иногда выходящая. Обыкн. садов. Съ-менами весной.

**Ф. капреолія** (F. capreolata, с ухват-тами). Европа, Азія. Цв. бѣловатые с темно-пурпуровымъ оттенкомъ, с мая до сентября.

**ФУОПСИСЪ** (Phuopsis). *Опис*—похожесть и *Риу*—растѣіе Фу; похожій на Фу. С. мареновыхъ. (1). Выносл. многол. р. Уходъ какъ за Круцианелля.

**Ф. стиліоза** (P. stilosa, с длиннымъ стол-бикомъ). Кавказ. Цв. малиновые, в июль. 1 ф.

**ФУРКРЕА** (Furcraea). *Фуркруа* (Fourcroy)—знам. франц. химикъ, † 1809. С. амариллисовыхъ. (15). Троп. Америка. Оранж. или тепл. рр. по уходу сходныя съ Атаве.

**Ф. Бедингхаузіи** (F. Bedinghansii, Бединггауза). Мексика. Цв. зеленоватые. Стволъ 3 ф. Снп. *Рейлія рейлі*, *Юска ари-рофилля*, *Ю. Парматіери*, *Ю. Тонеліана* (Roeslia regia, Yucca argyrophylla, Y. Parmentieri, Y. Tonellana). **Ф. гигантеа** (F. gigantea, гигантская). Ю. Америка. Цв. внутри бѣлые, снаружи зеленоватые; стволъ 2—4 ф. Снп. **Ф. фетидіа** (F. foetida). **Ф. кубен-зисъ** (F. cubensis, с о. Кубы). Троп. Америка. Цв. зеленоватые, осенью. **Ф. донгёва** (F. longaeva, продолжительно живущая). Мексика. Цв. бѣловатые. Стебель 3—4 ф., а в природѣ 40 ф. **Ф. ундулята** (F. undulata, волнистая). Мексика. Цв. зеленоватые, в ноябрь. Стебель 10 ф. **Ф. эле-гансъ** (F. elegans, нарядный). Мексика. Цв. зеленоватые. Р. безстебельное. Снп. **Ф. Гисбрэгтіи**, **Ф. пугиниформис** (F. Ghiesbreghtii, F. Puginiformis).

**ФУРКЬЕРА** (Fourquieria). П. *Фурке* (Fourquier)—француз. врачъ. С. тамарисо-выхъ. (3). Мексика. Тепло-оранж. куст. р. Песч. глин. дер. съ торф. Черенками в парникъ.

**Ф. формоза** (F. formosa, великолѣп-ная). Цв. шарлаховые. 6—10 ф.

**ФУНКІЯ** (Funkia). *Функъ* (Funk)—пѣмекскій ботаникъ. С. лилейныхъ. (6). Японія, Китай. Выносл. травян. рр. Глу-бокая хорошо удобренная з. Дѣленіемъ осенью.

**Ф. грандифлора** (F. grandiflora, круп-ноцвѣтная). Японія. Цв. бѣлые, пахучіе, с июля до сентября. Л. овальные съ сердцевидн. основаніемъ Снп. **Ф. японика** (F. japonica). **Ф. Зибольдіана** (F. Siebol-

diana, Зибольда), Японія. Цв. бѣлые, с лиловымъ оттенкомъ. Л. узкие, широко сердцевидно-овальные. **Ф. овата** (F. ovata, с яйцевидн. л.). Японія. С. Китай. В. Си-бирь. Цв. голубоватые или бѣлые, в май. Л. овальные. Снп. *Хемерокаллис цѣру-леа* (Hemerocallis coerulea). Разновид. *мар-гината* (marginata) имѣетъ листья съ бѣ-лою каймой. **Ф. субкордата** (F. subcorda-та, с почти сердцевидными л.). Японія. Цв. бѣлые, в августъ; л. сердцевидно-овальные. Снп. *Хемерокаллис альба*, *Х. плантагинеа*, *Х. кордата*, *Х. японика* (Hemerocallis alba, H. plantaginea, H. cor-data, H. japonica).

**ФУНДУКЪ**. См. Лѣщина.

**ФУНТЬ**. Мѣра вѣса въ 32 лота или 96 золот.

**ФУТЬ**. Мѣра длины: 12 дюйм., седь-мал доля сажени.

**ФУХСІЯ** (Fuchsia). Леонардъ *Фухсъ* (Fuchs)—пѣмекскій ботаникъ. С. она-гриковыхъ. (50). Центр. и южн. Америка, пренн. в Чили, Мексикѣ и Перу. Дрв. или куст. оранж. рр. зимующія в умѣр. Европѣ на воздухѣ. Плот. глин. дерн. 4 ч., хорошаго перекопъ ¼, листо-вой ¼. Съ-менами, черенками.

**Ф. апелата** (F. apelata, безлестная). Перу. Чашечка красная, вѣнчикъ блѣдно-желтый. 1—2 ф. **Ф. боливіана** (F. bolivi-ana, болівійская). Боливія. Цв. ярко-кар-минные. 2—3 ф. **Ф. депенденсъ** (F. de-pendens, пониклая). Чили. Чаш. свѣтло-шарлаховая, вѣнч. шарлаховый, лѣтомъ. 2—4 ф. **Ф. кораллина** (F. corallina, коралловая). Перу. Чаш. малиновая, вѣнч. фіолетовый; вѣтки красныя. 20 ф. **Ф. ко-римбифлора** (F. corymbiflora, с цв. в полусферич. кѣ). Перу. Цв. шарлаховые, лѣтомъ. 4—6 ф. **Ф. макростема** (F. macrostema, с большими тычинками). Чили. Чаш. шарлаховая, вѣнч. пурпуровый, с июля до октября. 6—12 ф. Имѣетъ нѣсколько разновидностей. **Ф. микрофилля** (F. microphylla, мелколистная). Мексика. Чашеч-ка шарлаховая, вѣнчикъ темно-красный, осенью. 2 ф. **Ф. пендулифлора** (F. pen-duliflora, с пониклыми цв.). Троп. Америка. Цв. ярко-малиновые, в мартъ. **Ф. прокумбенсъ** (F. procumbens, распро-стерта). Нов. Зеландія. Цв. мелкіе, трубча желтоватая, верх. часть отвороченная голу-бая, ягоды яркаго свѣтло-розоваго цвѣта. **Ф. симпликаулис** (F. simplicaulis, не-вѣтвистая). Перу. Цв. шарлахово-розовые, в октябрь. **Ф. спленденсъ** (F. splendens, великолѣпная). Мексика. Цв. шарлаховые с зеленымъ, рано лѣтомъ. 6 ф. **Ф. тими-фолія** (F. thymifolia, с л. какъ у ти-муса). Мексика. Цв. красныя, лѣтомъ. 4—6 ф. **Ф. трифилля** (F. triphylla, трех-

листной). Вестиндія. Цв. красно-шарлахо-вые. 1—2 ф. **Ф. фўльгенсъ** (F. fulgens, блѣстательный). Мексика. Цв. шарлаховые. 4—6 ф. Кроме названныхъ, въ садахъ воспитывается множество разновидностей съ простыми и махровыми цвѣтами.

**ХАВЕНАРИЯ** (Habenaria). *Habena*—ремень; по длинной ремневидной шпор-цѣ. С. орхидей. (400). Умѣр. и жаркія страны. Тенлич., оранж. и выносливыя земл. орхидей, значившіяся прежде въ родахъ *Гимнаденія*, *Платантера*, *Фил-лостазисъ* и *Целоглоссумъ*. Уходъ какъ за Ветіи. Поименованные ниже виды, кромѣ послѣдняго—выносливы.

**Х. блефариглотиіс** (H. blephariglot-itis). С. Америка. Цв. бѣлые, бахромчатые. в май—июнь. **Х. кристата** (H. cristata, гребенчатая). С. Америка. Цв. золотисто-желтые, поздней весной. 1 ф. **Х. псикодесъ** (H. psycodes, душистая). С. Америка. Цв. розовые и малиновые, пахучіе. **Х. фимбриата** (H. fimbriata, бахромчатая). С. Америка. Цв. крупныя, лилово-пурпуро-вые, лѣтомъ. **Х. хеллеборина** (H. helle-borina, напоминающая Хеллеборусъ). Сьерра Леоне. Цв. тѣлесные, в сентябрь. Р. теплолюбное. Снп. *Хеллофія хеллеборина* (Eu-luphia helleborina).

**ХАБЕРЛЕЯ** (Haberlea). *Хаберле* (Haberle)—проф. ботаники въ Пестѣ, † 1831. С. геснерійныхъ. (1). Румелія. Полувыносл. многол. трав. р. Песчан. глин. дерн. съ добавленіемъ торфяной. Съ-мена-ми и дѣленіемъ.

**Х. родопензисъ** (H. rhodopensis, с родопскихъ горъ). Цв. блѣднолиловые, в апрель. 4—6 д.

**ХАВЛИЦІЯ** (Hablitzia). Фонтъ *Хаб-лицъ* (von Hablitz)—пѣмекскій писатель и путешественникъ. С. лебедовыхъ. (1). Кавказ. Высоко-выносеяса трав. р. Обыкн. садовая. Съ-менами и дѣленіемъ.

**Х. тамнойдесъ** (H. thamnoides, похожа на Тамнусъ). Цв. зеленые, мелкіе, с июля до октября.

**ХАКЕА** (Hakea). Баронъ *Хаке* (Hake) пѣмекскій покровитель ботаники. С. про-тейныхъ. (95). Австралія. Оранж. кустарн. рр. Торф. 2 ч., глин. дерн. 1 ч. съ до-бавленіемъ песку, черенковъ и дрв. угля. Черенками изъ молодого роста, хо-рошо вырѣзаннаго. Темп. зимой 2—6°.

**Х. дактилоидесъ** (H. dactyloides, по-хожа на палець). Цв. бѣлые, в июль. 7 ф. Снп. *Конциумъ дактилоидесъ* (Conchium dactyloides). **Х. кукульята** (H. cucullata, клубучковая). Цв. красныя, в июнь. 6—8 ф. **Х. нѣтида** (H. nitida, блестящая). Цв. бѣлые, в июнь. 6—8 ф. **Х. суаве-ленсъ** (H. suaveolens, душистая). Цв. бѣлые,



льтомъ. 4 ф. Сип. *X. pectinata* (H. pectinata).

**ХАКЕТІЯ** (Hackelia). *Хакет* (Balthasar Hacket)—авторъ *Plantae alpinae carolinae*, † 1816. С. зонтичныхъ. (1). Европа. Альпійское травян. многол. р. Плотн. глин. дерн. Дѣленіемъ передъ началомъ роста.

*X. эрипактисъ* (H. eripactis, эрипактисъ). Цв. желтые, весной. 3—6 д.

**ХАВОРСІЯ** (Haworthia). *Хаворс* (Haworth)—наѣстный авторитетъ по сочнымъ рр., † 1833. С. лилейныхъ. (60) Южн. Африка и Ангола. Оранж. сочные рр. Уходъ какъ за Алоэ.

*X. арахноидесъ* (H. arachnoides, паутиная). Лл. продолговато-ланцетовидные, блѣднозеленые. *X. маргаритифера* (H. margaritifera, жемчужная). Лл. дельтовидно-ланцетовидные, по обѣимъ сторонамъ съ бѣлыми бугорками.

**ХАЛЕЗІЯ** (Halesia). Ст. *Хальс* (Hales)—авторъ «Vegetable Statics». С. стираксовыхъ (6). С. Америка, Китай, Японія. Оранж. деревца. Песчанистая, глубокая. Черенками изъ корней, весной или осенью, отводками.

*X. тетраптера* (H. tetraptera, четырехкрылая). С. Америка. Цв. бѣлые, весной. 15—20 ф. *X. хиспида* (H. hispida, волосатая). Японія. Цв. бѣлые. Сип. *Птеростираксъ хисpidумъ* (Pterostyrax hispidum).

**ХАЛИМОДЕНДРОНЪ** (Halimodendron). *Халимон*—морской и *дендрон*—дерево; растение встречается по сухимъ солончакамъ азиатской Россіи С. бобовыхъ. (1). Кустарн. р. Песч. Сѣменами, черенками и отводками.

*X. аргентеумъ* (H. argenteum, серебристый). *Жидовникъ*. *Цемикъ*. Цв. пурпуровые, довольно большіе, въ маѣ до іюля. 4—6.

**ХАЛКИДОНСКОЕ ЯБЛОКО**. Поздній сортъ, крупной величины, формою схожій съ апортомъ, темнозеленаго цвѣта съ румянцемъ, довольно пріятнаго кисло-сладкаго вкуса.

**ХАЛЬДЕРІЯ** (Halleria). *Халлеръ* (Haller)—авторъ «Stirpes helveticae» и др. С. поричниковыхъ. (5). Абиссинія, Мадагаскаръ и М. Д. Н. Оранж. орнамент. кустарн. рр. Легкая, сильная. Черенками, въ парникѣ.

*X. люцида* (H. lucida, глянцевитая). Мысь Д. Н. Цв. красноватые, большіе, въ іюнѣ. 4—6 ф.

**ХАЛЛІЯ** (Hallia). Бергенъ Мартинъ *Халль* (Hall)—ученикъ Линнея. С. бобовыхъ. (6). Южн. Африка. Оранж. многол. травян. или полукуст. рр. Уходъ какъ за Альхаги.

*X. имбриката* (H. imbricata, настельная). Цв. пурпуровые, въ августѣ. 1½ ф.

**ХАМАМЕЛИСЪ** (Hamamelis). *Хамма*—вѣтвь, *мелон*—плодъ; цвѣтокъ растетъ вѣтвь съ плодомъ. С. хамамелидовыхъ (3). Соед. Штаты, Японія. Выносн. или оранжер. куст. или низкодереви. рр. Песчан. Отводкой.

*X. арбореа* (H. arborea, древесный). Японія. Цв. желтые, съ темно-малиновой чашечкой; зимой. *X. виргиника* (H. virginica, виргинский). С. Америка. Цв. желтые, съ октябрь до февраля. Въ сѣменахъ много маслянистыхъ частей, онѣ съедобны; кора и листья—вяжущіе.

**ХАМЕБАТІЯ** (Chamaebatia). *Чаматай*—при землѣ и *батосъ*—ежевика, по низкому росту и сходству съ ежевикой. С. розановыхъ (1). Оранж. куст. р. Глин. дерн. съ пескомъ и торф. Черенками, въ парникѣ.

*X. фоліолоза* (C. foliolosa, листистая). Сиерра-Невада. Цв. бѣлые, крупныя. 2—3 ф.

**ХАМЕДОРЕА** (Chamaedorea). *Чаматай*—при землѣ и *дореа*—даръ, по плодамъ, выростающимъ низко. С. пальмъ. (6). Троп. С. Америка, Мексика, Папана. Тепл. древ. рр. Песч. дернов. сильная. Сѣменами и отпрысками. Темп. лѣтомъ 13—21, зимой 8—12°.

*X. Аренбергіана* (C. Arenbergiana, Аренберга). Гватемала. Лл. перистые до 3 ф. длиною; пень тонкій. Сип. *X. латиформисъ* и *X. латифолия* (C. latifrons, C. latifolia). *X. Вендланди* (C. Wendlandi, Вендланда). Мексика. Лл. перистые. Пень тонкій. Одна изъ лучшихъ декоративныхъ пальмъ. *X. геонимиформисъ* (C. geonimiformis, похожая на Геониму). Гватемала. Лл. цѣльные, на верху расщепленные, длиною въ 1 ф. Пень тонкій въ 4 ф. Сип. *Нуннезарія геонимиформисъ* (Nunnezharia geonimiformis). *X. гравинифолия* (C. graminifolia, съ лл. какъ у злака) Коста-Рика. Лл. перистые, длиною въ 4 ф. Пень тонкій какъ трость. *X. девмонкоидесъ* (C. desmoncoides, похожая на Девмонкусъ). Мексика. Лл. перистые въ 3 ф. длиною. Пень тонкій, сизый, какъ и лл.; достигнувъ извѣстной вышины начинаетъ виться. Сип. *X. сканденсъ* (C. scandens). *X. микрофилля* (C. microphylla, мелколистная). Троп. Америка. Лл. перистые, длиною въ 6—10 д., дугообразны, очень темно-зеленые. *X. Сартори* (C. Sartorii, Сартори). Мексика. Лл. длиннѣе 4 ф. Р. походить на *X. элеганс*. Сип. *X. мексикана* и *Моренія облонгата конферта* (C. mexicana, Morenia oblongata conferta). *X. формоза* (C. formosa, красивая). Толма въ Ю. Америкѣ. Лл. перистые, перья многочисленныя. *X. элеганс* (C. elegans, изящная). Мексика.

Лл. перистые, длиною въ 4 ф., изящно пинадолющие, ярко-зеленые. Пень толстый, въ 4 ф. Сип. *X. Хеллеріана* и *Кунтия Деллеяна* (C. Helleriana, Kunthia Deppiana). *X. Эрнесті-Аугусті* (C. Ernesti-Augusti, Эрнеста Августа). Новая Гренада. Лл. темно-зеленые, простые, длиною въ 2 ф.; глубоко рассѣченные надвое у вершины. Сип. *X. симплицифронс* (C. simplicifrons).

**ХАМЕЛІУЦИУМЪ** (Chamaelucium). Производить отъ *чаматилеке*—бѣлый низкій тополь. С. миртовыхъ. (1). Австралія. Оранж. куст. р. Часть волоконъ торфъ съ двумя чч. глин. дернов. и песку. Черенками изъ бокового роста, въ песокъ, подъ стекломъ. Темп. лѣтомъ 10—20, зимой 2—5°.

*X. циліатумъ* (C. ciliatum, рѣсничатый). З. Австралія. Цв. бѣлые, въ маѣ. 2 ф.

**ХАМЕЛІЯ** (Hamelia). Анри Луи Дю *Хамель ду Монсеа* (Du Hamel du Monceau), знаменитый французскій писатель по садоводству, † 1782. (8). Троп. Америка. Теплич. кустарн. рр. Песчан. торф. съ волокнист. глин. дерн. Черенками изъ вырѣзаннаго роста, въ песокъ, въ парникѣ. Темп. лѣтомъ 15—24, зимой 8—10°.

*X. вентрикоза* (H. ventricosa, вздутая). Ю. Америка. Цв. желтые, въ сентябрѣ. 8 ф. *X. патенсъ* (H. patens, распростертая). Ю. Америка. Цв. шарлаховые, лѣтомъ. 5—10 ф.

**ХАМЕПЕЙЦЕ** (Chamaepeuce). *Чаматай*—низкій и *пеуке*—ель, по сходству. С. сложноцвѣтныхъ. Теперь соединить съ *Кинкусъ*, съ которымъ близокъ. Выносильны или полувыносн. травян. рр. Сѣменами въ парникѣ. потомъ въ горшкахъ, и затѣмъ на воздухѣ.

*X. диаканта* (C. diacantha, двугольное). Сирія. Цв. головки пурпуровыя, лѣтомъ; лл. съ бѣлыми полосками. 2—3 ф. *X. Казабонѣ* (C. Casabonae, Казабонны). Южн. Европа. Цв. головки пурпуровыя, лѣтомъ; лл. съ бѣлыми жилками, съ шипами. 2—3 ф. *X. стрикта* (C. stricta, прямое). Южн. Европа. Цв. головки пурпуровыя, лѣтомъ; лл. съ бѣлыми жилками. 2 ф.

**ХАМЕРАНТЕМУМЪ** (Chamaeranthemum). *Чаматай*—низкій и *антосъ*—цвѣтокъ. С. акантовыхъ. (3). Бразилія. Тепл. рр. Глин. дерн. съ торф. Черенками изъ молодого роста, весной, въ песокъ, на теплой грядкѣ.

*X. піктумъ* (C. pictum, расписной). Бразилія. Лл. продолговато-овальные, зеленые съ оранжевыми краями и большими, по срединѣ, серебристымъ пятномъ.

**ХАМЕРОДОСЪ** (Chamaerhodos). *Чаматай*—низкій и *родонъ*—розанъ. С. розановыхъ. (5). Трав. многол. рр., близкія

къ Потентилля. Легко пропадаютъ зимою отъ сырости. Глин. дерн. съ пескомъ и торфян. Зимовать должны въ оранжерей. Сѣменами, какъ только посигуютъ, въ парникѣ.

*X. грандифлора* (C. grandiflora, крупноцвѣтный). Дурія Лв. бѣлые, въ іюнѣ. 6 д. *X. эректусъ* (C. erectus, прямостоящий). Скалистые горы. Цв. бѣлые, въ іюль—августѣ. 6 д.

**ХАМЕРОПСЪ** (Chamaeops). *Чаматай*—низкій и *рхопс*—кустъ. С. пальмъ. (2). Средизем. побережье. Оранж. пальмы. Сильная глин. дерн. Сѣменами и отпрысками. Темп. лѣтомъ 8—20, зимой 2—6°.

*X. макрокάρпа* (C. macrosarpa, крупноплодный). С. Африка. Сильная форма съ толстымъ пнемъ и болѣе крупными плодами. *X. хумилис* (C. humilis, низкій). Ю. Европа и С. Африка. Лл. длиною въ 3—4 ф., раздѣленные почти на треть длины узкими сегментами. 20 ф.

**ХАМЕЦИПАРІСЪ** (Chamaecypariss). *Чаматай*—у земли и *кыпариссъ*—кипарисъ. С. хвойныхъ. Сѣв. Америка, Японія. Въ уѣтр. климатъ выносильны рр. З. влажная, лѣто защищенное. Сѣменами и черенками, осенью.

*X. Лоусоніана* (C. Lawsoniana, Лоусонъ). С. Калифорнія. Лл. темно-зеленые, глянцевитые, вѣтви короткія, распростертые, пониклыя, перистые, стволъ сравнит. тонкій. 75—100 ф. Сип. *X. Бурсеріи* (C. Bursieri) и *Купрессусъ Лоусоніана* (Cupressus Lawsoniana). Имѣетъ много разновидностей. *X. лепоклада* (C. leptoclada, пѣжно-вѣтчинный). Японія. Лл. двойчатые, шпидовидные и чешуевидные, вѣтви густыя, короткія. Ростъ пирамидальный. 8—10 ф. Сип. *Ретиноспора лепоклада* (Retinospora leptoclada). *X. нуткаенсисъ* (C. nutkaensis, изъ Нутки). Британскія Колумбія. Лл. мелкіе, чешуйчатые; вѣтви вилообразныя съ загнутыми концами. Ростъ столбовой. 40—60 ф. Сип. *Туїдисисъ бореалисъ* (Thuja borealis). Имѣетъ нѣсколько разновидностей. *X. обтуса* (C. obtusa, съ тупыми лл.). Японія. Лл. колючатые, тупые, свѣтло-зеленые; вѣтви вѣтвиобразныя. 70—100 ф. Сип. *Кетелеерія* и *Ретиноспора обтуса* (Keteleeria obtusa, Retinospora obtusa). Имѣетъ много разновидностей. *X. скварроза* (C. squarrosa, растопыренная). Японія. Лл. расположенныя спирально, распростертые; вѣтви тонкія, согнутыя у концовъ. 4—6 ф. Сип. *Ретиноспора скварроза* (Retinospora squarrosa). *X. филіфера* (C. filifera, нитевал). С. Калифорнія. Лл. темно-зеленые, вѣтви перистыя, пониклыя; стволъ сравн. тонкій. 75—100 ф. Въ садѣхъ слыветъ подъ названіемъ *Купрессусъ* (Cupressus).



**ХАМИЛЬТОНІЯ** (*Hamiltonia*). Уильямъ *Хамилтонъ* (*Hamilton*)—знаменитый американскій ботаникъ. С. магнолиевыхъ. (4). Индія, Китай, Индіскій архипелагъ. Тепл. куст. рр. Глин. дерн. съ торфян. Черенками изъ полужрълаго роста, въ песокъ, въ парникъ. Темп. лѣтомъ: во время роста 13—21, зимой, въ состояніи покоя 7—10, во время цвѣтенія 10°.

**Х. скабра** (*H. scabra*, жесткая). Непаль. Цв. лазуревые, душистые, съ ноябля по мартъ. 4—6 ф. Сил. *Спермадиоктионъ азуреумъ* (*Spermadictyon azureum*). **Х. спектабилисъ** (*H. spectabilis*, красная). Цв. лилово-голубые, зимою. 4—6 ф. **Х. суавеоленсъ** (*H. suaveolens*, благоуханный). Отъ Индіи до Китая. Цв. бѣлые, въ октбр. 4—6 ф.

**ХАМИССОА**. См. Шамиссоа.

**ХАНКОРНІЯ** (*Hancornia*). Провенжонское названіе, необяснено. С. кутровыхъ. (1). Бразилія. Древесн. р. содержащее млечной сокъ, который на воздухѣ крѣпнеть какъ каучукъ. Волокна торф. и глин. дерн. и пескомъ. Черенками изъ полужрълаго роста въ парникъ. Темп. зимой 10; лѣтомъ 13—24°.

**Х. спеціоза** (*H. speciosa*, отъменная). Цв. похоти на жасминъ, душистые; плоды желтые съ красными пятнами, въ сливу, събѣлые. 20 ф.

**ХАНДЛОПАППУСЪ** (*Harporappus*) *Harloos*—простой и *rappus*—холодокъ; по отсутствію внутренняго хохолка. С. сложноцвѣтныхъ. (60). С. Америка, отъ Калифорніи до Техаса и Мексики, Чили и Патагоніи. Многол. травяни. или полукустарни рр. Садовая. Дѣленіемъ и сѣменами.

**Х. спинулозусъ** (*H. spinulosus*, иглестый). Скалистые горы. Цв. головки золотисто-желтыя, въ августъ. 6 до 18 д.

**ХАНТАЛІЯ** См. Шанталія.

**ХАРДВИКІЯ** (*Hardwickia*). Генералъ *Хардвикъ* (*Hardwick*)—остиндской компаніи. С. бобовыхъ. (3). Индія. Теплич. деревья. Сильная песчан. глин. дерн. Черенками изъ вызрѣлаго роста, въ парникъ. Темп. лѣтомъ 13—24, зимой 8°.

**Х. бина́та** (*H. binata*, съ двойчатыми лл.). Цв. желтые. 100 ф. Доставляетъ строительный матеріалъ. **Х. пинна́та** (*H. pinnata*, перистая). Цв. грязно-желтые. 40—50 ф.

**ХАРДЕНБЕРГІЯ** (*Hardenbergia*). Графиня фонъ *Харденбергъ* (*Hardenberg*)—сестра знаменитаго путешественника барона Хюгеля. С. бобовыхъ. (3). Австралія. Оранж. вьющ. травяни. или полукуст.

рр. 2 ч. торф. съ 1 ч. глин. дерн. и съ добавленіемъ песку и древесн. угля. Сѣменами или черенками изъ молодого роста, въ холодномъ парникѣ.

**Х. Компто́ніана** (*H. Comptoniana*, Комптона). Цв. пурпуровые, въ мартъ. Сил. *Х. digitata*, *Линдлея*, *Маккуана*, *Хюгели*, *Глицине Компто́ніана*, *Кенне́дия макрофилла* (*H. digitata*, *Lindley*, *Macquana*, *Huegelii*, *Glycine Comptoniana*, *Kennedy macrophylla*). **Х. монофилла** (*H. monophylla*, однолистная). Цв. пурпуровые, въ апрѣлѣ. Сил. *Х. cordata*, *овата*, *Глицине бимакула́та*, *Кенне́дия cordata*, *К. longiracemosa*, *К. монофилла*, *К. овата* (*H. cordata*, *H. ovata*, *Glycine bimaculata*, *Kennedy cordata*, *K. longiracemosa*, *K. monophylla*, *K. ovata*).

**ХАРИЕИСЪ** (*Charieis*). *Charieis*—изящный, но цв. С. сложноцвѣтныхъ. (1). Южн. Африка. Орнамент. однол. р. Сѣменами на мѣстѣ или въ парникѣ, весной.

**Х. хетерофилла** (*C. heterophylla*, разнолистная). Южн. Африка. Цв. головки съ голубыми лучевыми и голубыми же или желтыми торчвыми цв., въ іюнь 1 ф. Сил. *Каульфуссія амеллоидея* (*Kaulfussia amelloides*).

**ХАРЛАМОВСКОЕ** яблоко. Сорть средней поры посѣванія, довольно крупный, рѣпчатой формы, твердый, желтоватый, вкусомъ слабосладостный.

**ХАРПАГОФИТУМЪ** (*Harpagophytum*). *Harpago*—схватывать и *phyton*—растение. С. руляковыхъ. (4). Ю. Африка. Мадагаскаръ. Многол. трав. рр., въ садахъ не встрѣчаемыя.

**ХАРТВЕГІЯ** (*Hartwegia*). *Хартвегъ* (*Hartweg*)—ботаническій коллекторъ. С. орхидей. (2). Сред. Америка, Мексика. Эпифит. тепл. орхидей. Уходъ какъ за *Одонтоглоссумъ*.

**Х. гема́а** (*H. gemma*, двойная). Центр. Америка. Цв. ярко-аметистовые. **Х. пурпуреа** (*H. purpurea*, пурпуровая). Мексика и Гватемала. Цв. пурпуровые, въ августъ. 1 ф.

**ХАРТОГІЯ** (*Hartogia*). *Хартогъ* (*Hartog*)—голландскій путешественникъ по Ю. Африкѣ и Цейлону. С. краснопузырьниковыхъ. (1). Мысъ Д. Над. Оранж. орнам. кусты. Уходъ какъ за *Кассине*.

**Х. капензі́усъ** (*H. capensis*, капская). Цв. желтые, въ іюнь. Низкое деревцо.

**ХВОЙНИКОВЫЯ** рр. (*gnetaceae*). Малочисленное сем. кустарниыхъ, рѣдко древесныхъ, почти исключительно тропическихъ растений. Имѣетъ три рода, изъ нихъ наиболѣе извѣстны Вельвичія и Эфедря. Видовъ насчитываютъ до 30.

**ХВОЙНИКЪ**. См. Эфедря.

**ХВОЙНЫЯ** рр. (*conferae*). Многочисленное семейство древесныхъ и кустарныхъ породъ съ остающимся, болѣею частью, листомъ. Цвѣты одно- или двудомные, расположенные цилиндрическими или короткими сережками съ густорасположенными чешуйками. Женскіе цв. быв. иногда одиночные. Лички и сѣмена не покрыты. Листья очередные, супротивные, или пучками въ переночатой оберткѣ, часто узкіе, иглообразные, жесткіе, или въ видѣ часто и черепичато положенныхъ чешуекъ, иногда съ плоскимъ краемъ. Въ послѣднее время это семейство разбито на шесть отдѣловъ: *елевыхъ* (*Аbiesъ*, *Ларикъ*, *Пихусъ*, *Пихеа*, *Псевдотсуга*, *Тсуга* и *Цедрусъ*), *араукариевыхъ* (*Агатисъ*, *Араукарія* и *Конингамія*), *кипарисовыхъ* (*Актинострубусъ*, *Кальлятрисъ*, *Купрессусъ*, *Либоцедрусъ*, *Туя*, *Филлоя* и *Юниперусъ*), *плодоножковыхъ* (*Микрокаристъ*, *Подокарпусъ*, *Саксеготеа*), *тиссовыхъ* (*Гинкто*, *Дакридиумъ*, *Таксусъ*, *Торрейя*, *Феросфера* и *Фильдокладусъ*) и *лазекипарисовыхъ* (*Атротаксусъ*, *Криптомерія*, *Секвойя*, *Таксодиумъ* и *Цефалотаксусъ*).

**ХВОЩЕВЫЯ** рр. (*equisetaceae*). Семейство замѣчательныхъ тайноцвѣтныхъ, представителемъ которыхъ служатъ хвощъ, имѣющий до 25 видовъ, растущихъ въ умеренномъ поясѣ нашего полушарія, и ифъ-коръ въ тропическомъ. Къ послѣднимъ принадлежитъ *Эквишетумъ Марціи* (*Equisetum Martii*), находящейся дико въ Бразиліи и достигающей вышины почти 5 сажень. *Э. хіemale* (*E. hyemale*) употребляется для полировки.

**ХЕВЕКЛЯДУСЪ** (*Hebecladus*). *Небе*—пушистость и *klados*—вѣтвь; по пушистости молодыхъ вѣтокъ. С. пасленовыхъ. (5). Запад. троп. Америка. Тепл. многолѣт. травяни. или полукуст. рр. Сильная песчан. дерновая съ листовымъ переносомъ. Черенками изъ полужрълаго роста, въ песокъ, въ парникъ.

**Х. бифлорусъ** (*H. biflorus*, двухцвѣтный). Перуанскія Анды. Цв. пурпуровые съ зелеными. Полу-куст. рр. **Х. вентрикозусъ** (*H. ventricosus*, брюшистый). Перу. Цв. блѣдно-желтые, лѣтомъ. 3—4 ф. Кустъ.

**ХЕБЕНШТРЕТІЯ** (*Hebenstretia*). *Хебенштрейтъ* (*Hebenstreit*)—проф. ботаники лейпцигскаго университета, † 1757. С. селюговыхъ. (20). Ю. Африка. Оранж. кустари. или однол. рр. Песчан. волокна. дерн. съ добавленіемъ торфян. Черенками изъ молодого короткаго роста въ песокъ, весной.

**Х. дентата** (*H. dentata*, зубчатая). Цв. бѣлые, съ мая до сентябрю. 1 ф. Однол. **Х. фрутикоза** (*H. fruticosa*, кустовая). Цв. бѣлые, въ августъ. 1½ ф. Кустари.

**ХЕВѢА** (*Hevea*). Мѣстное названіе въ Южн. Америкѣ. С. молочайныхъ. (9). Влажные лѣса тропич. Америки. Тепл. высокія деревья. Песч. глин. дерн. Черенками изъ полужрълаго роста въ песокъ, въ парникъ.

**Х. бразиліензі́съ** (*H. brasiliensis*, бразильскій). Троп. южн. Америка. Цв. зеленовато-бѣлые, въ маѣ. 60 ф. Производитъ параскій каучукъ.

**ХЕДВИГІЯ** (*Hedwigia*). *Хедви́гъ* (*Hedwig*)—знаменитый бріологъ, проф. въ Лейпцигѣ, † 1799. С. мѣшечковыхъ. (5). Вестиндія, С. Бразилія, Гвіана. Тепл. древ. рр. Песч. глин. дерн. съ небольшимъ колич. торф. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ песокъ, въ парникъ. Темп. лѣтомъ 18—33, зимой 8—10°.

**Х. бальзамифера** (*H. balsamifera*, производящая бальзамъ). Вестиндія. Цв. бѣловатые, мелкіе. 60 ф.

**ХЕДЕРА** (*Hedera*). Названіе взятое у Виргилія и Плинія. С. аралиевыхъ. (2). Сѣвер. полушаріе и Австралія. Цѣпкія куст. рр., выносливыя въ умѣр. климатѣ. Сильная глаубоя. Черенками и прищипкой.

**Х. аустрали́ана** (*H. australiana*, австралийская). Купислендъ. Цв. зонтиками, лл. перистые. Оранж. древ. р. **Х. хеликсъ** (*H. Helix*). *Ляуцъ*. З. и Ю. Европа, С. Африка и З. центр Азія. Цв. зеленовато-желтые; осенью; лл. овальные, углстые, 3—5 лопастные, на безплодныхъ вѣтвяхъ болѣе раздѣленные. Имѣетъ нѣсколько разновидностей, изъ которыхъ заслуживаютъ наибольшаго вниманія: *алжиріензі́съ* (*algeriensis*), съ болѣе округлыми лл.; *донералиензі́съ* (*doperaliensis*) съ меньшими лл.; *комломерата* (*conglomerata*) съ волнистыми, густыми лл.; *Рёгнеріана* (*Roegneriana*) съ широко-сердцевидными лл.; *ромбеа* (*rhombica*), лл. ромбоидальные съ бѣлыми каемочками.

**ХЕДИЗАРУМЪ** (*Hedisarum*). Названіе, заимствованное у Диоскорида. С. бобовыхъ. (50). Европа, С. Африка и умѣр. гористыя мѣстности Азіи; 2 вида растутъ въ С. Америкѣ. Многол. травяни. или полукуст. рр. Въ садахъ содержатся весьма немногія. Обычн. садовая, на открытомъ солнечн. положеніи. Сѣменами.

**Х. корона́ріумъ** (*H. coronarium*, вѣнечный). Ю.-З. Европа. Цв. темно-красные, лѣтомъ. 3—4 ф. Многол. трав.

**ХЕДИСЦЕПЕ** (*Hedyscra*). *Hedys*—сладкій и *scera*—покрышка. С. пальмъ. (1). Земля Лорда Гоу. Тепл. пальма. Уходъ какъ за *Кентіа*.

**Х. Кентербюрі́ана** (*H. Canterburyana*, виконта Кентербюри). Ваи длинныя, пер-



ствя, густою кроной. 32 ф. Сип. *Kentia Canterburyana* (Kentia Canterburyana).

**ХЕДИХИУМЪ** (*Hedychium*). *Hedys* — приятный, сладкий, и *chion* — снѣгъ, по приятно-душистымъ свѣжо-бѣлымъ цв. С. нибирныхъ. (25). Троп. Азія. Тепл. трав. рр. Глин. дерн. съ перегноемъ и пескомъ. Темп. лѣтомъ 13—22, зимой 8—10°.

**Х. Гарднеріанумъ** (*H. Gardnerianum*, Гарднера). Остиндія. Цв. желто-лимонные, лѣтомъ. 3—5 ф. **Х. коронаріумъ** (*H. coronarium*, вѣнечный). Остиндія. Цв. свѣжо-бѣлые, душистые, въ маѣ. 5 ф. **Х. флауумъ** (*H. flavum*, желтый). Непаль. Цв. ярко-оранжевые, душистые, въ іюль. 3 ф.

**ХЕЕРІЯ** (*Heeria*). *Heer* (Oswald Heer) — знаменитый швейцарскій ботаникъ. С. черноустовыхъ. (4). Мексика, Гватемала. Тепл. трав. либо полукуст. рр. Песч. глин. дерн. съ торф. Черенками изъ молодого роста, въ февралѣ—мартѣ, въ парникѣ.

**Х. розеа** (*H. rosea*, розовая). Мексика. Цв. розовые, осенью и рано зимой. 1 ф. Полукустар.

**ХЕИЛАНТЕСЪ** (*Cheilanthes*). *Cheilos* — губа, *anthos* — цвѣтокъ, по формѣ спорового щитка. С. папоротниковыхъ. (50). Всѣ страны свѣта. Воздушныя, тепл. и оранж. рр. Глин. дерн. съ торф. Для тепл. и оранж. темп. лѣтомъ 10—21, зимой 6—10°.

**Х. аргентеа** (*C. argentea*, серебристый). Отъ Сибири до Индіи. Ван дельтовидный, 2—3 перистыя, длиною въ 3—4 д. Оранж. **Х. вестита** (*C. vestita*, покровный). С. Америка. Ван овално-ланцетовидныя, триперистыя. Почти выносл. **Х. вискоза** (*C. viscosa*, липкій). Нов. Мексика. Ван дельтовидныя, 3 или 4 перистыя. Тепл. и оранж. **Х. грацильліма** (*C. gracillima*, тонкій). Калифорнія. Ван узкоовальный, 2—3 перистыя, длиною въ 3—4 д. Оранж. **Х. капензисъ** (*C. capensis*, съ М. Д. Н.). М. Д. Н. Ван широкоя, 2 перистыя, длиною въ 4—6 д. Оранж. **Х. Клеветландіи** (*C. Clevelandi*, Клеветландіи). С. Америка. Ван овално-ланцетовидныя, 3 или 4 перистыя, длиною въ 4—12 д. Почти выносливый. **Х. ланугиноза** (*C. lanuginosa*, пушистый). С. Америка. Ван овално-ланцетовидныя, 2 перистыя, длиною въ 4—8 д. Выносливый. Сип. **Х. грацилис** (*C. gracilis*). **Х. Линдгеймера** (*C. Lindheimeri*, Линдгеймера). Нов. Мексика. Ван широко-ланцетовидныя, 3 перистыя, длиною въ 3—6 д. Оранж. **Х. микрофилла** (*C. microphylla*, мелколистный). Троп. Америка. Ван широко-овальной, 2—3 перистыя, длиною въ 3—9 д. Тепл. **Х. мизурензисъ** (*C. mysurensis*,

мизурійскій). Троп. Индостанъ. Ван овално-ланцетовидныя, 3 перистыя, длиною въ 3—12 д. Тепл. **Х. радиата** (*C. radiata*, лучистый). Троп. Америка. Ван перьевъ 6—9 расходящимися лучами. Тепл. **Х. рѣфа** (*C. rufo*, рыжий). Сѣв. Индостанъ. Ван широко-ланцетовидныя, длиною въ 6—9 д. Тепл. **Х. томентоза** (*C. tomentosa*, пушистый). Мексика. Ван овално-ланцетовидныя, длиною въ 6—12 д. Оранж. **Х. Урайтіи** (*C. Wrightii*, Урайта). Техасъ. Ван овално-ланцетовидныя, широкия, длиною въ 2—4 д. Оранж. **Х. фарингоза** (*C. farinosa*, мушкетный). Троп. страны обихъ полушарій. Ван дельтовидныя или ланцетовидныя, длиною въ 3 до 12 д. Тепл. **Х. фразгранс** (*C. fragrans*, благоуханный). Южн. Европа. Ван овальный, острокопечный, 2—3 перистыя, длиною въ 2—4 д. Полувыносл. **Х. хирта** (*C. hirta*, волосистый). М. Д. Н. Ван овално-ланцетовидныя, 3 перистыя, длиною до 12 д. Оранж.

**ХЕЙНСІЯ** (*Heinsia*). Филологъ *Heinsius* (Heinsius), переведшій Теофраста. С. мареновыхъ. (4). Троп. Африка. Тепл. куст. рр. Уходъ какъ за Гарденіей.

**Х. ясенифлора** (*C. jasminiflora*, съ цв. какъ у яасмина). Сьерра Леоне. Цв. бѣлые, въ февралѣ. 5—8 ф.

**ХЕЙРАНТУСЪ** (*Cheiranthus*). *Cheiri* или *Cheiry* — арабское названіе р. съ красными пахучими цв. По др. отъ *cheir* — рука и *anthos* — цвѣтокъ, — букетные цв. С. крестовѣтвыхъ. (12). Европа. С. Африка, 3. Азія, С. Америка. Оранж. и полувыносл. полукустар. рр. Легкая, сильная песчанистая. Сѣменами и черенками, подъ стекломъ, въ маѣ—іюнь.

**Х. Маршалли** (*C. Marshalli*, Маршалли). Гибридъ. Цв. темно-оранжевые, весной. 1—1½ ф. **Х. мутабилис** (*C. mutabilis*, измѣчивый). Мадера. Цв. сначала бѣлые, потомъ пурпуровые, полосатые, въ мартъ. Оранж. **Х. Хейри** (*C. Cheiri*, Хейри). *Желтофилла*. *Лакъ-фиол.* 3. Европа. Цв. разной величины и окраски, пахучіе, рано весной и лѣтомъ. 1—2 ф. Имѣетъ весьма много разновидностей съ простыми и махровыми цв., высокаго и низкаго роста.

**ХЕЙРОСТЕМОНЪ** (*Cheirostemon*). *Cheir* — рука и *stemon* — тычинка; у 5 тычинокъ основанія срослись, а верхніе согнулись, что даетъ имъ видъ руки. С. малъсвѣтыхъ. (1). Мексика. Тепл. дерево. Песч. дерн. съ волоки. торф. Темп. лѣтомъ 13—21, зимой 7—10°.

**Х. платаноидесъ** (*C. platanooides*, платановидный). Мексика. Цв. пушистые изъ одной колокольчатой чашечкой. 60 ф.

**ХЕЙРОСТИЛИСЪ** (*Cheirostylis*). *Cheir* — рука и *stylos* — столбецъ; столбецъ на задней сторонѣ бороздчатый, какъ ру-

ка. С. орхидей. (8). Малайск. архип.; троп. Африка. Тепл. земныя рр. Влажное тепло. Смысь трехъ частей рубленнаго торфяника съ одной частью лист. Стеблями.

**Х. мрамората** (*C. marmorata*, съ пестрыми какъ мраморъ лл.). Индія. Цв. бѣлые, съ красноватой чашечкой, въ сентябрѣ; лл. темные, красно-оливковые, бархатистые, съ золотистыми жилками, кот. съ возрастомъ листа исчезаютъ.

**ХЕЙСТЕРІЯ** (*Heisteria*). *Хейстеръ* (Heister) — проф. батаники въ Хельмштадтѣ. † 1758. С. морциниковыхъ. (10). 3. троп. Африка и троп. Америка. Тепл. деревня. Волоки. торф. и песч. глин. дерн. съ небольшою колич. листовою. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ пескѣ, въ парникѣ.

**Х. кокцинеа** (*H. coccinea*, шарлаховая). Вестиндія. Цв. бѣлые съ темно-пурпуровою или шарлаховою чашечкой, зимой. 15 ф.

**ХЕЙХЕРА** (*Heuchera*). *Хейхеръ* (Johann Heinrich Heucher) — проф. медицины въ Виттенбургѣ. † 1747. С. камнеломковыхъ. (20). Умѣр. С. Америка, отъ Мексикіи почти до арктич. пояса. Выносл. многол. травял. рр. Обыкн. садов., за исключеніемъ плотной. Дѣлается весной.

**Х. американа** (*H. americana*, американская). С. Америка. Цв. красноватые. 1½ ф. **Х. сангвинеа** (*H. sanguinea*, кроваво-красная). С. Мексика. Цв. темно-красные, лѣтомъ. 9 до 18 д. **Х. хиспида** (*H. hispida*, волосатая). Виргинія и Каролина. Цв. съ пурпуровыми жилками, въ маѣ до іюня. Сип. **Х. Ричардсоніи** (*H. Richardsonii*).

**ХЕКСАГЛОТТИСЪ** (*Hexaglottis*). *Hex* — шесть и *glotta* — языкъ, по шестилопастному столбику. С. козатиновыхъ. (3) Южн. Африка. Оранж. луковичныя рр. Уходъ какъ за Иксіей.

**Х. лонгифолия** (*H. longifolia*, длиннолистный). Цв. желтые въ маѣ. 1½ ф. Сип. *Морѣа флексуоза* (*Moraea flexuosa*).

**ХЕЛЕНИУМЪ** (*Helenium*). Названіе, употребленное Гипократомъ. С. сложноцвѣтныхъ. (18). Центр. и С. Америка. Выносл. орнамент. трав. рр. Садовая. Дѣлается и сѣменами.

**Х. аутомнале** (*H. autumnale*, осенній). С. Америка. Цв. головки желтыя, осенью. 4—6 ф. Многол.

**ХЕЛИДОНІУМЪ** (*Chelidonium*). *Chelidon* — ласточка, р. цвѣтеть, когда прилетаютъ ласточки. С. маковыхъ. (1). Европа, Азія. Многол. трав. р. Сѣменами и дѣленіемъ. Обыкновенная садовая.

**Х. маюсъ** (*C. majus*, большой). *Чистотѣль*. Повсемѣстно въ Россіи. Цв. желтые, весной и лѣтомъ. 1—2 ф. Въ садахъ встрѣ-

чается разновидность *лициніата* (*inciniata*) съ мелкопарзанными лл. и *флоре пидео* (*fl. pl.*) съ махровыми цв. Р. содержитъ оранжевый сокъ во всѣхъ частяхъ. Сокъ свѣже разрываннаго корня — превосходное средство отъ мозолей.

**ХЕЛИКОДИЦЕРОСЪ** (*Helicodiceos*). *Helix*, *helikos* — спираль, *dis* — двойной и *keras* — рогъ; по нижнимъ раздѣламъ лл. С. арондей. (1). Корсика. Оран. клубневое травял. р. близкое къ *Agum* и нуждающееся въ такомъ-же уходѣ, какъ *Арумъ*.

**Х. кринитусъ** (*H. crinitus*, съ чехломъ, покрытымъ волосками). Чехолъ овальный, бурого цв., внутри съ волосками, поготовокъ цилиндрической. 1—1½ ф. Сип. *Арумъ кринитумъ* (*Agum crinitum*).

**ХЕЛИКОНИЯ** (*Heliconia*). Отъ горы *Helicon* — обиталища мифологическихъ музъ. С. нибирныхъ. (25). Троп. страны Запада. полушарія Тепл. многол. трав. орнамент. рр. Сильная, рыхлая глин. дерн. Сѣменами и преимущ. черенками корневища. Темп. лѣтомъ 15—25, зимой 8—13°.

**Х. ауреостриата** (*H. aureo-striata*, съ золотистыми полосками). Лл. темно-зеленые съ золотистыми полосками, пущенными отъ главы. жилки къ краю, стебель съ зелеными и желтыми полосками. **Х. Вихайи** (*H. Vihai*, Вихай). Вестиндія. Цв. красные или оранжевые, въ іюль, августъ. 12 ф. **Х. пситтакорумъ** (*H. psittacorum*, попугайчья). Ямайка. Цв. оранжевые, въ августъ. 3—8 ф. **Х. триумфансъ** (*H. triumphans*, торжественный). Суматра. Лл. продолговатые, темно-зеленые съ черноватыми поперечными полосками.

**ХЕЛИКТЕРЕСЪ** (*Helicteres*). *Helicter* — свитой браслетъ, по свитымъ плодикамъ. С. навозниковыхъ. (30). Жаркія страны обихъ полушарій, преим. Америки. Тепл. дерев. или куст. рр. Глин. дерн. съ торфял. Черенками по составу, въ пескѣ, въ парникѣ.

**Х. Изора** (*H. Isora*, Изора). Австралія, Индія. Цв. красно-оранжевые, въ сентябрѣ, лл. какъ у лещины. 6 ф.

**ХЕЛИНУСЪ** (*Helinus*) — хватать, прищипка; по цѣльному росту. С. крушиновыхъ. (3). Абиссинія и Ю. Африка. Тепл. кустар. рр. Сильная песч. глин. дерн. Сѣменами и черенками изъ полузрѣлаго роста въ пескѣ, въ парникѣ.

**Х. оватусъ** (*H. ovatus*, яйцевидный). Наталь. Цв. зеленоватые.

**ХЕЛИПТЕРУМЪ** (*Helipterum*). *Helios* — солнце и *pteron* — крыло, по перистому хохолку. С. сложноцвѣтныхъ. (42). Южн. Африка и Австралія. Одно и многол.



трав. рѣдко кустар. полу-выносл. рр. Сильная легкая. Съеменами въ парникѣ, въ мартѣ.

**Х. Хумбольдтіанумъ** (H. Humboldtianum, Хумбольтовъ). З. Австралія. Цв. головки желтыя. 1—3 ф. Сип. *H. Sandfordii* (H. Sandfordii). **Х. Манглесіи** (H. Manglesii, Мангльса). З. Австралія. Цв. отъ блѣдныхъ до темныхъ малиновыхъ. 1—1½ ф.

**ХЕЛИХРИЗУМЪ** (Helichrysum). Названіе, заимствованное у Теофраста. С. сложноцвѣтныхъ. (260). Почти исключительно Мисъ Добр. Надежды. Оранже. или выносл., либо полувыносл. травянистыя или кустар. рр.; изъ нихъ немногія только воспитываются въ садахъ. Сильная глин. дерн. Однол.—съеменами, въ парникѣ, въ мартѣ; многол.—оранж.—черенками, весною, въ парникѣ. Виды этого рода составляютъ *сухоцвѣтныя*.

**Х. аренариумъ** (H. arenarium, песочный). Европа. Цв. головки желтыя, лѣтомъ. 6—12 д. Цв. эти употребляются въ сухомъ видѣ для траурныхъ вѣнковъ. **Х. брактееатумъ** (H. bracteatum, прицѣпчиконый). Австралія. Цв. головки различной окраски, въ августѣ. 3—4 ф. Полувыносл. однол. Имѣетъ много формъ.

Для приготовленія въ сухомъ видѣ цв., должно срѣзать ихъ до полного распусканія и сохранять въ прохладномъ темномъ мѣстѣ, подвѣсивъ цвѣтами внизъ.

**ХЕЛИАМФОРА** (Heliamphora). *Helios*—солнце и *amphora*—кувшинъ, по окружностямъ асцидіямъ. С. сарраценовыхъ. (1). Роранма. Оранже. трав. р. Ухоть какъ за Сарраценомъ.

**Х. нутансъ** (H. nutans, пониклая). Цв. бѣлые и блѣдно-розовые, пониклые; лл. трубчатые въ видѣ кувшиновъ съ наклоннымъ устьемъ. 1—2 ф.

**ХЕЛИАНТЕМУМЪ** (Helianthemum). *Helios*—солнце и *anthemon*—цвѣтокъ. С. ладонниковыхъ. (30). С. Сред. и Южн. Америка и Средиземное побережье, частью З. Азія. Одно- и многол. трав. или полукуст. рр. Песч. глин. дерн. Съеменами и черенками.

**Х. вулгаре** (H. vulgare, обыкновенный). *Нютникъ*. Европа. С. Америка. Цв. желтые, весною в лѣтомъ. Имѣетъ нѣсколько садовыхъ разновидностей. **Х. глобулярифолюмъ** (H. globulariaefolium, съ лл. какъ у Глобулярія). Испанія и Португалія. Цв. желто-лимонные, лѣтомъ. 9 д.

**ХЕЛИАНТУСЪ** (Helianthus). *Helios*—солнце и *anthos*—цвѣтокъ. С. сложноцвѣтныхъ. (50). С. Америка, Перу и Чили. Одно- и многол. трав. полувыносл. рр. Садовая. Съеменами и дѣленіемъ.

**Х. аннуусъ** (H. annuus, однолѣтний). *Под-*

*солнечникъ*. З. Соед. Штаты. Цв. головки большія, различнаго цвѣта и размѣра. 6 ф. Имѣетъ нѣсколько разновидностей и формъ.

**Х. декапеталясъ** (H. decapetalus, десятилепестковый). З. Соед. Шт. Цв. головки въ 2 д. шириной, осенью. 5 ф. Многол. Разновидность *мультифлорусъ* (multiflorus) наиболѣе разводится въ садахъ; цвѣт. головки у нея нѣсколько. **Х. оргіалисъ** (H. orgyalis, почной). Соед. Шт. Цв. головки желтыя, сравнит. небольшія, осенью. 6—10 ф. Многол. **Х. ригидусъ** (H. rigidus, жесткій). С. Америка. Цв. головки золотисто-желтыя, въ августѣ. 3 ф. Многол. Сип. *Х. диффузусъ* (H. diffusus). **Х. туберозусъ** (H. tuberosus, клубневой). *Земляная груша*. Верхняя Канада и Соед. Шт. Цв. головки желтыя, въ сент.—сентябрѣ. Въ концѣ осени на ползучемъ корнѣ вырастаютъ клубни, которые употребляются въ пищу. Поэтому р. это воздѣлывается у насъ въ огородахъ, но не цвѣтеть у насъ.

**ХЕЛИОКАРПУСЪ** (Heliocarpus). *Helios*—солнце и *carpos*—плодъ, створки плода съ рѣсничками вокругъ. С. лино-выхъ. (4). Троп. Америка. Тепл. древ. или кустар. рр. Песчан. глин. дерн. съ волоки. торф. Черенками изъ ползучаго роста, въ песокъ, въ парникѣ, весною. Темп. лѣтомъ 13—21, зимой 8—10°.

**Х. американусъ** (H. americanus, американскій). Цв. пурпуровые, въ іюль. 14—20 ф.

**ХЕЛИОПСИСЪ** (Heliopsis). *Helios*—солнце и *opsis*—подобный. С. сложноцвѣтныхъ. (6). С. Сред. и Ю. Америка. Одно-, дву- и многол. трав. рр. Ухоть какъ за Хелиантусъ.

**Х. левисъ** (H. laevis, гладкій). С. Америка. Цв. головки желтыя, осенью. 3—6 ф.

**ХЕЛИОТРОПИУМЪ** (Heliotropium). Названіе употребленное Теофрастомъ отъ *helios*—солнце и *tropos*—поворачиваніе, по предположенію, что р. движется по солнцу. С. бурачниковыхъ (150). Тропич. страны всей земной поверхности. Оранже. тепл. и воздушн. однолѣт. трав. и многол. полукуст. рр. Не луждалась въ санномъ высокой темпер., чувствительны къ холоду. Сильная, легк. песч. Однол. и двул. съеменами, въ апрѣлѣ, въ парникѣ, прочіе—черенками во всякое время года, по предпочтиту. весною, въ парникѣ, вначалѣ не санномъ тепломъ.

**Х. конвольвуляцеумъ** (H. convolvulaceum, вьюнковый). Нов. Мексика. Однол. Цв. бѣлые, душистые, лѣтомъ. 2 ф. **Х. коримбозумъ** (H. corimbosum, щитковидный). Перу. Оранже. куст. Цв. лиловые, въ маѣ до сентября. 4 ф. **Х. индикумъ** (H. indicum, индійскій). Востиндія. Тепл. однол.

Цв. голубые, въ іюль до августа. 1 ф. **Х. перувианумъ** (H. peruvianum, перуанскій). Перу. Оранже. Цв. отъ свѣтло до темно синихъ, душистые, въ іюль. 2 ф. Наиболѣе употребительный и имѣющий весьма много разновидностей и формъ, которые дѣлятся на три отдѣла: 1) съ лл. и цв. темными; 2) съ лл. и цв. свѣтлыми и 3) съ лл. зелеными и цв. темными.

**ХЕЛИОФИЛИЯ** (Heliophila). *Helios*—солнце и *phileo*—любить, по мѣсту нахождения рр. на солнечномъ положеніи. С. крестоцвѣтныхъ. (60). Ю. Африка. Однол. и полукуст. оранже. или полувыносл. рр. Однол. съеменами весною въ парникѣ. Полукуст. черенками въ песокъ, въ парникѣ. Песч. глин. дерн.

**Х. амплексикаулисъ** (H. amplexicaulis, стеблеобъемлющая). Цв. отъ бѣлыхъ до пурпуровыхъ, съ іюня до сентября. 9 д. **Х. коронопифолия** (H. coronopifolia, съ лл. придорожной иглы). Цв. синефолетовые, въ іюнь до сентября. 1—2 ф. **Х. пилоса** (H. pilosa, волосистая). Цв. голубые, въ іюль—іюль. 6—12.

**ХЕЛЬЛЕВОРУСЪ** (Helleborus). Названіе данное Теофрастомъ. С. лютиковыхъ. (12). Южн. Европа, Зап. Азія. Оранже. многол. трав. рр. Обыкн. садовая. Съеменами и предпочт. дѣленіемъ.

**Х. нигеръ** (H. niger, черный). *Черная Чемерица*. Сред. и Ю. Европа, З. Азія. Цв. бѣлые, зимой. 6—18 д. Имѣетъ нѣсколько разновидностей.

**ХЕЛОНЕ** (Chelone). *Chelone*—черепаха, по подобію задней стороны верхней губы цв. С. поричниковыхъ. (3). Сѣв. Америка. Многол. трав. выносл. рр. Песч. дернов. съ малымъ количествомъ лист. и торф. Дѣленіемъ и черенками изъ молодого роста, подъ стекломъ, въ апрѣлѣ—маѣ, также дѣленіемъ.

**Х. Ліони** (C. Lyon, Лиона). С. Каролина. Цв. пурпуровые, съ іюля по сентябрь. 3—4 ф. Сип. *Х. майоръ* (C. major). **Х. неморова** (C. nemorosa, лѣсное). С. Америка. Цв. розово-пурпуровые, въ іюль. 1 ф. **Х. обликва** (C. obliqua, косое). С. Америка. Цв. пурпуровые. 2—3 ф. Сип. *Х. пурпуреа* (C. purpurea). Есть разновидность *альба* (alba) съ бѣлыми цв.

**ХЕЛОНІАСЪ** (Helonias). *Helios*—солнце, по мѣсту нахождения. С. лилейныхъ. (1). С. Америка. Многол. травянист. Песчан. волокнистая, глин. дерн. съ торф. Съеменами или дѣленіемъ.

**Х. булліята** (H. bullata, вздутый). Цв. розово-пурпуровые, мелкіе, лѣтомъ. 1—1½ ф. Сип. *Х. латифолия* (H. latifolia).

**ХЕЛЬВИНГІЯ** (Helwingia). *Хельвингъ* (Helwing)—пѣмецк. писатель-бота-

никъ. С. аралиевыхъ. (2). Гималаи, Японія. Древесныя рр., воспитываемыя только въ ботанич. садахъ.

**ХЕЛЬМГОЛЬЦІЯ** (Helmholtzia). *Хельмгольцъ* (Hermann Helmholtz)—знаменитый пѣмецкій ученый. С. филлировыхъ. (2). Австралія, о. Тихаго океана. Оранже. трав. многол. рр. Песч. глин. дерн. съ торф. Дѣленіемъ или съеменами.

**Х. глянберрима** (H. glaberrima, очень гладкая). Цв. бѣлые, въ маѣ. 3 ф.

**ХЕЛЬМИНТОСТАХИСЪ** (H. Helminthostachys). *Helminthos*—червячекъ и *stachys*—колосье, по расположенію спорныхъ кучекъ. С. папоротниковыхъ. (1). Гималаи до Куинсленда. Тепл. папоротникъ.

**Х. цейланіка** (H. zeylanica, цейлонскій). Вел. безплодный-даневидно-перистый; плодоносныя—колосьями. Сип. *Х. дулицисъ* (H. dulcis).

**ХЕЛЬМИЯ** (Helmia). *Хельмъ* (Helm)—пѣмецкій пасторъ. С. діоскорейныхъ. (1). Цент. Америка. Тепл. выходящая р. Ухоть какъ за Диоскореемъ.

**Х. рацемоза** (H. racemosa, съ цв. кистью). Цв. желтые съ пурпуровыми. 8 ф.

**ХЕМАНТУСЪ** (H. Hemanthus). *Haima*—кровь и *anthos*—цвѣтокъ; по цвѣту чехла и тычинокъ пѣкторныхъ видовъ. С. амарилисовыхъ. (30). Ю. и Троп. Африка. Тепл. и оранже. лукович. рр. Песчан. глин. дерн. съ волоки. торф. Отпрысками.

**Х. абиссиникусъ** (H. abyssinicus, абиссинскій). Троп. Африка. Цв. шарлаховые, въ апрѣлѣ. Сип. *Х. tenuiflorусъ* *кокцинеусъ* (H. tenuiflorus coccineus). **Х. Кальбрейери** (H. Kalbreyeri, Кальбрейера). Гвинея. Цв. свѣтло-карминовые. 6 д. **Х. Катеріне** (H. Katherineae, миссъ Катер. Саудерсонъ). Цв. темно-красные. **Х. натадензисъ** (H. natalensis, изъ Натала). Наталь. Цв. блѣдно-зеленые съ оранжевыми тычинками и столбиками. **Х. циннабаринусъ** (H. cinnabarinus, киноварный). З. Африка. Цв. красные, въ апрѣлѣ.

**ХЕМАРІЯ** (Hemaria) *Haima*—кровь, по красному цвѣту нижн. стороны лл. С. орхидей. (4). Китай, Кохинхина, Малайск. архип. Земи. орхиден. Ухоть какъ за Гудайера.

**Х. дискоторъ** (H. discolor, разноцвѣтная). Ю. Китай. Цв. бѣлые, въ ноябрѣ, 1 ф.

**ХЕМАТОКСИЛОПЪ** (Haematoxylon). *Haima*—кровь и *xylon*—дерево. С. бобовыхъ. (1). Центр. Америка, Колумбія. Востиндія. Тепл. дерево. Торф. съ пескомъ. Черенками изъ молодого роста въ песокъ, въ парникѣ.

**Х. кампехіанумъ** (H. campechianum,



кампишное или сандальное дерево). Цв. желтые. 20—40 ф. Дает фиолетовый и синий сандалъ.

**ХЕМОРОКАЛЬЛИСЪ** (*Neomerocalis*). *Hemero*—день и *kallós*—красота. С. лилейных. (5). Сред. Европа, Азия, Япония. Многол. трав. рр. Обыкновенная садовая. Дѣленіемъ. Уходъ самый простой. Рр. выносливы.

**Х. флѣва** (H. flava, желтый). Южн. Европа до З. Сибири и Япония. Цв. желтые, пахучие, лѣтомъ. 2—3 ф. **Х. фѣльва** (H. fulva, рыжий). Ю. Европа до Япония. Цв. грязно-красно-оранжевые, большіе, безъ запаха, лѣтомъ. 2—4 ф. Разновидность *Каансо* (Kwan-so), имѣетъ махровые, бронзово-оранж. крупныя цв.

**ХЕМИМЕРИСЪ** (*Hemimeris*). *Hemi*—половина и *meris*—часть: верх. губа у вѣшника почти не вырастает. С. норичниковых. (5). Южн. Африка. Тепл. многол. трав. рр. Песч. глин. дерн. съ небольшими колич. торфяной. Черенками изъ молодого роста, въ песокъ, въ парникъ. Темп. лѣтомъ 13—20, зимой 8—10°.

**Х. монтана** (H. montana, горный). М. Д. Н. Цв. шароховые, въ июль. 6 д.

**ХЕМИТЕЛІЯ** (*Hemitelia*). *Hemi*—половина и *telia*—покрышка, по формѣ покрывала (индузія). С. папоротниковых. (30). Тропич. страны. Тепл. и оранж. древесные папор.

**Х. грандифолия** (H. grandifolia, большелистная). Вестиндія. Ван перистыя, перья длинны въ 1 до 1½ ф. Тепл. **Х. Смитта** (H. Smithii, Смитта). Нов. Зеландія. Ван двуперистыя. Оранж. Син. *Cyathea Smithii* (*Cyathea Smithii*).

**ХЕМИФРАГМА** (*Hemiphragma*). *Hemi*—половина и *phragma*—раздѣлъ, перегородка, по раздѣламъ плодника. С. норичниковых. (1). Гималаи. Почти вѣносл. травянистое р. Глин. дерн. на зиму собираемое отъ холода р.

**Х. хетерофиллюмъ** (H. heterophyllum, разнолистная). Цв. малиновые, колокольчатые, мелкіе, лѣтомъ.

**ХЕМИХЕНА** (*Hemichaena*). *Hemi*—половина и *chaeno*—звѣтъ, по двугубому вѣшнику. С. норичниковых. (1). Гватемала и Коста-Рика. Полувыносл. куст. Глин. дерн. съ торф. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ песокъ, въ парникъ.

**Х. фрутикова** (H. fruticosa, кустарная). Цв. волотисто желтые, въ июль. 3—5 ф.

**ХЕМИАНДРА** (*Hemiandra*). *Hemi*—половина и *andros*—мужъ: по пыльнымъ. С. губовѣтных. (3). Ю.-З. Австралія. Оранж. кустар. и полукуст. рр. Песч. глинисто-дерн. съ торфяной и древ. углемъ. Черенками изъ полузрѣлаго роста,

въ песокъ, въ парникъ, весной. Темп. лѣтомъ 10—20, зимой 2—5°.

**Х. пунгенсъ** (H. pungens, жгучая). Цв. бѣлые или малиновые съ темными пятнами, въ май. 1—2 ф.

**ХЕМИОНИТЕСЪ** (*Hemionites*). *Hemionos*—мужъ; Диоскоридъ полагалъ, что р. безплодно. С. папоротниковых. (8). Троп. страны обоихъ полушарій. Тепл. папоротники. Хороши для вардовскихъ ящичковъ.

**Х. кордата** (H. cordata, сердцевидный). Индія. Ван 6—9 д. длиной, овальныя или продолговато-ланцетовидныя. **Х. пальмата** (H. palmata, дланевидный). Вестиндія. Ван дланевидныя съ 5 ланцетовидными раздѣлами. **Х. пинната** (H. pinnata, перистый). Ямайка. Ван 5—6 д. длиной, перисто-разсѣченные.

**ХЕМОДОРОМЪ** (*Haemodorum*). *Haema*—кровь и *doron*—даръ, вѣроятно п. ч. корни употребляются австралийскими аборигенами въ пищу. С. кровяниковых. (17). Австралія. Оранж. травяни. рр. Торф. съ глин. дерн. Дѣленіемъ корней, весной. Темп. зимой 2—4°.

**Х. планифолюмъ** (H. planifolium, съ плоскими лл.). Цв. пурпуровые съ зеленоватымъ основаніемъ, въ августъ. 2—3 ф. **Х. теретифолюмъ** (H. teretifolium, съ круглыми лл.). Походитъ на предыдущій, но лл. почти круглыя.

**ХЕНОПОДИУМЪ** (*Chenopodium*). *Chen*—гусь и *pous*—нога, по формѣ лл. С. лебедовых. (50). За исключеніемъ тропич. странъ, въ др. мѣстахъ обильно. Трав. или полукуст. рр. мало красивыя.

**Х. Бонусъ-Хенрикусъ** (C. Bonus, Непісус, добраго короля Генриха). *Моралики*. З. Европа. Многол. р., стебли котораго употребляются взаимно спаржи, а лл.—шпината. Съедаемы весной. Въ первый годъ сборъ не большой, чтобы не ослабить р. Цв. зеленоватые, колокольчатые, въ августъ. 1 ф.

**ХЕНОСТОМА** (*Chaenostoma*). *Chaeno*—звѣтъ, *stoma*—ротъ, по тому зѣву. С. норичниковых. (26). Южн. Африка. Оранж. трав. и полукуст. рр. Обыкновенная садовая. Съедаемы въ парникъ, въ мартъ. Высадить на лѣто на воздухъ. Черенками осенью, чтобы продолжать зиму въ холодн. оранж.

**Х. линифолия** (C. linifolia, съ лл. льна). Мыс Д. Н. Цв. бѣлые съ желтымъ, въ ноябрь. Куст. оранж. 1 ф. **Х. полианта** (C. poliantha, многоцвѣтная). Южн. Африка. Цв. лиловые съ желтымъ, въ июнь. Травяни. 4 д.

**ХЕПТАПЛЕВРУМЪ** (*Heptapleurum*). *Hepta*—семь, *pleuron*—ребро, по

ребристому плоду. С. аралиевых. (60). Отъ Австраліи до Африки. Высокія кустар. или древ. тепл. рр. Уходъ какъ за Араліей.

**Х. полиботриумъ** (H. polybotryum, скученный), Ява. Цв. зеленоватые, мелкіе, зимой. Тонкостебельный, высокій кустъ.

**ХЕРАКЛЕУМЪ** (*Heraclium*). Древне-греческое названіе. С. зонтичных. (70). Горы центр. и южн. Европы, особенно Азия, а одинъ видъ изъ С. Америки. Дву- и многол. трав. выносливыя рр. Садов. обыкн. Съедаемы и дѣленіемъ. Рр. грубыя.

**Х. вильдозумъ** (H. villosum, волосистый). Кавказъ. Цв. бѣлые, лл. перисто-разсѣченные. 10—12 ф. Син. **Х. гигантеумъ** (H. giganteum). **Х. сетозумъ** (H. setosum, щетинистый). Ю. Европа. Лл. тройчатые, стебли и черешки съ иглами. **Х. сибирікумъ** (H. sibiricum, сибирскій). Европа, Азия. Цв. желтоватые, лѣтомъ; лл. перистые съ жесткими волосками. 5—6 ф.

**ХЕРБЕРТІЯ** (*Herbertia*). *Хербертъ* (W. Herbert), англійскій ботаникъ, знатокъ лукович. рр. † 1847. С. косатиновых. (6). Техасъ, Чили, Ю. Бразилія. Полувыносл. лукович. рр. Песч. глин. дерн. съ торф. Съедаемы и отпрысками.

**Х. цѣрѣлеа** (H. coerulea, голубая). Техасъ. Цв. съ лепестками голубыми и долями бѣлыми, искрапанными голубымъ. 6 д.

**ХЕРИТЬЕРА** (*Heritiera*). *Л'Ермье* (Charles Louis L'Héritier) — знаменитый франц. ботаникъ, † 1800. С. навозниковых. (3). Троп. Азия и Австралія. Тепл. ч. древ. рр. Песч. глин. дерн. Черенками изъ зрѣлаго роста въ песокъ, въ парникъ. Темп. лѣтомъ 13—24, зимой 8—13°.

**Х. макрофилля** (H. macrophylla, крупнолистная). Индія. Цв. красноватые. 20 ф.

**ХЕРМАННІЯ** (*Hermannia*). Поль *Херманъ* (Hermann)—проф. ботаники въ Лейденѣ, † 1695. С. битерійных. (80). Троп. и Южн. Африка, Мексика, Техасъ. Оранж. оранж. кустар. рр. Уходъ какъ за Махерніей.

**Х. фламмеа** (H. flammea, огненно-красная). М. Д. Н. Цв. красно-оранжевые или красные, лѣтомъ. 1—3.

**ХЕРМИНИУМЪ** (*Hermium*). *Hermine*—кроватьная почка, по узловатому корню. С. орхидей. (6). Европа, Азия. Земныя воздушн. или земные оранж. орхидеи. Известковая дерн. съ торф.

**Х. монорхисъ** (H. monorchis, съ однимъ клубнемъ). Европа, Сибирь, Гималаи. Цв. желто-зеленоватые многочисленныя, съ запахомъ мускуса, въ июль. 3—6 д.

**ХЕРМИНЬЕРА** (*Hermiera*). *Hermine*—кроватьная почка; по формѣ стебля. С. бобовых. (1). Троп. Африка. Тепл. кустарникъ. Глин. дерн. съ торф. Горшокъ долженъ стоять въ теплой водѣ. Съедаемы.

**Х. эляфроксилонъ** (H. elaphroxylon). Цв. большіе, желтые. Р. въ мелкихъ мѣстахъ Верхн. Нила сплошными массами. Это такъ назыв. *амбаисъ*.

**ХЕРНАНДІЯ** (*Hernandia*). *Хернандесъ* (Francisco Hernandez), врачъ Филиппа II испанскаго, писавшій о флорѣ Мексики. С. лавровых. (6). Троп. страны обоихъ полушарій. Тепл. ч. древ. р. Песч. глин. дерн. съ торф. Черенками изъ зрѣлаго роста, не отнимая лл., въ песокъ, въ парникъ.

**Х. Мёренгоутиана** (H. Moerenhoutiana, Мёренгоута). О. Тихаго ок. Цв. грязно-желтые, въ октябрь. Низкорослое дерево.

**ХЕРНИАРИЯ** (*Herniaria*). *Hernia*—грыжа; по предположенію объ излѣченіи болѣзни этимъ р. С. налещебровых. (8—10). Центр. и южн. Европа, З. Азия и С. Африка. Травы съ корневищемъ, существующимъ короткое время. Кромѣ одного, не имѣютъ значенія въ садоводствѣ.

**Х. глѣбра** (H. glabra, гладкая). Европа. Сѣв. и З. Азия. Цв. зеленые, мелкіе, лѣтомъ. Р. сильно вѣтвится и быстро застилаетъ мѣсто; поэтому иногда употребляется въ узорчатыхъ цвѣтникахъ.

**ХЕРОФИЛЛЮМЪ** (*Chaerophyllum*). *Chairo*—радоваться и *phyllon*—листъ, по запаху лл. С. зонтичных. (40). Европа, Азия, С. Африка и С. Америка. Трав. рр., не имѣющія садоваго значенія. Съедаемы на воздухъ, земли—всякая садовая.

**Х. бульбозумъ** (C. bulbosum, луковичный). *Рытчатый кѣрселъ*. Европа. Цв. бѣлые, въ июнь. 3—6 ф. Клубнеобразные корни содержатъ много крахмального вещества и составляютъ пріятную пищу, для которой р. воспитывается въ огородахъ.

**ХЕРПЕСТИСЪ** (*Herpestis*). *Herpestes*—гѣнчо ползучее, по образу роста. С. норичниковых. (50). Америка, Африка, Австралія, Ю. Азия. Многол. земн. или водныя трав. рр., изъ которыхъ многія встрѣчаются въ садахъ.

**Х. Монниѣра** (H. Monnieria, Монниѣ). Троп. страны. Цв. блѣдно-голубые, лѣтомъ. Р. теплолюбное. Глин. дерн. Дѣленіемъ или съедаемы. Дренажъ хорошій; держатъ постоянно влажнымъ.

**ХЕРРАНИЯ** (*Herrania*). *Херранъ* (Herran), президентъ республики Новой Гренады, С. навозниковых. (4). Троп. Америка. Оранж. деревья, съ кронами какъ у пальмъ. Уходъ какъ за Стеркуліей.



**Х. альбифлора** (*H. albiflora*, съ белыми цв.). Цв. белые. Кустар. р. Смена его применяются к семенам какао и улучшают их достоинство.

**ХЕРРЕРИЯ** (*Herreria*). *Херрера* (*A. de Herrera*), испанский агроном, † 1589. С. лилейных. (4). Троп. Америка. Оранжев. куст. рр. Стебель вьющийся, корневище клубневое. Смесь из песка, торфяной и глины. Дерн. Семенами или черенками.

**Х. сарсапарилля** (*H. sarsaparilla*, сарсапарилль). Бразилия. Цв. зеленые с желтым, в июль—июль. 8 ф.

**ХЕСПЕРАНТА** (*Hesperantha*). *Hesperos* — вечер и *anthos* — цветок. С. косатиковых. (20). Тропич. и Ю. Африка. Низкорослая оранжев. лукович. рр. Уход как за Иксия.

**Х. радиата** (*H. radiata*, лучистая). У цв. внутренние сегменты белые, наружные — с красно-коричневыми черточками, с апреля до июня. 6 д.

**ХЕСПЕРИС** (*Hesperis*). Название данное Теофрастом, — от *hesperos* — вечер; цв. большей части видов пахнут вечером. С. крестоцветных. (20). Европа, Малая Азия, Персия, Сибирь. Выносл. или полувыносл. дву- и многол. травяни. рр. Цв. с приятным запахом по вечерам. Песчанистая глина. Дерн. Семенами, а махровые сорта — делением или черенками.

**Х. грандифлора** (*H. grandiflora*, крупноцветная). Отечество неизвестно. Цв. белые и пурпуровые, в июль. Многол. 4 ф. **Х. матроналис** (*H. matronalis*, пожилой). Ночная фиалка. Ю. Европа и по Российской Азии. Цв. пурпуровые, в июль. 4 ф. Имѣет много разн. с. прост. и махр. цв. Многол. **Х. тристис** (*H. tristis*, грустный). Осенняя фиалка. Цв. белые, буро-красные или темно-пурпуровые, весной и летом. 1—2 ф. Двудлѣт.

**ХЕССЕА** (*Hessee*). *Хессе* (*Hesse*). миссионер и ботаник. С. амариллисовых. (5). Мисс Д. Н. Оранжев. луковичн. рр. Уход как за Струмария.

**Х. крипа** (*H. crispa*, курчавая). Цв. малиновые, с апреля до августа. 3 д.

**ХЕТАНТЕРА** (*Chaetanthera*). *Chaite* — жеч и *anther* — пыльник; у пыльников — пучки жгучих волосков. С. сложноцветных. Полувыносл. трав. одно и многол. рр. Глина. Дерн. с торф. Семенами в парник весной, и делением тоже весной.

**Х. serrata** (*C. serrata*, запыленная). Чили. Цв. головки золотисто-желтые. 6 д. Многол. **Х. цилиата** (*C. ciliata*, ресничатая). Чили. Цв. головки желтые, в июль. 2 ф. Однол.

**ХЕТЕРАНТЕРА** (*Heteranthera*). *Heteros* — измѣчивый и *anther* — пыльник, по измѣчивым пыльникам. С. понтедерийных. (8). Троп. Африка и Америка. Тепл. и полувыносл. водяныя многол. трав. рр.

**Х. лимоза** (*H. limosa*, болотная). Весьма распространена по болотам в Америке. Цв. яркие, сине-фиолетовые, с мая.

**ХЕТЕРОПАПУС** (*Heteropappus*). *Heteros* — различный и *pappus* — пушок; по различию хохолков у лучевых и торховых цв. С. сложноцветных. (4). Япония, Формоза, Манчжурия. Трав. рр. Уход как за Астером.

**Х. хиспидус** (*H. hispidus*, волосистый). Китай и Япония. Цв. головки белые, в сентябрь. 1 ф.

**ХЕТЕРОПТЕРИС** (*Heteropterys*). *Heteros* — различный и *pteron* — крыло; по разнообразным летучкам. С. мальпигийных. (8). Троп. Америка и З. Африка. Тепл. вьющ. кусты. Песч. глина. Дерн. с торф. и кусками древ. угля. Черенками из зрѣлого роста, в песок, в парник. Темп. летом 13—23, зимой 8—10°.

**Х. хризифилля** (*H. chrysophylla*, съ золотистыми лл.). Бразилия. Цв. оранжевые, длѣющиеся красными, в март.

**ХЕТЕРОСПАТЕ** (*Heterospatha*). *Heteros* — измѣчивый и *spathe* — чехолъ, по разнообразной величинѣ чехлов. С. пальм. (1). Амбония. Тепл. пальма. Песч. глина. Дерн. с листвою. Семенами.

**Х. элата** (*H. elata*, высокое). Лл. перисто-разсѣченные; стволъ гладкий. Син. *Метрокейлонъ элатумъ* (*Metroxylon elatum*).

**ХЕТЕРОТЕКА** (*Heterotheca*). *Heteros* — измѣчивый и *theca* — чехолъ. С. сложноцветных. (7). С. Америка и Мексика. Полувыносл. многол. трав. рр. Семенами и делением. Обыкн. садов.

**Х. инулоидес** (*H. inuloides*, похожая на девисилу). Мексика. Цв. большие, желтые, летом. 1—1½ ф.

**ХЕТЕРОТОМА** (*Heterotoma*). *Heteros* — измѣчивый и *tome* — разрезъ; разрезъ вѣтчика неравномерные. С. колокольчиковых. (4). Мексика. Однол. и многол. оранжев. рр. Сильная глина. Дерн. с волокнистой торф. Семенами в парник. Темп. летом 13—23, зимой 10—15°.

**Х. лобелиоидес** (*H. lobelioides*, похожая на Лобелию). Мексика. Цв. пурпуровые с желтым. Стебли деревенчатые.

**ХЕТЕРОТРОПА** (*Heterotropia*). *Heteros* — измѣчивый и *tropia* — перемена; по измѣчивым свойствам рр. С. кирказоновых. Оранжев. и полувыносл. мно-

голт. рр. с. ползучим корнемъ, родомъ изъ Японіи. Уходъ, какъ за Азарумъ.

**Х. азароидес** (*H. asaroides*, похожая на Азарумъ). Цв. пурпурово-зеленые, в апрѣль и май. 6 д. Син. *Азарумъ японикумъ* (*Asarum japonicum*). Оранжев. **Х. парвифлора** (*H. parviflora*, мелко-цветная). Цв. такие же, какъ у *Х. азароидес*, но мельче, в апрѣль. 3 д. Оранжев.

**ХЕТОГАСТРА** (*Chaetogastra*). *Chaite* — жеч и *gaster* — полость, углубление; трубка цв. со жгучими волосками. С. черноустовых. Тепл. и оранжев. трав. или куст. рр. Глина. Дерн. с торф. Черенками (многол.) в песок и теплѣ, семенами — в мартѣ. Темп. летом 13—25, зимой 6—9°.

**Х. грацилис** (*C. gracilis*, изящная). Бразилия. Цв. красные с лиловымъ; тепл. многол. 1 ф. **Х. стригоза** (*C. strigosa*, с короткими волосками). Вестиндія. Цв. пурпурово-розовые, оранжев. куст. р.

**ХЕТОКАЛИКС** (*Chaetocalyx*). *Chaite* — жеч и *calyx* — чашечка; чашечка со жгучими волосками. С. бобовых. Тепл. длѣющимся рр. Глина. Дерн. с торф. Черенками из зрѣлого роста, в теплѣ. Темп. летом 13—23, зимой 6—10°.

**Х. Винцентинус** (*C. Vincentinus*, Винцента). Вестиндія. Цв. желтые, в май до августа. Син. *Глицине Винцентина* (*Glycine Vincentina*).

**ХЕХТЕА** (*Hechtea*). *Хехт* (*Hecht*) — прусский софтикъ, † 1837. С. бромелиевых. (6). Мексика. Оранжев. трав. рр. Уходъ какъ за Тильландея.

**Х. аргентеа** (*H. argentea*, серебристая). Цв. белые; лл. жесткіе, согнутые, длинной в 1½—2 ф.

**ХИБЕРТИЯ** (*Hibbertia*). *Хиббертъ* (*Hibbert*) — покровитель ботаники в Англии, † 1838. С. дильзеніевых. (70). Мадагаскар, Нон. Каледонія, Австралія. Тепл. или оранжев. кустарн. или полукуст. рр. Торф. или глина. Дерн. вмѣстѣ или порознь, с достаточнымъ количествомъ песку. Черенками, в песок, в парникъ.

**Х. денгата** (*H. denata*, зубчатая). Цв. темно-зеленые, весной и летом. Р. вьющаяся **Х. перфоліата** (*H. perfoliata*, съ объемлющими лл.). З. Австралія. Цв. блѣдно-желтые, летом. **Х. стрикта** (*H. stricta*, пряморослая). Австралія. Цв. ярко-желтые, мелкие.

**ХИБИСКУС** (*Hibiscus*). Название употребленное Dioscoridemъ. С. мальвовых. (150). Преимущ. троп. страны. Тепл. и выносл. трав. и куст. и древ. рр. Тепл. виды — в горшках или грунту, в смѣси торф. с глин. дерн. поровну, с добавлением песку и древ. угля. Семенами и черенками в холод-

парникѣ. Выносл. вѣтв. садовой, семенами.

**Х. кокиннеус** (*H. coccineus*, красный). Болота Георгіи и Флориды. Цв. ярко-красные, в июль—августъ. Оранжев. **Х. марморатус** (*H. marmoreatus*, мраморный). Мексика. Цв. белые, в февраль. Листья на нижней поверхности блѣдые. Оранжев. **Х. милитарис** (*H. militaris*, военный). Соед. Шт. Цв. розовые, летом. 2—4 ф. Выносл. многол. **Х. роза-синензис** (*H. rosa-sinensis*, китайская роза). Китай, Японія. Цв. различной окраски простые, махровые и полумахровые, летом 10—15 ф. Имѣет много сортовъ, Тепл. **Х. шизопеталус** (*H. schizopetalus*, съ разрывными лепестками). Австралія. Цв. ярко-оранжевые с разрывными, бахромчатыми лепестками, в май. Тепл. **Х. сирианус** (*H. syriacus*, сирийскій). Сирія. Цв. различной окраски простые и махровые, в августѣ. Полувыносл. куст. р. Син. *Алтея фрутекс* (*Althaea frutex*). Имѣет очень много сортовъ.

**ХИДРАНГЕА** (*Hydrangea*). *Hydor* — вода и *aggeion* — сосудъ; по чашеобразному плоду. С. камнеломковых. (33). В. Азия, Ява, Гималайскія горы, С.-З. и Ю.-В. Америка. Оранжев. кустар., либо древесн. рр. Легкая, сильная, при хорошем дренажѣ и обильной поливкѣ. Дѣлениемъ корней и черенками из зрѣлого роста.

**Х. кверцифолія** (*H. quercifolia*, съ лл. какъ у дуба). Флорида. Цв. белые, полустолбчатые плоскіе; летом. 4—6 ф. **Х. петіоларис** (*H. petiolaris*, черешковая). Японія. Цв. белые. в апрѣль—май. **Х. Тунбергій** (*H. Thunbergii*, Тунберга). Японія. Цв. белые или розовые. 2—3. **Х. хортензис** (*H. hortensis*, садовая Гортензія). Китай. Цв. окрашенные различно, смотри по составу земли, — зеленые, розовые или голубые, с апреля до сентября. Имѣет много разновидностей, изъ нихъ *Отакса* (*Otaksa*) производитъ цвѣты тѣлесной окраски и все безплодные; это р. японское и выше. до 2½ ф.

**ХИДРАСТИС** (*Hydrastis*). *Hydor* — вода; по мѣсту произрастанія. С. лютиковых. (1). С. Америка. Выносл. и трудно воспитываемое многол. трав. р. Глина. Дерн. с торф. на влажномъ мѣстѣ. Дѣлениемъ корней.

**Х. канадензе** (*H. canadense*, канадскій). Цв. зеленоватые, мелкіе, безлѣстные. 1 ф.

**ХИДРИАСТЕЛЕ** (*Hydriastele*). *Hydria* — водоемъ и *stela* — столбъ; по произрастанію около воды и высокими стеблями. С. пальм. (1). Троп. Австралія. Тепл. пальма. Уходъ какъ за Кентія.

**Х. Вендландіана** (*H. Wendlandiana*,



Вендландова). Вап длиною въ нѣсколько футовъ съ многочисл. сегментами длиною въ  $1\frac{1}{2}$  ф. Син. *Кентия Вендландіана* (*Kentia Wendlandiana*).

**ХИДРОЛЕА** (*Hydrolea*). *Hydor*—вода и *elaia*—масло. С. водолистовыхъ. (14). С. и Ю. Америка, троп. Африка, Вестиндія, Малайскій архипелагъ, троп. Австралія. Оранж. травян. пр. Дѣленіемъ, черенками и сѣменами. Иловатый грунтъ въ водоемѣ.

**Х. каролинеана** (*H. carolineana*, каролинская). С. Каролина. Цв. голубые, лѣтомъ. 1—2 ф. Син. *Х. квадривалвис* (*H. quadrivalvis*). **Х. коримбова** (*H. corimbosa*, щитковая). Юж. Каролина до Флориды. Цв. голубые, лѣтомъ. 1—2 ф. **Х. спиноза** (*H. spinosa*, иглистая). Южн. Америка. Цв. голубые, въ іюнѣ и іюль. 1 ф.

**ХИДРОПЕЛЬТИСЪ** (*Hydropeltis*). *Hydros*—вода и *pelte*—щитъ; р. водяное съ щитовидными лл. С. кувшинковыхъ (?). Сѣв. Америка. Водяное р. Отпрысками. Болотистый ил.

**Х. пурпуреа** (*H. purpurea*, пурпуровый). Цв. пурпуровые, лѣтомъ. Син. *Бразенія пелтата* (*Brasenia peltata*).

**ХИДРОФИЛЛЮМЪ** (*Hydrophyllum*). *Hydor*—вода и *phyllon*—листь; весною на лл. собирается вода. С. водолистовыхъ. (6). С. Америка. Многол. трав. выносивая пр. Иловатая з. Дѣленіемъ и сѣменами.

**Х. аппендикулѣтумъ** (*H. appendiculatum*, дополнительный). Цв. голубые, въ іюнѣ и іюль. 9 д. **Х. виргиникумъ** (*H. virginicum*, виргинскій). Цв. голубые, съ іюня до августа. 1—2 ф. **Х. канадѣнзе** (*H. canadense*, канадскій). Цв. почти бѣлые, съ іюня до августа. 1 ф.

**ХИДРОХАРИСЪ** (*Hydrocharis*). *Hydor*—вода и *charis*—красота; красное водяное р. С. лягушниковыхъ. (1). Европа и С. Азія. Растетъ въ стоячей водѣ. Сѣменами, побѣгами и почками.

**Х. морзусъ-ранѣ** (*H. morzusa-ranae*). *Лягушникъ*. Цв. дов. большіе, бѣло-зеленые, лѣтомъ. Лл. округло-сердцевидные. Стебли съ лл. и корнями—плавающие.

**ХИЗИСЪ** (*Chysis*). *Chysis*—расплавчатый, по пыльцевой массѣ. С. орхидей. (8). Мексика, Колумбія. Теплич. эпифитъ. Волокни. торф. съ черенками, въ прохладной теплицѣ, въ корзинѣ. Отпрысками.

**Х. aurea** (*C. aurea*, золотистый). Венецуела. Цв. желтые съ губою, искривленною карминовыми пятнышками; цвѣтетъ въ разное время. Разнов. *Леммингхеи* (*Lemminghei*) изъ Гватемалы. Цв. розовые, въ маѣ—іюнѣ.

**ХИЛИЯ** (*Gilia*). *Хилио* (*Gilio*)—испанскій ботаникъ XVIII стол. С. синюшныхъ.

(65). Ю. и С. Америка. Пренм. однол. трав. пр. Легкая, рыхлая. Сѣменами весной.

**Х. ахиллеофолія** (*G. achilleae-folia*, съ лл. тысячелистника). Калифорнія. Цв. сине-пурпуровые, въ августѣ. У одной разновид. цв. бѣлые. **Х. андрозацеа** (*G. Androsacea*, похожая на Андрозацеу). Калифорнія. Цв. лиловые, малиновые или бѣлые, съ желтымъ или чернымъ устьемъ, въ августѣ. Син. *Лептосифонъ андрозацеусъ* (*Leptosiphon androsaceus*). У разновидности *розалеусъ* (*rosaceus*) цв. розовые. **Х. денсифлора** (*G. densiflora*, густо-цвѣтная). Калифорнія. Цв. лиловые или почти бѣлые, въ іюнѣ. Син. *Лептосифонъ денсифлорусъ* (*Leptosiphon densiflorus*). **Х. капitata** (*G. capitata*, головчатая). С.-З. Америка. Цв. голубые, лѣтомъ. 1—2 ф. **Х. линифлора** (*G. liniflora*, съ цв. какъ у льна). Калифорнія. Цв. бѣлые, лѣтомъ. 1 ф. **Х. микранта** (*G. micrantha*, мелкоцвѣтная). Калифорнія. Цв. розовые, лѣтомъ. 9 д. Син. *Лептосифонъ розеусъ* (*Leptosiphon roseus*). **Х. триколоръ** (*G. tricolor*, трехцвѣтная). Калифорнія. Цв. сѣтло-пурпуровые съ темно-пурпуровымъ кольцомъ и оранжевою трубкой, въ іюнѣ. 1 ф. Имѣетъ нѣсколько разновидностей.

**ХИЛОПСИСЪ** (*Chilopsis*). *Cheilos*—губа, *opsis*—сходство; по чашечкѣ съ губой. С. биньонійныхъ. (1) С. Америка. Оранж. куст. Торф. съ волокни. глин. дерн. Черенками изъ полувызрѣвшаго роста, въ пескѣ, подъ стекломъ на слабо нагрѣтомъ грунтѣ. Темп. лѣтомъ 13—25, зимой 7—10°.

**Х. линейрисъ** (*C. linearis*, узколистный). Западн. часть С. Америки. Цв. темно-пурпуровые, въ маѣ. 10 ф.

**ХИЛЛИЯ** (*Hillia*). Сэръ Хилль (*Hill*)—знаменитый ботаникъ, † 1775. С. мареновыхъ. (5). Троп. Америка и Вестиндіе о. Орнамент. тепл. кустарн. пр. Уходъ какъ за Цинхона.

**Х. лонгифлора** (*H. longiflora*, длинноцвѣтная). Вестиндіе о. Цв. бѣлые, очень душистые, въ февралѣ.

**ХИМАФИЛА** (*Chimaphila*). *Chaima*—зима и *phileo*—любить; сохраняетъ зелень зимою. С. вересковыхъ. С. Америка. Полукуст. пр. съ ползучими корнями. Глин. дер. съ пескомъ. Дѣленіемъ и побѣгами.

**Х. коримбова** (*C. corimbosa*, щитковая). Сѣв. полушаріе. Цв. зеленоватые, щитками, въ іюнѣ. Син. *Пирроля умбеллата* (*Pyrola umbellata*). **Х. макулата** (*C. maculata*, пятнистая). С. Америка. Цв. бѣлые, въ іюнѣ; лл. съ бѣлыми полосками вдоль жилокъ. Син. *Пирроля макулата* (*Pyrola maculata*).

**ХИМЕНАНДРА** (*Hymenandra*). *Hymen*—плева и *andros*—мужъ; пыль-

ники соединены плевой. С. прищипанныхъ. (1). Зап. Бенгаль и Ассамъ. Тепл. кустар. р. Уходъ какъ за Адрізія.

**Х. Вальлихія** (*H. Wallichii*, Валиха). Цв. малиновые. 2—4 ф.

**ХИМЕНАНТЕРА** (*Hymenanthera*). *Hymen*—плева и *anther*—пыльникъ; пыльники оканчиваются плевой. С. фиалковыхъ. (4) Оранж. куст. пр. изъ Австраліи и Нов. Зеландіи. 2 ч. песч. торф. и 1 ч. волокни. глин. дерн. Черенками изъ молодого роста въ пескѣ, подъ колпакомъ. Темп. зимой 4—6°.

**Х. дентата** (*H. dentata*, зубчатая). Нов. Южн. Валлис. Цв. желтые, въ апрѣлѣ. 6 ф. **Х. красифолія** (*H. crassifolia*, толстолистная). Новая Зеландія. Цв. желтоватые; ягоды бѣлые. 2—4 ф.

**ХИМЕНЕА** (*Hymenaea*) *Хименей*—богъ брака; намека на двойчатые лл. р. С. бобовыхъ. (8). Троп. Америка. Теплич. орнам. деревья, съ двойчатыми лл. Торф. съ глин. дерн. Черенками изъ зрѣлаго роста въ пескѣ, въ парникѣ, весной.

**Х. Курбариль** (*H. Carbarii*, Курбариль). Цв. желтые съ пурпуровыми полосками. 40—60 ф. Дерево это даетъ цѣнную смолу и твердую, мелко-зернистую древесину.

**ХИМЕНІЯ** (*Himania*). Францискъ *Хименесъ* (*Ximenes*)—испанскій монахъ, авторъ сочиненія о мексиканскихъ пр. 1615. С. морщинниковыхъ. (4). Тепл. куст. или дрв. пр. Мексика, Ю. Африка и о. Тихаго океана. Глин. дерн. съ торф. Черенками въ теплѣ, въ парникѣ. Темп. зимой 10—13, лѣтомъ 13—24°.

**Х. американа** (американская). Троп. страны. Цв. бѣлые, душистые, въ апрѣлѣ; плоды овальные, съѣдомые. 20 ф.

**ХИМЕНОДИКТЮНЪ** (*Hymenodictyon*). *Hymen*—плева и *dictyon*—сѣтъ; сѣмена обтянуты сѣтчатой плевой. С. мареновыхъ. (5). Азія и тропич. Африка. Тепл. деревья. Уходъ какъ за Цинхона.

**Х. экцелсумъ** (*H. excelsum*, высокій). Индія. Цв. метельчатые, лѣтомъ. 30 ф. Кора сильно вяжущаго свойства.

**ХИМЕНОКАЛЬИСЪ** (*Hymenocallis*). *Hymen*—плева и *kallos*—красота; по перепончатой чашечкѣ внутри цв. С. амариллисовыхъ. (30). Троп. Америка и Вестиндія. Теплич. и оранж. луковичныя пр. Плотная глин. дерн. Луковиды сажаются поверхъ земли; оранж. виды во время покоя содержатся сухо. Отпрысками.

**Х. амѣна** (*H. amoena*, прелестный). Цв. душистые, трубка—зеленоватая, остальное—бѣлое, въ октябрѣ. 1—2 ф. Тепл. **Х. калатинумъ** (*H. calathinum*, корзинчатый). Цв. бѣлые, очень пахучіе, въ мартѣ—апрѣлѣ. Оранж. **Х. макростѣфана** (*H.*

*macrostephana*, съ большою коронкой). Цв. бѣлые, съ зеленой трубкой, въ февралѣ. 2 ф. Тепл. **Х. спеціоза** (*H. speciosa*, отмытый). Вестиндія. Цв. чисто-бѣлые, очень душистые, преимущ. вечеромъ. Тепл.  $1\frac{1}{2}$  ф.

**ХИМЕНОФИЛЛЮМЪ** (*Hymenophyllum*). *Hymen*—плева и *phyllon*—листь. С. папоротниковыхъ. (80) Тропич. и жаркія страны; преимущ. эпифитныя пр.

**Х. демиссумъ** (*H. demissum*, низпадающій). Новая Зеландія, Филиппинскіе о. Вап широкія, овально-треугольныя, три или четыре-перистыя. Оранж. **Х. полиантусъ** (*H. polyanthus*, многоцвѣтный). Троп. страны. Вап овально-продолговатыя, три-перистыя. Тепл. Син. **Х. протрузумъ** (*H. protusum*). **Х. пухльеррумъ** (*H. pulcherrimum*, весьма красивый). Нов. Зеландія. Вап широкія, овально-треугольныя, 3 или 4 перистыя. Оранж. **Х. тунбриджѣнзе** (*H. tainbridgense*, изъ Тонбриджа). Вап продолговато-ланцетовидныя, перистыя. Страны умеренныя. **Х. хирсutumъ** (*H. hirsutum*, волосистый). Мексика, Вестиндія. Вап овально-остроконечныя, три-перисто-разсѣченныя. Тепл. **Х. циліатумъ** (*H. ciliatum*, ресничный). Троп. страны обонхъ полушарій. Вап продолговатыя, остроконечныя, три-перисто-разсѣченныя. Тепл. Син. **Х. Боріанумъ**, **Х. Пломьери** (*H. Borianum*, *H. Plummeri*).

**ХИМОНАНТУСЪ** (*Chimonanthus*). *Cheima*, *cheimon*—зима и *anthos*—цвѣтокъ, по цвѣтенію въ декабрѣ—январѣ. С. чашецвѣтниковыхъ. (1). Японія. Полувыпосо. кустарникъ. Глубокая, сильная, песчанисто-дерн. Содержится зиму въ оранжереѣ, гдѣ цвѣтетъ зимою душистыми цв. Сѣменами весной, отводкой рано осенью.

**Х. фрагрансъ** (*C. fragrans*, благовоный). Японія. Цв. желтые, душистые. 6 ф. Син. *Калкантусъ прекоксъ* (*Calycanthus praecox*).

**ХИНДСІЯ** (*Hindsia*). *Хиндсъ* (*Brinsley Hinds*)—англ. ботаникъ. С. мареновыхъ. (3). Бразилія. Орнам. тепл. кустарники. Песч. глин. дерн. и торф. Черенками изъ молодого роста, въ пескѣ, въ парникѣ. Темп. лѣтомъ 15—24, зимой 6—10°.

**Х. виолѣца** (*H. violacea*, фиолетовая). Цв. голубые, въ маѣ. 3 ф. Р. пушистое.

**ХИННЫЯ** пр. (*cinchonaceae*). Обширное семейство изъ травянистыхъ, кустарныхъ и древесныхъ пр. Въ настоящее время признается отдѣломъ маревыхъ раст. (*tubiaceae*) Цв. метелками или щитками; съ правильнымъ вѣтчикомъ. Листья простые, супротивные, имѣющіе у основанія черешковъ железковыя прищѣпки. Лучше другихъ известны роды: Гарденія,



Иксора, Коффеа, Спермакоце, Цефеалис и Цинхона.

**ХИПЕКОУМЪ** (Hypocoum). Название заимствованное у Dioscorida. С. маковых. (5). Ю. Европа, С. Африка, угтерренна Азия. Однолет. травяни. рр. Обыкновенно садовая. Съедами прямо въ грунтъ или предварительно въ парникъ.

**Х. прокумбенсъ** (H. procumbens, распростертый). Ю. Европа. Цв. желтые, весной и лѣтомъ. 1 ф.

**ХИПЕРИКУМЪ** (Hypericum). Название, данное Dioscoridomъ. С. зѣробойныхъ. (160). Европа, З. Азия, С. Америка. Оранже. или воздуш. травяни., либо кустарни и полукустарн. рр. Песч. глинисто-дерн. Съедами, черенками и дѣленіемъ корней. Цв. обыкновенно желтые.

**Х. балеарикумъ** (H. balearicum, балеарскій). Майорка. Цв. большіе, немногочисленные, съ марта до сентября. Оранже. куст. **Х. калицидумъ** (H. calycinum, съ больш. чашечкой). Южн. Европа. Цв. крупныя, лѣтомъ. 1 ф. Оранже. или полувьюнос. куст. **Х. патулюмъ** (H. patulum, пониклый). Японія. Цв. щитками, лѣтомъ. 6 ф. Полувьюнос. трав. **Х. перфоратумъ** (H. perforatum, продырявленный) *Зенробой*. Умбр. страны съв. полушарія. Цв. ярко желтые, лѣтомъ и осенью. 1—3 ф. **Х. Хукеріанумъ** (H. Hookerianum, Хукеровъ). Напаль. Цв. крупныя, лѣтомъ. 2 ф. Полувьюнос. куст. **Х. элегансъ** (H. elegans, изящный). Сибирь. Цв. кистями, лѣтомъ. 1 ф. Многол. вьюнос. **Х. эмпетрифолиумъ** (H. empetrifolium, съ л. Эмпетрумъ). Ю. Европа. Лестецки безъ железокъ. Цв. лѣтомъ. Полувьюнос. трав.

**ХИПОКАЛИММА** (Hypocalymma). *Нуро*—подъ и *calymma*—покрыт: чашечка отпадаетъ какъ покровъ или колпачекъ. С. мртвыхъ. (12). З. Австралія. Оранже. орнамент. кустарн. рр. Съеда. глини. дерн. съ торф. и пескомъ. Черенками изъ молодого роста въ песокъ, подъ колпачкомъ. Темп. зимой 4—6°.

**Х. ангиустифолиумъ** (H. angustifolium, узколистный). Цв. бѣлые, или свѣтло-малиновые, въ маѣ. 1 до 3 ф. Син. **Х. суаве** (H. suave). **Х. робустумъ** (H. robustum, крѣпкій). Цв. малиновые, въ маѣ. 2 ф.

**ХИПОКАЛИПТУСЪ** (Hypocalypturn). *Нуро*—подъ и *calypso*—скрывать; по колпачку на нераспустившемся цвѣткѣ. С. бобовыхъ. (1). Мысъ Д. Н. Орнамент. оранже. куст. Глини. дерн. съ торф. Черенками въ бобовыхъ побѣговъ. въ апрѣлѣ, въ песокъ, подъ колпачкомъ. Темп. зимой 4—6°.

**Х. обкордатусъ** (H. obcordatus, обратносердцевидный). Цв. пурпуровые, въ июль—нояб. 1—2 ф.

**ХИПОДЕРРИСЪ** (Hypoderris). *Нуро*—подъ и *derris*—кожица; по округлой покрышкѣ споронгіевъ. С. папоротниковыхъ. (2). Тринидадъ, Никарагуа. Тепл. папоротники.

**Х. Броуніи** (H. Brownii, Броуна). Тринидадъ. Ванъ сердцевидно-стрѣловидныя, цѣльныя. 10—12 д.

**ХИПОЕСТЕСЪ** (Hipoestes). *Нуро*—подъ и *estia*—домъ; по прицвѣтникамъ, покрывающимъ чашечку. С. акантовыхъ. (40). Южн. и троп. Африка, Мадагаскаръ, Вестиндія, Китай, о. Малайскіа архипелага и Австралія. Оранже. тенячныя кустар. и травяни. рр. Уходъ какъ за Юстиціей.

**Х. сангвинолента** (H. sanguinolenta, съ кроваво-красными жилками). Мадагаскаръ. Цв. свѣтло-пурпуровые, съ бѣлымъ горлышкомъ и темными по немъ жилками. 6—12 д. Р. травянистое.

**ХИПОКСИСЪ** (Hiroxis). *Нуро*—подъ и *oxys*—острый, по основанію плодника. С. амариллисовыхъ. (52). Троп. Азия, Австралія, Южн. Африка, Америка. Оранже. многол. трав., не луковичныя рр. Песчан. глини. дерн. съ торф. или листов. Отпрысками.

**Х. стеллята** (H. stellata). М. Д. Н. Цв. бѣлые съ голубымъ, въ апрѣлѣ до іюня. 9 д.

**ХИПОЛЕПИСЪ** (Hypolepis). *Нуро*—подъ и *lepis*—чешуя; по окружной пленкѣ, покрывающей споровыя кучки. С. папоротниковыхъ. (12). Троп. Африка и Америка, Австралія, Нов. Зеландія. Тепл. или оранже. папоротники.

**Х. Бергіана** (H. Bergiana, Берга). Южн. Африка. Ванъ дельтовидныя, 4-перистораздѣченныя, длиною 1 до 1½ ф. Оранже. **Х. дистансъ** (H. distans, разставленный). Нов. Зеландія. Ванъ овально-ланцетовидныя, двуперистыя, длиною въ 1 ф. Оранже.

**ХИПОЛИТРУМЪ** (Hypolytrum). *Нуро*—подъ и *elytron*—влагалнце; по двумъ или тремъ маленькимъ пленкамъ внутри большей. С. ситовниковыхъ. (25). Тропич. страны. Тепл. трав. рр. Песчан. глини. дерн. съ торфяной. Съедами или дѣленіемъ. Затѣненіе и влажность—главныя условія ухода.

**Х. латифолиумъ** (H. latifolium, широколистный). Цейлонъ. Цв. яркіе коричневые, лл. широко-ланцетовидные. 2—4 ф.

**ХИПОЦИРТА** (Hypocyrtia). *Нуро*—подъ и *kyrtos*—согнутый, горбатый; нижняя часть трубки вѣничка согнута горбомъ. С. гесперійныхъ. (10). Премунц. Бразилія. Теплич. кустарн. рр. Уходъ какъ за Гесперіей.

**Х. глабра** (H. glabra, гладкая). Южн. Америка. Цв. ярко-шарлаховые, въ июль—

нояб. 8—10 д. **Х. стригильоза** (H. strigilosa, съ жесткими волосками). Бразилія. Цв. шарлаховые, въ маѣ. 2 ф.

**ХИПЕАСТРУМЪ** (Hypeastrum). *Hippeus*—рыцарь и *astron*—звѣзда. С. амариллисовыхъ. (50). Тропич. Ю. Америка. Тепл. и оранже. лукович. рр. Песч. глини. дерн. съ торф. и листов. Отпрысками. Темп. отъ 13 до 20 во время развитія и 3—8° во время покоя. Для тепличныхъ темп. нѣсколько выше.

**Х. ауликумъ** (H. alicum, придворный). Рио-Жанейро. Цв. большіе, ярко карминные, вверху зеленые. Оранже. Син. *Амариллисъ аулика* (Amaryllis aliea). **Х. витата** (H. vittata, полосатый). Цв. свѣтло-бѣлые съ двойными красными полосками. Оранже.

**Х. ретикулатумъ** (H. reticulatum, съчатый). Бразилія. Цв. пѣжно-малиновые съ бѣлымъ, съ болѣе темною сѣткой. Теплич.

**Х. эквэстрэ** (H. equestre, рыцарскій). Вестиндія, Гвиана, Чили. Цв. оранжевые съ зеленымъ. Имѣетъ нѣсколько назидныхъ разновидностей.

**ХИППІЯ** (Hipria). *Hippos*—лошадь; причина такого примѣненія неясна. С. сложноцвѣтныя. (4). Ю. Африка. Оранже. травяни. или полукустар. рр. Торф. съ глини. дерн. Съедами и черенками.

**Х. фрутесценсъ** (H. frutescens, кустовая). Цв. головки желтыя, съ февраля до августа. 6 д.

**ХИППОБРОМУСЪ** (Hippobromus). *Hippos*—лошадь и *bromus*—дуриой запахъ; примѣненіе не объяснено авторомъ. С. мыловниковыхъ. (1). Ю. Африка. Оранже. смолистое дерево значительной величины. Песчан. глини. дерн. съ сухимъ коровымъ пахемъ. Черенками въ песокъ, въ парникъ. Темп. лѣтомъ 13—23, зимой 7—12°.

**Х. алътусъ** (H. alatus, крылатый). Цв. красноватые.

**ХИППОКРЕПИСЪ** (Hippocrepis). *Hippos*—лошадь и *krepsis*—подкова, по формѣ стручка. С. бобовыхъ. (12). Европа, С. Африка и З. Азия. Премунц. полувьюнос. травяни. или низкія кустарн. рр. Садов. обыкн. Съедами и дѣленіемъ.

**Х. балеарика** (H. balearica, балеарскій). Майорка. Цв. желтые, въ маѣ. Кустарн. 1—2 ф. **Х. комоза** (H. comosa, кучистый). Ю. и З. Европа, С. Африка. Цв. желтые, весной и лѣтомъ. Травяни. стелющиеся.

**ХИППОМАНЕ** (Hippomane). Название Теофраста одного молочая и означающее буквально кобылій ражъ, по дѣйствию на кобылъ. С. молочайныхъ. (1). Вестиндія, Центр. Америка. Высокое дерево, содержащее млечный, сильно ядовитый сокъ. Песч. глини. дерн. съ торф. Черенками въ песокъ, въ парникъ.

**Х. манцинелля** (H. mancinella, манцинелля). Цв. мелкіе, незамѣчательные, въ маѣ. 4—50 ф.

**ХИППОФАЕ** (Hipporhae). Название, взятое у Dioscorida, С. доховыхъ. (1). Европа, Сибирь, Востокъ, Гималай. Вьюнос. куст. р. Обыкновен. садовая. Съедами, отводкой, отпрысками и корневыми черенками.

**Х. рамнойдесъ** (H. rhamnoides, похожая на Крушину). *Областна*. Цв. желтые, двудомные, въ маѣ. Ягоды оранжевыя. 2—20 ф. На Гималаѣ растетъ форма **Х. саллицифолия** (H. salicifolia) почти ничѣмъ не отличающаяся.

**ХИППУРИСЪ** (Hippuris). Название взятое у Dioscorida, отъ *hippos*—лошадь и *oura*—хвостъ. С. слаогодишниковыхъ. (2). Европа, Центр. и С. Азия, С. и антарктич. Америка.

**Х. вулгарисъ** (H. vulgaris, обыкновенный). *Росенка*. Цв. зеленоватые, мелкіе. 8—10 д. Р. водяное или болотное, многол. Дѣленіемъ корней или съедами.

**ХИРІТА** (Chirita). Въ Индіи подъ названіемъ *cherita* слышутъ горечавки. С. гесперійныхъ. (30). Остиндія, Малайск. архип., Сиккимъ-Гималай. Тепл. и оранже. трав. или куст. рр. Глини. дерн. съ торф. Съедами весной, въ парникъ или черенками въ апрѣлѣ—маѣ, въ песокъ, подъ стекломъ. Темп. лѣтомъ 10—21, зимой 4—6°.

**Х. лиляціна** (C. Ilacina, лиловая). Чирикчи. Цв. весьма красивыя блѣдно-голубые съ бѣлою трубкою и такимъ же зѣвомъ, внизу трубки—желтое пятно. **Х. Мунія** (C. Moonii, Муна). Цейлонъ. Цв. блѣдно-пурпуровые, въ нояб. 2 ф. Тепл. **Х. синензисъ** (C. sinensis, китайская). Китай. Цв. ярко-пурпуровые съ красноватой трубкой, въ нояб. 6 д. Оранже.

**ХИРОНІЯ** (Chironia). Многол. *Хиронъ*—центавръ, сынъ Сатурна и Филыры; знатокъ музыки, врачеванія и охоты, научилъ употребленію цѣлебныхъ рр. С. горечавковыхъ. (14). Южн. Африка. Оранже. многол. трав. или кустар. рр. ¾ торф. съ 1 ч. глини. дерн. и большимъ количествомъ. Малой величины горшки. Черенками въ песч. землѣ, въ тепловатомъ парникѣ, весной. Остерегаться избытка поливки. Зимой темп. 3—6°.

**Х. жасминойдесъ** (C. jasminoides, похожая на жасминъ). Ю. Африка. Цв. красныя или пурпуровые, въ апрѣлѣ. 1—2 ф. **Х. линойдесъ** (C. linoides, похожая на лень). Ю. Африка. Цв. красныя, въ нояб. 1—2 ф. **Х. флорибунда** (C. floribunda, многоцвѣтная). Ю. Африка. Цв. малиновые, въ нояб. 2 ф.



**ХИССОПУСЪ** (*Hyssopus*). Название взято у Хиппократа. С. губоцвѣтнѣхъ. (1). Южн. Европа, Малая Азія. Легкая, несколько сухая земля. Сѣменами, дѣленіемъ, черенками.

**Х. официнализъ** (*H. officinalis*, аптечный). Цв. синие пурпуровые, либо бѣлые или красные, въ іюнѣ до сентября. 1—2 ф.

**ХИФЕНЕ** (*Hirphaene*) *Hirphaeno* — обвивать, по волокнамъ окружающимъ плодъ. С. пальмъ. (9). Троп. Африка, Аравія, Маскаренскіе о. Вѣтролистные тепл. пр. Сильная, песчан. глин. дерн. Сѣменами.

**Х. тебаика** (*H. thebaica*, еврейское). Верхн. Египетъ и Нубія. Ванъ вѣрообразный, макушечный; стволъ вѣтвящійся, 40 ф. Древесина очень крѣпкая.

**ХИАЦИНТУСЪ** (*Hyacinthus*). Название обозначавшее у Гомера косатикъ. С. лилейныхъ. (30). Троп. и южн. Африка. Средиземн. побережье и Востокъ. Выносл. и полувыносл. лукович. пр. Песчанистая, Сѣменами, отпрысками и искусств. производимыми дѣтками.

**Х. амегистинусъ** (*H. amethystinus*, аметистовый). Испанскій *hiacintus*. Южн. Европа. Цв. ярко-голубые, весной. 4—12 д.

**Х. коримбозусъ** (*H. corymbosus*, щитковидный). М. Д. Н. Цв. лилово-розовые, осенью. Р. Оранж. или полувыносл. Снн. *Massonia corimbosa* (*Massonia corymbosa*). **Х. ориенталисъ** (*H. orientalis*, восточный). Сирія. Цв. весьма различной окраски, душистые, весной. Одно изъ самыхъ распространенныхъ выгонныхъ пр. Имѣетъ чрезвычайно много простыхъ и махровыхъ разновидностей. Воспитывается въ горшкахъ, въ землѣ, или въ бокалахъ, въ водѣ. Главнѣйшія разновидности — *альбутусъ* (*albus*) или *Х. романусъ* (*H. romanus*, римскій), выгоняемый еще раньше обыкновеннаго, и *провинциалисъ* (*provincialis*), французскій, имѣющій то-же примѣненіе; оба гораздо маловѣтнѣе и слабѣе.

**ХИЕРАЦИМУЪ** (*Hieracium*). Заимствованное у Dioscorida название. С. сложноцвѣтнѣхъ. (150). Европа, С. Азія и Америка. Многоч. выносл. травяни. пр. Садов. общев. Дѣленіемъ весной или сѣменами.

**Х. аурантиумъ** (*H. aurantium*, оранжевый). Отъ Скандинавіи до Пириней. Цв. красно-оранжевые, въ іюнѣ—іюль. 1—1½ ф.

**ХИЕРОХЛОЕ** (*Hierochloa*) *Hieros* — священный и *chloa* — трава. С. злаковъ. (8). Холодные страны С. и Ю. полушарій. Пахучія многоч. выносл. травы. Обыкн. садовая. влажная. Сѣменами.

**Х. альпина** (*H. alpina*, альпійское). Сѣв. полушаріе, по горамъ. Цв. метелки

короткія, въ іюль. 1 ф. **Х. borealisъ** (*H. borealis*, сѣверное). Сѣв. полушаріе. Колоски бурые, въ маѣ. 1—2 ф.

**ХИОКОККА** (*Chiosocsa*). *Chion* — снѣгъ и *kokkos* — ягода; по бѣлому цвѣту плодотъ *Х. рацемоза*. С. маревыхъ. (8). Троп. Америка. Тепл. кустар. пр. Снѣсъ изъ глин. дерн. съ торф. и пескомъ. Черенками въ песокъ, подъ стекломъ въ теплѣ.

**Х. рацемоза** (*C. racemosa*, кустевая). Востиндія. Цв. сначала бѣлые безъ запаха, потомъ желтые съ запахомъ, въ февралѣ. 4—6 ф.

**ХИОНАНТУСЪ** (*Chionanthus*). *Chion* — снѣгъ и *anthos* — цвѣтокъ. С. маслиновыхъ. (3). Сѣв. Америка, Сѣв. Китай. Низкія дерев. или кустар. пр. Песч. торф. или песчан. дернов. влажная. Сѣменами и отводками, также прививкою на ясеню.

**Х. виргиника** (*C. virginica*, виргинскій). С. Америка. Цв. бѣлые, въ маѣ. 10 ф. Имѣетъ двѣ или три формы.

**ХИОНОГРАФИЪ** (*Chionographis*). *Chion* — снѣгъ и *graphis* — кисточка; цв. напоминаютъ снѣжные хлопья. С. лилейныхъ. (1). Японія. Полувыносл. травянист. многол. Снѣсъ изъ глин. дерн. съ торф. и пескомъ. Сѣменами и дѣленіемъ.

**Х. японика** (*C. japonica*, японскій). Японія. Цв. бѣлые, весной. 6 д. до 1 ф.

**ХИОНОДОКСА** (*Chionodoxa*). *Chion* — снѣгъ и *doxa* — слава; пр. цвѣтутъ между тающими снѣгомъ. С. лилейныхъ. (3). Востокъ. Рано весной цв., выносливыя трав. луковичныя пр. Снѣсъ изъ ровныхъ частей торф., глин., дерн. и песку, или листов. и песку. Сѣменами и дѣтками. Молодая луковичка не должно пересаживать тогда три.

**Х. Люциліе** (*C. Luciliae*, Люцилія). Малая Азія и о. Критъ. Цв. ярко-голубые, весной. 6 д. Одно изъ самыхъ красивыхъ рано цвѣтущихъ пр. Можно содержать и въ горшкахъ, представляя къ раннему цвѣтенію, какъ грядцы. **Х. пана** (*C. pana*, низкая). О. Критъ. Цв. бѣлые съ лиловымъ оттѣнкомъ, весной. 4 д.

**ХИОСПАТЕ** (*Hyospathe*). *Hys, hyos* — свинья и *spathe* — чехолъ. С. пальмъ. (3). Бразилія. Теплич. пр. Уходъ какъ за Бактрией.

**Х. элегансъ** (*H. elegans*, изящное). Пара. Ванъ въ 3—4 ф. длинно, молодая — цѣлыя, взрослые бѣлые или мѣтѣ раздѣленные и подъ конецъ неправильно перистыя. Онѣ употребляются на кровлю.

**ХИОЦИАМУСЪ** (*Hyosyamus*). *Huos* — свинья и *kyamos* — бобъ, такъ названо это р. Хиппократомъ. С. пасленовыхъ. (9). Марія и умѣр. страны Европы, Африки и Азіи. Дву и многол. трав. пр., не имѣющія примѣненія въ садоводствѣ.

Одинъ изъ наиболѣе обыкновенныхъ видовъ, — **Х. Нигеръ** (*H. niger*, черный) *Бн-лена*) извѣстенъ какъ лечебное и ядовитое средство.

**ХИОФОРБЕ** (*Hyophorbe*) *Hys, hyos* — свинья и *phorbe* — пища, плоды ѣдятъ свиньи и кабаны. С. пальмъ. (3). Тепл. орнамент. пальмъ среднего роста съ Маскаренскихъ о. Уходъ какъ за Арека.

**Х. Верскаффельтъи** (*H. Verschaffeltii*, Верскаффельта). Родригесъ. Ванъ перистыя въ 4—6 ф. длинной, съ линейно-ланцетовид. перьями. **Х. амарикаулисъ** (*H. amaricaulis*, съ горькимъ стволемъ). О. Мапрія. Ванъ перистыя, въ 4—6 ф. длинную, перья толстыя, широкія, частыя. Снн. *Арека speciosa* (*Arecia speciosa*).

**ХЛИДАНТУСЪ** (*Chlidanthus*). *Chlideios* — вѣтвистый и *anthos* — цвѣтокъ. С. амариллисовыхъ. (3). Ю. Америка. Полувыносл. лукович. пр. съ пахучими цв., появляющимися прежде л. Снѣсъ торф., лнст. и глин. дер. по ровну, съ добавленіемъ песку. Содержать въ горшкахъ на зиму переносить въ холодную оранж. и держать до весны сухо, потомъ теплѣе и влажнѣе. Отпрысками при пересадкѣ весной.

**Х. фрагрансъ** (*C. fragrans*, благоуханный). Буеносъ-Айресъ. Цв. желтые, душистые, въ іюнѣ—іюль.

**ХЛОАНТЕСЪ** (*Chloanthes*). *Chloos* — желтозеленый и *anthos* — цвѣтокъ, по окраскѣ цв. С. вербеновыхъ. Австралія. Оранж. куст., пр. близкія къ Лантана. Волокн. глин. дерн. съ песчан. торф. Черенками изъ молодого роста въ песокъ, подъ стекломъ. Темп. зимой 4—6°.

**Х. стѣхадисъ** (*C. stoechadis*, похожий на *Stoechas*). Нов. Южн. Валлисъ. Цв. желто-зеленоватые, въ іюнѣ до августа. 2 ф.

**ХЛОПЧАТНИКЪ**. См. Госсепіумъ.

**ХЛОРА** (*Chlora*). *Chloros* — блѣдный, до блѣдно-желтымъ цв. С. горечавковыхъ. (2). Европа, С. Африка, З. Азія. Обычно однол. Обыкновен. садовая. Сѣменами, въ умѣр. парникѣ, весной.

**Х. грандифлора** (*C. grandiflora*, крупноцвѣтная). Корсика, Сардинія. Цв. золотисто-желтые. 6 д. до 1 ф. Двухлѣт.

**Х. перфоліата** (*C. perfoliata*, съ прободенными л.). Зап. Европа. Цв. золотисто-желтые, въ іюль. 1 ф. Однол. въ известковой землѣ.

**ХЛОРИСЪ** (*Chloris*). *Chloros* — зеленый. С. злаковъ. (40). Тропич. страны. Обычно однол. оранжер. или возд. трав. пр. Песчанистая З. Сѣменами, весной.

**Х. барбата** (*C. barbata*, бородачатый). Индія. Колоски длин. въ 1½ до 2 д., лѣтомъ. 1 ф.

**ХЛОРОГАЛЮМЪ** (*Chlorogalum*). *Chloros* — зеленый и *gala* — молоко, сокъ у этихъ пр. зеленый. С. лилейныхъ. (3). Калифорнія. Выносл. луковичныя пр. Уходъ какъ за Оринтогалюмъ.

**Х. померидіанумъ** (*C. pomeridianum*, послѣ полуденный). Калифорнія. Цв. бѣлые съ пурпуровыми жилками, въ іюнѣ. 2 ф. Снн. *Антерикумъ померидіанумъ* (*Anthericum pomeridianum*), *Фалангитумъ померидіанумъ* (*Phalangium pomeridianum*), *Орнитогалюмъ диварикатумъ* (*Ornithogalum divaricatum*). Въ Калифорніи луковичы этого пр. употребляютъ для мытья, поэтому и само р. называется *мыльнымъ* (*soap-plant*). Цвѣты раскрываются только послѣ полудни.

**ХЛОРОКСИЛОНЪ** (*Chloroxylon*). *Chloros* — зеленый и *xylon* — дерево; по цвѣту древесныя. С. ясеневыхъ. (1). Остиндія. Тепл. дерев. пр. Глин. дерн. съ торф. Черенками изъ вырѣзаннаго роста въ песокъ, подъ стекломъ и въ теплѣ. Темп. лѣтомъ 13—22, зимой 8—10°.

**Х. Свитенія** (*C. Swietenia*, Ванъ Свитена). Индія. Цв. бѣлые. Лл. перистые. 50 ф. Замѣчательнѣе желтою, тяжелой и крѣпкою древесною.

**ХЛОРОСПАТА** (*Chlorospatha*). *Chloros* — зеленый и *spatha* — чехолъ. С. ароидей. (1). Ю. Америка. Тепл. клубнев. мног. пр. Глин. дерн. пополамъ съ торф. Сѣменами, дѣленіемъ клубня и отпрысками. Влажный воздухъ. Обильная поливка во время роста, самая умѣренная во время покоя. Темп. лѣтомъ 13—24, зимой 10—15°.

**Х. Кольби** (*C. Kolbii*, Кольба). Нов. Гренада. Лл. стоповидные, черешки крапчатые, чехолъ завитой, цилиндрич. Значеніе р. преимущ. ботаническое.

**ХЛОРОФИЛЪ**. Зеленое, смолистое, зернистое вещество, отъ котораго заимствованъ зеленый цвѣтъ растений. *Листо-зеленъ*.

**ХЛОРОФИТУМЪ** (*Chlorophytum*). *Chloros* — зеленый и *phylon* — растеніе. С. лилейныхъ. (40). Азія, Америка, троп. и южн. Африка. Теп. оранж. мног. трав. пр. Сильная песчанистая глин. дерн. Сѣменами, отпрысками и дѣленіемъ весной. Темп. лѣтомъ 13—24, зимой 10—13°.

**Х. арунденацеумъ** (*C. arundinaceum*, тростниковый). Гималаи. Цв. бѣлые. **Х. полиризонъ** (*C. polyrhizon*, многокоренный). Западная. Цв. бѣлые. **Х. фалькатумъ** (*C. falcatum*, серповидный). Гвинея. Цв. бѣловатые. 6 д. **Х. элатумъ** (*C. elatum*, высокий). Южн. Африка. Цв. бѣлые. 1 ф.

**ХЛѢБНОЕ ДЕРЕВО**. См. Артокарпусъ.

**ХМЪЛЬ**. См. Хумулюсъ.



**ХОДГСОНІЯ (Hodgsonia).** *Hodgsonia* (Hodgson)—английскій ботаникъ. С. тыквенныхъ (1). В. Бенгалъ и о. Малайскаго архипелага. Тенл. куст. Съемами или черенками въ песокъ, землѣ, въ парникѣ.

**Х. хетероклита** (*H. heteroclitia*, необычайная). Цв. желтые снаружи, бѣлые внутри, крупные, въ маѣ. Выходящая по деревьямъ кустарникъ, взбирающийся на 100 ф.

**ХОЛЬВЕДІЯ (Holboellia).** *Holboellia* (Holboell)—бывш. директоръ копенгагенскаго бот. сада. С. дуросмянниковыхъ (*ladizabaleae*). (1). Гималай. Оранж. выюц. кустарникъ. Легкая всякая. Черенками изъ полувзрѣлаго роста, весной.

**Х. латифолия** (*H. latifolia*, широколистная). Цв. пурпуровые или зеленоватые, очень душистые, въ мартѣ. 20 ф.

**ХОЛЬКУСЪ (Holeus).** *Holeus*—древнегреческое названіе злаковъ. С. злаковъ. (8). Европа, умѣр. Азія, С. и Южн. Африка. Одно- и многол. травы. Обыкновен. сад. Съемами.

**Х. ланатусъ альбо-варіегатусъ** (*H. lanatus albo-variegatus*). Лл. мягкіе, съ узкими продольными зелеными полосками, чередующимися съ серебристо-бѣлыми.

**ХОЛЬМСКИОЛЬДІЯ (Holmskioldia).** *Holmskioldia* (Holmskiold)—датскій ботаникъ, † 1794. С. вербеновыхъ. (3). Троп. Африка, Мадагаскаръ, Гималай. Тенл. куст. рр. Сильная легкая. Черенками въ песокъ, землѣ, въ парникѣ. Темп. лѣтомъ 13—26, зимой 8—12°

**Х. сангвінея** (*H. sanguinea*, кроваво-красная). Индія. Цв. шарлахово-красные. 4 ф.

**ХОМАЛАНТУСЪ (Homalanthus).** *Homalanthus*—гладкій и *anthos*—цвѣтокъ. С. молочайныхъ (8). О. Малайскаго арх. и Тихаго океана, Австралія. Тенл. кустарн. рр. Уходъ какъ за Эйфоріей.

**Х. полиандрумъ** (*H. polyandrum*, со многими тычинками). О. Лорда Ноу. Лл. очередные, широко-овальные, на нижней сторонѣ пурпуровые. Цв. мелкіе, невзрачные.

**ХОМАЛОНЕМА (Homalomena).** *Homalomena*—плоскій и *nema*—нить. Называется также *Хомаломея*. С. ароидеиныхъ. (20). Орпам. тенл. травяни. или кустарн. рр. изъ Азіи и тропич. Америки. Уходъ какъ за Каладіумъ.

**Х. Вальлісія** (*H. Wallisii*, Баллиса). Колумбія. Цв. чехолъ красноватый, початокъ красный; лл. кособокие, продолговато-овальные съ бѣлымъ краемъ и золотистыми крапинками на верхней сторонѣ. Сил. *Курьерія Вальліси* (*Surmeria Wallisii*). **Х. Рёзліи** (*H. Roezlii*, Рецля). Колумбія. Цв. чехолъ снаружи оливково-зеленый, внутри бѣ-

лый; лл. округлые съ нѣсколькими желтыми пятнами. 6 д.

**ХОМЕЛІЯ. См. Шомелія.**

**ХОМЕРІЯ (Homeria).** *Homerea*—встрѣчати; кисти тычинокъ образуютъ трубку вокругъ столбика. С. касатиковыхъ. Южн. Африка. Оранж. луковичн. рр. Уходъ какъ за Іксіей.

**Х. ауранціака** (*H. aurantiaca*, оранжевая). Цв. желто-оранжевые, лѣтомъ. 1 ф. Сил. *Бобартія ауранціака* (*Bobartia aurantiaca*). **Х. элегансъ** (*H. elegans*, изящная). Цв. желтые съ тускло голубымъ.

**ХОМОГИНЕ (Homogyne).** *Homos*—тоже-же, подобный и *gyne*—жена, по сходству женскихъ ил. съ другими. С. сложнопѣстныхъ. (3). Горы Европы. Безстебельныя травяни. выносл. рр. Обыкновен. садов. Съемами.

**Х. альпина** (*H. alpina*, альпійское). Австрія. Цв. головки ярко-пурпуровые, въ мартѣ до мая. 6 д. **Х. дисколоръ** (*H. discolor*, разноцвѣтное). Австрія до Италіи. Цв. головки бѣлыя, стрѣлка бѣло пушистая, въ іюнѣ—іюль. 6 д.

**ХОНДРОРИНХА (Chondrorhyncha).** *Chondros*—хрящъ и *rhynchos*—клювъ, по клювообразному посіку. С. орхидей. Тенл. эпифиты. Въ корзинѣ, съ мохомъ, торф. з. и др. углемъ. Дѣленіемъ при началѣ развитія. Темп. лѣтомъ 13—25, зимой 6—13°.

**Х. Честертони** (*C. Chesteroni*, Честертонна). Колумбія. Цв. желтые съ губою, имѣющею длинную бахрому. Весьма зимч. р.

**ХОНКЕНІЯ (Honckenya).** *Honckenia* (Honckeny)—авторъ флоры Германіи, † 1805. С. липовыхъ. (1). Троп. Африка. Тенл. кустар. р. Сухъ въ глини. дерн. съ торф. Черенками изъ молодого роста, въ песокъ, въ парникѣ.

**Х. фицифолія** (*H. ficifolia*, съ лл. смочковидны). Цв. сине-фіолетовые; лл. 3—7 лопастные, зубчатые.

**ХОРДЕУМЪ (Hordeum).**—Древне-латинское названіе ячменя. С. злаковъ. (20). Европа, С. Африка, умѣр. Азія и за-тропич. Америка. Одно-, рѣдко многол. травы. Въ садовомъ отношеніи заслуживаетъ вниманія только

**Х. юбатумъ** (*H. jubatum*, бородатый). *Собачій* или *соболій хвостъ*. С. Америка. Цв. разившіеся съ длинной щетинкой, въ іюнѣ. 2 ф.

**ХОРИСПОРА (Chorispora).** *Choris*—отдѣльный и *spora*—сѣмя; по тому, что въ стручкѣ по одному сѣянцу. С. крестоцвѣтныхъ. (7). Востокъ. Одно- и двул. трав. рр. 3. обыкновен. Съемами весной.

**Х. Грейгіи** (*C. Greigii*, Грейга). Туркестанъ. Цв. красновато-фіолетовые; лл. розеткой. 1—1½ ф. Двул.

**ХОРИЦЕМА (Chorizema).** *Choros*—пояска и *zema*—нанитокъ; Доль нашелъ это р. на ю.-з. берегу Австраліи, встрѣтивъ источникъ чистой воды, которую могъ утолить мучившую его долго жажду. С. бобовыхъ. (15). Австралія. Оранж. полукуст. рр. Торф. 3 ч., глини. дерн. 1 ч., песку пополамъ съ др. углемъ 1 ч. Съемами въ парникѣ, весной, или черенками изъ бокового роста, въ песокъ, подъ стекломъ.

**Х. ангиустифоліумъ** (*C. angustifolium*, узколистая). 3. Австралія. Цв. красно-оранжевые, въ апрѣлѣ. 1½ ф. Сил. *Дилувинія глицинофолія* (*Dillwynia glycinifolia*). **Х. варіумъ** (*C. varium*, измѣчивая). Лебяжья р. Цв. желтые и красные, въ іюнѣ. 4 ф. **Х. Генхманніи** (*C. Henchmannii*, Генхманна). 3. Австралія. Цв. шарлаховые, съ апрѣля до іюня. 2 ф. **Х. диверсифоліумъ** (*C. diversifolium*, разнолистная). 3. Австралія. Цв. красно-оранжевые, съ мая до іюля. 2 ф. Сил. **Х. спектабіле** (*C. spectabile*). **Х. кордагумъ** (*C. cordatum*, сердцевидная). 3. Австралія. Цв. красные или желтые, въ апрѣлѣ. 3 ф.

**ХОРМИНУМЪ (Horminum).** У Диоскорида одинъ изъ шалфеевъ названъ *horminow*. С. губоцвѣтнымъ. (1). Отъ Пиреней до Тироля. Выносл. многол. трав. р. Садовая. Съемами и дѣленіемъ.

**Х. пиренаикумъ** (*H. pyrenaicum*, пиренейскій). Цв. сине-пурпуровые, лѣтомъ. 6—12 д.

**ХОРСФЕЛЬДІЯ (Horsfieldia).** Томаъ *Горсфелдъ* (*Horsfield*),—американскій ботаникъ † 1859. С. аралиевыхъ. (2). Ява. Тенл. колючіе куст. Уходъ какъ за Араліей.

**Х. акулеата** (*H. aculeata*, иглстая). Цв. желто-зеленоватые; лл. сердцевидные, пятилопастные.

**ХОРТЕНЗИЯ. См. Хидрангеа.**

**ХОФФМАННІЯ (Hoffmannia).** *Hoffmann* (Hoffmann),—проф. ботаники гёттингенскаго университета, † 1826. С. мареновыхъ. (20). Троп. Америка. Трав. или куст. полувыносл. рр., высаживаемыя на лѣто на воздухъ. Песчанистая. Черенками въ песковатой з., въ парникѣ.

**Х. Гісбрехтіи** (*H. Ghiesbreghtii*, Гісбрехта). Ю. Америка. Цв. желтые съ красными пятнышками. 2—4 ф. Одна разновидность имѣетъ острые лл. **Х. дисколоръ** (*H. discolor*, разноцвѣтная). Мексика. Цв. красные. Лл. на верхней сторонѣ бархатистые зеленые и красно-пурпуровые на нижней. 6 д. Р. тепличное.

**ХОХЛАТКА. См. Корпидальсъ.**

**ХОВЕА (Hovea).** *Hove* (Hove)—поль-

скій ботаникъ, собиравшій рр. для Кью. С. бобовыхъ. (11). Австралія. Орпамет. оранж. куст. рр. Песч. торф., съ пѣк. количествомъ глини. дерн. и др. угля или толченаго кирпича. Съемами въ парникѣ, или черенками изъ молодого роста въ песокъ и парникѣ. Темп. зимой 4—7°, лѣтомъ защищать отъ солнца.

**Х. эллиптика** (*H. elliptica*, эллиптическая). Цв. красивые голубые, съ апрѣля до іюня. 2—4 ф.

**ХОВЕНІЯ (Hovenia).** *Hovenia* (Hoven)—сенаторъ въ Амстердамѣ. С. крупновыхъ. (1). Гималай, Китай, Японія. Оранж. куст. р. Песч. глинисто-дерн. Черенками въ песокъ, въ парникѣ.

**Х. дүльцисъ** (*H. dulcis*, сладкая). Цв. бѣлые, лѣтомъ. 8 ф.

**ХОЙЯ (Hoya).** Томаъ *Хой* (Hoy)—быв. садовникъ герцога Портумберлендскаго въ Сайонтъ-Гауэ. С. ластовниковыхъ. (50). 3. Азія, троп. Австралія и о. Малайскаго архипелага. Тенл. цѣпкія куст. рр. Торф. съ глини. дерн. и толченымъ кирпичемъ. Черенками во влажной и тепл. атмосферѣ. Зимой темп. 6—8°.

**Х. аустралис** (*H. australis*, австралійская). Кунислендъ и Нов. Ю. Валлисъ. Цв. бѣлые, пахучіе, въ октябрѣ. **Х. бѣлая** (*H. bella*, красивая). Индія. Цв. бѣлые, какъ бы восковые съ розовато-малиновымъ сердцемъ. 1½ ф. **Х. глобоза** (*H. globosa*, шарообразная). Индія. Цв. палевые съ бѣдно-малиновою коронкой, въ апрѣлѣ. **Х. имперіалисъ** (*H. imperialis*, царская). Борнео. Цв. красно-коричневые, очень большіе, какъ бы восковые, въ іюнѣ. **Х. карноза** (*H. carnosa*, мясистая). Кунислендъ. Цв. бѣдно-малиновые, лѣтомъ. **Х. Кумингіана** (*H. Cumingiana*, Куминга). Малайскій архип. Цв. зеленоватые, весной и лѣтомъ. **Х. линейрисъ** (*H. linearis*, линейная). Гималай. Цв. бѣлые, осенью. **Х. пальмиды** (*H. palmda*, бѣдая). Индія. Цв. палевые съ красной коронкой, лѣтомъ. **Х. Пёттси** (*H. Pottsi*, Потса). Индія. Цв. бѣдно-желтые. **Х. Шепгерди** (*H. Shepherdii*, Шепгерда). Сиккимъ. Цв. мелкіе бѣлые, въ іюнѣ. **Х. циннамомифолія** (*H. cinnamomifolia*, съ лл. корицы). Ява. Цв. бѣдно-желтые; съ зеленымъ оттыкомъ, въ іюль. 10 ф.

**ХОСАКІЯ (Hosackia).** *Hosack* (Hosack)—бывшій проф. ботаники въ Нью-Йоркѣ, † 1835. С. бобовыхъ. (25). Орегонъ. Калифорнія, Мексика. Однол. или многол. оранж. или полувыносл. травяни. рр. Глини. дерн. съ торф. Съемами и дѣленіемъ.

**Х. бисколоръ** (*H. bicolor*, двуцвѣтная). С. Америка. Цв. съ желтой ладьей и бѣлыми крыльями, лѣтомъ. Сил. *Лотусъ пиннатусъ* (*Lotus pinnatus*). Многол. **Х. красифолія** (*H. crassifolia*, толстолестная).



Калифорнія, Цв. зеленоватые съ покладными средними частями, въ июнь. 3 ф. Многол.

**ХОТТОНІЯ** (*Hottonia*). *Hottonia* (Hotton), бывш. проф. ботаники въ Лейденѣ, † 1709. С. первоцвѣтныхъ. (2). Европа, С.-З. Азія и С. Америка. Вынос. водяныя многол. трав. рр. Въ мелкихъ водахъ. Дѣленіемъ весной, или сѣменами въ ту же пору.

**Х. пальюстризъ** (*H. palustris*, болотная). Турча. Европа, З. Сибирь. Цв. лиловые съ желтымъ глазкомъ, въ июль. 1—2 ф.

**ХОТЧИНСИЯ** (*Hutchinsia*). Миссъ *Хутчинсъ* (*Hutchins*), знаменитый знатокъ по тайноцвѣтнымъ. С. крестоцвѣтныхъ. (1). Средн. и Южн. Европа, Русская Азія. Многол. трав. рр. съ высокими горъ Сред. и Юж. Европы. Песчан. сѣменами и дѣленіемъ.

**Х. петреа** (*H. petraea*, каменистая). Цв. мелкіе, весной. 3 д.

**ХОУЕЯ** или **ХОУІЕА** (*Howea*). Рр. находится въ природѣ только на о. лорда Лоу (*Lowe*). С. пальмъ. (2). Теплич. Уходъ какъ за Кентіа.

**Х. Бельморейна** (*H. Belmoreana*, Бельмора). Ваи въ 6—8 ф. длиной съ многочислен. остроколюч. сегментами. 36 ф. Сип. *Гризбачія Бельморейна*, *Кентія Бельморейна* (*Grisebachia Belmoreana*, *Kentia Belmoreana*). **Х. Форстеріана** (*H. Forsteriana*, Форстера). Листов. сегменты поинкые, тогда какъ у *Х. бельморейна* они обращены вверхъ.

**ХОУСТОНІЯ** (*Houstonia*). *Хустонъ* (*Houston*) описавшій американскія рр., † 1733. С. мареновыхъ. (20). С. З. Америка. Оранж. и полувынос. травяв. многол. рр. Листовая съ пескомъ. Сѣменами или дѣленіемъ осенью.

**Х. цѣрѹлеа** (*H. coerulea*, голубая). Виргинія. Цв. голубые, раннимъ лѣтомъ. 3—4 д. **Х. серпиллифолія** (*H. serpillifolia*, съ лл. какъ у богородской травы). Цв. бѣлые, съ іюня до августа. 3 д.

**ХРИЗАНТЕМУМЪ** (*Chrysanthemum*). *Chrisos*—золото и *anthos*—цвѣтокъ. С. сложноцвѣтныхъ. (80). Европа, Азія, Африка, С. Америка. Однол. и многол. трав. или почти куст., воздушныя или оранж. рр. Глин. дерн. пополамъ съ переносомъ. Однол. сѣменами, весной, въ парникѣ; многол. трав.—сѣменами и дѣленіемъ весной или осенью; разновидности *синензе*—дѣленіемъ и черенками въ мартѣ—апрѣлѣ въ легкой, но сильной землѣ; кустарные виды—дѣленіемъ и черенками; зимовать должны въ оранжереѣ.

**Х. аргентеумъ** (*C. argenteum*, съ серебристыми лл.). Левантъ. Цв. головки бѣ-

лыя. въ июль. 1 ф. Трав. мног. **Х. каринадумъ** (*C. carinatum*, съ килемъ). Варварійскія владѣнія. Цв. головки бѣлыя съ пурпуровымъ, въ августѣ. Сип. **Х. триколоръ** (*C. tricolor*). 2 ф. Однол. **Х. коронаріумъ** (*C. coronarium*, увѣчаный). Южн. Европа. Цв. головки желтыя съ іюля до сентября. 4 ф. Однол. **Х. сеgetумъ** (*C. segetum*, полевой, между хлѣбными рр.). Европа. Цв. головки желтыя съ іюля до августа. 1½ ф. Однол. **Х. синензе** (*C. sinense*, китайскій). Китай. Цв. головки разной окраски, осенью. Имѣетъ нѣсколько сотъ махровыхъ садовыхъ разновидностей и формъ, распределяемыхъ на слѣд. группы: *ранункуловидн.*, съ завороченными лепестками, съ леп. отвороченными, *анемоновидн.*, *помпоновидн.*, *лионскіе зубчатые* и *лионскіе крупн.* Всѣ съ большимъ или меньшимъ успѣхомъ выгоняются къ раннему цвѣтенію.

**ХРИЗОВАКТРОНЪ** (*Chrysobactron*). *Chrysos*—золото и *bactron*—железъ. С. лилейныхъ. Родъ этотъ нынѣ ссоединенъ съ Бульбиніею. Полувыносливыя трав. рр., воспріимчивыя подобно Антерикумъ. **Х. Хукері** (*C. Hookeri*, Хукера). Нов. Зеландія. Цв. ярко-желтые, рано весной. 1½—3 ф. Сип. *Антерикумъ Хукері* (*Anthericum Hookeri*).

**ХРИЗОВАЛЯНУСЪ** (*Chrysobalanus*). *Chrysos*—золото, *balanus*—желудь; по цвѣту плода. С. розовыхъ. (5). Троп. Африка и Америка. Теплич. или оранж. древ. рр. Песчан. дерн. сѣменами и черенками въ пескѣ и влажномъ теплѣ, подъ стекломъ. Плоды съѣдобны.

**Х. Икако** (*C. Icaeo*, икако). Флорида. Цв. бѣлые, плоды величиною въ сливу, круто-яйцевидные, обычно пурпуроваго цвѣта съ налетомъ. Тепл. 3—6 ф. **Х. облонгифолюсъ** (*C. oblongifolius*, съ продолговатыми лл.). Флорида. Цв. бѣлые, въ май—іюнь; плоды въ маслину, почти сухіе. 1 ф. Оранж.

**ХРИЗОГОНУМЪ** (*Chrysogonum*). *Chrysos*—золото, *gonu*—колено; цв. вырастаютъ обычно изъ коленъ стебля. С. сложноцвѣтныхъ. (6). Индія, Австралія, Сѣв. Америка. Глин. дерн. съ добавленіемъ торф. и лист. Дѣленіемъ весной.

**Х. виргиніанумъ** (*C. virginianum*, виргинскій). Соед. Амер. Штаты. Цв. головки желтыя, въ май. 6 д. Многол. трав. выносливое р.

**ХРИЗОКОМА** (*Chrysocoma*). *Chrysos*—золото и *koma*—волосъ; по желтымъ цвѣткамъ. С. сложноцвѣтныхъ. (8). Южн. Африка. Низкоросл. травяв. или куст. воздушн. или оранж. рр. Песчан. торф. Черенками съ полувызр. ростомъ въ пескѣ, подъ стекломъ.

**Х. кома-ауреа** (*C. Coma-aurea*, золотой

волосъ). Мысъ Д. Над. Цв. головки желтыя, въ июль. 2 ф. Оранж.

**ХРИЗОЛИДОКАРПУСЪ** (*Chrysolidocarpus*). *Chrysos*—золото, *carpos*—плодъ. С. пальмъ. (1). Оо. Маврікія и Бурбонъ. Тепл. р., нуждающаеся въ такомъ же попеченіи какъ Арека.

**Х. лютесценсъ** (*C. lutescens*, желтоватая). О. Маврікія и Бурбонъ. Лл. перистые, большіе, дугообразные; пенъ выпш. 30 и болѣе ф., шир. 4—6 д. Сип. *Арека лютесценсъ*, *Хиофорта Коммерсоніана* и *Х. индіка*. (*Areca lutescens*, *Hyophorbe Commersoniana*, *H. indica*).

**ХРИЗОПСИСЪ** (*Chrysopsis*). *Chrysos*—золото, *opsis*—подобіе; по золотисто-желтымъ цв. С. сложноцвѣтныхъ. (18) Сѣв. Америка, Мексика. Трав. многол. р. Обыкновен. садовая. Дѣленіемъ весной.

**Х. вильдоза** (*C. villosa*, косматый). С. Америка. Цв. головки желтыя, съ іюля до сентября. 1—2 ф. **Х. трихофилля** (*C. trichophylla*, съ волосатыми листьями). Юж. Амер. Штаты. Цв. головки желтыя, въ июль. 1—3 ф.

**ХРИЗОСПЛЕНІУМЪ** (*Chrysosplenium*). *Chrysos*—золото и *splen*—печень, по золотисто-желтымъ цв. и предполагаемому врачебному свойству р. отъ бѣдныхъ печенъ. С. камнеломковыхъ. (15). Европа, Азія, Америка. Выносливыя многол. трав. рр. не особенно красивыя.

**Х. альтернофоліумъ** и **Х. оппозитифоліумъ** (*C. alternifolium*, съ чередующимися лл. и *C. oppositifolium*, съ супротивными лл.), два видо растущіе вида, выпш. дюймовъ въ 6, съ желтыми лл. въ апрѣлѣ, легко размножаемые дѣленіемъ и любящіе влажныя мѣста.

**ХРИЗОФІЛЬІУМЪ** (*Chrysophyllum*). *Chrysos*—золото, *phyllon*—листъ; по нижней сторонѣ лл. С. сапотовыхъ. (60). Троп. страны. Тепл. оранж. древ. рр. Глин. дерн. съ торф. Черенками въ пескѣ, подъ стекломъ и въ теплѣ. Темп. лѣтомъ 13—21, зимой 8—10°.

**Х. макрофиллюмъ** (*C. macrophyllum*, большелистный). Сиера Леоне. Лл. продолговато-ланцетов. на нижней сторонѣ золотисто-пушистые. Рѣдкое, но чрезвычайно красивое р. 50 ф.

**ХРУСТАЛЬНАЯ ТРАВКА** См. Мезембриантему.

**ХРУЩЪ** (*Melolontha*). Жукъ, личинка котораго, живя по нѣскольку лѣтъ въ землѣ, питается корнями и наноситъ громадный вредъ. Наиболѣе опасный хрущъ—майскій.

**ХРЪНЪ**. См. Кохлеарія.

**ХРЯПЯ**. См. Гданская груша.

**ХРЯЩЪ**. Крупный песокъ.

**ХУАЗІЯ**. См. Шуазія.

**ХУАНУЛЬЛОА** (*Juanulloa*). *Хуанъ* и *Антоніо Уллоа* (*Juan et Antonia Uloa*) два испанскіе путешественника по Перу и Чили. С. пасленовыхъ. (7). Цент. Америка, Перу, Чили. Тепл. эпифитные куст. рр. Грубая торф. Черенками въ пескѣ, въ парникѣ.

**Х. паразитика** (*J. parasitica*, чужелюдная). Перу. Цв. оранжевые, въ май. 3 ф.

**ХУДІЯ** (*Hoodia*). Томасъ *Гудъ* (*Hood*), англійскій юмористъ, † 1845. С. ласточниковыхъ. (3). Ангола и Ю. Африка. Оранж. сочныя многол. рр. Глин. дерн., песку и толченого кирпичу по ровну. Черенками изъ молодого роста, срѣзаннаго какъ можно ближе къ стеблю. Ихъ просушить нѣсколько дней на солнцѣ, потомъ посадить и держать едва влажно. Темп. лѣтомъ 16—26, зимой 13—17°, постоянно на солнцѣ.

**Х. Байніи** (*H. Bainii*, Байна). Кару. Цв. тускло-желтые, въ июль. **Х. Гордони** (*H. Gordonii*, Гордона). Оранжевая рѣка. Цв. блѣдно-бурые.

**ХУДСОНІЯ** (*Hudsonia*). У. *Худсонъ* (*Hudson*)—лондонскій аптекаръ, авторъ «*Flora Anglica*», † 1793. С. ладонниковыхъ. (3). С. Америка. Полувынос. куст. рр. Торф. или песчан. Отводками или черенками изъ вырѣзавшаго роста, въ пескѣ, въ парникѣ.

**Х. эрикоидесъ** (*H. ericoides*, похожая на Эрику). Отъ Мейна до Виргиніи. Цв. желтые, съ мая до іюля.

**ХУЛЬЕТІЯ** (*Houletia*). *Хулле* (*Houlet*)—французскій садоводъ. С. орхидей. (6). Колумбія, Бразилія. Теплич. эпифит. орхидей. Торф. съ древесн. углемъ. Дѣленіемъ луковицъ при началѣ роста. Темп. лѣтомъ 13—26, зимой 8—12°.

**Х. одоратиссима** (*H. odoratissima*, самая душистая). Антиоквія. Цв. темно-оранжевые съ бѣлою губой. 1½ ф. **Х. пікта** (*H. picta*, расписная). Новая Гренада. Цв. коричневыя.

**ХУМЕЯ** (*Humea*). Лэди *Хюма* (*Hume*). С. сложноцвѣтныхъ. (4). Австралія. Двудлѣт. трав. или кустар. оранж. рр. Сильная глин. дер. съ перегноемъ и древ. углемъ. Сѣменами. весной, въ теплѣ.

**Х. элегансъ** (*H. elegans*, изящная). Цв. головки красно-коричневыя, лиловые или красно-розовыя, съ іюля до октября. 5—6 ф. По вѣжности, въ грунтъ высаживается не ранѣе конца мая.

**ХУМУЛЮСЪ** (*Humulus*). Отъ *humus*—зелень: рр. стелются, если имъ не подставить опоры. С. крапивныхъ. (2). Европа, Азія, С. Америка, Китай. Японія. Многол. вынос. зыющія рр. Глин. дерн. глубокая. Сѣменами и дѣленіемъ, весной.



**Х. люпулюсъ** (H. Lupulus, Хмѣль). Умѣр. Европа, Азия, С. Америка. Цв. зеленовато-желтые, лѣтомъ. Имѣетъ много сортовыхъ разновидностей.

**ХУННЕМАННІЯ** (Hunnemannia). *Хуннеманнъ* (Hunnemann), англійскій ботаникъ и коллекторъ. † 1837. С. маковыхъ. (1). Мексика. Многол. полувыносл. трав. р. Сильная з. Съеменами.

**Х. фумариѳолия** (H. fumariaefolia, съ лл. Дымянки). Цв. желтые, съ іюля до октяб. 2—3 ф.

**ХУРА** (Hura). Мѣстное американское названіе. С. молочайныхъ. (3). Тропич. Америка. Телнич. дрв. рр. Сильная гли. дерн. съ торф. Черенками въ песокъ и парникъ.

**Х. крѣпитансъ** (H. crepitans, трескающаяся). Цв. красноватые. 30—40 ф. Р. имѣетъ бѣлый млечный, очень ядовитый сокъ.

**ХУРМА**. См. Дюсирость.

**ХУТТЕА** (Houttea). *Луи Ван Гуттъ* (Van Houtte)—пѣзвѣстный бельгійскій садоводъ, † 1883. С. геснерійныхъ. (3). Бразилія. Телн. куст. рр. Ухоть какъ за Геснера.

**Х. Гарднери** (H. Gardneri, Гарднера). Цв. красные, съ августа по октябр. 2 ф.

**Х. пардина** (H. pardina, пятнистая какъ леопардъ). Цв. оранжевые, съ августа по октябр. 1½ ф.

**ХУТТЮИНИЯ** (Houttuynia). *Хуттунъ* (Houttuyn)—знаменитый амстердамскій виртуозъ. С. перцовыхъ. (3). Калифорнія, Гималаи, Китай, Японія. Оранж. многол. трав. рр. Легкая сильная земля. Дѣленіемъ и съеменами.

**Х. кордата** (H. cordata, сердцевидная). Японія. Цв. обертка, похожая на вѣшникъ, бѣлая; лл. сердцевидные.

**ХУЭРНИЯ** (Huernia) Юстусъ *Хуерниусъ* (Huernius)—одинъ изъ самыхъ раннихъ коллекторовъ капскихъ рр. С. ласточниковыхъ. М. Д. Над. Оранж. сочная рр. Ухоть какъ за Станелія.

**Х. бревирострисъ** (H. brevirostris, съ короткимъ остриемъ). Цв. желтоватые съ мелкими крапинками. 6 д. **Х. окулата** (H. oculata, съ глазками). Цв. внутри бѣлые, трубка вѣнчика почти полушаровидная, лѣтомъ. 3—4 д.

**ЦАЛЮЦАНСКІЯ** (Zaluzianskia). Адамъ *Цалюцанскій* (Zaluziansky); врачъ въ Прагѣ, написавшій въ 1602 г. «*Methodus herbariae*». С. поричниковыхъ. (16). Ю. Африка. Оранж. одно-и многол. трав. или полукуст. рр. Песков. гли. дерн. съ торф. Съеменами.

**Ц. капензисъ** (Z. capensis, съ М. Д. Н.) Мысъ Д. Н. Цв. бѣловатые, весной. Стебель съ мелкими волосками. Полувын. однол.

**ЦАЛЯККА И САЛЯККА** (Zalacca). Такъ называется на Молуккскихъ о. С. пальмъ. (8). Телн. рр. Ассамъ, Малайскій архип. Ухоть какъ за Цикасъ.

**Ц. едудисъ** (Z. edulis, съдобная); Малайскій архип. Лл. перистые, прямые съ длинными колочками, перья линейно-ланцетовидныя. Сил. **Ц. Вьюмѣна** (Z. Blumeana). **Ц. Вальлихана** (Z. Wallichiana, Вальлихова). Индія. Лл. перистые, перья пучками, черешки съ колочками.

**ЦАМИОКУЛЬКАСЪ** (Zamioculcas). Составлено изъ названій *Цаміа* (цикадейнаго р.) и *кульказія* (ароиды); на оба р. походить. С. ароидей. (2). Вост. часть тропич. Африки. Телн. многол. трав. рр. Песков. гли. дерн. съ листовою и мелкими кусками дрв. угля. Дѣленіемъ корня. Темп. зимой 13—17, лѣтомъ 15—24°.

**Ц. Боавини** (Z. Boivini, Буавена). Цв. съ грязно-желтоватымъ чехломъ внутри и зеленоватымъ снаружи; л. единственный, трех-угольно-овальный. Сил. *Gonatopus Буавини* (Gonatopus Boivini). **Ц. Лоддигесіи** (Z. Loddigesii, Лоддигеса). Чехолъ зеленый. Лл. перистые. Сил. *Калладіумъ цаміѳолиумъ* (Caladium zamiaefolium).

**ЦАМІЯ** (Zamia). *Zamia*—потерянный. Плиний называлъ такъ безплодная еловыя шишки, а Линней пригвоздилъ это названіе къ безплодному плодоношенію этихъ рр. С. цикадейныхъ. (30). Телн. или оранж. рр., напоминающія и пальмы и папоротники. Тропич. Америка, Вестиндія, Ю. С. А. Штаты. Хорошая гли. дерн. пополамъ съ торф. и съ добавленіемъ песку. Дѣленіемъ скученныхъ стеблей; съеменами и отростками Темп. зимой не ниже 13, лѣтомъ 13—22°.

**Ц. амплиѳолия** (Z. amplifolia, обильно-лиственная). Колумбія. Лл. прямые, листовичи двупарные, черешки пурпуровые. **Ц. Вальлизи** (Z. Wallisii, Вальлиса). Новая Гренада. Л. единственный, перистый; листовичи ланцетовидные. **Ц. калоккома** (Z. calocoma, съ красивыми волосками). Антильскіе о. Лл. длиною въ 3 ф. съ мелкими волосками, листовичи очерченные, числомъ до 8 на каждой сторонѣ. Стволъ низкій. Сил. *Микроцикасъ калоккома* (Microcycas calocoma). **Ц. пикта** (Z. picta, росписная). Мексика. Листочки съ бѣлыми пятнышками. **Ц. фурфурacea** (Z. furfuracea, мелко-пушистая). Мексика. Листочки отъ 10 до 13 на каждой сторонѣ, овальныхъ или тупо-ланцетовидныхъ. Стволъ цилиндрическій.

**ЦАНТОКСИЛЮМЪ** (Zanthoxylum). *Xanthos*—желтый и *xylon*—древе-

сина, по цвѣту корней. С. рутовыхъ. (80). Телн. или оранж. куст. и дрв. рр. тропич. странъ. Ухоть какъ за Цидифусъ.

**Ц. ароматикумъ** (Z. aromaticum, ароматическій). Ямайка. Цв. зеленоватые, въ апрѣлѣ. 20 ф. Телн. дерево. **Ц. нитидумъ** (Z. nitidum, блестящій). Китай. Цв. зеленоватые, въ маѣ, 10 ф. Оранж. кустъ.

**ЦАРСКАЯ ГРУША**. Средней величины, желтоватая съ румянцемъ, мягкотѣлая, пріятнаго вкуса.

**ЦАРСКІЙ ШИПЪ**. См. Сквозница длинная. **Ц. ш. сладкій**. Яблоко формою похожее на обыкновенный царскій шипъ, но болѣе сладкаго вкуса; тоже ранній сортъ.

**ЦАРСКІЯ КУДРИ**. См. Лиліумъ Мартагонъ.

**ЦАУШНЕРІЯ** (Zauschneria). *Цаушнеръ* (Zauschner)—пѣмецкій ботаникъ. С. онагряковыхъ. (1). Оранж. куст. Всякая легкая. Черенками изъ молодого роста, въ сентябрѣ, въ парникъ; дѣленіемъ и съеменами весной.

**Ц. калифорника** (Z. californica, калифорнскій). Калифорнія и Мексика. Цв. ярко-красные, лѣтомъ и осенью. 1 ф.

**ЦАЦИНТА** (Zacintha). Впервые р. найдено на о. Цантъ, древнемъ Zacinthus. С. сложноцвѣтныхъ. (1). Однол. трав. р.

**Ц. верруккоза** (Z. verrucosa, бородавчатая). Средиземн. побережье. Цв. головки желтыя, лѣтомъ. 6—12 д.

**ЦВѢТЕНЬ** (муж. р.). Цвѣточная пыльца тычинокъ, оплодотворяющая завязь въ пестикъ.

**ЦВѢТКОВЫЙ**. См. явнотрачный.

**ЦВѢТНИКЪ**. Клуба, мѣсто въ саду, засаженное цвѣтами.

**ЦВѢТНОСТЬ** частей растенія бываетъ. I. *бѣлая* (чистая, серебристая, млечная, мѣловая); II. *черная* (какъ уголь, черно-бурая, воронова крыла); III. *стран* (пепельная, сѣровая, дымчатая, мышиная); IV. *коричневая* (каштановая, рыжая, ржавая, пещочная); V. *красная* (гранатовая, огненная, розовая, тѣлесная, пурпуровая, киноварная, суриковая, кирпичная, кровавая, красно-коричневая, мѣдно-красная); VI. *голубая* (вазильковая, лазуревая, фиолетовая, лиловая, стальная); VII. *желтая* (лимонная, канареечная, палевая, бланжевая, желточная, шафрановая, оранжевая, блеклая, грязно-желтая) и VIII. *зеленая* (изумрудная, сизая, бирюзовая и оливковая).

**ЦВѢТОКЪ. ЦВѢТОЧЕКЪ**. Собраніе нѣсколькихъ (обычно четырехъ) колець изъ измѣненныхъ листьевъ: наружное кольцо образуетъ *чашечку*, второе—*ты-*

*чикъ*, а третье и четвертое—*тычики* и *пестики*.

**ЦВѢТОЧНИКЪ**,—**НИЦА**. Кто разводитъ цвѣты или торгуетъ ими; также кто дѣлаетъ искусственные цвѣты.

**ЦВѢТОЧНИЦА КАПУСТНАЯ** (Anthomyia brassicae). Муха, которая весной кладетъ лички на капустныя растенія; вылупившіяся изъ нихъ лички углубляются въ корень и тѣмъ губятъ растенія,—капусту, рѣпу, рѣдку.

**ЦВѢТЫ.ВѢНЦЫ**. См. Фритиллярія.

**ЦѢА** (Zea). *Zea* и *Zeia*—древне-греческія названія просо или другого хлѣбнаго р. С. злаковъ. (1). Америка. Всякая хорошая земля. Съеменами.

**Ц. майсъ** (Z. Maïs, Кукуруза). Разводится въ огромныхъ размѣрахъ по теплымъ и умереннымъ странамъ. Цв. однополоыми колосьями, женскіе большими, многорядными, въ іюнѣ. Имѣетъ разновидности *грацильнѣйша* и *варіеата* (gracillima et variegata).

**ЦЕАНОТУСЪ** (Ceanothus). У Диоскорида упоминается растеніе *keanothus*, не имѣющее, повидимому, никакого отношенія къ настоящему. С. крушиновыхъ. (20). Жаркія страны зап. части С. Америки. Телн. и оранж. либо полувыносл. куст. рр. Легкая. Черенками, въ песокъ, въ оранж., оселью, или отводкой.

**Ц. американусъ** (C. americanus, американскій). С. Америка. Цв. бѣлые, мелкіе, въ іюнѣ—іюлѣ. Выносл. **Ц. азуреусъ** (C. azureus, лазуревый). Мексика. Цв. голубые, въ маѣ, 10 ф. Сил. **Ц. биколоръ** и **Ц. перилеусъ** (C. bicolor, C. coerulesus). **Ц. Вейчянусъ** (C. Veitchianus, Вейча). Калифорнія. Цв. ярко-голубые. Выносл. **Ц. дентатусъ** (C. dentatus, зубчатый). Калифорнія. Цв. голубые, въ маѣ—іюнѣ. Выносл. Сил. **Ц. Лоббианусъ** (C. Lobbianus). **Ц. интегерримусъ** (C. integerrimus, съ цѣлыми лл.). Калифорнія. Цв. бѣлые, въ іюнѣ—іюлѣ. Полувыносл. **Ц. кунейтусъ** (C. cuneatus, клинообразный). Верхн. Калифорнія. Цв. блѣдно-голубые, въ апрѣлѣ—маѣ. Сил. **Ц. верруккозусъ** (C. verrucosus). **Ц. ригидусъ** (C. rigidus, жесткій). Калифорнія. Цв. пурпурово-голубые. Полувын. **Ц. флорибундусъ** (C. floribundus, многоцвѣтный). Калифорнія. Цв. ярко-голубые, въ іюнѣ. Выносл.

**ЦЕВРИНА** (Zebrina). Лл. испещренны полосами какъ у зебра. С. коммелиновыхъ. (2). Мексиканскія телн. или оранж. трав. рр. Сильная, легкая. Черенками.

**Ц. пѣндуля** (Z. pendula, поникалая). Цв. бѣлые, лѣтомъ. Стебель пониклый. Сил. *Традесканзія триколоръ*, *Т. зебрина*, *Цеа-*



*notitis vittata* (Tradescantia tricolor, T. zebrina, Ceonotis vittata).

**ЦЕДРАТЬ. ЦИТРОНЪ.** См. Цитрусь.

**ЦЕДРЕЛЯ** (Cedrela). Уменьш. *Cedrus*; древесина пахнет, как кедровая. С. ясенковых. (12) Тепл. и оранж. пр. изъ Азии и троп. Америки. Сильная гни. дерн. Черенками изъ вызрѣвшаго роста въ песокъ, подъ стекломъ и теплѣ. Темп. лѣтомъ 13—20, зимой 8—10°.

**Ц. одората** (C. odorata, пахучая). Канарейскіе о. Цв. тѣлесные, похожие на гіацинтовые, лѣтомъ. 50 ф. Древесина пахнетъ какъ асса-фетиды. **Ц. Тоона** (C. Toona, Тоона). Индія. Цв. бѣлые или малиновые, пахнущіе медомъ, въ марѣ—маѣ. 60 ф.

**ЦЕДРОНЕЛЛЯ** (Cedronella). Уменьш. отъ *kedros*—кедръ. С. губоцвѣтныхъ. (4) Канар. о., С., Америка, Мексика. Полувыносл. трав. пр. Песч. дерн. съ листвою и малымъ кол. торф. Дѣленіемъ и черенками.

**Ц. хордата** (C. cordata, сердцевидная). С. Соед. Шт. Цв. свѣтло-пурпуровые, въ маѣ—іюнь, 4—6 д. **Ц. трифилля** (C. triphylla, трилистная). Канарейскіе о. Цв. бѣлые или блѣдно пурпуровые, въ іюль, лл. имѣютъ пріятный бальзамическій запахъ. 3—4 ф. Куст. полувын. р.

**ЦЕДРУСЪ** (Cedrus). *Kedros*—хвойное дерево со временъ Гомера. С. хвойныхъ. (3) Востокъ, С. Африка, Гималаи. Величественныя деревья съ распростертыми вѣтвями и стволами въ 150—200 ф. Въ умѣренныхъ климатахъ—выносливы.

**Ц. атлантика** (C. atlantica, атлантискій). На горахъ Атласа въ Алжирѣ. Хвоя короче, чѣмъ у др. видовъ, сизоватая, 80—120 ф. **Ц. Либани** (C. Libani, ливанскій). Ливанскіи и Таврскіи горы въ Сиріи. Лл. жесткіе, пучками, темно-зеленые. 60—80 ф.

**ЦЕЗАЛЬПИНИЯ** (Caesalpinia). Андреевъ *Цезальпинусъ* (Caesalpinus)—знаменитый итальянскій ботаникъ. С. бобовыхъ. (40) Жаркій страны. Тепл. дерев. и куст. пр. Сѣменами и черенками въ песокъ, на прогрѣтомъ грунтѣ. Глини. дерн. съ торф. Темп. лѣтомъ 12—19, зимой 8—10°. Въ садахъ рѣдко встрѣчаются, п. ч. требуютъ много мѣста.

**Ц. бразиліензисъ** (C. brasiliensis, бразильская). Бразильское сандальное дерево *Бразилетта*. Бразилія. Цв. оранжевые. **Ц. саппанъ** (C. Sappan, Саппанъ). Тропич. Азія. Цв. желтые. 40 ф.

**ЦЕЙКСИНА** (Zeuxina). *Zeuxis*—соединеніе, по сродности лепестковъ съ верхнею долею чашечки. С. орхидей. (76) Остиндія, Малайскій архипелагъ, троп. Африка. Тепл. зеленая пр. Уходъ какъ за Анѣктохилусъ.

**Ц. рѣгія** (Z. regia, царская). Борнео. Цв. бѣлые съ зеленымъ; лл. съ темно-зеленымъ краемъ и широкою свѣтло-лиловою или бѣловатою полоскою, доходящею до середины. 5 д. Сип. *Анѣктохилусъ линейтусъ*, *Монохилусъ рѣгіумъ*, *Ханлохилусъ рѣгіумъ* (Anectochilus lineatus, Monochilus regium, Harlochilus regium).

**ЦЕКРОПІЯ** (Cecropia). *Cecrops*—Кекропъ, первый царь афинскій; Афини прежде назывались *Cecropia*. С. крапивныхъ. (40) Троп. Америка. Тепл. дерев. пр. Глини. дерн. съ торф. и пескомъ. Черенками изъ полувызрѣвшаго роста, въ песокъ, влажн. теплѣ. подъ стекломъ. Темп. лѣтомъ 13—24, зимой 7—12°.

**Ц. пельтата** (C. peltata, со щитовидными лл.). Ямайка. Цв. двуполые; лл. большіе, щитовидные. 30 ф.

**ЦЕЛЕСТИНА** (Coelestina). *Coelestis*—небесный, по лазурнымъ цв. С. сложн. цвѣтныхъ. Въ настоящее время родъ слитъ съ Агератумъ. Полувыносливыя, оранж. многол. трав. пр. Обыкновенная садовая. Сѣменами и черенками, весною, въ парникѣ.

**Ц. агератоидесъ** (C. ageratoides, похожая на Агератумъ). Нов. Испанія. Цв. голубки голубыя, въ іюль до октября. 1 ф.

**ЦЕЛІОПСИСЪ** (Coeliopsis). *Coelia* и *opsis*—похожіи на Целію. С. орхидей. Теплич. эпифиты, требующія такого же ухода, какъ Эпидендумъ.

**Ц. гіацинтосма** (C. hyacinthosma, съ запахомъ гіацинта). Панама. Цв. бѣлые съ оранжевымъ, съ запахомъ какъ у гіацинта.

**ЦЕЛІЯ** (Coelia). *Koilos*—пустой, полный, по пальцеватымъ массамъ, снаружи выпуклымъ, внутри вогнутымъ. С. орхидей. Теплич. эпифиты изъ Вестиндіи и Мексики. (5) Торфяникъ, съ торфян. з. и древесн. углемъ. Темп. во время роста 13—26, въ другое время 10—13. Дѣленіемъ.

**Ц. Вауеріана** (C. Baueriana, Вауера) Вестиндія. Цв. бѣлые, душистые, въ іюнь 1 ф. **Ц. макростахія** (C. macrostachya, длинно-колосая). Гватемала. Цв. красные, въ апрѣлѣ. 1 1/2 ф.

**ЦЕЛОГИНЕ** (Coelogyne). *Koilos*—полый и *gune*—женщина, по пестику. С. орхидей. (50) Остиндія, Малайск. арх. южн. Китай. Теплич. эпифиты; хотя большинство—тепло-оранж. или умѣренно теплич.: требуя для развитія нѣсколько высшей температуры, бываютъ во время цвѣтенія и покоя здоровѣе въ болѣе умѣренной. Торф. мохъ пополамъ съ волокн. торф. и нѣк. количествомъ песку.

**Ц. асперата** (C. asperata, жестковатое). Борнео. Цв. бѣлые, губа съ шоколадными пятнами и желтыми черточками. 2 ф. Нуж-

дается съ просторной посудой и теплич. содержаніи. **Ц. барбата** (C. barbata, борода-тая). Ассамъ. Цв. бѣлые, губа съ коричневыми рѣсничками. Нуждается въ постоянной полнѣ въ время развитія. **Ц. Валихiana** (C. Wallichiana, Валиха). Казія. Цв. розовые, душистые. Низкорослое. Сип. *Плейоне Валихiana* (Pleione Wallichiana). **Ц. вискоза** (C. viscosa, липкая). Индія. Цв. бѣлые, губа съ коричневыми черточками. Видъ рѣдкій. **Ц. Гарднеріана** (C. Gardneriana Гарднера). Казія. Цв. бѣлые; основаніе губы желто-лимонное, зимой, 1 ф. **Ц. Гоуеріи** (C. Gowerii, Гоуера). Ассамъ. Цв. бѣлые, на губѣ три возвышенныя черточки лимоннаго цвѣта; зимой и весной. Холодно-оранж. **Ц. корругата** (C. corrugata, сморщенное). Индія. Цв. бѣлые, губа съ желтымъ пятномъ и оранжевыми жилками, осенью. **Ц. кристата** (C. cristata, гребенчатая). Непаль. Цв. бѣлые, душистые, на губѣ желтое пятно и золотистая каемчатая сѣтка; съ декабря до марта. **Ц. Еумингия** (C. Eumigia, Еуминга). Сингапуръ. Цв. бѣлые, губа желтая, съ бѣлымъ пятномъ по срединѣ. 2 ф. **Ц. магулята** (C. maculata, пятнистая). Казія. Цв. бѣлые, губа съ малиновыми полосками, въ октябрѣ, ноябрѣ. Сип. *Гомфостилусъ candida* и *Плейоне магулята* (Gomphostylis candida et Pleione maculata). **Ц. Массангеана** (C. Massangeana, Массанжа). Цв. желто-охристые, губа каштановая. **Ц. мѣдіа** (C. media, среднѣе). Казія. Цв. бѣлые, губа съ желтымъ и коричневымъ. **Ц. одоратиссима** (C. odoratissima, самое пахучее). Индія. Цв. бѣлые, губа съ желтымъ пятнышкомъ, пахучіе; зимой. **Ц. пандурата** (C. pandurata, банду-рообразное). Борнео. Цв. зеленоватые, губа съ бархатистыми черными валиками, въ іюнь, іюль. **Ц. плантагина** (C. plantagina, съ лл. попутника). Индія. Цв. зеленоватые, губа бѣлая, съ коричневыми полосками. 1 1/2 ф. **Ц. спесиоза** (C. speciosa, отъѣнное). Ява. Цв. оливково-зеленые; губа желтая съ красными и черными жилками. **Ц. сульфуреа** (C. sulphurea, сѣро-желтая). Ява. Цв. зеленовато-желтые, губа бѣлая съ желтыми черточками. **Ц. флюксиды** (C. flaccida, вялое). Непаль. Цв. бѣлые; губа съ желтымъ оттыкомъ и малиновыми черточками, зимой и весной. 1 ф. **Ц. Хукеріана** (C. Hookeriana, Хукерова). Сиккимъ. Цв. розово-пурпуровые съ бѣлымъ, коричневымъ и желтымъ, въ маѣ. 3 д. Сип. *Плейоне Хукеріана* (Pleione Hookeriana). **Ц. Хумилис** (C. humilis, низкое). Непаль. Цв. бѣлые, иногда розоватые, губа бѣлая съ малиновыми и коричневыми пятнышками и черточками. Сип. *Плейоне хумилис* (Pleione humilis). **Ц. цилиата** (C. ciliata, рѣсничатое). Цв. желтые съ бѣлыми и съ бурными пятнышками, осенью. **Ц. Шиллеріана** (C.

Schilleriana, Шиллерова). Мульмейнъ. Цв. желтые, губа съ пурпуровыми пятнышками, въ іюнь. 6 д.

**ЦЕЛОЗІЯ** (Celosia). *Kelos*—сженный, по цвѣтамъ, какъ бы сожженнымъ у пѣкот. видовъ. С. амарантовыхъ. (30) Азія, Африка, Америка. Тепл., оранж. и полувын. обычно однол. пр. Сѣменами въ парникѣ, въ марѣ, затѣмъ по разсадкѣ въ оранж. или теплицѣ, и песокъ или тамъ-же, или на воздухѣ.

**Ц. аргентеа** (C. argentea, серебристая). Тропич. Азія. Цв. бѣлыми колосьями. **Ц. кристата** (C. cristata, гребенчатая). *Плѣтущій гребешокъ*. Азія. Цв. ярко-красные, сжатые колосомъ. Имѣетъ равновидности: *кокцинея* (coccinea) шарлахового цв.; *комоза* (comosa), съ цв. пирамидальными въ пониклыхъ колоскахъ и, наконецъ, съ *пестрыми листьями* (*variegata, variegata*) и цвѣтами какъ у видовой формы. **Ц. Хуттони** (C. Huttonii, Хуттона). Ява. Цв. красные; лл. малиновые. 1—2 ф. Оранж. орнамент., кустистое р.

**ЦЕЛЬСИЯ** (Celsia). Олафъ *Цельсъ* (Celsius)—проф. въ Упсалѣ (1670—1756), авторъ «Hierobotanicon», о библейскихъ пр. С. норичниковыхъ. (30) Южн. Европа, С. Африка, З. Азія. Одно-дву-и многол. трав. оранж., выносл. и полувыносл. пр. Легкая песч. земля. Обычно сѣменами въ парникѣ, весной.

**Ц. Арктурусъ** (C. Arcturgus, Арктурусъ). Кандія. Цв. желтые, крупныя, съ іюля до октября. 4 ф. Полувыносл. куст.; черенками. Содерж. въ оранж. въ горшкахъ. **Ц. крѣтика** (C. cretica, критская). Критъ. Цв. желтые, въ іюнь. 4—6 ф. Двуглѣт. выносл.

**ЦЕЛѢСТРУСЪ** (Celastrus). Названіе, встрѣчаемое у Теофраста. С. целастровыхъ. (20) Индія, Китай, Японія, Сѣв. Америка, Ю. Африка. Тепл., оранж. и выносл., болѣею частью кустар. пр. Глини. дерн. съ торф. и пескомъ. Черенками изъ полувызрѣв. роста, въ песокъ, подъ стекломъ.

**Ц. люцидусъ** (C. lucidus, блестящій). М. Д. Н. Цв. бѣлые. 1—2 ф. Оранж. Сип. *Кассине конкава* (Cassine concava). **Ц. сканденс** (C. scandens, цѣпкій). С. Америка. Цв. бѣлые. Раст. выносл., цѣпляющеся.

**ЦЕНЕРІЯ** (Zehneria). *Ценеръ* (Zehner)—вѣтскій рисовальщикъ растений. С. тыквенныхъ. (15) Тепл. и оранж. распростертыя или цѣпкія пр. Норфолькъ, Перу, троп. и юж. Африка и Азія. Уходъ какъ за Кукурбита.

**Ц. суависъ** (Z. suavis, вѣжная). Ю. Африка. Лл. съ бѣлыми крапичками, желтые. Сип. *Мелотрія пунктата* (Melothria punctata). Оранж. р. **Ц. хастата** (Z. has-



tata, съ кольцевидными лл.). Ява. Лл. узко-копьевидные, жилки съ серебристыми краями Сип *Melothria heterophylla* (*Melothria heterophylla*).

**ЦЕНКОВСКИИ** (*Cienkowskia*). *Л. С. Ценковский*—русский профессор. Сем. нибирных (1). Троп. Африка.

**Ц. Киркии** (*C. Kirki*, Керка). Занзибар. Теплолюб. многол. трав. р., относимое теперь къ Кемпферии. Песч. дерн. съ волокон. торф. и листовой. Длениемъ при началѣ роста. Темп. во время роста отъ 13 до 24, въ состояніи покоя 6 до 10°. Цв. розово-пурпуровые, въ августѣ. 6 д.

**ЦЕНОВІЯ** (*Zenobia*). Знаменитая царница Пальмиры, жившая въ III вѣкѣ. С. вересковых. (1). Америка. Оранж. куст. Песков. глини. дерн. съ торф. Сѣменами и отводкой.

**Ц. специоза** (*Z. speciosa*, особенная). Ю. Соед. Амер. Штаты. Цв. бѣлые, зонтичными пучками, лѣтомъ. 2—4 ф. Сип. *Andromeda cassinefolia* (*Andromeda cassinefolia*) и *A. cneidosa* (*A. speciosa*).

**ЦЕНТАУРЕА** (*Centaurea*). У Диоскорида названа *Kentaurion* Эрнтрее, которую вывелись себѣ рану центавръ Хиронъ, пораженный стрѣлою Геркулеса. С. сложнотѣпных. (400). Европа, С. Африка, Азия, С. Америка. Обыкновенная з. Сѣменами на воздухъ или въ парникъ; болѣе гнѣзныя содержатся въ оранж; пѣк. черенками.

**Ц. альпина** (*C. alpina*, альпійская). Италия. Цв. головки желтыя, въ июлѣ. 3 ф. Вынос. многол. **Ц. атропурпуреа** (*C. atropurpurea*, темно-пурпуровая). Вост. Европа. Цв. головки темно-пурпуровыя, съ іюня до августа. 3 ф. Однолѣт. вын. **Ц. ауреа** (*C. aurea*, золотистая). Юж. Европа. Цв. головки золотисто-желтыя, съ іюля до сентября. 2 ф. Мног. вын. **Ц. бабильоника** (*C. babylonica*, вавилонская). Левантъ. Цв. головки желтыя, мелкія, въ июлѣ. 6—10 ф. Многол. полувынос. **Ц. деальбата** (*C. dealbata*, бѣловатая). Кавказъ. Цв. головки розоватыя, лѣтомъ. 1—1½ ф. Многол. вынос. **Ц. макроцефала** (*C. macroscephala*, крупноголовая). Кавказъ. Цв. головки желтыя, въ июлѣ. 3 ф. Многол. полувын. **Ц. монтана** (*C. montana*, горная). Австрія. Цв. головки голубыя, большія, бывають и бѣлыя, рано лѣтомъ. Полувын. многол. **Ц. рагузина** (*C. Raguzina*, изъ Рагузы). Кандія. Цв. головки желтыя, въ іюнь—июль; лл. бѣлопушистые, перисторазсѣченные. 2 ф. Многол. полувын. **Ц. суавеолентс** (*C. suaveolens*, хорошо пахнущая). Левантъ. Цв. головки желтыя, душистыя. 1½ ф. Однол. **Ц. Фенцліи** (*C. Fenzlii*, Фенцля). Грузія. Цв. головки желтыя, большія. 4 ф. Дву-

лѣт. полувын. **Ц. ціанусъ** (*C. cyanus*, темно-голубая) *Василекъ* Европа. Цв. головки лазуревыя васильковыя, въ іюль. 2—3 ф. Однолѣт. вынос. Цвѣты различной окраски.

**ЦЕНТРАДЕНІЯ** (*Centradenia*). *Kentron*—шпора и *aden*—железа, по железякамъ у пыльниковъ. С. черноустовыхъ. Южн. Амер. Теплолюб. рр. Песчанисто-дерн. съ 2 ч. волокн. торф. Черенками изъ бокового роста рано весной. Темп. лѣтомъ 10—20, зимой 6—10°.

**Ц. грандифолия** (*C. grandifolia*, большелестная). Мексика. Цв. малиновые, въ ноябрѣ. 2 ф. **Ц. розеа** (*C. rosea*, розовая). Мексика. Цв. малиновые, въ январѣ. 1 ф.

**ЦЕНТРАНТУСЪ** (*Centranthus*). *Kentron*—шпора и *anthos*—цвѣтокъ, по вѣничку. С. валеріановыхъ. (8) Средиз. побережье Многол. трав. рр. Обыкновен. з. Сѣменами, весной.

**Ц. макросифонъ** (*C. macrosiphon*, длинно-трубчатый). Красная валеріана Испанія. Цв. розово-карминныя, въ июлѣ. 2 ф. Есть махровая разновидность.

**ЦЕНТРОНІЯ** (*Centronia*). *Kentron*—шпора; по пыльникамъ. С. черноустовыхъ. (9). Тепло. оранж. куст. рр. изъ Мексики, Нов. Гренады, Гвѣаны и Перу. Песч. торф. и лист. Черенками изъ полувызр. роста, въ пѣскѣ, подъ стекломъ.

**Ц. хеманта** (*C. haemantha*, кровавокрасная). Оканья. Цв. темно-краснопурпуровые. 8 ф. Сип. *Calceolaria haemantha* (*Calceolaria haemantha*). Оранж.

**ЦЕНТРОПОГОНЪ** (*Centropogon*). *Kentron*—шпора и *pogon*—борода; по бахромѣ у рыльца. С. колокольчиковыхъ. (80) Южн. Америка, Вестиндія. Тепло. и оранж. трав. мног. рр. Песч. торф. съ волокон. глини. дерн. Длениемъ корней.

**Ц. Люціанусъ** (*C. Lycianus*, Люси). Сад. гибриды. Цв. розово-карминныя, зимой. Теплолюб. **Ц. фастубусъ** (*C. fastuosus*, колокольч.). Цв. розовые, въ ноябрѣ. 2 ф. Оранж.

**ЦЕНТРОСОЛЕНІЯ** (*Centrosolenia*). *Kentron*—шпора и *solen*—трубка, по вѣничку. С. геснерійныхъ. Тропич. Америка. Тепло. трав. многол. рр. Торф., листов. и песокъ по ровну. Зимой почти вовсе не поливать. Черенками, въ пѣскѣ, въ разводочномъ парникѣ.

**Ц. буллата** (*C. bullata*, вздутая). Перу. Цв. блѣдно-желтые, въ іюнь. Сип. *Episcia tessellata* (*Episcia tessellata*). **Ц. пикта** (*C. picta*, росписанная). Берега Амазонской р. Цв. почти бѣлые. 1 ф.

**ЦЕНТРОТЕКА** (*Centrotheca*). *Kentron*—колоть и *theka*—ложе; по волоскамъ

у цвѣтковъ. С. злаковъ. (2). Троп. Африка и Азия, ос. Тихаго Океана. Глин. дерн. съ листов. Сѣменами весной.

**Ц. лаппаца** (*C. lappacea*, войлочная). Индія, Ява. Оранжер. трава въ 2 ф., съ зелеными метелками.

**ЦЕРАЗУСЪ** (*Cerasus*). Утверждаютъ, что р. было вывезено Лукулломъ изъ города Церазуса, въ Азіи. С. розановыхъ. (Вмѣстѣ съ *Prunus*, 80). Европа, Азия, Африка и Америка. Древ. и куст. рр. Сѣменами тотчасъ по вызрѣваніи или весной, прорѣжанными въ прослойкѣ пѣскомъ; тоже отводкой, черенками изъ корней и отпрысками; лучшія разновидности—прививкой. 3. глубокая, песковатая.

**Ц. Авіумъ** (*C. Avium*, птичій). Черешня. Ср. Европа. Цв. бѣлые, вмѣстѣ съ лл., почка продолговатая, безъ листов. чешуекъ; въ апрѣлѣ—маѣ; плоды овальные, черные, съ мякотью приставленною къ косточкѣ. 20—40 ф. Им. форму съ махровыми цв. (*multicaulis*, *multiflex*). **Ц. ацида** (*C. acida*, кислый). Вишня обыкновенная. Европа. Цв. бѣлые, въ апрѣлѣ—маѣ. 6—10 ф. Родоначальная форма нашихъ выносливыхъ вишенъ и между прочимъ владимірской, отличается свободно отдѣляющейся косточкой. Сип. *C. caproniana* (*C. caproniana*). **Ц. дурацина** (*C. duracina*, твердый). Ср. Европа. Цв. бѣлые, вмѣстѣ съ лл., въ апрѣлѣ; плоды сердцевидные; мякоть жесткая и терпкая. 10—20 ф. Съ *C. Авіумъ* произвелъ разновидность *Бигареллы* (*Bigarella*)—родоначальную форму *испанскихъ вишенъ*. **Ц. каролинская** (*C. caroliniana*, изъ Каролины). С. Америка. Цв. большіе, бѣлые. **Ц. лауроперазусъ** (*C. Laurocerasus*, лавровишневый). Левантъ. Цв. бѣлые, въ апрѣлѣ—маѣ. 6—10 ф. Им. много воспитываемыхъ въ садахъ разновидностей. **Ц. люзитанка** (*C. lusitanica*, португальскій). Португалія. Цв. бѣлые, въ іюнь. 10—20 ф. Имѣетъ разн. *муртифолия* (*myrtifolia*) съ мелкими лл., очень красивую. **Ц. махалебъ** (*C. Mahaleb*, душистый). Ю. Европа. Цв. бѣлые, въ апрѣлѣ—маѣ; плоды округлые, черные съ чернымъ горькимъ сокомъ, который даетъ трудно смываемыя пятна; древесина твердая, красная, съ пріятнымъ запахомъ. 10 ф. **Ц. окциденталис** (*C. occidentalis*, западный). Вестиндія. Цв. бѣлые. Тепло. древесное р. 20 ф. **Ц. падусъ** (*C. padus*). Черемуха. Европа. Цв. бѣлые, въ маѣ. 10—30 ф. Имѣетъ нѣсколько красиво-листныхъ разновидностей. **Ц. псевдо-церазусъ** (*C. pseudo-cerasus*, лже-церазусъ). Китай. Цв. бѣлые, въ апрѣлѣ—маѣ. Оранж., употребляемое для гонки. 6—10 ф. Сип. *Prunus paniculata* (*Prunus paniculata*). **Ц. сер-**

**рулата** (*C. serrulata*, съ заточенными лл.). Китай. Цв. бѣлые или розоватые, махровые, въ апрѣлѣ. Оранж. 15 ф. Сип. *C. Sieboldii* (*C. Sieboldii*). **Ц. хамецепазусъ** (*C. chamaecerasus*, дикая вишня). Ср. Европа. Цв. бѣлые, зонтиками, въ маѣ. 2—4 ф. Имѣетъ нѣсколько разновидностей.

**ЦЕРАТИОЛА** (*Ceratiola*). *Keraton*—маленькій рогъ; по рыльцу раздѣльному на четыре рожка. С. водянковыхъ. (1). Полувыносливый кустарникъ. Песчан. торф. съ малымъ колич. волокнистой глини. дерн. Черенками въ пѣскѣ. з. подъ стекломъ.

**Ц. эрикоидесъ** (*C. ericoides*, похожая на верескъ). Флорида, Каролина. Цв. коричневые, въ іюнь. 2 ф.

**ЦЕРАСТИУМЪ** (*Cerastium*). *Keras*—рогъ; у многихъ видовъ плодники похожи на бычачьи рога. С. гвоздичныхъ. (100). Широко распространенныя по земл. поверхности травяни. рр. Земля легкая. Длениемъ.

**Ц. альпинумъ** (*C. alpinum*, альпійскій). Европа. Цв. бѣлые, въ іюнь—июль. 2—4 д. Многол. **Ц. Виберштейни** (*C. Biebersteinii*, Виберштейна). Крымъ. Цв. бѣлые, рано весной. 6 д. Многол. **Ц. Буассьеры** (*C. Boissieri*, Буассье). Испанія. Цв. бѣлые, лѣтомъ. 4—6 д. Многол. **Ц. томентозумъ** (*C. tomentosum*, пушистый). Ю. и В. Европа. Цв. бѣлые, весной; верхніе лл. пушистые. 6 д.

**ЦЕРАТОЛОБУСЪ** (*Ceratolobus*). *Keras*—рогъ и *lobos*—стручокъ, по разнообразному лист. чехлу. С. пальмъ. (2). Ява, Суматра. Тонкоствольныя теплолюб. такого же ухода, какъ за Каламусъ.

**Ц. глянцесценс** (*C. glaucescens*, спозоватый). Ява. Лл. перистые, длиною до 2 ф. Черешки съ тонкими иглами.

**ЦЕРАТОНІЯ** (*Ceratonia*). *Keraton*—рогъ или стручокъ; по стручкамъ. С. бобовыхъ. (1). Средиземное побережье. Оранж. дерн., зимующіе на Ю. Россіи. 3. обыкновенная. Черенками, въ пѣскѣ, подъ стекломъ.

**Ц. силиква** (*C. siliqua*, стручковая). Рожки. Цереградскіе стручки. Цв. красные, маленькіе, въ сентябрѣ. 30—50 ф.

**ЦЕРАТОПЕТАЛОМЪ** (*Ceratopetalum*). *Keras*—рогъ и *petalon*—лепестокъ; лепестки расположены какъ козынь рожки. С. камнеломковыхъ. (2). В. Астралія. Оранж. деревья. Песч. дерноват. Черенками подъ стекломъ. Темп. лѣтомъ 10—20, зимой 2—6°.

**Ц. гуммиферумъ** (*C. gummiferum*, дающій камедь). Нов. Южн. Валлисъ. Цв. желтые, въ іюнь. 30—40 ф.

**ЦЕРАТОПТЕРИСЪ** (*Ceratopteris*)



*Keras*—рогъ и *pteris*—папоротникъ. С. папоротниковыхъ. (1). Тропич. страны.

**Ц. таликтроидесъ** (*C. thalictroides*, похожий на василистникъ). Подъ тропиками въ тихихъ водахъ. Вай сочные, безплодные — простыя, плодоносныя — перистыя. Син. *Parkeria pteroides* (*Parkeria pteroides*). Содержится въ горшкѣ, опушеномъ въ воду. Размнож. спорами весною, во влажной землѣ, тоже отводкой безплодныхъ вай.

**ЦЕРАТОСТЕМА** (*Ceratostema*). *Keras*—рогъ, *stemon*—стебель; по пыльникамъ со шпорцами внизу. С. брусничныхъ. (22). Андскія горы въ Ю. Америкѣ. Тепл. или оранж. куст. рр. Песч. дернов. съ торф. Черенками въ пескѣ подъ стекломъ.

**Ц. специозумъ** (*C. speciosum*, отъинная). Экваторъ. Цв. красно-оранжевые, яркіе.

**ЦЕРАТОЗАМІЯ** (*Ceratozamia*). *Keras*—рогъ и *Zamia*. С. цикадей. (6). Мексика. Тепл. рр. Сильная глян. дерн. съ перегноемъ. Съеменами, отпрысками и дѣленіемъ. Темп. лѣтомъ 13—22, зимой 6—10°. Влажный воздухъ.

**Ц. Кюстеріана** (*C. Kusteriana*, Кюстера). Мексика. Вай перистыя въ 2—4 ф., темно-зеленыя. **Ц. мексикана** (*C. mexicana*, мексиканская). Мексика. Вай перистыя въ 4—6 ф., съ иглистыми черенками. **Ц. Миквеліана** (*C. Miqueliana*, Миквели). Мексика. Вай перистыя, кожистыя; пень тонкій. **Ц. фуско-виридисъ** (*C. fusco-viridis*, рыже-зеленая). Мексика. Вай широко-перистыя, пень съ чешуйками при основаніи лист. черешковъ. Молодые вай шеюладно-бронзового цв.

**ЦЕРБЕРА** (*Cerbera*). По мифологической собакѣ Церберу, вслѣдствіе ядовитыхъ свойствъ рр. С. кутровыхъ. (4). Троп. Азія, Мадагаскаръ, о. Юж. Океана. Тепл. куст. и дрв. рр. Сильная глян. дерн. Черенками изъ молодого роста, въ апрѣлѣ, въ пескѣ подъ стекломъ, на теплой грядкѣ. Темп. лѣтомъ 13—22, зимой 7—10°.

**Ц. Мангасъ** (*C. Manghas*, Мангасъ). Перу. Цв. бѣлые, съ малиновой серединой, въ июлѣ до сентябрю. 20 ф.

**ЦЕРЕУСЪ** (*Cereus*) *Cereus*—воскъ; по гибкости иглъ у шкъ. и по ровному, какъ восковая свѣча, росту др. С. кактусовыхъ. (100). Троп. Америка. Вестиндія. Рр. тепличныя, но требуютъ только жаркой темп. когда дѣлаютъ ростъ, а потомъ могутъ выносить и значительно меньшее тепло, если только держать сухо. Песч. дерн. съ волокни. торф. пополамъ съ шпукатуркой и коровьимъ перегноемъ. Черенками во всякое время, изъ молодого роста лучше; нижняя часть черенка должна быть проявлена; вмѣсто втыканія —

класть между углемъ съ лист. землей, черепками и шпукатуркой. Во время роста и цвѣтенія поливать обильно Темп. лѣтомъ 10—24, зимой 3—8°.

**Ц. грандифлорусъ** (*C. grandiflorus*, крупноцвѣтный). Вестиндія. Цв. внутри желтые, въ июлѣ—августъ. Въ полномъ цвѣту только въ продолженіе шести часовъ; начинаютъ распускаться между 7—8 ч. вечера, въ полномъ цвѣту около 11 ч. вечера, а къ 3—4 ч. начинаютъ завядать. Пахнутъ сильно и приятно. **Ц. Макдональдія** (*C. Macdonaldiae*, Макдональда). Гондурасъ. Цв. ярко красные съ оранжевымъ, раскрываются ночью, въ июлѣ. **Ц. коцинеусъ** (*C. coccineus*, киноварный). Бразилія. Цв. красно шарлаховые, большіе, въ сентябрѣ. **Ц. квадрангулярисъ** (*C. quadrangularis*, четырехгранный). Вестиндія. Цв. бѣлые, распускаются ночью, пахучие. **Ц. пентагонусъ** (*C. pentagonus*, пятиугольный). Ю. Америка. Цв. бѣлые, въ июлѣ. 3 ф. **Ц. серпентинусъ** (*C. serpentinus*, змѣевидный). Ю. Америка. Цв. пурпуровые съ бѣлымъ, р. ползучее. 3—4 ф. **Ц. специозиссимумъ** (*C. speciosissimus*, отъинный). Мексика. Цв. большіе, шарлаховые, внутри фиолетовые. 3—6 ф. **Ц. фимбриатусъ** (*C. fimbriatus*, бахромчатый). Сантьяго-Доминго, Цв. розовые. 18—25 ф. **Ц. флагеллиформисъ** (*C. flagelliformis*, тонко-вѣтвистый). Перу. Цв. красные или малиновые, въ мартѣ. **Ц. фюльгидусъ** (*C. fulgidus*, красивый). Троп. Америка. Цв. шарлахово-оранжевые съ металлическимъ блескомъ.

**ЦЕРИНТЕ** (*Cerinth*). *Keros*—воскъ и *anthos*—цвѣтокъ; на цвѣты въ изобиліи налетаютъ пчелы. С. бурачниковыхъ. (4). Европа, 3 Азія, С. Африка. Одно- или двул. воздушн. рр. 3. обыкновен. Съеменами весной.

**Ц. майоръ** (*C. major*, большое). *Бородавникъ*. Швейцарія. Однол. Цв. желтые, въ июлѣ. 1 ф. **Ц. макулата** (*C. maculata*, пятнистое). Ю. и В. Европа. Многол. Цв. желтые съ пятно темными пурпуровыми пятнами, въ июлѣ. 1—1½ ф. **Ц. майоръ** (*C. minor*, меньшее). *Восчанка*. Ср. и Ю. Европа. Однол. Цв. желтые, въ июлѣ. 1—1½ ф. **Ц. реторта** (*C. retorta*, завернутая). Греція. Однол. Цв. желтые съ фиолетовымъ краемъ, въ июлѣ. 1½ ф.

**ЦЕРКОКАРПУСЪ** (*Cercocarpus*). *Kerkis*—воланъ, *karpos*—плодъ; по формѣ плода. С. розановыхъ. (5). Калифорнія, Мексика. Оранж. кустар. или дрв. рр. Глян. дерн. съ торф. Черенками корней въ пескѣ, подъ стекломъ. Темп. зимой 4—6°.

**Ц. фотергиллоидесъ** (*C. fothergilloides*, похожий на Фотергилла). Мексика. Цв. пурпуровые, въ маѣ. 12 ф.

**ЦЕРОКСИЛОНЪ** (*Ceroxylon*) *Keros*—воскъ и *xylon*—дерево; пень покрытъ восковымъ слоемъ. С. пальмъ. (2). Анды Нов. Гренады и Венецуелы. Оранж. дрв. рр. Глян. дерн. пополамъ съ торф. Съеменами.

**Ц. андикола** (*C. andicola*, съ Андскихъ горъ). Нов. Гренада. Лл. перистыя въ 2 до 12 ф. 50 ф.

**ЦЕРОПЕГІЯ** (*Ceropegia*). *Keros*—воскъ и *pege*—фонтанъ; по восковой наружности цв. С. ласточкинковыхъ. (50). Троп. и Ю. Африка, Остиндія, Малайск. арх., троп. Австралія. Часто цѣпкія, иногда клубневые, тепл. и оранж. трав. рр. Песч. дерн. волокни. торф. съ малымъ колич. лист. и съ дрв. углемъ. Черенками изъ бокового роста, въ апрѣлѣ, въ пескѣ, подъ стекломъ, на нагрѣтомъ грунтѣ. Темп. лѣтомъ 10—22, зимой 6—10°.

**Ц. Барклии** (*C. Barklyi*, Баркли). Ю. Африка. Цв. маленькіе, розовато-малиновые, въ маѣ. Клубневое. Оранж. **Ц. Гарднеріи** (*C. Gardnerii*, Гарднера). Цейлонъ. Цв. бѣлые съ пурпуровыми пятнами. Цѣлое оранж. р. **Ц. Сандерсоны** (*C. Sander-soni*, Сандерсона). Наталь. Цв. блѣдно-зеленые съ темно-зелеными жилками и крапинками. Оранж. **Ц. Твайтесіи** (*C. Thwaitesii*, Твайтеса). Цейлонъ. Цв. желтые съ темными кроваво-красными пятнышками. Тепл. **Ц. элегансъ** (*C. elegans*, изящная). Индія. Цв. пурпуровые. Тепл.

**ЦЕРЦИСЪ** (*Cercis*). Название, встрѣчаемое у Теофраста. С. бобовыхъ. (4). Юж. Европа, Азія, Японія, С. Америка. Полувыносл. или оранж. дрв. рр. Глубокая, песч. Съеменами весной и отводкой.

**Ц. канадѣнзисъ** (*C. canadensis*, канадскій). Канада. Цв. красные, въ маѣ. 12—20 ф. **Ц. силикваструмъ** (*C. siliquastrum*, стручковый). *Иудино дерево*. Ю. Европа. Цв. ярко-пурпуровые, въ маѣ. 20—30 ф. **Ц. хинѣнзисъ** (*C. chinensis*, китайскій). Китай, Японія. Цв. малиновые.

**ЦЕСПЕДЕЗІЯ** (*Cespedesia*). *Хуанъ Марія Цеспедесъ* (Juan Maria Cespedes)—священникъ въ Санта-Фе де Богота С. охновыхъ. Теплич. дерево, похожее на Теофраста. Уходъ, какъ за Охна.

**Ц. Бонпландіи** (*C. Bonplandii*, Бонплана). Троп. Америка. Цв. желто-оранжевые, дл. очень большіе.

**ЦЕСТРУМЪ** (*Cestrum*). *Kestron*—греческое названіе одного р. С. пасленовыхъ. (100). Жаркія страны Америки. Теплич., оранж. и полувыносл. куст. рр. Довольно сильная глян. дерн. съ торф. Черенками, въ апрѣлѣ, въ пескѣ и теплѣ.

**Ц. ауранціакумъ** (*C. aurantiacum*, оранжевый). Гватемала. Цв. оранжевые, въ августѣ. 4 ф. Оранж. **Ц. Ньювелли**

(*C. Newelli*, Ньювелли). Цв. ярко-малиновые. Оранж. Син. *Хабротамнусъ Ньювелли* (*Habrothamnus Newelli*). **Ц. розеумъ** (*C. roseum*, розовый). Мексика. Цв. розовые, въ июлѣ. 4 ф. Оранж. Син. *Хабротамнусъ розеусъ* (*Habrothamnus roseus*). **Ц. фасцикулатумъ** (*C. fasciculatum*, пучечный). Мексика. Цв. красно-пурпуровые. Оранж. 5 ф. Син. *Хабротамнусъ фасцикулатусъ* (*Habrothamnus fasciculatus*). **Ц. элегансъ** (*C. elegans*, нарядный). Мексика. Цв. красно-пурпуровые, лѣтомъ. Оранж. Син. *Хабротамнусъ элегансъ* (*Habrothamnus elegans*).

**ЦЕФАЕЛИСЪ** (*Cephaelis*). *Kephale*—голова, по расположенію цвѣтовъ. С. маревыхъ. (70). Троп. страны. Тепл. куст. или трав. многол. рр. Песч. волокни. торф. съ листов. и глян. дерн. Черенками изъ молодого роста, въ пескѣ, въ разводочномъ парникѣ.

**Ц. ипеакауана** (*C. Ipecacuanha*, Ипеакауана). Бразилія. Цв. бѣлые, снаружи пушистые. 6 д. **Ц. томентоза** (*C. tomentosa*, пушистый). Троп. Америка. Цв. коричневые. 4 ф.

Оба рр. тепличныя. Темп. лѣтомъ 13—21, зимой 8—10°.

**ЦЕФАЛОТАКСУСЪ** (*Cephalotaxus*). *Kephale*—голова. *Taxus*—тисъ, по сходству съ послѣдними деревьями С. хвойныхъ. (4). Японія, Китай. Въ углѣ. Европ. выносл. рр. Мѣсто защищенное. 3. обыкновен. Съеменами и черенками въ августѣ, въ песч. землѣ, подъ стекломъ.

**Ц. друпадеа** (*C. drupacea*, ягодный). Японія. Лл. желтоватые на верхней, свѣлые — на нижней сторонѣ, плоды пурпуровые. 6—8 ф. Син. *Ц. коріакса*, *Ц. дѣминда* (*C. coriacea*, *C. foeminea*) и *Подокартусъ коріакса* (*Podocarpus coriacea*). **Ц. педункулатъ** (*C. pedunculata*, подпертый). Японія. Лл. ярко-зеленые на верхней и съ двумя свѣлыми полосками на нижней сторонѣ. Плоды большіе, ягодные, на длинныхъ ножкахъ. 4—8 ф. Син. *Таксусъ синѣнзисъ* (*Taxus sinensis*). Имѣть разновидности: *сфѣралисъ* (*sphaeralis*) и *фостиніата* (*foetida*), *Таксусъ японика* (*Taxus japonica*) и *Подокартусъ коріакнусъ* (*Podocarpus coriarius*).

**ЦЕФАЛОТУСЪ** (*Cephalotus*). *Ке- phalotes*—головчатый, по собраннымъ нитямъ. С. камнеломковыхъ. (1). Ю.-З. Австралія.

**Ц. фолликулярисъ** (*C. follicularis*, мѣшчатый). Въ болотахъ Австраліи. Цв. мелкіе, бѣлые; лл. прикоренные, частію плоскіе, частію раздутые мѣшками, длиною отъ 1 до 3 д., темно-зеленаго цвѣта съ пурпуровымъ оттѣнкомъ и крышечкою съ красновато-малиновыми жилками. 2—3 ф.



Рубленый торф. мохъ съ торф. землей и черенками на хорошемъ дренажѣ. Держать подъ колпакомъ, чаще обтирая потъ. Отпрысками. Темп. лѣтомъ 13—20, зимой 8—10°.

**ЦЕФАЛАНТУСЪ** (*Cephalanthus*). *Kerphale*—голова и *anthos*—цвѣтокъ, по расположению цвѣтовъ. С. мареновыхъ. (6). Азія и Америка. Кустар. выносливы въ умѣр. климатъ рр., предпочитающія сырыя мѣстности, съ песчан. торф. Отводками рано осенью.

**Ц. окциденталис** (*C. occidentalis*, западный). С. Америка. Цв. желтоватые, въ июль. 7 ф.

**ЦЕФАЛАНТЕРА** (*Cephalanthera*). *Kerphale*—голова и *anthera*—пыльник. С. орхидей. (10). Европа, умѣр. Азія, С. Америка, С. Африка. Вынос. и полувынос. земныя орхидеи, нуждающіяся въ глини. дерн. з. съ примѣсью известковой. Дѣленіемъ.

**Ц. грандифлора** (*C. grandiflora*, крупноцвѣтная). Ср. Европа. Цв. бѣлые, губа желтая, въ май—июнь. 1—2 ф. **Ц. рѣбра** (*C. rubra*, красная). Ср. Европа. Цв. розово-пурпуровые, губа бѣлая, въ июль. 10—18 д.

**ЦЕФАЛАРИЯ** (*Cephalaria*). *Kerphale*—голова; по расположению цвѣтовъ. С. ворсянковыхъ. (24). Европа, Запад. Азія, С. Африка. Одно- и многол. трав. рр., сродныя съ Дитакусъ, и одного ухода.

**Ц. тартарика** (*C. tartarica*, татарская). *Свербежница*. Кавказъ, югъ Россіи. Цв. головки желтыя, большія, лѣтомъ. 5—6 ф. Многол.

**ЦЕФИРАНТЕСЪ** (*Zephyranthes*). *Zephyros*—восточный вѣтеръ и *anthos*—цвѣтокъ. С. амариллисовыхъ. (30). Жаркія страны Америки, запад. часть троп. Африки. Теплич. и оранж. лукович. рр. Глин. дерн. съ пескомъ и перегноемъ. Отпрысками, или сѣменами. Каждые два года пересаживать.

**Ц. Андерсона** (*Z. Andersoni*, Андерсона). Монте-Видео. Цв. золотисто-или мѣдно-желтые съ красноватымъ низомъ, въ май. Оранж. р. Снн. *Хабрантусъ Андерсона* (*Habranthus Andersoni*). **Ц. Атамаско** (*Z. Atamasco*, Атамаско). Виргинія. Цв. бѣлые съ пурпуровымъ или тѣлеснаго цв. отливомъ, въ май. Снн. *Амариллисъ атамаско* (*Amaryllis Atamasco*). Одинъ изъ наиболѣе выносливыхъ видовъ. **Ц. кандида** (*Z. candida*, бѣлый). Буеность-Айресъ. Цв. бѣлые, у основанія зеленоватые, въ сентябрь. Снн. *Амариллисъ кандида* (*Amaryllis candida*). **Ц. карината** (*Z. carinata*, съ килемъ). Мексика. Цв. зеленоватые, въ май. Почти выносливое р. **Ц. розеа** (*Z. rosea*, розовый). Куба. Цв.

розовые, въ май. Р. полувывосливое. **Ц. цитрина** (*Z. citrina*, желто-лимонный). Троп. Америка. Цв. ярко-желтые, въ августъ.

**ЦЕХСМЕНИЯ** (*Zixmenia*). Анаграмъ *Ximenesia*. С. сложноцвѣтныхъ. (25). Тепл. или оранж. многол. трав., либо куст. рр. изъ жаркихъ частей Америки. Велкая сильная. Черенками въ песокъ, подъ стекломъ, въ теплѣ.

**Ц. ауреа** (*Z. aurea*, золотистая). Мексика. Цв. головки золотисто-желтыя, въ сентябрь. 1½ ф. Снн. *Вербзина ауреа*, *Ведмля ауреа* (*Verbesina aurea*, *Wedelia aurea*). **Ц. овата** (*Z. ovata*, съ овальными лл.). Мексика. Цв. головки темно-оранжевые, осенью. Однол. выносливое. 2 ф. Снн. *Титонія овата* (*Tithonia ovata*).

**ЦИГАДЕНУСЪ** (*Zygadenus*). *Zygos*—ядро и *aden*—железа; железки расположены обычно по парно у основанія цв. сегментовъ. С. лилейныхъ. (12). С. Америка, З. Сибирь. Торф. влажная. Дѣленіемъ или сѣменами.

**Ц. глянберримусъ** (*Z. glaberrimus*, гладчайшій). С. Америка. Цв. бѣлые, въ июль. 2 ф. Снн. *Хелоніасъ брактеата* (*Helonias bracteata*).

**ЦИГОПЕТАЛИОМЪ** (*Zygopetalum*). *Zygos*—ядро и *petalon*—лепестокъ; въ первоначально найденномъ видѣ лепестки были сросшіеся основаніемъ съ долями. С. орхидей. (50). Жаркія страны Америки. Тепл. и оранж. эпифиты. Грубал торф. съ торф. мохомъ и древ. углемъ, въ корзинахъ и на чуркахъ. Никогда не допускать до сухости.

**Ц. брахипеталумъ** (*Z. brachypetalum*, коротко-лепестный). Бразилія. Цв. коричневыя съ зеленымъ разводами, губа бѣлая съ красновато-фіолетовымъ пятномъ. Тепл. **Ц. Вальліси** (*Z. Wallisii*, Вальліса). Эквадоръ. Цв. бѣлые съ красно-фіолетовыми кончиками, губа темно-фіолетовая съ бѣлой каймой. Оранж. Снн. *Пескатореа Вальліси* (*Pescatorea Wallisii*) **Ц. Гайриланумъ** (*Z. Gairianum*, Гейра). Эквадоръ. Цв. темно-фіолетовые, губа розово-пурпуровая. Тепл. Снн. *Пескатореа Гайрилана* (*Pescatorea Gairiana*). **Ц. Гаутиери** (*Z. Gautieri*, Готье). Бразилія. Цв. зеленые съ коричневыми крапинками и полосками, губа синне пурпуровая. Оранж. **Ц. Дайянумъ** (*Z. Dayanum*, Дая). Нов. Гренада. Цв. бѣлые, губа съ фіолетовымъ пятномъ. Тепл. Снн. *Пескатореа Дайянумъ* (*Pescatorea Dayanum*). **Ц. кандидумъ** (*Z. candidum*, бѣлый). Бразилія. Цв. бѣлые, губа посрединѣ розовая съ блѣднорозовымъ краемъ. Тепл. Снн. *Варреа кандида*, *Варшевичелла кандида*, *Хонтелла кандида* (*Warrea candida*, *Warszewiczella candida*, *Huntleya candida*).

**Ц. Клябохорумъ** (*Z. Klabochorum*, Клябоха). Эквадоръ. Цв. бѣлые съ шоколаднаго цв. кончиками, губа охристая или бѣлая съ пурпуровыми сосочками. Тепл. Снн. *Пескатореа Клябохорумъ* (*Pescatorea Klabochorum*). **Ц. кринитумъ** (*Z. crinitum*, волосатый). Бразилія. Цв. зеленые съ коричневыми полосками, губа бѣлая съ волосками. Оранж. Снн. **Ц. стенохилумъ** (*Z. stenochilum*). **Ц. Макайи** (*Z. Maskayi*, Макайи). Бразилія. Цв. желтовато-зеленые съ коричнево-пурпуровыми пятнышками; губа бѣлая, съ синне-пурпуровыми черточками и пятнышками. Оранж. Снн. *Ейлоphia Макайяна* (*Eulophia Maskaiana*). **Ц. максилляре** (*Z. maxillare*, челюстообразный). Бразилія. Цв. зеленые съ шоколаднаго цв. полосками, губа розово-пурпуровая. Оранж. **Ц. ростратумъ** (*Z. rostratum*, съ отроосткомъ). Гвиана. Цв. зеленоватые, губа бѣлая. Тепл. **Ц. триумфансъ** (*Z. triumphans*, торжествующій). Нов. Гренада. Цв. бѣлые съ голубыми кончиками, губа темно-синяя. Тепл. Снн. *Пескатореа триумфансъ* (*Pescatorea triumphans*). **Ц. цитринумъ** (*Z. citrinum*, лимоннаго цв.). Бразилія. Цв. темно-желтые, при основаніи губы темно-карминное пятно. Тепл. Снн. *Максиллярия цитрина*, *Промеяна цитрина* (*Maxillaria citrina*, *Prodenaea citrina*). **Ц. цѣлесте** (*Z. coeleste*, небесно-голубой). Колумбія. Цв. внизу свѣтло-голубые, посрединѣ темнорозово-желтые, по концамъ бѣлые; губа темно-фіолетовая. Оранж. Снн. *Боллаеа цѣлестисъ* (*Bollaea coelestis*).

**ЦИГОСТАТЕСЪ** (*Zygostates*). *Zygos*—ядро и *stalos*—стоящій; у основанія столбика два горизонтальныхъ отростка. С. орхидей. (4). Бразилія. Тепл. эпифиты. Уходъ какъ за Бурлингтоніа.

**Ц. Гриніана** (*Z. Greeniana*, Грина). Цв. бѣлые, губа съ зеленымъ черточками.

**ЦИГОФИЛЛИОМЪ** (*Zygophyllum*). *Zygos*—ядро и *phyllon*—листь, по парнымъ лл. С. парнолистныхъ. (52). Австралія и Ю. Африка. Тепл. кустар. или полу-куст. рр. Глин. дерн. съ торф. и пескомъ. Черенками въ песокъ, въ теплѣ, или сѣменами.

**Ц. фабаго** (*Z. Fabago*, верблюжий кормъ). Сред. и ю. Россія, Персія, Афганістанъ. Цв. желтые съ іюля до сентября. 1—4 ф. Многол. вынос. **Ц. фетидумъ** (*Z. foetidum*, вонючій). Ю. Африка. Цв. оранжевые съ пурпуровымъ пятномъ у основанія лепестковъ, въ іюль. 2—4 ф. Полукуст.

**ЦИДОНІЯ** (*Cydonia*). *Сидонъ*, на о. Критѣ, гдѣ находили это р. въ большомъ количествѣ. С. розановыхъ. (4). Японія, Китай, Цепаль. Древесн. и

куст. рр. Обыкн. садов. Сѣменами, черенками, отводкой и прививкой.

**Ц. вульгарисъ** (*C. vulgaris*, обыкновенная). *Айва-Кошъ*. Ю. Европа. Цв. бѣлые или розоватые, въ май или іюнь. Плоды различной формы. 20 ф. Служить дичкомъ для прививки грушъ. **Ц. Маулѣи** (*C. Maulei*, Маула). Японія. Цв. ярко-красные, въ апрѣлѣ. Плоды золотисто-желтые. Снн. *Пирусъ Маулѣи* (*Pyrus Maulei*). Раст. кустарное. **Ц. японика** (*C. japonica*, японская). Японія. Цв. темно-шарлаховые. Плоды зеленые. 5—6 ф. Куст.

**ЦИКАДѢИ**. См. Саговыя.

**ЦИКАСЪ** (*Cycas*). Такъ называется по гречески пальма. С. цикадеидныхъ. (15). Троп. Азія, Африка, Австралія, Полинезія. Теплич. многол. рр. Сильная песчан. глини. дерн. Отпрысками. Влажное тепло.

**Ц. мѣдіа** (*C. media*, средний). С. Австралія и Квинслендъ. Лл. эллиптически-ланцетовидные, перистые; пень толстый, высокій, цилиндрической. **Ц. норманбіана** (*C. Normandiana*, Норманбіа). Н. Ю. Валлисъ. Лл. продолговато-овальные, перистые. **Ц. революта** (*C. revoluta*, закрученный). Китай. Лл. темно-зеленые, перистые; пень очень толстый. **Ц. цирциналис** (*C. circinalis*, занитой). Остиндія. Лл. темно-зеленые, глянцевитые, перистые, съ серповидными перьями. Пень толстый, цилиндрической, у мужскихъ экз. тоньше.

**ЦИККА** (*Cicca*). Петеръ *Цикка* (*Cicca*)—писатель, жившій въ XVI стол. С. молочайныхъ. Въ настоящее время родъ слитъ съ Филлянтусъ. Теплич. куст. и древ. рр. Песчанист. дернов. Черенками изъ вырѣвшаго роста, въ песокъ, подъ стекломъ, на тепломъ грунтѣ. Темп. лѣтомъ 13—22, зимой 10—13°.

**Ц. дистиха** (*C. disticha*, съ двустрочными лл.). Остиндія. Цв. зеленоватые. 10 ф. Вопреки другимъ молочайнымъ, р. это не только не ядовито, но даетъ съдобные плоды; корень имѣетъ сильно послабляющія свойства.

**ЦИКЛЯМЕНЪ** (*Cyclamen*). *Ку-молъ*—окружный; по спиральной цвѣт. положъ. С. первоцвѣтныхъ. (8). Ср. Европа, Средизем. побережье, З. Азія. Воздушныя и оранж. клубневныя мног. травян. рр. Глин. дерн. съ торф. Сѣменами.

**Ц. африканумъ** (*C. africanum*, африканскій). Известковыя горы Алжирѣ. Цв. розовые или бѣлые, въ сентябрь—октябрь. **Ц. иберікумъ** (*C. ibericum*, иберійскій). Кавказъ. Цв. ярко-красные съ темнопурпуровымъ пятномъ при основаніи, въ февралѣ—мартѣ. Имѣетъ разновидность съ бѣлыми цв. **Ц. Коумъ** (*C. Squam*, Коумъ).



Юж. Европа, Малайя. Цв. красно-пурпуровые, самые маленькие из всех видов, в февраль—март. Имѣетъ разновидности съ бѣлыми и тѣлесными цв. **Ц. неаполитанумъ** (C. neapolitanum, неаполитанскій). Центр. и южн. Европа. Цв. бѣлые или красные съ яркимъ фиолетово-пурпуровымъ пятномъ при основаніи, въ августъ—сентябрь. **Ц. персикумъ** (C. persicum, персидскій). Греція, Палестина, Сирія. Цв. бѣлые, самые крупные изъ всехъ видовъ, бѣлые съ малиновыми пятнами у основанія, въ мартъ—апрѣль. Имѣетъ очень много восприимчивыхъ въ садахъ разновидностей. **Ц. цилицикумъ** (C. cilicicum, киликійскій). Киликія. Цв. бѣлые съ пурпуровымъ пятномъ при основаніи, въ октябрь.

**ЦИКНОХЕСЬ** (Cycnoches). *Kynos*—лебедь и *auchen*—шея, по длинному и красиво изогнутому столбцу. С. орхидей. (8). Троп. Америка. Теплолюб. Уходъ какъ за Катазетумъ.

**Ц. ауреумъ** (C. aureum, золотистый). Центр. Америка. Цв. свѣтло-лиловые. 1 ф. **Ц. барбатумъ** (C. barbatum, бородастый). Нов. Гренада. Цв. мелкіе, красивые, зеленоватые съ малиновыми крапинками, губа—бородачатая; въ июль. **Ц. Варшевичи** (C. Warszewiczii, Варшевича). Цв. зеленые. **Ц. Леманни** (C. Lehmanni, Лемана). Колумбія. Цв. лососевые, лепестки и губа оранжевые. Сил. *Ludemannia Lehmanni* (Ludemannia Lehmanni). **Ц. Лоддигезии** (C. Loddigesii, Лоддигеса). Суринамъ. Цв. зелено-коричневые съ болѣе темными пятнами, похожіе на гуся съ распушенными крыльями. **Ц. Эгертониумъ** (C. Egertonianum, Эгертона). Мексика. Цв. темно-пурпуровые, осенью. 2 ф.

**ЦИЛИСТА** (Cylista). *Kylis*—чаша, по большой чашечкѣ. С. бобовыхъ. Теплолюб. вѣющ. многол. рр. Глин. дерн. съ торф. Черенками въ песокъ, въ разводч. парникъ.

**Ц. скаріоза** (C. scariosa, шершавая). Остиндія. Цв. свѣтло желтые съ краснымъ.

**ЦИМБИДИУМЪ** (Cymbidium). *Kymbis*—лодка, по полому отростку губы. С. орхидей (30). Остиндія, Малайск. архип., Китай, Австралія, Африка. Теплолюб. и земная рр. Волоки. глинисто-дерн., съ волокнист. торф. и листов. Дѣленіемъ.

**Ц. биколоръ** (C. bicolor, двуцвѣтный). Цейлонъ. Цв. блѣдно-пурпуровые, въ апрѣль. **Ц. гигантеумъ** (C. giganteum, гигантскій). Сѣв. Индія. Цв. крупные, коричневые, губа съ желтымъ отгиномъ и пурпуровыми пятнами, зимой. **Ц. Дайяну** (C. Dayanum, Дейя). Ассамъ. Цв. желтоватые, съ малиновыми черточками. **Ц. канали-**

**кулѣтумъ** (C. canaliculatum, бороздчатый). С.-В. Австралія. Цв. пурпурово-коричневые съ зелеными краями, губа зеленоватая съ малиновыми крапинками, въ апрѣль. **Ц. Личіанумъ** (C. Lescchianum, Лича). Формоза. Цв. свѣтло-охристые съ коричневою чертою идущою почти до конца; губа съ бѣлымъ пятномъ. **Ц. Лоуіанумъ** (C. Lowianum, Лоуа). Бурма. Цв. большіе, зеленые съ коричневыми черточками; губа бѣловатая. въ мартъ. **Ц. Мастерси** (C. Mastersii, Мастерса). Ассамъ. Цв. бѣлые, губа съ розоватымъ отгиномъ, зимой. **Ц. Парии** (C. Parishii, Парии). Бурма. Цв. бѣлые, губа съ оранжевымъ ободкомъ и дискомъ. **Ц. пендулюмъ** (C. pendulum, пониклый). Непаль. Цв. коричневые, губа красная съ бѣлыми полосками, въ июль—августъ. У разновидности *пурпуреумъ* (purpureum) цв. темно-красные, а губа бѣлая съ малиновыми крапинками. **Ц. синензе** (C. sinense, китайскій). Китай. Цв. пурпурово-коричневые, превосходно пахнущіе; губа желто-зеленая съ пурпуровымъ. **Ц. эбурнеумъ** (C. eburneum, какъ слоново кость). Остиндія. Цв. доли бѣлые, лепестки и губа розоватые; цв. превосходно пахнутъ. Въ февраль. **Ц. Хукеріанумъ** (C. Hookerianum, Хукера). Сиккимъ-Гималаи. Цв. большіе зеленоватые, губа свѣтло-желтая. **Ц. Хуттони** (C. Huttoni, Хуттона). Ява. Цв. довольно большіе, темно-шоколадные, лепестки и губа бѣлые съ шоколадными полосками.

**ЦИМИЦИФУГА** (Cimicifuga). *Citex*—клоиъ и *fugo*—прогонять, по свойству рр. С. лютиковыхъ. (8). В. Европа и Сибирь. С. Америка. Воздушн. многол. трав. рр. Земля обихи. Дѣленіемъ весной, или сѣменами въ холод. парникъ.

**Ц. американа** (C. americana, американская). Каролина. Цв. бѣловатые, въ августа. 2—3 ф. **Ц. рацемоза** (C. racemosa, кистепан). С. Америка. Цв. бѣлые, въ июль—августъ. 3—5 ф. **Ц. японика** (C. japonica, японская). Японія. Цв. бѣлые. 3 ф.

**ЦИНАНХУМЪ** (Cynanchum). *Kynos*—собака и *ancho*—умерщвлять; по ядовитымъ свойствамъ нѣкот. видовъ. С. ласточниковыхъ. (18). Юж. Европа, Азія, Африка, Австралія. Выносливые виды въ обыкн. з., дѣленіемъ.

**Ц. розеумъ** (C. roseum, розовый). 3. Азія. Цв. красно-розовые. 1—1½ ф. Многол. выносл. Сил. *Цикотонумъ розеумъ* (Cycototum roseum).

**ЦИНАРА** (Cynara). *Kynos*—собака; по игламъ обертки, сравнимымъ съ зубами собаки. С. сложноцвѣтныхъ. (6). Средизем. побережье, Канарскіе о., одичали въ Америкѣ и Австраліи. Многол.

въ умѣр. климатъ вынослив. трав. рр. Сильная глин. дер. съ торф. Сѣменами и дѣленіемъ.

**Ц. Кардункулюсъ** (C. Cardunculus, Карды). Юж. Европа. Цв. головки пурпуровыя, въ августъ—сентябрь. 5 ф. Разводится на огородахъ; листовые черенки выбѣленные, употребляются въ пищу. **Ц. Сcoliмусъ** (C. Scolymus). *Артемисокъ*. Не есть настоящій видъ, а форма Ц. Кардункулюсъ. Цв. очень большіе, пурпуровые, осенью. Донце цвѣточной головки употребляется въ пищу, ради чего растеніе воспитывается какъ овощъ.

**ЦИНГИВЕРЬ** (Zingiber). На санскритскомъ яз. означаетъ *рогообразный*, вѣроятно по формѣ корня. С. инбирныхъ. (20); Остиндія, Малайскій архип. и о. Маскаренскіе и Тихаго океана. Теплолюб. или оранж. многол. трав. рр. Глин. дерн. съ торф. и пескомъ. Темп. зимой 4—6, лѣтомъ 13—26°.

**Ц. официнале** (Z. officinale, аптечный). *Инбиръ*. Остиндія. Цв. блѣдно-желтые съ темно-голубою губою, въ июль. **Ц. Церумбѣтъ** (Z. Zerbumbet, Церумбѣтъ). Остиндія. Цв. блѣдно-желтые, лѣтомъ. 3—4 ф.

**ЦИНЕРАРІЯ** (Cineraria). *Cinerea*—пепельный, —по цвѣту лл. С. сложноцвѣтныхъ (25). Юж. Африка. Обычно трав. рр. Обыкновен. садовая з. Сѣменами, въ парникъ или оранж., весной. Видъ *круента* произвѣлъ многочисленныя разновидности, принадлежащія къ лучшимъ садов. рр.; ихъ сѣютъ подъ рамами въ апрѣль, чтобы имѣть въ цвѣту въ июль и августъ, а въ июль и августъ — для цвѣтѣнія зимой или рано весной. Размнож. также черенками и отпрысками.

**Ц. ауранціака** (C. aurantiaca, оранжевая). В. и ю. Европа. Цв. головки оранжевыя. Возд. многол. **Ц. круента** (C. cruenta, съ грязно-красными лл.). Канарскіе о. Цв. головки красно-пурпуровыя, весной и лѣтомъ. 2 ф. Оранж. многол. Разновид. *Вебберіана* (Webberiana) — садов. гибридъ съ ярко-голубыми цв. **Ц. маритима** (C. maritima, приморская). Ю. Европа. Цв. головки желтыя, въ июль до сентября. Лл. перисторазсѣченные, серебристо-бѣлые, снизу пушистые. 2 ф. Полувыносл. многол.

**ЦИННАМОДЕНДРОНЪ** (Cinnamodendron). Отъ *cinnatomum* и *endron* (дерево). Сем. коричневыхъ. (2). Антильскіе о., Бразилія. Теплолюб. рр. Уходъ какъ за Камеллія.

**Ц. кортикосумъ** (C. corticosum, коровой). Вестиндія. Цв. красные. 50 ф.

**ЦИННАМОМУМЪ** (Cinnamomum). По арабски корицевое дерево называется

*kinaton*. С. лавровыхъ. (50). Троп. Азія. Австралія, Японія. Теплолюб. рр. Глин. дернов. съ торф. Черенками въ апрѣль, въ песокъ, подъ стекломъ, въ влажномъ теплѣ. Температ. лѣтомъ 13—22, зимой 10—13°.

**Ц. верумъ** (C. verum, настоящий). Остиндія. Цв. зеленые. 40 ф. **Ц. дѣльце** (C. dulce, сладкій). *Настоящая корица*. Остиндія. Цв. бѣлые съ желтымъ. 40 ф. **Ц. кассія** (C. cassia, кассія). Цейлонъ. Цв. желтые съ зеленымъ въ июль. 50 ф.

Вообще растенія этого вида, имѣя важныя экономическія значенія, въ сдоводствѣ встрѣчаются рѣдко.

**ЦИННІЯ** (Zinnia). Иоганъ *Циннъ* (Zinn)—профессоръ въ Гёттингенѣ, † 1759. С. сложноцвѣтныхъ. (12). Мексика. Полувыносл. одно- и многол. трав. рр. Сильная глубокая глин. дерн. на солнечномъ положеніи. Сѣменами въ парникъ въ концѣ марта или въ апрѣль; разсадить въ парникъ же; раньше высѣяныя бываютъ хуже.

**Ц. элегансъ** (C. elegans, изящная). Цв. головки шарлаховыя, красно-карминныя, розовыя, оранжевыя или бѣлыя. 2 ф. Имѣетъ очень много садовыхъ разновидностей.

**ЦИНОГЛОССУМЪ** (Cynoglossum). *Kyon*—собака и *glossa*—языкъ; по формѣ листьевъ. С. бурачниковыхъ. (60). Умѣр. и тропич. страны. Высокія, пушистыя двух- или многол. рр. 3. всякая. Сѣменами, весной.

**Ц. виргиникумъ** (C. virginicum, виргинскій). Соед. Штаты. Цв. голубые, въ июль. 2—5 ф. Многол.

**ЦИНОМЕТРА** (Cynometra). *Kyon*—собака и *metra*—матка, по формѣ стручковъ. С. бобовыхъ. (20). Троп. страны обонхъ полуострововъ. Теплолюб. рр. Глин. дерн. съ торф. Черенками, въ песокъ, подъ стекломъ.

**Ц. каулифлора** (C. cauliflora, съ цвѣтущимъ стеблемъ). Остиндія. Цв. бѣлые. 30—40 ф.

**ЦИНХОНА** (Cinchona). По жонъ губернатора въ Перу графъ Хинхонъ, испѣлвившейся въ 1638 г. корою этого р. отъ лихорадки. С. мареновыхъ. (36). Андскія горы въ Юж. Америкѣ. Оранж. дерев. рр. не имѣющія орнамент. значенія. Глин. дерн. съ волоки. торф., съ добавленіемъ песку и дерев. угля. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ песокъ, подъ стекломъ, въ теплѣ.

**Ц. официналисъ** (C. officinalis, аптечный). Перу. Цв. блѣдно-розовые 30—40 ф. Сил. *Ц. ланцеолатъ* (C. lanceolata).

**ЦИПЕЛЬЯ** (Cypella). *Kypellon*—чаша, бокалъ; по формѣ цвѣтовъ. С. ка-



сатниковыхъ. (5). Южн. Америка. Полувыносл. лукович. рр. 3. легкая. Сѣменами, или отпрысками, въ оранж.

**Ц. Херберти** (C. Herberti, Херберта). Буеносъ-Айресъ. Цв. желтые разныхъ оттенковъ, въ июль. 1 ф.

**ЦИПЕРУСЪ** (Cyperus). Название съ греческаго. С. ситовниковыхъ (700). По всей поверхности земнаго шара. Многоч., иногда однол. трав. злакообразныя рр. Глин. дерн. съ пескомъ и малымъ количествомъ торф. Дѣленіемъ или сѣменами въ теплѣ.

**Ц. альтернифолиусъ** (C. alternifolius, съ чередующимися дл.). Австралія. Стебли прямые съ узкими и длинными по концамъ дл., расположенными зонтикомъ. 1—2 ф. Форма *variegatus* (variegatus) имѣетъ стебли и дл. съ бѣлыми полосками. **Ц. лонгусъ** (C. longus, длинный). Европа и С. Африка. Цв. зонтичными метелками, осенью; дл. 2 или 3 на нижней половинѣ стебля, ярко-зеленые. 2—4 ф.

**ЦИПРИПЕДИУМЪ** (Cyperipedium). *Kypris*—Венера и *podion*—туфля, башмакъ. С. орхидей. (40) Европа, Азія, С. Америка, Мексика. Воздушн., оранж. и тепл. земныя орхидеи. Волокни. торф. съ добавленіемъ части глин. дерн., черенковъ и древ. угля. Дѣленіемъ.

**Ц. акадуле** (C. acule, безтепелый). Свв.-Амер. Соед. Штаты. Цв. зеленоватые, губа розовая, въ май—июль. Имѣетъ разновидность съ бѣлыми цв. **Ц. Аргусъ** (C. Argus, Аргусъ) Филипп. о. Цв. бѣлые, ровные, зеленые, темно-пурпуровые и коричнево-пурпуровые, въ мартъ—апрѣль. 1 ф. **Ц. ариетинумъ** (C. arietinum, баранья голова). Свв.-Амер. Соед. Шт. и Канада. Цв. зеленовато-коричневые. губа красная съ бѣлыми жилками, въ май, 7—10 д. **Ц. Ашбортоніе** (C. Ashburtoniae, леди Ашбортонъ). Гибридъ между Ц. барбатумъ и инсигне. Цв. бѣлые съ зелеными оттыкомъ и пурпуровыми жилками; губа свѣтло-пурпуровая съ желтыми и пурпуровыми пятнышками. Теплич. **Ц. барбатумъ** (C. barbatum, бородачій). Малакка. Цв. спинная доля внизу съ пурпуровыми полосками, сверху бѣлая; лепестки такіе-же съ пучками черныхъ волосковъ; губа темно-пурпуровая, весной и лѣтомъ. Теплич. Имѣетъ много формъ. **Ц. Воксальи** (C. Vexallii, Воксали). Индія. Цв. зеленоватые. Теплич. **Ц. венустумъ** (C. venustum, красивый). Непаль. Цв. зеленоватые съ желтовато-зеленой губой, зимой. Холодно-оранж. **Ц. верниксіумъ** (C. vernixium, законый). Гибридъ между Ц. аргусъ и вильдозумъ. Цв. охристые съ малиновымъ и зеленымъ. **Ц. вексиляріумъ** (C. vexillarium, знаменный). Гибридъ между Ц. Фай-

раинумъ и барбатумъ. Доли бѣлые съ пурпуровыми черточками, лепестки пурпуровые; мѣшокъ губы блѣдно-коричневый съ блѣдно-зелеными жилками. **Ц. вильдозумъ** (C. villosum, волосатый). Индія. Цв. оранжевые, губа ярко-коричневая, въ май. 1 ф. Тепл. **Ц. гуттатумъ** (C. guttatum, крапчатый). *Куронамки*. *Рабия зозульки*. С. Россія, Сибирь, С. Америка. Цв. бѣлые съ розово-пурпуровыми крапинками, въ июль. **Ц. Дайанумъ** (C. Dayanum, Дейя). Борнео. Цв. бѣлые съ пурпуровымъ, въ май—июль. Дл. пестры. Теплич. **Ц. Друри** (C. Druryi, Друри). Индія. Цв. зеленовато-желтые, губа охристая. 6 д. Тепл. **Ц. инсигне** (C. insigne, замѣчательный). Непаль. Цв. желтоватые съ пурпуровыми черточками; губа желтая. Тепл. **Ц. Кальцеолусъ** (C. Calceolus). *Вашмачки*. Свв. Азія и Европа. Цв. каштановые, губа блѣдно-желтая. 12—18 д. **Ц. кандидумъ** (C. candidum, бѣлый). Свв. Америка. Цв. зеленоватые, губа бѣлая, рано лѣтомъ. 12 д. **Ц. конколоръ** (C. concolor, одноцвѣтный). Мульмейнъ. Цв. бѣлые; дл. пестры. Тепл. **Ц. лаевиатумъ** (C. laevigatum, гладкій). Филипп. о. Цв. внутри съ пурпуровыми черточками, шеколадные съ зелеными; губа желтая; весной. Тепл. Син. **Ц. филиппинензисъ** (C. philippinensis). **Ц. Лоуренцеанумъ** (C. Lawrenceanum, Лоуренса). Борнео. Цв. бѣлые съ пурпуровыми мѣтками; дл. пестрые. Тепл. **Ц. Лоуи** (C. Lowii, Лоуа). Борнео. Цв. зеленоватые съ пурпуровыми мѣтками; губа свѣтло-коричневая. Тепл. **Ц. макрантумъ** (C. macranthum, крупноцвѣтный). *Пытушки*. Сибирь. Цв. ярко-пурпуровые, большіе; губа сильно вздутая, въ май—июль. 9—12 д. **Ц. нивеумъ** (C. niveum, снѣжно-бѣлый). Малайск. архип. Цв. бѣлые съ немногими киноварными черточками. 6 д. Тепл. **Ц. пардинумъ** (C. pardinum, леопардовый). Индія. Цв. бѣлые съ желто-зеленоватымъ, непрерывнымъ темно-пурпуровымъ. Дл. пестры. Тепл. **Ц. Парисіи** (C. Parishii, Париса). Бурма. Цвѣты зеленоватые, губа пурпуровая, лѣтомъ. 2 ф. Тепл. **Ц. парвифлорумъ** (C. parviflorum, мелкоцвѣтный). С. Америка. Цв. мелкіе, душистые, темно-пурпуровые, губа пурпуровая или желто-зеленоватая. 1½ до 2 ф. **Ц. Петри** (C. Petri, Петра Війча). Малайск. архип. Цв. бѣлые съ зелеными жилками, лепестки буроватые, губа коричнево-зеленая. **Ц. пубесценсъ** (C. pubescens, пушистый). С. Америка. Цв. крупные, желто-коричневые съ темными мѣтками; губа желтая, въ май—июль. 1½—2 ф. **Ц. селлигерумъ** (C. selligerum, сѣловидный). Гибридъ между Ц. барбатумъ и левигатумъ. Цв. бѣловатые, губа желтая, раздутая. **Ц. Спесеріанумъ** (C. Spicerianum, Спейсера). Остиндія. Цв.

бѣлые съ зеленоватыми лепестками, губа зеленая. **Ц. спектакиле** (C. spectabile, красивый). Соед. Штаты. Цв. бѣлые, губа розовая, въ июль. Дл. съ бѣлыми волосками. 1½—3 ф. Имѣетъ нѣсколько формъ. **Ц. Стоней** (C. Stonei, Стона). Бразилія. Цв. бѣлые съ красными и пурпуровыми полосками, губа темно-пурпуровая. Имѣетъ 2—3 разновидности. **Ц. супербиенсъ** (C. superbienus, превосходный). Ява. Цв. очень большіе, бѣлые съ ярко-коричневыми полосками и крапинками; губа большая, яркаго коричневаго цвѣта. Весной и лѣтомъ. Тепл. Син. **Ц. Вейчианумъ** (C. Veitchianum). **Ц. Файрейанумъ** (C. Faircainum, Файрейя). Остиндія. Цв. бѣлые съ зелеными и пурпуровыми черточками; губа пурпуровая. 1 ф. Холод. оранж. **Ц. Хайнальдианумъ** (C. Haunaldianum, Хайнальда). Филипп. ос. Цв. розовые съ зелеными, губа зеленая, зимой. **Ц. Харрисіанумъ** (C. Harrisianum, Харриса). Гибридъ между Ц. барбатумъ и вильдозумъ. Цв. пурпуровые съ бѣлыми кончиками, губа темно-малиновая. **Ц. Хукеріе** (C. Hookerae, Хукера). Борнео. Цв. желтоватые, губа коричневая съ желтымъ, лѣтомъ. Дл. съ бѣлыми пятнами. Тепл. **Ц. эйриандрумъ** (C. euryandrum, съ большими пылинками). Гибридъ между Ц. барбатумъ и Стоней. Доли какъ у послѣдняго. а лепестки, какъ у перваго; губа также, какъ у Ц. барбатумъ.

**ЦИПУРА** (Cipura). Происхождение названія не объяснено. С. косатиковыхъ. (4). Южн. Америка, Мексика, Вестиндія, Оранж. лукович. рр. Песчан. дерн. съ листовою. Сѣменами въ парникъ. Темп. лѣтомъ 13—21, зимой 6—10°.

**Ц. палюдоза** (C. paludosa, болотная). Гвѣана. Цв. бѣлые, въ июль. 1 ф.

**ЦИРИЛЬЯ** (Cyrilla). Доминико *Цирило* (Cyrillo)—бывш. проф. ботаники въ Неаполѣ. С. цирильяловыхъ. (2). Южн. Америка, Вестиндія, Бразилія. Оранж. куст. рр. Песчан. глин. дерн. съ торф. Черенками въ песокъ, подъ стекломъ, на слабомъ теплѣ.

**Ц. рацемифлора** (C. racemiflora, съ цвѣтами кистью). Южн. Соед. Штаты. Цв. бѣлые, въ июль—августъ. 6 ф.

**ЦИРИЛЬЛОВЫЯ** рр. (Cyrilleae). Малочисленное семейство, отличающееся отъ вересковыхъ только тѣмъ, что лепестки не срослись и что пылинки раскрываются щелью. Цвѣты обычно кистями. Листья цѣльные, безъ промежутовъ. Роды сюда принадлежащіе: Клифтонія, Костеа и Цирилья. Всѣхъ видовъ извѣстно 8, растущихъ въ жаркомъ климатѣ Новаго Свѣта.

**ЦИРРЕА** (Cirrhaea). Отъ *cirrhus*—ухватъ, носокъ вытянутъ въ ухватъ. С.

орхидей. (5). Бразилія. Эпифитныя тепл. рр. Торф. мохъ, торфъ, черенки и древ. уголь. Во время развитія высокая темп. и влажности, въ состояніи покоя — прохлада и сухе. Темп. лѣтомъ 13—26, зимой 10—13°.

**Ц. Лоддигезіи** (C. Loddigesii, Лоддига). Бразилія. Цв. зеленовато-желтые, доли—съ темно-красными полосками, въ май.

**ЦИРРОПЕТАЛУМЪ** (Cirrhopetalum). *Cirrhus*—ухватъ и *petalon*—лепестокъ, по узкимъ лепесткамъ. С. орхидей. (30). Малайск. архип., Маскаренскіе о., Китай, Австралія. На чуркѣ. Темп. во время роста 19—24, во время покоя 13°.

**Ц. аурагумъ** (C. auratum, съ золотистыми краями). Манилла. Цв. палевые съ золотистыми и красно-малиновыми полосками, весной. **Ц. Кумингii** (C. Cumingii, Куминга). Филипп. о. Цв. яркіе красно-пурпуровые, въ разное время года. **Ц. медузэ** (C. Medusae, Медузы). Сингапуръ. Цв. блѣдно палевые, лѣтомъ. **Ц. Туарси** (C. Thouarsii, Туарса). Ява, Манилла. Цв. тускло-оранжевые, лѣтомъ. **Ц. трипудіансъ** (C. tripudians, танцующій). Бурма. Цв. коричневые, съ блѣдо-пурпуровыми.

**ЦИРТАНГЕРА** (Cyrтанthera). *Kyrtos*—закривленный и *anthos*—пыльникъ. С. акантовыхъ. (7). Бразилія, Мексика. Тепл. рр., требующія такого же ухода какъ Юстиція.

**Ц. катальпифолия** (C. catalpaefolia, съ дл. какъ у Кательи). Гондурасъ. Цв. желтые, въ июль. 6 д. **Ц. хризостефана** (C. chrysostephana, съ золотистымъ вѣнчикомъ). Мексика. Цв. золотисто-желтые, зимой.

**ЦИРТАНТУСЪ** (Cyrthantus). *Kyrtos*—скривленный и *anthos*—цвѣтокъ, по пониклымъ цв. С. амариллисовыхъ. (15). Юж. Африка. Оранж. лукович. рр. Глин. дерн. съ листовъ и пескомъ. Отпрысками.

**Ц. сангвинеусъ** (C. sanguineus, кроваво-красный). Мысь Д. Н. Цв. большіе, яркіе красно-оранжевые внутри, желтые снаружи, въ августъ.

**ЦИРТОПОДИУМЪ** (Cyrtopodium). *Kyrtos*—скривленный и *poda*—нога, по губѣ. С. орхидей. (20). Азія, Африка, троп. Америка. Тепл. земл. орхидеи. Торф., торфяной мохъ и черенки. Дѣленіемъ Темп. лѣтомъ отъ 13 до 25, зимой 10—13°.

**Ц. пунктатумъ** (C. punctatum, точечный). Бразилія. Цв. желтые съ коричневыми крапинками, губа желтая съ коричневымъ, въ апрѣль. **Ц. сангвинеумъ** (C. sanguineum, кроваво-красный). Тропич. Индія. Цв. отъ пурпуровыхъ до коричневыхъ, губа розовая, лѣтомъ.

**ЦИРТОСТАХИСЪ** (Cyrstostachys)



*Kyrtos* — скривленный, *stachys* — колосъ, по положению дв. колосовъ. С. пальмъ. (2). Малайск. архип. Теплич. пр., пуждающаяся въ такомъ же уходѣ какъ Арека.

Ц. Ренда (С. Renda, Ренда). Малайск. архип. Цв. красновато-желтые, дл. перистые, 30 ф. Сип. *Арека эритропода* и *Бентинкля Ренда* (*Arena erythropoda* et *Bentinckia Renda*).

**ЦИРТОХИЛЮМЪ** (*Cyrtochilum*) *Kyrtos* — скривленный и *cheilos* — губа, по формѣ губы. С. орхидей. Центр. америк. теплич. пр. На чуркахъ съ торфяникомъ. Темп. лѣтомъ 13—26, зимой 10—13°.

Ц. цитринумъ (С. citrinum, лимонный). Централы. Америка. Цв. желто-лимонные, съ большой губой, въ апрѣлѣ. Ц. макуллатумъ (С. maculatum, пятнистый). Вера-Круцъ. Цв. зеленые, съ пурпуровыми пятнышками, весной и зимой.

**ЦИРТОЦЕРАСЪ** (*Cyrtoceras*). *Kyrtos* — скривленный и *keras* — рогъ, по кривымъ рокамъ у вѣчника. С. ласточниковыхъ. Пр. близкія къ Хойя, выходящая. Песч. глин. дерн. съ кусками древесн. угля. Черенками въ песокъ, подъ стекломъ, въ теплѣ.

Ц. мультифлорумъ (С. multiflorum, многоцвѣтный). Борнео. Цв. бѣлые съ темно-желтыми кончиками, въ августѣ. Называется тоже *Хойя коріанса* (*Hoja coriacea*) и *Центростемма мультифлорумъ* (*Centrostemma multiflorum*).

**ЦИРЦЕА** (*Circaea*). Мнѣологическая полстебница Цирцея, изготовляющая отравы. С. онагровыхъ. (3). Европа, Азія, С. Америка. Многол. трав. пр. 3. обикн. садовая. Отпрысками и дѣленіемъ.

Ц. альпина (С. alpina, альпійская). Сѣв. полушаріе. Цв. блѣдно-красные, въ июлѣ, 4—6 д. Ц. лютецiana (С. lutescens, парижская). С. полушаріе. Цв. блѣдно-красные, въ июлѣ, 1—1½ ф.

**ЦИСТАКАНТУСЪ** (*Cystacanthus*). *Kystis* — волдырь и *acanthus*, по вздутымъ цв. С. акантовыхъ. (3). Кохинхина, Мартобанъ. Теплич. многол. Легкая, песчан. дернов. съ волоки. торф. Черенками изъ молодого роста, въ песокъ, въ парникѣ.

Ц. тургида (С. turgida, нагубный). Кохинхина. Цв. бѣлые съ малиновою съточкой, въ апрѣлѣ, 1—1½ ф. Сип. *Мениния тургида* (*Meninia turgida*).

**ЦИСТЕРНА**. Выстѣлище накапливаемой воды, искусств. водоемъ. Можетъ быть наружной или внутренней, каменной или металлической. Полезна во многихъ отношеніяхъ: отстоявшаяся вода на воздухъ изъ жесткой становится мягкой, температура ея сравнивается съ темпе-

ратурою воздуха, наружного или внутреннего, что весьма важно для поливки растений.

**ЦИСТОПТЕРИСЪ** (*Cystopteris*). *Kystis* — пузырь и *pteris* — папоротникъ. С. папоротниковъ. (6). Альпы, Канарск. о., С. Африка, С. Америка. Оранж. и выноса. папоротники.

Ц. фрагилис (С. fragilis, хрупкій). Сѣв. и южн. полушарія. Ван овално-ланцетовидный, трехперистый. Имѣетъ очень много формъ, изъ которыхъ особеннаго вниманія заслуживаютъ: *angustata* (angustata), *dentata* (denticata) и *Dicksoniana* (Dicksoniana).

**ЦИСТУСЪ** (*Cistus*). *Kiste* — ящикъ, по своеобразному устройству плодниковъ. С. ладонниковыхъ. (30). Ю. Европа, С. Америка. Оранж. куст. пр. Сильная глини. дерн. съ лист. Черенками весной или осенью въ песчанист. торф., подъ стекломъ; тоже сѣменами.

Ц. альбидусъ (С. albidus, бѣлый). Ю.-З. Европа. Цв. блѣдно-пурпуровые, въ июлѣ. 2 ф. Ц. вагинатусъ (С. vaginatus, влагалищный). О. Тенерифъ. Цв. розовые, съ апрѣля по июнь. 2 ф. Ц. вильбозусъ (С. villosus, волосатый). Ю. Европа. Цв. красно-пурпуровые, въ июлѣ. Сип. Ц. инканусъ и Ц. ундулатусъ (С. incanus et С. undulatus). 3 ф. Ц. ладаниферусъ (С. ladaniferus, производящій ладанъ). Испанія. Цв. бѣлые, въ июлѣ. 4 ф. Ц. латифолиусъ (С. latifolius, съ широкими л.). Варварійскія влад. Цв. бѣлые съ желтымъ основаніемъ, въ маѣ. 3 ф. Ц. монспеліансисъ (С. monspeliensis, изъ Монпелье). Ю. Европа. Цв. бѣлые, въ июлѣ. 4 ф. Ц. м. *флорентинусъ* (Pogeninus) есть гибридъ между монспеліансисъ и сальвифолиусъ. Ц. облонгифолиусъ (С. oblongifolius, съ продолговатыми л.). Испанія. Цв. бѣлые съ желтымъ внизу пятномъ, въ июлѣ. 4 ф.

Ц. псилосепакусъ (С. psilosepalus, съ гладкими лепестками). Отечество неясно. Цв. бѣлые, съ іюня до августа. 2—3 ф. Ц. пурпуреусъ (С. purpureus, пурпуровый). Левантъ. Цв. красновато-пурпуровые, въ июлѣ. 2 ф. Ц. ротундифолиусъ (С. rotundifolius, круглолистный). Ю. Европа. Цв. пурпуровые съ желтымъ основаніемъ, съ іюня до сентября. 1 ф. Ц. хираутусъ (С. hirsutus, щетинистый). Ю.-З. Европа. Цв. бѣлые съ желтыми мѣтками, въ июлѣ. 2 ф.

**ЦИССАМПЕЛОСЪ** (*Cissampelos*). *Kissos* — по гречески означаетъ плющъ, а *ampelos* — виноградную лозу: пр. цѣпляется какъ плющъ, а плоды имѣютъ похожіе на виноградныя ягоды. С. луносѣмянниковыхъ. (18). Троп. Америка, Африка. Теплич. цѣнка пр. Глин. дерн. съ торф. Черенками изъ бокового роста.

въ песокъ, въ разводочномъ парникѣ. Темп. лѣтомъ 13—21, зимой 6—11°.

Ц. мауриціана (С. mauritiana, съ о. Маврикія) О. Маврикія. Цв. желтые съ зелеными.

**ЦИССУСЪ** (*Cissus*). *Kissos* — плющъ, по росту. С. виноградныхъ. Этотъ родъ теперь слитъ съ *Vitis*. Цѣнка пр. теплич., оранж. и воздушн. Приводимые два вида, наиболѣе встречаемые въ садахъ, нуждаются въ смѣси изъ 2 ч. волоки. торф. съ одной глини. дерн. и листов., съ достаточн. количествомъ крупнаго песку. Черенками, весной.

Ц. дисколоръ (С. discolor, разноцвѣтный). Ява. Цв. зеленовато-желтые. Лл. продолговато-сердцевидные; верх. ихъ сторона бархатистая, ярко-зеленая съ бѣлыми пятнами и крапинками, нижняя — красно-пурпуровая. Ц. порпирофилла (С. porpiorhylla, съ пурпуровыми л.). Борнео. Но всему вѣроятно принадлежитъ къ с. перцовыхъ, къ роду *Пиперъ*.

**ЦИТАРЕКСИЛЮМЪ** (*Citharexylum*). *Kithara* — лира и *xylon* — дерево, по пригодности для изготовленія музыкальных инструментовъ. С. вербовыхъ. (20). Троп. Америка. Тепл. древ. пр. Глин. дерн. съ торф. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ развод. парникѣ. Темп. лѣтомъ 12—21, зимой 8—13°.

Ц. каудатумъ (С. caudatum, съ хвостомъ). Ямайка. Цв. бѣлые. 20 ф. Ц. субсерратумъ (С. subseratum, немногозубчатый). Вестиндія. Цв. бѣлые. 15 ф.

**ЦИТИЗУСЪ** (*Cytisus*). Происхожденіе не опредѣлено. С. бобовыхъ. (38). Европа, З. Азія, С. Африка, Канарскіе о. Кустарныя пр. 3. обикнов. Сѣменами и прививкой на Лабурнумъ.

Ц. альбусъ (С. albus, бѣлый). Испанія и Португалія. Цв. бѣлые, въ маѣ. 6—10 ф. Ц. капитатусъ (С. capitatus, головчатый). Сред. Европа. Цв. желтые, въ июлѣ. 2—4 ф. Ц. нигрикансъ (С. nigricans, чернотелый). Европа. Цв. желтые, въ июлѣ. 3—6 ф. Ц. сессилифолиусъ (С. sessilifolius, съ сидчими л.). Ю. Европа. Цв. желтые, въ маѣ. 4—6 ф. Ц. филипесъ (С. filipes, тонковѣтвистый). Тенерифъ. Цв. бѣлые, въ мартѣ. На зиму не сбрасываетъ листа. Ц. хирсутусъ (С. hirsutus, волосатый). Европа. Цв. желтые, въ июлѣ.

**ЦИТРУЛЛЮСЪ** (*Citrullus*). Отъ *Citrus* — померанецъ, по плодамъ похожимъ на померанцы. С. тыквенныхъ. (3). Троп. Азія, Африка. Уходъ какъ за Кукумисъ.

Ц. вулгарисъ (С. vulgaris, обыкновенный). *Арбузъ*. Индія. Цв. желтые. Плоды съдобные. Имѣетъ много сортовъ, отличающихся по формѣ, а также по цвѣту кожи

и мякоти. Сип. *Кукумисъ* и *Кукурбита цитруллузъ* (*Cucumis et Cucurbita citrullus*). Однол. Ц. Колоцинтисъ (С. Colocynthis, Колоквинтъ). Индія. Цв. свѣтло-желтые. Все р. пѣсколько жесткое. Сип. *Кукумисъ Колоцинтисъ* (*Cucumis Colocynthis*). Многол.

**ЦИТРУСЪ** (*Citrus*). Происхожденіе названія неясно: полагаютъ отъ *Китронъ* — города въ др. Гудеѣ или отъ греческ. *Kitron* — померанецъ и лимонъ. С. рутовыхъ. (7). Троп. Индія, Австралія. Оранж. дер. Глин. дерн. съ листовымъ и коровымъ перегноемъ, съ добавленіемъ песку. Сѣменами, черенками, отводкой, прививкой.

Ц. аурантиумъ (С. aurantium, золотистый). *Апельсинъ*. Азія. Плодъ золотисто-оранжевый, шаровидный, съ толстой кожей и сладкою мякотью. Лл. продолговато-овальные, остроколючные; черешки почти голые. 10—30 ф. Ц. вулгарисъ (С. vulgaris, обыкновенный). *Померанецъ*. Азія. Пл. шаровидный, съ тонкою кожей и горько-кислою мякотью; лл. эллиптические, остроколючные, кругло-зубчатые, черешки съ сердцевиднымъ крыломъ. 20—30 ф. Ц. декумана (С. decumana). *Пампельмусъ*. Полинезія. Пл. очень большіе, круглые; кожа толстая, зеленоватая, губчатая. Лл. овальные, тупые, на нижней сторонѣ пушистые; черешки съ широкими сердцевидными крыльями. 18 ф. Ц. Лиметта (С. Limetta). *Бергамотъ*. Азія. Пл. шаровидные съ выдавшимися сосочкомъ, кожа крѣпкая, мякоть сладкая; лл. овално-округлые, зубчатые, черешки шиловидные. 8—15 ф. Ц. Лимонумъ (С. Limonum). *Цедра*. *Цитронъ*. Азія. Плоды продолговатые съ очень тонкою желтою кожей, приставшею къ кислой мякоти; лл. продолговато-овальные, кругло-зубчатые; черешки съ маленькими крыльями. 8—10 ф. Ц. мѣдика (С. medica, мидійскій). *Лимонъ*. (Древ. римляне называли Mala medica или Mala persica, по мѣсту происхожденія). Азія. Пл. продолговатые съ сосочкомъ, обычно семиглавные; мякоть бѣловатая, кислая; кожа желтая, толстая, твердая, пахучая, неровная; лл. продолговатые, тупые; черешки голые. 8—16 ф. Въ Вестиндіи воспитывается разновидность «ацیدا» (acidia), у которой плоды мельче и шаровидной формы. Изъ нихъ извлекается лимонная кислота. Ц. нобилис (С. nobilis, благородный). *Мандаринъ*. Китай. Плоды красноватые съ сладкой мякотью и сладкой кожей, сплюснутой формы, съ 9—12 глѣвами. Лл. овальные; черешки тонкіе. 15 ф. Ц. трифолиата (С. trifoliata, трехлистый). Японія. Пл. желто-оранжевые, шаровидные, маленькіе; лл. тройчатые, черешки крылатые. 4 ф. Сип. *Псеудерис сепарта* (*Pseudaeagle*



seriaria). **Ц. японика** (*C. japonica*, японскій). *Кумкама*. Китай, Японія. Пл. шаровидные или нѣсколько эллипсоидальные, яркаго желто-оранж. цвѣта, 4—6 гнѣздные; кожица толстая; мякоть сладкая-кисловатая. 4—6 ф.

**ЦИФИЯ** (*Cyphia*). *Kurphos*—горбатый; по формѣ рыльца. С. колокольчиковыхъ. (12) Юж. Африка, Абиссинія. Оранж. многол. трав. рр. Смѣсь глин. дернов. съ торф. и пескомъ по ровну. Черенками, въ песокъ.

**Ц. бульбоза** (*C. bulbosa*, луковичная). М. Д. Н. Цв. блѣдно-голубые, въ августѣ. 6 д. **Ц. волюбилис** (*C. volubilis*, вьющаяся). М. Д. Н. Цв. голубые; стебли нитевидные, вьющіеся противу солнца.

**ЦИФОКЕНТИЯ** (*Cyphokentia*). *Kurphos*—горбъ и *Kentia*—пальма, похожая на Кентію, съ боковымъ горбомъ у плода. С. пальмъ. (2). Новая Каледонія. Уходъ какъ за Арека.

**Ц. робуста** (*C. robusta*, сильная). Новая Каледонія. Ван перисто-раздѣльными, безъ колючекъ.

**ЦИФОМАНДРА** (*Cyphomandra*). *Kurphos*—горбъ и *aner*—тычинокъ, по формѣ тычинокъ. С. пасленовыхъ. (24) Южн. Америка. Оранж. куст. рр. Глин. дерн. съ листовою. Сѣменами или черенками, подъ стекломъ, въ теплѣ. Темп. лѣтомъ 15—23, зимой 13—15°.

**Ц. бетаса** (*C. betacea*, свекольная). Южн. Бразилія. Цв. въ почкѣ пурпуровые, распустившіеся зеленые; плоды красные, липевидные, вмятшіеся томаты. 12—14 ф. Снн. *Solanum fragrans* (*Solanum fragrans*).

**ЦИФОСПЕРМА** (*Cyphosperma*). *Kurphos*—горбатый и *sperma*—сѣмя; по формѣ сѣмени. С. пальмъ. (2). Новая Каледонія. Теплич. пальмы съ толстыми, колючатыми нѣжми. Уходъ какъ за Арека.

**Ц. Вьелларія** (*C. Viellardii*, Вьелларя). Нов. Каледонія. Лл. перисто-разсѣченные, сегменты кожистые. Снн. *Kentia robusta* и *Kentia Viellardii* (*Kentia robusta* et *K. Viellardii*).

**ЦИХОРИУМЪ** (*Oichorium*). Древнее египетское названіе. С. сложноцвѣтныхъ. (3). Распространенъ обширно. Одно и многол. трав. рр. Сильная, рыхлая, легкая з. Сѣменами ежегодно, даже многол.

**Ц. интибусъ** (*C. intybus*). Цикорій. Европа. Цв. головки ярко-голубыя, въ іюль. 2—5 ф. Многол. **Ц. спинозумъ** (*C. spinosus*, колючій). Греція. Цв. головки голубыя; вѣтви окаймляются острыми. Ц. **Эндивія** (*C. Endivia*). Эндивій. Китай. Цв. головки блѣдно-голубыя, въ іюль. 2 ф. Однол. Лл. большіе, выемчатые, зубчатые, гладкіе.

**ЦИЦИФОРА** (*Ziziphora*). *Zizi*—индѣйское названіе цв. и *phoreo*—песу. С. губоцвѣтныхъ. (2). Средн. и зап. Азія, южн. Средиземное побережье. Оранж.; полувысока. и выноса. многол. и однол. трав. рр. Легкая, хорошая. Черенками и сѣменами.

**Ц. даяннта** (*C. dasyantha*, густоцвѣтная). Кавказъ. Цв. красные, въ іюль. 6 д. **Ц. клиноподиоидесъ** (*C. clinopodioides*, похожая на Клиноподиумъ). Кавказъ. Цв. пурпуровые, въ іюль. 6—12 д.

**ЦИЦИФУСЪ** (*Zizyphus*). *Zizouf* по арабски означаетъ лотусъ. С. крупно-выхъ. (50). Троп. Азія и Америка и умѣр. климатъ обоихъ полушарій. Тепл. или оранж. древесн. или куст. рр. Песков. глин. дерн съ торф. Черенками изъ взрѣвшаго роста въ песокъ, подъ рамами, въ теплѣ. Цв. зеленые.

**Ц. вульгарисъ** (*C. vulgaris*, обыкновенный). *Чамиски*. Ю. Европа. Цвѣтеть въ августѣ. Плоды красные или черные, съдобные. 6 ф. и выше. **Ц. лотусъ** (*C. lotus*). *Грудный лотъ*. Ю. Европа, С. Африка. Плоды желтые, мучнистые. 2—4 ф. **Ц. Спина-Кристи** (*C. Spina-Christi*, Христовъ тернъ). З. Азія, С. Африка, Египетъ. Цв. въ августѣ. Вѣтки съ двойными иглами, одна прямая, другая согнутая. Цв. полагаютъ, что изъ нихъ былъ свить терновый вѣнецъ Спасителя. 6 ф. **Ц. ююба** (*C. jujuba*, ююба). С. Африка, Индія, Австралія. Цвѣтеть въ апрѣль; плоды шаровидныя, мясистыя и мучнистыя. 30—50 ф.

**ЦИАНАНТУСЪ** (*Cyananthus*). *Kyanos*—голубой и *anthos*—цвѣтокъ. С. колокольчиковыхъ. (6) Гималаи. Приземистая многол. трав. рр. Листовая съ пескомъ. Черенками весной и лѣтомъ.

**Ц. инканусъ** (*C. incanus*, бѣлый). Горы Сикхилеа. Цв. нѣжно-лазуревые, въ августѣ. 3—4 д. **Ц. лобатусъ** (*C. lobatus*, лопастной). Горы Гималаи. Цв. яркіе, сине-пурпуровые, въ августѣ и сентябрѣ. 4 д.

**ЦИАНЕЛЛА** (*Cyanella*). Уменьшенное *kyanos*—голубой. С. лилейныхъ. (5). Южн. Африка. Легкая, сильная песчан. з. Отпрысками.

**Ц. одоратиссима** (*C. odoratissima*, очень пахучая). Мысь Д. Н. Цв. темно-розовые, дѣлающіеся потомъ голубыми, въ іюль—августѣ. 1 ф. Оранжер.

**ЦИАНОФИЛЛЮМЪ** (*Cyanophyllum*). *Kyanos*—голубой и *phyllon*—листь; по цвѣту нижней стороны лл. С. черноустовыхъ. Тепл. листь. рр. Хорошая волокон. торф. по-ровну съ листов. и съ 1/4 песку. Черенками и глазками въ песокъ, въ разводч. парникъ и сѣменами.

**Ц. магнафикумъ** (*C. magnificum*, великокопный). Мексика. Цв. мелкіе, незна-

чительные. Лл. широко-овальные, стуживающіеся къ концамъ, верх. сторона бархатисто-зеленая съ бѣлыми жилками, нижняя сторона красновато-пурпуровая.

**ЦИАНОТИСЪ** (*Cyanotis*). *Kyanos*—голубой и *ous*—ухо, по формѣ лепестковъ. С. коммелиновыхъ. (33). Троп. страны. Сильная глин. дерн. Черенками, въ песокъ, въ разводч. парникъ и дѣленіемъ.

**Ц. барбата** (*Z. barbata*, бородачатый). Индія, Китай. Цв. темно-голубые, въ августѣ. 1 ф. Оранж. многол. трав.

**ЦИАТЕА** (*Cyathaea*). *Kyathaeon*—чашечка, по спорнымъ сѣмечкамъ на нижней сторонѣ вай. С. папоротниковъ. (100). Троп. страны, преим. ост. Тихаго океана. Теплич. или оранж. древ. папоротники. Глин. дерн. Дѣленіемъ корни и посѣвомъ.

**Ц. арбореа** (*Z. arborea*, древесная). Вестиндія. Черешки свѣтло-коричневые. Ван двухперистыя, большія. Тепл. Снн. *Ц. Гревильеана* (*C. Grevilleana*). **Ц. деальбата** (*Z. dealbata*, бѣловатая). Нон. Зеландія. Ван почти кожистыя, двух-трех-перистыя, на нижн. сторонѣ бѣлыя. **Ц. инсигнисъ** (*C. insignis*, замѣчательная). Ямайка. Пенъ чешуйчатый. Ван кожистыя. Тепл. Снн. *Ц. принцепс* (*C. princeps*) и *Циботіумъ принцепс* (*Cybotium princeps*). **Ц. интегра** (*C. integra*, цѣльная). Амбонка и Филиппинскіе о. Ван твердыя, буровато-зеленые. Тепл. Снн. *Ц. петиолята* (*C. petiolata*). **Ц. медулярисъ** (*C. medullaris*, сердцевидная). Новая Зеландія. Пенъ высокий. Ван большія, двух-трех-перистыя, кожистыя. **Ц. сѣрра** (*C. serrata*, зубчатая). Вестиндія. Ван двухперистыя. Тепл. **Ц. экцелса** (*C. excelsa*, высокая). О. Маврикія. Ван двуперистыя, кожистыя. Оранж. и тепл.

**ЦИАТОДЕСЪ** (*Cyathodes*). *Kyathos*—чашечка и *odons*—зубъ, по чашеобразному диску съ зубчиками. С. эпакрисовыхъ. (13). Австралія, Нов. Зеландія, Сандвич. ос. Оранж. орнамент. куст. рр. Торф. Черенками, подъ стекломъ, въ песокъ съ торф. з.

**Ц. гляука** (*C. glauca*, сиво-зеленый). Таеманія. Цв. бѣлые, въ апрѣль до іюня. Дерево въ 25 ф.

**ЦИЕРІЯ** (*Zieria*). *Циеръ* (*Zier*)—польскій ботаникъ, другъ Смита, номенклатора. С. рутовыхъ. (10). Австралія. Оранж. куст. или древ. рр. Песков. глин. дерн. съ торф. Черенками изъ молодого роста въ песокъ, подъ рамой.

**Ц. Смитія** (*Z. Smithii*, Смит). Цв. бѣлые. Высокій куст. Снн. *Ц. ланцолата* (*Z. lanceolata*).

**ЦОМИКАРПА** (*Zomicarpa*). *Zomi*—опушка и *karpos*—плодь, околоплодникъ лопается сверху и остается съ сѣменами,

образующими какъ бы опушку. С. ароидей. (3). Бразилія. Тепл. клубн. многол. рр. Уходъ какъ за Стауростигма.

**Ц. пѣтоніумъ** (*Z. pythionum*, змѣиная). Чехоль фиолетовый; лл. почковидные о 5 сегментахъ. 1 ф. Считается противоядіемъ змѣиного яда.

**ЦОМИКАРПЕЛЛЯ** (*Zomicarpella*). Уменьшенное *Zomicarpa*. С. ароидей. (1). Тепл. клубневое р. Уходъ какъ за Стауростигма.

**Ц. макулата** (*Z. maculata*, пятнистая). Новая Гренада. Цвѣторасположеніе мыленькое; чехоль тускло-зеленый; лл. овалныя, сердцевидно-стрѣловидные, съ блѣдно-зелеными пятнами по краямъ.

**ЦОРНІЯ** (*Zornia*). *Цорнъ* (*Zorn*)—баварскій ботаникъ, † 1799. С. бобовыхъ. (10). Америка и ю. Африка. Тепл. или оранж. одно-, либо многол. трав. рр. Садового значенія не имѣютъ.

**ПОСТЕРОСТИЛИСЪ** (*Zosterostylis*). *Zoster*—лента и *stylis*—столбикъ, по полосѣ, опоясывающей столбикъ С. орхидей. Остиндія, о. Малайскаго архипелага, Австралія. Тепл. и оранж. земный рр. Уходъ какъ за Сипрантесъ.

**Ц. арахнитесъ** (*Z. arachnites*, паутинный). Цейлонъ. Цв. зеленые, губа желтая съ пурпуровыми черточками и крапинками, покрытая какъ бы паутиной.

**ЦЫГАНКА**. Сортъ яблока среднихъ размѣровъ, поздняго посѣванія, съ темной кожей и плотной мякотью.

**ЦЫНОВКА**. См. рогожа.

**ЦѢПКИЯ** рр. Поднимающіяся или разпространяющіяся помощью прицѣпокъ, усиковъ или ухватовъ, либо черенковъ, корней и пр. Смѣшиваются со *вьющими*, которыя поднимаются обвиваясь стеблемъ вокругъ опоры.

**ЧАВЕРЪ**. См. Сатурея.

**ЧАЙ**. См. Камелія. *Ч. Пингъ*, см. Эпилобіумъ; *Ч. курильский*, см. Потентилля; *Ч. луговой*, см. Лизимахія.

**ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО**. См. Османтусъ.

**ЧАПЫЖНИКЪ**. См. Цицифусъ.

**ЧАСТУШНЫЯ** рр. (*alismaceae*). Малочисленное семейство водяныхъ или болотныхъ рр. съ трехлепестковыми цвѣтками на безлистныхъ стебелькахъ и съ простыми прикоренными листьями. Сюда принадлежатъ роды Лизима и Сагиттарія.

**ЧАЩЕЦВѢТНИКОВЫЯ** рр. (*calycanthaceae*). Кустарники рр. съ четырехгранными стеблями. Цвѣты одиночные; чашечка изъ многочисленныхъ окрашенныхъ долей, переходящихъ въ лепестки.



Листья супротивные, цельные. В этом семействѣ два рода—Каликантусъ и Химокантесъ.

**ЧАЩЕЦВѢТНЫЯ** pp. (calyciflorae). Отдѣлъ двухъсѣменодольныхъ, въ которомъ тычинки вырастаютъ изъ чашечки или изъ ложа цвѣтка.

**ЧАЩЕЧКА.** Наружное кольцо цвѣтовыхъ листьевъ.

**ЧЕВЫШѢВСКОЕ** яблоко. Поздний сортъ, средней величины, продолговатой формы, краснаго цвѣта и превосходнаго вкуса.

**ЧЕЛНОЧЕКЪ.** См. лодочка.

**ЧЕМЕРИЦА ВѢЛАЯ** и **Ч. ЧЕРНАЯ.** См. Вегатумъ.

**ЧЕМЫШЪ.** См. Халимодронъ.

**ЧЕРВЕЦЪ** (Coccus). Мелкое насекомое съ выпуклымъ щитомъ, заходящее на поверхности лл. и крѣпко къ нимъ присасывающееся. Высасывая соки, червецы сильно вредятъ рр.

**ЧЕРЕМУХА.** См. Церазусъ.

**ЧЕРЕНОКЪ.** Отрѣзанныя части побѣговъ, употребляемыя для размноженія растеній, преимущественно разновидностей, которая не воспроизводится сѣменами. Время года для посадки черенковъ весьма различно для различныхъ растеній; нѣкоторые принимаются во всякую пору. Рр. съ мягкой древесной размножаются черенками въ болѣе высокой температурѣ и спертomъ воздухѣ, нежелательно, въ которыхъ онѣ росли; имѣющія плотную древесину нуждаются въ тѣхъ же условіяхъ, но въ меньшей степени, а съ древесною крѣпкою, прирастающіе въ продолжительный срокъ, нуждаются въ температурѣ не столько высокой, сколько ровной. Травянистыя рр. до обрѣзки съ нихъ черенковъ должны быть въ полномъ ростѣ, полумягкія — когда древесина полу-вызрѣла, причемъ боковые побѣги лучше срѣзать съ частью старой древесины. Корни въ большинствѣ случаевъ вырастаютъ только изъ колыбѣ, — угловъ, которые должны быть углублены въ землю; нѣк. впрочемъ даютъ корни изъ всякой части стебля. Черенки должно брать только съ здоровыхъ раст. и оставлять большую часть листьевъ; при выкапываніи въ землю необходимо, чтобы основаніе листа было въ землѣ; поверхностный песокъ способствуетъ крѣпкому стоянію черенка.

Длина черенка опредѣляется тоже особенностями растенія, вообще предпочитаютъ черенки средней длины, не слишкомъ сочные, но и не сухіе. Указаніе на время посадки и на способъ наболаѣ

успѣшнаго производства даетъ только опытъ. Затѣненіе пѣжныхъ черенковъ весною и лѣтомъ, во всякомъ случаѣ необходимо.

Нѣкот. рр. размножаются *листовыми* черенками съ находящеюся на нихъ почкой. У Вегоній, Глюксиній и т. п. полукаются при этомъ корни на средней и боковыхъ жилкахъ безъ глазковъ или почекъ. Котиледонъ и др. сочныя раст. можно размножать простымъ саженемъ листа.

Наконецъ *корневые* черенки дѣлаются изъ частей корня, который даютъ отъ себя корни. Такимъ способомъ размножаются между прочимъ Клеродендронъ и Гераніумы.

**ЧЕРШНЯ.** См. Церазусъ.

**ЧЕРНОВЫЛНИКЪ.** См. Артемизія.

**ЧЕРНОВСКОЕ** яблоко. Ранний сквозной сортъ рѣпчатой формы, среднего размѣра, желтаго цвѣта съ румянцемъ.

**ЧЕРНОЕ ДЕРЕВО.** Яблоко средней поры поснѣванія, рѣпчатой формы, съ хрупкой мякотью, весьма пріятнаго кисловатаго вкуса, желтоватое съ бѣлыми крапинками.

**ЧЕРНОКЛѢНИКА.** См. Ацеръ.

**ЧЕРНОУСТОВЫЯ** рр. (melastomaceae). Травянистыя, кустарныя или древесныя раст. преимуществ. изъ тропич. Америки. Въ семействѣ 134 рода и 1800 видовъ. Бертолонія, Меластома, Миконія, Плерома и Рексія.

**ЧЕРТОВА ВОРОДА.** См. Винцеток-сикумъ.

**ЧЕРТОВЫ ОРѢХИ.** См. Трапа.

**ЧЕШНОКЪ.** См. Алыіюмъ.

**ЧЕХОЛЪ.** Листъ, обертывающій до распусканія початокъ.

**ЧЕШЕВИЦА.** См. Ленсъ.

**ЧИНАРЪ.** См. Плятанусъ.

**ЧИСТОТѢЛЪ.** См. Хелидоніумъ.

**ЧИСТОУСЪ.** См. Осмунда.

**ЧІШКИ.** См. Месплюсъ.

**ЧУВУЕКЪ.** Черенокъ виноградной лозы.

**ЧУВУШНИКЪ.** См. Филадельфусъ.

**ШАЛОТЬ** или **ШАРДОТЬ**—лукъ. См. Алыіюмъ.

**ШАМИССОА** (Chamissoa). Луи-Шарль-Альбертъ Шамиссо (Chamisso) знаменитый натуралистъ. С. амарантовыхъ (8). Троп. и Южная Америка. Тепл. куст. рр. Песч. волокн. дернов. Черенками изъ вызрѣвшаго роста, въ песокъ и въ разво-

дочномъ парникѣ. Темп. лѣтомъ 13—24, зимой 8—10°.

**III. альтиссима** (C. altissima, самая высокая). Ямайка. Цв. бѣлые. Высокое трав. р.

**ШАМПИНОНЪ.** Пленчатый грибъ, — *печерница*, разводимый искусственно на открытыхъ грядахъ и въ закрытыхъ помѣщеніяхъ, — шампиньонцахъ. Успѣхъ разведенія зависитъ отъ умѣнья заложить гряду, дѣлаемую изъ конского навоза, содержать надлежащую температуру и отъ достоинства грибницы.

**ШАПОЧКИ.** См. Тагетесъ.

**ШАПТАЛІЯ** (Chaptalia). *Шанталъ* (Chaptal)—знаменитый французскій химикъ. С. сложноцвѣтныхъ. (18). С. Америка. Трав. выносливыя рр. Легкая, песчанистая. Дѣленіемъ весной.

**III. томентоза** (C. tomentosa, пушистая). С. Америка. Цв. головки бѣлыя, въ маѣ, 6 д.

**ШАУЕРІЯ** (Schaueria). *Шауеръ* (Schauer), проф. въ Грейфсвальдѣ, † 1848. С. акантовыхъ. (8). Бразилія. Тепл. трав. или полукуст. рр. Уходятъ какъ за Юстицію.

**III. каликотриха** (S. calycotricha, съ волосистою чашечкой). Чашечка желтоватая, вѣнчикъ желтый, въ февраль. 2 ф. Сип. *Юстиція калитриха* (Justicia calytricha).

**ШАХМАТНЫЙ** порядокъ. Посадка въ переплетъ, въ перевязь, — растеніе одного ряда противъ промежутка другаго.

**ШВАННІЯ** (Schwannia). *Шваннъ* (Schwann)—врачъ въ Боннѣ. С. мальпигіевыхъ. (5). Бразилія. Тепл. куст. рр. Глин. дерн. съ лист. и пескомъ. Черенками изъ вызрѣвшаго роста, въ песокъ, въ парникѣ.

**III. элегансъ** (S. elegans, изящная). Цв. красные, пушистые, въ іюнѣ; лл. овальные.

**ШВЕЙГГЕРІЯ** (Schweiggeria). *Швейггеръ* (Schweigger)—проф. бот. въ Кёнигсбергѣ, † 1821. С. фіалковыхъ. (2). Бразилія и Меконка. Тепл. куст. рр. Глин. дерн. съ торф. и пескомъ. Черенками изъ молодого роста, въ песокъ, въ парникѣ.

**III. пауцифлора** (S. pauciflora, малоцвѣточная). Бразилія. Цв. бѣлые, въ декабрь. 4—6 ф.

**ШВЕНКІЯ** (Schwenkia). *Швенкъ* (Schwenck)—проф. медицины въ Гейѣ, † 1671. С. пасленовыхъ. (20). Ю. Америка, троп. Африка. Тепл. трав. или полукуст. рр. Песч. глин. дерн. Сѣменами.

**III. американа** (S. americana, американская). Бразилія. Цв. лиловые, въ августѣ. 2 ф. Однол.

**ШЕВРЪ-ФЕЙЛЬ.** См. Лонидера.

**ШВЕДЕЯ** (Scheelea). *Шееле* (Scheele), знаменитый германскій химикъ. С. пальм. (7). Троп. Америка. Тепл. пальмы. Торф. пополамъ съ глин. дерн. и съ добавленіемъ песку. Сѣменами.

**III. унгвисъ** (S. unguis, когтевая). Лл. перисторазсѣченные отъ 2 до 6 ф. длиной, темно-зеленые, влажлива съ коричневыми волокнами. **III. эксцельза** (S. excelsa, высокая). Венецуела. Лл. перисторазсѣченные, въ 15 до 24 ф. длиной, эллиптические; стволъ въ 40—50 ф. вышиной и въ 2—3 ф. толщиной.

**ШЕКОЛАДНОЕ ДЕРЕВО.** См. Теоброма.

**ШЕЛКОВИЦА.** См. Морусъ.

**ШЕЛКОВКА** или **КРАСНОТѢЛОЕ** яблоко. Сортъ средней поры поснѣванія, среднихъ размѣровъ, продолговатый, краснаго цвѣта, слабо-кисловатаго вкуса. Мякоть красноватая, кожица шелковистая, что и объясняетъ поводъ къ его названію.

**ШЕЛКОПРЯДЪ** (Bombyx). Ночная бабочка, гусеница которой особенно вредна плододоводству и лѣсамъ. Ни одно семейство бабочекъ не заключаетъ столько вредныхъ гусеницъ, какъ шелкопряды.

**ШЕЛЬХАММЕРА** (Schelhammera). *Шельхаммеръ* (Schelhammer), проф. въ Гейѣ, † 1716. С. лилейныхъ. (2). В. Австралія. Оранж. многол. трав. рр. Глин. дерн. съ торф. Дѣленіемъ.

**III. мультифлора** (S. multiflora, многоцвѣтная). Цв. бѣлые, въ іюнѣ. 6—11 д.

**III. ундулата** (S. undulata, волнистая). Цв. бѣдно-лиловые, въ іюнѣ. 6 д.

**ШЕНІЯ** (Schoenia). Д-ръ *Шенъ* (Schoen)—ботаникъ. С. сложноцвѣтныхъ. (1). Р. схожее съ Хелихризумъ. Уходятъ такой же.

**III. Кассиніана** (S. Cassiniana, Кассини). Австралія. Цв. головки желтыя, въ апрѣлѣ. 1—2 ф.

**ШЕПЕРДІЯ** (Shepherdia). *Шепердъ* (Shepherd), директоръ ливерпульскаго бот. сада. † 1836. С. лоховыхъ. (3). С. Америка. Полувыносл. или выносл. кустар. или низкор. древ. рр. Уходятъ какъ за Хиппофае.

**III. аргентеа** (S. argentea, серебристая). Цв. желтые, въ апрѣлѣ; плоды шарлаховые, кисловатые. Высокій кустъ. **III. канадэнзисъ** (S. canadensis, канадская). Цв. желтоватые, въ маѣ; плоды желто-красные, безвкусные. 3—6 ф.

**ШЕПФИЯ** (Schoerfia). *Шенфъ* (Schoerf)—германскій ботаникъ. С. моризинниковыхъ. (10) Троп. Азія и Америка. Тепл. или оранж. куст. рр. Торф. съ глин. дерн. и пескомъ. Черенками въ песокъ, въ парникѣ.



**Ш. ффрагранс** (*S. fragrans*, душистая). Непаль. Цв. желтые, съ запахомъ, въ июль. 15 ф.

**ШЕФФЕРІА** (*Schaefferia*). *Шеффер* (*Schaeffer*) имѣе. натуралистъ, † 1790. С. целастровыхъ. (2). Вестиндія, Техасъ, Нов. Мексика. Тепл. куст. рр. Глин. дерн. съ торф. и пескомъ. Черенками изъ полузрѣлаго роста, въ парникъ.

**Ш. фрутесценс** (*S. frutescens*, кустарная). Вестиндія. Цв. бѣлые, въ августъ; плоды шарлаховые. 10 ф.

**ШИПАНТУСЪ** (*Schizanthus*). *Schizo*—раскалывать, и *anthos*—цв., по разсѣченному илчичку. С. пасленовыхъ. (7). Чили. Полувыносл. однол. рр. Сильная глин. дерн. съ лист. Сѣменами.

**Ш. Грѣми** (*S. Grahami*, Грѣма). Цв. лиловые или розовые, верх. губа желтая съ лиловыми кончиками, съ іюня до октября. 2 ф. Разновидность *remjusa* (*retusus*) ростѣе, съ болѣе крупными розовыми цв. **Ш. кандидусъ** (*S. candidus*, бѣлый). Цв. бѣлые, въ июль. 2 ф. **Ш. пиннатусъ** (*S. pinnatus*, съ перистыми лл.). Цв. лиловые или фіолетовые, передняя губа съ желтымъ среднимъ сегментомъ, некрапанымъ пурпуровымъ или фіолетовымъ, съ іюня до октября. Имѣетъ очень много различныхъ формъ и садовыхъ названій.

**ШИЦЕА** (*Schizaea*). *Schizo*—разсѣкаться, по разсѣченнымъ ваямъ. С. папоротниковъ. (16). Остиндія, Африка, Австралія, Полинезія, троп. Америка. Тепл. оранж. или выносл. папоротники.

**Ш. бифида** (*S. bifida*, двухразсѣченная). Австралія. Ван. длп. 6—18 д., вылообразныя. Оранж. **Ш. рупестрисъ** (*S. rupestris*, любящая каменистую почву). Австралія. Ван. какъ лл. у злаковъ, сплюснутый, длиной въ 3—4 д. Оранж.

**Ш. варіеата** (*S. variegata*, пестролистный). Борнео. Лл. продолговато-ланцетовидные съ бѣлою серебристою полосой. Вевъ стебля. **Ш. криспата** (*S. crispata*, курчавый). Борнео. Лл. продолговато-сердцевидные, темно-зеленые съ сѣрою полосой съ каждой стороны отъ сред. жилки. **Ш. неогвинейсизе** (*S. neoguineensis*, Новой Гвиней). Новая Гвиней. Лл. овальные, остроколючные съ сердцевиднымъ основаніемъ, темно-зеленые съ неправильными крупными желтоватыми пятнами. **Ш. пѣлъхра** (*S. pulchra*, красивый). Борнео. Лл. продолговатые, остро-

конечные, съ сердцевиднымъ основаніемъ, устьянные серебристо-зелеными пятнами.

**ШИМА** (*Schima*). Арабское названіе. С. теристрейнныхъ. (4). Троп. Азія и о. Индѣйскаго архипелага. Тепл. древ. или куст. рр. Торф. Черенками въ торф. з. въ парникъ.

**Ш. Нороньѣ** (*S. Noronhae*, Норонья). Троп. Азія. Цв. бѣлые, въ августъ и сентябрь. Сил. **Ш. суперба** (*S. superba*).

**ШИНУСЪ** (*Schinus*). Названіе заимствованное у Теофраста. С. сердечниковыхъ. (12). Яркія мѣстности Ю. Америки. Тепл. кустарники или низкорослыя древ. рр. Уходъ какъ за Русъ.

**Ш. Молье** (*S. Molle*, Мулы въ Перу). Бразилія и Перу. Цв. желтовато-зеленые, въ июль—августъ; плоды розовые, въ горшину. Содержитъ смолу, 20 ф. **Ш. теребинтифоліусъ** (*S. terebinthifolius*, съ лл. какъ у Теребинтуса). Бразилія. Цв. зеленовато-бѣлые, въ июль. 20 ф.

**ШИПОВНИКЪ**. См. Роза.

**ШИПОВИДНЫЙ**. Имѣющій видъ шипа, но не настоящій шипъ.

**ШИПЪ**. Колочка. Игла растенія, которая не вырастаетъ подобно колочку, какъ сучокъ, а бываетъ какъ бы насажена и приросшию подношвой.

**ШИРОКОЕ** яблоко. См. Плодовитое ківское.

**ШИЦАНДРА** (*Schizandra*). *Schizo*—раскалывать и *aner, andros*—мужъ, по расколотымъ тычинкамъ. С. магноліевыхъ. (6). Сѣв. Америка и троп. в. Азія. Тепл. и оранж. куст. рр. Песков. глин. дерн. съ торф. Черенками изъ зрѣлаго роста, въ песокъ, подъ стекломъ.

**Ш. кокцінеа** (*S. coccinea*, шарлаховая). С. Америка. Цв. шарлаховые, мелкіе, въ июль. Цѣлое высокое оранж. р. **Ш. мрамората** (*S. marmorata*, мраморная). Борнео. Лл. сердцевидные, остроколючные съ серебристо-бѣлыми разводами. Цѣлое тепл. р. Сил. *Sphaerostema marmoratum*.

**ШИЦОВАЗИСЪ** (*Schizobasis*). *Shizo*—раскалывать и *basis*—основаніе: при созрѣваніи плода завядшій цв. покровъ снадаетъ въ видъ колпачка. С. лилейныхъ. Тропич. юж. Африка. Тепл. или оранж. луков. рр. Легкая глин. дерн. Сѣменами и отпрысками.

**Ш. интриката** (*S. intricata*, перепутанный). Ю. Африка. Цв. покровъ бѣлый; лл. шпильные, мясистые.

**ШИЦОЛОВІУМЪ** (*Schizolobium*). *Schizo*—рѣзать и *lobos*—стручокъ, втроято п. ч. стручокъ раскрывается. С. бобовыхъ. (2). Бразилія, Панама. Тепл. деревья. Уходъ какъ за Цезальпиніа.

**Ш. эксцельзумъ** (*S. excelsum*, высокий). Бразилія. Цв. желтые; лл. 18-парные. 120 ф.

**ШИЦОМЕРІА** (*Schizomeria*). *Schizo*—рѣзать и *meris*—часть, по усѣченнымъ лепесткамъ. С. камеломковыхъ. (1). Оранж. деревья. Глин. дерн. съ пескомъ. торф. Черенками.

**Ш. овата** (*S. ovata*, овальная). Австралія. Цв. бѣлые, мелкіе, въ июль. 50 ф.

**ШИЦОПЕТАЛОНЪ** (*Schizopetalon*). *Schizo*—рѣзать и *petalon*—лепестокъ, по разрѣзаннымъ лепесткамъ. С. крестоцвѣтныхъ. (5). Чили. Оранж. или полувын. однол. трав. рр. Глин. дерн. съ торф. и пескомъ. Посѣять въ горшкѣ, весну держать въ оранжереѣ, а потомъ высадить; при этомъ осторожно обходиться съ корнями.

**Ш. Валькери** (*S. Walkeri*, Валькера). Цв. бѣлые, кистями, въ маѣ до августа. 1—2 ф.

**ШИЦОСТИЛИСЪ** (*Schizostylis*). *Schizo*—рѣзать и *stylis*—столбикъ; столбикъ раздѣленъ на трое. С. косатиковыхъ. (2). Ю. Африка. Оранж. многол. трав. р. Песков. глин. дерн. съ торф. или листов. Дѣленіемъ весной.

**Ш. кокцінеа** (*S. coccinea*, шарлаховый). Цв. красные, двуряднымъ колосомъ, въ октябрь или ноябрь. 3 ф.

**ШИЦОФРАГМА** (*Schizophragma*). *Schizo*—рѣзать и *phragma*—перегородка; при созрѣваніи плода, выпадаютъ перегородки. С. камеломковыхъ. (1). Полувыносл. куст. р. Глин. дерн. съ пескомъ. Черенками въ песокъ на умѣренно нагрѣтомъ грунтѣ, или сѣменами.

**Ш. хидрангеойдесъ** (*S. hydrangeoides*, похожая на Хидрангеа). Японія. Цв. бѣлые или тѣлесные, осенью. Р. цѣпкое, высокое.

**ШИПКА**. Плодъ изъ отвердѣлыхъ чешуевидныхъ плодинокъ, расположенныхъ симметрично вокругъ оси.

**ШКОЛА**. Разсадинка для разводки разныхъ возрастовъ плодовыхъ, лѣсныхъ и др. растеній (плодовая, древесная, кустарная и пр. школа).

**ШЛИММІА** (*Schlimmia*). *Шлиммъ* (*Schlimm*)—одинъ изъ коллекторовъ Линдена. С. орхидей. (3). Анды Колумбій. Тепл. эпифит. рр.

**Ш. трифиды** (*S. trifida*, триразсѣченная). Новая Гренада. Цв. съ превосходнымъ запахомъ, напоминающимъ Жасминъ и Померанецъ, бѣлые съ пурпуровыми пятнышками, губа тоже бѣлая съ ярко-оранжевымъ пятномъ.

**ШЛУМБЕРГІЯ** (*Schlumberge*—*ria*). *Шлумбергеръ* (*Schlumberger*),—садо-

водъ въ Берлинѣ. С. бромеліевыхъ. (3). Ю. Америка. Тепл. многол. трав. рр. Уходъ какъ за Тилландсіа.

**Ш. Морреніана** (*S. Morreniana*, Моррена). Мѣсто родины неизвѣстно. Цв. желтые, прицвѣтники темно-пурпуровые.

**ШНИТЛУКЪ**. См. Алілюмъ.

**ШНУРЪ**. Бичевка, которую натягиваютъ для направленія конки или разбивки.

**ШОМБЪРГКІЯ** (*Schomburgkia*). Сэръ *Шомбургъ* (*Schomburgk*)—путешественникъ, † 1865. С. орхидей. (12). Троп. Америка. Тепл. эпифиты. Мохъ и торф. Дѣленіемъ.

**Ш. тибичинисъ** *грандифлора* (*S. tibicinis grandiflora*, крупноцвѣтная съ коронными рогами). Гондурасъ. Цв. блѣдно-пурпуровые, бока губы съ пурпур. краями, середина оранжевая съ пурпуровыми черточками. Сил. *Ш. грандифлора* (*S. grandiflora*).

**ШОМЕЛІА** (*Chomelia*). *Шомель* (*Chomel*)—врачъ Людовика XV, авторъ *Abregé de l'histoire des plantes usuelles*, † 1712. С. мареновыхъ. Тепл. куст. рр., нуждающіяся въ такомъ же уходѣ какъ Иксора или Хлороксилонъ.

**Ш. спиноза** (*S. spinosa*, игловатая). Картагена. Цв. бѣлые, пахнущіе ночью; лл. овальные. 8—12 ф.

**ШОТІЯ** (*Schotia*). *Ван-деръ-Шотъ* (*Van-der-Schot*),—путешествовавшій съ Жакеномъ, † 1819. С. бобовыхъ. (4). Ю. и троп. Африка. Оранж. куст. рр. Песков. глин. дерн. съ волокн. торф. Черенками изъ полузрѣлаго роста, въ песокъ, въ парникъ.

**Ш. латифолія** (*S. latifolia*, широколистная). Цв. розовые или тѣлесные, метелками, въ июль. Стручья жарить и ѣдятъ. 20—30 ф. Дерево.

**ШОУВІЯ** (*Schouwia*). *Шоувъ*—знаменитый датскій ботаникъ, † 1854. С. крестоцвѣтныхъ. (3). Аравія. Выносл. трав. однол. рр. Легкая песковатая. Сѣменами.

**Ш. арабика** (*S. arabica*, арабійская). Цв. розово-пурпуровые, въ июль. 1 ф.

**ШПАЛЕРА**. Развязка растенія по рѣшеткѣ, различнымъ образомъ. Можетъ быть воздушная или оранжерейная. Употребляется преимущественно для плодовыхъ деревъ.

**ШПИНАТЪ**. (См. Спинація).

**ШПОРЦА**. Трубочатый отростокъ, или выростъ на листовой и обычно на цвѣточной части.

**ШПРЕКЕЛІА** (*Sprekelia*). *Шпрекельсенъ* (*Sprekelsen*)—написавшій сочиненіе о лилейныхъ рр., † 1764. С. ама-



риадисовыхъ. (2). Мексика, Боливия. Полувынос. луков. рр. Уходъ какъ за Амариллисъ.

**III. формозиссима** (*S. formosissima*, очень красивая). Мексика. Цв. карминные или бѣлые, въ июль. 2 ф. Спн. **III. глаука** (*S. glauca*) и **Амариллисъ формозиссима** (*Amaryllis formosissima*).

**ШПРЕНГЕЛИЯ** (*Sprengelia*). Христианъ-Конрадъ *Шпренгелъ* (*Sprengel*) въ Бранденбургѣ авторъ знаменитаго сочиненія объ оплодотвореніи цвѣтовъ, † 1816. С. атакрисовыхъ. (3). Вѣт троп. В. и Ю. Австралія. Оранж. куст. рр. Песков. торф. Сѣменами или черенками.

**III. инкарната** (*S. incarnata*, тѣлесная). Цв. малиновые, въ май. 2 ф.

**ШПРИЦЪ ШПРИНЦОВЪ** (А. Брызгалка, ручная водометка, прыскъ. Вообще трубка съ ситкомъ, въ которой ходитъ поршень).

**ШПРОССЕЛЬКОЛЬ**. См. Брасека.

**ШРАДЕРА** (*Schradera*). Генрихъ *Шрадеръ* (*Schrader*)—нѣмецкій ботаникъ, † 1836. С. мареновыхъ. (5). Бразилія, Гвиана, Вестиндія и Горгонскіе о. Тепл. полуэпифитныя куст. рр. Песков. глин. дерн. съ торф. Черенками въ песокъ, въ парникъ.

**III. цефалотесъ** (*S. cephalotes*, головчатая). Ямайка. Цв. бѣлые, въ июль. 4 ф.

**ШРАНКИЯ** (*Schrankia*). *Шранкъ* (*Schrank*)—нѣмецкій ботаникъ, † 1835. С. бобовыхъ. (10). Америка. Тепл. или оранж. трав. или полукуст. рр. Глин. дерн. съ торф. и пескомъ. Черенками изъ молодого роста, въ песокъ, въ парникъ, или отдѣленіемъ корневыхъ клубней.

**III. акулеата** (*S. aculeata*, колючая). Вера-Крусъ. Цв. красные, въ июль. 1—2 ф. Тепл. многол. **III. унцината** (*S. uncinata*, съ крючками). Юж. Соед. Штаты. Цв. розовые, съ июля до августа. 2 ф. Оранж. многол. или полукуст. растеніе.

**ШТАМБЪ**. **ШТАМБА**. Стволъ. Лѣшина. Толынь. Голынь. Пенъ. Чистъ. Штамбовое дерево растетъ въ *глыстахъ*, а не въ комъ или сучьяхъ. *глыстовое*; *глысное*, *голынное*.

**ШТЕЙДНЕРА** (*Steudnera*). *Штейднеръ* (*Steudner*), германскій ботаникъ. С. ароидныхъ. (4). Бурма. Тепл. многол. трав. рр. Песковая глин. дерн. съ листов. и кусками древ. угля. Воздухъ влажный. Отпрысками, черенками или дѣленіемъ. Тепл. зимой 13—15, лѣтомъ 15—24°.

**III. колоказіефолія** (*S. colocasiaefolia*, съ лл. какъ у Колоказіи). Чеходъ ждот. вѣтй снаружи, пурпуровый внутри, дочатокъ бѣлый; лл. цвѣтвидныя на филотовыхъ черешкахъ.

**ШТЕЛЛЕРА** (*Stellera*). *Штел-*

*леръ* (*Steller*), русскій коллекторъ, † 1746. С. ягодковыхъ. (8). Центр. и З. Азія. Многол. вынос. трав. рр., полукуст. или куст. рр.

**III. альтаика** (*S. altaica*, алтайская). Алтай. Цв. бѣлые, въ июль. 1 ф.

**ШТЕРНБЕРГИЯ** (*Sternbergia*). Графъ Каспаръ *Штернбергъ* (*Sternberg*), знаменитый ботаникъ, † 1838. С. амариллисовыхъ. (20). В. Европа и Средиземн. побережье. Вынос. или полувынос. луков. рр. Рыхлая глин. дерн. При посадкѣ луковицы углублять на 4—6 д.

**III. литея** (*S. lutea*, желтая). Центр. Европа. Цв. желтые, осенью. 6—12 д. Спн. *Амариллисъ литея* (*Amaryllis lutea*). Имѣетъ нѣсколько разновидностей, изъ которыхъ *сиккула* (*sicula*) даетъ крупныя цв.

**ШТИФТИЯ** (*Stiffia*). *Штифтъ* (*Stift*)—лѣбъ-медикъ австрійскаго Двора, † 1836. С. сложнотѣпныхъ. (5). Бразилія и Гвиана. Тепл. куст. или древ. рр. Волоки. глин. дерн. Черенками изъ молодого роста въ песокъ и парникъ.

**III. хризанта** (*S. chrysantha*, съ золотисто-желтыми цв.). Бразилія. Цв. головки оранжевыя, въ февраль до апрѣля. 6 ф.

**ШТОКЪ-РОЗА** (Альтея-розеа). Старинное садовое р., цвѣтущее осенью. Размощ. сѣменами, черенками и дѣленіемъ, а иногда глазками съ боковыхъ вѣтвей, въ июль—августъ, когда глазки тверды, въ песокъ, подъ закрытіемъ. Сѣмена свѣжія, осенью въ плошки, въ тепл.; или въ июль—июль на воздухѣ. Всходы разсаживаютъ въ горшки и зиму сохраняютъ отъ мороза, а весной, въ май, высаживаютъ на воздухѣ. Черенки дѣлаютъ изъ молодыхъ отростковъ, у самаго корня, когда они бываютъ длиною въ 3 д. Ихъ сажаютъ по одностокъ въ горшки, въ песокъ, и держатъ подъ закрытіемъ, пока не дадутъ корней. Наконецъ дѣленіе корней производится осенью, по отцвѣтеніи. Въ умеренномъ климатѣ штокъ-розу можно оставлять на зиму въ грунтъ, въ противномъ случаѣ—вынимать и сохранять въ сухомъ помѣщеніи, защищенномъ отъ мороза, пересаживая въ горшки, которые ставятъ у свѣта и не пересушивать. При зацвѣтаніи въ грунтъ полезно класть поверхностное удобрение. Лѣтомъ необходимо хорошо поливать. У сильныхъ можно оставить 2—3 цвѣт. стебли, у слабыхъ—только одинъ. Къ каждому р. должна быть поставлена крѣпкая палка для привязки, на солнечномъ мѣстѣ р. можетъ достигнуть вышины 8—10 ф. и цвѣсти на разстояніи 3 ф. отъ земли.

**ШТЫКЪ**. Пласть, слой, на каюю

глубину вразъ беретъ лопата (три штыка составляютъ аршинъ глубины). *Штыковать*—всконать на штыкъ и переворотить.

**ШУАЗІЯ** (*Choisy*). *Шуазъ* (*Choisy*) женевскій ботаникъ. С. рутовыхъ. (1). Мексика. Тепл. куст. р., требующее такого же ухода, какъ Хлороксилонъ.

**III. терната** (*C. ternata*, тройчатая). Мексика. Цв. бѣлые, пахучіе, въ июль. Лл. тройчатые. 6 ф.

**ЩЕВЕНЬ**. **ЩЕВЕНКА**. Битый измелченный камень. Мелкая галька. Отсюда *щебенитъ*, *щебенить*.

**ЩЕЛКУНЪ**. Жукъ, такъ названный потому, что если его положить на спину, то онъ подпрыгиваетъ со щелканіемъ отъ особаго устройства груднаго членника, у котораго есть отростокъ входящій въ ямочку и упругостью своею дѣйствующій какъ шарниръ. Личинка вредна не менѣе личинки майскаго жука: живя нѣсколько лѣтъ въ землѣ, она гложетъ корни. Личинку эту англичане называютъ *проводочнымъ червемъ* (*wire-worm*), по тонкому тѣлу, одѣтому твердой оболочкой.

**ЩЕМЯЛИНА**. См. Прунелля.

**ЩЕТИНКА**. Тонкая, прямая, длинная колотка; твердый волосокъ.

**ЩИТОКЪ**. Цвѣточная кисть, въ которой цвѣточные почки по мѣрѣ приближенія къ вершинѣ становятся короче, такъ что всѣ цвѣтки кисти приходятся на одной поверхности.

**ЭАРИНА** (*Earina*). *Еарина*—весна, по времени цвѣтенія. С. орхидей. (6). Остр. тихаго о., Нов. Зеландія. Тепл. эпифиты. Волоки. торф. съ мохомъ, на которые прикрѣпляется р. Темп. лѣтомъ 13—24, зимой 8—12°.

**Э. мукроната** (*E. mucronata*, съ остроконечными лл.). Цв. бѣлые, въ май.

**ЭВЕНУСЪ** (*Ebenus*). *Ebenos*—слоновая кость. С. бобовыхъ. (8). Средизем. побережье. З. Азія. Трав. или полукустар. оранж. рр. Уходъ какъ за Антильск.

**Э. Сибторпії** (*E. Sibthorpii*, Сибторпа). Атласъ и Парнасъ. Цв. пурпуровые. Р. травян. Спн. **Э. пинната** (*E. pinnata*).

**ЭБЕРМАЙЕРА** (*Ebermaiera*). Карлъ *Эбермайеръ* (*Ebermaier*)—нѣмецкій авторъ сочиненія о врачевныхъ рр. С. акантовыхъ. (30). Остидія, Малайск. арх., Китаи, троп. Австралія, Бразилія. Тепл. трав. рр. Глин. дерн. 2 ч., торф. 1 ч. Черенками изъ коней, побѣговъ, въ песокъ, въ развод. парникъ. Темп. лѣтомъ 13—20, зимой 6—10°.

**Э. нѣтида** (*E. nitida*, блестящая). Бра-

зилія. Цв. бѣлые. 4 д. Р. походить на Фиттонія. Спн. *Хамерантѣмумъ нѣтидумъ* (*Chamaeanthemum nitidum*).

**ЭВАДЕНІЯ** (*Euadenia*). *Еу*—хорошо и *aden*—железа; по придатку при основаніи цвѣтоноса. С. каперовыхъ. (3). Тропич. Африка. Тепл. трав. или полукуст. рр. Глин. дерн. Черенками въ песокъ, въ парникъ.

**Э. эминенсъ** (*E. eminens*, знаменитая). Цв. желтые, расположенные вѣтвистыми цвѣтоносами, въ видѣ канделябры, у которой по концамъ сидятъ желтые цв., какъ газовыя горѣлки.

**ЭВХЕТИСЪ** (*Euchaetis*). *Еу*—хорошо и *chaite*—волосъ; лепестки внутри съ бородкой. С. рутовыхъ. (5). Оранж. похожая на верескъ, изъ Ю. З. Африки. Уходъ какъ за Діосма.

**Э. гломерата** (*E. glomerata*, клубочков. М. Д. Н. Цв. бѣлые, въ май. 2 ф.

**ЭВГЕНІЯ** (*Eugenia*). Въ честь Евгенія Савайской. С. миртовыхъ. (500). Тропич. Азія, Африка, Америка, Австралія. Тепл. и оранж. древ. и куст. рр. Уходъ какъ за Миртусъ.

**Э. бразиліензисъ** (*E. brasiliensis*, бразильская). Бразилія. Цв. бѣлые, одиночные, въ апрѣль; лл. овальные, тупые. 6 ф.

**Э. буксифолія** (*E. buxifolia*, съ лл. какъ у Буксеа). Вестиндія. Цв. бѣлые, по нѣскольку, въ май; лл. продолговато-овальные. 4—6 ф. Тепл. **Э. миртифолія** (*E. myrtifolia*, съ лл. какъ у Мирты). Куинслендъ и Нов. Юж. Валлисъ. Цв. по три или четыре, бѣлые, лл. отъ яйцевидныхъ до овально-ланцетовидныхъ; плоды красные, яйцевидные. 6—12 ф. Спн. **Э. аустрالیесъ** и **Ямбоза аустрالیесъ** (*E. australis*, *Jambosa australis*).

**Э. ямбоза** (*E. Jambosa*, *Jambosa*). Остидія. Цв. кистями, бѣлые, съ февраля до июля; лл. узко-ланцетовидные. 20—30 ф. Спн. **Ямбоза аугуларисъ** (*Jambosa vulgaris*).

**ЭВКАЛИПТУСЪ** (*Eucalyptus*). *Еу*—хорошо и *kalypto*—покрывать; чашечка покрывается цв. до распусканія и потомъ сваливается чѣлною какъ крышка. (100). Австралія, Индѣск. архип. Оранж. древ. рр. Торф. съ глин. дерн. Сѣменами и черенками изъ молодыхъ бобовыхъ побѣговъ, въ началѣ лѣта. Темп. зимой 1—6°.

**Э. глобулюсъ** (*E. globulus*, шаровидный). Цв. крупные, бѣлые. До 300 ф. **Э. Гуннии** (*E. Gunnii*, Гунна). Цв. бѣлые. 30 ф. Одинъ изъ самыхъ выносливыхъ. **Э. кокцифера** (*E. coccifera*, съ *Coccus*). Цв. пурпуровые, въ декабрь. Низкорослое дерево. Спн. **Э. дафноидесъ** (*E. daphnoides*). **Э. цитриодора** (*E. citriodora*, съ лимоннымъ запахомъ). Лл. съ железистыми по-



лосками, при растирании пальцами пахнущее лимономъ.

**ЭВКЛЕА (Euklea).** *Eukleia* — слава, по красотѣ древесины. С. гебеновыхъ. (19). Оранж. куст. рр. съ Мыса Д. Н. Уходъ какъ за Дюспросомъ.

**Э. полиандра (E. polyandra)**, со многими тычинками). Цв. двудомные, въ июль — июль. Сип. *Diplonema эллиптика* (*Diplonema elliptica*).

**ЭВКОМИСЪ (Eucomis).** *Eukomes* — съ красивыми волосами. С. лилейныхъ. (5). Южн. Африка. Полувыпосл. луковичн. рр. Сильная, легкая. Отпрысками.

**Э. биколоръ (E. bicolor)**, двуцвѣтный). Наталь. Цв. зеленоватые съ пурпуровыми краями, въ августѣ. **Э. нана (E. nana)**, низкий). М. Д. Н. Цв. коричневые, въ май. 9 д. **Э. пунктата (E. punctata)**, крапчатый). М. Д. Н. Цв. буро-зеленые, въ июль. 2 ф.

**ЭВКРОЗИЯ (Eucrosia).** *Eu* — хорошо и *kyssos* — бахрома. С. амариллисовыхъ. (1). Перу. Сильная, гли. дерн. плотная. Зимовать лучше въ теплицѣ. Отпрысками. Темп. зимой 2—6°.

**Э. биколоръ (E. bicolor)**, двуцвѣтный). Перу. Цв. оранжевые, въ апрѣлѣ. 1 ф. Р. рѣдкое.

**ЭВКРИФИЯ (Eucyphia).** *Eu* — хорошо и *kyrphios* — покрытый, по колпачку у цв. (4). Австралія, Чили. Оранж. кустар. и древ. рр. Гли. дерн. съ торф. Черенками изъ молодого роста въ песокъ, подъ стекломъ.

**Э. кордифолия (E. cordifolia)**, сердцелистная). Тасманія. Цв. бѣлые, красивые; высокое дерево. Сип. *Капродонтозъ люцида* (*Caprodonotos lucida*).

**ЭВЛАЛИЯ (Eulalia).** *Eu* — хорошо и *lalia* — молва, по хорошему отзывамъ о р. С. злаковъ. (1). Японія. Холод. оранж. Обычн. садовая. Дѣленіемъ.

**Э. японика (E. japonica)**, японская). Японія. Цв. пурпуровые, метелками; лл. линейно-ланцетовидные, длиною въ 3 ф. Имѣетъ пестролистныя формы, — *фблисъ стріатисъ* (*foliis striatis*) съ бѣлыми продольными и *зебрина* (*zebrina*) — желтыми поперечными полосами.

**ЭВЛОФИЯ (Eulophia).** *Eulophos* — съ красивыми каймами; по губѣ. О. орхидей (50). Троп. и Южн. Америка. Тепл. земныя рр. Уходъ какъ за Каланте.

**Э. макростэхія (E. macrostachya)**, съ крупнымъ колосомъ). Цейлонъ. Цв. желтые, губа съ красно-пурпуровыми черточками, очень вогнутая, въ январѣ.

**ЭВНОМИЯ (Eunomia).** *Eu* — хорошо и *nomos* — порядокъ; лл. супротивные, сѣмена двойчатые. С. крестоцвѣтныхъ. (2).

Съ горъ Малой Азіи. Полувыпосл. или оранж. полукуст. рр. Песчанистая. Сѣменами или черенками, лѣтомъ, подъ стекломъ.

**Э. опозитифолия (E. oppositifolia)**, съ супротивными лл.). Цв. бѣлые, въ июль. 6—12 д.

**ЭВОЛЬВУЛОСТЬ (Evolvulus).** *Evolvulus* — не обвиваю, въ отличіе отъ *Convolvulus*. С. вьюнковыхъ. (70). Жаркія страны. Тепл. однол. или мног. распростертыя или ползучія, рѣдко прямые рр. Уходъ какъ за Конвольвулюсъ.

**Э. пурпурео-цѣрулеусъ (E. purpureo-coeruleus)**, сине-пурпуровый). Ямайка. Цв. сине-пурпуровые, въ июль — августъ. 1½ ф.

**ЭВНИМУСЪ (Eunymus).** Название, встрѣчаемое у Теофраста. С. краснопузыриковыхъ. (40). Горы Индіи, С. Китай, Японія, Европа, С. Америка, Австралія. Выпосл. или полувыпосл. кустарн. или древ. рр. Гли. дерн. съ пескомъ. Черенками изъ прошлогодн. роста.

**Э. атропурпуреусъ (E. atropurpureus)**, черно-красный). С. Америка. Цв. темно-пурпуровые, въ июль. 6—14 ф. **Э. фимбриатусъ (E. fimbriatus)**, бахромчатый). Японія. Цв. бѣлые. 12 ф. **Э. европеусъ (E. europaeus)**, европейскій). *Верескельдъ*. Европа, С. Азія. Цв. зеленоватые, дурно пахнущіе, въ май. 6—20 ф. **Э. японикусъ (E. japonicus)**, японскій). Непаль. Цв. бѣлые, мелкіе, въ апрѣлѣ. 20 ф. Имѣетъ нѣсколько пестролистныхъ формъ.

**ЭВПАТОРИУМЪ (Eupatorium).** Название, взятое у Diosкорида. С. сложнопцвѣтныхъ. (400). Залади. Европа, Сѣв. и троп. Африка, Америка, Австралія. Тепл., оранж. и выносл. травян. и кустарн. рр. Тепл., оранж. и выносл. травянистыя — въ обыкн. з. и дѣленіемъ при началѣ роста; тепл. и оранж. кустарн. и полукуст. — въ гли. дерн. съ торф. — черенками въ песокъ, въ парникѣ. Темп. обычная для теплицы и оранжерей.

**Э. атрорубенсъ (E. atropubens)**, черно-красный). Мексика. Цв. гол. красноватые съ лиловымъ оттѣнкомъ, осенью и зимой. Оранж. Сип. *Хебеклинумъ атрорубенсъ* (*Hebeclinium atropubens*). **Э. іантинумъ (E. ianthinum)**, фиолетовый). Мексика. Цв. головки пурпуровыя, зимой. Оранж. Сип. *Хебеклинумъ іантинумъ* (*Hebeclinium ianthinum*). **Э. рипариумъ (E. riparium)**, побережный). Южн. Америка. Цв. головки бѣлыя, весной. Оранж.

**ЭВПОМАТИЯ (Eupomatia).** *Eu* — хорошо и *poma* — крышечка, по колпачку покрывающему цв. до распусканія. С. апоновыхъ. (2). Австралія. Оранж. куст. рр. Песчан. торф. съ волокн. гли. дерн.

Черенками изъ зрѣлаго роста, въ песокъ, подъ колпакомъ.

**Э. Бенеттіи (E. Bennetii)**, Беннетта). Цв. зеленоватые. 1—2 ф.

**ЭВРИГАНІЯ (Eurygania).** *Euryg* — широкий и *ganos* — блестя. *Эвриганія* — жена Эдипа. С. брусничныхъ. (12). Анды Ю. Америки. Оранж. куст. Гли. дерн. съ торф. и пескомъ. Черенками въ песокъ просто или подъ стекломъ.

**Э. овата (E. ovata)**, яйцевидная). Цв. красные, въ июль.

**ЭВРИКЛЕСЪ (Eurycles).** *Euryg* — широкий и *kleio* — закрывать; по цвѣт. покрову. С. амариллисовыхъ. (2). С. Австралія, Малайск. архип. Тепл. луков. рр. Легкая гли. дерн. съ пескомъ, листовая и коровымъ перегноемъ. Сѣменами, но чаще отпрысками. Темп. лѣтомъ 10—20, зимой 6—10°.

**Э. амбоинензисъ (E. amboinensis)**, изъ Амбоины). Амбоина. Цв. бѣлые, въ мартѣ. 1—2 ф. Сип. *Э. австралика* и *Панкраціумъ амбоинензисъ* (*E. australica*, *Pancratium amboinense*).

**ЭВРИА (Euria).** *Euryg* — большой; название не отвѣчающее маленькимъ цв. С. тернестреиміиныхъ. (30). Японія, Китай, о. Индѣйскаго архипелага. Оранж. куст. рр. Торф. или лист. Черенками изъ концовъ молодыхъ побѣговъ, въ песокъ, въ парникѣ.

**Э. японика (E. japonica)**, японская). Японія. Цв. зеленоватые. Имѣетъ пестролистную форму *латифолия варіегиата* (*latifolia variegata*) съ листьями, по которымъ расположены желтыя пятна.

**ЭВРИАЛЕ (Euryale).** *Эвриала* — одна изъ Горгоны, которой Овидій, вмѣсто волосъ на головѣ, даетъ змѣй; по ключести рр. С. кувшинковыхъ. (1). Ю. Китай, Индія. Однол. тепл. водяное р. Гли. дерн. Сѣменами. Темп. зимой 10—13, лѣтомъ 13—22°.

**Э. фероксъ (E. ferox)**, колючее). Остиндія. Черешки и чашечка усажены колючками. Цв. темно-фиолетовые, въ сентябрѣ. Сѣмена съѣдобныя.

**ЭВСКАФИСЪ (Euscaphis).** *Eu* — хорошо и *skaphis* — книжка, по вытянутой чашечкѣ. С. мыловниковыхъ. (2). Японія. Оранж. или полувыпосл. куст. рр. Хорошая глянцисто-дерн. Сѣменами и черенками.

**Э. Стафилеойдесъ (E. Staphyleoides)**, похожий на Стафилеа). Цв. бѣлые или желтоватые. 10—12 ф. На родникъ р. пользуется большимъ вниманіемъ по врачевнымъ своимъ свойствамъ.

**ЭВСТЕГИЯ (Eustegia).** *Eu* — хорошо и *stego* — покрывать, по тройному вѣичику. С. ласточкинковыхъ. (4). Южн. Афри-

ка. Оранж. трав. рр. Уходъ какъ за Церопегіа.

**Э. хастата (E. hastata)**, стрѣловидная). Цв. бѣлые, въ июль; лл. стрѣловидные.

**ЭВСТОМА (Eustoma).** *Eustoma* — красная паружность, или отъ *eu* — хорошо и *stoma* — устье. С. горечавковыхъ. (2). С. и Ю. Америка. Холодно-оранж. Гли. дерн. съ торф. и пескомъ. Сѣменами въ парникѣ.

**Э. Русселианумъ (E. Russelianum)**, Росселя). Отъ Небраска до Техаса. Цв. сине-пурпуровые, въ июль. Однол. полувыпосл. **Э. экзальтатумъ (E. exaltatum)**, возвышенный). Ю.-Амер. Соед. Шт. Цв. пурпуровые, въ июль. Оранж. трав.

**ЭВСТРЕФУСЪ (Eustrephus).** *Eu* — хорошо и *strepho* — виться. С. лилейныхъ. (2). Австралія. Полувыпосл. вьющ. рр. Уходъ какъ за Дианелія.

**Э. латифолиусъ (E. latifolius)**, широколистный). Ю. Валлис. Цв. свѣто-пурпуровые, въ июль. Стебли тонкіе, избирающіеся на значительную вышины.

**ЭВТАКСІЯ (Eutaxia).** *Eutaxia* — скромность; по миловидности р. когда оно въ цвѣтѣ. С. бобовыхъ. (8). Австралія. Оранж. куст. Уходъ какъ за Хорнцемъ.

**Э. миртифолия (E. myrtifolia)**, съ лл. Мирты). Цв. многочисленныя, желтые, въ августѣ. 2—6 ф.

**ЭВТЕРПЕ (Euterge).** *Эутерпа* — одна изъ девяти музъ. С. пальмы. (8). Троп. Америка, Вестиндія. Теплн. пальмы. Сильная гли. дерн. Сѣменами. Темп. лѣтомъ 13—24, зимой 8—13°.

**Э. монтана (E. montana)**, горное). Виперисторавсч., черешки внизу чешуйчатые, 40 и болѣе ф. **Э. олеарца (E. oleacea)**, масляное). Вестиндія. Сегменты виллиейно-ланцетовидные. 80—120 ф. **Э. эдулисъ (E. edulis)**, съѣдомое). Бразилія. Сегменты ланцетовидные, черешокъ и жилки съ чешуйками. Пень 40—100 ф.

Эти пальмы называютъ *канустными*, верхняя почка и сердцевина верхней части ствола употребляются въ пищу.

**ЭВФОРБИЯ (Euphorbia).** Название, данное Diosкоридомъ въ честь Эвфорба — мавританскаго врача. С. молочайныхъ. (600). По всей земной поверхности. Тепл., оранж., воздуш. деревья, кустар. и травян. Выпосл. однол. — сѣменами на воздухѣ, весной; но изъ нихъ едва ли что заслуживаетъ вниманія; то же должно сказать и о троп. однолѣтнихъ, которые съятъ въ парникѣ. Трав. многол. болѣею частью полу- или вполне выносливы; дѣленіемъ, сѣменами; песчанистая. Кустар. и полукуст. почти всѣ въ сухой теплицѣ или теплой оранжерей; сѣменами и черенка-



ми, у основанія обсушенными. Плотныя, съ твердой древесной требуютъ сильной, песчанисто-дерновой съ торф., для сочныхъ—часть штукатурки и черенковъ. Темп. зимой не ниже 6°.

**Э. атроурпуреа** (*E. atropurpurea*, черно-красная). Тенерифъ. Цв. (прив.) красно-пурпуровые, большіе, въ мартъ, 3—6 ф. Оранж. **Э. мелоформисъ** (*E. meloformis*, въ видъ дыни). М. Д. Н. Цв. зеленоватые; на р. нѣтъ иглъ, оно многоугольное. 6—9 д. Теплич. **Э. Монтейри** (*E. Montei*, Монтейро). Багія. Цв. зеленые, въ июль. 2—6 ф. Замѣч. тепл. р. съ послѣдовательнымъ образованіемъ тычиночныхъ цв. **Э. Мирсинитесъ** (*E. Myrsinites*, Мирсинитесъ). Ю. Европа. Цв. желтые, лѣтомъ. Орнамент. выносл. **Э. пульхеррима** (*E. pulcherrima*, красивая) Мексика. Цв. зеленовато-желтые съ большими красными прив., зимой. Тепл. куст. Спн. *Poinsettia pulcherrima* (*Poinsettia pulcherrima*). Имѣетъ разнородность *plenissima* (*plenissima*) съ двойными прив. **Э. спленденсъ** (*E. splendens*, великолѣпная). Бурбонъ. Прив. ярко-красные, какъ бы восковые. Стебель съ длинными колючками. 4 ф. Тепл. **Э. фугенсъ** (*E. fulgens*, блестящій) Мексика. Прив. оранжево-шарлаховые, зимой. 4 ф. Тепл. Спн. **Э. жакинѣфлора** (*E. jacinthiflora*). **Э. ципарисіасъ** (*E. cyparissias*, кипарисовый). *Молокай. Молока*. Европа, Ю. Россія. Цв. желтые, зонтикомъ, весной. 1—2 ф.

**ЭВФРАЗИЯ** (*Euphrasia*). *Euphrasia*—прозрѣвать: по предположенію, что эти рр. испѣляютъ слѣпоту. С. норичниковыхъ. (20). Умѣр. страны. Низкорослыя трав. рр. немѣлкія значенія въ садоводствѣ.

**ЭХВАРИДИУМЪ** (*Eucharidium*). *Eucharis*—пріятный. С. онарриковыхъ. (2). Калифорнія. Однол. выносл. Сѣменами весной или съ осени. Обыкн. садовая. **Э. конциннумъ** (*E. concinnum*, красивый). С. Америка. Цв. лилово-пурпуровые, лѣтомъ. 1 ф. Спн. **Э. грандифлорумъ** (*E. grandiflorum*).

**ЭВХАРИСЪ** (*Eucharis*). *Eucharis*—пріятный. С. амараллисовыхъ. (5). Андскія горы, Колумбія. Нов. Гренада. Теплич. лукович. рр. Легкая глин. дерн. съ торф. Отпрысками. Темп. лѣтомъ 13—21, зимой 8—12°.

**Э. грандифлора** (*E. grandiflora*, крупноцвѣтнй). Нов. Гренада. Цв. чисто бѣлые. Спн. **Э. амазоника** (*E. amazonica*). **Э. кандида** (*E. candida*, бѣлый). Нов. Гренада. Цв. бѣлые. **Э. Сандеріана** (*E. Sanderiana*, Сандера). Нов. Гренада. Цв. бѣлые.

**ЭВХЛАЕНА** (*Euchlaena*). *Eu*—хорошо

и *chlaina*—покрывъ, по большому племени. С. злаковъ. (2). Мексика. Троп. однол. злаки, близкіе къ Ца. Сѣменами въ оранж.

**Э. люксуріансъ** (*E. luxurians*, роскошная). Мексика. Цв. мужскіе въ короткихъ, женскіе—въ длинныхъ метелкахъ; стебли 12—15 ф. по нѣскольку изъ одного сѣмени, сочные.

**ЭГЛЕ** (*Aegle*). Эдна изъ трехъ гесперидъ. С. рутовыхъ. (3). Троп. Азія, троп. Африка. Теплолюбивыя дер. съ плодами похожими на апельсины по паражности, очень вкусными и весьма душистыми.

**ЭГИФИЛІА** (*Aegiphila*). Отъ *aix*—козелъ и *philos*—дорогой; любятъ козы. С. вербеновыхъ. (30). Троп. Азія и Африка. Песчанисто-дерновая. Размножается черенками въ песокъ, подъ закрытіемъ, въ теплицѣ.

**Э. грандифлора** (*A. grandiflora*, крупноцвѣтнй). Гаванна. Цв. желтые, въ ноябрь. 3 ф.

**ЭДЕРА** (*Oedera*). *Эдеръ* (*Oeder*)—проф. ботаники въ Копенгагенѣ, † 1794. С. сложноцвѣтныхъ. (4). Юж. Африка. Оранж. куст. рр. Песков. глин. дерн. съ небольшою колич. торфяной. Черенками въ песокъ, подъ закрытіемъ, въ парникѣ.

**Э. пролифера** (*O. prolifera*, перерослая). Цв. головки желтыя; нижн. часть лучевыхъ цв. пурпурово-каштановая, въ май—июль. 1 ф.

**ЭДЖВОРСІЯ** (*Edgeworthia*). Англійскій ботаникъ *Эджворсъ* (*Edgeworth*). С. ягодковыхъ. (2). Остіндія, Китай, Японія. Орнам. оранж. куст. рр., близко схожія съ *Daphne*. Песчан. глин. дерн. 2 ч., волокнист. торф. 1 ч. Черенками, весной, въ песокъ, подъ стекломъ.

**Э. хризантис** (*E. chrysanthia*, золотистая). Китай и Японія. Цв. желтые. 1 ф.

**ЭЙЗЕНХАРДТИЯ** (*Eisenhardtia*). *Эйзенхардтъ* (*Eisenhardt*)—проф. въ Кенигсбергѣ. С. бобовыхъ. (2). Мексика и Техасъ. Оранж. кустарн. рр. Глин. дерн. съ торф. Черенками изъ молодого роста подъ стекломъ, въ песокъ.

**Э. аморфойдесъ** (*E. amorphoides*, похожая на Аморфу). Мексика. Цв. бѣдно-желтые, въ июль. 4—6 ф.

**ЭЙТОНІЯ**. См. Айтонія.

**ЭЙХОРНІЯ** (*Eichhornia*). *Эйхорнъ* (*Eichhorn*)—прусскій ученый. С. поитеридіевыхъ. (5). Южн. Америка, троп. Африка. Теплолюбивыя водныя рр. Грубая. Дѣленіемъ.

**Э. ацуреа** (*E. azurea*, лазуревая). Бразилія. Цв. голубые, въ июль. **Э. краснопесъ** (*E. crassipes*, съ толстыми лл. че-

решками). Цв. фіолетовые, лѣтомъ. Р. пускаетъ корни, не достигающіе земли.

**ЭКБАЛЛИОМЪ** (*Ecballium*). *Ecballein*—выбрасывать, по быстрому выбрасыванію сѣмянъ изъ созрѣвшаго плода. С. тыквенныхъ. (1). Средиземн. побережье. Однол. на воздухъ, всоспитывается какъ тыква.

**Э. элатеріумъ** (*E. elaterium*, брыгающий). Цв. желтые, въ июль. Употребляемый въ медицинѣ элатеріумъ получается изъ этого р.

**ЭКВИЗЕТУМЪ** (*Equisetum*). *Equi*—лошадь и *seta*—волосъ. *Хвощъ*.

**ЭКЕБЕРГІЯ** (*Ekebergia*). К. *Экебергъ* (*Ekeberg*)—капитанъ шведскаго флота, сопровождавшій въ Китай Спарманна. С. ясенковыхъ. (3). Троп. ю. Америка. Оранж. древ. рр. Песч. глин. дер. съ волоки. торф. Черенками изъ полузрѣлаго роста, въ песокъ, въ тепловатомъ парникѣ.

**Э. капензисъ** (*E. capensis*, съ Мыса Д. Н.). Мысъ Д. Н. Цв. бѣлые, въ июль. Высокое дерево.

**ЭКЗАКУМЪ** (*Exacum*). Название заимствованное у Плинія. С. горечавковыхъ. (20). Индія, в. Азія, Малайск. архип., Сокотра. Тепл. или оранж. однол. многолѣт. трав. рр. Торф. съ глин. дерн. по ровну. Сѣменами, въ апрѣль, въ теплѣ.

**Э. цейланикумъ** (*E. zealanicum*, цейлонскій). Цейлонъ. Цв. ярко-фіолетовые, въ сентябрь. 1—2 ф. Тепл. однол.

**ЭКЗОСТЕММА** (*Exostemma*). *Ex*—безъ и *stemma*—вѣнецъ; по высушившимся тычинкамъ. С. мареновыхъ. (25). Троп. Америка и Вестиндія. Тепл. дерн. и куст. рр. Уходъ какъ за Цинхона.

**Э. карибеумъ** (*E. caribaeum*, карибскій). Вестиндія. Цв. бѣлые, въ июль. 20 ф. **Э. лонгифлорумъ** (*E. longiflorum*, длинноцвѣтнй). Санъ Доминго. Цв. бѣлые, въ июль. 20 ф.

**ЭКЗОХОРДА** (*Exochorda*). *Exo*—наружный и *chorda*—веревка, по расположенію сѣменныхъ послѣдовъ. С. розановыхъ. (3). С. Китай, Туркестанъ. Полувыносл. или оранж. куст. рр. Садовая хороша. Сѣменами, отводками, отпрысками.

**Э. грандифлора** (*E. grandiflora*, крупноцвѣтнй). С. Китай. Цв. бѣлые, въ май, 6 ф.

**ЭКРЕМОКАРПУСЪ** (*Ecremocarpus*). *Ekremes*—висячій и *karpos*—плодъ. С. бильборіевыхъ. (3). Колумбія, Перу. Полувыносл. выносл. рр. Легкая сильная. Сѣменами въ мартъ, въ парникѣ.

**Э. скаберъ** (*E. scaber*, грубый). Чили.

Цв. шарлаховые или красно-оранжевые съ вадутымъ устьемъ, въ июль—августъ. Лл. съ прищипками. Спн. *Calamptelis scabra* (*Calamptelis scabra*).

**ЭКСТИРПАТОРЪ**. Подрѣзъ. Скоронашка. Пахательное орудіе о нѣсколькихъ мелкихъ сошникахъ для вывлочки сорныхъ травъ и пр.

**ЭЛАЕАГНУСЪ** (*Elaeagnus*). *Elaeis*—маслина, *Agnos*—Витексъ. Агнусъ-Капустъ. С. лоховыхъ. (27). Ю. Европа, Азія, С. Америка, Австралія. Возд. или оранж. кустарн. либо низкія деревца. рр. Обыкн. садовая. Сѣменами, отпрысками, отводками и черенками.

**Э. аргентеа** (*E. argentea*, серебристый). С. Америка. Цв. желтые, скученные, въ июль—августъ; лл. съ серебристыми чешуйками. 8—12 ф. **Э. лонгипесъ** (*E. longipes*, съ длинными черешками). Японія. Цв. оранжевые, вѣтви красно-бурныя. 3 ф. **Э. макрофилла** (*E. macrophylla*, крупнолистный). Японія. Цв. зеленовато-желтые, осенью. 6 ф. **Э. пунгенсъ** (*E. pungens*, колючій). Японія. Цв. желтоватые, вѣтви колючія. 6 ф. **Э. хортензисъ** (*E. hortensis*, садовый). *Иерусалимская верба*. Востокъ. Одичать въ Ю. Европѣ. Цв. желтые внутри, сѣро-чешуйчатые снаружи, съ запахомъ, въ май. 15—20 ф.

**ЭЛЕВЗИНЕ** (*Eleusine*). *Eleusis*—гдѣ былъ храмъ Цереры. С. злаковъ. (7). Тропич. страны. Рѣдко встрѣчаются въ садахъ, какъ мало примѣчательныя рр.

**ЭЛЕОДЕНДРОНЪ** (*Elaeodendron*). *Elaia*—маслина и *dendron*—дерево; плодъ похожъ на маслину, сѣмена—маслинистыя. С. краснопузырьчанковыхъ. (30). Африка и Индія. Орнамент. тепл. и оранж. деревья или куст. Уходъ какъ за Элеокарпусъ.

**Э. капензе** (*E. capense*, съ М. Д. Н.). М. Д. Н. Цв. зеленоватые, невзрачныя; плоды желтые, овальные, велич. въ 1/2 дюйма, орехъ. 18 ф.

**ЭЛЕОКАРПУСЪ** (*Elaeocarpus*). *Elaia*—маслина и *karpos*—плодъ, по подобію плода. С. липовыхъ. (50). Троп. Азія, Австралія, Тихаго ок. Тепл. или оранж. деревья и куст. Сѣмѣя глин. дерн. съ торф. Черенками изъ зрѣлаго роста съ оставленнымъ лл., въ песокъ, въ парникѣ, или сѣменами въ парникѣ.

**Э. грандифлора** (*E. grandiflora*, крупноцвѣтнй). Ява. Цв. бѣлые съ желтымъ, лѣтомъ. 7 ф. Красное тепло. р. Спн. *Моноцера грандифлора* (*Monocera grandiflora*).

**ЭЛЕТТАРІЯ** (*Elettaria*). На Малабарѣ называется *Элеттари*. С. имбирныхъ. (2). Остіндія, Цейлонъ. Тепл. рр.



схожія съ Амомуѣ. Сильн. песчан. глин. дерн. съ кусками торфян. Дѣленіемъ корня весной. Темп. лѣтомъ 13—24, зимой 8—12°.

**Э. кардамомуѣ** (E. Cardamomi, кардамонтъ). Возвышенности Траванкура и Малабара. Цв. зеленоватые. 6—9 ф. Производитъ кардамонтъ.

**ЭЛИЗЕНА** (Elisena). Принцесса Элиза—сестра Наполеона. С. амариальсовыхъ. (3). Перуанскія Анды. Оранж. луков. рр. Торф. съ сильно песчан. глин. дерн. Отпрысками. Темп. лѣтомъ 10—20, зимой 6—10°.

**Э. лонгипетала** (E. longipetala, съ длинными лепестками). Лима. Цв. бѣлые, въ мартѣ. 3 ф.

**ЭЛИМУСЪ** (Elymus). Названіе взято у Гипократа. С. злаковъ. (20). Европа, Азія, С. Америка. Садоваго значенія не имѣютъ.

**ЭЛОДЕА** (Elodea). *Elodes*—растущій въ водѣ. С. лягушниковыхъ. (8). Троп. и умѣр. Америка. Непривлекательная, многол. водяныя рр.

**Э. канаденсисъ** (E. canadensis, канадская) введена была въ Англію изъ Америки въ 1841 г. и вскорѣ до того размножилась въ рѣкахъ и каналахъ, что затруднила по нимъ плаваніе судовъ, чего на своей родинѣ она не производитъ. Впрочемъ, и въ сажалкахъ и воздушныхъ аквариумахъ она современемъ исчезаетъ, вѣроятно, по истощеніи спеціальнаго питательнаго вещества.

**ЭЛЬВАНТУСЪ** (Elleanthus). *Eilo*—закрываю и *anthos*—цвѣтокъ; цв. скрыты прицвѣтниками. С. орхидей. (50). Троп. Америка. Сильн. глин. дерн. съ торф. Уходъ самый простой въ теплицѣ.

**Э. каравата** (E. Caravata, каравата). Гвиана. Цв. ярко-желтые съ пурпуровымъ плодиномъ, въ ноябрѣ. Снн. *Эвелина каравата* (Evelyna Caravata).

**ЭЛЛИОТТИЯ** (Elliottia). *Эллиотта* (Elliot)—американскій ботаникъ, † 1830. С. вересковыхъ. (3). Японія и С. Америка. Подувыноса. куст. рр. Торф. съ песчан. дерн. Черенками.

**Э. радемоза** (E. rasmosa, листовая). Георгія. Цв. бѣлые, въ августѣ. 4—10 ф.

**ЭЛАЙСЪ** (Elais). *Elais*—маслина, получается такое же масло, какъ и изъ маслинъ. С. пальмъ. (4). Троп. Америка, З. Африка. Теплич. Сильная песчанистая. Сѣменами. Темп. лѣтомъ 13—24, зимой 10—13°.

**Э. гвинеевизъ** (E. guineensis, гвинейскій). Гвинея. Стволъ 20—30 ф., дл. перистые длпн. 15 ф. Производитъ пальмовое масло. **Э. меланококка** (E. melanococca, черно-сѣмянный). Троп. Америка. Похожъ на предыдущій, но меньше ростомъ.

**ЭМБЕЛИЯ** (Embelia). Мѣстное названіе на Цейлонѣ. С. прищипниыхъ. (55). Троп. Азія и Африка, Австралія, Нов. Каледонія. Тепл. вьющ. кустарн. или деревца. Торф. съ глин. дерн. Черенками въ песокъ, въ парникѣ. Темп. лѣтомъ 13—22, зимой 7—10°.

**Э. робуста** (E. robusta, крѣпкая). Индія. Лл. продолгов. овальные, вѣтви гладкія. 20 ф.

**ЭМБОТРИУМЪ** (Embothrium). *En*—въ, *bothrium*—ямка, рѣзникъ; по пыльнымъ. С. протейныхъ. (4). Влѣ троп. Америка, на Андахъ. Оранж. куст. Песч. торф. Черенками въ песокъ, подъ стекломъ. Темп. зимой 2—5°.

**Э. кокцинеумъ** (E. coccineum, шарлаховый). Цв. красно-оранжевые, длинные, пониклые, лѣтомъ. 3 ф.

**ЭМПЕТРУМЪ** (Empetrum). Названіе взято у Dioscorida. С. водяниковыхъ. (1). Европа, Кавказъ, Японія, В. Азія, С. Америка. Выноса. низкіе кустар. Вересковая или песч. торф. Черенками лѣтомъ въ песч. торф., подъ стекломъ и сѣменами, которые всходятъ медленно.

**Э. нигрумъ** (E. nigrum, черный). *Водяника*. Цв. розоватые, въ маѣ; ягоды черныя, похожія на можжевельныя. 6—12 д. Имѣетъ разновидность *рубрумъ* (rubrum) съ красными ягодами въ Чили и Огненной Землѣ.

**ЭМПЛЕВРУМЪ** (Empleurum). *En*—въ и *pleuron*—перепонка покрывающая легкія: сѣмена прикрѣплены къ плевѣ. С. рутовыхъ. (1). Ю. Африка. Оранж. Оранж. кустъ. Уходъ какъ за Diosma.

**Э. серрулатумъ** (E. serrulatum, мелкозубчатый). М. Д. Над. Цв. мелкіе, малиновые, въ іюнѣ. 2—3 ф.

**ЭНКІАНТУСЪ** (Enkianthus). *Enkyos*—увеличенный и *anthos*—цвѣтокъ; цв. раздутые. С. вересковыхъ. (5). Китай, Японія, Гималаи. Оранж. куст. Глин. дерн. пополамъ съ торф. Черенками изъ зрѣлаго роста, подъ стекломъ, но безъ теплаго нагрѣванія, весной. Осторожно сажать въ горшки.

**Э. кампанулятусъ** (E. campanulatus, колокольчатый). Японія. Цв. зеленоватые съ краснымъ отливомъ, въ іюнѣ. Снн. *Андромеда кампанулята* (Andromeda campanulata). **Э. квинквифлорусъ** (E. quinqueflorus, четырехцвѣтнй). Китай. Цв. внизу красные, въ верхней же части тѣлесные, съ февраля до сентябля. 3—10 ф. Снн. **Э. ретикулатусъ** (E. reticulatus). **Э. японікусъ** (E. japonicus, японскій). Японія. Цв. бѣлые, въ февралѣ.

**ЭНОКАРПУСЪ** (Oenocarpus) *Oinos*—вино и *carpos*—плодъ, нѣкоторые виды

производятъ вино и масло. С. пальмъ. (8). Ю. Америка. Тепл. перистыя пальмы. Торф. пополамъ съ глин. дерн. Сѣменами и отпрысками.

**Э. бакаба** (O. basaba, бакаба). Лл. разбросанные; перья линейно-ланцетовидныя. Ягоды сине-пурпуровыя, почти шаровидныя. 50—60 ф. **Э. батана** (O. batana, батана). Лл. рѣдкіе; ягода цилиндрически-эллиптическая, тупая. 40 ф. **Э. миноръ** (O. minor, меньшая). Лл. 6—10, разбросанныхъ, почти горизонтальныхъ; ягода черно-пурпуровая въ лѣсной орѣхъ, остроколючая. 10 ф.

**ЭНОТЕРА** (Oenothera). *Oinos*—вино и *thera*—пресѣдованіе, погоня. Такъ называлось у Теофраста р., должно быть *Eriobium*, котораго корни ѣли, чтобы прогнать окаянныя винои. С. оягариковыхъ. (110). Юж. Америка, Австралія. Трав. или куст. рр. Сѣменами, дѣленіемъ и черенками. Упоминаемые виды—многол., однолѣтнія означены.

**Э. акаулисъ** (O. acaulis, безстебельная). Чили. Цв. бѣлые, съ мая по сентябрь. 6 д. **Э. амѣна** (O. amoena, красивая). С.-З. Америка. Цв. розовые, съ четырьмя красно-малиновыми пятнышками, лѣтомъ. 1—2 ф. Разновидность *рубикунда* (rubicunda) имѣетъ лилово-пурпуровые цв. съ болѣе темными пятнами. **Э. биеннисъ** (O. biennis, двулѣтняя). С. Америка. Цв. блѣдно желтые, съ пѣшнымъ запахомъ, лѣтомъ и осенью. Въ садахъ известна подъ названіями *Ламаркина* и *грандифлора* (O. Lamarckiana, O. grandiflora). **Э. глянукъ** (O. glauca, свая). Соед.-Ам. Шт. Цв. блѣдно-желтые съ іюня до октябля. 1—2 ф. **Э. калифорника** (O. californica, калифорнская). Калифорнія. Цв. бѣлые до свѣтло-малиновыхъ, съ желтою серединой, распускающіеся ночью, душистые, въ іюль. 2 ф. **Э. линеарисъ** (O. linearis, узкая). Соед.-Амер. Шт. Цв. желтые съ слабымъ запахомъ, лѣтомъ. **Э. миссуріансисъ** (O. missouriensis, съ Миссури). Соед.-Амер. Шт. Цв. желтые, крупныя; чашечка съ красными пятнами. Имѣетъ много разновидностей, изъ нихъ у *латифolia* (latifolia) листья шире, чѣмъ у типа. **Э. паллида** (O. pallida, блѣдная). С. Америка. Цв. бѣлые съ желтыми основаніями, при завяданіи краснѣющіе, съ іюня до сентябля. 1 1/2 ф. **Э. спеціоза** (O. speciosa, особенная). С. Америка. Цв. бѣлые, при увяданіи краснѣющіе, съ марта до сентябля. 2—3 ф. Стебель кустарный. **Э. тараксацифолія** (O. taraxacifolia, съ лл. какъ у одуванчика). Чили. Цв. бѣлые, становящіеся при завяданіи красными, лѣтомъ. 6 д. **Э. Уитнея** (O. Whitneyi, Уитнея). Калифорнія. Цв. красно-розовые съ болѣе темными пятнами, лѣтомъ. 1—1 1/2 ф. Однолѣтняя. Снн. *Годетія грандифлора* (Godelia grandiflora). Имѣетъ разновидно-

сти: *кониолоръ* (concolor)—съ бѣлыми, *фламмеа* (flammea)—съ карминными и *фламмеа-стриата* (flammea-striata)—карминно-полосатыми цв. **Э. экзімیا** (O. eximia, отборная). Скалистыя горы Верхней Калифорніи. Цв. бѣлые, въ іюль. 9—12 д.

**ЭНСЛЕЯ**. См. Айнслея.

**ЭНТАДА** (Entada). Мѣстное малабарское названіе. С. бобовыхъ. (10). Троп. Америка и Африка. Теплич. вьющіяся. Глин. дерн. пополамъ съ торф. Черенками изъ молодого роста, въ песокъ, въ парникѣ. Темп. лѣтомъ 12—20, зимой 7—10°.

**Э. сканденсъ** (E. scandens, лазящая). О. Тихаго ок., Ост-и Вестиндія. Цв. бѣлые; стручья деревянистые въ 2—4 ф. длиной. Снн. *Э. Пурсетта* и *Мимоза сканденсъ* (E. Pursaetha, Mimosa scandens).

**ЭНТЕЛЕА** (Entelea). *Enteles*—совершенный, всѣ тычинки плодотворныя. С. линовыхъ. (1). Нов. Зеландія. Оранж. оранж. куст. рр. Глин. дерн. съ пескомъ. Черенками изъ полурѣзлаго роста въ песокъ, подъ стекломъ. Темп. зимой 2—5°.

**Э. арборесценсъ** (E. arborescens, древесная). Цв. бѣлые, въ маѣ. 20 ф.

**ЭНЦЕФАЛІЯРТОСЪ** (Enccephalartos). *En*—въ, *kephale*—голова и *artos*—хлѣбъ: внутр. часть верха ствола содержитъ питательныя крахмалъ. С. цикадеидныхъ. Оранж. декорат. рр. (12). Троп. и Ю. Африка. Глин. дернов. съ пескомъ. Сѣменами. Темп. лѣтомъ 13—21, зимой 6—10°.

**Э. Альтенштейни** (E. Altensteinii, Альтенштейния). М. Д. Н. Вап перистыя въ 2—6 ф. длиной, перья темно-зеленыя, колючія. **Э. вильозусъ** (E. villosus, волосатый). Натал. Вап перистыя въ 3—6 ф. дл., перья остроколючія, черенки волосистые. У разнов. *амплиатусъ* (ampliatas, крупной) вап нагнутыя, съ болѣе развитыми перьями. **Э. плюмозусъ** (E. plumosus, перистый). Юж. Африка. Вап большія, перистыя, перья съ колючками по краямъ. **Э. хорридусъ** (E. horridus, грубый). Ю. Африка. Вап перистыя въ 2—6 ф. длиной, перья съ длинною колючкой. У разнов. *триспинозусъ* (trispinosus) внутр. край пера съ тремя колючками.

**ЭПАКРИСОВЫЯ** рр. (epacrideae). Кустарныя рр., встрѣчаемыя въ Австраліи, Новой Зеландіи и на Антарктическихъ остр. Родовъ до 26, изъ нихъ наиболѣе извѣстны: Дракофильюмъ, Лейкопогонъ, Стифелія и Эпакрисъ. Видовъ 320.

**ЭПАКРИСЪ** (Epacris). *Epi*—на и *akros*—вершина; по мѣсту произростанія въ природѣ на верхахъ горъ. С. эпакрисовыхъ. (26). В. Австралія, Нов. Зеландія, Нов. Каледонія. Оранж. куст. рр.



похожий на веревки (Эрика), но несравненно легче воспитываемый. Песч. торф. или собств. вересковой. Черенками из макушечного роста. Темп. зимой 3—7°.

**Э. импресса** (*E. impressa*, сплюснутый). Австралия. Цв. отъ блылыхъ до красныхъ, въ мартъ. 2—3 ф. По различію окраски получали названія, выражающія формы того-же р. **Э. лонгифлора** (*E. longiflora*, длинноцвѣтный). Австралія. Цв. красно-малиновые, въ маѣ—іюнь. 2—4 ф. Спн. **Э. грандифлора** и **Э. миниата** (*E. grandiflora*, *E. miniata*). **Э. пультеллы** (*E. pulchella*, красивый). Австралія. Цв. красные или малиновые, въ маѣ. 1—3 ф. **Э. пурпурасцея** (*E. purpurascens*, пурпуроватый). Австралія. Цв. бѣлые съ краснымъ отътнкомъ, въ январѣ до марта. 2—3 ф. Спн. **Э. оносмафлора** (*E. onosmaeflora*).

**ЭПИГЕА** (*Epigaea*). *Epi*—на и *gaia*—земля, по стелющемуся росту. С. вересковыхъ. (2). С. Америка, Японія. Ползучіи куст. рр. Песчан. торф. Дѣленіемъ.

**Э. репенс** (*E. repens*, ползучая) С. Соед.-Ам. Шт. Цв. бѣлые съ краснымъ отътнкомъ, пахучіе, въ маѣ.

**ЭПИДЕНДРУМЪ** (*Epidendrum*) *Epi*—на и *dendron*—дерево; по эпифитному росту. О. орхидей. (400). Троп. Америка. Телпич. и оранж. эпифиты. Уходъ какъ за Кэтлея.

**Э. алатусъ майюсъ** (*E. alatus majus*, большескрылый). Гватемала. Цв. бѣдно-желтые, губа съ пурпуровыми черточками, въ іюнь—іюль. Спн. **Э. калосхилумъ** (*E. caloschilum*). Оранж. **Э. атропурпуреумъ** (*E. atropurpureum*, темно-пурпуровый). Мексика. Цв. темно-розовые или пурпуровые, губа розовая съ темно-пурпуровыми пятнами, въ маѣ—іюнь. Спн. **Э. макрофиллумъ** (*E. macrophyllum*). Оранж. **Э. аурантиакумъ** (*E. aurantiacum*, оранжевый). Гватемала. Цв. ярко-оранжевые, губа оранжевая съ малиновыми черточками, въ мартъ до маѣ. 1 ф. Телп. **Э. бикорнѣтумъ** (*E. bicornutum*, двурогий). Тринидадъ. Цв. бѣлые съ малиновыми пятнами на губѣ, лѣтомъ. Телп. **Э. дихромумъ** (*E. dichrosum*, двуцвѣтный). Пернамбуко. Цв. свѣтло-розовые, губа ярко-малиновая. Оранж. **Э. энемиодорумъ** (*E. enemiodorum*, съ чехлами). Гватемала. Цв. свѣтло-желтые съ коричн. пятнами, губа бѣлая. Оранж. **Э. Линдлейанумъ** (*E. Lindleyanum*, Линдлей). Настоящее названіе для *Barkeria Lindleyana* (*Barkeria Lindleyana*). **Э. неморале** (*E. nemorale*, лѣсной). Мексика. Цв. свѣтло-лиловые, губа съ фиолетовыми черточками, въ іюль. Телп. **Э. паникулѣтумъ** (*E. paniculatum*, метельчатая). Новая Гренада. Цв. пурпуровые или лилово-пурпуровые. Оранж. **Э. призматокарпумъ**

(*E. prismatocarpum*, съ призматическими плодами). Центр. Америка. Цв. желтые съ темно-пурпур. крапинками, пахучіе; губа пурпурово-лиловая съ бѣлымъ краемъ, въ іюнь. Оранж. **Э. сиринготирисъ** (*E. syringothyrus*, похожий на сиреневыя кисти). Боливія. Цв. темно-пурпуровые съ желтымъ основаніемъ губы. Телп. **Э. фалькатумъ** (*E. falcatum*, серповидный). Мексика. Цв. зеленовато-желтые, губа желтая, пахучіе, лѣтомъ. Спн. **Э. алоуфидіумъ** и **Э. Паркинсоніанумъ**. Телп. **Э. эвектумъ** (*E. evectum*, распростертый). Нов. Гренада. Цв. розово-пурпуровые. Телп.

**ЭПИЛОБИУМЪ** (*Epilobium*). *Epi*—на, *lobos*—стручокъ. С. огариковыхъ. (60). Умѣр. и холод. страны. Многол. травяни. или полукуст. рр. Обыкн. садов. Дѣленіемъ и сѣменами.

**Э. аугустифоліумъ** (*E. angustifolium*, узколистный). *Кипрей. Чай-Иоаннъ*. Сѣв. полушаріе. Цв. красно-розовые или бѣлые, въ іюль. 3—6 ф. **Э. Додонеи** (*E. Dodonaei*, Додонеа). Европа. Цв. темно-розовые, крупныя, въ іюль. 1 ф. Спн. **Э. Халлері** (*E. Halleri*). **Э. обкордѣтумъ** (*E. obcordatum*, обратно-сердцевидный). Сіера-Невада, Калифорнія. Цв. яркіе красно-розовые, лѣтомъ. **Э. розмаринифоліумъ** (*E. rosmarinifolium*, съ л. Розмарина). Европа. Цв. красныя, въ іюль. Спн. **Э. аугустифоліумъ** (*E. angustifolium*). **Э. хирсѣтумъ** (*E. hirsutum*, волосистый). Европа. Цв. бѣдно-малиновые, въ іюль. 3—5 ф. Р. лишнее, съ кисловатымъ запахомъ.

**ЭПИМЕДИУМЪ** (*Epimedium*). Названіе, заимствованное Линнеемъ у Diosкорида. С. барбарисовыхъ (8). Европа, Азія. Выпосл. многол. трав. рр. съ ползучимъ корневищемъ и одностѣбл. Глин. дерн. по ровну съ торф. Дѣленіемъ корня въ іюль, августъ.

**Э. альпінумъ** (*E. alpinum*, альпійскій). *Безцвѣтникъ*. Средн. Европа. Цв. снаружи сѣроватые, внутри темно-малиновые, лѣтомъ. 6—9 д. **Э. макрантумъ** (*E. macranthum*, крупноцвѣтный). Японія. Цв. бѣлые. 10—15 д. **Э. Мусшіанумъ** (*E. Musschianum*, Муссиа). Японія. Цв. тускло-бѣлые, въ маѣ. **Э. пиннѣтумъ** (*E. pinnatum*, перистый). Персія. Цв. ярко-желтые, лѣтомъ. 8 д. до 2 ф. **Э. рубрумъ** (*E. rubrum*, красный). Отечество съ точностью неизвѣстно. Цв. снаружи сѣроватые, внутри ярко-карминные. Спн. **Э. альпінумъ рубрумъ** (*E. alpinum rubrum*).

**ЭПИПАКТИСЪ** (*Epipactis*). Названіе заимствованное у Diosкорида. С. орхидей. (10). Европа, Азія, С. Америка. Выпосл. земныя орхидеи. Рыхлая глин. дерн. съ извѣстною, влажною, закрытою мѣстою. Дѣленіемъ.

**Э. латифолія** (*E. latifolia*, широколистный). *Ярмоганскъ*. С. Россія. Цв. зеленовато-пурпуровые, въ іюль. 1—2 ф. **Э. палюстрисъ** (*E. palustris*, болотный). *Гайникъ*. С. Россія. Цв. бѣловатые съ малиновымъ отътнкомъ, въ іюль. 1 ф.

**ЭПИПРЕМУМЪ** (*Epipremnum*). *Epi*—надъ и *premn*—стволь, —рр. пускаютъ корни въ древесныя стволы. С. ароидеиныхъ. (8). Малайск. архип. и о Тихаго океана. Телпич. выходящая рр. Сильная глин. дерн. съ торф. и пескомъ. Черенками стебля. Темп. зимой 10—13, лѣтомъ 23—22°.

**Э. мірабіле** (*E. mirabile*, удивительный). О. Фиджи. Лл. большіе, перисторазсѣченные, темно-зеленые. Ростъ быстрый. Все р. походить на Монстера.

**ЭПИСЦІЯ** (*Episcia*). *Episkios*—затѣненный, по мѣсту роста въ природѣ. С. геснеріиныхъ. (30). Троп. Америка. Телпич. многол. трав. рр. Уходъ какъ за Геснера.

**Э. биколоръ** (*E. bicolor*, двуцвѣтная). Нов. Гренада. Цв. бѣлые съ пурпуровыми краями. 3 д. **Э. вильдоза** (*E. villosa*, пушистая). Суринамъ. Цв. бѣлые съ пурпуровымъ, въ маѣ—іюнь. 1—1½ ф. **Э. фульгида** (*E. fulgida*, блестящая). Нов. Гренада. Цв. ярко-киноварные, въ іюль. 6 д.

**ЭПИФИЛЛУМЪ** (*Epiphyllum*). *Epi*—надъ и *phyllon*—листь; цв. вырастаютъ изъ плоскихъ листьевъ, которые кажутся л. С. кактусовыхъ (3). Бразилія. Телп. выходящая полукуст. рр. Уходъ какъ вообще за кактусовыми. Прививаются на *Перескль акуланта*, а также размножаются черенками. Темп. лѣтомъ 12—21, зимой 3—6°.

**Э. труктѣтумъ** (*E. truncatum*, отсѣченный). Цв. красныя или розовыя изъ отсѣченныхъ макушекъ. Спн. *Кактусъ труктѣтумъ* (*Cactus truncatus*). Имѣетъ очень много разновидностей, цв. котор. окрашены въ различную окраску.

**ЭРАГРОСТИСЪ** (*Eragrostis*). *Eros*—любовь и *agrostis*—трава; по трясущимся колоскамъ. С. злаковъ. (100). Одно и многол. рр. по всѣмъ теплымъ и умѣр. странамъ. Нѣкоторыя очень нарядны и легко размножаются сѣменами, вспой. Лучшими можно назвать: *капильярисъ*, *мегастахія*, *эпиптиака* и *элеганс* (*capillaris*, *megastachya*, *aegyptiaca* et *elegans*).

**ЭРАНТЕМУМЪ** (*Eranthemum*). *Eran*—любить и *anthemon*—цв., по красотѣ цв. С. акантовыхъ. (30). Троп. и южн. Африка, троп. Америка, Австралія, Малайск. арх. Телпич. Торфян. 1 ч., глин. дерн. 2 ч. Темп. лѣтомъ 12—20, зимой 6—10°. Черенками изъ конечи. по-

бѣговъ въ песчан. дерн. подъ стекломъ въ парникѣ.

**Э. альбо-маргинатумъ** (*E. albo-marginatum*, бѣлокрайчатый). Полинезія. Лл. продолговато-эллиптич. съ широкою бѣлою каймой. **Э. асперумъ** (*E. asperum*, жесткій). Соломоновы о. Цв. бѣлые съ пурпуровыми пятнами, въ мартъ. Лл. темно-зеленые съ жилками у краевъ. **Э. пультеллѣтумъ** (*E. pulchellum*, красивый). Остиндія. Цв. ярко-голубые, въ апрѣлѣ. Лл. темно-зеленые съ помятою поверхностью. **Э. ретикулѣтумъ** (*E. reticulatum*, сѣтчатый). Полинезія. Лл. темно-зеленые съ золотистою сѣткою. Спн. **Э. Шомбургки** (*E. Schomburgkii*). **Э. туберкулѣтумъ** (*E. tuberculatum*, бугорчатый). Нов. Каледонія. Цв. бѣлые, лл. маленькіе, овальные. **Э. циннабаріумъ** (*E. cinnabarinum*, киноварный). Мартобанъ. Цв. красно-малиновые; лл. овально-ланц. темно-зеленые.

**ЭРАНТИСЪ** (*Eranthis*). *Er*—весна и *anthos*—цвѣтокъ. С. лютиковыхъ. (2). Европа, Азія. Многол. клубнев. выносл. рр. Обыкн. сад. Отпрысками.

**Э. сибирікусъ** (*E. sibiricus*, сибирскій). З. Сибирь. Цв. желтые, въ апрѣлѣ. 3 д. **Э. хіемалисъ** (*E. hiemalis*, зимній). *Любникъ*. З. Европа. Цв. желтые, въ началѣ апрѣля. 3—8 д.

**ЭРЕМИЯ** (*Eremia*). *Eremos*—одинокий, по числу сѣмянъ въ гнѣздѣ. С. вересковыхъ. (10). Южн. Африка. Оранжево-куст. рр. Песч. торф. Черенками изъ концовъ вѣтокъ. Зимн. темп. 2—6°.

**Э. Тотта** (*E. Totta*, готтентотская). Цв. красныя, головками, въ іюнь. 2 ф.

**ЭРЕМОСТАХИСЪ** (*Eremostachys*). *Eremos*—одинокій и *stachys*—колосъ. С. губоцвѣтныхъ. (30). Зап. и Сред. Азія. Выносл. многол. трав. рр. Сильная легкая сѣменами или дѣленіемъ.

**Э. лациниата** (*E. laciniata*, съ разрозненными лл.). Левантъ. Цв. желтые, въ іюль. 1—1½ ф.

**ЭРЕМУРУСЪ** (*Eremurus*). *Eremos*—одинокій и *oura*—хвостъ, по двѣторасполо. С. лилейныхъ. (18). Отъ Азіяской Россіи до Индостана. Полувыносл. многолѣт. трав. рр. похожая на гіацинты. Хорошая садовая. Дѣленіемъ.

**Э. робустусъ** (*E. robustus*, здоровенный). Туркестанъ. Цв. периково-малиновые, кистью въ 8—9 ф. **Э. спектабилисъ** (*E. spectabilis*, красивый). З. Сибирь. Цв. желтые. 2 ф. **Э. хималайскіусъ** (*E. himalaicus*, гималайскій). Гималаи. Цв. бѣлые, звѣздчатые, стрѣлка въ 1½—2 ф.

**ЭРЕТИЯ** (*Ehretia*). *Eretm* (*Ehret*)—пѣмец. ботаникъ и рисовальщикъ. С. бурачниковыхъ. (50). Жаркія страны. Телп.



или оранж. кустар. либо древесн. рр. Сѣмь глин. дерн. съ торф. Черенками, весной, въ песокъ, въ парникъ. Темп. лѣтомъ 13—22, зимой 8—10°.

Э. **тинифолия** (E. tinifolia, съ лат. какъ у Tinus). Вестиндія. Цв. бѣлые, сильно пахучіе, въ іюнь—іюль. 16—28 ф. Оранж.

ЭРИКА (Erica). На званіе употреблен. по Плинію и имъ взятое у Теофраста. С. вересковыхъ. (400). Прем. Мысь Д. Над. Оранж. кустарн. рр. Песч. торф. (собственно вересковая) для всѣхъ вообще, для болѣе сильныхъ — съ добавленіемъ небольшого количества глин. дерн. Дрепакъ весьма важенъ. Черенками, въ песокъ, торф. съ пескомъ наверху, подъ стекломъ въ парникъ Темп. зимой 2—6° при обильномъ провѣтриваніи. Вся грудность ухода — въ предупрежденіи плѣсени зимой.

Э. **Айтонія** (E. Aitonia, Айтона). Цв. блѣдно-красные, въ іюнь до сентября. 2 ф. Э. **ампуляцеа** (E. ampullacea, бутылкообразная). Цв. красные, въ іюль. 2 ф. Э. **андромедафлора** (E. andromedaeflora, съ лат. какъ у Андромеды). Цв. темно-красные, съ марта до іюля. 1—3 ф. Э. **Аустиніана** (E. Austiniana, Аустина). Цв. бѣлые съ карминовымъ, въ іюль до августа. Э. **Вомонтіана** (E. Beaumontiana, Вомона). Цв. бѣлые съ пурпуровымъ, въ іюнь. 1 ф. Э. **Бергіана** (E. Bergiana, Бергуса). Цв. пурпуровые, въ май—іюнь. 1½ ф. Э. **ваганс** (E. vagans, блуждающая). Цв. блѣдно-пурпуровые съ іюля до сентября. Изъ 3. Европы. Э. **вестита** (E. vestita, покрытая). Цв. бѣлые. 3 ф. Имѣетъ нѣсколько формъ. Э. **Викторія** (E. Victoria, Виктория). Цв. темно-пурпуровые, лѣтомъ (гибридъ). Э. **Вильморейна** (E. Vilmoreana, Вильморейна). Цв. бѣлые, весной (гибридъ). Э. **грандифлора** (E. grandiflora, крупноцвѣтная). Цв. желтые, въ іюнь—іюль. 3 ф. Э. **грацилис** (E. gracilis, изящная). Цв. красно-пурпуровые, съ сентября до декабря. 1 ф. Э. **Девоніана** (E. Devoniana, девонская). Цв. ярко-пурпуровые, лѣтомъ (гибридъ). Э. **Кандолеана** (E. Candolleana, Кандоля). Цв. красно-розовые, въ іюнь—іюль (гибридъ). Э. **карнеа** (E. carnea, тѣлеснаго цв.). Цв. блѣдно-красные, весной. 6 д. Германія. Э. **каффра** (E. caiffa, каффарская). Цв. бѣлые, пахучіе. 1½ ф. Э. **Ламбертіана** (E. Lambertiana, Ламберта). Цв. бѣлые съ май до іюля. 1—2 ф. Э. **Линнеана** (E. Linneana, Линнея). Цв. бѣлые, съ января до мая. 1½ ф. Э. **Массоніи** (E. Massonii, Массона). Цв. бѣлые, съ зеленымъ отворотомъ, съ іюля до октября. 3 ф. Э. **мелантера** (E. melanthera, съ черными пыльниками). Цв. малиновые, осенью и зимой. 2 ф. Э. **одората** (E. odorata, ду-

шистая). Цв. бѣлые, пахучіе, съ мая до іюля. 1 ф. Э. **Пармантеріана** (E. Parmanteriana, Пармантье). Цв. красновато-пурпуровые, съ іюня до августа. 1 ф. Э. **примулоидес** (E. primuloides, первоцвѣтная). Цв. розово-пурпуровые, въ май—іюнь. 1 ф. Э. **пропенденс** (E. propendens, вислая). Цв. пурпуровые, въ іюль. 1 ф. Э. **раменталеа** (E. ramentacea, чешуйчатая). Цв. красновато-пурпуровые, съ іюля до декабря. 1½ ф. Э. **Савилеана** (E. Savileana, Савила). Цв. красные, съ апрѣля до сентября. 1 ф. Э. **скапарія** (E. scoraria, ракушечниковая). Цв. зеленоватые. 2—3 ф. Юж. Европа. Э. **триколоръ** (E. tricolor, трехцвѣтная). Цв. въ нижней части красные, средней—зеленоватые, въ верхней—бѣлые, съ мая до іюля. 2 ф. Э. **Файрайана** (E. Fairiana, Файрайа). Цв. ярко-розовые, съ іюня до августа (гибридъ). Э. **хемалис** (E. hyemalis, зимняя). Цв. малиново-розовые, зимой и весной (гибридъ). Э. **циліарис** (E. ciliaris, ресничная). Цв. блѣдно-красные, въ августъ и сентябрь. 1 ф. 3. Европа. Э. **Шамиссонис** (E. Chamissonis, Шамиссо). Цв. розовые, въ апрѣль. 1½ ф. Э. **эксимія** (E. eximia, отборная). Цв. шарлаховые, въ май и іюнь. 2 ф. Э. **элеганс** (E. elegans, изящная). Цв. малиновые, съ желтыми кончиками, лѣтомъ. 6—12 д. Э. **эхифлора** (E. echiflora, похожая на Эхиумъ). Цв. темно-красные, съ марта до мая. 1½ ф.

ЭРИГЕРОНЪ (Erigeron). Название взятое у Теофраста. С. сложноцвѣтныхъ. (100). По весѣмъ умѣр. и холод. поясамъ. Преимущ. вынослив. одно-, дву- и многол. трав. рр. Садовая, нѣсколько влажная. Дѣленіемъ и сѣменами.

Э. **ауранциакусъ** (E. aurantiacus, оранжевый). Туркестанъ. Цв. головки оранж. выш. 1 ф. Многол. Э. **глаукусъ** (E. glaucus, сизый). С.-З. Америка. Цв. головки пурпуровыя, лѣтомъ и осенью. 6—12 д. Многол. Э. **грандифлорусъ** E. grandiflorus, крупноцвѣтный). Скалистые горы. Цв. головки пурпуровыя или бѣлыя, поздн. лѣтомъ. 4—8 д. Многол. Э. **мультирадиатусъ** (multiradiatus, многоручиный). Гималаи. Цв. головки пурпуровыя, дискъ желтый, лѣтомъ. 6 д. до 2 ф. Э. **специозусъ** (E. speciosus, отынный). С.-З. Америка. Цв. головки съ цв. лучевыми фіоле. товыми, дисковыми желтыми, осенью. 1½ ф. Многол.

ЭРИЗИМУМЪ (Erysimum). Название взятое у Гиппократ. С. крестоцвѣтныхъ. (70). Ю. Европа, Ср. Азія, Америка. Одно-, дву- и многол. трав. рр. Хорошая садовая. Сѣменами и дѣленіемъ.

Э. **альпинумъ** (E. alpinum, альпійскій

Норвегія. Цв. желтые, пахучіе, въ май. 6 д. Многол. Э. **охролеукусъ** (E. ochroleucus, желтоватый). Альпы Европейскія, Юра. Цв. блѣдно-желтые, съ апрѣля до іюля. Многол. Спн. **Хейрантусъ охролеукусъ** (Cheiranthus ochroleucus). Э. **Перовскіанумъ** (E. Perovskianum, Перовскаго). 3. Азія, Кавказъ. Цв. красно-оранжевые. 1 ф. Э. **пумилумъ** (E. pumilum, низкій). Европа. Цв. блѣдно-желтые, пахучіе, лѣтомъ. 1—3 д.

ЭРИНГИУМЪ (Eryngium). Название заимствованное у Теофраста. С. зонтичныхъ. (150). Умѣр. и жаркія страны. Одно-, дву- и многол. трав., обычно колючія рр. Песчан. дернов. Сѣменами и дѣленіемъ.

Э. **акватукусъ** (E. aquaticum, водяной). С. Америка. Цв. головки бѣлыя или блѣдно-голубыя, съ іюля до сентября. 2—3 ф. Спн. Э. **юкифлолюмъ** (E. yuccaeifolium). Э. **альпинумъ** (E. alpinum, альпійскій). Европа. Цв. головки съ обертками голубые, въ іюль—августъ. 1½—2 ф. Э. **аметицинумъ** (E. amethystinum, аметистовый). Европа. Цв. головки шаровидныя, аметистовыя, въ іюль—августъ. 1—2 ф. Э. **Бургати** (E. Bourgati, Бургата). Перепел. Цв. свѣтло-голубые, съ іюля по августъ. 1—2 ф. Э. **гигантеумъ** (E. giganteum, великанскій). Кавказъ. Цв. головки яйцевидныя, голубыя, въ іюль и августъ. 3—4 ф. Э. **панданифоліумъ** (E. pandanifolium, съ лат. какъ у Пандануса). Монте-Видео. Цв. пурпуровые съ малыми обертками, 3—5 ф.

ЭРИНУСЪ (Erinus). Название заимствованное у Діоскорида. С. норичниковыхъ. (1). Европ. Альпы. Въ умѣр. климатѣ годное для каменныхъ участковъ р., которое распространяется самосѣвомъ. Э. **альпинусъ** (E. alpinus, альпійскій). Цв. пурпуровые, съ марта до іюня. 5—6 д.

ЭРИТАЛИСЪ (Erithalis). Название заимствовано у Плинія. С. мареновыхъ. (5). Флорида и о. 3. Инд. океана. Тепл. куст. рр. Песчан. волокн. дернов. съ добавленіемъ торф. Черенками изъ бокового роста въ песокъ, весной или лѣтомъ, въ парникъ. Темп. лѣтомъ 13—22, зимой 8—10°.

Э. **фрутикоза** (E. fruticosa, кустарный). Ямайка. Цв. бѣлые, мелкіе, приятно пахучіе. 10—15 ф.

ЭРИТѢА (Erythea). *Эритеа* — одна изъ геснеридъ, сторожившая садъ съ золотыми яблоками. С. пальмъ. (2). Ю. Калифорнія. Оранж. рр., близкія къ Ливистона. Ухождъ какъ за Арка.

Э. **эдудисъ** (E. edulis, съдомая). Гваделупа. Пень тонкій, выш. 30 ф., лл. вѣрообразные, даетъ плоды вѣсомъ въ 40—

50 ф. Спн. *Брахѣа эдудисъ* (Brahea edulis).

ЭРИТРЕА (Erythraea). *Erythros* — красный. С. горечавковыхъ. (30). По всей поверхности. Одно-, дву-, многол. трав. рр. Песчан. дерн. Сѣменами или дѣленіемъ.

Э. **диффуза** (E. diffusa, раскидистая). 3. Европа. Цв. ярко-розовые. 2—3 д. Многол. Э. **Мулленберги** (E. Muhlenbergi, Мулленберга). Калифорнія. Цв. темно-малиновые съ зеленого цв. глазкомъ въ видѣ звѣздочки. 8 д.

ЭРИТРИНА (Erythrina). *Erythros* — красный. С. бобовыхъ. (24). Жаркія страны. Тепл. куст. и дерев. рр. Глин. дерн. съ торф. и коровьимъ перегноемъ. Черенками молодымъ побѣговъ весной, въ песокъ, въ парникъ. Темп. лѣтомъ 10—20, зимой 6—10°.

Э. **индика** (E. indica, индійская). Ост-индія. Цв. великолѣпные шарлаховые, или бѣлые. 20—30 ф. Э. **кріста-галли** (E. crista-galli, пѣтушій гребешокъ). Бразилія. Цв. темно-шарлаховые, въ май до іюля. 6—8 ф. Спн. Э. **лаурифолія** (E. laurifolia).

ЭРИТРИХИУМЪ (Eritrichium). *Erion* — пухъ и *trichos* — волосъ, — рр. пушистая. С. бурачниковыхъ. (70). Европа, Средиземн. побережье, Азія, Америка, Австралія. Песчан. глин. дерновая. Сѣменами и дѣленіемъ.

Э. **напумъ** (E. napum, низкій). Альпы. Цв. яркіе лазурные съ желтымъ глазкомъ, какъ у невабудки, лѣтомъ. 2—3 д. Р. это прозвано «слагоу альпійской флоры».

ЭРИТРОКСИЛОНЪ (Erythroxyton). *Erythros* — красный и *xylon* — дерево; у нѣк. видовъ древесина красная. С. леновыхъ. (50). Тепл. или оранж. дер. Троп. Америка, Африка, Остиндія, Австралія. Глин. дерн. съ торф. Черенками изъ полузрѣлаго роста въ песокъ, въ парникъ. Темп. зимой 7—10, лѣтомъ 13—20°.

Э. **Кока** (E. Coca, Кока). Ю. Америка. Цв. зеленоватые. 3—6 ф. Оранж.

ЭРИТРОНИУМЪ (Erythronium). *Erythros* — красный, но цв. С. лилейныхъ. (7). Европа, Азія, Японія, С. Америка. Безстеб. выносл. или полувыносл. луков. рр. Легкая глин. дерн. съ торф. Отпрысками.

Э. **американумъ** (E. americanum, американскій). С. Америка. Цв. ярко-желтые, весной, лл. съ фіолетовыми и бѣлыми разводами. 3—6 д. Э. **денс-канисъ** (E. dens-canis, собачій зубъ). *Кандикъ*. Европа. Цв. розово-пурпуровые, весной, лл. съ буропурпуровыми и бѣлыми разводами. 6 д.



**ЭРИТРОФЛЕУМЪ** (*Erythrophloeum*). *Erythros*—красный и *phloos*—кора, по красному соку в стеблѣ. С. бобовыхъ. (4). Южн. Америка и Австралія. Тепл. дер. Уходъ какъ за Акація.

Э. гвинеецъ (*E. guineense*, гвинейскій). Сьерра-Леоне. Цв. блѣдно-желтые. 40—100. Кора очень ядовита. Э. Лябушери (*E. Labouchei*, Лябушера). С. Австралія. Цв. желтые, густыми колосами.

**ЭРИТРОХИТОНЪ** (*Erythrochiton*). *Erythros*—красный и *chiton*—покрытъ. С. рутовыхъ. (4). Бразилія, Гвiana, Нов. Гренада. Тепл. деревья. Глин. дерн. съ листов. Сѣменами и черенками.

Э. бразиліензисъ (*E. brasiliensis*, бразильскій). Бразилія. Цв. съ красною чашечкой и блѣлымъ вѣнчикомъ, въ іюль. 10 ф. Э. хипофиллантусъ (*E. hypophyllanthus*, съ цв. на лл.). Колумбія. Цв. блѣлые.

**ЭРИЦИНЕЛЛЯ** (*Ericinella*). Уменьшительное *Erica*. С. вересковыхъ. (4). Ю. и троп. Африка и Мадагаскаръ. Оранж. куст. пр. Уходъ какъ за Эрика.

Э. Манни (*E. Mannii*, Манна). Камерунскія горы. Цв. тускло-красные, въ іюль. 4—10 ф.

**ЭРИАНТУСЪ** (*Erianthus*). *Erion*—шерсть и *anthos*—цвѣтокъ; по волоскамъ у каждаго колоска. С. злаковъ. (12). Южн. Европа, Китай, Японія, С. Америка. Полувысока. пр. Песчан. дерн. Сѣменами.

Э. Равеннѣ (*E. Ravennae*, изъ Равенны). Ю. Европа. Образуеъ густыя кустистыя поросли въ 5—6 ф., но только въ жаркіе года.

**ЭРИГОНОМЪ** (*Eriogonum*. *Erion*—шерсть и *goni*—суставъ; суставы стебля покрыты волосками. С. истодовыхъ. (100). С.-З. Америка. Цвѣтущія лѣтомъ однол. трав. или многол. деревин. пр. Глин. дерн. съ торф. Сѣменами и дѣленіемъ.

Э. композитумъ (*E. compositum*, сложный). Цв. тускло-бѣлые или розовые. Многол. 18 д. Э. коримбозумъ (*E. corimbosum*, щитковый). Цв. темно-розовые, рѣже желтые, или бѣлые. 1 ф. Э. умбеллятумъ (*E. umbellatum*, зонтичный). Цв. желтые. 3—12 д.

**ЭРИОДЕНДРОНЪ** (*Eriodendron*). *Erion*—шерсть и *dendron*—дерево; плодики наполнены пушкомъ. С. мальвовыхъ. (8). Тропич. страны. Тепл. дрв. пр. Сильная глин. дерн. Сѣменами въ песчан. землѣ, въ теплѣ. Темп. зимой 8—10, лѣтомъ 13—21°.

Э. афрактудумъ (*E. anfractuosum*, курчавый). Вестиндія. Цв. снаружи пушистые, внутри желтоватые. 100 ф. У равно-

видности *карибумъ* (*caribaeum*) цв. красивые свѣтло желтые или бѣлые съ превосходнымъ запахомъ. Э. лейантѣмумъ (*E. leianthemum*, гладко-цвѣтнй). Бразилія. Цв. бѣлые. 70 ф.

**ЭРИОКНЕМА** (*Eriocnema*). *Erion*—шерсть и *cneme*—нога; по пушистымъ черешкамъ. С. черноустовыхъ. (2). Южн. Бразилія. Тепл. трав. пр., требующія такого же ухода какъ за Бертолонія.

Э. мarmorатумъ (*E. marmoratum*, мраморная). Цв. розовые, въ май. 4 д. Э. фульвумъ (*E. fulvum*, рыжая). Цв. малиновые, въ іюнь. 6 д.

**ЭРИОПСИСЪ** (*Eriopsis*). *Eria* *p'opsis*, похожее на *Eria*. С. орхидей. (4). С. Бразилія, Гвiana, Колумбія. Оранж. эпифиты. На мхѣ дѣленіемъ. Темп. лѣтомъ 13—25, зимой 8—10°.

Э. билоба (*E. biloba*, двулопастный). Отечество неизвѣстно. Цв. темно-желтые съ коричневыми пятнами. Э. рутидобулбонъ (*E. rutidobulbon*, съ грубыми луковичками). Нов. Гренада. Цв. крупныя и темныя, чѣмъ у билоба.

**ЭРИОСЕМА** (*Eriosema*). *Erion*—пухъ и *sema*—флагъ. С. бобовыхъ. (40). Ю. Америка и троп. Африка. Тепл. трав. или кустарн. пр. Смѣсь изъ глин. дерн. съ торф. Сѣменами и черенками.

Э. грандифлорумъ (*E. grandiflorum*, крупно-цвѣтнй). С. Мексика. Цв. желтые, кистями, въ октябрѣ. 1—2 ф. Э. виоллацеумъ (*E. violaceum*, фиолетовый). Троп. южн. Америка. Цв. фиолетовые, въ іюль—августъ. 4 ф.

**ЭРИОСПЕРМУМЪ** (*Eriospermum*). *Erion*—шерсть, пухъ и *sperma*—сѣмя, по пушистому покрову сѣмянъ. С. лилейныхъ. (25). Троп. и Южн. Африка. Оранж. луковичн. пр. Уходъ какъ за Бульбине.

Э. Веллендені (*E. Bellendeni*, Веллендена). М. Д. Н. Цв. свѣтло-голубые, съ іюня до августа. 1 ф. Э. Маккені (*E. Mackenii*, Макъ-Кена). Наталь. Цв. яркіе, золотисто-желтые, въ іюль. Э. пролиферумъ (*E. proliferum*, перерослый). М. Д. Н. Цв. бѣлые, зеленые, (съ іюня до августа. 9 д. Э. пубесценс (*E. pubescens*, пушистый). М. Д. Н. Цв. зеленые, въ іюль. 1 ф.

**ЭРИОСТЕМОНЫ** (*Eriostemon*). *Erion*—шерсть, пухъ и *stemon*—тычинка. С. рутовыхъ. (30). Австралія, Нов. Каледонія. Оранж. куст. Песч. торф. 3 ч., песч. дерн. 1 ч. Черенками изъ молодого роста, въ песокъ, въ апрѣлѣ, подъ стекломъ. Темп. лѣтомъ 10—20, зимой 6—10°.

Э. буксифолиусъ (*E. buxifolius*, съ лл. Буксуса). Цв. малиновые или розовые, въ апрѣлѣ до іюня. 1—2 ф. Э. интерме-

диусъ (*E. intermedius*, промежуточный). Цв. бѣлые съ розовымъ оттикомъ, въ апрѣлѣ. 3 ф. Э. перифолиусъ (*E. perfoliatus*, съ лл. олеандра). Цв. розовые или малиновые, въ апрѣлѣ. 3 ф. Э. скаберъ (*E. scaber*, жесткій). Цв. бѣлые, съ малиновымъ оттикомъ, въ мартѣ до іюня. 1½ ф.

**ЭРИОФИЛЛУМЪ** (*Eriophyllum*). *Erion*—шерсть и *phyllon*—листь, по пушистымъ лл. С. сложно-цвѣтнхъ. (12). С. З. Америка. Травян. или полукуст. пр. Обыкн. садов. Дѣленіемъ весной.

Э. цеспитозумъ (*E. caespitosum*, дернистый). Цв. желтые, въ май. 1 ф.

**ЭРИОФОРУМЪ** (*Eriophorum*). *Erion*—шерсть и *phoreo*—нести; по пушистымъ головкамъ. С. спотовиковыхъ. (10). Сѣв. полушаріе. Европа, Азія, Америка. Пр. болотныя, представителями которыхъ могутъ служить наши дикорастиція *Пушицы* (*E. vaginatum*, *E. vaginatum*).

**ЭРИОХИЛЮСЪ** (*Eriochilus*). *Erion*—шерсть и *cheilos*—губа, по пушистому диску губы. С. орхидей. (5). Австралія. Оранж. земныя пр. Волокн. глин. дерн. съ торф. и пескомъ по ровну. Дѣленіемъ корней.

Э. аутомналисъ (*E. autumnalis*, осенній). Цв. малиновые, въ октябрѣ. 6 д. Снн. *Эпипактисъ куккуллята* (*Eriopactis cucullata*). Э. скаберъ (*E. scaber*, жесткій). Цв. розовые, въ сентябрѣ. Очень близокъ съ Э. аутомналисъ.

**ЭРИЯ** (*Eria*). *Erion*—шерсть, по пушистымъ лл. нѣкот. видовъ. С. орхидей. (120). Индія, ю. Китай, Малайск. архип. Тепл. эпифиты. Волокн. торф. съ рубленымъ мохомъ. Дѣленіемъ. Темп. лѣтомъ 13—26, зимой 8—10°. Въ садахъ встрѣчаются рѣдко, п. ч. цв. не замѣчательны.

**ЭРОДИУМЪ** (*Erodium*). *Erodios*—журавль; плодики напоминаютъ клювъ этой птицы. С. гераниевыхъ. (50). Европа, С. Африка, умѣр. Азія. Выноса. или полувын. травян. или полукуст. пр. Песчан. дерн. Сѣменами и дѣленіемъ.

Э. макраденумъ (*E. macradenum*, съ крупными железками). Перенеп. Цв. блѣдно-фиолетовые, въ іюнь—іюль. 6 д. Безстебельное. Снн. Э. glandулозумъ (*E. glandulosum*). Э. Манескави (*E. Manescavi*, Манеско). Перенеп. Цв. красно-пурпуровые, лѣтомъ. 1—2 ф. Э. пеларгонифлорумъ (*E. pelargoniflorum*, съ цв. какъ у Пеларгонія). Анатолія. Цв. бѣлые съ пурпуровыми пятнышками, лѣтомъ. Э. Рейхарди (*E. Reichardi*, Рейхарда). Майорка. Цв. бѣлые съ малиновыми жилками, въ апрѣлѣ по сентябрь. 2—3 д.

**ЭРЦИЛЛЯ** (*Ercilla*). Название мѣст-

ное перуанское. С. лаконосовыхъ. (1). Перу, Чили. Оранж. цѣпкое р., прикрѣпляющееся къ стѣнѣ, какъ плющъ.

Э. спиката (*E. spicata*, колосчатая). Цв. пурпуровые, лл. округло-овальные.

**ЭСКАЛЬОНІЯ** (*Escallonia*). *Escallonia* (Escallon) — испанскій путешественникъ по Ю. Америкѣ, нашедшій первые виды этого рода. С. камнеломковыхъ. (36). Юж. Америка. Полувысока. куст. Глин. дерн. съ торф. и немного мусора. Черенками изъ молодыхъ побѣговъ, въ песокъ, подъ колпакомъ, въ оранж., также отводкой и отпрысками.

Э. макранта (*E. macrantha*, крупноцвѣтная). Чили. Цв. ярко-красные, дов. большіе. 3—6 ф. Э. организисъ (*E. organensis*, съ Органнхъ горы). Органнхъ горы. Цв. темно-розовые. 2—4 ф. Э. рубра (*E. rubra*, горная). Цв. красные. 3—6 ф.

**ЭСКУЛЮСЪ** (*Aesculus*). Такъ у Плинія называлъ дубъ со съдобными желудками, по *esca*—пища. С. сапидовыхъ. (15). Пренп. Сѣв. Америка. Дрв. пр. Глинисто-дерновая лучшая. Размн. отводкой весной или прививкой, обычно же—сѣменами, весной. Отличается отъ *Равія* (*Ravia*) колючимъ плодомъ.

Э. глабра (*A. glabra*, гладколистный). Сѣв. Америка. Цв. зеленовато-желтые, въ іюнь. 20 ф. Назыв. также *овізісисъ* (*obiesis*, съ Огайо) и *паллида* (*pallida*, блѣдный). Э. хиппокастанумъ (*A. hippocastanum*, коневій каштанъ). Азія. Цв. бѣлые съ розовымъ, въ апрѣлѣ—май. Красное дерево, особенно въ цвѣту. 40 ф. Имѣеъ разновидности отличающіяся формою листьевъ и одну—съ махровыми цв.

**ЭСПАРЦЕТЪ**. См. Онобрихисъ.

**ЭСПЕЛЕТІЯ** (*Espeletia*). Донъ Хозе де-Эспелета (Don Jose de Espeleta), новогренадскій вице-король. (11). Новая Гренада. Орнамент. оранж. пр. Песчан. торф., содержитъ въ сухой части оранж.

Э. аргентеа (*E. argentea*, серебристая). Цв. головки желтыя, дискъ коричневый, въ іюнь. 5—6 ф. Э. грандифлора (*E. grandiflora*, крупноцвѣтная). Цв. головки желтыя, большія, лѣтомъ. 10 ф.

**ЭСТРАГОНЪ**. См. Артемизія.

**ЭТИОНЕМА** (*Aethionema*). Отъ *aito*—прижигать и *nema*—нить; по тычинкамъ. С. крестоцвѣтнхъ. (16). Юж. Европа, Малая Азія, Персія. Дрв., куст. и однол. пр. Размнож. сѣменами весной, а многолѣтніе виды—черенками лѣтомъ. Легкая, рыхлая.

Э. коридифолия (*A. coridifolia*, съ листьями какъ у Корсѣя). Малая Азія. Цв. лилово-розовые, въ іюнь. Многолѣтнее полукустарное р. 6—8 д.



**ЭФЕДРА** (*Ephedra*). Такъ названъ у Плинія хвощъ. С. хвойниковыхъ. (30). Юж. Европа, Азия, С. Африка Чили, Техасъ, Калифорнія. Низкорослая сте- лящаяся куст. рр. Обыкновенная садовая. От- вождкой молодыхъ вѣтокъ.

Э. вульгарисъ (*E. vulgaris*, обыкновенная). Хвойникъ. Европа, Ю. Россія. Цв. бѣловатые, въ июнь—июль. Ягоды красныя. 1—2 ф. Сил. Э. моностахія (*E. monostachya*). Э. небродензисъ (*E. nebroden- sis*, неброденская). Ю.-З. Европа. Цв. бѣло- ватые, въ июль—августъ. Ягоды красныя 3—4 ф.

**ЭХМЕА** (*Aechmea*). Отъ *iachme-* остріе, по жесткимъ колочкамъ у цвѣточ- ныхъ обертокъ. С. бромелиевыхъ. (60). Южн. Америка. Красивыя тепличныя куст. рр. Хорошо дренажированная смѣсь волокнистой глин. дерн. земли съ листов. Больше свѣта. По отцвѣтении вы- стаютъ отростки, на кот. образуются въ слѣд. году цвѣты. Если хотѣть имѣть боль- шие экземпляры, то этихъ отростковъ не отнимаютъ, въ противномъ же случаѣ ими размножаютъ. Для этого ихъ отнимаютъ съ нѣсколькими нижними лист. и сажаютъ въ песокъ, а держать тепло и влажно. Укоренившіеся разсаживаютъ по одиноч- кѣ. Зимой рр. содержатся сухо. Внима- тельно наблюдаютъ, чтобы не было за- стойной воды внизу листьевъ и въ средѣ пѣ р. п. ч. отъ этого оно гниваетъ.

Э. Линдені (*A. Lindenii*, Линденова). Ю. Бразилія. Цв. желтые. 1 ф. Э. спекта- билисъ (*A. spectabilis*, замѣчательная). Гватемала. Цв. розовые. 3—4 д. Э. фуль- генсъ (*A. fulgens*, яркоцвѣтная). Каенна. Цв. темно красные, въ августъ—сентябрь. Э. хистриксъ (*A. hystrix*, колочал). Каенна. Цв. шарлаховые, въ февраль. 2½ ф.

**ЭХИДНИУМЪ** (*Echidnium*). *Echid- nitum*—молодая змѣя, по сходству р. съ Драконіумъ. С. ароидеиныхъ. (2). Бра- зилія. Тепл. клубнев. многол. рр. Сильная неск. глянцисто-дерн. и листов. Сѣменами и отростками. Темп. лѣтомъ 13—23, зи- мой 10—13°.

Э. Регелианумъ (*E. Regelianum*, Ре- гели). Бразилія. Цв. буро-пурпуровые, въ июль. 1½—3 ф. Сил. Э. спрусеанумъ (*E. Spruceanum*).

**ЭХИДНОПСИСЪ** (*Echidnopsis*). *Echidne*—змѣя и *opsis*—подобіе, по стеб- лямъ. С. ласточниковыхъ. (2). Абиссинія. Оранж. сочныя, трав. безлистные рр. Глин. дерн. съ пескомъ, битыми черенками и съ поверхн. удобреніемъ коровьимъ пе- регноемъ. Черенками съ обсохшими ниж. концами. Темп. лѣтомъ 12—21, зимой 4—8°.

Э. цереиформисъ (*E. cereiformis*, по- хойій на Цереусъ). Абиссинія. Цв. ярко- желтые, мелкіе. 6 д.

**ЭХИНАЦЕА** (*Echinacea*). *Echinoc-* ежъ, по колючему ложу. С. сложноцвѣт- ныхъ. С. Америка. Оранж. траилн. многол. полувыносл. рр. Сильная глин. дерн. съ листов. Дѣлениемъ и сѣменамъ. Причи- сляются къ Рудбекія.

Э. ангустифолія (*E. angustifolia*, узколистная). Соед. Ам. Штаты. Цв. гол. свѣтло-пурпуровыя или розовыя, лѣтомъ. 2—4 ф. Э. пурпуреа (*E. purpurea*, пур- пуровая). Соед. Ам. Шт. Цв. головки красновато-пурпуровыя, лѣтомъ. 3—4 ф.

**ЭХИНОКАКТУСЪ** (*Echinocactus*). *Echinoc-* ежъ и *Cactus*—по сходству съ ежомъ. С. кактусовыхъ. (200). Техасъ и Калифорнія до Перу и Бразиліи. Ухождъ какъ за кактусами.

Э. пектиниферусъ (*E. pectiniferus*, гребенчатый). Мексика. Цв. бѣдно-зеленые съ розовымъ, въ апрѣль. 4 д. Э. Пент- ланди (*E. Pentlandii*, Пентланда). Цв. жел- тые съ красноватымъ, въ июль. Э. родо- фталмусъ (*E. rhodophthalmus*, съ крас- нымъ глазомъ). Санъ-Луи-Потоси. Цв. ро- зовые, въ августъ. 4—5 д.

**ЭХИНОПСИСЪ** (*Echinopsis*). *Echi-* nos—ежъ и *opsis*—похожіи. С. кактуса- выхъ. (12). Троп. Америка. Ухождъ какъ за кактусовыми.

Э. кристата (*E. cristata*, гребенчатый). Боливія. Ц. бѣлые, въ июль. Э. мульти- плексъ (*E. multiplex*, многочисленный). Ю. Бразилія. Цв. розовые. 6 д. Сил. Це- реусъ мультиплексъ (*Cereus multiplex*). Э. Эйриэи (*E. Eurysei*, Эйриса). Мексика. Цв. бѣлые пахучіе, въ январь.

**ЭХИНОПСЪ** (*Echinops*). *Echinoc-* ежъ и *ops*—подобіе, по колючимъ чешуй- камъ обертокъ. С. сложноцвѣтныхъ. (73). Южн. Европа, Азия, С. и З. Австралія. Оранж. траилн. по грубымъ дву- и многол. рр. Обыкн. садовая. Двудѣт. —сѣменами; мно- гол.—дѣлениемъ.

Э. коммунатусъ (*E. commutatus*, измѣн- чивый). Европа. Цв. головки голубыя, лѣ- томъ. 2—3 ф. Двудѣт. Э. Ратро (*E. Ratto*, Ритро). Юж. Европа. Цв. гол. го- лубыя, лѣтомъ. 3 ф. Многол.

**ЭХИНОСПЕРМУМЪ** (*Echinospertum*). *Echinoc-* ежъ и *sperma*—сѣмя, по колючему пуху. С. бурачниковыхъ. (50). По умѣреннымъ поясамъ обонхъ по- лушарій, преим. сѣвернаго. Одно-, дву- и многол. трав. рр. Обыкн. садовая. Сѣме- нами, а многол. и черенками, подъ стек- ломъ, лѣтомъ.

Э. маргинатумъ (*E. marginatum*, каем- чатый). Россія. Цв. бѣдно-голубые, какъ у незабудки. Двудѣт.

**ЭХИТЕСЪ** (*Echites*). *Echis*—змѣя, по извилистому, извивающемуся росту. С. кутровыхъ. (35). Троп. Америка. Тепл. вьющ. куст. рр. Ухождъ какъ за Дипладенія.

Э. атропурпуреа (*E. atropurpurea*, темно-пурпуровый). Бразилія. Цв. темно- нескладные, въ июль. Э. пунансъ (*E. punitans*, пониклый). Вестиндія. Цв. желтые, пониклые, въ сентябрь. Э. стеллярисъ (*E. stellaris*, звѣздчатый). Бразилія. Цв. желтые, въ сентябрь. 6 ф.

**ЭХИУМЪ** (*Echium*). Название зап- стованное у Dioscorida. С. бурачнко- выхъ. (20). Европа, З. Азия, С. Африка, Канарск. о. Вносл. или оранжер. травяни- либо кустари. рр. Обыкн. садов. Травян. —сѣменами, кустари. черенками; для оранж. глин. дерн. съ торф., 4—7° зимой.

Э. кандикансъ (*E. candicans*, бѣловат- ный). Мадера. Цв. голубые, въ маѣ. 2—4 ф. Оранж. двуд. Э. фастуозумъ (*E. fas- tuosum*, пышный). Канар. о. Цв. темно- голубые колокольчатые, съ апрѣля до авгу- ста. 2—4. Оранж. многол.

**ЭЧЕВЕРІЯ**. См. Котиледонъ.

**ЭПИНАНТУСЪ** (*Aeschinanthus*).

Отъ *aichimo*—стыдиться и *anthos*—цвѣ- токъ. С. геснерійныхъ. (60). Остиндія, Малайскій архип., троп. Азия, Китай. Куст. и трав. рр. Имѣютъ всѣ достоин- ства: красивыя и пахучіе цвѣты, темную зелень и неприхотливость. Растутъ на чуркахъ; предварительно прикрѣпленія мѣдной проволокой, корни обмотать мо- хомъ. Потомъ пужаютъ только въ опрыскиваніи и куаніи по временамъ въ теплой водѣ. Можно держать и въ горшкахъ, чаще пересаживая въ сильную землю; когда разрастется—распирать на деревянномъ трельяжѣ. Размнож. сѣ- менами и черенками. Послѣдніе дѣлаются весной, изъ полужрѣлой древесины, въ 2—3 д., оставляя одинъ только верхній листъ. Сажаютъ въ песокъ, ставятъ на теплый грунтъ и прикрываютъ стекломъ. Укоренившіеся разсаживаютъ по оди- нокѣ въ горшки, кот. ставятъ подъ стекло, а потомъ постепенно приучаютъ къ воздуху, окончательно сажаютъ въ корзины съ мохомъ съ самымъ тонкимъ слоемъ рыхлой, сильной земли. Лѣтомъ поливаютъ обильно, не позволяя цвѣсти въ первый годъ; зимою держатъ прохлад- нѣе и суше. Послѣ покоя, даютъ ростъ, который образуетъ цвѣты.

А. Бошианусъ (*A. Boschianus*, Бошети). Ява. Цв. шарлаховые, въ июль. 1 ф. А. Лоббианусъ (*A. Lobbianus*, Лоббовъ). Ява. Цв. красно-оранжевые, въ июнь. Р. цѣпляющаеся. А. лонгифлорусъ (*A. lon-*

*giferus*, длинноцвѣтный). Ява. Цв. шарла- ховые, лѣтомъ. Р. пониклое. А. миніа- тусъ (*A. miniatus*, киноварный). Ява. Цв. ярко-киноварные, въ июнь. Наз. также *ра- дикансъ* (*radicans*, укореняющійся). А. пѣль- херъ (*puleher*, красивый). Ява. Цв. ярко- шарлаховые, въ июнь. Р. цѣпкое. А. спе- циозусъ (*A. speciosus*, замѣчательный). Цв. оранжевые, лѣтомъ. 2 ф. А. трико- лоръ (*A. tricolor*, трехцвѣтный). Борнео. Цв. кроваво-красные съ оранжевымъ звѣ- томъ, въ июль. 1 ф. А. яванікусъ (*A. javanicus*, яванскій). Ява. Цв. красные, въ июнь. Р. цѣпляющаеся.

**ЭШОЛЬЦІЯ** (*Eschscholtzia*). Нату- ралистъ Эшольцъ (*Eschscholtz*) сопро- вождалъ Коцебу въ кругосвѣтномъ пла- ваніи. С. маковыхъ. (5). Зап. С. Аме- рики. Однол. или многол. трав. рр. Са- довая обыкн. Сѣменами весной, на мѣстѣ.

Э. калифорника (*E. californica*, калифорнская). С.-З. Америка. Цв. ярко-жел- тые, лѣтомъ. 1½ ф. Многол. Имѣетъ раз- новид. съ бѣлыми, розовыми, свѣтло-желт. и др. цв. Изъ нихъ особеннаго вниманія заслуживаетъ *крюка* (сросса, желтая), изъ Калифорніи, съ ярко-желтыми цв. лѣтомъ. 1 ф.

**ЮБЕА** (*Jubaea*). *Юба* (*Juba*),—нуми- дійскій царь. С. пальмъ. (1). Чили. Оранж. пальма. Сѣмь изъ ½, сильной глин. дерн. и ¾, листовой съ пескомъ. Сѣменами.

Ю. спектабилисъ (*J. spectabilis*, замѣчательная). Ван перистыя, въ 6 до 12 ф. длинной, стволъ въ 40 до 60 ф. Самая юж- ная въ Америкѣ пальма. Изъ сока выва- ривается пальмовый «медъ».

**ЮГЛАНСЪ** (*Juglans*). Название встрѣчаемое у Плинія и производимое отъ *Jovis glans*—орѣхъ Юпитера. С. орѣшниковыхъ. (8). Умѣр. и около-тро- нич. страны сѣв. полушарія. Выносл. и полувыносл. древ. рр. Всякая плодород- ная земля, наприм. глубокая глин. дерн. Сѣменами и прививкой.

Ю. нѣгра (*J. nigra*, черный). Соед. Шта- ты. Цв. зеленоватые, весной; плоды шаро- видные, съ липкими сосочками; листочковъ 13—17, сердцевидно-остроконечныхъ. 60 ф. Ю. регія (*J. regia*, царскій). Воложскій или грецкій орѣхъ. Персія. Цв. зеленова- тые, весной; плоды въ зеленой шелухѣ, овальные, на короткой ножкѣ. Листочковъ 5—9, овальныхъ, мелко-зубчатыхъ. 40—60 ф. Имѣетъ много разновидностей. Ю. цинереа (*J. cinerea*, пепельный). Бѣлый грец. орѣхъ. Соед. Штаты. Цв. зеленова- тые весной. Плоды продолговато-яйцевид- ные, съ острымъ концомъ, покрытые лип- кимъ веществомъ; листочковъ 15—17, лан-



цветовидныхъ съ округлымъ основаніемъ. 30—60 ф.

**ЮККА (Yucca).** Название мѣстное. С. лилейныхъ. (По однимъ 12, по другимъ 21). Теллч. и оранж. пр. близкія къ драценамъ и кордилинамъ. Южн. Амер. Соед. Штаты, Мексика и Центр. Америка. Легкая, сильная. Дѣленіемъ мясистыхъ корней, разрыванныхъ поперекъ и посаженныхъ въ песокъ, въ теллч.

**Ю. алоифолия (Y. aloifolia,** съ лл. какъ у алое). Вестиндія до С. Каролины. Цв. бѣлые, въ маѣ, іюнѣ. Лл. мечевидные, твердые, сизые, съ красноватой кожочкой. 15—20 ф. Имѣетъ много разновидностей: у *триколоръ* (tricolor) лл. пестрые съ бѣлыми и желтыми, а у *варіегиата* (variegata) только съ бѣлыми полосками. **Ю. ангустифолия (Y. angustifolia,** узколистная). Миссури. Цв. колокольчатые, снаружи зеленоватые, въ іюль. Лл. съ колючкою и бѣдно-красными краями. Стебли почти не имѣетъ. Нѣсколько разновидностей. **Ю. Випплэя (Y. Whipplei,** Уипплэя). Калифорнія и Аризона. Цв. бѣлые, лѣтомъ. Лл. прямые, лелые, края бѣдые съ мелкими зубчиками. Стебли нѣтъ. У разновидности *виоласеа* (violacea) цв. фиолетовые. **Ю. глаука (Y. glauca,** сизая). С. Америка. Цв. бѣлые, широко-колокольчатые, лѣтомъ. Лл. мечевидные. Стебли нѣтъ. **Ю. глоріоза (Y. gloriosa,** знаменитая). Соед. Амер. Штаты. Цв. колокольчатые, снаружи красноватые, въ іюль. Лл. розеткой, жесткие, тускло-зеленые, слегка сизые. 4—6 ф. Нѣсколько разновидностей, между пр. *рекурвифолия* (recurvifolia), имѣющая пестролистную форму. **Ю. Трекулеана (Y. Trecaleana,** Трекуля). Техасъ и С. Мексика. Цв. колокольчатые бѣлые, лѣтомъ; лл. мечевидные, тускло-зеленые, съ красноватыми краями. Сип. **Ю. агавоидесъ, Ю. конкава, Ю. конторта, Ю. корнута, Ю. револута, Ю. ундулата (Y. agavoides, Y. concava, Y. contorta, Y. cornuta, Y. revoluta, Y. undulata).** **Ю. филиментоза (Y. filamentosa,** волокистая). С. Америка. Цв. бѣлые, снаружи зеленоватые, въ іюнѣ. Лл. розеткой, мечевидные, сизоватые. Стебли почти нѣтъ. Имѣетъ нѣсколько разновидностей, изъ нихъ *охроидесъ* (ochroides) и *филлида* (fasciata) заслуживаютъ наиболѣе вниманія.

**ЮНИПЕРУСЪ (Juniperus).** Название, заимствованное у Виргилія и Плинія. С. хвойныхъ. (27). Умѣр. и холод. страны сѣверн. полушарія. Древеси. и куст. пр. Песков. обыкн. садовая. Сѣменами и черенками.

**Ю. виргиніана (J. virginiana,** виргинскій). Соед. Штаты. Лл. шиловидные, мел-

кіе. 10—15 ф. Пирамидальный ростъ. Имѣетъ много разновидностей. **Ю. дрападеа (J. drupacea,** ягодный). Сѣверн. часть Сирин. Лл. по трое, болѣе широкія, чѣмъ у пр. Плоды темно-пурпуровые, крупныя. 8—10 ф. Ростъ прямой. **Ю. коммунисъ (communis,** обыкновенный). *Можжевельникъ*. Сѣв. полушаріе. Лл. шиловидные, остроконечные, по трое, на верхн. сторонѣ сизые, на нижней—зеленые. 3—20 ф. Имѣетъ нѣсколько разновидностей. **Ю. окциденталисъ (J. occidentalis,** западный). Калифорнія. Лл. колючатые; ягоды мелкія, темно-пурпуровыя. 10—50 ф. **Ю. прокумбенсъ (J. procumbens,** распростертый). Канада и С. Соед. Штаты. Сизый, распростертый кустъ, походящій на Ю. сабина съ сизыми лл. Сип. **Ю. прострата и Ю. репенсъ (J. prostrata et J. repens).** **Ю. сабина (J. Sabina,** сабинскій). *Казачій можжевельникъ*. Ю. Европа. Лл. мелкіе, черепчатые. 5—8 ф. Имѣетъ нѣсколько разновидностей. **Ю. турифера (J. thurifera,** ладонный). Ю. -З. Европа. Лл. шиловидные, настельчатые, свѣтло-сизые. 15—25 ф. **Ю. хинензисъ (J. chinensis,** китайскій). Китай. Лл. тройчатые или супротивные, плоскіе, острые, или чешуеобразные. Имѣетъ много разновидностей. **Ю. экцелса (J. excelsa,** высокій). Малая Азія. Лл. супротивные, тройчатые, толстые, сбѣгающіе, рыхло-настельные. 20—40 ф. Имѣетъ разновидность *стрикта* (stricta) съ болѣе сизыми лл.

**ЮНЕУСЪ (Juncus).** *Jungo*—соединяю: листья и стебли служатъ для связыванія. С. ситниковыхъ. (100). Умѣр. преимущ. арктич. поясовъ. Одно- и многол. травы. Во всякой болотной или мо-чажной з. Дѣленіемъ.

**Ю. лѣтевиренсъ (J. laetevirens,** ярко-зеленый). Японія. Лл. ярко-зеленаго цвѣта. 3 ф. Дернинками.

**ЮРИНЕА (Jurinea).** Происхождение названія не объяснено. С. сложноцвѣтныхъ. (40). Ю. Европа, З. и Сред. Азія. Трав. многол. выносл. пр. Ни одно не имѣетъ садоваго значенія.

**ЮСТИЦИЯ (Justicia).** *Юстисъ* (Justice) — шотландскій садоводъ. С. акантовыхъ. (100). Индія и Ю. Африка. Трав. и полукуст. телл. или оранж. пр. Глин. дерн. пополамъ съ листовой. Черенками, весной, въ парникѣ. Темп. лѣтомъ 13—22, зимой 7—10°.

**Ю. вентрикоза (J. ventricosa,** брюшистая). Индія, Китай. Цв. малиновые, въ іюнѣ—іюль. 3 ф. **Ю. Гендурасса (J. Gendurassa,** Гендурасса). Индія. Цв. лиловые, колючатые, въ іюнѣ—іюль. 3 ф. **Ю. мрамората (J. marmorata,** мраморная).

Лл. съ бѣлыми пятнами и разводами. **Ю. перувиана (J. peruviana,** перуанская). Перу. Цв. бѣдно-фіолетовые, большіе, осенью. 2 1/2 ф.

**ЮЮБА. См. Цицифусъ.**

**ЯБЛОКО.** Плодъ яблони. Изъ сортовъ русскихъ, нуждающихся еще въ обстоятельной классификаціи, наиболѣе извѣстны: *айсовка, антоновское, апортное, арабка, аркада, артемьевское, боро-винка, бѣль, варгуль, винный квасъ, восковое, выпловокъ, горювка, кальвилъ, камышевское, карска, коричневое, коробовка, корольское, кривоствѣтное, крымское, малаета, майматовское, мирное, навозное, наливъ, навалоское, нѣжка, плодovitка, поповское, райское, рамзъ, ра(е)нѣтъ, синапъ, сквозняна, скоростѣлка, титовка, фондринъ, царскій шипъ, челебъ, черное дерево, чернокожее, корьевское* и др. Болѣе обыкновенные сорта приведены отдѣльно.

**ЯБЛОНЯ РАЙСКАЯ или СИБИРСКАЯ. См. Пирусъ.**

**ЯВОРОЗА (Jaborosa).** Название взято съ арабскаго *Явороза*, означающаго Мандрагору, р. близкое къ настоящему. С. насленовыхъ. (7). Мексика и Анды въ-тропич. Ю. Америки. Оранж. или выносл. трав. многол. пр. Легкая песков. глин. дерн. Дѣленіемъ и черенками изъ молодого роста.

**Я. интегрifoлия (J. integrifolia,** съ цѣльными лл.). Буэнос-Айресъ. Цв. бѣлые. 6 д.

**ЯВНОБРАЧНЫЙ. ЯВНОЦВѢТНЫЙ. ЦВѢТКОВЫЙ.** Одно изъ колѣнъ растительнаго царства, заключающее растенія, имѣющія тычинки и яички, которыя послѣ оплодотворенія превращаются въ сѣмена съ зародышемъ. Явноцвѣтныя подраздѣляются на односѣмьно-дольныя или внутреслыя и на двусѣмьно-дольныя или вѣтрослыя.

**ЯВОРЪ. См. Ацеръ и Плятанусъ.**

**ЯГОДКИ. См. Дафне.**

**ЯГОДКОВЫЯ** пр. (thymeleaceae). Древесн., кустар., рѣдко травяни. пр., имѣющія широкое распространеніе. Въ семействѣ 38 родовъ и 360 видовъ. Главнѣйшіе роды: Гиндія, Дафне, Лягетта, Пимелея и Фалерія.

**ЯГОДНЫЙ.** Давущій ягоды, — много-гнѣздные плоды съ сочною чашечкой и околосѣмянникомъ.

**ЯГОДЫ ВАВЫ. См. Рускусъ.**

**ЯЗВЕННИКЪ. См. Антипаллисъ.**

**ЯЗІОНЕ (Jasione).** Заимствовано у

Теофраста, который обозначаетъ этимъ названіемъ Конпельвулюсъ. С. колокольчиковыхъ. (12). Умѣр. Европа и Средиземныя побережья. Трав. пр. Песковатая. Сѣменами—многол. съ осени, однол. — весной; первыя также дѣленіемъ.

**Я. монтана (J. montana,** горное). *Букашинникъ*. Европа. Цв. голубые, иногда бѣлые, головками, лѣтомъ. Однол. 6—12 д. **Я. переннисъ (J. perennis,** многолѣтнее). З. Европа. Цв. голубые, лѣтомъ. 1 ф.

**ЯИЧНИКЪ** Часть плодника, въ которомъ заключены яички,—неоплодотворенныя сѣмена.

**ЯИЧКО. СѢМЯННАЯ ПОЧКА.** Та часть плодника, которая потомъ развивается въ сѣмя

**ЯИЧНОЕ ДЕРЕВО. См. Солянумъ.**

**ЯКОВИНІЯ (Jacobinia).** Происхождение названія темное. С. акантовыхъ. (30). Троп. Америка, отъ Бразиліи и Боливіи до Мексики. Теллч. трав. или куст. пр. Ухождъ какъ за Юстицію.

**Я. Гисбрехтіана (J. Ghiesbreghtiana,** Гисбрехта). Мексика. Цв. шарлаховые, зимой. 1—1 1/2 ф.

**ЯКОРЪ.** Сортъ яблока средней поры послѣванія, довольно крупный, желто-зеленоватого цвѣта, со вкусною, расплывчатой мякотью.

**ЯНТАРКА. См. Пирусъ.**

**ЯРМОЖНИКЪ. См. Эпипактисъ.**

**ЯСЕНЕЦЪ. См. Диктамнусъ.**

**ЯСЕНКОВЫЯ** пр. (melissaeae). Обширное семейство древесныхъ и кустарныхъ, рѣдко полукустарныхъ породъ изъ тропической Азіи и Америки. Древесина многихъ слыветъ подъ названіемъ кипарисной, кромѣ запаха отличается плотностью и красивымъ цвѣтомъ. Аглая, Мелія, Светенія.

**ЯСЕНЬ. См. Фраксинусъ.**

**ЯСМІНУМЪ (Jasminum).** Название арабское. С. масличныхъ (120). Азія, Африка, Австралія, о. Южн. Океана. Телл. оранж. и выносл. кустари., обычно вьющ. пр. Черенками въ песков. или торф. з., въ парникѣ. Глин. дерн. пополамъ съ торф.

**Я. грацильнумъ (J. gracillimum,** очень нѣжный). Борнео. Цв. бѣлые, крупныя, душистые, зимой. **Я. грандифлорумъ (J. grandiflorum,** крупноцвѣтный). Тропич. с.-в. часть Гималая. Цв. бѣлые, съ ниж. стороны красноватые, съ іюня до октября. Телл. р., на родинѣ встрѣчаемое на высотѣ 2—5 ф. **Я. нудифлорумъ (J. nudiflorum,** голоцвѣтный). Китай. Цв. желтые, зимой. Растетъ быстро. **Я. оффицинале (J. officinale,** аптечный).



С. Индія до Персіи. Цв. бѣлые, душистые, съ іюня до сентября. Имѣетъ пестролистныя разновидности. **Я. револютумъ** (*J. revolutum*, съ завернутыми дл.). Индія. Цв. ярко-желтые, пахучіе съ мая до октября. **Я. самбакъ** (*J. Sambac*): *Самбакъ* или *Арабскій жасминъ*. Индія. Цв. бѣлые, душистые. Цв. почти круглый годъ.

**ЯТЕОРИЦА** (*Jateorhiza*). *Jatos* — исцѣленіе и *rhiza* — корень, по врачевнымъ свойствамъ. С. полулуизианскихъ. (3). Троп. Африка и Мадагаскаръ. Тепл. многол. вьющ. пр. Уходъ какъ за Коккуллюсь.

**Я. Колумбо** (*J. Columbo*, Колумбо). Мо-

забникъ. Цв. блѣдно-зеленые; корень многол., стебли однол. Доставляетъ корень (колумбо), употребляемый въ медицинѣ.

**ЯТРОФА** (*Jatropha*). *Jatros* — врачъ и *trophe* — пища, по врачевнымъ свойствамъ. С. молочайныхъ. (70). Юж. Америка. Тепл. трав. или куст., рѣдко древесн. пр. Песков. торф. съ глини. дерн. Черенками изъ молодого роста, предельно обезвѣшенными, въ тепл. парн., въ песокъ.

**Я. подагрика** (*J. podagrica*, подагровая). Новая Гренада. Цв. красно-оранжевые, лѣтомъ.  $1\frac{1}{2}$  ф.

Конецъ.



Изданія К. Л. Риккера въ С.-Петербургѣ.

Невскій пр., д. № 14.

## БОТАНИКА

Профессора д-ра **А. де-Бари.** Перев. подъ редакц. **Хр. ГОВИ.**

1880. — Цѣна 60 к., съ перес. — 80 к.

*Оглавленіе:* Вступленіе. — Сурѣница и родственныя ей формы. — Вишневое дерево. — Малина, земляника и сродныя имъ формы. — Розы. — Яблоня, груша. — Горохъ, бобы и сродныя имъ формы. — Картофель. — Бѣлая глухая крапива (яснотка) и родственныя ей формы. — Маргаритки, Чертополохи и Одуванчикъ. — Дубъ — Ивы и тополи. — Тюльпанъ, лиліи, лукъ и сродныя имъ формы. — Злаки. — Взаимныя родственныя отношенія цвѣтковыхъ растений. — Папоротники. — Безцвѣтковые растенія. — Мхи. — Водоросли. — Грибы. — Растительное царство

## АТЛАСЪ ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ.

основанъ  
Проф. **К. АРЕНДТСОМЪ.**

передѣланъ  
Проф. **БРАНДТОМЪ.**

### СОДЕРЖАНІЕ:

*Анатомія челоука* 36 рисунковъ. *Ботаника* 180 рис. *Зоологія* 544 рис. *Минералогія и Геологія* 28 рис. Съ объяснительнымъ текстомъ.  
Изданіе 3-е 1882. Цѣна 1 р. 50 к.; съ перес. 1 р. 80 к. Раскрашенное изданіе 4 р.; съ перес. 4 р. 50 к.

## ЗВѢЗДНЫЙ АТЛАСЪ. ДЛЯ НЕВЕСНЫХЪ НАБЛЮДЕНІЙ

27 картъ съ объяснительнымъ текстомъ.

Составилъ **Я. МЕССЕРЪ.**

**1888.** Цѣна въ переплетѣ 4 р. 50 к., съ пересылкою 5 руб.

„Съ возрастаніемъ интереса къ астрноміи сталъ ощущаться недостатокъ въ хорошемъ звѣздномъ атласѣ, въ которомъ заключались бы не только карты частой неба, но и каталогъ звѣздъ, какъ переменныхъ, такъ и двойныхъ звѣздныхъ скопленій и туманностей. Этому условію вполнѣ удовлетворяетъ звѣздный атласъ Я. Мессера. Описанія и приложенія составлены весьма добросовѣстно, по новѣйшимъ наблюденіямъ и даннымъ“. (Изъ рецензій профессора С. Глазенапа въ „Новомъ Времени“, отъ 28 сентября 1888 г.)

## Мѣстоприсхожденіе воздѣлываемыхъ растеній.

Соч. **А. ДЕКАНДОЛЛЯ.** Перев. со 2 франц. изд. и. ред. **Хр. ГОВИ.**

1885. Цѣна 3 руб. 60 коп., съ перес. 4 руб.

Цѣль труда — опредѣлить первоначальное состояніе каждаго воздѣланнаго вида растенія и указать: откуда, изъ какой области земнаго шара оно ведетъ свое происхожденіе. Вместе съ тѣмъ, пользуясь многочисленными ботаническими, археологическими, палеонтологическими, историческими и лингвистическими данными, авторъ пытается установить — въ продолженіи сколькихъ вѣковъ или тысячелѣтій каждый видъ и какимъ образомъ культура его распространялась по различнымъ направленіямъ въ послѣдующихъ другъ за другомъ эпохахъ. Здѣсь собрано также много любопытныхъ фактовъ и указаній по вопросу о начальномъ состояніи культуры растеній.



Изданія К. Л. Риккера въ С.-Петербургѣ.

Невскій пр., д. № 14.

Сочиненія д-ра Эд. РЕГЕЛЯ:

## Содержаніе и воспитаніе растений въ комнатахъ.

ЧАСТЬ I. Печатается 6-мъ изданіемъ.

ЧАСТЬ II Печатается 2-мъ изданіемъ.

## Однолѣтнія и двухлѣтнія цвѣтушія растения.

ВЫБОРЪ ЛУЧШИХЪ ИЗЪ НИХЪ и УХОДЪ ЗА НИМИ.

3 изданіе. Съ 361 рисунками. 1885. Цѣна 3 р. 50 к.

### Земляника.

Ея содержаніе и описаніе годныхъ для  
нашего климата сортовъ.

Изд. 3-е съ 91 рис. 1874. 40 к.

### Смородина.

Ея разведеніе и содержаніе.

Изданіе 2-е. Съ 8 рис. 1883 г. 50 к.

### Ревень настоящій

и его культура въ Россіи.

Съ 2 рис. 1882. 15 к.

### Малина.

Ея разведеніе и содержаніе.

1866. 15 к.

## Русская дендрологія

Перечисленіе и описаніе древесныхъ породъ и многолѣтнихъ вьющихся растений,  
выносившихъ климатъ средней Россіи на воздухѣ, ихъ разведеніе, достоинство,  
употребленіе въ садахъ, въ техникахъ и пр.

Выпускъ 1—6. Съ 116 рисунками. 1870—1889. 4 р. 20 к.

## Общія правила разбивки садовъ

ВЪ КЛИМАТѢ СРЕДНЕЙ РОССІИ.

2-е изд. 1883. Съ 14 рисунками. 75 коп.

## Популярное наставленіе къ русскому пло- доводству,

или руководство къ уходу за яблонями, грушами, вишнями и сливами въ кли-  
матѣ средней Россіи. Съ 6 рисунками. 2-е изданіе 1889. 60 к.

## Путеводитель по Императорскому С.-Петер- бургскому ботаническому саду.

Съ планомъ. 1873. 50 коп.

## Весеннія красивоцвѣтушія многолѣтнія и луко- вичныя растения,

ихъ содержаніе и воспитаніе въ садахъ.

1888. Съ 91 политипажемъ. 1 рубль.